


Ex Bibliotheca  
majori Coll. Rom.  
Societ. Jesu

~~A~~  
124

10 12  
a 12  
7 G  
12







Ex Bibliotheca  
majori Coll. Rom.  
Societ. Jesu

~~A~~  
124

70 12  
a 12  
7 G  
12





CASPARI BAUHINI.

*Viri Clariss.*

Π Ι Ν Α Ε

THEATRI  
BOTANICI.

*sive*  
I N D E X

IN THEOPHRASTI DIOSCORIDIS

PLINII ET BOTANICORVM

qui à seculo scripserunt

O P E R A

PLANTARVM CIRCITER SEX MILLIVM

AB IPSIS EXHIBITARVM

N O M I N A

cum earundem Synonymijs & differentijs  
methodice

*secundum genera & species proponens.*

OPVS XL ANNORVM

summo pere expetitum  
ad Autoris autographum recensitum.



BASILEÆ

IMPENSIS JOANNIS REGIS

cl<sup>o</sup> l<sup>o</sup> LXXI





LECTORI BENEVOLO.



Peris hujus Autor, Galeni Præceptoris scripta legens, singulari fato, in hunc locum ipsius, qui tertio de Compositione Medicamentorum κατὰ γέννην habetur, incidit. Quisquis (inquit) auxiliorum undique copiam habere volet, omnis materiæ, stirpium, animalium & metallorum, tum aliorum terrestrium corporum, quæ ad Medicinæ usum ducimus, expertus esto; ut ex eis & exacta & notha cognoscat. Deinde, in Commentario, quem de Simplicium Medicamentorum facultate prodidi, sese exerceat. Nisi enim hoc modo instructus, ad præsentis operis præsidia veniat, verbotenus quidem medendi methodum sciet, opus vero nullam ipsa dignum perficiet. Qua sententia permotus, præter cæteras Medicinæ partes necessarias, ad Botanica, quæ auxilia medica subministrant, animum studiumque convertit: ea qua fieri potuit diligentia, non solum Botanographos, tanquam mutos præceptores, legendo & relegendo sedulo consuluit: verum etiam vivos in Germania, Gallia & Italia, per aliquot annos peregrinando, varijs in Academijs coram attente audivit, de Plantarum historia, nominibus viribusque studiosè inquisivit: & quod præcipuum erat, Plantas locis natalibus inspicendo, nullis molestijs, nullus laboribus nullisque sumptibus pepercit, imitatus Dioscoridis & Galeni exempla. Verum & ipsas Plantas cum autoribus contulit, qua fieri potuit industria, quo genio & ingenio, lectas, exsiccatas asservavit, ut ingentem earum thesaurum aliquot millium, præter fructus, semina, ligna, &c. collegerit.



Nec his contentus, ad veriolem & certiolem cognitionem, plures Medicinæ studiosos, Galliam, Italiam, aliasque regiones adeuntes, rogavit, ut omnis generis Plantas, etiam vulgatissimas (ipsa quoque Gramina & Trifolia,) colligerent & transmitterent. Quod quia liberaliter ab ipsis factum, eorum nomina gratitudinis ergo, peculiari Catalogo consignata adjunxit. Insuper, hinc inde, literis ad plurimos Viros Clarissimos, rei plantariæ peritos, Germaniæ, Galliæ, Italiæ, Angliæ, Daniæ, Belgij, Cretæ in Græcia, sollicitare non destitit, ut plantas transmitterent, vel de illis suam sententiam, in bonum publicum exponerent: idque à multis, pro-na benignaque mente abunde factum, grato animo agnovit, ipsorumque honorificam mentionem fecit. Nihil autem eorum, quæ studiosis in hoc disciplinæ genere, (uti & in alijs,) utile fore existimavit, intentatum reliquit. Eos frequenter, ad Vegetabilium inspectionem & cognitionem manuduxit. Varijs utilissimis scriptis, in publicum editis, Plantarum studium illustravit & auxit. Verum cum, quæ terra, entium horum beneficentissima parens, sinu suo complectitur φύς, ad infinitum pene numerum accedant, sicque huic studio difficultas inde maxima oritur: autorum quoque dissensus, atque ἀμειβομένη, hancce δυσκολίαν augeat & exaggeret, hæc ne ab hac amœnissima, humanoque generi à utilissima contemplatione, quemquam absterreant, de methodo Plantarumque Synonymijs cogitavit; quæ ambo in hunc πίνακα contulit, Plantarum hocce μεθόδως καὶ συνώνυμον σύγγραμμα concinnans: in quo ex methodice, secundum genera & species, habita potissimum ratione formæ externæ, distributæ habentur. Pro ea autem qua fuit æquitate & modestia, aliorum labores benigne interpretatus, suum cuique religiose tribuit, paremque benevolentiam ab alijs speravit, omnes hujus studij cultores & asseclas, rogavit, ut, si animadverterent se (quod non dubitet, sed ultro fateatur) alicubi lapsum esse, vel forte bis eandem Plantam repetisse, hujus studij immensitatem cogitent, quod fere Oceano simile dici possit. Nam, quemadmodum Dei in Oceano mira-



cula imperscrutabilia sunt: sic etiam Botanicum studium infinitum: imprimis, cum indies novæ Plantæ, tum alibi, tum in Indijs reperiantur. Paratus bene monentes audire, candide & amice monentibus gratias agere. Zoilum nunquam curandum putavit, cujus socij neque nunc attendendi: qui postquam hoc opere usi sunt, sine quo nunquam in studio Botanico progredi potuissent, convicijs illud impetunt, & filum, quo via ipsis per labyrinthi mæandros facta, turpiter dilacerare & conspurcare tentant. Sed hæc est sciorum & maleficatorum natura, qua solent melioribus obrectare magis, quam laude dignum quicquam præstare: hac ratione potius suam prodentes invidiam & malevolentiam, quam ut virorum bonorum & bene meritorum famam obscurare possint. Editio autem hæc recensita est ad Autoris autographum: quicquid à priori mutatum, ipsius manu factum. Utere ergo, **BENEVOLE LECTOR**, aliorum laboribus ad **DEI LAUDEM**, in commodum tuum, & typographica errata operantium infirmitati condona.





## ZACHARIAS ROSENBACHIUS,

Medic. Doct. & Professor in Illustri Schola Herbornensi, Corollario  
de inethodo Plantarum, in Indice Plantar. Herbornæ  
Nassoviorum 1626. edito.



*Erum naturalium perfecte mixtarum tanta per Orbem terrarum ac maria diversitas est, ut eas omnes cognoscere, & in certas classes disponere, uni homini sit plane impossibile. Unus enim homo vix unam speciem, v. gr. pisces, vel aves, licet illi per totam suam vitam, mane & vesperti, noctu & inter diu, jugiter operam det, plene cognoscet. Inventi sunt tamen viri, qui herouo animo pradi, nullis sumptibus laboribusq; parcentes, ad quarundam specierum plenariam fere cognitionem pervenerunt, ut opera eorum satis testantur, &c. Sola res herbaria hucusq; imperfecte ac sine certa methodo, tradita fuit. Quamvis enim de illa plurimi, tum veteres, tum recentiores scripserint, omnes tamen, vel paucissimas plantas proposuerunt, vel plures etiam ita permiscuerunt, ut nullus in eis stabilis ordo appareat. Unus CASPARVS BAVHINVS, circiter sex millia plantarum primus proposuit, easq; omnes mirabili ordine, in Pinace theatri sui Botanici, digessit. Sentient nobiscum in hoc, quicunque vel mediocriter in re herbaria versati sunt. Tanto magis autem preceptorem etiam illum nostrum secuti sumus, quia omnes ejus plantas, seu hortum siccum, non semel, sed bis ac ter, non sine magna admiratione, ipsi spectavimus. Nec credimus, in tanta plantarum varietate, meliorem ordinem unquam à quoquam adeò facile inveniri posse. Incipit enim ab herbis tritissimis, ut graminibus, progreditur per fruges, olera, & legumina, donec tandem ad frutices*

frutices & arbores perveniat, hoc perpetuo observando, ut plantas, sibi quoad externam formam maxime, vel viribus etiam internis, similes, pulcherrimis numeris jungat, dissimiles, libris, sectionibus ac titulis diversis, elegantissime distinguat. Caterum, miretur forte junior aliquis, cur princeps ille Botanicorum, cui palmam hac in re merito tribuimus, hunc Pinacem suum, opus XL. annorum, inscripserit, cum tamen liber parvus videatur, & multi sint, qui etiam uno anno magnum volumen scribant ac publicent. Verum non librorum quantitas, sed qualitas potius spectari debet. Sic qui Pinacem hunc legeri ac intellexerit, mirabitur, quomodo Autor Baubinus eum tam cito absolvere potuerit. Est enim revera omnium herbarum, suffruticum, fruticum & arborum, que in hortis, agris, pratis, vallibus, montibus, sylvis, littoribus, & aquis totius terrarum Orbis nascuntur, absolutissimum compendium. Hujusmodi libri facilius quidem oculis inspiciuntur ac describuntur, at materias singulas è remotissimis locis conquirere, methodice digerere, multis nova eaq; aptissima nomina imponere, easdem ad vivum describere, pingere, doctorum virorum judicijs subicere, ac posteritatis memoria, cum centuplo fructu tradere, hoc vero opus, hic labor est, quem non noverunt nisi experti, & pluribus annis plurimum exercitati. Prestat paucis verbis multa, quam multis pauca, vel nihil omnino dicere.



Gramen adest Bulbusq;, Olus atq; Umbella, Venenum,  
Atque Corona, Odor & Flos est, vescumque Legumen,  
Cardus in spinis, Frutex succedit & Arbor.

F. M.

Ad



Ad  
CASPARUM BAUHINUM  
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ.

I.



*Ut potiùs neclant benè olentia ferta Napæe,  
BAUHINE, quàm tibi, cedo?  
Mille etenim herbarum, plantarum nomina mille  
Collecta fasce uno doces.  
Tot grates debent, quod habent ridentia plantas  
Herbasq; prata & frutices.  
Cui potiùs violas, Junonia lilia, cui nam,  
Milesias spargant rosas?  
Floreat & viget nomen, BAUHINE, perenne  
Tibi, dum rosa & flores erunt.  
Assyriosq; Tibi ad cippum post fata Napææ  
Fundant odores perpetim.*

GEORGIUS REMVS, J. C.  
Noricus.

\*\*\*\*\*

II.

*LITTORA tot Ponti, tot campos visere & Hortos.  
Desine, tot Sylvas, tot prata, totq; rupes.  
Hac loca quod Stirpes, totus quos proferat Orbis,  
BAUHINI scriptis conspice in Eiconicis.*

PASCHALIS LE COQ, MED. apud Picta-  
vienses Decanus & Senior.

III. DE

III

**D**E plantis Graij scripserunt atque Latini,  
*Scripsit Arabs, Tunto, Gallus, Iber, Italus.*  
 De plantis quicquid scribunt Graij atque Latini,  
*Quicquid Arabs, Tunto, Gallus, Iber, Italus:*  
 Omne hoc unus habet, *BAVHINE*, labore paratum,  
*Pervigili, ingenio dispositumq; tuo.*  
 Imò alijs non visa, velut te Lynce, patefcunt,  
*Humanis deinceps usibus utilia.*  
 Ergò velut nomen planta una unusve libellus  
*Istorum studijs obtinuit celebre:*  
 Sic quoq; Plantarum praesens opus, immortalè  
*Dignum est Authoris nomen habere sui:*  
 Herbarumq; Tibi, *BAVHINE*, scientia laudem,  
*Debeat, an Phæbo, lis erit hac Medicis.*

SIGISMUNDVS SCHNITZERVS,  
 Med. Bambergensis.

\*\*\*\*\*

IV.

**Q**UID non *BAVHINVS* praestat? nam subleuat agros;  
*Describit Plantas; mortua membra secat.*  
*Jaçtiset Herophilas, Vesalius atq; Galenus*  
*Se jaçtent; noster praestitit auctor eos.*  
 Illi parva docent magnis inclusa libellis;  
*Hic docet in parvis, magna stupenda, libris.*  
 Qui *BAVHINVM* igitur non suspicit, atq; miratur  
*In plantâ cerebrum calcere molle gerit.*

LAVRENTIVS HOFMANNVS, HALLA-  
 Saxo, Phil. Med. & Chérurg. D.

**A**RTIS dictator Medica clarissimus hic est,  
 Nostra cui haud similem secula tulere virum.  
 BAVHINVS scriptis toto celebratus in orbe  
 Perfectis, cujus nomen ubiq; sacrum.  
 Quem stupet Ausonius, Gallus veneratur, Iberus  
 Miratur, Teuto calica ad astra vehit.  
 Solo hoc Sole viget Plantarum notio vera,  
 Et Microcosmi, quae est historia ampla, patet.  
 Ut meritò Hic artis dicatur Apollo & Apelles  
 Tam clarè illustrat quae latuere prius.  
 Vivat BAVHINVS decus immortale medentum,  
 Perpetuò felix floreat & vigeat.

JOANNES CAROLVS Rosenberg/  
 Argentini. Med. & Ph. D.





# NOMINA AUTHORUM

quorum operâ usi sumus.

**A**DAMUS Lonicerus: is herbarium Eucharj Röslin sui in officio Francofurti antecessoris, Germanicè scriptum quartò auxit, & postremò an. 1569. prodijt: postmodum remoto Eucharj nomine, suum præfixit, & cum figuris 833. circiter, anno 1582. dedit. Francofurti.

**ADAMI** Zaluzanij, methodi herbariæ lib. 3. Francofurti 1604. 4.

**ADRIANI** Junij Medici, phallus ex fungorum genere in Holandia: Delphis 1564. 4. cum figura.

**ADRIANI** Spigelij Patavini Professoris, Isagoges in rem herbariam lib. 2. Patavij 1606. 4.

**ADVERSAR'ORUM** opus à Petro Pena & Matthia de Lobel, Londini anno 1570. editum, additis circiter 284. figuris: postmodum anno 1576. Antuerpiæ novus titulus præfixus, epistola ad Reginem omiſsa: cui operi Lobelius Observationes suas cum novis figuris junxit.

**ÆGIDII** Everhardij Antuerpiani, de herbanaceis sive Nicotiana commentariolus, ejus vires proponens: ejusdem de usu radicis Me-coachæ. Antuerpiæ 1587. 16.

**ÆMILII** Macri Veronenſis, poësis de Herbarum virtutibus, cum obscuriorum succincta expositione Georgij Pictorij Villinganij Medici. Basileæ cum figuris 52. ex Crescencio. 1581. 8.

**ALEXANDRI** Petronij, de victu Romanorum & valetudine conservanda lib. 5. Romæ 1592. 4.

**ALOYSIUS** Anguillara horti Patavini tertius in ordine præfatus, de plantis suam sententiam diversis communicavit: opusculum in partes 14. divisum, opera Johannis Marinelli Italice prodijt (additis duabus figuris Chamæ-leontis & Sedi arboreſcentis) Venetijs 1561. in 8.

**ALOYSIUS** Mundella, Medicus Brixienſis, horti Patavini secundus in ordine præfatus, Epistolarum librum unum (in quo 36. epistolæ) & Annotationes in Examen simplicium Brasavolæ scripsit: cum Epistolis Manardi simul cula, Lugduni 1556. in fol.

**AMATI** Lufitani in libros quinque Dioscoridis enarrationes, additis diversarum lingua-

rum nominibus. Argentinæ 1554. in 4.

**ANDREAS** Bellunenſis notis in Avicennam.

**ANDREAS** Cæsalpinus Aretinus, in Acad. Pisana Professor, de plantis lib. 16. scripsit, nullis figuris additis: prodijt Florentiæ 1583. Ejusdem appendix ad hos libros, Romæ 1603. in 4.

**ANDRÆ** Lacunæ, commentaria in Dioscoridem cum figuris Hispanica lingua conscripta. Salmant. 1552. fol.

Ejusdem annotationes in Dioscoridē, in quibus Ruellij versio castigatur. Lugduni 1554. 16.

**ANDRÆ** Theveti Cosmographia, Gallicè edita cum figuris aliquot plantarū & animalium.

Ejusdem singularitates Gallicæ Antartice sive Americæ, cum 11. figuris plantarum, Gallicè: Lutetiæ 1557. 4.

**ANGELUS** Pales & Bartholomæus ab Urbe, veterum Ordinis minorum observantiarum provinciarum Romanæ, annotationes in Antidotarium Mesues. Venetijs 1543. fol.

**ANTONII** Mizaldi de Sena opusculum. Lutetiæ 1574. 8.

Ejusdem hororum secreta: item de Arborum insitione & dendranatome. Ibid. 1575. 8.

**ANTONII** Musæ Brasavoli Ferrariensis, examen omnium simplicium quorum in officinis usus est. Lugduni 1556. 16.

**ANTONII** Pafini annotationes & emendationes in versionem Dioscoridis à Matthiolo propositam: Italicè. Bergomi 1591. 4.

**APULEIUS** Platonici de Herbarum virtutibus, addita demonstratione herbarum singulorum signorum Zodiaci, nec non & stellarum errantium Lutetiæ 1528. in fol.

**ATHENÆI** Deipnosophistarum lib. 15 Græcolatin. cum Dalechampij interpretatione. 1597 in fol.

**AUGUSTINI** Galli Pressani, de Agricultura, Italicè. Venerijs 1569. 4.

**BARTHOLOMÆI** Carrichterii liber, ostendens sub quo signo Zodiaci & in quo gradu plantæ sitæ sint, & quando colligendæ, Germanicè. Argent. 1589. 8.

**BARTHOLOMÆI** Marantæ Venuſini. metho-

chodus cognoscendorum simplicium lib. 3. Venetijs 1559. in 4.

Ejusdem de Theriaca & Mithridatio lib. duo à Camerario Latine reddit. Francofort. 1576. 8.

BASILII Besleri fasciculus rariorum animalium, lapidum, maritimorum & fructuum, cum iconibus fructuum 54. maritimarum plantarum 12. &c. In fig. oblonga, Norinbergæ.

Ejusdem Horti Eystettensis descriptio cum figuris 1082. Norinbergæ. 1613.

BENEDICTI Aterij descriptio montium Stocchorij & Nelli in Bernatum ditione, & stirpium in eis nascentium: cum Cordo impressa.

BERNHARDI Dessenij Cronenburgij Medici Colonienfis lib. 10. de composit. medicam. cum ingredientium explicatione, Francofort. 1555. in fol.

BERNHARDI Paludani Medic. Ercusani, notæ ad Linscottij historiam Indicam, additæ Operibus Indicis.

BOTANICUM Francofurtianum: sunt icones Eucharj Roslin cum folis nominibus,

CAROLUS Clusius, Dodonæi historiam vernacula lingua conscripam, Gallicam fecit, & corollarium de aromatibus addidit, cum figuris quæ separatim in octavo prodire anno 1560. in fol.

Idem Garziæ ab Horto dialogos de aromatibus & simplicibus Lusitanicè conscriptos, in Epitomen contraxit, Latinos fecit, annotationibus & figuris plantarum 30. illustravit. Antuerpiæ anno 1574. 8. ejus editio quinta auctorior, additis 36. figuris cum ejusdem exoticis 1605. in folio prodijt.

Idem Nicolai Monardis de medicamentis Indiæ Occidentalis, ex Hispanicè transtulit, notis & figuris 9. illustravit: Anno 1574. 8. ejus editio quarta cum exoticis excusa est.

Ejusdem Monardis lib. tertius ab eodem Latine redditus, Antuerpiæ 1583. in 8. cufus.

Idem Christophori Acosta historiam ex Hispanico Latinam fecit, in epitomen contraxit, Scholijs illustravit, & anno 1582. edidit: tertio vero additis sex figuris cum exoticis anno 1605. in fol. prodijt.

Idem de plantis per Hispaniam observatis, lib. duos scripsit, figuris 230. additis. Antuerpiæ anno 1576. in 8.

Idem de Simplicibus per Pannoniam &

Austriam observatis libros quatuor conscripsit, figuras 353. addidit. Antuerpiæ 1583. in 8. Verum tam Hispanica quam Pannonica historia alijs juncta in folio, anno 1601. excusa fuit.

Idem Historiam plantarum rariorum cum appendice & auctario, additis figuris 1135. anno 1601. Antuerpiæ publicijuris fecit.

Idem exoticorum libros decem scripsit, quorum sex priores variam materiam circa animalia & plantas cum iconibus plantarum 194. continent. Item Garziæ lib. 2. Ch. Acosta lib. 1. Nic. Monardis lib. unum, qui prius separatim prodire. Item Nicol. Monardis lib. 3. de lapide Bezoar & Scorzonera, de Ferro & Nive, Anno 1605. in fol.

Ejusdem curæ posteriores post mortem editæ, additis 27. figuris, & libello Gregorij de Regio de Pipere Indico, His additamentum (unica figura adposita) jungitur. Antuerpiæ 1611. fol.

CAROLI Stephani domus rustica Gallicè scripta, 1554. in 4.

Ejusdem de hortens libellus, Lugduni 1536. in 8.

Ejusdem Seminarium sive plantarum earum arborum, quæ post hortos conscribi solent, Lugd. 1577. 8.

CASPARUS Bauhinus in Phytopinace 1460. plantarum nomina cum aliquot Synonymijs exhibuit, & 164. descriptiones novarum plantarum, octoq; figuras adposuit: Basileæ 1596. in 4.

Idem P. Andréæ Matthioli opera omnia, in Germania prius non cusa, emaculata dedit, additis 330. figuris & 50. novis ab ipso primum descriptis, cum. Synonymijs. Francofurti 1598. fol.

Idem Animadversiones in Historiam generalem Lugduni cufam, in quibus circiter 400. figuras in illo opere bis terve positas & repetitas esse ostendit. Francofurti 1600. in 4.

Idem Jacobi Theodori Tabernæmontani historiam Germanicam correxit, maxima parte auxit: figuras novas plures addidit: nonnullas descripsit & parti primæ Synonymias adposuit. Francofurti 1617. in fol.

Ejusdem Prodrromus sui Theatri Botanici, in quo circiter sexcentæ plantæ ab ipso primum descriptæ, additis 140. novis figuris, Francofurti 1620. in 4. editus est.

Ejusdem catalogus plantarum circa Basileam spontè



spontè nascentium, cum earundem Synonymijs & locis natalibus. Basileæ 1622. in 8.

CASPARI Pilleterij Middelburgenfis Medici, plantarum synonymia alphabetico ordine propofita. Middelburgi 1610. 8.

CASPARI Schvvenckfeldij catalogus stirpium & fossilium Silesiæ. Lipsiæ 1601. 4.

CASTORIS Durantis Medici Romani, herbarium novum cum figuris plantarum quæ in tota Europa, India Orientali & Occidentali nascuntur Italicè, viribus Latinis verbis expressus: Ordinem alphabetico observavit, & plantarum figuras 879. adposuit. Romæ 1587. folio.

CECHINI Martinelli discursus de Amomo & Calamo aromatico, Italicè. Venetijs 1604.

4. Ejusdem discursus examen, authore incerto, cum utriusque figura, Mantuæ 1607. 4.

CHRISTOPHORI Acoftæ Africani Medici & Chirurgi historia eorum medicamentorum & Simplicium rariorum, quæ ex India Orientali in Europam adferuntur, Hispanicè primum, dein Italicè edita, additis 43. figuris. Venetijs 1587. in 4. hanc in Epitomen contractam, Clusius Latinam fecit.

CHRISTOPHORI Encelij de re metallica lib. 3. & de Uva quercina. Francofurti 1577. 8.

CLAVDII Galeni de facultatibus simplicium lib. 11. & alimentorum lib. 3. & de compos. medic. in Operibus ipsis.

CLAVDII Roehardi pharmacopœi Trecensis, tractatus de Abûnehijis, cum Jo. Baubini tractatu editus.

CONRADI Gesneri historia plantarum & Viris, ex Dioscoride, Ægineta, Theophr. Plinio & recentioribus Græcis juxta elementorum ordinem. Venetijs 1541. 16.

6. Ejusdem Catalogus plantarum quadrilinguis: Tiguri 1542. in 4.

Ejusdem de Lunarijs & noctu lucentibus, cum figuris quinque, & montis Fræti sive Pilati Lucernarum descriptione. Ibid. 1552. 4.

7. Ejusdem de hortis Germaniæ liber, cum appendice & Corollario ad Cordi historiam in quo figuræ quinque: cum Cordi operibus, Argentiniæ 1561. fol.

Ejusdem de fossilibus, lapidibus & gemmis, cum maritimarum plantarum octo figuris, Tiguri 1567. 8.

Ejusdem Epistolæ medicinales per Casp.

Wolffium editæ: addita de Aconito primo asseratione cum tribus figuris. Tiguri 1577. 4.

Ejusdem de Stirpium collectione, per Wolffium edit. Tiguri 1587. 8.

CONSTANTINI Cæsaris de agricultura libri 20. opera Jo. Alexandri Brasicensi editi Græcè: Basileæ 1539. 8. Idem à Jano Cornaro Latine redditum: Basileæ 1540. 8.

CRISPINI Passæi junioris horti floridi partes duæ, florum, fructuum herbarumque icones, 315. cum brevi b. descriptionibus secundum quatuor anni tempora. Arnhemij 1614. 8. forma oblonga.

DAVIDIS Kyberi lexicon rei herbariæ trilingue: item tabulæ collectionum per 12. menses Conradi Gesneri. Argentiniæ 1573. 8.

EMANUELIS Svvertij florilegium, in quo præter figuras plurimas etiam 47. plantæ ex India utraque allatæ, hæcenusque non descriptæ adduntur. Francofurti 1612. folio.

EUANGELISTÆ Quadramij Eremitæ, Theol. D. & Ducis Ferrariensis Simplicistæ, tractatus de Theriaca & Mithridatio: Ferrariæ anno 1577. in 4.

EUCHARII Rœslin Medici Francfordiani herbarium aliquoties Germanicè cûsum, prius sub Jo. Cubæ antecessoris sui, dein suo, & quidem postremo anno 1546. cum 632. fig. Franc. in fol. tandem Ada. Loniceri nomine.

EURICII Cordi Simesusij Medici, Botanologicum per Dialogum propositum, Coloniae 1534. 8.

FABII Columnæ phytobasanos cum fig. 34. Neapoli 1592.

Ejusdè de minus cognitis plantis partes duæ, quarum prima figuras 161. Romæ anno 1606. altera pars cum fig. 44. Ibidem 1616. cusa est.

FERRANTIS Imperati Neapolitani pharmacopœi historia naturalis lib. 28. cum figuris lapidum, corallorum, spongiarum, &c. plantarum verò & fructuum 33. Neapoli 1599. folio.

FRANCISCI Alexandri Vercellensis Medici Apollo, de compositione medicamentorum, radijs duodecim constans. Venetijs 1565. fol.

FRANCISCUS Lopez de Gomara historia Indiarum generalis.

GABRIELIS Alphonsi de Hererâ, opus de Agricultura Hispanicè scriptum, per Mambrianum de Fabriano Italicè redditum, cum figuris 74. parvis. Venetijs 1577. 4.

rhodus cognoscendorum simplicium lib. 3. Venetij 1559. in 4.

Ejusdem de Theriaca & Mithridatio lib. duo à Camerario Latine reddit. Francofort. 1576. 8.

BASILII Besleri fasciculus rariorum animalium, lapidum, maritimarum & fructuum, cum iconibus fructuum 54. maritimarum plantarum 12. &c. In fig. oblonga, Norinbergæ.

Ejusdem Horti Eystettenfis descriptio cum figuris 1083. Norinbergæ. 1613.

BENEDICTI Aretij descriptio montium Stoechornij & Nefsi in Bernatum ditione, & stirpium in eis nascentium: cum Cordo impressa.

BERNHARDI Dessenij, Cronenburgij Medici Colonienfis lib. 10. de composit. medicam. cum ingredientium explicatione, Francofort. 1555. in fol.

BERNHARDI Paludani Medic. Encusani, noræ ad Linscottij historiam Indicam, additæ Operibus Indicis.

BOTANICUM Francofurtianum: sunt icones Eucharlij Roeslin cum solis nominibus,

CAROLUS Clusius, Dodonæi historiam vernacula lingua conscriptam, Gallicam fecit, & corollarium de aromatibus addidit, cum figuris quæ separatim in octavo prodire anno 1560. in fol.

Idem Garziæ ab Horto dialogos de aromatibus & simplicibus Lusitanice conscriptos, in Epiromen contraxit, Latinos fecit, annotationibus & figuris plantarum 30. illustravit. Antverpiæ anno 1574. 8. cujus editio quinque auctorior, additis 36. figuris cum ejusdem exoticis 1605. in folio prodijt.

Idem Nicolai Monardis de medicamentis Indiæ Occidentalis, ex Hispanico transulit, notis & figuris 9. illustravit: Anno 1574. 8. cujus editio quarta cum exoticis excusa est.

Ejusdem Monardis lib. tertius ab eodem Latine redditus, Antverpiæ 1583. in 8. cufus.

Idem Christophori Acostæ historiam ex Hispanico Latinam fecit, in epitomen contraxit, Scholijs illustravit, & anno 1582. edidit: tertio vero additis sex figuris cum exoticis anno 1605. in fol. prodijt.

Idem de plantis per Hispaniam observatis, lib. duos scripsit, figuris 230. additis. Antverpiæ anno 1576. in 8.

Idem de Simplicibus per Pannoniam &

Austriam observatis libros quatuor conscripsit, figuras 353. addidit. Antverpiæ 1583. in 8. Verum tam Hispanica quàm Pannonica historia alijs juncta in folio, anno 1601. excusa fuit.

Idem Historiam plantarum rariorum cum appendice & auctario, additis figuris 1155. anno 1601. Antverpiæ publici juris fecit.

Idem exoticorum libros decem scripsit, quorum sex priores variam materiam circa animalia & plantas cum iconibus plantarum 194. continent. Item Garziæ lib. 2. Ch. Acostæ lib. 1. Nic. Monardis lib. unum, qui prius separatim prodierat. Item Nicol. Monardis lib. 3. de lapide Bozoar & Scorzonera, de Ferro & Nive, Anno 1605. in fol.

Ejusdem curæ posteriores post mortem editæ, additis 27. figuris, & libello Gregorij de Regio de Pipere Indico. His additamentum (unica figura adposita) jungitur. Antverpiæ 1611. fol.

CAROLI Stephani domus rustica Galliæ scripta, 1554. in 4.

Ejusdem de re hortensi libellus, Lugduni 1536. in 8.

Ejusdem Seminatium five plantarium earum arborum, quæ post hortos conscribi solent, Lugd. 1557. 8.

CASPARUS Bauhinus in Phytopinace 1460. plantarum nomina cum aliquot Synonymijs exhibuit, & 164. descriptiones novarum plantarum, octoq; figuras adposuit: Basileæ 1596. in 4.

Idem P. Andræ Matthioli opera omnia, in Germania prius non cusa, emaculata dedit, additis 330. figuris & 50. novis ab ipso primum descriptis, cum Synonymijs. Francofurti 1598. fol.

Idem Animadversiones in Historiam generalem Lugduni cusam, in quibus circiter 400. figuras in illo opere bis terve positas & repetitas esse ostendit. Francofurti 1600. in 4.

Idem Jacobi Theodori Tabernæmontani historiam Germanicam correxit, maxima parte auxit: figuras novas plures addidit: nonnullas descripsit & parti primæ Synonymias adposuit. Francofurti 1613. in fol.

Ejusdem Prodromus sui Theatri Botanici, in quo circiter sexcentæ plantæ ab ipso primum descriptæ, additis 140. novis figuris, Francofurti 1620. in 4. editus est.

Ejusdem catalogus plantarum circa Basileam sponte

sponte nascentium, cum earundem Synonymijs & locis natalibus. Basileæ 1622. in 8.

CASPARI Pillererij Middelburgenfis Medici, plantarum synonymia alphabetico ordine propofita. Middelburgi 1610. 8.

CASPARI Schvvenckfeldij catalogus stirpium & fossilium Silesiæ. Lipsiæ 1601. 4.

CASTORIS Durantis Medicæ Romani, herbarium novum cum figuris plantarum quæ in tota Europa, India Orientali & Occidentali nascuntur Italicè, viribus Latinis verbis expressus: Ordinem alphabetico observavit, & plantarum figuras 879. adposuit. Romæ 1525. folio.

CECHINI Martinelli discursus de Amomo & Calamo aromatico, Italicè. Venerijs 1604. 4. Eiusdem discursus examen, autore incerto, cum utriusque figura, Mantuæ 1605. 4.

CHRISTOPHORI Acoftæ Africani Medici & Chirurgi historia eorum medicamentorum & Simplicium rariorum, quæ ex India Orientali in Europam adferuntur, Hispanicè primum, dein Italicè edita, additis 43. figuris. Venetijs 1585. in 4. hanc in Epitomen contractam, Clusius Latinam fecit.

CHRISTOPHORI Encelij de re metallica lib. 3. & de Uva quercina. Francofurti 1557. 8.

CLAVDII Galeni de facularibus simplicium lib. 11. & alimentorum lib. 3. & de compos. medic. in Overibus ipsis.

CLAVDII Rochardi pharmacopœi Trecensis, tractatus de Abſinthijs, cum Jo. Bauhini tractatu editus.

CONRADI Gesneri historia plantarum & Viris, ex Dioscoride, & gineta. Theophr. Plinio & recentioribus Græcis juxta elementarium ordinem. Venetijs 1541. 16.

Eiusdem Catalogus plantarum quadrilinguis. Tiguri 1542. in 4.

Eiusdem de Lunarijs & noctu lucentibus, cum figuris quinq; & montis Fræti sive Pilati Lucernatum descriptione. Ibid. 1552. 4.

Eiusdem de hortis Germaniæ liber, cum appendice & Corollario ad Cordi historiam in quo figuræ quinque: cum Cordi operibus, Argentiniæ 1561. fol.

Eiusdem de fossilibus, lapidibus & gemmis, cum maritimarum plantarum octo figuris, Tiguri 1565. 8.

Eiusdem Epistolæ medicinales per Casp.

Wolſium editæ: addita de Aconito primo asservatione cum tribus figuris. Tiguri 1577. 4.

Eiusdem de Stirpium collectione, per Wolſium edit. Tiguri 1587. 8.

CONSTANTINI Cæsaris de agricultura libri 20. opera Jo. Alexandri Brasiscani editi Græcè: Basileæ 1539. 8. Idem à Jano Cornaro Latine reddit: Basileæ 1540. 8.

CRISPINI Passæij junioris horti floridi partes duæ, florum, fructuum herbarumque icones, 315. cum brevib. descriptionibus secundum quatuor anni tempora. Arnheimij 1614. 8. forma oblonga.

DAVIDIS Kyberi lexicon rei herbariæ trilingue: item rabulæ collectionum per 12. mentes Conradi Gesneri. Argentiniæ 1553. 8.

EMANUELIS Svvertij florilegium, in quo præter figuras plurimas etiam 47. plantæ ex India utraque allatæ, hæcenusque non descriptæ adduntur. Francofurti 1612. folio.

EUANGELISTÆ Quadramij Eremitæ, Theol. D. & Ducis Ferrariensis Simplicistæ, tractatus de Theriaca & Mithridario: Ferrariæ anno 1597. in 4.

EUCHARII Ræslin Medici Francfordiani herbarium aliquoribus Germanicè cufum, prius sub Jo. Cubæ antecessoris sui, dein suo, & quidem postremo anno 1546. cum 642. fig. Franc. in fol. tandem Ada. Loniceri nomine.

EURICII Cordj Simeſiſij Medici, Botanologicum per Dialogum propoſitum, Coloniae 1534. 8.

FABII Columnæ phytobasanos cum fig. 34. Neapoli 1592.

Eiusdè de minus cognitæ plantis partes duæ, quarum prima figuras 161. Romæ anno 1606. altera pars cum fig 44. Ibidem 1616. cusa est.

FERRANTIS Imperati Neapolitani pharmacopœi historiæ naturalis lib. 28. cum figuris lapidum, corallorum, spongiarum, &c. plantarum verò & fructuum 33 Neapoli 1599. folio.

FRANCISCI Alexandri Vercellenſis Medici Apollo, de compositione medicamentorum, radijs duodecim constans. Venetijs 1565. fol.

FRANCISCUS Lopez de Gomara historia Indiarum generalis.

GABRIELIS Alphonsi de Heretæ, opus de Agricultura Hispaniæ scriptum, per Mambrianum de Fabriano Italicè redditum, cum figuris 74. parvis. Venetijs 1577. 4.

**GARZIE** ab Horto, proregis Indiæ Medici, de aromatibus & simplicibus medicamentis apud Indos nascentium historia ordine Alphabetico, per Dialogos lingua Lusitanica conscripta, à Clusio in epitomen contracta & Latine facta.

**GONSALVI** Ferdinandi Oviedi, Indiæ Occidentalis historia generalis, à Dureto in Galliam translata.

**GREGORII** de Regio, Capuccini, de Capsico libellus, curis posterioribus Clusij additus.

**GUILIELMI** Turneri Angli, plantarum historia, Anglicè scripta, cum paucis figuris. Londini, folio.

**HERMOLAI** Barbari in Dioscoridem Collariorum libri quinque. Coloniz 1590. fol.

Ejusdem in C. Plinij naturalis historiz liberos castigationes. Basileæ 1534. 4.

**HIERONYMI** Benzonis Mediolanensis, noviorbis historia, per Urbanum Calvatonem Latine reddita. Genevæ 1600. 8.

**HIERONYMI** Brunsvicensis apodixis Germanica, Brunfelsij herbario addita. Argentinz 1531. fol.

**HIERONYMI** Cardani de varietate rerum lib. 1. Basileæ 1581. 8.

**HIERONYMI** Fracastorij opera, 1590. Lugduni 8.

**HIERONYMI** Tragi historia (quæ sæpius Germanicè Argentinz in folio prodijt) per Davidem Kyberum Latine reddita, cum iconibus 567. licet ad 800. describantur. Argentinz 1552. in 4.

Ejusdem editio Germanica à Melchiore Sebizio & Nicolao Agerio emaculata. 1595. fol.

**HISTORIA** Generalis plantarum libris 18. per Joannem Molinæum collecta: Lugduni anno 1587. excusa, in qua figuræ 2686. proponuntur, verum circiter 400. bis cærvè repetuntur.

**HONORII** Belli Vicentini, Medici Cretensis epistolæ de plantis ad Clusium, cujus operibus additæ: nonnullas ad nos dedit, quæ necdum editæ.

**JACOBUS** Antonius Cortusius patricius Patavinus & horti Patavi ii V. præfectus, à Matth. Dodonæo & alijs freo jenter citatur ob plantas ipsi communicatas, à quo & ego Patavij accipi: nil edidit nisi Catalogum horti Patavini, cum ejusdem arsis, Italicè. Venetij 1591. 8.

**JACOBI** Theodori Tabernæmontani historia Germanica tribus partibus edita cum figuris 2087. Francofurti 1588. fol.

Idem emaculatus auctus & plantarum descriptionibus & figuris ac medicamentis plurimis, à C. Bauhino anno 1613. fol.

Ejusdem icones cum nudo nomine Latino & Germanico. Francofurti 1590. in longa forma prodire.

**JANUS** Cornarus Germanus, Dioscoridem transtulit & singulis capitibus Emblemata addidit. Basileæ 1557. folio.

**INDIÆ** Occidentalis partes decem cum additamento ad partem nonam, in folio.

**INDIÆ** Orientalis historiz partes decem, in folio.

**JOACHIMUS** Camerarius, Matthioli historiam Germanicam per Hanschium primum versam, & cum Matthioli figuris cusam, rursus emaculavit, novis iconibus 123. & notis auxit.

Idem Matthioli epitomen dedit cum figuris 1003. Francofurti. 1586. 4.

Idem hortum Medicum & Philosophicum scripsit: figuras 56. addidit. Francofurti 1588.

**JOSEPHI** Acostræ, historia Indiæ, addita tomis Indicis, à Clusio Latinitate donata.

**JO. CUBE**, hortus sanitatis Germanicè cum figuris circiter 370. Augustæ 1486. fol.

**JO. Baptiste** Portæ Neapolitani, Villæ libri 12. Francofurti 1592. 4.

Ejusdem Phytognomonica 1591. Franc. 8.

**JOHANNES** Bauhinus p. m. frater meus, scripsit libellum de Plantis à Divis denominatis. Basileæ 1591. 8.

Idem de Absinthij generibus. Montisbelgardii 1593. 8.

Idem de plantis circa Balneum Bollenfense nascentibus catalogum scripsit, pomorum fig. 60. & pyrorum 40. additis: editus cum Historia de Balneo Bollenfensi. Montisbelgardi 1598. 4.

**JO. Bruyerinus** Campegius Lugdunensis, de re cibaria lib. 2. Francofurti 1622. 8.

**JOANNIS** Costæi de universali stirpium natura libri duo. Taurini 1578. 4.

Ejusdem annotationes in Mesuem, cum operibus Mesuæi. Venetij 1570. fol.

**JO. du Choul** montium Lugdunensis agri præfectus, Lugdunensem Pillati montem descripsit, duabus parvis figuris additis: cum Gesneri libello de Lunarijs prodijt. 4.

JOANNIS Dantzijs Astenfis, tabulæ Simplificium quæ apud Dioscoridem, Galenum & Plinium facultates continent: & de Simplificium medicamentorum facultatibus, dialogi quatuor. Basileæ. 1543. fol.

JO. FRAGOSUS Hispaniarum regis Medicus & Chirurgus, aromatum, fructuum & simplicium aliquot ex utraque India in Europam delatorum historiam Hispanicè scripsit, Israel Spachius Med. Argentinenfis edidit. Argentinæ 1608.

JO. FRANCIUS, hortum Lusatiae sive Catalogum plantarum in Lusatia nascentium, additis Latinis & Germanicis nominibus scripsit. Budisinae 1594. 4.

JO. Gerardi historia plantarum Anglica cum figuris ipsius Tabernæ montani: nonnullis etiam Lobelij: & insuper 16. novis additis. Ita ut sint circiter 2190. Londini 1597. folio.

JO. Hugonis Lincei itinerarium ac navigatio in Orientalem sive Lusitanorum Indiam, cū Bernhardi Paludani annotationibus. Hagæ comitis 1599. fol. jungitur etiam Historijs Indicis.

JO. Leonis Africæ descriptio.

JO. Lerus Burgundus, historiam Brasiliæ nam Gallicè primum, deinde Latinè dedit. Genevæ 1594. 8. etiam cum Hist. Indicis edita.

JO. Monardi Med. Ferrariensis, epistolæ Medicinalium lib. 20. cum annotationibus in Jo. Mesue simplicia medicamenta, & primum quæ à Mesuæ omiſſa sunt. Lugduni 1556. in fol. & etiam cum Mesuæ.

JO. Pona Pharmacopœus Veronenſis, simplicium in monte Baldo nascentium Catalogum scripsit, & nonnullarum descriptiones cum fig. 160 addidit. Cluſius suæ historiæ rariorū junxit.

Idem auctiorem dedit & nonnullarum plantarum, ab Honorio Belli in Creta observatarū, descriptiones cum fig. 38. addidit. Basileæ 1608. 4.

Idem auctus, cum alijs plurib. exoticis, ex Nobilissimi Nicolai Contareni Senatoris Veneti horto instructissimo acceptis, figuris 91. additis, à filio Francisco Pona Med. Doctore, in linguam italicam translatus. Venetijs 1617. 4.

JO. Robini Botanici Regij, hortus Henrici IV. Regis Galliae & Navarrae, cum figuris 214. Lutetiae 1608. folio.

JO. Roderici Castelli albi Lusitani, index Dioscoridis, sive in Dioscoridis historiales campos exegemata. Antuerpiæ 1536. fol.

JO. Ruellij de natura stirpium libri tres, Basileæ 1537. fol. Eiusdem Dioscoridis versio.

JO. Sturmius Lovaniensis professor, de rosa Hiericunthia libellum scripsit. Lovanii 1608. 8.

JO. Thalij Medici Northusani, Sylva Herculæ, sive Catalogus plantarum in montibus & locis vicinis spontè nascentium, cum plurimarum descriptionibus cum Camerarij horto, novem figuris additis, editus Francofurti 1588. 4.

JO. Theodori de Bry florilegij partes tres. 1612. 1614. & 1618 folio.

JULII Cæsaris Scaligeri, animadversiones in Theophrasti libros sex de causis plantarum. Genevæ 1566. fol. Eiusdem in libros de historia plantarum. 8.

Eiusdem in libros duos de plantis Aristoteli inscriptos, commentarij Genevæ 1566. folio.

Eiusdè de Subtilitate l. 15. Francofurti 1576. 8.

LAURENTII Phrisij Synonyma, sive explicatio nominum medicamentorum in officinis usitatorum, Germanicè. Argentinæ 1535. fol.

LEONHARDI Fuchſij historia Latina cum 516. figuris. Basileæ 1542. fol.

Eiusdem icones scorum editæ. Basileæ 1549. 8.

Eiusdem de composit. Medicamentorum lib. 4. Lugduni 1556. 16.

LEONHARDI Rauvvolfij Medici Augustani, peregrinatio in Orientem, in qua plurimæ plantæ describuntur, & figuræ 42. apponuntur. Lauringæ 1584. 4. Icones hæ etiam in Appendice Historiæ Lugdunensis habentur.

LEVINI Lemnij, de plantis sacris, Lugduni 1595. 8. cum Fr. Valsij sacra Philosophia.

L. Junij Moderati Columellæ de re rustica l. 12. & de Arboribus liber unus. Lugduni 1541. 8.

LUDOVICI Jungermanni D. Catalogus plantarum circa Altorfium nascentiū, à Casparo Hofmanno Professore recentius. Altorfi 1615. 4.

LUDOVICI Romani navigatio in Orientē l. 7. Archangelo Madrignano interprete: cū alijs qui novum orbem describere. Basileæ 1555. fol.

MARCELLI Virgilij Florentini Secretarij Dioscoridis interpretatio, cum ejusdem Commentarijs. Coloniz 1529 fol.

MARCI Catonis de re rustica liber. Lugduni 1541. 8.

MARCI Terentij Varronis de re rustica libri tres. Ibid.

MARTINI Mylij, hortus philosophicus. Gorlicii 1597. 8.



**MATTHÆI** Sylvarici, opus Pandectarum. Venetijs 1499. fol.

**MATTHÆI** de Lobel plantarum seu Stirpium historia, additis figuris 1476. cum Adversariorum volumine (prius tamen edito) adnexo. Antuerpiæ 1576. fol.

Ejusdem Icones seorsum cussæ, 2116. numero. Antuerpiæ 1581. in longa forma.

Ejusdem Adversariorum pars altera, cum rariorum simplicium Appendice, additis 39. figuris. Londini 1605. in fol.

Ejusdem Rondeletij pharmacia restituta, priorilibro addita.

Ejusdem de Balsamo libellus & Zingibere, cum 5. figuris. Londini 1598. 4. qui Adversar. parti alteræ etiam jungitur.

**MAXIMILIANI** Transylvani de Moluccis epistola, cum novi orbis scriptoribus edita.

**MELCHIORIS** Guilandini quarti horti Patavini præfati, Theon sive Apologia adversus Matthiolum. Patavij 1558. 4.

Ejusdem aliquot epistolæ de Stirpibus, ibid.

Ejusdem Papyrus sive commentarius in tria C. Plinij de papyro capita. Venetijs 1572. 4.

Ejusdem conjectanea Synonymica plantarum, cum Horti Patavini catalogo sub anno 1591. Jo. Schenckii opera edita. Francofurti 1600. 8.

**MONACHI** in Mesuem, vide Angelus Palea.

**NICANDRI** Theriaca & Alexipharmaca, cum incerti authoris Græcis Scholijs. Venetijs 1523. 4. Ejusdem editio Græcolatina cum Goræi Scholijs. Lutetiae 1557. 4.

**NICOLAI** Clavæ Bellunenensis pharmacopœi, de Absinthio umbellifero, cum ejus figura, & de Scorfonera Italica, Venetijs 1610. 4.

**NICOLAI** Lonicenii, de Plinij & aliorum erroribus & ejusdem quædam de herbis & fruticibus. Basileæ 1529. 4.

**NICOLAI** Maronæi Medici Veronensis, de Amomo commentarius, cum Jo. Ponæ montis Baldi descriptione editus.

**NICOLAI** Monardis Hispalensis medici, de simplicibus medicamentis ex Occidentali India delatis, lib. 2. Hispanice scripti, à Clusio Latine redditi, notis illustrati. Antuerpiæ 1574. 8. & editio quarta Clusij exoticis cum fig. 17. addita.

Ejusdem libri tres de Bezoar lapide, de Scorzonera, de ferro & nive, ibidem.

Ejusdem libellus de Rosa & Citrijs Latine scriptus, cum Clusij exoticis editus.

**NICOLAI** Winckleri Medici Hallensis chronica herbarum, florum, seminum, fructuum, radicum, succorum, animalium, &c. quo tempore singula legenda. Augustæ 1571. 4.

**OTTTHONIS** Brunfelsii historia Latina tribus tomis prodijt: primus anno 1530. alter 1531. & tertius posthumus, anno 1536. Argentinae, cum figuris 238. at sedecim bis positæ sunt: summam cum & sine figuris 288. describuntur.

Idem & Germanice scripsit, in folio cum ijsdem figuris, & in 4. parvis figuris additis. Argentinae 1539.

**PALLADII** Rutilij, de re rustica lib. 14. Lugduni 1541. 8.

**PAULUS** Ronealmus Blæsenfis, specimen historiae plantarum cum figuris 43. typis æneis expressis, edidit. Lutetiae 1611. 4.

**PEDACIUS** Dioscorides Anazarbæus, de materia medica, & quidem editio Marcelli Virgilij, Goupilij, Assulani, Joannis Ruellij, Jani Cornarij, Jo. Antonij Sarraceni.

**PEDACI** Dioscoridis libri sex Ruellio interprete, cum parvis iconibus 350. additis cuilibet capiti hujus secundæ editionis annotationibus compendarijs ab H. B. P. medico: item & triginta icones stirpium nondum delineatarum à Jac. Dalechampio. Lugduni 1552. 8.

**PETRI** Andræ Matthioli commentaria Italica cum magnis figuris 1568. Venetijs: ejusdem Italica, cum parvis figuris, 1563.

Ejusdem editio Germanica Camerariana.

Ejusdem editio à C. Bauhino emaculata.

Ejusdem epitome anno 1571. edita.

Ejusdem epitome à Camerario correctæ.

Ejusdem Epistolæ cum Commentarijs Francofurti editæ, cum Apologia in Amatum Lusitanum.

**PETRI** Bellonij Observationum libri tres à C. Clusio latinitate donati, additis plantarum figuris 10. Antuerpiæ 1589. 8.

Ejusdem de neglecta stirpium cultura, eodem ex Gallico vertente, ibidem: & simul cum libris exoticorum Clusij editi.

Ejusdem de arboribus coniferis, resiniferis & sempiterna fronde virentibus, cum earundem iconibus octo. Parisijs 1553. 4.

Ejusdem de medicato funere & medicamen-

tis, ca-

ris, cada veriservandi vim habentibus. Ibidem.

PETRI Crescentij Bononiensis de agriculturæ partibus, plantarum & animalium natura & utilitate lib. 12. ante annos ducentos scripti. Basileæ 148. cum paucis figuris.

PETRI Pavij horti publici Academię Lugdunobatavæ præsidis, ichnographia, descriptio, usus, & stirpium quas habet nomina. Leidæ 1609. in 8.

PETRUS Penz, vide Adversaria.

PH LIPPUS Pigafetta regni Congiani historiam scripsit, quæ cum Indicis historiis edita.

POMPEIUS Sprechis, Antabstinchium Clavenæ, cum figura Abstinchij umbelliferi. Venetijs 1611. 4.

PROSPER ALPINUS, sextus horti Patavini præfectus, de Balsamo dialogum, ejus figura addita, scripsit. Venetijs 1591. 4.

Ejusdem de plantis Ægypti liber, cum figuris 46. & cum Medicina Ægyptiorum. Venetijs 1592. 4.

Ejusdem de Rhapontico, cum ejusdem figura. Patavij 1612. 4.

Q. APOLLINARIS liber experimentorum Germanicè sæpius editus cum 141. figuris. Argentinæ 1589. 8.

REMBERTI Dodonęi Stirpium historia Belgicè scripta, & à Clusio Gallicè reddita (vide Clusium) cum iconibus, quæ seorsim duobus tomis in octavo prodire. Antverpiæ 1553. & 1559. Icones numero 840. cum annotationibus.

Ejusdem frugum historia, anno 1512. Latinè, Antverpiæ cusa & recusa in 8.

Ejusdem eorum & purgantium historia seor-

sim cum novis figuris edita, in 8. Eadem simul juncta in libros triginta divisa. Antverpiæ anno 1583. in folio, cum 1305. figuris. Hæc historia denuo recusa Belgicè, cum cujusdam annotationibus prolixis, additis adhuc 36. novis figuris anno 1608. Latinè similiter ab autore emaculata paucis mutatis, & figuris quæ in Belgica editione habentur, cum descriptione additis, anno 1616. prodijt.

SIMON'S Januensis Clavis sanationis obscuriora vocabula ordine Alphabetico exponens. Venetijs 1486. fol. cum Sylvatico recusa.

TARQUINII Ocyori De rrmundani, de viginti radicibus adversus pestem probatis, cum earundem plantarum figuris, Germanicè cum Q Apollinaris libello.

THEOPHRASTI Græci de historia & de causis plantarum, editio Græca Veneta 1552. 8. Basileensis, 1541. 4. & Gazæ versio Lugduni 1552. 8. cum Joannis Jordani correctione.

THOBIAE Roelsij Medici Medioburgensis epistolæ ad Clusium: cum historia Clusij editæ.

THOMAS Hariot Insulam Virgineam descripsit: Clusius Latinè reddidit, est prima pars Ind. Occidentalis.

VALERII Cordi in Dioscoridem annotationes.

Ejusdem lib. 4. de stirpium historia, cum figuris 272. ex Trago & aliquot novis à Gesnero additis.

Ejusdem Sylva observationum, quæ omnia simul, Gesnero curante, Argentinæ 1561. in fol. edita.

Ejusdem dispensatorium sæpius recusum.



# NOMINA FORUM QUI PLANTAS SIL SEMINA COMMUNICAVUNT

<b>A</b> Claviu, Medicus Alteri Canensis.	Joan. Bauhus, Patavini Arch. & Med. Argentoricensis.
Angelus Bufti dictus Vinea, Medicus Venerus.	Joan. Fleislerus, Urtisli. Medicus.
Arnoldus Gillenius, Ducis Megapolitani Medicus.	Joan. Francus senior, Medicus Camicensis.
Basilijus B. slerus, Pharmacop. Norinberg.	Joan. Carolus Rosenberger, Poliarer Wormat.
Bernhardus Paludanus, Medicus Enchulanus.	Joan. Henricus Cherlerus p.m. Med. Basil.
Casparus Bartolinus, Histrix Medicinæ Professor.	Joan. Henricus Richmerus p.m. Med. Basil.
Casparus Hoffmannus, Altorfij Medicinæ Professor.	Joan. Dormannus, Pharmacop. Gunningensis.
Casparus Weckerlinus, Medic. Argentr.	Joan. Neudorffer, Medicus Norinbergens.
David Vasmarus, Lubecensis medicus.	Joan. Pona, Pharmacop. Veronensis.
Daniel Loritius, Ducis Wirtenberg Med.	Joan. Prevotius, Med. Professor & horti Patavini septimus prefectus.
Eberhardus Vorstius, Lugd. Batavorum Medicinæ Profell.	Joan. Rudolphus Salernus, Poliarer & Med. professor Argentinae.
Fabius Columna, I.C. Lynceus.	Joan. Sigfridus Helmstadi Medic. Professor.
Ferrandes Imperarus, Pharmacop. Neapolitan.	Joan. Terentius ex socier. Jesu, qui ex India plantas misit.
Franciscus Pona, Medicus Veronensis.	Joan. Michael Wolffhardus, Med. Rotebur.
Fridericus Meyer, Argentin. p.m.	Laurent. Rosenau, Pharmacop. Lineburgensis.
Fridericus Monavius Med. D.	Laurentius Scholtzius senior p.m. Med. Urtisli.
Georgius Fuchs, Medicus Hafnienfis.	Leonhard Doldius p.m. Medicus Norinberg.
Georgius Rumbaum, Med. Urtisli.	Lucas Justus, Basil. Ducis Bifont. Medicus.
Georgius Sporlinus Basil. Med. Candid.	Ludovicus Fürer, Senator Northufanus.
Gregorius de Regio Capuccinus.	Ludovicus Jungermannus, Professor Gieslanus.
Henricus Heil Meier, Dantiscan.	Matthias de Lobel, p.m. Botanographus.
Hermannus Higius, Medicus Arnheimi.	Matthæus Lister Loufincen. Medicus.
Hieronymus Vischerus, Med. Norinberg.	Nicolaus Agerius, Physices Profess. Argent.
Honorius Belli Vicentinus, Medic. Cretensis.	Nicolaus Conrarenus, Senator Venetus.
Jacobus Albinus, Medicus Hamburg.	Olaus Worm Doctor & Professor Hafniz.
Jacobus Anronius Cortufus, quintus Patavini horti præfatus.	Paschalis le Coq, Pictaviensis, Med. & Profess.
Jacobus Cargillus, Medicus Scoticus.	Philipp. Steph. Sprenger p.m. Pharmacop. Helmst.
Jacobus Gulelmi Hooft Amstelredam.	Reinold Alsinus, Profess. & horti Patavini sextus præfatus.
Jacobus Hagenbachius, Medicus Basil.	Samuel Sartler, Ducis Brunsuic. Medicus.
Jacobus Zuingerus p.m. Medicus Basil.	Thomas Platerus, Basil. D. & Professor.
Joachimus Burserus, Medicus Annebergenfis.	Vespasianus Robinius, qui Lutetie hortum exoticis plantis instructissimum habet, & à quo plura expectamus.
Joan. ab Alen, pharmacop. Bremenfis.	
Joan. Anatolius Privæus, Medicus Vefuntinus.	
Joan. Backmeisterus, Professor Rostochienfis.	



# EXPLICATIO NOMINUM

## Authorum citatorum.

**A** COSTA Crisostomus.  
 Aftuar. Aftuarius.  
 Ad. Adversaria Penæ.  
 Aegin. Aegineta.  
 Aer. Aerius.  
 Agric. Georgius Agricola.  
 Aldroan. Ullyles Aldroandus.  
 Alp Alpi. Alpin. Alpinus.  
 Ama. Amarus.  
 Ang. Anguillara.  
 Apul. Apuleius.  
 Arist. Aristoteles.  
 Athenæ. Athenæus.  
 Avic. Avicenn. Avicenna.  
 Barbosa Odoardus.  
 Belli Honorius Belli.  
 Bellon. Bellonius.  
 Bell. obs. Belloni observationes.  
 Bell. cult. de cultura neglecta.  
 Bentz. Hieronymus Barzoe.  
 Boc. Franc. Botanologicum Francofordianum.  
 Bras. Brallav. Brallavolus.  
 Bry. du Bry. Florilegium de Bry.  
 Brunf. Brunfelsius in folio.  
 Brunf. 4. editione in 4.  
 Brunf. ico. quoad iconem.  
 Brunf. def. quoad descriptionem.  
 Busbeq. Augerius Bæbequius.  
 Cadamust. Aloysius Cadamustus.  
 Cæf. Cæsalpinus.  
 Cam. Camer. Camerarius in horto.  
 Cam. ep. & hor. Camerarius in epitome Matthioli & suo horto.  
 Cam. ad Matth. Camerarius in Matthioli à se emaculato.  
 Cam. fig. horti. Camerarius in figuris horti suo additis.  
 Carate Augustinus.  
 Carda. Cardanus de varietat. rerum.  
 Car. Carolus Stephanus.  
 Cast. Castor Durantes.  
 Cast. ap. in Appendice.

Cast. ico. secundum iconem, non descriptionem.  
 Cast. def. Secundum descriptionem, non iconem: idem apud alios intelligas.  
 Cat. Altorff. Catalogus Altorffensis.  
 Cato Marcus Cato.  
 Cels. Cornelius Celsus.  
 du Choul. Johannes du Choul.  
 Cicca. Petrus de Cicca.  
 Claven. Clavenna pharmacopœus.  
 Cl. h. Clusius historia rariorum.  
 Clus. hist. def. ico. historia rarior: descriptione, vel iconem.  
 Clus. pan. historia Pannonica.  
 Clus. hisp. historia Hispanica.  
 Clus. ex. exot. historia exoticarum.  
 Clus. ap. appendice ad historiam rariorum: ap. alt. aut. appendicis alterius auctario.  
 Clus. cur. post. in curis posterioribus.  
 Clus. in corol. in corollario ad Dodonæi editionem Gallicam.  
 Clus. in Garz. in Mon. Clusius notis suis in Garziam, in Monardem.  
 Cod. Cæf. Codex Cæsarius à Dodonæo saepe citatus.  
 Col. & Colum. ubi in frugum historia occurrat, Columel' intelligas.  
 Col. Colum. Fabius Columna.  
 Contareus Nicolaus.  
 Cord. in Diosc. Cordus notis in Dioscoridem.  
 Cord. hist. in sua plantarum historia.  
 Cord. obs. in sylva observationum.  
 Cord. schol. Cordi scholiasies qui Æmilium censetur.  
 Cord. in disp. in dispensatorio.  
 Corn. Janus Cornarius.  
 Cortelius Ferdinandus.  
 Gortus. Jacob. Antonius.  
 Cost. in Mef. Costæus in Mesuem.  
 Costin. Nicolaus Costinus.  
 Dal. Dalechampsius.  
 Dal. in Plin. notis ad Plinium.

- Dalech. in Diosfiguris additis ad Dioscoridem  
 Ruellianum.  
 Dalech. Lugd. in historia universali Lugduni edita.  
 Diosc. Dioscorides.  
 Dod.ed.belg. editione Latina in folio.  
 Dod.gal. Dodonæus in editione gallica Clusij.  
 Dod.ut. Dodonæus in utraque tam Gallica quam Latina editione.  
 Dod.ed.belg. editione Belgica & postrema.  
 Dod.fl.in historia florum in octavo cusa.  
 Durantes Castor.  
 Duretus Claudius.  
 Encelius Christophorus.  
 Eysl. Eyslet. hortus Eyslettenfis.  
 Eric. & Val. Cord. Ericius & Valerius Cordus, pater & filius.  
 Fallop. Gabriel Fallopius.  
 Fabric. Georgius.  
 Frag. Fragosus.  
 Fracast. Fracastorius.  
 Franc. Francus in horto Lusatie.  
 Fuch. Fuchsius in historia Latina in folio.  
 Fuch. ico. in iconibus seorsim editis.  
 Fuch. comp. de compositione medicamentorum.  
 Gal. Galenus.  
 Gaza in versione Theophrasti.  
 Gar. Garzias ab Orto.  
 Ger. Johannes Gerardus Anglus.  
 Gesl. h. hort. Gesnerus in libro de hortis Germaniæ: hor. ap. in appendice hujus libri de hortis.  
 Gesl. lun. libello de herbis noctu lucentibus.  
 Gesl. fra. in descriptione montis fracti.  
 Gesl. scol. in libello de collectione stirpium.  
 Gesl. foss. de fossilibus.  
 Gesl. cat. in plantarum Catalogo quadrilingui.  
 Gesl. ad Cord. in corollario historiæ Cordi addito.  
 Gesl. in epist. in epistolis suis.  
 Gomara Franciscus.  
 Guil. Guilandinus in Theone.  
 Guil. the. in Theone.  
 Guil. pap. in commentario in Plinii capita de Papyro.  
 Hariot in descriptione insulæ Virginæ.  
 Hermol. Hermolaus Barbarus in corol. ad Dioscorid.  
 Hipp. Hippocrates.  
 Hon. Belli Honorius Belli in epistolis ad Clusium.  
 Imper. Fitzandres Insuperatus in sua hist. naturali.  
 Ind. occ. India Occidentalis historia.  
 Ind. or. Ind. Orientalis historia.  
 Josephus Acosta in hist. Indiæ.  
 Lac. Lacun. And. Lacuna.  
 Lang. Johannes Langius.  
 Lem. Levinus Lemnius.  
 Leon. Nicolaus Leoniceus.  
 Leri. in descript. Brasiliæ.  
 Linsc. Linscot. Linscotus in histor. Indiæ orientalis.  
 Lob. Lobelius in Observat.  
 Lob. ob. idem.  
 Lob. ad par. alt. in Adversariorum parte altera.  
 Lob. Belg. editione lingua Belgica.  
 Lob. ico. in iconibus separatim editis.  
 Lob. pharm. Rond. pharmacia Rondeletij restituta.  
 Lon. Adamus Lonicerus.  
 Lud. Rom. Ludovicus Romanus.  
 Lugd. Historia generalis Lugduni cusa.  
 Manard. Johan. Manardus.  
 Marcel. Marcellus Virgilius.  
 Marogna. Nicolaus Maronæus Veronensis.  
 Matth. Matt. Matthiolus.  
 Matth. comp. Matthioli compendium in 4.  
 Matth. Ital. Matthioli editio lingua Italica cum magnis figuris, folio.  
 Matth. ico. si iconem perpendas.  
 Mycon. Myconus hic à Lugdun. citatur.  
 Myreps. Nicolaus Myrepsius.  
 Monach. Mef. Monachi in Mesuem.  
 Monard. Nicol. Monardus.  
 Mund. Mundel. A. oysius Mundella.  
 Nicander in Theriacis & Alexipharmacis.  
 Ovied. Ferdinandus Oviedus.  
 Oribas. Oribasius Græcus.  
 Pallad. Palladius.  
 Palud. Bernhardus Paludanus notis in Linscotum.  
 Pandest. Pandestarius.  
 Pena. Petrus Pena in Adversarijs.  
 Phytopin. Phytopinax C. Baubini.  
 Pigafet. Pigafetta in descript. regni Congiani.  
 Plin. Plinius.

Pon. Johannes Pona edit. Latina.  
 Pon. Ital. editione Italica montis Baldi.  
 Portæ. Jo. Baptista Portus in sua villa.  
 Prod. Prodromus C. Bauhini.  
 Quad. Euangelista Quadramius.  
 Rauvv. Leonhardus Rauvvolfius.  
 Reg. Gregorius de Regio Capuccinus.  
 Richer. Richerius de Belleval, Botanicus Mon-  
 speliensis.  
 Rös. Eucharius Röslin.  
 Rob. Joan. Robinus.  
 Rondel. Rondeletius in sua praxi.  
 Ruel. Joan. Ruellius.  
 Scalig. Scaliger in subtilitatibus.  
 Scalig. in Arist. in Aristotelem de plantis.

Schvvenck. Casparus Schvvenckfeldius.  
 Serap. Serapio Arabs.  
 Sethi. Simeon Sethi Græcus.  
 Solinand. Solinander in consilijs.  
 Stad. Stadius in Brasiliæ descriptione.  
 Sv. Svve. Svvert. Svvertius.  
 Tab. Taber. Tabernæmontanus. edit. folio.  
 Tab. ico. in iconibus separatim cufis.  
 Th. Thal. Johannes Thalius.  
 Thevet. Andreas Thevetus.  
 Tovar. Simon Tovar, Hispalensis Medicus.  
 Trag. Hieronymus Tragus.  
 Tur. Guilielmus Turnerus.  
 Valeran. Valerandus Donreus Pharmacopœus.  
 Vercell. Franciscus Vercellenis.



AD AVTHOREM

HERMANNUS vander Haghen / BELGA

Illust. Principis Auriaci & Reipubl. Arnemiensis  
in Geldria Med. ord.



*AVHINE Aonidum decus immortale sororum,  
Quas aeterna tui laudes monumenta merentur  
Ingenij, tum quanta tuis, quae nuper in auras  
Doctorum manibus passim vulgata teruntur,  
Gratia debetur cæptis, non prenderis acri  
Mente, aut facundo quis digno expresserit ore.*

*Non si Thebanus veniat rediivivus ab Orco  
Maximus, aut vates Itale telluris alumnus,  
Atq; his Meonides socium se adjunxerit ipse.  
Tam dotes animi variae, tam multa relucet  
Omnibus in scriptis virtus prestantia tanta,  
Non modò ut aequales Medicorum scita sequuti,  
Seu vivam licuit vocem exaudire docentis,  
Seu scriptos oculis tantum evoluisse labores,  
Dicere nil dubitent, se terq; quaterq; beatos:  
Verùm etiam feri post secula longa nepotes,  
Egregias memori solvent tibi pectore grates.*

*Quis genera herbarum seclis ignota priorum  
Et fruticum plura & florum quis prodidit unus?  
Qua dum sollicito nemorosos lumine saltus,  
Dum sylvas, montesq; feros vallesq; reductas  
Scrutaris, monstrante Deo, & tua Vota juvante,  
Ernis atq; oculis pulchrè spectanda dedisti:*

*Gallia*

*Quid quicquid habet, quicquid Curia, quicquid  
Ferreus latis virgultis finibus extat,  
Arte tuo doctus viva sub imagine chartis  
Cernere cuiq; licet descriptum clare BAHINE.  
Prætereo quæ missa tibi non obvia nostris  
Multa locis libri concludis fasce sub uno.*

*Ergo Dioscorides ne tanta præmia laudis  
Prima ferat, ne Matthiolus sibi proxima poscat,  
Efficiis, unus habes & prima & deinde secunda.  
Magnanimi sileant, qui vix dum singula Reges  
Invenere, suos fastus & nomina ponant.*

*Quid memorem innumeros, cum morbis agra trahebant  
Corpora, vicina tua quos solertia moris  
Eripuit, miserisq; dedit producere vitam.  
Ut Diæ non falso raptos è faucibus artis  
Arte tua sibi sexcentos perisſe queratur.*

*Nec minor incisos humani ob corporis artus  
Gloria percrebuit: quæ dexteritate nec ulli  
Priscorum, nostri nec cuiquam cesseris ævi.*

*Multa Tibi forsan videor dixisse BAHINE  
Vix tamen hæc fuerint fastigia summa tuarum  
Virtutum Ingenij: at prohibet pudor addere plura.*



DE VTILITATE HVIVS OPERIS  
ANDRÆ LIBAVII D. & P. L.

*Carmen.*



Uti causas vires propria & discrimina rerum,  
Primi exercitijs exposuere suus.  
Inventu seros inagnu juvere nepotes,  
Et cura populu consulere bona.  
Scilicet hu ducibus ludentibus opesina ceptum est  
Discerni & membris utiliora sequi.  
Quin etiam si quid natum foret inens acerbi,  
Sive parum cautu esset oborta luess  
Querere praesidium morbumq; evellere membris  
Hinc soliti, poterant se reperare sibi.  
Idq; via facili. Nam nomine cognita quaq;  
Forma animu solita se exhibuere diu.  
Improbior donec successit patribus etas  
Contemtrixq; boni Gens, populumq; serox.  
Hinc rabiesq; furens & martia castra secuta  
Rerum confudit notitiam atq; notas.  
Artibus hinc subacta fides, viresq; negata  
Esse sub hu, primi quas docuere senes.  
Postera gens igitur sinxit nova nomina, resq;  
Spectatas alio protulit inde sono.  
Tu quoz, livor iners multum mutare solebas,  
Atq; peregrinu fingere verba notu.  
Scilicet ut raperes soli tibi turpiter usum  
Natura, medica notitiamq; rei.  
Sed tandem superavit amor studiumq; juvandi:  
Et cessit rabies invidiosa bono.  
Milliaq; in summam collecta vocabula, quæ res  
Signentur passim spe meliore monent.  
Quicumq; ergo vagu erras autoribus, atq;  
Ambiguu traberu per dubitanda vsq;  
Huc propera. menti curas demittunt inanes:  
Hic Ariadnae fila laboru habes.  
Magnus paony Heros BAVHIVS in ausu  
Errantes certo dirigit orbe pedes.  
Ille laborifer praelarus in agmine Phœbi  
Herbarum titulos ut bona legit apu:  
Unum concessit opus, quod dis ere promptu  
Posu, quas habeat quæ et herba notas.  
Utior hoc igitur gratu, tantumq; laborem  
Declara studio, non perisse, tuo.



# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER PRIMUS.

## SECTIO PRIMA. DE GRAMINIBVS.

**G**RAMEN à gradiendo, quòd geniculatis ramis serpat Dioscorides lib. 4. cap. 30. ἀρῶσις nominat: Ut & Theophrastus 1. hist. 10. 4. eiusd. 7. & 11. & caus. 16. cui 3. hist. 9. πικὰ dicitur. Ἀρῶσις ὁρῶν τὴν ἀρῶν, quòd in agris proveniat: Πικὰ, quòd omnium herbarum frequentissima.

Genera Dioscorid. quatuor facit: Primum ἀρῶσις, alterum καλαμῶσις, tertium quod in Parnasso, & quartum quod in Cilicia, cinna nominatum provenit: qua à se invicem tum figura, tum facultate multum discrepat. Es Plinio l. 24. c. 19. Primum geniculatum, alterum Parnassii, tertium aculeatum, quod triplex: Primum cuius in cacumine plurimum quinque aculei, daëtylon, alium quod Arzoo simile, tertium quod tenuius in parietinis & tegulis, quartum denig. Babylonicum, quod juxta vias nascitur. At Theophrastus multas differentias proponit: posteriores plures agnovère. Verum tantus in his Naturalisus, ut prater varietates, à prisca & recentioribus propositas, longè plures enumeraturi simus, cum in hanc classẽ Bromi, Phenicis, Lolij & Avena sterilis species (nam & ipsa Graminei generis sunt) resulerimus: de quibus ordine, à Gramine canino, cum ejus in Germania Officinis usus sit, initio factò.

### GRAMEN CANINUM.

Gramen vocamus ad imitationem Plinij, cui Canaria, quasi à canibus inventa, quã fastidium deducunt, vomitum cum pituita rejicientes: hinc Cynagrostis alii: & à foliorum primò producentium forma, quibusdam Dens Canis dicitur.

I. Gramen caninum arvense, sive Gramen Dioscorid.  
Gramen, Ruel. Dod. Cord. in Dioscor. Cast.  
Gramen Dioscoridis, Gesner. hort.  
Gramen canarium medicatum, Ad. Lob.  
Gramen caninum. Tab. Ger.  
Gramen vulgare, Lugd.  
Gramin. primi fortè Diosc. species major, Thal.

II. Gramen caninum vineale: primum in Prodomo.

III. & IV. Gramen caninum longius radicatum majus, & minus.

Gramen canarium longius radicatum latiore panicula, majus & minus, Lob. adv. part. alt.

V. Gramen caninum supinum paniculatum folio varians.

Graminis 1. Dioscor. species minima, Thal.

VI. Gramen caninum supinum paniculatum dulce: 2. in Prod.

Graminis dulcis nomine, D. Lobelius misit.

VII. Gramen caninum supinum minus.

Gramen caninum supinum. Lob. ico. Ger.

Gramen caninum supinum, 2. Tab.

IX. Gram. caninum maritimum spicatum.

Gramen geniculatum caninum marinum, Lobel. ico.

Gramen caninum tertium, Tab.

Gramen caninum marinum, Ger.

IX. Gramen caninum marit. spicâ foliaceâ  
Gram. can. longius radicat. marin. 2. Lob. ico.  
Gramen caninum quartum, Thab.  
Gramen caninum marinum alterum, Ger.

2. X. Gramen can. marit. spicâ echinâtâ, quod  
Gramen caninum maritimum asperum, vel 3.  
in Prod.

Gramen caninum medicatum marinum spicâ  
echinâtâ, C. Bauhini, Lob. ad part. alt.

XI. Gram. canin. marit. spicatum: 4. in Prod.

XII. Gram. muror. radice repente: 5. in Prod.

### GRAMEN NODOSUM,

& radicis forma.

I. Gramen nodosum avenacâ paniculâ.  
an Ægilops bulbigenus, Plin. l. 19. c. 5.

Gramen, vel avenæ syl. genus, Gef. col.

Gramen bulbosum nodosum, Ad. Lob. Lugd.

cui & Gramen nodosum, sub alia figura.

Gramen tuberosum, sive nodosum, Cam.

Gramen bulbosum, Tab.

Gramen caninum nodosum, Ger.

Agrostes alterum genus, Dod.

II. Gram. gemmeum seu nodosum secundum.

Perlaro vulgò, & Oryza sylv. Cæs.

an Coix Myconi, Lugd.

III. Gramen nodosum spicâ parvâ, sive no-  
dosum tertium: 6. in Prod.

IV. Gram. bulbosum aquaticum: 7. in Prod.

V. Gramen bulbosum ex Alepo: 8. in Prod.

### GRAMEN TREMULUM.

I. Gramen tremulum maximum.

an Phalaris alterâ, Cæs.

Gram. amourettes majore paniculâ candican-  
te, Clus. cur. post.

Colore paniculatum variat, est tufcensis,  
est albi coloris.

II. Gramen tremulum majus.

Lolium 10. & Ægilops Plinij, Trag.

Ægilops, Gef. hort. Lon.

Graminis 1. genus, Dalech. in Diosc. Ama.

Phalaris pratensis minor, Ad. Lob. ico.

Amourettes tremblantes, Clus. hist.

Phalaris pratensis, Ger.

Gramen polyanthos, Lugd.

Gramen leporinum & tremulum, Tab.

Gramen holiaceum 10. Tragi, Thal.

Variat paniculæ colore viridi, spadiceo.

III. Gram. tremulum min. paniculâ magnâ.  
Phalaris parva, Cæs.

Gramen amourett. alterum, Clus. cur. post.

Hoc aliquando in cacumine tres aut qua-  
tuor ramulos exiles fundit, semenque triangu- 2. b  
lum habet.

IV. Gramen tremul. minus pan. parvâ: 9. in  
Prod. Idem diceremus cum Graminis specie  
parva Thalij, si nostrum folia pilosâ haberet.

V. Gramen paniculis elegantissimis, sive  
ἱερόγυνος, majus.

Gramen amourettes, quasi amatorum, Clus.

Gramen paniculosum phalaroides, Lob.

Gramen pratense sextum, Dod.

Gramen filiceum seu polyanthos 2. Lugd.

Gramen paniculatum sativum, Tab.

Gramen paniculatum, Ger.

VI. Gram. minimum paniculis elegantiss.

Gramen minimum Dalech. Lugd.

### GRAMEN PANICULATUM.

*Gramen pratense paniculatum.*

I. Gramen pratense paniculatum molle.

Gramen lanatum Dalechampiij Lugd.

Gramen paniculatum molle, Lob. adv. part. alt.

Gramen equinum, sive Hippagrostis Gesneri  
cum hoc plurimum convenit.

Gramen albicans lanuginosum molle, Cam.

II. Gramen prat. paniculatum majus, latio-  
re folio: 11. Theoph.

Gramen vulgò cognitum, Trag. ico.

Gramin. 2. genus Dalech. in Diosc.

Gramen prat. majus vulgatius, Ad.

Gramen prat. vulgatius, Lob. Lugd.

Gramen pratense primum, Dod.

Gramen, Lon. commune, Thal.

Gramen alterum & vulgare, Tab.

Gramen pratense, Ger.

an per Chulem Garzias hoc gramen intellexit?

Clus. not. ad Garz.

III. Gramen pratense paniculatum majus  
angustiore folio: 10. in Prod.

Variat paniculâ & glumis longioribus.

IV. Gramen Ungaricum Busbequij in iti-  
nerario Constantinopolitano.

V. Gramen pratense paniculatum medium.

Gramen minus, Ad. Lob. ico. Tab.

Gramen pratense secundum, Dod.

Gramen pratense minus, Ger.

Variat latiore & angustiore folio.

VI. Gramen pratense paniculatum minus.

Gra-



Gramen paniculatum minus, Tab.  
Gramen minimum album & rubrum, Ger.  
Variat hoc paniculâ & culmis purpurascen-  
tibus & albis.

3. a VII. Gram. paniculâ multiplici: 12. in Prod.  
Majus & minus reperitur Montepessulî, &  
Gramen minus duriusculum nominatur.

*Gramen paniculatum arvense.*

I. Gramen arvense paniculâ crispâ.  
Gramen, Matth. Lugd.  
Gramen minimum Xerampelinum, Ad. Lob.  
ico. Lugd.  
Gramen minimum, Lugd.  
Gramen bulbosum Dalech. Lugd.  
II. Gramen paniculâ pendulâ aureâ.  
Gramen aureum Dalech. Lugd.

III. Gramen segetum altiss. paniculâ sparsâ.  
Gramen segetum paniculâ speciosâ latiore.  
Lob. ico.

Gramen segetale, Tab. Ger.  
an Gram. caule geniculato, Thal.

IV. Gramen segetum paniculâ arundinacâ.  
Gramen loliaceum 8. Tragi, Thal.  
Agrorum venti spica, Lob. ico.  
Gramen pratense 3. Dod.  
Gramen harundinaceum, Ger.

Variat paniculâ flavescente & spadiceâ.

*Gramen paniculatum montanum  
& sylvestre.*

I. Gram. montanum paniculâ spadiceâ de-  
licatiore: 12. in Prod.

II. Gram. paniculatum odoratum 13. in Prod.

III. Gramen paniculatum folio variegato.  
Gramen sulcatum, Ad. Lob. ico. Lugd.

Gramen striatum, Lon. Ger.

Gramen pictum, Cam. Tab.

Variat in colore foliorum.

IV. Gram. sylvat. panic. altiss. 14. in Prod.

*Gramen paniculat. aquaticum.*

I. Gram. palustre paniculatum altissimum.  
Gramen aquatic. harundin. paniculat. Tab.  
Gramen majus aquaticum, Ger.

II. Gramen palustre paniculâ speciosâ: 15.  
in Prod.

III. Gram. palust. panic. minus: 16. in Prod.

IV. Gramen aquatic. paniculat. latifolium.  
Lolij nonum genus, Tragi.

Gramen majus aquaticum, Lob. ico.  
Graminis arundinacæ alia species, Thal.  
Gramen harundin. paniculatum, Tab. Ger.

GRAMEN SPICATUM.

3. b

*Gramen spicatum aquaticum.*

I. Gramen aquatic. fluitans multiplici spica.  
*Αρπυρία ποταμίου.*

Gramen anatum, Tragi.  
Gramen aquis innatans, Lob. ico.  
Gramen fluviatile, Tab. Ger.

II. Gramen aquatic. geniculatum spicatum.  
Gramen aquatic. spicatum, Lob. ico.  
Gramen fluviatile album, Tab.  
Gramen fluviatile spicatum, Ger.

III. Gramen maritim. fluitans cornutum:  
17. in Prod.

*Gramen cristatum & spicatum pratense.*

I. Gramen pratense cristatum, sive Gramen  
spicâ cristatâ læve.  
Gramen cristatum C. Bauhini, Lob. ad part. 2.  
18. in Prod.

Variat florum colore, communiter ex pallido  
flavescentes, aliquando punicei coloris sunt.

II. Gramen spicâ cristatâ subhirsutum:  
19. in Prod.

III. Gramen pratense spicâ flavescente.  
Gramen anthoxanthum, Lugd.

IV. Gramen pratense spicâ purpureâ ex-  
triculo prodeunte, vel Gramen folio spicam  
amplexante.

Gramen pratense Dalech. Lugd.

V. Gramen spicatum folio aspero.

Gramen spicatum, Dalech. Lugd.

Variat folio nonnunquam articulatâ, & flo-  
ribus, qui apud nos pallidè lutei, in pratis mon-  
tium frigidorum subrubelî sunt.

VI. Gram. caryophyllatæ folijs spicâ divulsâ.

Gramen spicatum folijs Veronicae, Lob. ico.

Graminis loliacei octavi 4. species, Thal.

Gramen nigrum, Lugd.

Gramen caryophylleum, Tab.

Reperitur majus in pratis humidis, minus  
in siccis.

VII. Gramen caryophyllatæ folijs spica  
squamata.

Graminis loliacei 8. alia perpusilla species,  
Thal.

Hujus figuram priori junxit Lobel. in icon.

*Gramen spicatum montanum & nemorosum.*

I. *Gramen spicatum angustifol. montanum*: 20. in Prod.

4.a II. *Gramen sylvatic. angustifol. spicâ albâ*: 21. in Prod.

III. *Gramen caryophyllum nemorosum spicâ multiplici*: 22. in Prod.

IV. *Gramen caryophyllum montanum spicâ variâ*: 23. in Prod.

V. *Gramen caryophyllum alpinum.*

*Gramen alpinum Rabinum, Gef. hort.*

*Gramen Rabinum, Ad. (vel Ravisium montanum,) Tab.*

VI. *Gramen spicatum folijs & spicis hirsutis mollibus.*

**GRAMEN TYPHOIDES.**

*Ἀγριὸς τυφώδης.*

I. *Gramen typhoid. maximum spicâ longissimâ*: 25. in Prod.

*an Stelephuros Theophrasti, Ang.*

II. *Gramen typhoides molle.*

*Gramen alopecuroides, Lob. ico.*

*Gramen alopecurinum 1. Tab.*

*Gramen alopecuroides minus, Ger.*

III. *Gramen typhoides asperum primum.*

*Gramen typhoid. asperum majus, fortè Thalij.*

*Gramen typhinum 1. Tab.*

*Gramen typhinum majus Ger.*

IV. *Gramen typhoides asperum alterum.*

*Gramen typhinum, Lob. Lugd.*

*Gramen pratense 7. Dod.*

*Gramen typhinum 2. Tab.*

*Gramen typhinum minus, Ger.*

V. *Gramen typhoid. spicâ angustiore.*

*Gramen alopecuroides minus alterum, Lobel. icon.*

*Gramen alopecurinum 2. Tab.*

*Gramen alopecurinum minus, Ger.*

*Variat spicâ longiore & brevior.*

VI. *Gramen typhoides culmo reclinato.*

*Gramen alopecuroides minus, Lob. ico.*

*Gramen alopecurinum 3. Tab.*

*Gramen alopecurinum majus, Ger.*

VII. *Gramen typhoides spicâ multiplici.*

*Calamagrostis prima, Trago descrip.*

*Gramen typhinum 3. Tab.*

*Cyperus typhinus, Ger.*

**GRAMEN PHALAROIDES.**

I. *Gramen phalaroides majus, sive Italicum.*

*Gramen phalaroides 2. Lob. ico.*

*Gramen phalaroides, Tab.*

*Gramen alopecuroides majus, Ger.*

II. *Gramen phalaroid. minus, sive Hispan.*

26. in Prod.

III. *Gramen phalaroides spicâ molli, sive 4.b Germanicum*: 27. in Prod.

**GRAMEN ALOPECUROIDES.**

I. *Gramen Alopecuroides spicâ rotundior:*

*Ἀλεπίνας Theoph. Cauda vulpina Plinij,*

*Alopecuros Theoph. Ang.*

*Cauda vulpis Monspelienf. speciosior, Ad.*

*Alopecuros, Dod. Tab. Cam. Ger.*

*Alopecuros altera, Lob. ico.*

*Cauda vulpina, Cæs.*

*Variat: Creticum enim spicâ est majore, & ad tactum delicatior.*

II. *Gram. Alopecuros minor spicâ longiore.*

*Alopecuros longâ spicâ, Tur.*

*Cauda vulpina Monspel. Ad. Lob. ico.*

*Alopecuros major, Tab.*

*Variat magnitudine & spicarum longitudine, quæ in altera longior, in altera brevior & rotundior.*

III. *Gramen Alopecuros major spicâ longiore.*

*Juncus marinus gramineus folijs schœnanthij,*

*Ad. Lob. ico. Lugd.*

*Schœnanthium adulterinum, Tab. Ger.*

IV. *Gramen Alopecuroides Anglobritann. maximum.*

V. *Gramen Alopecuroides Africum.*

*Utriusq; iconem D. Lobelius ad memisit, & in Illustrat. plantarum descripturum monuit.*

VI. *Gramen Alopecuroides spicâ asperâ.*

*Gramen echinatum Dalech. Lugd.*

**GRAMEN TOMENTOSUM.**

I. *Gramen tomentosum spicatum.*

*Gram. tomentosum, Alopecuros veta Theoph. & Plinij, Lugd.*

*Gramen sparteum 2. & Schœnanthium, Tab.*

*Juncus marinus gramineus, Ger. tir.*

II. *Gram. pratens. tomentos. paniculâ sparsâ.*

*Gnaphalium Diosc. Trag.*

*Typha Diosc. Ang.*

*Juncus bombycinus, Ad. Lob. ico.*

Gramen eriophorum, Dod.  
Linum pratense, Gef. col. Lon.  
Gnaphalium Tragi, Lugd.  
Pseudolinum, Calt. icon.

Gramen junceum lanigerum, Thal.  
Gramen tomentosum, & Linagrostis, Tab.  
Gramen tomentarium, Ger.

5.2. Nonnunquam contractis pediculis tanquam pappus conspicitur.

III. Gramen tomentosum alpinum & minus: 28. in Prod. ex Rhætia D. Burferus attulit.

### GRAMEN SPARTEUM.

*Αἰσάραρον*, Theophr. Spartium Plinio.

I. Gramen sparteum 1. panicula comosa.  
Spartum Plinij, Clus. Lob. Lugd.  
Spartum herba, Dod.  
Spartum Plinij 1. Tab. Ger.

Juncus Ibericus sive Hispan. Dalech. in Plin.

II. Gramen sparteum 2. panicula brevi folliculo inclusa.

Spartum herba alterum, Clus. hist.  
Spartum alterum Plinij, Lob. Lugd. Tab. Ger.  
Spartum herbae alia species, Dod.

III. Gramen sparteum spicatum folijs mucronatis longioribus, vel spica secalinâ.

Spartum tertium, Clus. Lugd.  
Spartum herba 4. maritimum, Clus. hist.  
Spartum nostras, Lob.  
Spartum 5. & Plinianum 3. Tab.  
Spartum Anglicanum, Ger.

IV. Gramen sparteum spicatum folijs mucronatis brevioribus.

Gramen sparteum 1. Tab.  
Spartum Anglicum 2. Ger. tit.

V. Gramen sparteum spicatum latifolium.  
Spartum nostras alterum, Lob. ico.  
Spartum 6. vel Plinianum 4. Tab.  
Spartum herba 4. Batavicum, Clus. hist.

VI. Gramen sparteum juncifolium.  
Spartum nostras parvum, Lob. ico.  
Spartum 7. vel Plinianum 5. Tab.

VII. Gramen sparteum Basilicense capitulaceo folio: 29. in Prod.

VIII. Gramen sparteum minus, vel Hollandicum: 30. in Prod.

IX. Gramen sparteum Monspeliacum capitulaceo folio minimum: 31. in Prod.

X. Gramen sparteum setas equinas referens: 32. in Prod.

Ex Java Insula allatum: cujus videtur mentio facta in Clusij curis posterioribus, sub herbâ, Sparto Hispanico, non abssimili.

XI. Gramen sparteum pennatum, Spartum Austriacum, Clus. pan.

Gramen 9. vel junceum, Dod.

Gramen pinnatum, Dalech. Lugd.

Variat juba colore: est flavo. & etiam candido.

XII. Gram. spart. variegatum: sub 33. in Prod. Sparti nomine D. Jungermannus misit.

### GRAMEN JUNCUM ET

Spicatum.

I. Gram. foliolis junceis oblongis, radic. alba Gramen junceum Dalech. Lugd.

II. Gramen foliolis junceis brevibus majus radice nigra: 34. in Prod.

III. Gram. foliolis junceis brevibus minus. Exile gramen durius, Lob.

Gramen exile, Lugd.

Gramen minus duriusculum, Tab. Ger.

IV. Gramen exile Nicæum: de quo paucis. Busbequius in suo Itinerario.

V. Gramen foliolis junceis radice jubatâ.

Gramen exile durius Nortvegicum aut Daniæ cum, Lob. ad par. 2.

VI. Gramen palustre junceum racemoso femine: 35. in Prod.

VII. Gramen junceum polystachion.

Gramen junceum 2. vel junceum aquaticum majus, Tab.

Gramen junceum aquaticum Ger.

IX. Gramen junceum folio articulo sylvaticum.

Gramen junceum 1. vel sylvaticum nemorosum, Tab.

Gramen junceum sylvaticum, Ger.

IX. Gramen junceum folio articulo aquaticum.

Gramen aquat. alterum, Lob. ico.

Anudo minima, Lugd.

Gramen junceum polycarpon, Thal.

Gramen aquaticum, Tab. Ger.

Habetur majus & minus Thalia monente: in majore, post foenifecium, caulis novus palmaris excrescit, cui non amplius capitula corymbacea insident, sed utriculi unciales paleacei in capillamenta fissi, modo virides, modo purpurascētes: rarissimè cum corymbis utriculi reperiuntur.

X. Gramen junceum folijs & spicâ junci.

Gramen junceum maritimum, Lob. ico. Ger.

Gramen junceum tertium, Tab.

XI. Gram. junceum folijs & spica junciminus.

Gramen junceum marinum dense stipatum, Lob. ico.

6.2 Gramen junceum s. vel aquaricum minus, Tab.

Gramen junceum marinum, Ger.

XII. Gramen junceum montanum capite squamoso: 35. in Prod.

XIII. Gramen junceum minimum capitulo squamoso: 37. in Prod.

XIV. Gramen junceum minimum alterum 38. in Prod.

XV. Gramen junceum minimum maritimum: 39. in Prod.

XVI. Gram. junceum spicatum seu triglochin.

Calamagrostis 2. Trag. ico.

Calamagrostis 4. Lugd.

Carex minus, Lon. quoad 2. fig.

Gramen mixtum ex Junco & Gramine, Thal.

Gramen marinum spicatum alterum, Lob. ico. majus, Cam.

Gramen marinum spicatum, Ger.

Gramen triglochin Dalech. Lugd.

Gramen junceum 4. vel spicatum, Tab.

XVII. Gramen spicatum alterum.

Gramen marinum spicatum, Lob. ico.

Gramini montano spicato simile in maritimis Flandriae, Clus. pan.

Gramen aquatic. spicatum, Tab. Ger.

## GRAMEN CYPEROIDES.

Spicatum & paniculatum.

I. Gramen cyperoides latifolium spica ru-  
fa: sive caule triangulo.

Graminis 4. genus, Trag.

Gram. cyperoides, Lob. Lugd. Cam. Tab. Ger.

Gramen triangulum, Lugd.

Carex Tragi, Lugd.

II. Gramen cyperoides latifolium spica spadi-  
ceeo viridi majus: 40. in Prod.

III. Gramen cyperoides angustifolium spi-  
ca spadiceo viridi minus: 41. in Prod.

IV. Gramen cyperoides angustifol. spicis  
longis erectis.

Gramen palustre majus, Lob. ico.

V. Gram. cyperoides spica pendula brevior.

Pseudocyperus, Ges. hort. Lob. ico. Dod.

Pseudocyperus *δολυμάρη* Thal.

Gramen aquaticum, Lugd.

Majus & minus habetur.

VI. Gramen cyperoides spica pendula  
longiore & angustiore: 42. in Prod.

VII. Gram. cyperoid. panicula sparsa majus.  
Gram. cyperoid. aquat. vulgatus, Lob. ico. Ger. 6b

Gramen cyperinum majus, Tab.

Variat panicula, in altera compatiore & bre-  
vior, in altera magis expansa & longiore.

VIII. Gramen cyperoides palust. majus spi-  
ca compacta.

Gramen palustre cyperoides, Lob. ico. Ger.

Gramen junceum triquetrum, Thal.

Gramen cyperinum palustre, Tab.

IX. Gramen cyperoides spicis minoribus,  
minus compactis: 43. in Prod.

X. Gram. cyper. palustre majus spica diversa.

Gramen cyper. parvum aquatic. Lob. ico. Ger.

Gramen cyperinum palustre minus, Tab.

XI. Gramen cyperoides minus panicula  
sparsa subflavescente.

Juncus exiguus prarenensis, Trag.

Calamagrostis 3. Trag. ico. Lugd.

Carex minus, Lon. quoad 1. fig.

Gramen marinum spicatum minus, Cam.

Gramen cyperoides minimum panicula sub-  
flava C. Bauhini, Lobelio ad par. 2.

XII. Gramen cyperoides minus, panicula  
sparsa nigricante.

Gramen cyperoides minimum nigricante pa-  
nicula, Lob. ad. par. 2.

XIII. Gramen cyperoides miliaceum,

Cyperus graminea, Ad. Lob. ico. Lugd.

Juncus latus, Lugd.

Pseudocyperus *πολύμαρνη* Thal.

XIV. Gramen cyperoides maritimum,

Juncus maritimus, Ad. Lob. ico. Tab.

Juncus marinus alius Penæ, Lugd.

Gramen maritimum, Eidem.

## GRAMEN ARUNDINACEUM.

I. Gramen arundinaceum spica multiplici.

*Καλαμάριον* Dioscoridis.

Calamagrostis forte Babylonica, Ad.

Calamagrostis, Lob. Lugd.

Gramen arundinaceum, Lugd.

Gramen arundinaceum majus, Tab. Ger.

Variat ratione loci: nam quod in arenosis,  
spica est crassior: quod in montosis, dumetis  
humidis, spica est tenuior.

II. Gramen arundinaceum spicatum.

Gra-

Gramen harundinaceum minus, Tab. Ger.

III. Gramen arundinaceum paniculâ molli spadiceâ majus.

7. a Gramen tomentosum, Lob. ico.

Graminis loliacei 8. alia species, Thal.

IV. Gramen arundinaceum panicula molli spadicea minus.

Graminis loliacei octavi tertia species, Thal.

V. Gramen arundinaceum ramosum, plurimum album: 44. in Prod.

VI. Gramen arundinaceum enode majus montanum.

Scirpi primum genus, Trag.

Juncus sylvestris, Lon. ico.

Juncus lychnanthemus major, Thal.

Gramen harundin. montanum, Tab.

VII. Gramen arundinaceum enode minus sylvaticum.

Scirpi alterum genus, Trag.

Juncus lychnanthemus tenuis major, Thal.

VIII. Gramen arundinaceum maritimum acutissimum.

Oxygrostis maritima Dalech. Lugd.

## GRAMEN NEMOROSUM.

*Gramen nemorosum glabrum.*

I. Gramen nemorosum paniculis albis capillaceo folio: 45. in Prod.

II. Gramen nemorosum spicâ subnigrâ recurvâ.

Gramen cyperinum nemorosum, Tab. Ger.

III. Gramen nemorosum spica rufescente molli.

Gramen nemorosum 1. Tab.

Gramen sylvaticum, Ger.

IV. Gram. nemorosum spicis parvis asperis.

Gramen sylvaticum 3. Tab.

Gramen sylvaticum minus, Ger.

Variat latiore folio in dumetis, & angustiore in pratis.

V. Gramen nemorosum caliculis paleaceis. Holostium, Matth.

Holostium Matthioli, Lob. ico. Lugd.

Gramen epigonatocaulon, Thal.

Gramen junceum 6. vel bufonium, Tab.

Gramen junceum, Ger.

Duplex est repens: & erectum.

VI. Gramen holost. alpinum minimum: 64. in Prod.

*Gramen nemorosum hirsutum.*

I. Gramen hirsutum latifolium majus.

Gramen hirsutum nemorosum, Lob. ico. Ger. 7. b

Gramen sylvaticum 4. five pilosum, Tab.

II. Gramen hirsutum latifolium minus.

Magnitudine porissimum differt: datur & hujus majus & minus.

III. Gramen hirsutum capitulis Psyllij.

Cyperella Cordi & Pseudocyperi species pumila, Ges. hor.

Gramen exile hirsutum cyperoides, Lob. ico.

Gramen cyperinum pilosum, Tab.

Gramen nemogum Dalechampi, Lugd.

Gramen exile hirsutum, Ger.

Variat folijs latioribus & angustioribus.

IV. Gramen hirsutum capitulo globoso.

Combretum Plinij, Ang.

Herba Luziola vulgo, Cæs.

Gramen lucidum, Tab.

Gramen palustre echinatum, Ger. icon.

V. Gram. hirsut. angustif. majus: 47. in Prod.

VI. Gramen hirsutum angustifolium minus paniculis albis.

Gramen Leucanthemum Dalech. Lugd.

## GRAMEN ECHINATUM

& aculeatum.

I. Gramen spicâ subrotundâ echinatâ: vel

Gramen echinato capitulo.

Gramen echinatum tribuloides, Colum.

II. Gram. spicâ planâ echinatâ: 49. in Prod.

III. Gram. album capitulis aculeatis Italicum.

Gramen aculeatum, Matth. Cæs. Lugd.

IV. Gramen palustre aculeatum Germanicum vel minus.

Gramen palustre echinatum, Lob. ico.

Gramen aculeatum, Lugd.

Variat spicis longioribus, rotundioribus, sæpe in eadem planta.

V. Gramen palustre aculeatum Italicum vel majus.

## GRAMEN DACTYLOIDES

five lichenium.

I. Gramen dactylon Ægyptiacum.

Nejemelsalib, five Gramen crucis, Ægyptijs, Alpino.

II. Gramen dactylon folio arundinaceo majus: aculeatum fortè Plinij.

Gramen, Ang. Clus. Cæs.

Gramen vulgare Dalech. Lugd.

Gramen canarium alterum, Lob.

8. a Variat: nam Gallicum folijs est nonnihil villosis: Germanicum vero; folijs est glabris & cauliculis minus erectis.

III. Gramen daſtylon folio arundinaceo minus cum appendice.

Gramen vulgare Dalechampi, Lugd.

Fortè cum ſecundo idem.

IV. Gramen daſtylon folio latiore.

Sanguinaria Nevenaræ, Trag.

Canaria Plinij, & Galli crus Apuleji, Ang.

Coronopus, Leonicens.

Iſchæmon, Gefcat. Cluſ. hiſt. Tab.

Iſchæmon vulgare, Ad. Lob. Ger.

Iſchæmon Plinij, Cluſ. hiſt. quoad iconem.

Gramen Iſchæmon Plinij, Lugd.

Variat ſpicis, plerumq; quinis & ſenis: rarè quaternis: rariffimè ternis.

V. Gram. daſtylon anguſtifol. ſpicis villoſis. Iſchæmon ſecundum, Tab.

Spicis tribus, 6. 7. & 10. variat.

VI. Gramen daſtylon ſcoparium.

Gramen ſcoparium iſchæmi paniculis Gallicum, Lob. ad par. 2.

VII. Gramen daſtylon aquaticum.

Gramen aquaticum geniculatum, Tab. Ger.

IX. Gramen daſtylon eſculentum.

Gramen mannæ, Matth. Caſt.

Gramen aculeatum, Sanguinaria, Capriola, Leon. Ruel. Ama.

Fru mentem, German. Schwaden / Oryzæ ſpecies, Cord. in Dioſc.

Gramen album ſeu hirsutum, Gef. hort.

Manna cœleſtis Germanis, Eidem.

Gramen Mannæ eſculentum, Ad. Lob. Ger.

Gramen Mannæ primum, Dod. Tab.

Gramen aculeatum i. Plinij Thal.

Graminis genus quod in German. ſeritur, Cæſ.

Gramen Mannæ prius Matth. & prius Dod. Lugd.

## GRAMEN PANICEUM.

I. Gramen paniceum ſpicâ diviſâ.

Panicum ſylv. Matth. Ad. Caſt. Cam. Lugd. Tab. Ger.

Panicum Herbariorum ſylveſtre, Lob.

Gramen Mannæ alterum, Dod. Lugd.

Milium ſylveſt. & ſupinum, Cluſ. hiſt.

Panicæſtella ſpecies, Cæſ.

an Milium ſylveſtre Iſchæmum, Ang.

Spica ſubinde ſingularis, non rarè multiplex, eaq; modò herbaceæ, modò atrorubens. 8. b tis coloris eſt.

II. Gram. panic. ſpicâ ariſtis longis armatâ.

Panici effigie gramen ariſtis circumvallatum, Lob. icon.

Gramen paniceum Ger. ſecundum, Tab.

III. Gramen paniceum ſpicâ ſimplici: Ελν. μύζουρι.

Lolium ſextum, Miliaria herba Plinij, Trag.

Panici effigie gramen ſimplici ſpicâ, Lob. ico.

Panicæſtella, Cæſ.

Panicum ſylveſtre aliud, Dalech. Herba alba fortæſt Plinij, Lugd.

Gramen paniceum primum, Tab.

Gramen cyperiodes ſpicarum, Ger. ico.

Variat: aliquando enim ſpicâ oblongâ: aliquando brevi & rotundâ.

IV. Gramen paniceum ſpicâ aſperâ.

Lolium 7. Phalaris ſylv. Dioſc. Trag.

Gramen geniculatum, Tab. Ger.

Variat: Monſpelij palmo minus: apud nos erectum & cubitale.

V. Gramen paniceum ſpicis nigriâ.

Panici effigie gramen 3. Lob.

Gramen paniceum, 3. Tab.

Gramen paniceum parvum, Ger.

## GRAMEN MILIACEUM.

I. Gramen ſylvaticum paniculâ miliacæ ſparſâ.

Gramen miliaceum, Lob. ico. Cam. Tab. Ger.

Gramen pratenſe 4. Dod.

II. Gram. mont. panicula miliacæ ſparſâ: 50. in Prod.

III. Gramen arundinaceum paniculâ miliacæ: 51. in Prod.

## GRAMEN SORCHINUM.

I. Gramen Sorghi paniculâ erectum.

Gramen ſorghi effigie, Lob. ico.

Gramen ſorghinum, Tab. Ger.

Gramen pratenſe 5. Dod.

II. Gramen arundinaceum Sorghi paniculâ ſparſâ: 52. in Prod.

## GRAMEN SPICA TRITICEA

& Secalina.

I. Gramen latifolium ſpicâ triticeâ latiore compactâ: 53. in Prod.

Variat latiore & anguſtiore folio.

II. Gra-



II. Gramen latifol. spicâ triticeâ divulsâ: 54. in Prod.

III. Gramen angustifol. spicâ triticeâ compactâ: 55. in Prod.

IV. Gram. angustifolium spicâ tritici muticæ simili.

Gramen frumentarium segetaleve, triticeum, sive triticeâ spicâ, C. Bauhini, Lob. ad. par. 2. 56. in Prod.

V. Gramen spicâ fecalina: 57. in Prod.

### GRAMEN SPICA BRIZÆ.

I. Gramen spicâ brizæ majus: 58. in Prod.

II. Gramen spicâ brizæ minus: 59. in Prod.

III. Gramen spicâ geminâ millepedæ simil. Gramen dystachyophoron, Colum.

### GRAMEN HORDEACEUM.

I. Gramen hordeaceum montanum sive majus.

Graminis loliacei 3. genus majus, Thal.

II. Gram. hordeaceum minus & vulgare.

Lolium tertium, Trago.

Holcus Plinij, Aristida alijs, Ang.

Hordeum murinum, Tur. & Cæs.

Hordeum spontaneum spurium, Ad. Lob.

Hordeum sive triticum murinum, Dod.

Hordeum spurium, Tab. Ger.

Graminis loliacei 3. genus, Thal.

Gramen hordeaceum, Lugd.

III. Gramen hordeo disticho simil.

Gramen hordeaceum pumilum, Clus. cur. post.

### GRAMEN LOLIACEUM.

I. Gramen loliaceum spicâ longiore.

Alp. Diosc. Arist. Theoph. Gal. Orib. Ægin. Aët.

Zafetzer Constan. Zinzania Arabum.

Lolium & Æra, Plinio.

Lolium, Ruel. Matth. Ges. cat. Ama. Cord. in

Diosc. Tur. Dod. Cæs. Cast. Lugd. Tab.

Lolium & triticum remulentum, Ad. Lob.

Lolium verum, Ges. hor.

Lolium album, Ger.

Frumentum satuum, Lon.

Variat: communiter aristas habet, sed sine aristis quoque Bononiæ observatum.

II. Gramen loliaceum latifolium spicâ angustiore: 60. in Prod.

III. Gram. loliac. angustiore folio & spicâ. *q. sinf.* Dioscoridi, à seminis colore phœniceo.

Herba Phœnicea Græcis, hordeum murinum nostris, Plin.

Lolium quantum, Trago.

Phœnix, Matth. Tur. Lacun. Dod. [cui & Lolium murinum.] Cast. Ang. Cord. Lon. Cæs. Lugd.

Hordeum murinum, Guil. Lob. Tab.

Graminis loliacei 4. genus Tragi, Thal.

Lolium rubrum, Ger.

IV. Gramen loliac. minus spicâ simplici: 61. in Prod.

V. Gramen loliaceum minus supinum multiplici spicâ: 62. in Prod.

VI. Gramen loliaceum supinum.

Gram. phalaroides exile supinum humi sparsum Danicum, Lob. ad. par. 2. à quo accepimus.

VII. Gramen maritimum paniculâ loliaceâ: 63. in Prod.

### GRAMEN FESTUCÆ, SEV

*Ægilops & Bromos herba.*

I. Festuca graminea glumis hirsutis.

Lolium 2. Trag. at. icon.

Ægilops & Festuca, Dod. gal. Ges. hort.

Bromos, Lac. altera, Ger.

Bromos sterilis altera, Lob. Lugd.

Lolium, Lon.

Festuca altera, Dod.

Gramen murorum Dalech. Lugd.

Festuca graminea, Thal.

Phœnicis altera species, Eid.

Syphonium, Bromos herba, Tab.

Variat spicis, quæ aliquando quasi in fasciculum comprehensæ. & Phœnix altera est Thalij: aliquando dispersis: sic aliquando glabris, aliquando hirsutis: & propriè Secales vitium est.

II. Festuca graminis glumis vacuis: 64. in Prod.

Variat: aliquando aristis oblongis incurvis armata Monspeßuli reperitur.

III. Festuca graminea effusa jubâ: 66. in Prod.

IV. Festuca graminea nemoral. latifolia mollis.

Festuca quarta, Thal.

V. Festuca junceo folio: 66. in Prod.

an Festuca nemoral. quarta & tenuifolia, Thal.

VI. Festuca junceo folio spicâ geminâ: 67. in Prod.

VII. Festuca avenacea sterilis elatior.

*Spinae* Diosc. aliis. *Spinae* non, ad differentiam avenae.

Festugago, Gazæ.

Lolij primum genus, Trag. def.

Ægilops prima, Matth. altera, in comp.

Ægilops, Lac. vera, Gef. hort.

Bromos & avena herba, Dod. gal.

Festuca & avena Græca, Lon.

Avena sterilis, Ad. Thal.

Bromos sterilis, Lob. ico. Ger.

Bromos herba, Dod. Lugd.

Avena Græca, Cæs.

Ægilops 1. & Avena fatua, Tab.

VIII. Festuca avenacea sterilis humilior.

Lolij quintum genus, Trag.

Bromos herba graminei generis, Thal.

IX. Festuca graminea arvensis minor.

Festuca sexta, Thallio.

X. Festuca pratensis lanuginosa: 68. in Prod.

XI. Festuca dumetorum: 69. in Prod.

XII. Festuca dumetorum foliis angustissimis pilosis: 70. in Prod.

XIII. Festuca utriculis lanugine flavescens.

*Spinae* Diosc. Theoph. [ ubi Gaza Avenam vertit, ] Gal. Oribas. Ægin.

Hordeum festuca, seu Ægilops, Plinio.

Ægilops Bromoides Belgarum, Lob.

Festuca prior, Dod.

Avena tertium genus syl. Cæs.

Avena sylvest. seu nigra, Thal.

Ægilops Dodonæi, inter Ægilopen & Bromum media, Lugd.

Ægilops sexta, Bromoides 2. Tab.

XIV. Festuca altera capitulis duris.

Ægilops, Ang. Matth. comp. Ad. Dod.

Ægilops secunda, Matth. Lugd.

Festuca sive Ægilops Narbonensis, Lob.

Triticum sylvest. in Sicilia, Cæs.

Fruentum syl. Cast. ap.

Ægilops Lobelij & Penzæ, Lugd.

Ægilops peregrina, Tab.

Festuca Italica, Ger.

Spica communiter ex duobus aut tribus capitulis duris composita est: nonnunquam ex plurib. compacta, spicam triuncialem obtinet.

XV. Festuca longissimis aristis glumis vacuis spadiceis coloris.

Ægilops 4. Bromoides 1. Tab.

Ægilops Bromoides, Ger.

## GRAMEN AVENACEUM.

I. Gram. montanum avenaceum spicatum.

Gramen montan. spicatum. Clus. pan. & hist.

Gramen sylvaticum secundum, Tab.

Gramen marinum spicatum alterum, Ger.

II. Gramen mont. avenaceum locustis rubris: 71. in Prod.

Variat caule, lævi in montosis: in dumetis humidis, foliis cauleque subasperis.

III. Gramen avenaceum locustis rariorib.

Gramen avenaceum rariore grano Danicum,

Lob. ad. par. 2. à quo accepimus.

IV. Gramen avenaceum capillaceum minoribus glumis.

Gramen Anglo-Britannicum avenaceum, Danico nemorali simile: Hoc nomine à D. Lobelio accepimus.

Gramen nemorale avenaceum alterum ex fusco xerampelinum & lucidum Danicum, Eid.

ad. par. 2. cuius etiam varietatem notat.

V. Gramen avenaceum montanum lanuginosum.

Gram. monta. avenæ semine, Clus. pan. & hist.

Gramen avenaceum, Tab.

Hordeum distichon, Ger. ico.

VI. Gramen avenaceum lanuginosum glumis rarioribus: 72. in Prod.


VII. Gram. avenac. lanuginosum ramosum.

Gramen glumosum Dalech. Lugd.

VIII. Gramen glumis variis: 73. in Prod.

IX. Gramini affinis planta ad gutturis inflammationes utilis.

Planta in planis nascens graminis modo, Petri de Olina in epist. ad Manardem. sed quid?



## SECTIO SECUNDA

JUNCUS, NARDUS, CYPERUS, SPARGANIUM,  
Uva marina & Equisetum.

## DE JUNCO.

**JUNCUS** à jungendo, Græcis  $\chi\alpha\iota\nu$ , à loricis & funibus dicitur. Dioscorides in odoratum & in odorum divisisse videtur. Nam l. i. de Juncis odorato, quem simpliciter  $\chi\alpha\iota\nu$  per excellentiam nominavit: at l. 4. c. 52. de inodoro egit: hunc duplicem fecit, unum levem, alterum acutum: hunc sterilem, & alterum semine nigro & crassior e calamo, & tertium  $\delta\lambda\omicron\chi\alpha\nu$  prioribus carnosiores. Sic Theophr. 4. hist. 13. tria sunt genera,  $\alpha\kappa\upsilon\tau\omicron\varsigma$  acutus & sterilis, qui mas:  $\mu\alpha\lambda\alpha\gamma\kappa\omicron\nu$  frugifer, quem  $\mu\alpha\lambda\alpha\gamma\kappa\omicron\nu$  ariserum vocitat: tertium  $\delta\lambda\omicron\chi\alpha\nu$  dicitur: at de odorato 9. hist. 7. egit. Plinius l. 21. c. 18. quinque fecit, 1. Mariscum appellatum, 2. marinum, oxyphænum, & hujus tria genera: acutus, sterilem, quem marem & oxym. alterum semen ferentis, quem Melancranin vocant, & fructuosior: magis tertius, qui Holoſchænos nominatur. Quare Juncus alius est odoratus, indurus alter: vel alius locis aridis, alius aquis provenit: hic, vel in aquis dulcibus, vel maritimis. Rursum utriusque generis alij  $\alpha\mu\phi\iota\gamma\alpha\iota$  in  $\alpha\kappa\upsilon\tau\omicron\varsigma$  in unctorem pungentem desinunt, alij in fastigium obtusius: & sic alius  $\lambda\epsilon\nu\iota\varsigma$ , levius: alius  $\tau\epsilon\theta\epsilon\chi\upsilon\varsigma$ , asper: alius fastigium acutiore alius, obtusiore. Juncus levius & in fastigio acutus, alius est oxyphænos, alius holoſchænos. Oxyphænos alter mas,  $\alpha\kappa\upsilon\tau\omicron\varsigma$ , nullo semine fecundus: alter femina,  $\mu\alpha\lambda\alpha\gamma\kappa\omicron\nu$ , nigrum semen ferens: sic ad fecundum, clavatus: petrosus verò, ad lapides referendus est.

## I. Juncus odoratus sive aromaticus.

$\chi\alpha\iota\nu$   $\alpha\delta\iota\sigma\mu\alpha$  &  $\chi\alpha\iota\nu$   $\sigma\mu\alpha$   $\alpha\delta\iota\sigma\mu\alpha$ , Hipp.

$\chi\alpha\iota\nu$   $\sigma\mu\alpha$   $\alpha\delta\iota\sigma\mu\alpha$ , Græcis posterioribus.

$\chi\alpha\iota\nu$ , Diosc. & Galeno.

Juncus odoratus, Plinio, Hermol. Ruel. Matth.

Tur. Lac. Ad. Lobel. Clus. in Garz. Cæs. alp. Cast.

Lugd.

Juncus rotundus, Celso.

Juncus rotundus odoratus, Marcell. Ama.

Corn.

Schenus & Juncus odoratus teres ac rotundus

Cord.

Schenanthum, Mesuëo, Lon. (cui & Cyperus

rotundus.) Tab. (& Juncus aromaticus.) Cam.

(& Juncus floridus sive aromaticus) Acostæ.

Squinanthum, Varroui, Ang. Gaul. & Offici-

nis, quasi  $\chi\alpha\iota\nu$   $\alpha\delta\iota\sigma\mu\alpha$ , junci flos.

Adhar & Adhar, Arabibus. Sachbar, Arabia

incolis.

Palea de Mecha & Parus camelorum, vulgo.

## JUNCUS ACUTUS.

I. Junc. acut. capitulis forghi  $\sigma\phi\epsilon\chi\alpha\nu$  Diosc.

Juncus acutus, Ang. Cord. in Diosc. Cast. acu-

to cacumine. Ges. cat.

Juncus maritimus primus, Ad.

Juncus rotundus alter, Cæs.

Huc ferri potest

Uva palustris & inusitatum Caricis genus, cu-

jus folia peracuta cruda & pedes sauciant: par.

6. Ind. octid. exped. in Floridam.

II. Juncus acut. marit. capitulis rotandis.

Juncus acuminatus, Ama.

Juncus acutus maritimus, alter, Ad.

Holoſchænos major, Lugd.

III. Juncus acutus maritimus caule trian-

gulo: i. in Prod.

an Juncus exiguus maritimus, Cæs.

IV. Juncus acutus paniculatus sparsus.

Juncus tertius, Dod. gal. acutus, Dod. Cast.

Juncus acutus vulgat. Lob. ico.

Juncus oxyſchænos Dodonæi, Lugd.

## JUNCUS LÆVIS

Ο'λόχον @.

## I. Juncus seu Scirpus Indicus.

Juncus Indicus porofus, Cluf. cur. post.  
an ex hoc Juncus parantur tapetia in Guinea:  
Linf. part. 2. Ind. or. c. 4. & ex hoc Scirpove vi-  
ridi, sportulas, storeas, stragula & pileos in  
Guinea puellæ faciunt: par. 6. Ind. or. c. 7.  
& apud Bantanos, pilæ luforiæ: par. 5. Ind. or.  
fig. undecima.

II. Juncus maximus, five Scirpus major  
quamvis veteres Scirpum à Juncis diffiniffe  
videantur.

Mariscus Plinij.

Juncus palustris major, Trag. Tab.

Juncus grandis Holoschænos, Cord. in Diosc.  
Gef. cat. Dod.

Scirpus, Junci tertia species, Lac.

Juncus tertius holoschænos, Ang. Cast.

Juncus & Scirpus, Lon.

Juncus aquaticus maximus, Ad. Lob. ico. Ger.

Juncus lævis aquaticus maximus, Thal.

Juncus rotundus 3. Cæf.

Juncus lævis, Ger. ico.

Holoschænos Theophrasti, Lugd. defc.

## III. Juncus five Scirpus medius.

Juncus sylvaticus, Tab.

Juncus aquaticus maximus, Ger. ico.

## IV. Juncus lævis paniculâ sparsâ major.

Juncus vulgaris alter, Trag.

Juncus oxyſchænos, Ang.

Juncus lævis (ſeu lenis.) Cord. in Diosc. Dod.

Lugd. five Oxyſchænos vulgaris.

Juncus lævis vulgat. Ad. Thal. paniculâ ſparsâ,  
Lob. ico.

## V. Juncus lævis alter.

Junci lævis aliud genus, Lugd.

Ex hoc, medulla prorsus nivea ad lucerna-  
rum lumina extrahitur.

## VI. Juncus lævis paniculâ ſparsâ minor.

## VII. Juncus lævis paniculâ non ſparsâ.

Juncus. Matth. Lac. Cast.

Juncus lævis, Lugd.

Juncus lævis glomerato flore, Lob. ico.

Juncus palustris minor, Tab.

an Juncus rotundus primus, Cæf.

VIII. Juncus exiguus montanus mucrone  
carens: 2. in Prod.

an Juncus lychnanthemos tenuis, Thal.

## IX. Juncellus inutilis: 3. in Prod.

Chamaſchænos, Gef.

Huc referendus eſt

Juncellus omnium minimus, Ad.

## JUNCUS ACUMINE REFLEXO.

## I. Juncus acumine reflexo major.

Juncus lævis, Gef. cat. Tab.

Juncus melancranis, & Juncus oxyſchænos  
fœmina, Lugd.

an Juncus lychnanth. tenuis major, Thal.

## II. Juncus acumine reflexo alter: 4. in Prod.

III. Juncus acumine reflexo minus vel tri-  
fidus: 5. in Prod.

## JUNCUS CAPITULIS

Equiſeti.

## I. Juncus capitulis equiſeti major.

Juncus aquaticus min. capitulis equiſeti, Lob.

Juncus clavatus, Dalech. Lugd.

Juncus alius ſecundus, Eid.

Variat ſciris latioribus & triplo anguſtio-  
ribus.

II. Juncellus capitulis equiſeti minor &  
ſluitans: 6. in Prod.

## JUNCUS CAPITULO LANU-

ginoso & bombycino.

I. Juncus capitulo lanuginoso: ſive Schœ-  
nolagurus: 7. in Prod.

## II. Juncus alpinus bombycinus: 8. in Prod.

## JUNCUS FLORIDUS.

## I. Juncus floridus major.

Calamagrostis 2. Trag. prima, Lugd. cui etiam

Calamagrostis leucanthemos.

Sparganium, Dod. gal.

Juncus floridus, Matth. Cast. Lugd.

Gladiolus palustris, Cord. hiſt. & Ger.

Gladiolus aquaticus, Gef. cat. Dod.

Carex alterum, Lon.

Juncus cyperoides floridus paludofus, Lob.  
Ad. &

Juncus cyperoides paludofus, Eyſt.

Juncus cyperinus floridus, Tab.

Butomos Theoph.

Quibuſdam Butomos Theoph. 1. hiſt. 8. & 4.  
hiſt. 9. 11. 12. alijs Gladiolus Ejuſdem 1. hiſt. 8.

& 16. Item 4. hiſt. 9. 10. 11. nonnulli ſpargani-  
um Dioſcorid. 1. 4. c. 21. Flos colore elt in pur-  
pura diluto: at Tragus candido notat.

## II. Juncus floridus minor: 9. in Prod.

NARDUS.

**N**ardus Diosc. l. i. forse à Naardo urbe Syriaca, Euphrati contermina: aliis Naardos *ἡ ὀσμή*, quam inter aromata Dioscorides: inter odorata ad unguenta, Theoph. hist. 7. recensuit.

Genera Dioscorides plura fecit, & cap. 6. differentias multas, loco natali solùm differentes, proposuit, omnibus in uno monte nascentibus: ut Syriacam, Occidentem versus Syriam respiciente: Indicam, Orientem versus ad Judæam vergente: hac duplex, una in monte, altera ad radicem montis, non procul à præterfluente Gange, qua Gangitica, quæq; omnes simul adferuntur: addit & Sampharissicam: de reliquis speciebus infra l. 4. agemus. Plinius de Nardo & ejus differentiis l. & cap. 12. verba fecit.

I. Nardus Indica, quæ spica, Spica nardi, & Spica Indica Officinis.

Nardus, Ruel. Cord. in Diosc. Gef. cat. Lac. Tur. Lob.

Nardus Indica, Matth. Cortd. hist. Lon. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Spica Nardi, Ang. (cui Nardus Gangitis Diosc.) Mundel. Amat. (& Indica spica.) Ad. Lob. ico.

Acoft. Cæs. (qui ex Algarum genere esse statuit,) Lugd.

Spicæ nardus, quam frumenti more ad duarum

vel ternarum spithamarum altitudinem ex-  
crescere scribunt: in 4. part. hist. Ind. Orient.  
cap. 39.

Hæc à Syriaca & Gangetica, tantùm natali-  
bus differre videtur.

II. Nardus spuria Narbonensis.

Nardus Gangitis spuria Narbonæ, quæ Gan-  
gitidi Dioscoridis prorsus quadrare videtur,  
Ad. Lob. ico.

Nardus spuria Narbonensis, Lugd.

Nardus Narbonensis, Ger. adulterina, Tab.

CYPERUS ET EJUS

Species.

**K**ύπερος αὐτὸ ῥόμπε, à radice effugit, quæ pyxidulam aut vasculum pusillum imita-  
tur, nomen accepisse videtur.

Genera duo Dioscorides l. i. recensuit: alterum radice rotundâ, quod Officinarum Cy-  
perus est: alterum Gingiberis effigie, quod in Officinis Curcuma dicitur. Theoph. 4. hist. 11. Cy-  
perum (Gladisolum Gaza versis) radice inæquali esse scribit, partim crassa carnosâ, partim  
gracili & sarculosa. Plin. l. 21. c. 18. Cypero radice olivæ nigra similem tribuit, & cum ob-  
longa sit, Cyperidem vocari.

Cyperus alius amarus, alius dulcis est: amarus, vel odoratus, vel indorus: uterque vel  
rotundus, vel longus: dulcis verò vel angustifolius, vel lausfolius est.

CYPERUS ROTUNDUS

odoratus.

Ῥόμπε & ῥόγγυλ.

I. Cyperus rotundus Orient. major.

Cyperus rotund. Hodueg Ægyptijs, Alpino.

Cyperus Diosc. major rotundus, Ad.

Cyperus rot Orient maj. vel Babylonice. Rauv.

Cyperus major Syriacus, Cam. in Matth.

Cypero rotundo similis, Cæs.

II. Cyperus rotundus Orientalis minor.

Cyperus rotundus minor, Ad.

Cyperus minor Creticus, Cam. ad Matth.

Orientalis cortice est fusco; Creticus verò  
nigro.

III. Cyperus rotundus vulgaris.

Cyperus, Trag. Lob. qb. cui & Juncus qua-  
drat. Celli.

Juncus angulosus & triangularis, Plinio.

Cyperus prima species, Ama.

Cyperus rotundus, Cord. in Diosc. Gef. hort.

Dod. Lob. ico. Lon. Tab. Ger.

Cyperus alter radice olivari, Cæs.



IV. *Cyperus rotund. minimus Hispanicus.*  
*Cyperus rotundus pumilus, Cluf. cur. post.*

### CYPERUS ROTUNDUS

*inodorus.*

I. *Cyperus rotundus inodorus ex Florida.*  
*Radix S. Helenæ, Monar. Cluf. exot.*  
*Pater noster S. Helenæ, Cast.*

II. *Cyperus rotundus inodorus Anglicus.*  
*Cyperus rotundus inod. littoreus, Lob. Lugd.*  
*Pseudocyperus, cujus herbam Nocum in He-*  
*truria vocant, Cæf.*

III. *Cyperus rotundus inod. Germanicus.*  
*Cyperus aquaticus septentrionalis, Lob.*  
*Cyperus aquaticus, Lugd.*  
*Cyperus rotundus, nigra inodora radices*  
*habens, Cam.*

### CYPERUS LONGUS

*odoratus.*

I. *Cyperus odoratus radice longâ: sive Cy-*  
*perus Officin.*

*Cyperus radice gracili & furculosa, Theoph.*  
*Cyperida, Plinio.*  
*Cyperus, Matth. (qui & longum & rotundum*  
*vulgarem una fig. exprimit, ut & Lugd.) Ang-*  
*Fuch. Tur. Lac. Gef. cat. (cui & Juncus angu-*  
*losus) Cast.*

*Cyperus Romanus, sive longus, Cord. in Diof.*  
*Cyperus longus habitior, Ad.*  
*Cyperus longus odorator, Lob. Lugd.*  
*Cyperus longus, Cord. Gef. hor. Dod. Cam.*  
*Tab. Ger.*

*Cyperus secunda species, Ama.*  
*Cyperus primus & major, Cæf.*  
*Galanga syl. longa, Germanis.*

II. *Cyperus longus odoratus Peruanus.*  
*Radix contra yerva, id est, venenis adversans,*  
*Monardi.*  
*Radix contra venena, Lugd.*

### CYPERUS LONGUS IN-

*odorus.*

I. *Cyperus longus inodorus Peruanus.*

*Drakena radix, Cluf. ex. Lugd.*  
*Bezoardica radix, Tab.*

II. *Cyperus longus inodorus Orientalis.*  
*Radix Drakenæ affinis, Cluf. ex.*

III. *Radix contra venenatas sagittas.*  
*Tarvpara radix in Guiana cujus succo vulne-*  
*rati sanantur: par. & Ind. Occid.*

IV. *Cyperus longus inodorus Germanicus.*  
*Cyperus longus inodorus syl. Lob. ico.*

V. *Cyperus longus inodorus sylvaticus, vel*  
*montanus: hic in Prodromo describitur.*

### CYPERUS ESCULENTUS.

I. *Cyperus rot. esculentus angustifolius.*  
*arundinifer, Gef. hor.*

*Trasi, Matth. Cast. Cæf. Lugd. Frag.*  
*Herba radice magnitudine avellanæ, Cord. ob,*  
*Juncus avellana, Ama.*

*Trasi Veronensium, Ad. Lob.*  
*Dulcichinum, Gef. hor. Guil. Dod.*  
*Holoconkhis Hippocratis, Fabric.*

*Cyperus dulcis, Theoph. Cam. Tab.*  
*Cyperus esculentus, Ger.*  
*Malinathalla (quasi valde regerminans) The-*  
*ophrasti, Ægyptiorum, & Anthalium Plinij,*  
*Dalech. in Plin. Cæf. Colum.*  
*Margaritæ Ægyptiæ, Autori libri Aristotelis,*  
*de plantis, Dalech. in Plin.*

*Trasi folio cyperi, Cluf. in Garz.*  
*Habaziz, Poræ.*  
*Habel assis Tripolitanis, sive Granum alzelæ*  
*Arabum, Rauvvolf.*

Plantam hanc nec caulem, nec florem, nec  
 semen producere, sed sola radicem propaga-  
 tione conservari, Gesnerus libr. de hor. & Po-  
 na in suo Baldo, affirmant. Contrâ, Matth.  
 Dodonæus Lob. Columna, cum flore pin-  
 gunt: & Cæsalpinus, caules, folia, & se-  
 men Cyperi, & Fragosus flores spicatos ali-  
 quantum flavos, tribuit.

II. *Cyperus rotundus esculentus latifolius.*  
*Caceras, Garziæ: addit Cluf. in notis, an Mar-*  
*abada Theophrasti.*  
*Caceras in Goa, Frag.*





## SPARGANIUM.

Σ *Παργάνιον ἀπὸ τῶν ἀραγάνων, fasciis, quod foliis ejus latis & vitilum modo lentis, pro fasciis nutrites utantur: cujus Dioscorides l. 4. incriminavit: Βένη. Theoph. 4. hist. 2. cui mas & semina, & hac sterilis.*

## I. Sparganium ramosum.

Sparganium, Trag. Matth. Ang. Tur. Cord. in Diof. Gef. cat. Lac. Ad. Cæf. Cast. Cam. Tab. [ cui & Gladiolus palustris. ] Ger. Eyf.

Butomos Theoph. Ang.

Butomon, Ruel. Dod. gal. Gef. cat.

Platanaria, Dod. Thal.

Sparganium & Butomos Theoph. Lob.

Carex, Lon.

Phlees femina, Lugd.

Calamagrostis secunda, Eidem.

## II. Sparganium non ramosum.

Sparganium alterum, Lob. Cæf. Lug. Tab.

Platanaria altera, Dod.

Sparganium latifolium, Ger.

II. Sparganium minimum, in Prodomo descriptum, à Dom. Furero missum.

## POLYGONUM BACCIFERUM.

sive Uva maritima.

## I. Polygonum bacciferum scandens.

Caucon & Ephedra, Plinio.

Ephedra sive Anabasis, Bellonio & Dod.

Ephedra Plinij fortè, Rauvvolf.

II. Polygonum bacciferum maritimum majus, sive Uva maritima major.

Polygonum quartum Plinij majus, Clus. hist.

Tragos, sive Uva marina major, Lob.

Uva marina, Dod. quoad icon. & Ger.

Polygonum marinum 1. sive cocciferum 1. Tab.

III. Polygonum bacciferum maritimum min.

Tragos, Ruel. Tragum, Gef. hor.

Equisetum quartum, Matth. Lugd.

Croton Nicandri, Ang.

an Androsace, Bellonij.

Equiseti facie recemosa planta, Ad.

Uva marina Monspel. Lob. Tab.

Polygonum quartum Plinij minus, Androsace fortè Bellonij, Clus. hist.

Polygonum marinum secundum, Tab.

Tragus, sive Scorpius maritimus Dalech. Lugd.

Tragum, Uva marina, Dod. desc. Cam.

Uva marina quarta, vel minor, Ger.

an Oreocollon, Hieroclis & Abfyrtij, Lugd.

## EQUISETUM.

Ι *ἰσῆς, Dioscoridi l. 4. c. 46. sive Cauda equina, quod folia setis equinis respondeant. Hinc Plinio l. 26. c. 13. Equisetum, Hippuris à Græcis dicta, est pilus terra, equina seta similis: cui l. 18. c. 28. Equisetis, & Equiselus dicitur,*

Genera duo Dioscoridi, alterum vicinos arborum caudices scandens: alterum caule cubito majore, & comis brevioribus, &c. Plinius & tertium agnovit, quod pini foliis assimilavit.

I. Equisetum palustre linariæ scopariæ folio: 1. in Prod.

II. Equisetum palustre longioribus setis.

Hippuris major, Brunf. Dod.

Equisetum 1. Matth. Lac. Ang. Cast. Lugd. qui etiam sub Equiseti primi Alparago Dodon. pinxit.

Caucon Plinij, Ang.

Equisetum majus, Dod. gal. Lob. ob. Ger.

Hippuris, Ama. Ad. Lob. ico.

Equisetum 2. & Hippuris 1. Diof. Tab.

III. Equisetum palustre brevioribus setis.

Equisetum palustre, Lob. ico.

IV. Equisetum palustre brevioribus foliis polyspermon: *πυλίσπερον ἕλμα*, Sanguinariam fecerunt quidam vertunt.

Polygonum femina, Dioscoridi.

Polygoni tertium genus, quod Oreon, Plin.

Polygonum femina, Matth. Eric. Cord. Bra-

sav. qui Equiseti speciem esse negat. Gef.

cat. & hort. Dod. Ama. Ang. Lac. Cast. Lugd. Tab.  
 Sanguinalis femina, Cord. in Diosc.  
 Limnopeuce, Cord. hist.  
 Polygonum femina femine vidua, Ad. Lob. ico.  
 Polygonon femineum, Thal.  
 Equisetum tertium, Cæs.  
 Cauda equina femina, Ger.

Hoc communiter sine semine reperitur, aliquando ad singulas articulorum commissuras dena & plura semina [hinc polyspermon] adnascuntur.

V. Equisetum pal. minus, polystachion: 2. in Prod.

VI. Equisetum palustre tenuissimis & longissimis setis: 3. in Prod.

VII. Equisetum sylvaticum tenuissimis setis, Hippuris minor altera, Trag.  
 Equisetum sylvaticum, Tab. Ger.

VIII. Equisetum pratense longissimis setis, Equisetum alterum, Matth. Lac. Cæs. Lugd.  
 Equisetum alterum, Diosc.  
 Equisetis, Plin.

Hippuris altera, Trag. Ama.  
 Hippuris & Equisetum, Gef. cat.  
 Equisetum, Fuch. ico. Cord. in Diosc.  
 Equisetum longius, Dod. gal. [figurâ transpositâ.] Fuch.

Hippuris major, Thal. prima, Lon.  
 Hippuris fontalis, Ad. & Equiset. 2. Diosc. Lob.  
 Hippuris minor fontalis, Ad.  
 Hippuris minor, Lob. ico. figurâ 2.  
 Equisetum palustre majus, Tab. palustre, Ger.

IX. Equisetum arvense longioribus setis.  
 Hippuris minor, Trag. Dod. Thal.  
 Hippuris altera, Gef. cat. Cornar.  
 Equisetum, Er. Cordo, minus, Fuch. figurâ transpositâ: minus vel 3. & 4. Lon.  
 Polygonon femina, Fuch. ico.  
 Equisetum alterum, Ang. Bras. Cord. in Diosc. Lob. ico.

Hippuris arvensis major, & Corfanda Tab.  
 Equisetum segetale, Ger.  
 X. Equisetum foliis nudum non ramosum sive junceum, *ἰσπότης ἀρούρες*.

Hippuris major, Trag. major altera, Lon.  
 Sanguinali feminae similis, Cordo in Diosc.  
 Polygonum femineum *ἀρούρες*, Thal.  
 Equisetum Junceum, Tragi. Lugd.  
 Hippuris prima Cornar.  
 Hippuris sine foliis & nuda, Tab.  
 Equisetum nudum, Ger.

XI. Equisetum foliis nudum ramosum.  
 Equisetum 3. Matth. Lugd.  
 Hippuris minor. Lob. ico. & Dodon. sed utriusque ad primam figuram.

XII. Equisetum nudum minus variegatum Basileense.

an Hippuris lacustris, foliis mansu arenosis, Gef. coll. quod in Prod. 4. est.

XIII. Equisetum foetidum sub aqua repens, 5. in Prod.

Equisetum pini foliis simile apud Plinium: & Hippuris minima à Diosc. non descripta, Dal. in Plin.

Equiseti quintum genus minimum, Lugd.

## SECTIO TERTIA. DE ARUNDINE, PAPYRO, ET Typha.

### ARUNDO.

**A**RUNDO (quæ Græcis κάλαμος, παρὰ καλῶς ἀμαρβαί, ut vult Etymologus) in odoratam & inodoratam dividitur. Odoratam sive Aromaticam, Diosc. l. i. c. 17. at inodoratam c. 115. proposuit, & genera quinque agnovit.

Est enim τὰς ὁσ. 5. πλῆ. συμμεγίσ. δὲ τὰς 2. φραγμαίτης: solida, femina, fistulis dicata, crassa & sepiaria. Verum Theoph. 4. hist. 12. duo summa genera, τὸν αὐλὴν τικόν, καὶ τὸν ἐτέρον, ribialem & reliquam constituit, & inde in plures species subdividit. At Plinius l. 16. c. 26. multis plures differentias agnovit: quare l. 24. c. 11. viginti novem genera se demonstrasse monet, ubi & odorata mentio fit.

ARUN-

## ARUNDO ODORATA.

## I. Calamus Aromaticus Indicus.

Κάλαμος, & Κάλαμος μυρσίνος, Hipp. & Gal.

Κάλαμος ἰνδός, Theoph.

Κάλαμος ἀρωματικός, Diosc. Orib. Egin. Aëtio.

Κάλαμος ἰνδός, Dionysio de situ Orbis.

Calamus Arabicus, Plutarchus Alexandrinus, Cels.

Calamus odoratus, Plin. Hermol. Ruel.

Calamus aromaticus, Manardo.

Calamus aromaticus, Cord. in Dioscor. Fuch.

comp. Guil. pap. Garz. Lob. ob. Clus. ad Garz.

Acost. Cæf. & in 4. parte Ind. Orient. fig. 20. &

Diringo Malays, & Deringo, par. 3. Indic. Orient. 39.

Diringuo, 4. parte Ind. Orient. fig. 20.

## II. Calamus aromaticus Syriacus.

Calamus aromaticus à Syriaco diversus Guil. pap.

Calamus odoratus Libani, Lob. ico. Cam. ad Matth.

Solius Calami figuram proponunt, qualem à Doct. Paludano, anno 1579. ex Ægypto allatum, Patavij accepimus, qui 1. in Prod.

III. Calamum odoratum Matthiolum pingir, & ex eo Lacuna, Lonicerus, Acosta, Durantes, Lugd. hist. Tabernæm. & Gerard. Calamum aromaticum nominantes, quem fictitium suspicamus.

## ARUNDO INODORA.

## I. Arundo vulgaris sive φραγμίτης Diosc.

Κάλαμος χαράκις, Theoph.

Harundinis quintum genus, Trag.

Harundo phragmitis, Ruel. Corn. Dod.

Arundo aut Calamus, Tur. Gesf. Lon.

Harundo vallis, Ama.

Harundo vallatoria, Dod. gal. Lob. Lugd. Thal. Ger.

Arundo palustris, Matth. Lugd. Tab.

Calamus vulgaris, Cord. in Diosc.

Canna secunda, quæ femina Diosc. Ang.

Calamus sive harundo alia gracilis. Cæf.

II. Arundo sativa, quæ διὰ τὴν Dioscor. & Theoph.

Arundo, Matth. Lac. Caß. Amnica, Ruel.

Arundo domestica, Matth. Lugd. Tab.

Arundo cypria, Dod. gal. Ama. Ger.

Canna quarta, quæ Donax, Ang.

Arundo magna, Gesf. hor. Italica major, Cam.

Arundo donax sive cypria, Dod.

Arundo donax sativa, Lob.

Calamus, sive harundo crassa, Cæf.

III. Arundo Anglica foliis in summitate dissectis: 2. in Prod.

## IV. Arundo scriptoria atrorubens.

Κάλαμος συγγίτης, Diosc. Xieroff, Theoph.

Syringias fistularis arundo 3. Dod. gal.

Canna tertia, Calamus scriptoria, Ang.

Harundo fistularis, Ama.

Fistula vel Syringa, & Arundo scriptoria, Ad. Lob. ico.

Canna fistularis, Tab. Ger.

Sic in China ex Arundinibus pennæ scriptoriæ sunt [an ex hac?] in quas penicilla more pictorum nostratum indunt: in hist. Ind. Orient. par. 2. c. 26.

V. Arundo sarcta maxima atrorubens, quæ Principes pro scipionibus utuntur.

Κάλαμος σαρτός, Dioscoridi.

Κάλαμος τερνός, Theophrasto.

Canna Indica, aliquibus Papyrus, Matth. Ital.

Cannæ prima species Diosc. Ang.

Arundo Indica & septima, Dod. gal.

Arundo Indica, cum teres sit, Papyrus antiquorum non rectè statuitur, Guiland. pap.

Juncus, papyri Ægyptiæ genus, Ama.

Nastos vel sarcta, Ad. Lob. ico. tertia, Tab.

Nastos Clusij, Ger.

VI. Arundo sarcta geniculata sive sagittalis.

Nastos & Arundo prima, Dod. gal.

Nastos sive sarcta altera toxica, Lob. ico.

Arundo sarcta seu Nastos 1. Tab.

Calamus sagittalis, Ger.

In Bali Insula, gestant Cannas sagittivomas, ex quibus teretes exilesque sagittulas ex Arundine fabrefactas [an ex prædicta Arundine?] in apice verò intoxicatas, efflant: in hist. Ind. Orient. part. 3. c. 39.

## VII. Arundo sarcta flava.

Ζενγίτης καὶ ἰνδός, Theophrasto.

Arundo femina & secunda, Dod. gal.

Nastos, seu sarcta, sive toxica gracilis & plicatilis, Lob. ico.

Nastos secunda, Tab.

Arundo sarcta, Ger.

VIII. Arundo repens vel Chamæcalamus.

Arundo humilis, Gesf. hor.

Arundo tertia in maritimis, Cæf.

Arundo epigejos, Lugd.

## ARUNDO INDICA.

I. Arundo arbor: in qua humor lacteus gignitur, qui Tabaxir, Avic. & Arabibus dicitur. Mambu Indorum, in cuius arundinibus Tabaxir sive Saccar. Mambu, Gatzia. Mambu sive arbor Tabaxir, Lugd. Frag. Spodium aut Tabaxir Persianorum, Acoft. Spodium, Cast. Frag.

Hi duo secuti et errorem Gerardi Cremonensis, qui in Rhafi Tabaxir Arabum per Spodium reddit: cum *Zoadir* sive Spodium, sit Tutia Arabum, cuius in externis remedijs solum usus est. Tabaxir verò in Arabum compositionibus, intra corpus sumatur.

Est autem Tabaxir (ut habetur in 4. part. Ind. Orient. c. 14.) medulla arundinis Mambu sive Bambus, & vocatur Saccar Mambu, id est, Saccharum de Mambu, quod propter insignem vim medicamentosam magni fit, & ab Arabibus, Persis, & Aethiopibus, qui illud Tabaxir vocant, avidè coëmitur.

Harundo Indica, Clus. exot.

Bambus sive lunc. Indic. 4. p. Ind. ot. c. 14. fig. 12. Bambu, Mambu, ex qua Tabaxir, part. 4. Ind. Orient. cap. 3.

Canna Tabaxir & Arundo, quam Indi Bambus vocant, Idem.

Sunt arundines aspectu gratissimæ, præaltæ, nigrae, rotundæ, crassæ, ita ut utraq; manu vix junctim includas, imò femoris crassitie. Crescunt sponte in Norfingæ Regno ad litus, & universo littore Malabar, præcipuè juxta Chorumandel. Indi ex ijs domos suas ædificant, ut in Terenate, quas findunt, & singulari industria intorquent: part. 5. Ind. Orient. Siciu Pegu etiam; & stramine teguntur: part. 7. Ind. Or. c. 35. & 37. & in civitate Bantam, cuncta ædium sublicia ex his arundinibus assulatum dissectis constant: 3. part. Ind. Orient. cap. 21. Imò ad lecticas Pallankyns dictas vulgò, utuntur, in quibus mulieres per publicum deferunt. Sic & naviculas, duobus viris capiendis aptas: conspiciunt: part. 2. Ind. Orient. 17. & part. 4. c. 14. Hac adversatij, quem vitæ omnino exuere nolunt, dorsum contundunt: part. 2. Ind. Orient. cap. 32.

Arundines in Indiæ Occident. sylvis (an eadem cum priore?) non raro nascuntur, crassitudine cruris humani, quæ a debet teneræ, ut singulæ stantes uno ictu gladij secantur: aridæ ve-

rò tanta duritie, ut fisis illis, & in modum Chirurgicorum scalprorum efformatis, sagittas suas ita arment Barbati in Brasilia, ut uno ictu feras humi fundant, &c. in Ind. Occident. hist. part. 3. c. 12.

Cannæ seu arundines editissimæ nascuntur, quarum quodlibet intersepeum mensuræ Hispanicæ capax est: hæ structuris ædium etiam adhibentur: in hist. Ind. Occident. 1. 4. c. 30.

Cannarum Hierosolymitanarum nomen quoq; occurrit in hist. Ind. Orient. part. 4. c. 6.

II. Arundo Saccharifera.

Arundo octava, vel saccharata, Dod. gal. Harundo ex quo Saccharum.

Melicalamus, Cord. hist.

Mel arundinis quibusdam Saccharum, Lon.

Arundo Saccharata, Dalech. in Diosc.

Sacchari canna, Gesl. hor.

Arundo saccharina Indica, Ad. Lob. ico. Lugd.

Canna mellea, Cæf.

Arundo & calamus saccharinus, Tab.

Calamus Indicus, part. 6. Ind. Or. c. 19.

Calamus Indicus Saccharites, & Canna Saccharina, in hist. Ind. Orient. par. 4. 5. & 6. c. 38. & hist. Occid. Ind. part. 3. 4. 8. & 9.

De Sacchari differentijs, & consiciendi modo, in nostris in Matthiolum notis, & lib. de compositione Medicam. egimus: Vide & Munsteri cosmograph. 1. 2. c. 91.

III. Arundo Indica versicolor.

Canna de Bengala Lusitanis: in Regno Bengala crescunt Arundines versicolores, medulla plenæ, crassitie arundinibus Hispanicis similes, paulò tamen tenuiores: virides adhuc, lenitè inflectuntur, ad stanni modum, aut instar Salicis, foris pûctis versicoloribus notatæ sunt, haud secus ac si arte ita pictæ forent. Vtrunt ijs in Lusitania mulieres vetulæ pro scipionibus, quibus gressus titubantes sustinent, quarum varia genera apud Doct. Paludanum videre est: in hist. Ind. Orient. p. 2. c. 18.

IV. Arundo Indica versicolor flexilis.

Rota vocat in Bengala, aliud genus ejusdem arundinis, quod gracilius & tucinius est, viminis ad modum flexile, ex quo Calathi & alia multa pulcherrima consciuntur: ex hist. Ind. Orient. part. 2. cap. 18.

V. Arundo Indica punicea mollis.

Arundo vel Scitpi porius genus puniceae coloris & mollis, quam parumper contortam, arcui pro

pro nervo adaptant: nascitur in Regno Congiano, & in regno Bengala ad Gangen fluvium, hist. Ind. Orient. part. 1. c. 5.

VI. Arundo Indica volubilis.

Arundo Indica in Insula Sumatra, variè secircæ arbores vinciens, centum, ducentarum, imò trecentarum, & plurium Orgyarum longitudine, ita ut vix ejus origo finisve deprehendi possit, circulis vasariis consiciendis, valde accommoda: ad Clusij curas posteriores.

VII. Arundo Indica fluitans.

Trombas sive arundinera fluitantia in Bali Insula: in hist. Orient. Ind. part. 3. c. 2. & 40. & part. 4. fig. 10. pingitur.

Arundines longæ sive Algæ in salo fluitantes, par. 5. Ind. Orient.

VIII. Tubuli arundinacei ad Asthma.

Refert Manardis, & ex eo Lugd. hist. ex Hispaniola adferri tubulos cannarum, qui extrinsecus & intrinsecus, gummi illiti sunt, quod Tabaci succum esse putant. Addit Clus. incolas

Virginæ frequenter uti tubulis quibusdam ex argilla factis, ad Tabaci fumum hauriendum: quales apud Anglos in frequenti usu.

IX. Arundo Indica latifolia.

Canna Indica, Ges. hor. Clus. hisp. [cui & flos cancri nonnulli,] Cam. [cui & Xiphium Indicum,] Cæs. rubra, Eyst.

Arundo Indica florida, Ad. Lob. & Canacorus quorundam, quod inter Cannam & Aconem ambiguae naturæ sit, quare & Calamaeorus.

Papyrus, Cast.

Gladiolus Indicus, Cam. ad Matth.

Arundo seu Canna Indica, Lugd. cum duplici figura.

Arundo Indica latifolia sive florida, & Harundo liliiflora Tab.

Harundo florida, Ger.

X. Arundo Indica latifolia, flore luteo punctato: quæ 3. in Prod.

Canna Indica lutea rubris maculis punctata, vel flore croceo guttato, Eyst.

## PAPYRUS ET QUÆ

pro Papyro usurpantur.

CUM Papyrus in Aegypto res sit cognata Arundini, secundum Plin. l. 24. c. 11. imò & Calami chartis serviant, eodem, lib. 16. c. 36. autore: idcirco papyrus, & ea quæ in novo Orbe Papyri vicem præbent, subiiciamus.

I. Papyrus Nilotica sive Ægyptiaca.

ndupor, Diosc. & Theophrasto.

Papyrus, Plinio & Alpino.

Papyrus Ægyptica sive Biblus Ægyptia Eustathio, Guil. pap.

II. Papyrus Syriaca vel Siciliana.

Sari, Theophrasto.

Biblos secunda, Eustachio.

Papyri altera species, quæ Paperus in Sicilia, Guiland.

Papyrus, Cæs. Nilotica, Ad. Tab. Ger.

Papyrus Ægyptia, Penæ, Lugd.

Cum in novo Orbe diversarum arborum foliis & corticibus pro papyro utantur, sequentia nominare tantum lubet, siquidem ad arbores pertineant.

I. Palmera humilia, Scalig. Lugd.

II. Guaiabara in Insula Hispaniola, ex Oviedo, Lugd.

III. Copey, ibidem apud eundem.

IV. Tal, in provincia Mangi, Lugd.

V. Lantor, palmæ Indicæ genus, cujus folia

viri longitudinem æquant: hist. Ind. Orient. part. 4. c. 3. & 6. & pingitur fig. 16.

VI. Ficus Indicæ foliis & Turcæ utuntur, hist. Ind. Orient. part. 6. c. 38.

VII. Palmæ, nuces Indicæ Cocos gignentis, arboris substantiam plicabilem usurpant. hist. Ind. Orient. par. 4. c. 12.

VIII. Arboris foliis sex brachiorum longis, cujus folio extenso, tres, quatuorve viri, in itinere operiuntur, ut pluvias non metuant: ex Nicolai Costini itinerario, Lugd. histor. refert.

IX. Papyrus ex lava, est liber arboris tenuissimæ membranæ instar, ut ex Clusij notis, Lugd. hist. proponit.

Papyrifera arbor librenuissimæ membranæ instar candido, Clus. exor. l. 1. c. 4.

an Pannus è libro arboris quo in Insula Tidaræ fœminæ pudenda tegunt, Pigassetæ.

X. Arboris liber subpunicæ coloris, Clus. l. cit. qui & Filorum tenuissim. ex arboris

C a cortice



corrice confectorum ibidem meminit.

XL. Melt sive Magnei, ex hujus folijs, Mexicani papyrum & pergamenum conficiunt : Duretus de admirabilibus plantis.

## TYPHA EIUSQUE SPECIES.

**T**HE Diofcor. l. 3. c. 133. meminit, cui florum effigies turbinata, quasi typhonis sese gyran-  
tis turbinem, aut gigantis staturam minacem signaret, nomen dedisse videtur : vel potius  
τίφῃ a τίφῃ quod locum palustrem notas.

Duplex est, palustris & cerealis. Theophrast. utriusque meminit : alterius 4. hist. 11.  
in lacu Orchomenio nascentis : aliterius, inter frumentacea, 2. hist. 4. & causas plant. 6.  
At Dioscorides de prima, de qua Plinius l. 16. c. 36. inter aquaticos Calamos egit.

I. Typha palustris major.  
Typh., Dioscorid. & Theophrasto.  
Typha aquatica, Trag. Lugd.  
Typha, Matth. Fuch. Ama. Lac. Tur. Cord. in  
Diofcor. Lon. Ad. Lob. Cast. Tab. Ger.  
Typha palustris, Ruel. Cæs. aquatica, Cestrum  
morionis, Dod.  
Papyri species, Dog. gal.

Ulva, Ang.  
Juncus alper Dod. Lugd.  
II. Typha palustris clavâ gracili.  
Typha media, Clus. pann.  
III. Typha palustris minor.  
Typha minor, Ad. Lob. ico. Lugd. minima,  
Clus. pann.  
Typha minor sive Typhula, Tab.

\*\*\*\*\*

## SECTIO QUARTA.

### DE FRUMENTO.

Triticum, Zea, Hordeum, Secale, Avena, Ustilago, Oryza,  
Miliun, Panicum, Phalaris.

**F**RUMENTACEA dicuntur, quacunque geniculato culmo, & foliis harundinaceis  
constant, semenq. panificio & pulsibus aptum, in spiciis aut jubeis producunt ceu Tri-  
ticum, Hordeum, Milium, Panicum, & his similia.

Genera prima duo sunt, per tempora satius divisa : Hyberna, qua circa Vergiliarum oc-  
casum sata, terrâ per hyemem nutriuntur, ut Triticum, Hordeum : Aestiva, qua ante astra-  
tem, Vergiliarum exortu feruntur, ut Milium, Panicum. Verum in Græcia & Asia, omnia Ver-  
giliarum occasu feri, Plinius testis est : quadam autem utroq. tempore in Italia : ex his quadam  
& tertio, Veru scilicet : aliqui enim Verna appellant, Milium, Panicum, Alicam seu Saliginem.

### DE TRITICO.

**TRITICUM**, quamvis generaliter omne frumentum, quod ex spiciis tritum, ac  
trituratione repurgatum est, significet, ut ex Varrone colligere est. posteriores tamen, pe-  
culiari frumenti speciei Tritici nomen tribuunt, de quo priori loco, Dioscoridem imitatus,  
qui l. 2. c. 107. τριτὶς πρῶτον primò egit. Πυρὸς dicitur Græcis, quasi σπυρὸς, pro σπυρὸς, ἀπὸ  
τῷ σπυρὸς, secundum Etymologicum.

Genera duo fecit Dioscorides : at Theophr. 3. hist. 4. plura ratione regionum, qua ex  
locis cognomina sortita sunt : qua etiam colore & specie, & proprietate inter se differunt :  
quem Plinius l. 18. c. 7. sequitur. Sic in Lyma Ind. Occident. una Tritici spica, duplo plus  
Hispanicis spiciis fundit : in hist. Ind. Occident. part. 9. addit amento.

I. Triti-



I. *Triticum hybernum* aristis carens.

*Triticum*, Brunf. 4. *Gefhor*. Cord. in Diosc. Cui & *Triticum* semestris Dod. Tab. sive Robus, Colum. Dod. gal.

*Tritici* primum genus, Trag. Fuch. Lon.

*Siligo* spica murica, Ad. & Lob.

*Triticum* spica murica, Lugd. Ger.

*Triticum* aristis carens, Cæf.

*Siligo* veterum videtur, quam Plinius *Tritici* delicias vocavit.

II. *Triticum siligineum*.

*Triticum* candidum, Græcorum & Galeni, *Ξαλγύνη* & *αργύρη* Hippocr. aut ejus interpreti

Trago: sive Olyro.

*Siligo* Varroni, Columellæ & Plinio, cui & Sandalum.

*Tritici* genus candidistrimum, Cæsalp. 1. 13. vocavit.

III. *Triticum æstivum*.

Trimestre *triticum* Græcis *τρειμῆστρον* Theoph. & Diofcor.

Seranium, Galen.

*Siliginis* & *tritici* tertia species, Columell.

*Triticum* trimestre, Portæ.

*Triticum* aliud quod Vernellum vocant, Cæsalp.

IV. *Triticum rufum* grano maximo.

Far sive Adoreum veterum, Lugd.

V. *Triticum rufum* hexastychon.

*Tritici* rufi genus aliud, Lugd.

VI. *Triticum spicâ* multiplici.

*Triticum* ramosum Plinij, spicâ ramosâ, Cæf.

*Tritici* quinta species, & Gran del graspo, id est, frumentum racemosum, Ang.

*Triticum* multiplici spica, Lob. ico. Ger.

Ble qui truche, Lugd.

*Triticum* typhinum multiplici spicâ, Tab.

*Triticum* racemosum, Portæ.

Spicis modo paucioribus, modo pluribus, ita

ut Matthiolus 24. spicas viderit.

VII. *Triticum semine* oblongo.

Long gran Matisconensium, ad *Asiæ* Thraciæ

Galenii accedere videtur, Lugd.

Huic congener Frumentū Scourgeon, Ruellij.

VIII. *Triticum aristis* longioribus spicâ cæruleâ.

*Triticum* Loca vocatum alerum, & *triticum* lucidum Gallo-belgarum, Lob. ico.

Tragus frumenti genus spicâ cæruleâ, Lugd.

*Triticum* nigrum peregrinum 2. Tab.

*Triticum* lucidum, Ger.

IX. *Triticum aristis* longioribus spicâ albâ.

an Far Gallicum sive barbati genus, Ruel.

Robus sive *Triticum*, Insularis Gallo-belgis.

Loca vocatum, Lob. ico.

*Triticum* typhinum, Ger. quartum, Tab.

X. *Triticum typhinum* sive Typha cerealis multiplici folliculo.

Typha inter frumentacea, Theoph. Typha, Galeno: Typhæ, Plinio.

XI. *Triticum typhinum* simplici folliculo.

*Tritici* tertium genus, Trag. Fuch. Lon.

*Triticum*, Matth. Lac. Cast. Lugd.

*Triticum* Romanum Tragi, Eid.

Typha cerealis, Ruel. Dod. gal.

Typha Dodonæi, & Typha Fuchsi, Lugd.

*Triticum* aristis circumvallatum, Ger.

*Triticum* typhinum, Tab. aristis munitū, Cæf.

XII. *Triticum typhinum* simplici folliculo Hispanicum.

*Triticum* typhinum, Dod. Lugd.

*Triticum* aristis circumvallatum, Lob.

XIII. *Triticum sylvestre* Creticum.

Agriostari, id est, *Triticum* sylvestre grano minore tritico sativo, in Creta frequentis: Honor.

Belli epist. 7. ad Clusium.

Agriostari, sive Frumentum syl. Creticum,

Pon. in Bald: Ital.

## ZEA EIUSQUE SPECIES.

**Z**EA, Ζέα, ἡ ζῆα, quibusdam idem cum ἄλφα: aliis frumenti peculiaris species, qua Latinorum Semen est: nam & Plinio Zea, Semen dicitur l. 18. c. 3.

Unum generum est Dioscoridi l. 2. c. 111, αἰνὰ ἡ ἀνίσταται.

## I. Zea Briza dicta, vel Monococos Germanica.

Ζέα ἀνὰ, quod simplicis grani sit, Diosc.

Spelta prima, Trag. ico. secunda, Eid. descript.

Zea, Ang.

Zea simplex, Matth. Lac. Cord. in Diosc.

Zea alterum genus, Fuch.

Frumentum locale: Ruel.

Siligo, & Zea alterum genus, Tur.

Briza, Dod. gal. Ad. Lugdun. Monococcus,

Lob. Ger.

Monococcon, frumentū barbatum, Far venni-

culum rubrum, Col. Zea, Mnesitheï fortè, Dod.

Spelta vulgò, Cæs.

Zæ species prima, Cast.

Zea monococcos, Tab. minor & monococcos, Lugd.

II. Zea dicoccos vel major.

*Zea dicoccos*, [quodd grana bina juncta habeat,]

Zea Diofco.

Zea, Theoph. & Galeno.

Zea, Brunf. Cord. in Diofco. Lon. Ger.

Spelta prima, Trag. descript. secunda, Eid. ico.

Zea dicoccos, Matth.

Zea altera, Matth. Lac. Cast.

Zæ primum genus, Fuch. Tur.

Zea, Romanis veteribus Semen, nunc Spelta, Dod. gal.

Zea, vulgò Spelta, Far antiquis: Ador posterioribus, & Semen Adoreum, Dod.

Typha, Ang.

Far primum, Cæs.

Zea major seu dicoccos, Lugd.

Zea ador, Tab.

III. Zea Amylea, vel Zeopyrum Amylæum. an Far. Olyra Diofco. hâlicastrum trimestre cognominatum, Col.

Triticum secundum, Trag. Fuch. Lon.

Olyra, Dod. gal. Lugd.

Triticum trimestre, Cord.

Amylæum frumentum & Farhalicastrum, Dod.

Frumentum vel Triticum Amylæum, Tab.

Triticum amylæum, Ger.

IV. Zeopyrum seu Triticospeltum, quodd naturam habeat *Zeas* & *pyris*.

*Zeopyrus* & *zeuopyrus*, Galeno.

Speltæ species tertia, Trag.

Hordeum alterum, Ang.

Zeopyron, Dod. Ad. Lob. Lugd. Tab.

Hordeum glabrum, Cord. hist. hexastichon, hodie hordeum sine tunica, Cord. in Diofco.

Hordeum nudum, Ges. hor. Ger. mundum, Cæs.

Hordeum *zeuopyrus*, Cam.

V. Zeocryton seu Oryza Germanica.

Oryza Germanica, Trag. [cui & Tragus cereale, & candidum far,] Dod. cui & Far Gallicum, & frumenti barbati genus Ruel. videtur.

Olyra, Ad.

Far, Teutischer Reis / Cast.

Thypha Theophrasti, Tab.

an Far Clusianum, Lugd.

Spelta in Regno Congiano, omnium frumentorum, quæ habent, vilissimum, quæ porcos alunt: in hist. Ind. Orient. part. 1. lib. 2. c. 1.

Siligine abundat ex fe Cambaie Regnum: hist. Ind. Orient. par. 1. lib. 2. c. 1. & Chinæ tellus feracissima est Siliginis, ibid. c. 25. & Japonensis terra siliginem fert, ibid. c. 28.

Siliginis Turcica, quæ Mille Abrai dicitur, promontorium Viride perfelix: Ind. Orient. part. 3. c. 40.

## HORDEUM EIUSQUE SPECIES.

**HORDEUM**, *Hordeon* & *Hordeon*, quodd eo reperto & in usum recepto, glandibus spretis, à brutis homines distincti sunt: antiquissimum enim in cibis hordeum, sicuti Asbahiensium ritu, Menandro autore, apparet, & gladiatorum cognomine. (ut Plin. 1. 18. c. 7. loquitur,) qui Hordearj vocabantur: nunc studiosos, idiotas sic appellare solent.

Unum Diofcorid. 1. 2. c. 108. meminit: at Theoph. 8. hist. 4. Hordeum aliud rotundius minus, aliud oblongius majus, item aliud candidum, aliud ad purpuram accedens. Hoc, ut & Triticum, in India Occid. semine ex Hispania delato, facundius & uberius evasit, ut habetur in hist. Ind. Occid. par. 9. c. 31.

I. Hordeum polystichum hybernium.

Hordeum, Brunf. Matth. Lac. Ges. hor. Lob. [cui & Hordeum polystichon autumnale Ad. part. alt.] Dod.

Lon. Cast. Cæs. Ger.

Hordeum majus, Trag.

Hordeum polystichum, Fuch. Tur. Dod. gal.

[cui & Hordeum Cantherinum,] Lugd. Tab.

Hordeum primum, Ang.

Hordeum secundum hyemale, Cord. in Diofco.

Polystichum dicitur quia in multos versus

spicatur: est enim differentia in spicarum forma, magnitudine & granorum numero: quoddam binos, quoddam ternos quaternos, quinos, cumque plurimum senos versus habet: sic aliud rotundius & minus, aliud oblongius & majus, aliud candidius, aliud nigrius.

II. Hordeum polystichum vernum.

Hordeum senis versibus, Matth. Cam.

Hordeum Septentrioni notissimum *πολύστικον*, Lob. ob.

Hor-

Hordeum polystichon vernum, Lob. ico. & Ad. port. alt.

Hordeum polystichum æstivum, & Hordeum trimestre polystichum, Tab.

III. Hordeum distichon: quoddam spica binos ordines habeat, Plinio.

Hordeum ~~αἰσχρο~~ Galaticum, Columellæ.

Hordeum Cantherinum, Ruellio.

Hordeum minus, Trag.

Hordeum distichum, Fuch. Tur. Dod. Cord.

in Diosc. Lob. Lugd. Tab. cui & æstivum & trimestre minus.

Hordeum binis versibus, Matth. Cam.

Hordei alterum genus, Cæf.

IV. Hordeum Causiticum.

Orzada ex Hispania nova, Monardi, Cast.

Hordeolum Monardis, Lugd.

Cevadilla, id est, Hordeolum, Monardi & Frag.

Causiticum est, solum propter similitudinem huc relatum.

## SECALE SIVE ROGGA

cujusque species.

**SECALE**, monente Plinio l. 18. c. 16. etiam Farrago appellatur: nonnullis Rogga: & duplex est: sationis tempore & magnitudine distinctum.

I. Secale latifolium, in Prod. descriptum.

II. Secale hybernium vel majus.

Siligo, Brunf. Ruel. Lon. veterum & secale, Tra.

Secale, Matth. Dod. gal. (quibusdam Farrago, non tamen est vera Farrago, quæ nil aliud est quam Hordeum,) Fuch. Lob. Tab. Ger.

Secale & Farrago Plinij, Lugd. Cast.

Olyra, Cord. in Diosc.

Rogga sive secale Plinij, Dod.

Tipha cerealis & Tipha Theophrasti, Portæ.

III. Secale vernum vel minus.

Siligo æstiva, Trag.

Secale alterum, Lugd.

Rogga sive secale æstivum, Dod.

Illud læcius, hoc gracilius, culmis paucioribus, spica brevior & tenuiore.

IV. Secale luxurians.

Clavi filiginis, Lon.

Secalis mater, Thal. tit. de Gramine.

An Plin. l. 18. c. 17. de hoc intelligendus, dum scribit: Inter vitia segetum & luxuria est, cum onerata fertilitate procumbunt: alij volunt

Plinium intelligere id, quod Theophr. 8 hist. ~~πολλοσπικον~~, insanam foliorum luxuriam, vocavit.

V. Secale affinis peregrina.

Nuchani, Garzie.

Secales peregrinum genus, Lugd.

## AVENA EIUSQUE SPECIES.

**AVENA**, ἀρῆμος Dioscoridi l. 2. c. 116. forsan ἀρῆμα, quod cibum significat: nam ut autor est Plin. l. 18. c. 17. Germania populi huius pulve vivunt. Theophr. 4 hist. 6 ex Zea Avena fieri scribit: at Plin. l. c. Avena. primū frumenti visū esse, & Hordeum in eam degenerare, refert.

I. Avena vulgaris seu alba.

Avena, Brunf. Matth. Fuch. Dod. Tur. Ama.

Lac. Lou. Ad. Cast. Tab. Lugd.

Avena sativa & prima, Trag.

Avena vesca, Ad. Lob. Ger.

Avena frumentum, Cord. in Diosc.

Avena prima species, Ang.

Avena mitior & sativa, Cæf.

II. Avena nigra.

Avena altera, Ang.

Bromos, Ama.

Avena sylvestrior nigra, Cæf.

III. Avena nuda.

Avena nuda, Ad. Lob. Dod. Tab. Ger.

## USTILAGO.

**USTILAGO**, frugum, præsertim spicarum, maxime Avena & Secales. morbus est. Theophr. 8 hist. 10. de frugum vitio agens, scribit, quadam communia esse omnibus seminibus, ut tevole, id est, Rubigo, sicut Gaza vertit: quadam vero propria quibusdam, ut Tabida radice, Ciceri & Erucarum infestatio. Sic & 3. causar. 27. Rubiginis, & Plin. l. 18. c. 17. meminere.

I. Ustila-

- I. Vstilago fecales.  
Vstilago, Trag. Dod. (cui Avenæ ac Tritici  
propriè morbus) Lon. Lob. Lugd. (cui præ-  
sertim Avenæ pestis est.)  
Vstilago secalina, Tab.  
II. Vstilago hordei.

Vstilago polystichi, & Vstilago hordei dysti-  
chi, Lob. ico.  
Vstilago hordeacea, Tab.  
III. Vstilago Avenæ: & Lob. ico.  
Vstilago Avenacea, Tab.

## O R Y Z A.

**O** R Y Z A Diofcoridi l. 2. cap. 117. Οζύζον Theoph. 4. hist. 5. Oryza Plin. l. 8. cap. 7. ex qua  
Pisifanam fieri scribis. Per Pisifanam aliqui intelligunt Oryzam, qua vulgo cortice nu-  
data venalis habetur.

I. Oryza Italica, ad differentiam Germani-  
cæ, de qua inter Zeas.  
Oryza, Brunf. Matth. Ang. Tur. Cord. in Diofcor.  
Lac. Dod. Lob. Lon. Cæf. Cast. Cam. Tab. Ory-  
za peregrina, Trago.  
Oryzam, frumentacearum generi, Diofcor. inter  
legumina, Galenus recenset, Lugd.  
Hordeum Galaticum Columellæ, Hermolaus,  
Ruel. Amat. & Tab. censuere.

II. Oryza Indiæ Orientali peculiaris.  
Oryzæ peculiare genus, Regina Patensis, Hol-  
landis obtulit, ut habetur in Ind. Or. par. 8. sed  
quid? Oryzam ex India originem traxisse, &  
per universum ferè orbem disseminatam esse,  
in 6. part. Ind. Orient. scribitur. Hæc præci-  
pua omnium Indiæ Orientalis locorum annô-  
na est, part. 3. Ind. Orient. c. 39. Hinc Indis  
loco panis est, ex ea placemias parantibus; ex

qua in China potum faciunt, quem in Peru A-  
cuam vocant: in Iaponia vinum, quod Iaven-  
ses Aracle nominant: & in Pegu, Aquam ex-  
trahunt, quæ cum aqua vitæ certat: part. 7. Ind.  
Orient. c. 34.

Distinguunt in Oryzam optimam, quam Gi-  
rasol, & in viliorem, quam Chambasal Indi  
vocant. Linfcor. par. 2. Ind. Or. c. 37. & par. 4.  
c. 6. In summa, Oryzæ usus, universis propè  
nationibus, non minus quàm frumentum fa-  
miliaris est: ut de China, Iaponia, Philippinis,  
& maxima Indiæ Orientalis parte sileam, etiã  
per Africam & Aethiopiam universam, Indi-  
amque Occidentalem, cibus usitatissimus est.  
Sic & Europæi, qui panes ex frumento habent,  
Oryza, obsonij vice, cum lacte aut aqua deco-  
ctâ, utuntur.

## FRUMENTVM INDICVM.

**E**TS I in Canaria frumenti varia genera habeantur: at tamen positissimum apud Indos qua-  
druplex est: Primum, Milium Indicum: secundum Mays, quod Triticum ipsorum est: ter-  
tium, quod Manigette indierant: quartum est Oryza, qua in Regno Congiano Maxxa di Man-  
puto, id est semen Lusitanicum, at Malaicenses Bras appellant: & tres posteriores species deli-  
neata in 6. part. historia Indiæ Orientalis figura 14. proponuntur.

I. Frumentum Indicum, seu Milium Indic.  
Milium hoc spicas habet oblongas, ex granu-  
lis colore semen Cannabis a mulantibus, com-  
positas, formâ nonnihil oblongis, utriculis sive  
folliculis aristis carentibus inclusis instar Di-  
psaci herbæ, quod trium mensium spacio suc-  
crefcit: dein abscinditur, in terram mientis spa-  
cio deponitur, ut Solis calore probè exiccetur  
& percoquatur: tandem spicæ à culmis refecan-  
tur, in fasciculos collectæ domum deportantur,  
stramine operiendis, vel muniendis ædificijs,  
destinato. Hoc frumenti genus optimum est,  
quod fractum & comminutum, cãdidissimum  
apparet, ex quo facili labore panis pinfitur,  
cum admodum molle sit, & attritu statim, mas-  
sam conficiendis panibus aptam, præbeat. Et  
hoc fru-

hoc frumenti genus, semper habuerunt, etiam ante Lusitanorum adventum: hist. Ind. Orient. part. 6. cap. 30.

An semen, quod Congiani Lucum vocant, canabis grana, nisi quod paulo sit majus, referens, quod molâ manuariâ, subactum & pistum, panem præbet candidum, tritico non inferiorem, hist. Ind. Orient. part. 1. l. 2. cap. 2.

An Arundinis genus granum ferens, nostro Secali aut frumento simile, quod decoctum esui est aptum: Insulæ Virginæ historia.

II. Frumentum Indicum grano avellanæ magnitudine.

Folia habet angusta & tenuia, sed in tantam altitudinem, quemadmodum tertium, non exurgit: ex ramis frumentum illud instar nucum avellanarum dependet, quod aristas habet cum Tritico sive Mays convenientes, colore rubicundo: grana cute tenella in veluta, putaminibus includuntur, & peculiariibus quasi loculis, admodum granorum in malo Punico, ab invicem distincta: seminatur in agris, quemadmodum frumentum verum, potissimum in Africa, & quidē in peculiari quodam loco, qui nomen eriam suum inde obtinuit: & Æthiopibus, Manigette: Batavis, Grain dicitur: part. 6. Ind. Or. cap. 38.

III. Frumentum Indicum Mays dictum, an Triticum Baërianum Plin. l. 18. c. 7.

Frumentum Arabicum, quod Mays nominant, in hist. Ind. Orient. part. 8.

Frumentum ex Guinea, ibid.

Triticum Indicum sive Mays, quod Lusitani apud Nigritas primò seminarunt: in hist. Ind. Orient. part. 6. c. 31.

Pagatovv, Virginæ indigenis.

Avati fructus, ex quo Brasiliiani potum Kaavvy coquunt: Stad. par. 3. Amer. c. 7.

Milium amplum, Triticum Satracenicum, barbaris Avati, quod idem cum Indorum Mays & Triticum Peruanum, Lerio part. 3. Amer. c. 8.

Milium Abrayn, id est, Siligo Turcica in Baly, par. 3. Ind. Or. c. 40.

Frumentum Asiaticum: par. 7. Ind. Occid.

Milium Brasilianum: par. 3. Amer.

Milium in florida: par. 6. Ind. Occid.

Differentia notanda, cum duo genera, ad sex vel septem pedes, tertium ad decem in Virgi-

us, ut quod è Lucanis tollitur: alterum subtilius & aridius, quod Morochen appellant.

Granum hoc magni proventus est (bis enim Martio & Junio ferunt: part. 2. Ind. Occid.) cum in Peru ex uno grano 600. gignantur: at in Virginea mille & quinquaginta, & interdum bina millia reddat. Siquidem spica vel una, vel binæ, ternæ, vel quaternæ, & singulæ spicæ quinques, sexies, & septies centena grana in Virginea contineant: apud Americanos, singuli culmi tribus quatuorve spicis onusti adolefcunt, quarum singulæ, grana centum & amplius pendunt. Sic grana alba, rubra, flava, cærulea, in Virginea sunt.

Frugum omnium communissimum Indiæ Occidentalis locis, in Peru, nova Hispania, Guatimala, Chile, & universa terra firma, in Insulis verò non item: sic & in Indiæ Orientalis aliquibus. Hoc Indi communiter cum primo commiscunt: & ex hoc solo panem Arepas nominatum, & potum Chicha (potus subaculus Cici dictus: par. 9. Ind. Occid. addit.) Indis vocarunt: ut fortissimum, quod in Peru Sora dicitur.

An hæc herba quæ in Brasilia aliquando senes virilia contegit, cujus folia duorum digitorum latitudine, paulum incurva, in longitudinem excrefcencia, veluti calamus qui spicam Milij sive Tritici Sarracenicæ contegit: Lerio in Brasil. cap. 7.

Haëtenus ex hist. Indica: subjiciamus recentiorum nomina.

Turcicum frumentum, Trag. (cui & Typha magna) Fuch.

Frumentum Indicum, perperam Turcicum, Matth. Lon. Cast.

Milium Indicum Plinianum, Ruell. Gef. Ad. Lob. cui & Mays Occidentale.

Milium Indicum, Dod. Gal. (cui & frumentum Asiaticum,) Tur. Lac. Gef. cat.

Frumenti octava species Turcica, dictum, Ang.

Triticum Baërianum sive Indicum, Cord. hist.

Gef. hort.

Frumentum Turcicum, Ang. Dod. Gef. hor. (cui & Panicum peregrinum rectius,) Tab. Ger.

Triticum Indicum Fuch. & Matth. Lugd. Portę.

Maizum, Monardi.

Maiz, triticum Indicum potius, quàm frumentum Turcicum dicendum, cum non ex Asia,

sed In-



sed India primum sit allatum, Cam.

Maiz Indorum, Panicum Indicum, Cæf.

Mays, quod nulla specie cum Milio, quod Plinius ex India in Italiam importari scribit, convenit, Joseph. Acofta hist. Ind. l. 4. c. 16.

Variat apud nos floris colore, purpureo, rubeo, luteo, aliquando pro ratione fructus futuri: granorum in colore quatuor præcipue genera: habetur enim grans rufescentibus, nigricantibus, crocantibus, & subalbicantibus.

IV. Frumentum Ind. Mays dictum alterum.

Milium Indicum magnum aliud, Lob. ico.

Milium Indicum, Cast.

Frumentum Indicum, Tab.

Frumentum Asiaticum, Ger.

Hoc cum spicarum colore variet, idcirco Tabernæmontanus spicas sedecim, Gerardus ve-

rd 12. pingit: quæ colore sunt vel simplici, vel mixto: simplici, albo, luteo, aureo, violaceo, spadiceo, nigro: mixtis coloribus, albo, spadiceo: & cæruleo: cæruleo, albo, nigro, partimque punctis spadiceis mixto: albo, violaceo, luteo cum punctis spadiceis: rubro, nigro & spadiceo: luteo albo, aliquando cæruleo & violaceo, aliquando luteo & albo, violaceis & cæruleis punctis aspersis: rubro & spadiceo: aureo & albo: cæruleo, luteo, albo, & punctis cæruleis aspersis: denique cæruleo, luteo, violaceo & albo.

V. Frumentum Indic, Mays dictum minus. Hujus Tabernæmontanus meminit, quod prioris altitudinem tantum mediam attingat, cujus spicæ non ad culmorum latera, sed floribus succedant, colore albo, rubeo, spadiceo, luteo, atrorubente, & aliquando mixto.

## MILIUM EJUSQUE SPECIES.

**M**ilium, à miliari summa Fello, quasi millesimum granum seras. Κίρρη Diofcor. lib. 2. cap. 119. & Theoph. 8. hist. 3. à numerosissimis & minutis granis ficum, quæ Κίρρηαιδες vocantur. Hippocrati secundum Galenum πικραλ. Milium, Plin. lib. 18. c. 7.

I. Milium semine luteo vel albo.

Milium, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Tur. Dod.

Cord. in Diofcor. Lac. Lon. Lob. Cast. Tab. Lugd.

Milium Diofcoridis, Theophrasti & Plin. Cæf.

Milium vulgare, Gef. hor. Ad. commune, Ang.

Milium aureum & album, Cam.

II. Milium semine nigro.

Milij nigri species apud Oribasium, Ang.

Milium femine nigro & lariores juba, Lob. obs.

Milij alterum genus è colore nigro deterius, Cæfalp.

Milium jubâ subinde coloris nigricantis, Dod.

Milium nigrum, Tab. Cam. Ger.

Hoc quod in Argovia Bernatum frequenter feritur, à vulgato differt folijs latioribus, caule non adeo alto, jubâ sparsâ & minore, semine aliquantum majore & rotundiore, & ad pultes conficiendas altero longè utiliore.

III. Milium Sabæum.

Millo, frumentum in Guinæa parvum, Milij forma sed dulcius, ex quo panem & vinum conficiunt in Regno Sabo: ad Cluf. curas post.

IV. Milium arundinaceum subrotundo semine. Sorgo nominatum.

Milium quod ex India in Italiam inductum nigro colore, Plinio.

Panicum Diofcoridis & Plinij, Trag.

Milium Indicum, Matth. Fuch. ico. (cui & Sarracenicum,) Gef. hor. Cord. hist. Guiland. Lugd. Cast. def.

Milium Indicum Plinij, Ang. Cam.

Milium aliud, Ama.

Panicum Indicum, Gef. hor.

Sorghij, Fuch. Dod. gal. (cui Panici species videtur,) Lon.

Sorgum, Gef. hor. Tab. (cui & Panicum loculare,) Ger.

Sorgo, Melica Italarum, Lob. Sorgo Infubrum, Bellonio.

Melica sive Sorgum, Dod.

Melica, fortè à Meline: Sagina alijs à saginando, Calamagrostis Diofcoridis ex hoc genere videtur, Cæf.

Variat seminis colore, quod aliàs rufum, aliàs plenus nigricat: habetur & album & luteum, quod

Sorgum fructu rubro & fructu albo, Eyst.

V. Milium arundinac. plano alboque semine. Sorgo simile granum, Hæreomen Arabum, Bellonio.

Dora, Rauvvolfo.

Milium Æthiopicum, Portæ.



an Milium album in Regno Congt, quod vocant, hist. Ind. Orient. part. prim. libro se-  
Mazza di Congo, id est, semen Congianum|cundo, cap. primo.

## PANICUM EIUSQUE SPECIES.

**E**λυμ & μάλιν Dioscoridi lib. 2. cap. 120. Theoph. 8. hist. cap. 1. 3. 7. & 10. μέλι & Ελυμ & Ελυσαν ab ελύω involuo. Plin. lib. 18. cap. 7. Panicum, & paniculis quibus semen incit. Mel frugum Dioclis, eidem lib. 22. cap. 25. μάλιν, quasi melleum quidpiam.

I. Panicum Germanicum, sive paniculā minore.

Milium agreste sive exiguum, Trag.  
Panicum, Fuch. Tur. Dod. Cord. Gesner. hor.  
Lon. Lob. Cæsalp. Cam. Tab. Ger.

Variat paniculis albis, flavis & purpureis: semen album, luteum, rufescens: Dioscorides frumentaceis, Gal. leguminibus jungit.

II. Panicum Italicum, sive paniculā majore.  
Panicum Marcello, Hermolao, Ruellio, Matthiolo, cui & domesticum: Anguil. Cæsalp. Portæ.

Panicum sativum, Lugdunensi.

Panicum vulgare, Clus. hist.

Panicum aliud Indicum, paniculā villosā, Lob.

Panici Indici spica, Dodon.

Panicum Indicum, Tab. Ger.

III. Panicum Indicum spica obtusa cærulea.  
Panicum cæruleum Indic. Ad. Lob. ico. Cam. Tab.

Panicum Indicum, Dod. Ger. sive peregrinum, Lugd.

Panicum Americanum, Clus. hist.

Panicula est subcærulea, in calidioribus regionibus magis sativa.

IV. Panicum Indicum spicā longissimā.

Panici Americani spica grandis vel lesquipedalis, Clus. hist.

Panicum Æthiopicum ex Guinea, Clus. hist.  
ap. ad lib. 6.

## DE SESAMO ET ERYSIMO CEREALI.

**C**UM Dioscorides & Theophrastus Sesamum inter fruges retulerint: & Plin. lib. 18. cap. 10. frumenta astita dixerit, Sesama, milium, panicum: sic & Erysimum in Asia & Græcia, Sesamo simile asserat: & Theophrastus 2. caus. plant. 17. semina hæc, milium, sesamum, erysimum inter fruges reposuerit: & 6. caus. plant. 19. Sesama & Erysimum sicca cibo idonea, non verò viridia scripserit, de utroque nunc.

Sesamum & Sesama similiter Dioscoridi lib. 2. cap. 121. Theoph. pluribus locis σισαμον, aliis σισάμη dicitur. Duplex Theophrastus agnovisse videtur, dum 8. hist. 5. inquit, Et Sesami genus quoddam candidum datur.

### SESAMUM VETERUM.

Sesamum, Matth. Ang. Tur. Lob. Dod. Cast. Tab. Portæ.

Sesamum verum, Cord. in Diosc. Gef. hor. Lugd. Cam.

Sesama, Cæsalp.

Sempsem, Alpino.

Semen ex Alexandria, Creta, Sicilia affertur.

### ERYSIMUM.

Theophrasti folio hederaceo, εριψιμον & ορύζιμον, hirco-triticum & fagi-triticum, quod fagineam glandem forma triquetra & colore sordido quodammodo referat, licet multo minus sit.

Ocymum veterum, Trago.

Frumentum Sarracenicum, Matth. Lugd. Cast. Tragotrophon & Fago-triticum, Dod. gal.

Erylimi alterum genus Theoph. Cord. in Diosc. Irion cerealis sive Erysimum Ruel.

Erysimum cereale, Gef. cat. Portæ.

Frumenti genus folio hederaceo, Eid.

Formentone, Ang. (cui Ocymum est Varronis) Cæsalp.

Frumentum vaccinum, Lon.

Erysimum Theophrasti, Lob.

Fegopyron, Dodonæo, Fagopyrum, Ad. (an Erysimum Theoph.) Lob. ob. (& Lampfana vera quorundam,) Franco.

Ocymum cereale, Clus. pan. Tab.

Tragopyron, Gerard.

Polygonum hederaceum, Col.

Sarracenicum dicitur, quia ex Africa primum

delatum credatur: nam veteribus vel non cognitum, vel non usitatum, vel neglectum, Dodonæus asserit.

## PHALARIS.

**P**HALARIS Plinio lib. 27. cap. 12. *φάλαρις* Dioscoridi lib. 3. cap. 159. an Melia altera Theophrasti.

I. Phalaris major semine albo.

Phalaris Dioscoridis, Trag. ico.

Phalaris, Matth. Ang. Tur. Dod. Cord. Gef.

hor. [ cui & Canariense semen, ] Lon. Lob.

Cæsalp. Cast. Cam. Lugd. Tab. Ger.

Phalaris herba, Gef. cat.

Milium alterum Theoph. Dalech. in Plin.

II. Phalaris major semine nigro.

Cuneno, Melitensium lucolis.

Gratum hoc in Melita frequens, Canariis

insulis familiare, Malsiliæ notum, nigrum,

oblongum, milio simile, quo Canarios pasce-

res præcipuè nutriunt: ex grano aliquando à

Dalechampio sato, Phalaris prodiit.



## SECTIO QUINTA.

### ASPHODELUS, PHALANGIUM.

**A**SPHODELUS sive *Hastula Regia*, quod regij sceptri effigiem, dum flores, referat. *Ἀσφοδῖλον* unius Dioscor. lib. 2. c. 199. meminit, cujus florem *ἀσφιδέρον* appellant: & Theophrasti. 1. hist. 10. & 7. ejusd. 11. & 12. qui 1. hist. 7. *ἀσφιδέρον*, pro tota planta usurpat. *Asphodelum* aliquos Herois appellasse, Dionysium marem ac feminam fecisse, & aliquos Halymon Hesioidi existimasse, Plin. lib. 22. cap. 12. scribit. Sic lib. 21. cap. 17. testatur, Theoph. & fere Græcos & Pythagoram, caulem *Anthericon*, radicem verò, qua ex octuaginta simul acervatis bulbis constat, *Asphodelum* nominasse: cujus genera duo faciunt: quod etiam lib. & cap. 22. ostendit.

I. *Asphodelus albus ramosus mas.*

*Asphodelus primus*, Ang. Clus. hist.

*Asphodelus major*, Clus. hisp. albus, Eyf.

*Asphodelus ramosus*, Lob. ico. Ger.

*Asphodelus caule ramoso maritimus & mas*, Cæf.

Hic sæpè radicibus ducentis, aut pluribus ab uno capite dependentibus reperitur.

II. *Asphodelus albus non ramosus.*

*Asphodelus*, Marcel. Ruell. Matth. Ama. Gef.

cat. Lon. Cast. verus, Cord. in Dioscorid.

*Asphodelus mas*, Dod. gal.

*Asphodelus alter*, Ang. Clus. hist.

*Hastula regia*, Trag. lat. Lon. Lac. Gef. hor. Lugd.

*Asphodelus albus*, Gef. hor. ap. Clus. hisp.

Dod. Tab. Cam. major, albus, Lob.

*Asphodelus caule simplici*, Cæf.

*Asphodelus non ramosus*, Ger.

III. *Asphodelus autumnalis.*

*Asphodelus autumnalis sive major*, Cam.

I V. *Asphodelus purpurascens foliis maculatis.*

*Asphodelus flore incarnato pallido*, Dod. gal.

*Asphodelus flore suave rubente*, Lob. ico.

*Asphodelus flore rubente*, Tab. Ger.

V. *Asphodelus luteus & flore & radice.*

*Asphodelus flore melino*, Matth. ico.

*Asphodelus luteus*, Gesner. hor. Dod. Cæsalp.

Lugd.

*Asphodel. luteus minor*, Ad. & Lob. (& *Eri-zambac Arabum*,) Tab. Lugd. Gerar.

*Iphyon* Theoph. videtur, Ang.

*Asphodelus fœmina sive luteus*, Cam. epit.

*Hastula*

Hastula regia minor, & Asphodel. minor, Cast.  
Asphodelus luteo flore & radice, Cam.  
Meminere Tabern. & Gerar. Asphodeli lutei,  
qui albo, radicibus & floribus sic similis, sed  
foliis brevioribus, cauleque latis foliis cincto,  
quem Asphodelum luteum nominant.

VI. Asphodelus albus minimus.

Asphodelus minimus, Clus. hist.

VII. Asphodelus foliis fistulosis.

Asphodelus tertius aliquibus maritimus, Ges.  
hort. ap.

Asphodelus minor, Clus. Dod. Lugd. Cam.

Phalangium Cretæ Satonenfis, Ad. Lob. Lugd.  
Ger.

Phalangij alterum genus, Cæs.

Phalangium Narbonense, Tab.

VIII. Pseudoasphodelus palustris Anglicus.

Asphodelus luteus palustris, Dod. Tab.

Asphodelus palustris, Lugd.

Asphodelus minimus luteus acori sol. palust.  
Lob.

Asphodelus acorifolius palustris luteus, Ad.

Asphodelus Belgicus palustris luteus, Lob. ad.  
part. alt.

Pseudoasphodelus primus vel major, Clus.  
hist.

IX. Pseudoasphodelus palustris Scoticus.

Asphodelus minimus Noruegicus luteus palu-  
stris Scoticus & Lancastrienfis, Lob. advers.  
parte secunda.

Asphodelus Lancastræ, Gerar.

X. Pseudoasphodelus alpinus.

Pseudoasphodelus pumilio foliis Iridis, Clus.  
pan. vel secundus, Eid. hist.

## PHALANGIUM EIUSQUE

Species.

**Φαλαγγίς** Diosc. lib. 3. cap. 122. *meminere* : sic dictum Galeno, 8. *simpl. facult.* quod de-  
morfit à Phalangii auxiliatur, cui Φαλαγγίτης, & Plin. lib. 27. cap. 12. Phalangites,  
à quibusdam Phalangium, ab aliis Leucanthemum vocatum.

I. Phalangium magno flore.

Phalangium, Matth. Cast. majus, Ges. hor.

Phalangium Matthioli, Lugd. Tab.

Phalangium Allobrogicum majus, Clus. hist.  
ap. 2. Eyst.

Phalangium Dalechampij, Lugd.

Lilium polyrhizon Myconi, Lugd.

II. Phalangium parvo flore non ramosum.

Phalangites quorundam, Cord. in Diosc.

Liliago, Cord. hist. ejus Scholiasti, Asphodelus  
Germanicus.

Liliago Cordi, Asphodeli syl. species, Thal.

Phalangium non ramosum, Lob. Dod. Tab.  
Ger.

Phalangium cauliculis simplicibus, Cæsalp.

Liliasphodelus albo flore quibusdam.

Phalangio Allobrogico congener, vel Phalan-  
gium montanum, Clus. cur. post.

Est majus folio longiore, & latiore, semi-  
ne majore : est alterum in quo omnia mino-  
ra, & folia angustiora, in monte Wasserfall :  
cujus radices sæpe pro Rusci veri radicibus,  
magno errore divenduntur.

III. Phalangium parvo flore ramosum.

Moly alterum Plinij, Dod. gal.

Phalangites sive Palangium herba, Gesner.  
hor.

Phalangium ramosum, Lob. Dod. Lugd. Tab.  
Ger. Eyst.

Phalangium, Asphodelus parvus dici posset,  
Cæsalp.

Phalangium majus, Cam.





## SECTIO SEXTA.

XYRIS, IRIS, ACORUS, GALANGA, ZIN-  
ZIBER, ZEDOARIA, COSTUS, CURCUMA  
ET CROCUS INDICUS.

### XYRIS.

**E**T PIE ob folij similitudinem, quasi rasorium cultrum dicitur, de qua Diosc. lib. 4. cap. 22.  
**E**T CAS. à γεία, Iris sylvestris Theophrasto : Plin. lib. 21. cap. 20. Iris sylvestris, à quibusdam  
Xyris vocata. Spatula fetida, tum ob figuram folij gladiolum referentis, tum quod gravem  
odorem exhalet, vulgo dicitur.

#### I. Gladiolus foetidus.

Xyris five Iris sylvest. Dioscoridi.

Spartanium live Xiphidion, Offic. spatula fo-  
etida, Ruell. Ama.

Spatula foetida, Trag. (cui & Gladiolus Italic.)

Fuch. Lon. Gef. hor. Ang. Cæs. Tab. Dod.

Xyris, Matth. Lac. Tur. Cord. Cornaro, Lob.

Cast. Cam. & Ger.

Xyris vel Iris agria Theo. Dod. gal. Ad. Lob. ico.

Xyris Matthioli & Lobeli, Lugd.

Cum Matthioli & Lobeli figura, radice for-  
ma differant, ideo in historia Lugdunenfi  
duæ figuræ positæ: dum enim adhuc juvenca  
est, radicem habet fibrosam seu capillarem:  
ubi verò adolevit, crassa est. Flos communiter  
obsoletè purpureus: aliquando saturata pur-  
pura arridet, rariùs rubet.

#### II. Gladiolus foetidus maritimus.

Xyris maritima, quam fluctus in littora, cum  
aliis purgamentis reijciunt, Lugd.

### IRIS ET EIUS DIFFERENTIÆ.

**I**RIS, à γεία Diosc. l. 1. c. 1. à cælestis arcus similitudine nomen accepit. Species complures esse,  
colore floris differentes, idem ostendit, nempe candido, pallente, luteo, (alii nigros legunt,) pur-  
pureo, caruleo, seu cyaneo. Quam colorum diversitatem non in uno flore reperiri, videtur Dio-  
scorides, (ut aliqui credunt,) voluisse: siquidem de Illyrica maxime loquatur, quam Brassavo-  
lus in Illyrico plerumq. candidis, alias pallidis, nonnunquam luteis & etiam purpureis conspe-  
xit. Theo. 6. caus. 13. Iris odorata est, & à gratia palasi nomen accepit, qua in Illyride (6. caus. 28.)  
melior quàm in Macedonia: in Thracia vero, locisq. fri. idioribus odore penitus caret. Gaza  
Iridis vocem Consecratricem versit. Plin. l. 21. c. 7. Iris diversicolor. specie floret, sicut & arcus  
cælestis, unde & nomen: laudatissima in Illyrico; proxima in Macedonia, qua longissima, can-  
dicans, & exilis: tertium locum habet Africana, qua amplissima & gustu amarissima. Illyrica  
quoq. duum generum: Raphanitis, à similitudine, (forse Astragalus Gal. & Aërij), qua &  
melior: Rhizotomos subrusa: non improbat & Pisidica.

Recentiores multas differentias agnoscunt: quare dividemus in eam, quæ radice est genicu-  
lata, & eam quæ radice est bulbosa: hæc enim & foliorum latitudine angustia, florisq. colore,  
& ratione loci natalis variant.

#### IRIS LATIFOLIA.

##### I. Iris vulgaris Germanica five sylvestris.

Iris, Brunf. Gesner. cat. sylvestris, Matth. Lac.

Cord. hist. Cast. Lugd. Tab. syl. prima, Advers.

Iris syl. major, Matth. ep. Gef. hor.

Iris Germanica, Fuch. carulea, Dod.

Gladiolus caruleus major, Trag.

Iris latifolia major vulgaris, Clus. hist.

Iris biflora, Ger. ico.

Hæc est, quam in testorum culminibus, vi-  
nearum

nearum macerij & muris plantare consueverunt, quæ in hortos translata, cultura speciosior redditur.

## II. Iris hortensis latifolia.

Iris Germanica, Trag. Domestica, Matth. Lac. Cast. Lugd.

Iris, Tur. Ang. Dod. Cord. in Diof. Lon. Tab.

Iris communis, Ges. hor. vulgaris, Lob. Ger.

Iris nostra sativa, Cord. hist.

Iris, Hyacinthus Virgilij, Columellæ & Palladij, Ang. Cam.

Iris major cærulea, vel purpurea, Cam.

Iris latifolia vulgaris cærulea, Eyst.

## III. Iris hortensis pallidè cærulea.

Iris cujus flores aquæ cyaneum colorem referunt, Dod.

Iris dilutè cærulea involucro albo, Tab.

Iris Chalcedonica, Ger. ico.

Iris latifolia major obsoleta, Clus. hist.

## IV. Iris hortensis alba Germanica.

Iris albo flore, Ges. hor. alba, Tab. Ger.

Iris vulgaris candidis floribus, Lob. ico. Lugd.

Iris candida, Dod. sub Iridea altera.

## V. Iris alba Florentina.

an Iris Africana Dioscoridis?

Iris sativa floribus nivei coloris, Matth.

Iris Florentina seu femina, Ges. hor.

Iris Florentina, Ireos officin. Dod. gal. Lon. Ad. Tab. Ger. Franco, Eyst.

Iris Illyrica, Cord. in Diof.

Iris flore ex toto candido, Cæsalp.

Iris major alba, Illyrica vulgo vel potiùs Florentina, Cam.

Iris latifolia major alba, Clus. hist.

Hæc Florentina à Germanica differt, quòd hujus radix siccata: non secus ac vulgaris cærulea, consurgatur: illius verò non, quæ etiam radicis minor est: in officinis nostris Illyrica habetur, quæ Venerijs adfertur, quæ rufescit, minus nitida est, at odore est suaviore.

## VI. Iris Illyrica.

Iris Illyrica, Eyst. quæ à Florentina aliquantulum differt, quòd hujus flos candidissimus sit, cum Illyricæ sit coloris dilutè cærulei pallescens & odore remissiore.

## IRIS LATIFOLIA PEREGRINA MAJOR.

I. Iris Sufiana flore maximo ex albo nigricante,

Iris Sufiana, Clus. pan.

Iris Chalcedonica variegata, Lob. Tab.

Iridi luteæ variegatæ in Lugd. hist. jungitur.

Iris Camerarij, Ger. ico.

Iris latifolia major prima, Clus. hist.

Iris Chalcedonica latifolia, Eyst.

Iris Pharaonis, vel nigra Cretica quibusdam.

## I. Iris Asiatica cærulea polyanthos.

Iris Asiatica cærulea, Clus. pan. sive latifolia major 2. Eid. hist.

Iris Dalmatica major, Lob. ico. Lugd. Tab. Ger. ico.

## III. Iris Asiatica purpurea.

Iris Asiatica purpurea vel 3. Clus. pan.

Iris latifolia major 5. Eid. hist.

## Huc referantur

Iris latifolia violaceo colore major, &

Iris latifolia major variegata, Eyst.

## IV. Iris peregrina subrubens inodora.

Iris major latifolia sexta, Clus. hist.

## V. Iris peregrina odore oxyacanthæ.

## VI. Iris major latifolia 24. Clus. hist.

## VI. Iris Dalmatica major.

Iris Dalmatica major, Clus. hisp. ut Lob. Lugd. desc. Cam. Tab. Ger. & Chalcedonica 2. Tab. icon.

Iris major latifolia 3. Clus. hist.

an Iris Lusitanica verna, Lob.

## VII. Iris Byzantina purpureo cærulea.

Iris major latifolia 18. Clus. hist.

## VIII. Iris Damascena polyanthos.

Iris major latifolia 4. sive Damascena, Clus. hist.

## IRIS LATIFOLIA GERMANICA & PANNONICA.

## I. Iris latifolia Germanica odore suavi.

Iris major latifolia 7. Clus. hist.

## II. Iris latifolia Germanica odore Sambuci.

Iris major latifolia 8. Clus. hist.

## III. Iris latifolia Germanica ochroleucos.

Iris major latifolia 28. Clus. hist.

## IV. Iris latifolia Germanica candido purpurea.

Iris major latifolia 21. Clus. hist.

## V. Iris latifolia odore oxyacanthæ.

Iris exotica, Camer. vel Iris 5. Clus. pan.

Iris major latifolia 14. Clus. hist.

VI. Iris latifolia Pannonica colore multiplici,

Iris

*Iris varia caulifera*, vel *Iris* 4. Clus. pan.

*Iris major latifolia* 15. Clus. hist.

*Iris Pannonica* 4. Clusij, Tab.

*Iris lutea variegata*, Ger. icon.

VII. *Iris latifolia alba viridis*.

*Iris major latifolia* 16. Clus. hist.

VIII. *Iris latifolia caule aphylo*.

*Iris* 7. & *Iris caulifera purpurea* 1. & 2. Clus. pan.

*Iris major latifolia* 25. & 26. Clus. hist.

Variat: in illa, folia circa caulem minus, in hac, magis purpuraeunt.

IX. *Iris latifolia candida*, purpureis venis distincta.

*Iris major latifolia* 27. Clus. hist.

*Iris Portugalia*, Eyfset.

### IRIS LATIFOLIA

Belgica.

I. *Iris latifolia Belgica* odore Sambuci.

*Iris Lusitanica verna*, Lob. quoad icon.

*Iris latifolia major* 9. Clus. hist.

II. *Iris latifolia Belgica versicolor* odore Sambuci.

*Iris major latifolia decima*. Clus. hist. def. Eyfset.

III. *Iris latifolia Belgica* odore Sambuci altera.

*Iris latifolia major* 11. Clus. hist.

IV. *Iris latifolia Belgica variegata*.

*Iris major latifolia* 12. Clus. hist.

V. *Iris latifolia Belgica caerulea versicolor*.

*Iris major latifolia* 13. Clus. hist.

VI. *Iris latifolia ex albo pallens striata*.

*Iris major latifolia* 17. Clus. hist.

VII. *Iris latifolia humilior purpurea*.

*Iris major latifolia* 19. Clus. hist.

VIII. *Iris latifolia humilior versicolor*.

*Iris major latifolia* 20. Clus. hist.

### IRIS BIFLORA.

I. *Iris biflora flore minore*, odore lilij convallij.

an *Raphanites* Plinij: & *Astragalites* Aëcio.

*Iris biflora*, Clus. hisp. Lugd.

*Iris biflora Lusitanica*, Lob. Dod.

*Iris latifolia majora*. Clus. hist.

II. *Iridi bifloræ affinis flore majore*.

*Iris Illyrica*, vel *Iris* 6. Clus. pan.

*Iris major latifolia* 23. Clus. hist.

an *Iris Byzantina*, Camerarij huic similis?

III. *Iridi bifloræ affinis minor*.

*Iris Dalmatica minor*, Clus. hisp. Lob. Lugd.

*Iris latifolia major* 18. Clus. hist. quoad icon.

### IRIS LATIFOLIA

Lutea.

I. *Iris lutea sativa*.

*Iris sativa floribus aureis*, Match.

II. *Iris lutea variegata* Lobelij.

*Iris lutea variegata*, Lob. Lugd.

III. *Iris lutea variegata Camerarij*.

*Iris variegata* è luteo & purpureo, Cam.

Duplicem habet, aliam folijs languidis, aliam erectis.

*Huc referenda.*

*Iris Pannonica variegata*, Eyfset.

Flores purpura flavescit, & lineis purpurascens distinguitur.

IV. *Iris media longissimis folijs lutea*.

*Iris Tripolitana* mediam inter latifolias & angustifolias, Clus. hist.

### IRIS ANGUSTIFOLIA.

I. *Iris pratenfis angustifolia folio scetido*.

*Iris angustifolia media*, Clus. hisp.

*Iris angustifolia major*, sive prima, Clus. hist.

*Iris folijs angustis prima* Clusij, Eyfset.

II. *Iris pratenfis angustifolia non scetida altior*.

*Iris angustifolia media*, sive *Iris angustifolia Pannonica* vario flore, & *Iridis undecimæ species prior*, Clus. pan.

*Iris sylvestris Byzantina peramœna*, Lob. ico. & Ger.

*Iris syl. angustifolia major*, Tab.

*Iris undecima* Clusij, Camer.

*Iris tenuifolia*, Thal.

*Iris angustifolia altera*, Clus. hist.

*Iris pratenfis major*, Eyfset.

III. *Iris pratenfis angustifolia humilior*.

*Xiphion*, seu *Gladiolus caeruleus minor*, Trag.

*Iris tenuifolia*, Cord. hist. Gef. hor.

*Iris minor* seu *tenuifolia*, Dod.

*Pseudoacorus caeruleus* Tragi, Lugd.

*Iridis undecimæ altera species*, Clus. pan.

*Iridis angustifoliæ secundæ species altera*, Eide. hist.

*Xyris minor*, Camer.

IV. *Iris angustifolia maritima major*.

*Iris maritima Narbonensis*, Advers.

*Iris*



*Iris sylv. maritima Narbonensis*, Lob. ico.  
*Iris angustifolia media*, vel ejus prima species, Cluf. hisp.

*Iris sylv. altera*, Penæ, Lugd.

*Iris maritima*, Camer.

*Iris angustifolia* 3. Cluf. hist. at 1. quoad icon.

V. *Iris angustifolia maritima minor*.

*Iridis angustifoliæ mediæ altera species*, Cluf. hisp.

*Iris angustifolia quarta*, Cluf. hist.

VI. *Iris angustifolia hortensis versicolor*.

*Iridis angustifoliæ tertiæ species*, Cluf. hisp.

*Iris angustifolia quinta*, Cluf. hist.

VII. *Iris angustifolia candida lincis rubentibus notata*.

*Iris candidis floribus angustifolia*, Lobel. ad. part. 2.

VIII. *Iris angustifolia bicolor*.

*Iris flore cæruleo obsoleto cinereouë polyflora*, Lob.

*Iris flore cæruleo polyanthos*, Lugd.

IX. *Iris angustifolia prunum redolens minor*.

An Rhizoromos Plinij.

*Iridis Illyricæ nomine offensa Hermolao*.

*Iris perpusilla sylv. angustifolia*, Lob. observ.

*Chamæiris angustifolia*, Eid. ico. minor, Tab. Eyst.

*Chamæiris*, Dod. & Lugd. odoratissima, Cam.

*Iris angustifolia humilior*, Cluf. hisp.

*Iris angustifolia minor*, vel 12. Eid. pan.

*Iris peregrina*, Illyrica vulgo, Cæsalp.

*Chamæiris vel Iris humilis*, Cam. in Matth.

*Chamæiris tenuifolia*, Ger.

*Iridis angustifoliæ sextæ species altera*, Cluf. hist.

X. *Iris angustifolia prunum redolens major*.

*Iris sylvestris minor*, Matth. Cast.

*Iris sylv. altera*, Ges. hor. Lugd.

*Chamæiris angustifolia*, Tab. Ger.

*Iridis angustifoliæ sextæ species prima*, Cluf. hist.

*Chamæiris odore carens*, Cam.

## CHAMÆIRIS.

I. *Chamæiris major saturatè purpurea biflora*.

*Chamæiris latifolia biflora*, Eyst.

II. *Chamæiris variegata*.

*Iris perpusilla latifolia*, Lob. observ.

*Iridis perpusillæ latifoliæ varietas*, Eid. ico.

*Irid. humili latifoliæ similis*, Cluf. hisp.

*Chamæiris seu alia perpusilla Iris latifolia*, Lugd.

*Iris sylv. minor latifolia*, Tab.

*Iris violacea*, Ger. ico.

*Chamæiris latifoliæ genus 1. cum icone Chamæiris nivæ Lobelij*, Cluf. hist.

Flos ex cæruleo dilutus aut candidus, aut pallens, aut purpureus, aut violaceus: huc pertinet.

*Chamæiris cæruleo & violaceo colore*, Eyst.

III. *Chamæiris flore saturo violaceo*.

*Chamæiris latifolia Pannonica major*, vel *Iris octava*, Cluf. pan.

*Chamæiris latifolia major*, addida figura *Chamæiris latifoliæ flore rubello Lobelij*, Cluf. hist.

Flos hujus aliquando purpureus, aliquando eleganter cæruleus est.

IV. *Chamæiris minor*, flore purpureo.

*Iris minor*, Dodon.

*Iris violacea parva*, Lob. ico.

*Chamæiris latifolia minor purpurea*, vel *Iridis 9. species prima*, Cluf. pan.

*Chamæiris latifolia minor prima*, Cluf. hist.

Flos saturatioris purpuræ, odoratus: interdum dilutior & inodorus.

V. *Chamæiris minor flore purpureo cæruleo*.

*Chamæiris latifolia minor cærulea*, vel *Iridis 9. species altera*, Cluf. pan.

*Chamæiris latifolia minor 2. Cluf. hist.*

VI. *Chamæiris minor flore rubello*.

*Chamæiris latifolia flore rubello*, Lob.

*Chamæiris latifolia minor rubescens*, vel *Iridis 9. species tertia*, Cluf. pan.

*Chamæiris latifolia minor tertia*, Cluf. hist.

Floris colore variat purpureo, cæruleo, rubescente, pallido, albo & vario: est flore odoro & inodoro.

VII. *Chamæiris minor flore variè picto*.

*Chamæiris latifolia minor septima*, Cluf. hist.

VIII. *Chamæiris flore purpureo flavescente*.

*Chamæiris latifolia minor octava*, Cluf. hist.

Eyst.

Huc referri debet

*Chamæiris flavo & purpurascente flore*, Eyst.

IX. *Chamæiris flore pallido & albo*.

*Chamæiris latifolia minor*, vel *Iridis 9. species 4. Cluf. pan.*

*Chamæiris latifolia minor* 4. Eid. hist.

Huic similis est.

*Chamæiris latifolia minima*, Eyft.

X. *Chamæiris minor* flore variegato.

*Chamæiris latifolia minor varia*, vel *Iridis* 9. species 5. Cluf. pan.

*Chamæiris latifolia minor* 7. Eid. hist.

XI. *Chamæiris flore luteo*, vel candido.

*Iris minor lutea*, Dod.

*Chamæiris lutea altera*, Lob. ico.

*Chamæiris nivea*, aut candida, Eidem. & Eyft.

Huc pertinet,

*Chamæiris flore argenteo & flore candido*, Eyft.

XII. *Chamæiris flore obsoleto pallido*.

*Chamæiris latifolia minor sexta*, Cluf. hist.

XIII. *Chamæiris flore pallide luteo*, vel *Chamæiris minor* ὀχρῆλον.

*Chamæiris latifolia minor nona*, hist.

XIV. *Chamæiris minor flore purpureo*.

*Chamæiris latifolia minor* 10. Cluf. hist. Eyft.

XV. *Chamæiris candicans venis variis* distincta.

*Chamæiris latifolia minor* 11. Cluf. hist.

XVI. *Chamæiris saxatilis Gallica*.

*Iris perpusilla saxatilis latifolia acaulos fermè*, Adver. & Lob. ico.

*Iris pusilla sylvestris*, Cæsalp.

*Iris perpusilla & saxatilis*, Lugd.

an *Iris δισμυλ*, Cam.

Variat: altera flore est purpureo & radice odorata: altera flore pallido, radice inodora.

XVII. *Chamæiris latifolia saxatilis Lusitanica*.

*Iris humilis latifolia*, Cluf. hisp.

*Iridis aliud genus humilius*, Eid. hist.

## ACORUS.

**A**ΚΟΡΟΣ, quia τῆς κόρης, id est, pupillis sive aciei oculorum caliginose medetur, dicitur, de quo Dioscorid. lib. 1. cap. 2. Meminit Plin. lib. 25. cap. 13. *Acori Iridis folijs, radicibus nigris: quare cum & Dioscoridis & nostra, sit radicibus albicanibus; candida, commendatur, de hac Plinius intelligendus non est.*

I. *Acorus verus*, sive *Calam. aromat.* Officinarum.

*Acorus*, perperam *Calamus aromaticus officinarum*, Manardo, Trag. Matth. Cord. Gesner.

Dod. Ad. Lob.

*Calamus aromaticus vulgo*, Amato, Mundellæ, Cæsalp.

*Acorum*, Lon. Cam. Tab. Ger. Eyft.

*Acorum legitimum*, Cluf. hisp. verum, Lugd.

*Calamus noster*, *Iridis species*, Ang.

II. *Acorus adulterinus*.

*Iris in maritimis nascens*, à Theophrasto & Plinio improbata.

*Acorus*, Brunf. Cord. hist. Lac. Cæsalp. Cam. Cast. Lob.

*Acorus falsa*, Cord. in Diosc. Ges. hor. vulgo, Cæsalp.

*Acorum adulterinum*, Trag. falsum, Matth. Cast.

*Gladiolus luteus lilij*, Er. Cord. luteus, Fuch. ico. Lon.

*Acorum officinarum*, Fuch.

*Acorus nostras*, Ruel. palustris, Ad. Lob.

*Acorus luteus falsus*, Lugd.

*Gladiolus aut Acorus falsus*, Tur.

*Gladiolus aquaticus*, Ama.

*Iris lutea*, Dod. gal. Cord. hist.

*Iris palustris lutea*, Tab. Ger.

*Iris agrestis*, Ges. car.

*Pseudoiris*, Dod. palustris, Eyft.

*Butomum*, Cluf. hist.

III. *Acorus adulterinus Aquitanicus*.

*Acorus Aquitanicus*, Ad.

*China spuria*, *Acori effigie*, Lob. ico.

## GALANGA.

**C**UM *Galanga*, quibusdam *Acori*, nonnullis *Iridis species* videatur, & minor à recentioribus Græcis *Cyperus Babylonica* nominetur, hac omnino optime referri posse censuimus. Græcis recentioribus γάλαγγα. Arabibus *Galingian* dictum.

I. *Galan-*

I. Galanga major, Matth. Cord. hist. Ad Lon. Lob. Cæf. Lugd. Tab.  
Galanga crassa, Ama.  
Galangam, Schœnanthi radicem, volunt Monachi in Mesuem.  
Acorus veterum, Leonicensi & Brassau.  
Acorus seu Galanga major, Fuch. comp. Corn.  
Galanga crassior, Costæo.  
Lancuaz Javanensibus, apud quos crescit, Linsc. par. 4. Ind. Orient. cap. 39. & Tab. 18.  
Iridis genus, Clusio in Acolta.

Galangam Garzias ab Orto & Acolta proponunt: quos secuti sunt Durantes & Lugd. historia: an eadem sit cum nostra Galanga

major, Clusius dubitat.

II. Galanga, & Galanga minor officinatum, Galanga, Ruel. Brassav. Mund. Gef. car. Officin. Cæsalp.

Galanga minor, Matth. Cord. hist. Fuch. comp. Corn. (cui & Cyperus Babylonica,) Ad. Lon. Lob. Acoltæ. Lugd. Tab. Ger. Linsc. part. 4. Ind. Orient. cap. 39.

Galanga Indica, Ama.

Galanga tenuis, Costæo.

Lavandou Chinenensibus, apud quos nascitur, Linsc. lib. cap.

An Dioscorid. lib. 2. cap. 189. per Pipetis radicem intellexit?

## ZINZIBER EIUSQUE

Species.

**Z**INGIBER, cum folia Iridis & siliquam aliquatenus Xyridi similem habeat, de eo hic agendum: quod Diosc. lib. 2. cap. 190. *Σιγγύβρις*; Galeno & Oribasio *Σιγγύβεα* dicitur: Plin. lib. 12. cap. 7. *Zimpireri*, & *Zingiberi* habet.

I. Zingiber.

Zingiber & Zingiber, Herbariis.

Zingiber, cypero cognata herba, Cordo.

Acolta pingit latissimis foliis, cum tamen ei Lacrymæ Jobi folia tribuat, ut & Monardes: at Adversaria, arundinaceis foliis, & rectius Lobelius in suo Balsamo libello: hæc fecerit, ut dubius essem, diversa ne forent. Accedit, quod Autor. 6. part. hist. Ind. Orient. cap. 38. scribat, primò tenuioris arundinis speciem præ se ferre: & mox subjungit, crescere etiam velut Gladiolus: sic Svertius in suo Florilegio, foliis & flore Iridis pingit.

Zinziber flore albo facie Iridis nominans.

Radices conditæ ex India Orient. adferuntur, Monarde monente; in nova Hispania & in

Cubâ copiosè provenit, ut Joseph. Acolt. lib. 3. cap. 23. scrib.

Reperiuntur apud Aromatarios, radices albæ & rubentes: hæ rubricæ, illæ sæpè cretâ infectæ, quò à teredinibus, cui candidiores & molliores magis obnoxia, præserventur: hæ Zingiberis albi, illæ rubri nomine, ab Amato donantur.

II. Zingiber fuscum.

Zingiber intus fuscum, Cord. hist.

Mechin & Zingiber fuscum Officinis, Ad.

Zingiber fuscum, Lugd.

III. Zingiberi affinis cortice squamato.

Mechini rara varietas, Ad. Lob. ico.

Mechinum Penæ, vel Mechinum rarius, Lugd. Doronicum Arabum, Penæ.

## ZEDOARIA EIUSQUE

Species.

**Z**EDOARIA subjungitur, quia foliis & Zingiberis, sed majoribus, longioribus, & latioribus, ut & radice, & in Calecut Zingiber sylvestre dicitur, Garzia autore: à Javanensibus, apud quos in Sunda copiosè provenit, Canior nuncupatur. 4. part. Ind. Or. cap. 7. Sunt qui veterum Arnabo, & Zarnabum, & Zurumbet Arabum esse velint: recentioribus Gracis, *Zâdæa*, quam duplicem faciunt, longam & rotundam. Costus Syriacus Dioscoridis videtur.

I. Zedoaria longa.

Zedoaria & Veterum Arnabi altera species longa radice, Cord. hist.

Zedoaria radice longa, Clus. in coroll.  
 Zedoaria Officin. Zerumbeth sive Zurumbeth,  
 Avicennæ & Serapionis, Dod.  
 Zedoaria seu Costus Arabicus, Ang.  
 Zaduria sive Zadura herba, Ad.  
 Zedoaria, Bras. Lon. Lugd.  
 Zadura vel Zaduar, Gef. cat. Ruel. Fuch comp.  
 Zeduria vulgaris, Guil.  
 Zedoaria Officin. Lob. vulgò appellata, Cæs.  
 Zedoaria Arab. Zurumbeth, aroma Zingiberi  
 simile, Græcis prætermisum, Ama.  
 Zedoaria, aliquibus Costi species, Diosc. Frag.  
 II. Zedoaria rotunda.  
 Zurumbethum, Cord. hist.  
 Zedoaria Arabum, Guil.  
 Zedoaria quæ rotunda est, Clus. in coroll.  
 Zedoaria loripes, Costæo in Mesuem.  
 Zerumbeth & Zedoaria rotun. Ang. Fuch. com.  
 Zedoaria rotunda, quæ Avicennæ Antora, Lon.  
 Zerumbeth Serapionis, Lob.

Zerumbeth Javanensibus canior, Linsc. par. 4.  
 Ind. Or. fig. 20.

Hæc à priori alia ratione non differt, quam  
 forma, & ejusdem radices partes esse dicimus,  
 quemadmodum Lobelius, & hist. Lugd. figura  
 proponunt: quare utraq; indifferenter uti pos-  
 sumus, Conditur etiam Saccharo, & Zingiberi  
 præfertur.

II. Zedoaria tuberosa nigricans.  
 Zerumbeth Serapionis, Clus. in Garz. Lob.  
 (quod cum rotunda junxit,) & hist. Lugd. figura  
 Zadura & Zedoaria, Cast.

IV. Zedoaria Geiduar dicta.  
 Geiduar Avicennæ Garziæ & Lugd.  
 Gedvvar Clus. in exor. austario.  
 Zedoaria vera, Garziæ, Cæs.  
 Sambaya Malays, Geiduar Chienensibus, part.  
 4. Ind. Or. c. 8.

Hanc Veronà à Johanne Ponà insigni Phar-  
 macopœo accepimus.

## COSTUS EJUSQUE SPECIES.

**C**ostus sequitur, cum ejus species una Zingiberi similis sit, & initio Zingiberis sylvestris  
 nomine vendiderint, Adversar. autoribus monentibus.

Tā Kōsu species tres Diosc. l. i. c. 15. proposuit: Arabicum, qui albus est: Indicum, qui  
 niger & levis: Syriacum, qui gravis buxi colore. At Plin. lib. & cap. 12, duo fecit genera: ni-  
 grum, & quod melius, candidans. Theoph. 9. hist. 7. Costum solum nominat, & quidem inter ea,  
 quæ ad unguenta apta sunt. Officina, in dulcem & amarum dividunt, cum tamen Galeno  
 omnis Costus amarus sit: at Aethiæcus, Arabes secutus, Costi dulcis meminit. Verùm hæc ra-  
 dix cum recens est, nullius amaritudinis particeps est, candidiorq; persistit: cum autem vetu-  
 state corrumpi incipit, amaritudinem & nigredinem contrahit.

I. Costus Arabicus Dioscoridis.  
 Costus albus seu Arabicus, Cord. hist.  
 Costus verus, Valerando.  
 Zingiberis effigie Costus Arabicus & Syriacus:  
 non tamen genuinus costus est, Ad.  
 Costi quoddam genus, Zingiberis radicibus si-  
 mile, Clus. in Garz.  
 Costus Arabicus, Cam. in Matth.  
 Costus Arab. & Syriacus, Lugd.  
 Cyperi Indi potius, quàm Costi species, Co-  
 stæo in Mes. At Paludanus notis in 4. part. In-  
 diæ Or. c. 39. Syriacum ab Arabico distinguit,  
 quatuor sibi esse genera scribens, Indicum ni-  
 irum, Arabicum & Syriacum, cum genere  
 quarto alio, quod Zingiberi simile sit.

II. Costus Irident redolens.  
 Costus Garziæ, Acostæ. Fragoso.  
 Costus Indicus, Ama. Clus. in Garz. Tab.  
 Lugd.  
 Costus facie radices centaurij majoris, Lob.  
 Costus Lusitanicus, Cam. in Matth.  
 Costus Indicus, Malays Puchò dictus, quo no-  
 mine pingitur in 4. par. hist. Ind. Or. tab. 20.

III. Costus corticosus.  
 Costus Molucensis corticosus rugosus, Ad. Lob.  
 ico. Lugd. historia sub uno titulo & hunc, & se-  
 quentes 4. & 5. posuit.

IV. Costus lignosus.  
 Costus Molucensis lignosus fervidior, Ad. Lo-  
 bel. ico.

Costus

Costus Molucanus, Tab.

V. Costus effigie radices Solani furiosi, Ad. Lob. ico.

Costus alter peregrinus, Tab.

VI. Costus amarus Officinarum, seu Helenium, & Comagenium Discoridis.

Helenij Comagenij radix, Cord. in Diosc.

Inula Comagenia, Eid. hist.

Costus officin. Ad.

Costus amarus Pharmacop. Cam. ep. Matth.

Costus Comagenius adulterinus officin. Lob. icon.

Costus officin. amarus Costw. Lon. Cast. Tab.

Costus Officin. adulterinus, Lugd.

VII. Costus dulcis officin. centaurio magno cognatus.

Costus dulcis officin. Lon. sed adulterin. Tab.

Costi Pharmacopolarum species major, Cam.

in Matth. lit. D.

Costus dulcis, Cast.

VIII. Costus adulterinus insipidus.

Costus alter litera B. notatus, Cam. in Matth.

IX. Costus Officinarum ingratus, sive Thapliæ species.

Costi vice sæpè venditur & alia radix, per transversum in taleolas secta, crassitudine plerumque manum implens, foris fusca, intus candicans, cortice crasso, substantia rara, gustu acri admodum, & nauseosam salivam ciens, & quasi strangulans; & cum teritur, rancidam pinguedinem olens. Quare non Costus, sed Thapliæ majoris, montis Gargani radix est, quæ non sine periculo intra corpus sumitur, quam Agyrtæ corrupto nomine cum Italis Costones, quasi Costum amarum vocant. At Cæsalpino Ferulæ ejusdem radix est.

## CURCUMA.

*Kρις 1' ραχῖ Dioscoridi: Indica herba, quæ Cyperis vocatur, Zingiberis effigie, Plin. lib. 21. cap. 18.*

I. Cyperi genus ex India, Matth. Fuch. comp.

Cyperus Indicus Dioscor. & Curcuma officin. Cord. hist. Clus. corol. Lon. I. ob. Cæs. Tab.

Cyperum Indicum Brasau. & Cortæus suspiciantur.

Cyperis tertia species, vel Indus; Ama.

Curcuma longa & rotunda, Cord. hist.

Cyperis Indica, Ges. cat.

Cyperus altera, radice lutea, Cast.

Terra merita, Ruel. Ad. Lob. ico. Lugd.

Duplex est, radice communiter longa, aliquando rotunda: hæc multò acrior existit, & cum Zingibere sæpè adfertur.

II. Crocum Indicum proposuit Garzias, folijs milij majoribus: & Acofta, folijs Orchidis Serapiæ distæ majoribus latioribusque.

Croci Indici, Acoftæ nomine, cum ejusdem figura, in Lugd. hist. proponitur.

Radix Zingiberis facie intus flava, Malaïæ, Cuihet. Linscor. par. 3. Ind. Or. c. 14.

Crocus Indicus, Lusitanis Saffran da Terra, planta lilio albo similis. Linsc. par. 4. Ind. Or. c. 3. & 7. cujus figura tab. 13. exhibetur: cui & Curcuma, cap. 8.

III. Ganti radix ac Zinziber ex China, quæ Indi corpora sua fucant: part. 4. Ind. Orient. cap. 8.

IV. Tomon pute, radix Galangæ seu Curcumæ similis est, albicat, & ad illinenda corpora facit. l. c.

V. Caxumba, in Bantam Floers, quo in cibis condiendis & vestibus gossypinis tingendis utuntur; part. 4. Ind. Or. 7.



# CASPARI BAUHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER SECVNDVS. DE BULBOSIS.

## SECTIO PRIMA.

IRIS BULBOSA: IRIS TUBEROSA: SISYRIN-  
CHIUM: GLADIOLUS ET HYACINTHUS.

### IRIS BULBOSA

latifolia.

Iris bulbosa latifolia acaulos odora.  
Iris bulbosa latifolia, Clus. hisp. Dod. Lug. Cam.  
Iris bulbosa latifolia purpurea, Svvert.  
Hyacinthus poetarum latifolius, Lob.  
Flos vel purpureus, vel cæruleus: interdum  
laetæ coloris.

II. Iris bulbosa latifolia caule donata.

Hæc variat floribus colore, cæruleo, atro pur-  
purante: est & cærulea lineis & violaceis, vel  
purpureis, sic & cinerea violaceis strijs distin-  
cta, quas Svvertius pinxit, nomine  
Iridis Anglicæ majoris bulbosæ latifoliæ: quæ  
Iris bulb. Anglica fl. cæruleo, &  
Iris Anglicana major, flore violaceo, Eyst.  
Iridis bulbosæ latifoliæ flore atro purpurante.  
Iridis majoris Franciæ cæruleæ lineis violaceis  
crassioribus ornata, quæ etiam variat.

III. Iris bulbosa latifolia candida.

Iris bulbosa Anglicana major fl. candido, Eyst.  
Iris bulb. Anglic. latifolia flore albo, Svvert.

IV. Iris bulbosa folijs cepaceis maculatis  
flore purpureo inodoro.

Iris bulbosa, Dodon. Ger.

Iris bulbosa angustifolia fl. purpureo, Clus. hisp.

Iris bulbosa violaceo flore, Clus. hist.

Hyacinthus flore Iridis Theocriti & Poëta-  
rum, Lob.

Hyacinthus poeticus Lobelij Lugd.

Est & flore violaceo, interdum elegantissi-  
mi, interdum dilutioris coloris: est & atro-  
bens in summo albo; niveo flore in Pyrænis:

aliquando macula flava albo flori aspergitur,  
Clusio in append. altera monente; qui in cu-  
ris posterioribus longè majorem varietatem  
recenset, cum etiam rubro & purpurascente flo-  
re reperitur.

Huc referendæ quatuor species ex Svvertio.  
Iris bulbosa flore cæruleo, quæ Iris bulbosa an-  
gustifolia cærulea, Eystetensis.

Iris bulbosa flore atro purpurascente.

Iris bulbosa flore albo.

Iris bulbosa flore cinereo.

### IRIS BULBOSA ANGUSTI-

folia versicolor.

I. Iris bulbosa angustifolia tricolor odore  
coriandri.

Iris bulbosa angustifolia flore vario, Clus. hisp.  
Lugd.

Iris bulbosa Lusitanica, Dodon.

Hyacinthus Poëtarum Hispanicus, Lob.

Iris bulbosa flore vario, Cam. Ger.

Iris bulbosa 3. sive versicolor, Clus. hist.

Variat flore latiore & radice brevi binis ple-  
rumque floribus: altera flore angustiore radi-  
ce oblonga: utraque dilutioris aut saturatio-  
ris coloris.

II. Iris bulbosa angustifolia tricolor.

Iris bulbosa varicolor, Clus. hist. qui sub classe  
secunda species quinque floribus colore varian-  
tes proponit.

1. Trium foliorum inclinatorum labra flava  
sunt, macula aurea magna in labro reflexo in-  
signita, ad quam venæ purpurascentes excur-  
runt;



runt: at trium incumbendum dorsum & alæ pallent, latera candicant: tria erecta albicant, venis subcæruleis saturatioribus vel dilutioribus distincta.

2. Tria inflexa pallent labro flavâ maculâ notato, internè quibusdam venulis purpurascentibus distincta: tria ligulam tegentia albicant, vel Ochri colore sunt: tria surrecta exalbida, nervo flavo excurrente.

3. Flore est latiore, brevior, ternis folijs inflexis latis, & propendente labro, aurâ maculâ insignito, & alio orbe cincto, per oras crispis, cæruleis coloris, nervo extrinsecus virente, intrinsecus pallente, venis purpureis in latera excurrentibus: at tria gibba purpurea sunt, gibbo albicante, alis cæruleis: tria erecta ex cæruleo purpurascunt.

4. Tria reflexa flava sunt, maculâ aurâ in labro, à qua venæ dilutius purpurascences sparguntur: folia incumbencia exalbida, nervo pallido divisa: tria surrecta inferius cæruleo purpurascunt, venis distincta, supernè candicant.

5. Terna inflexa læte coloris, aurâ maculâ labro impressâ: folia incumbencia, & terna erecta alba, & circa ungues subcærulea.

III. Iris bulbosa vericolor ramosa.  
Iris bulbosa vericolor *παραλυστος*, Clus. hist.  
Variat binis, ternis, quaternis floribus.

### IRIS BULBOSA LUTEA *inodora.*

I. Iris bulbosa lutea inodora major.  
Iris bulbosa angustifolia luteo flore, Clus. hist. Lugd. Eystet.  
Iris bulbosa 3. luteo flore, Dod. 4. five lutea, Clus. hist.  
Hyacinthus poetarum luteus, Lob. Lugd.  
Lirum mas, aut Lirum verum Dodonæi, Lug.  
Iris bulbosa lutea, Tab. Cam. Svvet.  
Iris bulbosa flore pallido, Ger.

Invenitur latiore aliquantulum, saturatiore & magis rutilante aureo colore, radice item breviori & crassiori, vaginula sanguineo colore infecta: alia dilutioris flavi coloris, vaginula sanguineo colore carente: & aliæ adhuc differentiæ occurrunt, Clusio notante.

Huc pertinent  
Iris bulbosa pallido colore, sive luteo pallefcente, Eyst.  
Iris bulbosa lutea mixta, Eiusdem.

Iridis bulbosæ luteæ varietates quatuor, Lobelius advers. parte altera recenset.

II. Iris bulbosa lutea inodora minor.  
Iris Mauritanica, Clus. cur. post.

### IRIS BULBOSA LUTEA *vericolor.*

I. Iris bulbosa lutea vericolor major & elatior.  
Iridis bulbosæ vericoloris, vel flavivariæ classis tertiæ prima, Clus. hist.

Iris bulbosa lutea varia, Lob. ad. par. 2.

II. Iris bulbosa lutea vericolor latiflora elatior.

Iris bulbosa flava varia septima, Clus. hist.

III. Iris bulbosa lutea vericolor latiflora humilior quadruplex.

Iris bulbosa flavivaria classis tertiæ 2. 3. 4. & 8. Clus. hist.

Primæ, terna folia inflexa flava sunt maculâ aurâ insignita, purpureis venis internè distincta: folia gibba purpurascunt: hæc 2. est Clusio.

Alterius folia reflexa flava sunt cum aurâ maculâ, & qua parte gibbosis integuntur venis obsoletè purpureis distincta: tria surrecta ex cæruleo purpurascunt, nervo flavo per longum excurrente: tria incumbencia obsoleta, quibus flammei quid permixtum est: hæc 3. Clusio.

Tertiæ, folia inflexa pallida, aurâ maculâ insignita, quæ camerato folio integuntur, venis purpurascuntibus distinguuntur, folia gibba purpurascunt, tria erecta cærulea sunt: hæc 4. est Clusio.

Quartæ, folia recurva flava sunt, aurâ maculâ notata, internè purpurascuntibus radijs distincta: folia gibba purpureo cærulea, gibbo ex purpureo flavescunt: folia erecta, cærulei purpurei permixti coloris: hæc 8. est Clusio.

IV. Iris bulbosa lutea vericolor angustiflora elatior, quæ duplex est.

Iris bulbosa flavivaria classis tertiæ 5. & 6. Clus. hist.

Primæ, folia reflexa flavescunt, maculâ aurâ labro insignita, at incumbencia candicant, nervo eminentiore *αχρηστόν*: folia erecta exalbida internè subcæruleis venis distincta. Altera media est inter 2. & 3.

Huc referatur  
Iris bulbosa angustifolia lutea mixta, quæ flore est pallidè flavescente, venulis purpureis disseminatis, Eystet.

V. Iris

V. Iris bulbosa lutea verticolar angustiflora humilior triplex.  
Iris bulbosa flavovaria, classis tertiae 9. 10. & 11. Clus. hist.

Primæ folia reflexa labris sunt longioribus & pallidioribus, oris purpurascens, macula aurea longiore insignita, incumbentibus internè purpurascens: nervo carnei coloris externè ex viridi pallescentibus: & folia gibba purpurea, gibbo dilutiore: foliis surrectis purpura saturatiore nitentibus.

Alterius folia reflexa labro sunt pallescente, flava macula in radios desinente infecta: parte angustiore foris virecente, internè venis viridibus prædita: folia bifida, exalbida, gibbus pallescens: folia erecta alba, nervo circa ungum pallescente.

Tertiæ folia inflexa alba, flava macula insignita, incumbentia purpurascunt: tria erecta purpurei sive violacei coloris sunt.

VI. Iris bulbosa lutea verticolar, inter latifloram & angustifloram media.

Iris bulbosa flavovaria 12. Clus. hist.

#### IRIS BULBOSA CÆRULEA:

cæruleo varia: violacea alba.

I. Iris bulbosa angustifolia cærulea tilia: odore.

Iris bulbosa 5. sive cærulea, Clus. hist.

Iris bulbosa angustifolia odorata Eyst.

II. Iris bulbosa cærulea minor.

Iris Hispanica cæruleo purpurea, Svvert.

III. Iris bulbosa cæruleo purpurascens vario flore.

Iridis bulbosæ verticolaris 13. genus, Clus. hist.

IV. Iris bulbosa cæruleo violacea.

Iris bulbosa flore cæruleo & purpureo, Eyst.

Huc pertinent ex horto Eystetteni

Iris bulbosa variegata.

Iris bulbosa mixta.

Illi flos purpuroviolaceus, medio luteus: huic è cæruleo albicans, aureus & ex albo pallescens.

V. Iris bulbosa angustifolia violacea.

Iris bulbosa violacea Pyrænea, Lob. ad. part. 2.

Iris Anglicana violaceo flore, Eyst.

Huc referatur,

Iris bulbosa violacea colore mixto, Eyst.

VI. Iris bulbosa angustifolia alba.

Iris bulbosa alba, Lob. ad. part. alt.

Refert Clusius in altera appendice, se à Joachimo Venerio admonitum, se in Pyræneis Iridis bulbosæ varia genera observasse, & viginti sex generum descriptionem fecisse, & eisdem quæ flavum aut rubrum florem haberet, in illis montibus non reperisse: sed inter multas myriades, eam quæ cæruleum sive violaceum florem gerit, unicam plantam reperisse, quæ florem persus niveum haberet.

#### IRIS TUBEROSA.

Iris tuberosa folio anguloso.

Hermodactylus verus, Matth. Lugd. Tab. Cam. Ger.

Iris tuberosa, Dod. gal. Lugd. Lob. Eyst.

Iris bulbosa præcox, Clus. hist.

Lonchitis major, Cast.

Lonchitis prior Diosc. Aldrouando.

Satyrion, Cæsalp.

Iris tuberosa obscurè viridi colore, Svvert.

### SISYRINCHIUM.

**Σ**ισυρίγχιον Theoph. lib. 7. hist. 13. hoc peculiare habes, ut una radix, primo augeatur hyeme, tum ineunte vere, quod in imo excreverit, contrahatur, supremumq. crescat, quod mandatur. Sic quoque Plin. lib. 19. cap. 5. sisyrrichio hoc mirum, imas ejus radices crescere hyeme, verno autem tempore minui & contrahi, tum deinde bulbum pinguescere: Non solum suillo pabulo bulbosa atque carnosa radices aptitudo, sed planta hujus, rostro forma rostrata, suillo similis nominis (ut rectè doctissimus Fab. Columna) causa suis.

I. Sisyrrinchium majus flore lutea macula notato.

Sisyrrichion majus vel primum, Nofelha Hispanis, quasi nucula auellana, Clus. hisp.

Sisyrrichium majus, Dod. flore cæruleo, Svvert.

Hyacinthus Poëticus Hispanicus gemino gladiolo reticulato bulbo, Lob. observ.

Sisyrrichium Cordi & Clusij, Lob. ico.

Sisyrrinchium, bulbi esculenti genus, Lugd.

Flos coloris est cærul. luteis macul. aspersis.

II. Sisy-

II. Sisyrrinchium flore albâ maculâ notato. Sisyrrinchium Mauritanicum, Cluf. in app. 1. & cur. post.

Flos purpureæ dilutioris albâ maculâ insignitus.

III. Sisyrrinchium medium.

Sisyrrinchium minus, Dod. Cluf. hisp. Lugd. Svvert. Eyst.

Sisyrrinchion Theoph. & parva Nofelha, Lob.

IV. Sisyrrinchium minus latifolium.

Sisyrrinchium alterum latifolium. Colum.

V. Sisyrrinchium minus angustifolium flore majore variegato.

Sisyrrinchium Asprensium angustifolium alterum, Colum.

VI. Sisyrrinchium minus angustifolium.

Sisyrrinchium Theoph. Colum.

VII. Sisyrrinchium Persianum.

Flos Persicus Sisyrrinchio congener, Cluf. hist.

## GLADIOLUS.

**G**ladiolus, à foliorum forma, Dioscoridi L. 4. c. 20. *Ξιφίον & φάσγανον* dicitur: & *Gaza* apud Theoph. 7. hist. 11. & 12. *Ensem* vertit. Plin. L. 25. c. 11. & 26. c. 8. *Xiphion & Phasgation* nominat.

I. Gladiolus maximus Indicus.

Gladiolus maximus promontorii Bonæ spei flore rubro incarnato, Svvert.

II. Gladiolus major Byzantinus.

Gladiolus Byzantinus atropurpureus, Svvert.

III. Gladiolus floribus uno versu dispositis major.

Xiphion, Spatha seu Gladiolus segetalis Ruel.

Victoralis fœmina, vel Gladiolus sylvestris Cord. hist.

Victoralis rotunda & Gladiolus verus, Ges. hort.

Victoralis herba, Lon. rotunda, Eyst.

Gladiolus, Dod. Narbonensis, Lob.

Xiphion minus, Cluf. hist. pan. & rar.

Gladiolus nostras, Cam. Germanicus, Tab.

Variat magnitudine, quibusdam locis major ac procerior: alijs minor & humilior: floris colore purpuro rubente, aliquando candicante, qui

Gladiolus flore albo, Lob. adv. part. 2. & Svvert.

Gladiolus Narbon. flore incarnato & flore purpureo, Eystet.

Gladiolus carnei coloris, Svvert.

Gladiolus Hispanicus flore albo, Eystet.

Sic in Narbonensi & Germanico, flores ad unam caulis partem digesti.

IV. Gladiolus utrinque floridus.

Gladiolus, Matth. Dod. gal. (cui & Gladiolus segetalis, & Lingua cervina Apuleij) Ges. col.

Ang. Lac. Cast. Cæs. Lugd. peregrinus, Cam. Xiphion, Diosc. Ges. ap.

Gladiolus utrinque floriferus, Dod.

Gladiolus Italicus binis florum ordinibus cinctus, Lob.

Gladiolus Italicus, Tab.

Gladiolus flore pallido, Ger.

Gladiolus purpuro violaceus, Svvert.

Variat flore rubro & incarnato, qui

Gladiolus Italicus fl. rubro, Eyst.

V. Gladiolus angusto gramineo folio: in Prod. descript.

VI. Gladiolus floribus uno versu dispositis minor.

Gladiolus minimus, Lob. adv. part. 2.

VII. Gladiolus palustris.

Gladiolus lacustris aut stagnalis Dortmanni, Cluf. cur. post.

## HYACINTHUS ET EJUS Species.

**Y**'AKINΘOZ unus est Dioscoridi L. 4. c. 63. at Theoph. 6. hist. 7. duplex, *sarvus* & *sylvestris*: & ut Plin. L. 21. c. 11. *Hyacinthum sabula duplex comitatur, luctum præferens ejus quem Appollo dilexerat (Hyacinthum vocatum) aut ex Ajacis cruce edisi, ita discurren-*

*ribus venis, ut Gracarum litterarum figura A. I. inscripta legatur. Dupliciter Veteres meminere, alter Poëticus, alter Medicus est: illum, aliqui fabulosum vel Poëticum: hunc, historicum seu Medicum vocant: rursus alius Gracorum, alius Latinorum est; Gracorum esse Hemerocallida Diosc. sive Liliū rubrum Plinij; Latinorum, tridem radice tuberosa, censent; Medicorum verò ab utroque varias, de quo in praesens.*

### HYACINTHUS COMOSUS.

#### I. Hyacinthus comosus major purpureus.

Hyacinthus, Dioscoridi.

Bulbine prima, Plinij, forte alijs Pericarpus bulbosus, Ejusd.

Hyacinthus quartus & major, & Hyacinthus rubens Virgilij, Trag.

Hyacinthus, Ruel. Matth. Cord. in Diosc. Ges. cat. Port. Cast.

Hyacinthus maximus, Tur. major, Lugd. Tab.

Hyacinthus primus, Ama. Fuch. Ges. hor.

Hyacinthus caeruleus maximus, Fuch. fol.

Hyacinthus caeruleus major mas, Fuch. ico.

Hyacinthus sylvestris, Cord. hist.

Pancratium, Ges. hor. Lac.

Bulbus, Ang.

Bulbi esculenti genus, Dod. gal. Lugd.

Bulbi sylvest. primum genus, quem Pothos Theophrasti, suspicatur, Cæs.

Hyacinth. magnus, & Bulb. Vomitorius, Lon.

Hyacinthus primus Matthioli, Clus. hist.

Hyacinthus Neotericorum sive comosus spurius tertius, Dod.

Hyacinthus comosus, Diosc. Ad. major, Lob. Cam. Lugd.

Hyacinthus comosus, Ger. spurius, Eyst.

Variat: alter præcox, latiore folio, coma crassiore, majoreq; bulbo: alter serotinus, angustioris folio, coma tenuiore, laxiore tamen & elegantiore, minoreq; bulbo: Hinc apud Cam.

Hyacinthus comosus major sive serotinus & minor sive præcox, & flore communiter purpureo, vel caeruleo purpureo (rarius albo) qui Hyacinthus comosus purpureus, Svvert.

#### II. Hyacinthus comosus albus Belgicus.

Hyacinthus comosus albus, Lob. Lugd. albo flore, Clus. hist.

Hyacinthus comosus leucanthemos, Cam.

Huc referatur

Hyacinthus comosus fl. albo obsoletiore Clus. pan.

#### III. Hyacinth. comosus albus Byzantinus.

Hyacinthus comosus Byzantinus, Clus. pan. & hist. Eyst.

Flores initio candicantes, cum marcescunt fusci: vel exterius subfusco obsoleto colore, intus albicantes, ad fundum capillis nigricantibus.

#### IV. Hyacinthus comosus Hispanicus.

Hyacinthus comosus major Hispanico semine natus, Clus. pan. & hist.

#### V. Hyacinthus paniculatus caeruleus.

Hyacinthus Sannesiensis coma panniculosa, Colum.

Hyacinthus comosus ramosus nondum descriptus purpureo-violaceus, du Bry.

### HYACINTHUS RACEMOSUS.

#### I. Hyacinthus racemosus caeruleus major.

Hyacinth. botryoides caeruleus amœnus, Lob. ico.

Hyacinth. botryoid. caeruleus major, Tab. Ger.

Hyacinthus botryodes caeruleus, Clus. pan.

Hyacinthus botryoides odoratus, Cam.

Hyacinthus botryoides major, Eyst.

Hyacinthus botryoides major Hispanicus, Svvert.

#### II. Hyacinthus racemosus latif. speciosior.

Hyacinthus botryodes caeruleus, vel g. genus, Clus. pan. vel purpureus f. Eid. hist.

Hyacinthus botryoides incarnatus, Tab. Eyst.

Hyacinthus botryoides caeruleus amœnus, Ger. ico.

Flos dilutioris purpureæ etiam in caeruleum tendens.

#### III. Hyacinthus racemosus albus.

Dipadi candidis floribus, Lob. Lugd.

Hyacinthus botryoides lacteus, Clus. pan. Tab.

Ger. albo flore, Clus. hist. Eyst.

Variat floris colore lacteo, niveo, cui dilutissima purpura perfusa: est & tertius floribus ex caeruleo virefcentibus: Svvertius carneo, albo & caeruleo botryoides nomine pingit.

#### IV. Hyacinthus uvâ ramosâ major.

Hyacinthus ramosus botryoides caeruleus, Casp. Bauhini: in florilegio du Bry.

#### V. Hyacinthus uvâ ramosâ minor.

Hyacinth. botryodes ramosus, Clus. pan. vel g.

uvâ ramosâ, Eidem hist.

VI. Hyac-

VI. *Hyacinthus racemosus cæruleus minor latifolius.*

*Bulbina Plinij videtur.*

*Bulbi esculenti genus minus, Dodonæo gal. Lugd.*

*Hyacinthus cæruleus major, Fuch. Tur. Lugd. fœmina, Fuch. ico.*

*Hyacinthus 2. Fuchij, Gef. hort.*

*Hyacinthus minor, Lon.*

*Hyacinthus botryodes primus & major, Clus. pan, & hist.*

*Hyacinthus botryoides cæruleus, Eyst.*

VII. *Hyacinthus racemosus cæruleus minor juncifolius.*

*Hyacinthus primus, vel Hyacinthus vernus exiguus, Trag.*

*Allium caninum exiguum, Eidem.*

*Hyacinthus Cord. in Diosc. minor, Eidem observ.*

*Hyacinthus neotericorum primus, Dod. flor.*

*Hyacinthus racemosus, Dod.*

*Hyacinthus comosus minor, Lob. obs. Lugd.*

*Hyacinthus botryoides vulgaris, Lob. ico.*

*Hyacinthus botryoides 1. & minor, Clus. hist.*

*Hyacinthus botryoides odoratus, Cam.*

*Hyacinthus botryoides cæruleus, Ger.*

*Hyacinthus cæruleus minor, vel sextus, Tab.*

*Pancratium alterum Dodonæi, Gef. cat.*

*Bulbine flore cæruleo, Gef. hor. minor, Eid. color.*

*Bulbus sylvest. & Bulbus coronarius Theoph. Cæsalp.*

Variat floris colore cæruleo, aliis saturato, aliis dilute exalbido, dilute purpurascens; odore apud nos est pruni: at *Tragus inodorum* asserit.

VIII. *Hyacinthus racemosus moschatus.*

*Bulbus vomitorius, Matth. Cast. Lugd.*

*Muscari, Clus. hisp. & pan. Ger. Turcarum, Camer.*

*Dipadi Chalcedonicum & Italarum, Lob. Lugd.*

*Hyacinthus spurius recentiorum alter, Dod.*

*Hyacinthus botryoides Chalcedonicus moschatus, & Hyacinthus purpureus magnus peregrin. Tab.*

*Hyacinthus neotericorum alter, Lugd.*

*Muscari obsoletiore flore, Clus. hist.*

*Muscari majus obsoleto albo flore, Eyst.*

*Flos initio interdum purpurascens, aut viridis: dein ex purpura virens, aut cum viriditate albicans: nonnunquam subcæruleus: aliquando initio nigricans, sive saturate purpurascens, dein pallidus, vel flavesens; vel ab initio pallidus, postea flauus, postremo pallescens, nigricans, aut plaus; hic & niveo, & egregie rubente, & carneo reperitur; hinc quatuor figuræ apud Svvertium; & in hort. Eyst.*

*Muscari flore obsoleto albo & obsoleto nigro.*

IX. *Hyacinthus racemosus moschatus luteus.*

*Dipadi flavum, sive Muscari Constantinopolitanum, sive Chalcedonicum, Lob. ico.*

*Muscari flavo colore, Clus. hist. flavum, Ger. luteo flore, Eyst.*

*Muscari Turcarum flore luteo, Cam.*

*Hyacinthus botryoides Chalcedonicus luteus, Tab.*

Nonnunquam flore dilute purpureo, aliquando cæruleo virente reperitur; ex viridi flavescente, Clus. in ap. alt. notavit.

X. *Hyacinthus racemosus luteus præcox.*

*Tipadi lutei varietas, sive Muscari luteum præcox, Lob. ad part. 2.*

*Flores initio subcærulei, postea aurei.*

## HYACINTHUS OBLONGO go flore.

I. *Hyacinthus oblongo flore cæruleus major,*

*Hyacinthus, Dod. gal. Lugd.*

*Hyacinthus Anglicus, Ad. Ger. Eyst. & Belgicus, Lob.*

*Hyacinthus non scriptus, Hyacinthus Dioscoridis, Dod. Lugd.*

*Hyacinthus Belgicus non scriptus, Cam.*

*Hyacinth. Hispanicus, Clus. hist. addit. Svvert. flore cæruleo & albo.*

Variat floris colore ut plurimum cæruleo, cæsioue: aliquando amethystino vel violæ, nigra dilutam purpuram refert: aliquando carneo, hinc

*Hyacinthus Anglicus colore amethystino: & aliis colore violaceo, Eyst. &*

*Hyacinthus Anglicus flore incarnato, &*

*Hyacinthus Anglicus cinericeus: Item*

*Hyacinthus Hispanicus flore violaceo, & flore incarnato, Eyst.*

qui Hyacinthus carnei coloris, Svver. item floribus albicantib. aut candidis, five niveis, qui Hyacinthus Belgicus candidus, Lob. Hyacinthus non scriptus flore candido, Dod. Hyacinthus albus Anglicus, Tab. Ger. Hyacinthus Hispanicus flore albo, Svvert.

II. Hyacinthus oblongo flore fusco.

*Hyacinthus Mauritanicus*, Clus. hist. ap. 1. & cur. post.

**Hyacinthus Mauritonicus Clusij**, cui flores vicini plures obsoleti, & fusci, Lob. ad. part. 2.

III. *Hyacinthus obsoleto flore.*

Hyacinthus obsoletior Hispanicus, Clus. pan.  
obsoleti coloris Hispanicus serotinus, Eid. hist.  
Hyacinthus Hispanicus obsoleto flore, Cam.  
Hyacinthus obsoletior Hispanicus semine  
compresso Pancratij Monspel. maritimi, Lob.  
ad. par. 2.

*Hyacinthus serotinus maximus*, Eyst.

Variat floris colore ex purpureo pallido & virescente mixto: sic ex albo cinerei, & ex albicante virescente, Clus. ap. alt.

*Hyacinthus obsoletus* Clusij, flore obsoleto viridi, Svvert.

Sic eorum color valdè obsoletè spadiceus est, qualis plerumque cervis esse solet.

IV. *Hyacinthus obsoletus* flore alter.

*Hyacinthus serotinus* obsoleto colore. Eyst.

V. *Hyacinthus ferotinus albicans*.

*Hyacinthus serotinus* facie Orientalis, Eyst.

VI, *Hyacinthus oblongo flore flauo viridi*.  
*Hyacinthus obsoletus Æthiopicus* Clus. cur.  
 post.

VII. *Hyacinthus oblongo flavo flore.*

Hic cum tertio convenit, nisi quod minor, & flos ex sex foliolis luteis, aliquando candicantibus compositus est, in cujus medio staminula bina pallida conspiciuntur: in Gallia Narbonensi in summitate pontis Gari reperitur.

VIII. *Hyacinthus oblongo caruleo flore minor.*

*Hyacinthus minor* Hispan. Clus. hist. ap. 2. &  
cur. post.

Varia flore caeruleo, albo, interdum mixto, dilute suaviterque rubente, ( qui *Hyacinthus flosrubro* ex Lusitania, Lob. ad. par. 2. ) venis saturatioribus per foliolorum externorum longitudinem excurrentibus.

IX. *Hyacinthus floribus campanulæ uno versu dispositis.*

Hyacinthus totus albus, Campanilla, Lob. ad.  
par. 2. ex Lusitania.

X. Hyacinthus floribus campanulæ utrinque dispositis.

Hyacinthus Neapolitanus, Svvert.

HYACINTHUS ORIENTALIS.

I. Hyacinthus Orientalis caule maculato.

Hyacinthus Dioscorid. & Theoph. Ang.  
Hyacinthus Orient. Matth. Gesner. hor. Dod.  
(cui & minor) Cast. Lugd. Clus. hist. Rauv.  
cæruleus, Tab. Gr. Eyll.

Hyacinth. Orientalis Græcus, Ad. Lob. Lugd.  
Hyacinthus Constantinopolitanus, Cam.  
Hyacinthus, Cæsalp.

II. *Hyacinthus Orientalis purpureus*.

*Hyacinthus Orientalis purpurorubens*, Lob.  
ico. flore purpureo, Cam.

Variat flore purpureo, purpurorubente: & Syvertius.

Hyacinthum Orient. ferotin. flore purpureo  
pingit: & huc referendus.

Hyacinthus fl. purpureo albo, Eyst.

III. *Hyacinthus Orientalis exalbidus*.

Flores antequam aperiuntur albi, aperti or-  
stantum albas habent, reliqua partecarnei  
sunt, senescentes toti nivei sunt, Clus. hist.

Est & aliter floribus ex cinereo albis, folijs paulo angustioribus & crassioribus, qui Hyacinthus Orien. fl. cinereo albus, Eyst.

IV. Hyacinthus Orientalis albus primus.  
Hyacinthus Or. albus, Lob. ico. & Clus. hist.  
Flore niveo, Eyst.

flore albicante, & flore albo, Svvert.

**Hyacinthus Constantinopolitanus albo flore,**  
Cam.

Flore albicante & flore albo, Svvert. qui etiam  
Hyacinthum facie Orientalis, flore cæruleo  
& flore albo, &



Hyacinthus Orient. major, Dod. polyanthos, Ad. Lob. Tab. Lugd.

Hyacinthus Orientalis polyanthos, Clus. hist. Ger.

Hyacinthus Orient. præcox multiflorus cæruleus, Svvert.

Hyacinthus Orient. major, flore cæruleo, & alter violaceo colore, Eyst.

Flores sæpè 40. producit.

VII. Hyacinthus præcox albus.

Hyacinthus præcox flore albo Caccini, Clus. cur. post.

VIII. Hyacinthus Orientalis latifolius.

Hyacinthus Orient. *πολυφύλλος* alter, Clus. hist.

IX. Hyacinthus Orientalis variegatus phœniceis caliculis subtus rubentibus: vel floribus antèrùs albescens, aversâ parte purpurascens.

Hyacinthus Orientalis variegatus, &

Hyacinthus Orientalis mixtus, Eyst.

V. Hyacinthus maximus polyanthos.

Hyacinthus Jacobæus altus multis floribus Italicus, Svvert.

XI. Hyacinthus Orientalis ramifolius.

Hyacinthus Orientalis *πολυκλάδης*, Clus. hist.

XII. Hyacinthus Orient. florum folijs reflexis & variegatis.

Hyacinthus Orient. reflexis folijs, colore violaceo, &

Hyacinthus Orient. viol. colore a'bis lineis, Eyst.

Flores purpuroviolacei, lineis albicantibus dorsalibus distincti: vel lætè purpurei & janthini, virgulis obscurioribus signati.

XIII. Hyacinthus Orientalis, caule folioso. Hyacinthus Asiaticus *πολλόκαυλον* caule, Clus. cur. post.

Hyacinthus caule folioso, Svvert.

XIV. Hyacinthus Arabicus, Camerarij, quid?

XV. Hyacinthus exoticus flore phalangij. Hyacinthus circa Alepum Ayur dictus, Ravvolff.

Hyacinthus Tripolitanus, Cam. ad. Matth.

### *Hyacinthus Orientalis serotinus.*

I. Hyacinthus Orientalis serotinus.

Hyacinthus Orient. serotinus mixtus, Eyst.

Florum apices albescunt, qua pediculis adhærent, rubellunt.

II. Hyacinthus Orient. serotinus floribus erectis candidis, vel cæruleis.

Hyacinthus Orientalis serotin. erectis candidis floribus, &

Hyacinth. Orient. serot. erectis cæruleis floribus, Eyst.

III. Hyacinthus Orient. serotinus striatus. Hyacinthus minimus serotinus facie Orientalis hyacinthi, Lob. ad. par. 2. ap.

an Hyacinthus serotinus minimus cæruleus, Clus. hist. ap. 2.

Flos ex cæruleo dilutus, senis venis cæruleis striatus.

### *Hyacinthus Orientalis flore pleno.*

I. Hyacinthus Orientalis flore duplici.

Hyacinthus flore duplici ex albo virescente, Clus. cur. post.

Hyacinthus Orientalis pleno flore subviridi, Svvert.

Hyacinthus Orient. fl. duplici, Eyst.

Flores gerit insitos duplices: ex albo virescentes, vel cæruleos, ad pediculum parum virentes.

II. Hyacinthus Orient. fl. cæruleo pleno: & Eyst.

III. Hyacinthus Orient. albus multiplici flore.

Hyacinthus candidissimus pleno flore, Eyst.

### HYACINTHUS STELLARIS.

I. Hyacinthus stellaris bifolius Germanicus.

Narcissus Martius, Brunf.

Narcissus cæruleus & Hyacinthus alius, Trag.

Hyacinthus cæruleus minor mas, Fuch. ico.

Hyacinthus albicans seu scemina, Fuch. Tur. Lugd.

Hyacinthi Germanici liliflori minor species, Lob. ob.

Satyrium trifolium, Dod. gal.

Bulbus syl. quidam bifolius, Gef. hon. &

Hyacinthus, seu Bulbus syl. Eid. col.

Bulbus vomitorius, Lon.

an Hyacinthus bifolius Theoph. Lob. ico.

Flore est cæruleo, in alijs colore magis saturo, alijs magis diluto, rarius ad carneum vergente, suaviter rubente: est etiam exalbido, & veluti cinereo, subcæruleo de flore: sunt qui & flavos notant.

II. *Hyacinthus stellaris trifolius*.  
*Satyrion erythronium*, Dod.gal.  
*Hyacinth. cæruleus minor*, Tur. minor fœmina, Fuch. ico.  
*Hyacinth. cæruleus mas minor*, Fuch. Lugd.  
*Hyacinthus Fuchsij*, Dod. medius, Lon.  
*Hyacinth. Germanicus liliflorus*, Ad. stellaris, vel flos Martius stellatus Germanicus, Lob.  
*Hyacinthus stellarus*, Clus. hist. flore cæruleo, Cam. Eyst.  
*Hyacinthi alterum genus*, Cæf.  
 Priore per omnia major & triphyllus, qui ramentum voluit, eundem dicat.  
 III. *Hyacinthus stellaris albus*.  
*Narcissus candidus*, Trag.  
*Hyacinthus niveus*, Fuch. floribus candidis, Dodon.  
*Hyacinth. diphyllos Fuchsij floribus candidis & purpureis*, Cord. obs.  
*Hyacinthus stellaris albicans serotinus*, Lob. Lugdun.  
*Hyacinthus albicans Botanicorum*, Lob. ad. part. 2.  
*Hyacinthus stellatus flore albo*, Cam.  
*Bulbus vomitorius albo flore*, Lon.  
 IV. *Hyacinthus stellatus cæruleus staminulis ex viridi luteis*.  
*Hyacinthus stellatus Italicus*, Eyst.  
 V. *Hyacinthus stellaris purpureus*.  
*Hyacinthus stellaris major*, Lob. ad. par. 2.  
 VI. *Hyacinthus stellaris spicatus cinereus*.  
*Hyacinthus stellatus cineracei coloris*, Clus. hist. &  
*Hyacinthus stellatus æstivus*, Eid. cur. post.  
*Hyacinthus stellatus Byzantinus sive exoticus Someri*, latè depressè spicà fastigiatus, Lob. ad. part. 2.  
*an Hyacinthus stellatus cinereus ex Gallica*, Eidem.  
 VII. *Hyacinthus stellaris cæruleus amœnus*.  
*Hyacinth. stellaris Byzantinus alter elegantissimus serotinus bullatus*, Lob. ad. par. 2.  
*Hyacinthus latifolius Dalechampij*, Lugdun. icon.  
*Hyacinthus peregrinus pluribus caulibus præditus, cæruleo violaceus*, Svvert.  
 Variat magnitudine & floris colore amœno cæruleo, dilutè cæruleo, quandoque ex cæ-

ruleo purpurascente, vel violaceo : rarissimè albo.

VIII. *Hyacinth. stellaris obsoletè cæruleus*, vel major.

*Hyacinthus stellarus Byzantinus*, Clus. hist. & Eyst.

*Hyacinthus stellatus Byzant. tenuifolius præcox*, Lob. ad. part. 2.

Huc referendus  
*Hyacinthus Byzantinus flore cæruleo lacteo*, Svvert.

IX *Hyacinthus stellaris cæruleus striatus*.

*Hyacinthus stellatus Poreti*, Clus. cur. post.

X. *Hyacinth. stellaris saturè cæruleus*.

*Hyacinthus Hispanicus stellaris flore*, Clus. cur. post.

XI. *Hyacinthus stellaris æstivus cæruleo purpurascens major*.

*Hyacinthus stellatus æstivus*, Clus. hist. ap. altera.

Flores sunt subcærulei dilutiores : sic albi, staminibus purpurascens.

XII. *Hyacinthus stellaris æstivus minor flosculis alternatim sitis*.

*Hyacinthus stellatus æstivus minor*, Clus. in aust. ap. alt. & cur. post.

XIII. *Hyacinthus stellaris folijs & radice lilij*.

*Hyacinthus stellaris lilifolius*, Lobel. Lugd. Ger.

*Hyacinthus liliaceus*, vel septimus, Tab.

*Hyacinth. stellat. angustifolius*, Clus. hist. & ap. alt. ejusdemq; austario & cur. post.

*Hyacinthus lilifolius flore cæruleo pallido*, Svvert.

Flores intensè cærulei, sive violacei, rarius nivei.

XIV. *Hyacinthus stellaris autumnalis major*.

*Hyacinthus autumnalis major*, Ad. Clus. hisp.

& hist. Lob. Dod. Lugd. (cui & *Typhium Theophrasti*) Ger.

*Hyacinthus stellatus autumnalis angustifolius major*, Eyst.

Aliquando cauliculis est ramosis, & Svvertius exhibet

*Hyacinthum autumnalem albo flore*.  
*Hyacinthum flore purpureo pallido*.

XV. *Hyac-*

XV. *Hyacinthus stellaris autumnalis minor.*

*Hyacinthus autumnalis*, Gef. hor. Ad. Clus. hisp. Lob. Lugd. Ger.

*Hyacinthus autumnalis minor*, Dod. Clus. hist. Eyst.

*Bulbus æstivus Dalech.* Lugd.

Flos cæruleus, purpuræ dilutioris, ex purpura rubens.

XVI. *Hyacinthus stellaris minimus.*

*Hyacinthus stellaris vernus pumilus*, Lob. ad. par. 2. Eyst.

XVII. *Hyacinthus minimus maritimus* in Prod. descript.

In Florilegio Svvertij adhuc pinguntur sex diversi *Hyacinthi*;

*Hyacinthus stellaris albus*: 2. cæruleus: 3. ex cæruleo violaceus: 4. carnei coloris: 5. luridus: 6. stellatus major, azureus, hicque elegantissimus existit.

### HYACINTHUS INDICUS.

I. *Hyacinthus Indicus bulbosus stellatus.*

*Hyacinthus stellatus Peruanus*, Clus. hist. Lob. ad. par. 2. Eyst.

*Hyacinthus Peruanus*, Robino; flore cæruleo multiflorus, Svvertio.

*Hyacinthus stellatus Boëticus*, Clus. cur. post.

Variat colore floris, qui nunc è cæruleo purpureus, modò saturationis purpuræ & quasi

violaceus, umbone purpureo, staminulis cæruleis: vel ex albo rubicante, umbone & staminulis albis, quem nomine *Hyacinthi Peruani carnei coloris*, Svvertius pinxit.

II. *Hyacinthus Indicus bulbosus minor.*

*Hyacinthus Indicus minor Orientalis*, Svvert.

III. *Hyacinthus Indicus tuberosus flore Hyacinthi Orientalis.*

*Bulbus Indicus flore albo Hyacinthi Orientalis æmulo*, Paludano.

*Hyacinthus Orientalis Indicus*, Simoni Tour.

*Hyacinthus Indicus tuber. radice*, Clus. hist. Lob. ad. par. 2.

*Hyacinthus minor Indicus tuber. radice albus*, Svvert.

IV. *Hyacinthus Indicus tuberosus flore Narcissi.*

*Hyacinthus Indicus tuberosa radice*, Robino.

*Hyacinthus major Indicus tuberof. radice*, Svvert.

### HYACINTHUS COLCHICI folio.

I. *Hyacinthus latifolius maximus.*

*Hyacinthus Ind. Orient. dictus*, adhuc incognitus, Svvert.

II. *Hyacinthus latifolius alter.*

*Hyacinthus Africanus bulbo crasso facie Hyacinthi Peruani*, Svvert.

## BULBUS ERIOPHORUS

### BULBUS CRINITUS ET FLOS.

Tigridis.

**B**ULBUS ERIOPHOS, id est, Laniferi, inter veteres Theopb. 7. hist. 13. meminit, illum in lustroribus nasci, lanamq; sub primis tunicis habere, ex qua roge & alia vestes conficiantur: cujus & Plin. lib. 9. cap. 11. meminit, Theophrasti testimonio usus.

I. *Bulbus eriophorus Peruanus.*

*Eriophorus Peruanus*, Clus. hist.

Magnam cum *Hyacintho Indico bulboso* stellato affinitatem habet, hujus tamen folia duplo latiora: flos purpureus, circa umbili-

cum cæruleus; vena atropurpurea floris folium percurrente,

II. *Bulbus eriophorus Orientalis.*

*Bulbus eriophorus*, Clus. pan. & hist. Lob. Dod. Cam. Lugd. Tab.

**Bulbus**

II. *Hyacinthus stellaris trifolius*.  
*Satyrion erythronium*, Dod.gal.  
*Hyacinth. cæruleus minor*, Tur. minor *fœmina*, Fuch.ico.  
*Hyacinth. cæruleus mas minor*, Fuch. Lugd.  
*Hyacinthus Fuchsi*, Dod.medius, Lon.  
*Hyacinth. Germanicus liliiflorus*, Ad. *stellaris*, vel *flos Martius stellatus Germanicus*, Lob.  
*Hyacinthus stellatus*, Clus. hist. flore cæruleo, Cam.Eyft.  
*Hyacinthi alterum genus*, Cæf.  
 Priore per omnia major & triphyllus, qui ramentum voluit, eundem dicat.  
 III. *Hyacinthus stellaris albus*.  
*Narcissus candidus*, Trag.  
*Hyacinthus niveus*, Fuch. floribus candidis, Dodon.  
*Hyacinth. diphyllos Fuchsi* floribus candidis & purpureis, Cord. obf.  
*Hyacinthus stellaris albicans fetorinus*, Lob. Lugdun.  
*Hyacinthus albicans Botanicorum*, Lob. ad. part. 2.  
*Hyacinthus stellatus flore albo*, Cam.  
*Bulbus vomitorius albo flore*, Lon.  
 IV. *Hyacinthus stellatus cæruleus staminulis ex viridibus luteis*.  
*Hyacinthus stellaris Italicus*, Eyft.  
 V. *Hyacinthus stellaris purpureus*.  
*Hyacinthus stellaris major*, Lob. ad. par. 2.  
 VI. *Hyacinthus stellaris spicatus cinereus*.  
*Hyacinthus stellatus cineracei coloris*, Clus. hist. &  
*Hyacinthus stellatus æstivus*, Eid. cur. post.  
*Hyacinthus stellatus Byzantinus sive exoticus Someri*, latè depressa spica fastigiatus, Lob. ad. part. 2.  
 an *Hyacinthus stellatus cinereus ex Gallica*, Eidem.  
 VII. *Hyacinthus stellaris cæruleus amœnus*.  
*Hyacinth. stellaris Byzantinus alter elegantissimus fetorinus bullatus*, Lob. ad. par. 2.  
*Hyacinthus latifolius Dalechampij*, Lugdun. icon.  
*Hyacinthus peregrinus pluribus caulibus præditus, cæruleo violaceus*, Svvert.  
 Variat magnitudine & floris colore amœno cæruleo, dilute cæruleo, quandoque ex cæ-

ruleo purpurascente, vel violaceo; rarissime albo.

VIII. *Hyacinth. stellaris obsoletè cæruleus*, vel major.

*Hyacinthus stellatus Byzantinus*, Clus. hist. & Eyft.

*Hyacinthus stellatus Byzant. tenuifolius præcox*, Lob. ad. part. 2.

Huc referendus

*Hyacinthus Byzantinus flore cæruleo lacteo*, Svvert.

IX *Hyacinthus stellaris cæruleus striatus*.

*Hyacinthus stellatus Poreti*, Clus. cur. post.

X. *Hyacinth. stellaris saturè cæruleus*.

*Hyacinthus Hispanicus stellaris flore*, Clus. cur. post.

XI. *Hyacinthus stellaris æstivus cæruleo purpurascens major*.

*Hyacinthus stellatus æstivus*, Clus. hist. ap. altera.

Flores sunt subcærulei dilutiores: sic albi, staminibus purpurascens.

XII. *Hyacinthus stellaris æstivus minor flosculis alternatim sitis*.

*Hyacinthus stellatus æstivus minor*, Clus. in auct. ap. alt. & cur. post.

XIII. *Hyacinthus stellaris folijs & radice lilij*.

*Hyacinthus stellaris lilifolius*, Lobel. Lugd. Ger.

*Hyacinthus liliaceus*, vel *septimus*, Tab.

*Hyacinth. stellat. aquigum*, Clus. hist. & ap. alt. ejusdemq; auctario & cur. post.

*Hyacinthus lilifolius flore cæruleo pallido*, Svvert.

Flores intensè cærulei, sive violacei, rarius nivei.

XIV. *Hyacinthus stellaris autumnalis major*.

*Hyacinthus autumnalis major*, Ad. Clus. hisp.

& hist. Lob. Dod. Lugd. (cui & *Typhium Theophrasti*) Get.

*Hyacinthus stellatus autumnalis angustifolius major*, Eyft.

Aliquando cauliculis est ramosis, & Svvertius exhibet

*Hyacinthum autumnalem albo flore*.

*Hyacinthum flore purpureo pallido*.

XV. *Hy-*

XV. *Hyacinthus stellaris autumnalis minor.*

*Hyacinthus autumnalis*, Gef. hor. Ad. Clus. hisp. Lob. Lugd. Ger.

*Hyacinthus autumnalis minor*, Dod. Clus. hist. Eyst.

*Bulbus æstivus Dalech.* Lugd.

Flos cæruleus, purpuræ dilutionis, ex purpura rubens.

XVI. *Hyacinthus stellaris minimus.*

*Hyacinthus stellaris vernus pumilus*, Lob. ad. par. 2. Eyst.

XVII. *Hyacinthus minimus maritimus* in Prod. descript.

In Florilegio Svvertij adhuc pinguntur sex diversi *Hyacinthi*;

*Hyacinthus stellaris albus*: 2. cæruleus: 3. ex cæruleo violaceus: 4. carnei coloris: 5. luteus: 6. stellatus major, azureus, hieque elegantissimus existit.

## HYACINTHUS INDICUS.

I. *Hyacinthus Indicus bulbosus stellatus.*

*Hyacinthus stellatus Peruanus*, Clus. hist. Lob. ad. par. 2. Eyst.

*Hyacinthus Peruanus*, Robino; flore cæruleo multiflorus, Svvertio.

*Hyacinthus stellatus Boëticus*, Clus. cur. post.

Variat colore floris, qui nunc è cæruleo purpureus, modò saturationis purpuræ & quasi

violaceus, umbone purpureo, flaminulis cæruleis: vel ex albo rubicante, umbone & flaminulis albis, quem nomine *Hyacinthi Peruani carnei coloris*, Svvertius pinxit.

II. *Hyacinthus Indicus bulbosus minor.*  
*Hyacinthus Indicus minor Orientalis*, Svvert.

III. *Hyacinthus Indicus tuberosus flore Hyacinthi Orientalis.*

*Bulbus Indicus flore albo Hyacinthi Orientalis æmulo*, Paludano.

*Hyacinthus Orientalis Indicus*, Simoni Tour.

*Hyacinthus Indicus tuber. radice*, Clus. hist. Lob. ad. par. 2.

*Hyacinthus minor Indicus tuber. radice albus*, Svvert.

IV. *Hyacinthus Indicus tuberosus flore Narcissi.*

*Hyacinthus Indicus tuberosa radice*, Robino.

*Hyacinthus major Indicus tuberosa radice*, Svvert.

## HYACINTHUS COLCHICI folio.

I. *Hyacinthus latifolius maximus.*

*Hyacinthus Ind. Orient. dictus*, adhuc incognitus, Svvert.

II. *Hyacinthus latifolius ater.*

*Hyacinthus Africanus bulbo crasso facie Hyacinthi Peruani*, Svvert.

## BULBUS ERIOPHORUS

### BULBUS CRINITUS ET FLOS.

*Tigridis.*

**B**ULBUS ERIOPHOS, id est, laniferi, inter veteres Theoph. 7. hist. 13. meminit, illum in litoribus nasci, lanarumq; sub primis tunicis habere, ex qua toga & alia vestes conficiantur: cujus & Plin. lib. 9. cap. 11. meminit, Theophrasti testimonio usus.

I. *Bulbus eriophorus Peruanus.*

*Eriophorus Peruanus*, Clus. hist.

Magnam cum *Hyacintho Indico bulboso* stellato affinitatem habet, hujus tamen folia duplo latiora: flos purpureus, circa umbili-

um cæruleus, vena atropurpurea floris folium percurrente,

II. *Bulbus eriophorus Orientalis.*

*Bulbus eriophorus*, Clus. pan. & hist. Lob. Dod. Cam. Lugd. Tab.

*Bulbus*

Bulbus lanatus ex Oriente, Cæs.

Cum Dodonæus in florum historia fictitiam figuram posuerit, idcirco eandem figuram sub nomine

Eriophori bulbi commentitij, posuere Lobel. Lugd. at Cæs.

Bulbi eriophori, & Tab. sub Eriophori bulbi altera icone.

Ipse vero Dodonæus edit. postrema, utramque figuram habet; alteram titulo Bulbi eriophori icona amico missa; alteram, Bulbi eriophori Viennæ nati effigies.


III. Bulbus eriphorus minor.

Hyacintho obsoleto Æthiopico, subjecit Clus. cur. post.

IV. Bulbus marinus crinitus, *τοξιδας*, in hist. Lugd. proponitur; quid sit, ignoramus.

V. Tigridis flos. Dod. Lub. Lugd. Tab. Oculo Xochiel, id est, flos Tigridis, novæ Hisp. live Mexicane Provincie, in hist. Mexicana.

Radice habet porraceam, folia gladioli, flos rubet egregie, circa medium tamen albus, & instar pellis Tigridis maculatus: hujus veram figuram in florilegio I. du Bry videre est.



## SECTIO SECUNDA.

# NARCISSUS: LEUCOIUM: LILIO- NARCISSVS SIVE TVLIPA.

## NARCISSUS ET EJUS SPECIES.

**N**ΑΡΚΙΣΣΟΣ καὶ λεύκων Dioscoridi l. 4. c. 161. & Theoph. 6. hist. 6. & 7. ejusdem 12. dicitur, non à Narcisso adolescente nimum seipsum adamante, ut Poëta fabulantur, sed à vi stupefaciendi, quam νάρκωσις Græci vocant: seu ut Plinius, à narce, quam vim Narcisso inesse l. 21. c. 19. testatur: hinc Plutarcho in Symposio, quasi nervos hebesans & torpidas gravitates efficiens dicitur.

Unius Theophrastus meminit: at Dioscorides in flore differentiam notat, qui albus sit, intus croceus, in quibusdam purpureus, ita ut alius sit μετρωδης, alius κερκωδης, Et Plinio l. 21. c. 5. Narcissus alter flore candido, calyce purpureo: alter calyce herbaceo: per calycem intelligens quod in floris medio est, nullius Græci auctoris exemplo: & seq. c. 19. Narcissum unum purpureo flore, & alterum, herbaceum dixit.

**NARCISSUS PORRACEO FOLIO,**  
angusto calyce, latifolius simplex,  
uno flore.

I. Narcissus maximus pallidus folijs incanis.

Narcissus omn. maximus pallidus ad Clus. cur. post.

II. Narcissus maximus flore cæruleo albicante simbria croco aurea.

Narcissus maximus mediopurpureus, aut cæruleus latifolius Hispanicus, Eyft.

III. Narcissus albus magno odore flore circulo pallido.

Narcissus 13. medioluteus Poëricus, Tab.

Narcissus mediopurpureus, Gerico.

Narcissus latifolius 7. Clus. hist.

IV. Narcissus niveus odoratus circulo rubello.

Narcissus serotinus montanus, Clus. pan.

Narcissus latifolius 6. Clus. hist.

Narcissus mediocrubens communis, Svvert.

V. Narcissus albus circulo purpureo.

Narcissus purpureus, Gef. hor.

Narcissus mediopurpureus, Dod. Lugd. Clus. pan. Eyft.

Narcissus mediocrubens purpureus, Ad.

Nar-



Narcissus Poëticus mediopurpureus, Lob.  
Narcissus, Cast. primus circulo rubeo, Cæs.  
Narcissus 14. & Poëticus 1. Tab.  
Narcissus mediopurpureus præcox, Ger.

Unum fert florem, rard binos: & huic similem, circulo tamen rubro, in Pannonicis Clusius proponit,

Narcissum ferotinum montanum vocans.  
Narciss. medio rubeus communis, Svvert.

VI. Narciss. alb. circulo croceo vel luteo.  
Narciss. Veterum, Trag. Candidus, Lon.  
Narcissus primus, Dod. gal. Cæs.  
Narcissus Italicus flore candido, & Narcissus alb. Ges. hor.

Anemone limonia Theophrast. Narcisso cognata, Eid.

Narciss. Poët. mediotroceus, Lob.

Narcissus Poëticus medioluteus Dodonæi, Lugd.

Narcissus 10. roseoluteus major, Tab.

Narciss. medio purpureus præcox, Ger. ico.

Narcissus ferotinus, Svvert.

Hic à priori potissimum circuli colore differt, & Narcissus Dioscoridis videtur.

Hujus generis tres reperiuntur, forma, colore, aut odore nequaquam, & magnitudine parum, sed florendi tempore, differentes: majores, medijs, præcoces: & serius prodeuntes, minores sunt.

VII. Narcissus albus circulo croceo minor.  
Narcissus minor ferotinus mediotroceus, Lobel. ico.

Narciss. 16. ferotinus albus, Tab. minor, ferotinus, Ger.

VIII. Narcissus flore cæruleo, Clus. pan.  
Narciss. cæruleus, solo floris colore à Narcisso medio croceo differens, Lob. ad. part. 2.

### NARCISSUS EXOTICUS.

I. Narcissus Indicus totus ruber.

Narciss. latifolius octavus, qui & Indicus rubro flore, vulgo Jacobæus, Robi. Clus. hist.

Narcissus Indicus rubro flore, Lob. ad. part. 2.

Narciss. Ind. flore sanguineo, Svvert.

Ex India Orientali adfertur.

II. Narcissus ex albo rubescens.

Narciss. Gareti, flore albo exteriori parte rubicundo Svvert.

III. Narciss. Ind. obtuso latif. folio, bulbo vastissimo.

Narcissus Indicus Orient. bulbo magno & compressiore rotundo, folijs Narcissi, Svvert.

IV. Narciss. Ind. obtuso latissimo folio alter.  
Narcissus Indicus Occident. folijs Narcissi latifolij, Svvert.

V. Narciss. Ind. lato & multiplici folio.  
Narcissus promontorij Bonæ spei bulbo oblongo, Svvert.

VI. Narcissus Africanus folijs bifolij.  
Narcissus Africanus five Narciss. exoticus, Lobel. ad part. 2.

Variat folio acutiore, rotundiore, & complicato; flore est phœniceo.

NARCISSUS LATIFOLIUS SIMPLEX pluribus floribus.

*Narcissus totus albus.*

I. Narcissus albus major odoratus.

Narcissus latifolius major, in latifoliorum classe alter, Clus. hist.

Communiter binos, interdum ternos & quaternos flores, & sex folijs, imò ex duodecim constantes, Clusius notavit.

II. Narcissus Orientalis major albus.  
Narcissus Orientalis major polyanthos totus albus, Eyst.

Est latifolius, floribus copiosis albis peramplis, odoratus, tribus staminibus luteis brevibus donatis.

III. Narcissus Orientalis medius albus.  
Narcissus Orient. medius totus albus polyanthos, Eyst.

A priori sola magnitudine differt.

IV. Narcissus Orient. albus calice stellato.  
Narcissus Orient. albus odoratus calice stellato, Eyst.

Floribus est albis odoratis, in medio stamina auro-lutea instar stellæ radiatim disposita.

V. Narcissus totus albus major.  
Narcissus totus albus, Dod. Lob. & Lugd.  
Narcissus totus albus prior, Clus. hisp.  
Narcissus latifolius simplici flore prorsus albo, Eid. hist.

Narciss. albus major, Cam. quintus albus, Tab.  
Narcissus Orient. polyanthos minor totus albus, Eyst.

Narciss. medioluteus polyanthos, Ger. ico.

VI. Narcissus totus albus major.  
Narcissus totus albus alter, Clus. hisp.  
Narcissus latifolius niveus alter, Eid. hist. defer.

Narcissus totus albus paucioribus floribus, Lob.ob.

Narcissus albus minor, Cam.

VII. Narcissus niveus.

Narcissus latifolius niveus tertius, Clus.hist.

VIII. Narcissus albus flore minore Jasmini odore.

Narciss. latifol. niveus tertius alter, Clus.hisp.

*Narcissus medioluteus.*

I. Narcissus orientalis albus calice luteo Campanulæ simili maximus.

Narciss. polyanthos orient. calice medioluteo odoratus maximus, Eyst.

Hujus, ut & duorum sequentium calix, campanulæ instar amplius luteus: flores jucundum odorem spirant.

II. Narcissus orientalis albus calice luteo medius.

Narciss. polyanthos orient. medioluteus odoratus medius, Eyst.

III. Narciss. orient. albus calice luteo minor. Narciss. polyanthos orient. medioluteus minor odoratus, Eyst.

IV. Narcissus orient. calice aureo pluribus foliolis pleno.

Narcissus orientalis mediocroceus calice pleno, Eyst.

Flos albus, calice aureo pluribus tortilibus foliolis pleno.

V. Narcissus Orient. calice rotundo auro-luteo.

Narciss. orient. mediocroceus major, Eyst.

VI. Narcissus pallidus mediocroceus.

Narciss. medioluteus Pisanus, Lob.ico. Svvert.

Narcissus latifolius flore prorsus albo secundus, Clus.hist.

VII. Narcissus pallidus medioaureus.

Narcissus sulphurei coloris minor, ad Clus. cur. post.

VIII. Narcissus albus circulo croceo polyanthos.

Narcissus. Matth. comp. octavus, edit. Ital.

Narcissus mediocroceus serotinus polyanthos, Lob. ico.

Narciss. quart. Matthioli, Lugdun.

Narcissus 15. niveus serotinus, Tab. totus albus, Ger.ico.

Narcissus, Castori; quem quinto simplici flore junxit.

Hic etiam circulo purpureo reperitur, qui Narcissus mediopurpureus, Eyst.

IX. Narcissus pallidus circulo luteo.

Narcissus medioluteus, Dod. Lugd. Ger. Svvert. Eystett.

Narcissus albidus medioluteus, Lob.

Narcissus 6. medioluteus 1. Taber.

Narcissus latifolius flore prorsus flavo, Clus. hist. icon.

X. Narcissus pallidus circulo aureo alter.

Narcissus latifolius 5. vel Narcissus pallido flore medioaureus, Clus. hist.

Meminit Clusius & alterius, cujus flos ex pallido virefcit, calice angusto flavo.

XI. Narcissus medioluteus copioso flore odore gravi.

Narcissus octavus fortè Matth.

Narcissus medioluteus, Ad. Lob. (cui & Donas Narbonensem) Clus. hisp. Svvert. medioluteus alter, Dod. Lugd.

Narcissus præcox simpl. flore, vel latifolius simplex 1. Clus. hist.

Narcissus 7. medioluteus 2. Tab.

Narcissus Pisanus, Ger.

Narcissus alter comofo flore, Cæs.

Narcissus Constantinopolitanus minor calice fimbriato, mediocroceus, Eyst.

Varia folijs obtusioribus & acutioribus: sic floris colore, qui aliquando sulfureus, sive *αυξηλας*: aliquando 10. 12. etiam 18. flores observavimus.

XII. Narciss. medioluteus majorib. floribus.

Narcissus præcox, Clus. hisp.

Narcissus medioluteus alter, Lob. obf.

Narciss. latifol. Byzantin. mediolut. 2. Clus. hist.

Præcocior priore, latioribus folijs, & floribus majoribus.

XIII. Narciss. niveus calice flavo odoris fragrantissimi.

Narciss. latifol. simpl. mediolut. 3. Clus. hist.

*Narcissus totus luteus.*

I. Narcissus luteus polyanthos Africanus.

Narciss. Africanus major, flavus polyanthos: in addit. ad Clus. cur. post.

Narcissus Africanus multiflorus coronatus, Svvert.

Narcissus luteus Africanus major, &

Narcissus Africanus aureus major, Rob.

II. Narciss. luteus polyanthos Lusitanicus. Narciss.

Narcissus d'Argiers, aut Ægyptius, Lob. ad. part. alt.

Narciss. de Argiers polyanthos totus lut. Eyst.  
Narciss. Africanus flore aureo, Svvert.

III. Narciss. luteus Constantinopolitanus.  
Narciss. totus luteus ex Thracia, Clus. hisp.

Narciss. latifolius flavo flore five 4. Zerincadacamer nomine allatus, Eidem hist.

Flos aut omnino luteus, aut pallidus: qui pallidus, caliculum planè aureum habet.

IV. Narciss. angustifolius totus luteus.  
Narcissus totus luteus semper florens Caccini, ad Clus. cur. post.

Singulis caulibus ad quindenos flores, idque sæpius in anno, Florentiæ profert.

V. Narciss. angustifol. flavus magno calice.  
Narcissus 9. qui angustifolius 1. vel Narcissus juncifolius 1. amplo calice, Clus. hist.  
Narciss. maximo calice, flore luteo, Svvert. qui allum adjungit.

Narcissum oblongo calice, flore luteo.

Narciss. juncifolius præcox major, &  
Narciss. juncifolius latiore calice, Eyst.

### NARCISSUS PORRACEO angusto folio.

I. Narcissus angustifolius albus major.  
Narcisso juncifolio albo flore, junxit Clus. in cur. post.

II. Narciss. angustifolius albus minor: qui 1. in Prod.

III. Narciss. angustifol. pallidus calice flavo.  
Narcissus sulfurei coloris majusculus, ad Clus. cur. post.

IV. Narcissus parvus albus simbria suave rubente.

Narcissus parvus stellatus albus medio suave rubente vertice, Lob. ad. par. 2.

V. Narcissus mediocroceus gramineo folio.  
Narcissus mediocroceus tenuifolius, Lob. ad. par. 2.

### NARCISSUS JUNCIFOLIUS. simplex, luteus & albus.

I. Narciss. juncifol. oblongo calice luteus major.

Narciss. juncifolius prior, Clus. hisp. Lugd.

Narciss. juncifol. major, Dod. odoratiss. Cam.  
Narciss. luteus juncifolius vel luteus Africanus, Ad. præcox, Lob.

Narciss. 10. angustifol. 1. & juncifol. 1. Clus. hist.  
Narciss. 8. juncifolius 1. Tab. juncifol. præcox, Ger.

Narciss. major juncifol. Eyst.

Flores terni, quaterni, quini, interdum gemelli odorati.

II. Narciss. juncifol. luteus minor.

Narciss. juncifol. Dod. flo. Lugd. alter, Clus. hisp.

Narciss. juncifol. minimus Dod. Camer. Clus. hist. Eyst.

Narciss. juncifolius serotinus, Lob. Ger.

Narciss. 9. juncifolius 2, Tab.

Narciss. flore luteo, brevi calice, Svvert.

Clusius frequentioribus: Lobelius paucioribus folijs dicit: uterque eadem figura utitur: unico aut altero flore flavo & odoro.

III. Narciss. juncifol. flore luteo variegato.  
Narciss. luteus albicanibus lineis distinctus, brevi calice, Svvert.

IV. Narcissus juncifol. flore pallidiore, calice flavo.

Narciss. juncifol. minor, Clus. hist. ap. & Lob. ad. par. 2. minimus, Eyst.

V. Narciss. juncifol. flore rotundo roseo.  
Narciss. juncifolius flore rotundæ circinitatis roseo, Lob. Lugd. Svvert. cui flos albus est.  
Narcissus 10. roseoluteus major & minor, Tab.

VI. Narcissus juncifolius totus albus.  
Narciss. juncifol. flore albo, alter, Clus. ap. alt. aust. & cur. post.

Narciss. juncifol. polyanthos albus, Eyst.

VII. Narciss. autumnalis albus.

Narcissus juncifolius albus autumnalis medio obsoletus, Svvert.

VIII. Narciss. albus autumnalis minimus.  
Narciss. autumnalis minor, Clus. hisp. Lugd. Tab. Ger. parvus, Dod. Lob.

Narciss. serot. five autumnal. minim. Clus. hist.

IX. Pseudonarcissus gramineo folio, five Leuconarcissus æstivus: qui 2. in Prod.

### NARCISSUS MAGNO ET brevis calice.

I. Narciss. latifol. max. alb. calice brevi luteo.  
Narcissus albus max. calice luteo brevi, Eyst.

II. Narciss. latifolius pallidus calice amplo & aureo, caule striato.

Narcissus latifol. flavo flore amplo calice, Clus. cur. post.

Pseudonarcissus pallidus calice amplo, Eyst.

Variat unico flore, aliquando binos conjunctos habet: hic intensè luteus, ille pallidus: ad Cluf. cur. post.

III. Narciss. latifol. pall. calice amplo alter. Narcissus omnium maximus pallidus amplo calice flavo: in addit. ad Cluf. cur. post.

IV. Narcissus latifolius sulfureus vel albus brevi calice.

Narcissus sulfurei coloris brevi calice, Svvert.

Narcissus totus albus brevi calice, Idem.

Pluribus est floribus. Addit & alium totum album triplici flore & angustiore folio.

V. Narcissus albus medius calice luteo brevit: & Eyflet.

### NARCISSUS MAGNO ET OB-

longo tubo vel calice, latifolius.

I. Narcissus maximus pallidè luteus.

Narcissus maximus griseus vel pallidus, amplo calice flavo, non descriptus, Svvert.

II. Narcissus alter crasso bulbo.

Narcissus minor pallidus amplo calice flavo non descriptus, Svvert.

III. Narcissus subflavus tubo sexangulo.

Narcissus falsus sive Pseudonarcissus tuba sex angulari dilutior flavus non descriptus, Svvert.

IV. Narcissus flavus tubo rotundo.

Narcissus seu Pseudonarcissus oblonga tuba rotunda, non fimbriata quasi abscissa, flavo flore, Svvert.

V. Narcissus albus tubo luteo.

Narcissus seu Pseudonarcissus albus oblongo calice luteo, Svvert.

VI. Narciss. alb. calice flavo, moscari odore.

Narcissus oblongo calice, Cluf. hist. ap. alt.

Narcissus albus luteo longiore calice, ad Cluf. cur. post.

Pseudonarcissus albus calice luteo, Eyflet.

Triplacis Clusus meminit: 1. fl. albo, calice flavo. 2. flore albo, sed calicis ore magis croceo: 3. flore ex albo pallecente, aut *exgelatius*, calice latiore & oris croceis.

Et in curis post. in alijs stylus tubi oras superat, in alijs non excedit. Aliquando (ut ad cur. post. additum) fore majore ex folijs niveis, aut candidis, sed angustioribus & oblongis, odore grato.

VII. Narcissus albus calice flavo alter.

Narcissus albus oblongo calice præcox, ad Cluf. cur. post.

Triplex species: 1. latis & viridibus folijs, caule brevior, flore albo, tubo flavo: 2. folijs angustioribus: 3. folia tubum cingentia pallida, angustiora, & acuminata: & est tubo fimbriato & non fimbriato, ut est

Narcissus tuba non fimbriata flavescente, Svve.

VIII. Narcissus syl. pallidus calice luteo.

*Basiliensis* Theoph. Codiaminum Gaza vertit, Plin. lib. 22. cap. 11. secutus.

Narcissus Brunf. Lac. quo ad ico. primam.

Narcissus luteus, Trag. Gef. hor.

Narcissus 8. Matth. fol. quo ad ico. 1.

Narcissus 3. Eid. comp.

Narcissus Matthioli, Lugd. quoad 2. ico.

an Narcissus, Ang?

Codiamum, vel Codiaminum flore Codij, id est, Campanulæ, Gef. hor.

Bulbus syl. & Codiaminum, Eid. col.

Pseudonarcissus, Dod. gal. vulgaris, Cluf. hist.

Pseudonarcissus luteus, Tab. Eyflet.

Narcissus luteus syl. Dod. Lon. Lugd.

Narcissus totus luteus montanus, Theoph. Ad. & Lob.

Narcissus calice prælongo anguloso, Cæf.

Pseudonarcissus Anglicus & Hispan. Ger.

Pseudonarcissus minor Germanicus, Svvert.

Cauli cuilibet communiter flos unus inseret: aliquando duo: hinc

Pseudonarciss. vulgaris binos flores in eodem caule gerens, Cluf. hist. ap. alt. verum & triplici flore adservo: reperitur & magis præcox,

Cluf. hisp.

Pseudonarcissus præcox, Eyflet.

Sic Cluf. hist. ap. alt. auctar. multas notat differentias, flores majores, minores, forma & colore dissimiles: aliquibus sex folia tubam amplexantia præpallida, alijs pallida, alijs saturatiora: tubus aut valdè amplus, aut angustus,

qui vel pallidus, vel flavus & quasi aureus, aut oris crenatis, vel crenatis & fimbriatis simul, quales sunt

Pseudonarcissus simpl. Belgarum &

Pseudonarcissus luteus, Eyflet.

Aut quodammodo æqualibus, & minimè crispis. Huc referri possunt:

Bulbus flore luteo superiore parte aperto, & Bulbus alius flore luteo humili, cujus semen simile Hemerocallidi Valentiniæ: plura non habet, Cluf. pan.

IX. Narcissus maj. tot. luteo calice prælongo, Pleu-

Pseudonarcissus major, Clus. hisp. & Hispanicus Clus. hist. Svvert.

Narcissus tyl. alter, Dod.

Narcissus totus luteus montanus, Theophrasti. Hispanicus, Lob.

Narcissus totus luteus montanus major, Eyst.

Huic similis inodorus, inefficacior locis ad meridiem, Ad.

X. Narcissus totus luteus flor. folijs reflexis.

Narcissus totus luteus oblongo calice & reflex. folijs, Eyst.

XI. Narcissus parvus totus luteus.

Pseudonarcissi genus admodum exile, Clus. pan.

Pseudonarcissus minor Hispanicus latifolius, Clus. hist.

Narcissus totus luteus mont. minimus, Eyst.

Narcissus Hispanicus flore luteo pumilus, Svvert.

XII. Narcissus albus oblongo calice.

Pseudonarcissus albo flore, Clus. hist. ap. alt. auct. totus abus, Eyst.

Narcissus oblonga tuba totus albus, Svvert.

Duplex est: unus altior flore longiore & tubo angustiore, flore albo, vel etiam *exilior* colorem accedente: alter humilior, flore brevior & tuba laxiore. Aliquando flos non pendulus sed protuberans, Clus. cur. post.

XIII. Narcissus albus fimbria lutea.

Pseudonarcissus flore albo tuba oblonga, fimbrijs luteis, Svvert.

XIV. Narcissus luteus repens.

Pseudonarcissus minor luteus repens, Eyst.

**NARCISSUS OBLONGO, CALICE,**  
vel Calathi figurâ, angustior etiam  
juncifolius.

I. Narcissus angustifolius albus calice oblongo floreque reflexo.

Narcissus juncifolius albus fl. reflexo, Clus. ap. alt. auctar. & cur. post.

Narcissus juncifolius alb. calice magno, Lob. ad. par. alt.

Narcissus totus alb. reflexus, Svvert.

II. Narciss. montan. juncifol. calice flavo.

Pseudonarcissus primus, Clus. hisp. juncifol. primus, Clus. hist. & juncis folijs, Eid. cur. post.

Narcissus montanus juncifol. minimus, Lob. Lugd.

Narciss. juncifol. fl. luteo reflexo, Svvert.

III. Narciss. montan. alter flore fimbriato.

Pseudonarciss. juncifol. 2. flavo flore, Clus. hist.

Narciss. montan. juncifol. minim. alter, flore luteo fimbriato, Lob. Lugd.

Pseudonarciss. juncifol. Eyst.

Huc referendus

Narciss. tuba fimbriatâ flore flavescente, &

Narciss. pseudojuncis folijs luteus fimbriat. Svvert.

IV. Narciss. montan. albus minimus.

Narcissus omnium minimus montanus alb. Lob. Lugd.

Pseudonarciss. juncifol. 3. albo flore, Clus. hist.

Variant hi tres: alijs flos amplior, vel flavescentis coloris, vel flavi, vel aurei: in nonnullis stilus oras excedit, in alijs vix ad oras pertingit: aliquando oris æqualibus, aliquando fimbriatis.

V. Narciss. montanus juncif. calice aureo.

Pseudonarciss. minim. juncifol. aureus, Eyst.

VI. Narciss. montanus coronatus.

Narcissus montanus minimus coronatus, Lob. ico.

## NARCISSUS PLENO FLORE.

I. Narcissus Orient. fl. multiplici & pleno alboluteo.

Narcissus nobilis Orient. polyanthos mixtus, Eyst.

II. Narciss. latifol. alb. medioluteus.

Narciss. 9. Matth. comp. & primus, Eid. fol.

Narciss. 8. Matthioli, Lugd.

Narciss. flore multiplici, Clus. hisp. (pleno flore 2. in hist.) Lugd. multiplex, Dod.

Narciss. albus polyanthos (five Chalcædonicus & multiplex) Lob. Ger.

Narciss. 4. L. on. 1. polyanthos, Matth. Tab.

Narciss. exoticus live Constantinopolit. Cam.

Narciss. major fl. multiplici, Eyst.

Narciss. Chalcædonicus pleno flore albo, Svvert.

Narciss. mediocrocei plenifloris degeneraciones, in sua historia se propositurum, Lob. ad. par. 2. pollicetur.

III. Narciss. latifol. alb. medioaureus.

Narciss. pleno flore secundus, Clus. hist.

Terni, quæterni, flores, suavis odoris.

IV. Narciss. albus corona multiplici lutea.

Narciss. pleno flore 2. Clus. pan. 3. Eid. in h. lt.

Narciss. albus alter media fimbriata lutea multi-

triplici corolla, Lob. ico.

Narcissus juncifolius multiplici complexu, constans, Cæs.

Narcissus medioluteus corona duplici, Svver.

Odore est, inter Narcissum & Muscari medio: etiam cum decem floribus vidimus.

V. Narcissus bulbo anguloso.

Narciss. Constantinopolitanus, quem Zeiden Sari vocant, Camer.

VI. Narciss. multiplex totus flavus.

Narciss. plenus quartus flavo flore, Clus. hist.

Narciss. flavus pleno flore, Svvert.

VII. Narciss. albus mediopurpureus multiplex.

Narcissus pleno flore quintus, Clus. hist.

Flos unus, interdum duo, odore ad Muscari accedens: aliquando viginti & pluribus: aliquando sexaginta quatuor folijs constat.

VIII. Narcissus totus niveus multiplex.

Narciss. pleno flore sextus, Clus. hist.

Narcissus albus pleno flore, Svvert.

IX. Narciss. albus multiplex ex Virginea.

Narcissus totus albus de Virginea pleno flore, oblongo apice, Svvert.

X. Narcissus sylv. multiplex calice carens.

Pseudonarcissus pleno flore, Clus. hist.

Pseudonarcissus luteus polyanthos, Tab.

Narcissus sylv. multiplex, Dod.

Narciss. luteus multiplici flore, Lob.

Narciss. luteus multiplex Dodonæi, Lugd.

Narcissus cujus flos multiplici plexu rosæ instar constat, Cæs.

Narcissus ex luteo pallidus flore pleno, Cam.

Narciss. sylv. stellatus, Eyst.

Duplex est: unus elegantior est, florem explicatum semper gerens: hic

Pseudonarcissus luteus flavo pleno flore, Svve.

Alter verò florem explicat, sed involucri inclusus permanet: uterque pallidus.

XI. Narcissus flore pleno variegato.

Narciss. Septentrionalis flore pleno luteo, Eyst.

XII. Narcissus luteus sylv. duplici & triplici tubo aureo.

Narcissus duplici tuba flore luteo, Svvert.

Pseudonarcissus pleno flore, seu triplici tuba, Clus. hist. ap. alt. & cur. post.

Narcissus Septentrionalis calice luteo pleno, duplicatis folijs, Eyst.

XIII. Narcissus luteus sylv. triplici tubo alter.

Pseudonarcissi pleno flore varietas, Clus. cur. post. qui duplicem proponit.

Narcissi totilutei præcoci Septentrionalium, sive montani Theophr. omnium vulgarissimi, triplicem ex eadem radice differentiam, addit figurâ, Lob. ad. par. 2. recenset.

Narciss. Septentr. fl. pleno luteo oris incisus, Eyst.

XIV. Narciss. luteus tubo diviso.

Pseudonarcissus duplex diviso calice odoratus, Svvert.

XV. Narciss. latifolius luteus multiplex.

Narcissus Cyprius luteus polyanthos fl. pleno, Lob. ad. part. alter. & addit

Narcissum polyanthea Byzantinum hujus familiaris esse, quem tamen non describit.

XVI. Narcissus juncifol. aureus multiplex Anemones formâ.

Narcissus juncifol. pleno flore, Clus. cur. post.

Narcissus juncifolius luteus flore pleno, Eyst.

Est & huic similis alter, qui licet multiplex sit, tamen adeo multiplex foliorum textura non est, quem

Narcissum aureum pleno flore vocat Svvert. hunc à Patre Gregorio de Regio Capucino, unâ cum alijs ex Italia accepimus.

## NARCISSUS MARITIMUS.

I. Narcissus maritimus.

Hæmpanensis, Theophr. 6. hist. 1. ubi Elium Gaza vertit.

Hemerocallis quibusdam putatur, Bulbus scilicet littoralis, Theophr. Pancratium Monspel. & Squilla minor Pharmacop. Ges. hor.

Hemerocallis Valétina, Clus. hisp. & hist. Dod. fl. Lob. (cui & Narcissus Constantinopolitanus

Matth.) Cam. (cui & Con Zambach Turcis) Taber.

Pancratium marinum, Ad.

Pancratium floribus rubris, Lob. ico.

Pancratium Dalech. Lugd.

Narcissus marinus, Dod. Clus. hist. ap. alt. & cur. post. Cæs.

Narcissus Pancratium marin. flore albo, Svve.

Variat flos colore: apud Monspelienses est albo, est subluteo, & est pallescente: apud Italos, rubeo & purpureo, quandoque punicante: hinc apud Lobelium in iconib. duplex figura, Pancratium marinum, & Pancratium floribus rubris: & apud Taber.

Lilium marinum album,

Lilium marinum luteum:

Narcissus major sive Pancratium floribus rubris,



bris, & Narcissus Pancratium marinum sive Hemerocallis Valentina, Svvert.

### II. Narcissus Illyricus liliaceus.

Narciss. 3. vel Constantinopolitanus, Matth. & Lugd. qui priorem putat.

Afouzenas de las Indias, Lob. ob.

Lilionarcissus Hemerocallidis Valentinae facie, &

Lilionarciss. Orient. Plateau, Clus. hist.

Lilionarciss. Hemerocallidis facie, Eyst.

Narcissus montanus sive marinus alter, qui Matthioli tertius, Clus. hist. app. 2. & in au. hujus meminit.

Narcissus Constantinopolitanus, Tab.

Narciss. 3. Matthioli multiflorus albus, Svvert.

Pancratium Indicum alterum vernum, sive

Narcissus Indicus alter facie Pancratij Monspeliani, Lob. ad. par. 2.

Flores seni, septeni: sic, caule duplici: ab uno 14. Liliacei candidi, ab altero 12. aliquando unus caulis triginta quinque flores sustinuit: aliquando flos fuscus caryophyllo aromatico concolor.

### III. Narcissus Indicus autumnalis.

Pancratium Indicum, aut Narcissus Indicus maximus autumnalis quorundam, Lobel. ad. part. 2.

IV. Narcissus Indicus folio latissimo triquetro.

Narcissus sive Pancratium Orientale Svvert.

### V. Narcissus Indicus laciifolius alter.

Narciss. Indic. sive Pancratium Occid. Svvert.

## LEUCOIUM BULBOSUM EJUSQUE Species.

**Λ**ευκοιον apud Theoph. 6. hist. 7. & 7. cnsd. 13. *Gaza violam albam vertit. Leucoion, inquit, florum prima se ostendit, emicat ubi catum clementius statim, etiam nondum hyeme exacta: ubi vero immisit, postea. Plin. L. 21. c. 11. Viola alba florum prima Ver nunciantium, cujus vita longissima est trimatus.*

### I. Leucoium bulbosum vulgare.

Leucoium Theophrasti, & Viola alba, Plinij.

Narciss. Martius. Brunf. septimus, Matth. Lugd.

Viola alba Theoph. Trag. (cui & Hemerocallida Diosc.) Fuch. Ges. cat.

Narcissus & Viola alba, Tur.

Narcissi candidi genus, Cord. in Diosc.

Narcissus aquaticus, Cæs.

Viola alba bulbosa Fuchij, Lugd.

Leucoium Theoph. Dod. gal. Lon.

Leucoium bulbosum Theoph. Ges. hor. Thal.

Leucoium bulbosum primum, Tab.

Leucoium bulbosum hexaphyllum, Dod. Cam.

minus, Eyst.

Leucoium bulbosum præcox majus, Clus. pan.

& hist. Ger. ico.

Leucoium alterum bulbaceum Theoph. Portæ.

Leuconarcissolirion prat. vernum paucioribus

floribus, Ad.

Leuconarcissolirion paucioribus floribus, Lob.

Leuconarcissolirion vulgare, & Opitio Theophr.

Cam. in Matthiolum.

Narcissus Germanicus vulgaris, Svvert.

Flores in singulis pediculis singuli, rariss. gemini: tribus & quinque folijs pingit, Svvert. nomine

Narcissi Hispanici Leucoij minoris.

### II. Leucoium bulbosum flore patulo.

Narcissoleucoion Bohemicum, Svvert.

Leucoium bulbosum hexaphyllum majus, Eyst.

stett.

Folij est latioribus, flore majore & patulo.

### III. Leucoium bulbosum majus sive multiflorum,

quod aliqui Acrocorion Plinij statunt.

Leuconarcissolirion prat. vernum, Ad. Lob.

Leucoium bulbosum polyanthemum, Dodon.

Cam. Lugd. multiflorum, Tab.

Leucoium bulbosum majus, Ger.

Leucoium bulbos. serotinum majus, Clus. pan.

Leucoium bulbosum serotinum, Eystett. qui &

minus exhibet.

Narcissus 2. Matthioli. Lugdunen. 3. & Matth.

10. Tab.

Narcissoleucoium majus Hispanicum, Svvert.

Variat folijs pallidiorib. minus mucronatis

sed

sed velut bifidis: floribus, maculis ex viridi pallidioribus intectis.

IV. *Leucoium bulbosum trifolium minus*. *Narcissus tertius alter*, Matth. comp. *Narcissus* 8. alter, Eid. fol. 2. Lac. ico. *Leucoium bulbosum triphyllum*, Dod. Cam. minus, Eyst. *Leucoium bulbosum præcox minus*, Clus. pan. & hist. *Leuonarcissolirion prat. vernum omn. minimum*, Ad.

*Leuonarcissolirion minimum*, Lob. *Leuonarcissolirion bifolium*, Cam. in Matth. *Narcissus*, Matth. quoad. 1. fig. Lugd. *Narcissus montanus alter*, Cæf.

V. *Leucoium bulbosum trifolium majus*. *Leucoium bulbosum Byzant.* Clus. pan. præcox, Eid. hist. & Lob. ad. par. 2. & *Leuonarcissolirium*, sive tertium bulbosum *Leucoion*, Lob.

*Leucoium bulbosum triphyllum majus Byzantinum*, Eystett. an *Narcissus sextus*, Matth. Lugd. *Leucoium bulb.* 2. Tab. sub bulb. præcoce, Ger.

VI. *Leucoium bulbosum trifolium cæruleum*.

*Leucoium triphyllum flore cæruleo* *Someri*, Lob. ad. part. 2.

VII. *Leucoium bulbosum autumnale latifolium*.

*Narcisso leucoium autumnale*, Svett.

VIII. *Leucoium bulbosum autumnale*. *Leucoium bulbosum autumnale minimum*, Dod. minus, Clus. hisp. Lugd. & Cam. *Leucoium bulbosum autumnale tenuifolium*, Clus. hist.

*Leuonarcissolirion minim. autumnale*, Lob.

IX. *Leucoium bulbosum tenuifolium vernum*.

*Leucoium bulb.* vernum minimum, sive folio capillari præcox, Clus. cur. post.

X. *Leucoium unico & junceo folio*.

*Bulbus uniporum* & seu unifolius.

an *βελόνη* Theophrasti, Clus. hist. app. 2. auct.

an *Orinthogalum unifolium flore albicante*, Svett?

XI. *Leucoico bulbo affinis duplex*.

*Bulbus* quatuor aut quinque flores gestans in modum Campanulæ albæ, Clus. pan. & hist.

Alterum addit bulbum flore magno, Campanulæ forma, terram spectante, intus luteo, foris purpureo, ibid.

## TULIPA ET EJUS SPECIES.

**T**ulipa, cujus descriptionem & figuram primus Gesnerus, Anno 1560. in append. ad Cordi hist. dedit, à pileo Dalmatico, vel amiculo capitis, ab ipsis gestari solito, nomen habet, idq; propter floris cum pileo similitudinem. Sunt qui *Anemonem*, a quo *νιαν* Theoph. velint, cum ibi *Pulsatillam* intelligere videatur: alij *Cynorrhodon* Plin. l. 21. c. 5. censent: alij ad *Satyrium trifolium* referunt. *Turca Alé* & *Zampul* vocant. *πυθία* fortè Theophrasti.

Genera prima tria sunt: præcoxius unum: serotinum aliterum: dubium tertium, medio tempore florens.

*Præcox*, caule est pedali, firma medulla pleno, quem folia plerumq; terna, nonnunquam quaterna & quina amplectuntur, propendens & nutans, interdum surrecta: cauli flos unicus (rarissimè gemini, vel summo caule conjunctim nascentes, vel bifido inhaerentes) sex folijs (rarissimè septenis & octonis) constans, ex quo tot stamina, quot folijs constat, colore variantia prodeunt.

*Serotina*, caule est cubitali & tripedali, fungosa materia pleno, quem quaterna plerumq; folia, nonnunquam quina & sena firmiora, ut plurimum erecta non nutans ambiunt: semine quam in præcoci majore, & bulbo longiore majoreq; plerumq; constat: sic & caulem ramosum interdum habes.

*Dubia*, quæ præcoxium flore marcescente suos explicans, & serotinū florere incipientibus,

jama

*jam senescunt, & cum his interdum florent. Sunt inter has nonnulla, quæ serotinarum magnitudinem æquant: alia quæ præcoces non superant, nec illis forma abstmiles sunt: & illa quidem vel amplissimis floribus prædita, vel præcoce non majoribus: quædam etenim præcocius humiliores sunt.*

*Omnium folia apice mucronato, aut orbiculato: vel tria interiora orbiculata, exteriora mucronata, & contrâ existunt.*

## TULIPA PRÆCOX SIMPLICIS

& unius coloris.

## I. Tulipa præcox lutea.

an Satyrion triphyllon Dioseoridis.

Tulipa alia, Gef. ap. ad Cordum, lutea, Cast.

Lilionarcissus luteus, Lob.

Tulipa præcox flava, Clus. hist. tota lutea, Ger.

an Oulidia, Lugd.

Variat vel pallidæ, unguibus plerumq; aureis, vel ad auri fulgorem accedentibus, unguibus veluti fuligine aspersis: interdum flos inodorus, vel odor imbecillus, vel quasi croci sive etiam cæræ recentis. Aliquando flavus, sequenti anno flavum & rubrum commixtum habuit.

## II. Tulipa præcox rubra.

Tulipa Turcarum, Gef. ap. ad Cordum.

Narcissus quintus, Matth. Lugd.

Anemone limonia Theophr. Tulipa quorundam, Gef. hor.

Lilij rubentis genus videtur: Idem.

Satyrion erythronium fortè: Idem.

Lilionarcissus sanguineus puniceusve, Ad. Lob.

Tulipa, Dod. Lon. major, Lug. rubra, Cast. præcox rubra, Clus. hisp. pan. & hist.

Colore est nunc saturatiore, modo dilutiore & gratissimi aspectus: interdum ineleganti & obsoleto: foliorum unguis, vel lutei omnino, aut levi fuligine in luteo aspersi: in quibusdam in medioungue macula nigra, in alijs ita lata, ut sola linea lutea ambiens conspiciatur: interdum unguis folij partem dimidiam occupant. Odor instar mali aurei, ut plurimum obscurus, vel papaveris virus referens. Aliquando qui ruber fuit, sequenti anno variè commixtus, ex rubro & flavo inter se confusus coloribus, modo flavo, medium folium occupante, modo rubro, vel utroque radiatim per oras discurrente fuit. Verùm eæ, quæ nativum colorem mutant, subinde corrumpi solent. Huc pertinent ex Eyst.

Tulipa præcox floribus rubris in album luteum languescens.

## III. Tulipa præcox purpurea.

an Cosmo sandalos Veterum inter coronarias?

Lilionarcissus purpureus, Lob.

Tulipa præcox purpurea, Clus. hist.

Aliàs dilutior & Damascenam rosam colore referens: interdum adeò diluto, ut albescere videatur: aliàs purpura saturatio, & violaceum sive amethystinum colorem habet: hic est, Lilionarcissus purpureo violaceus, Lob.

Aliàs Pæoniae floris æmulus, ut aliquando ex purpura nigricat, & obsoletior est: hic est,

Lilionarcissus purpureus sanguineus, puniceusve quintus, Lobel. & huc referas duos sequentes:

Lilionarciss. sanguineum paniculæve 8. &

Lilionarcissum sanguineum puniceumve obsoletum, tribus exterioribus mucronatis folijs, internis verò retusis, Lob.

Ungues cum apicibus aut pallent, aut lutei sunt: nonnulli apices nigros habent, pediculis veluti fuligine infectis: odora est & inodora. Aliquando purpurea, sequenti anno album & purpureum colorem, variè inter se commixtos, & radiatim folia secantes, habuit. Item ex Eyst.

Tulipa purpurea calice pallescente &

Tulipa summe miniata calice luteo.

## IV. Tulipa præcox alba.

Lilionarcissus niveus, Lob. ico.

Tulipa præcox alba, Clus. hist.

Flos omnino candidus, nisi tria folia exteriora dorso cineracei vel cærulei quippiam admixtum haberent; unguis lutei, nonnunquam veluti fuligine aspersi, apicibus & staminibus pallidis, aliquando unguis prorsus albi, apicibus nigricantibus:

Admonet Clusius, se Tulipas cærulei omnino coloris nondum vidisse: totum florem pallidè violaceum in horto meo habui.

## TULIPA PRÆCOX

Varia.

## I. Tulipa præcox rubra varia, Clus. hist.

Rubra variæ floris folia exteriora mucronata,

H

inter-

interiora orbiculata, magna ex parte sunt: hujus differentiarum octo:

1. Est magnis oris auri fulgore splendidibus, magnis unguibus luteis: apicibus, vel nigris, vel obsoleta purpura tinctis, pediculis veluti fuligine infectis.

2. Foliorum exteriorum ora foris lutea, interiorius dilutius rubentia, rubedine quasi radiatim in luteas oras desinente: at interiora rubent, ungues lutei, stamina cinerea.

3. Folia diluore minij colore rubent, oris mediocribus, foris minij colore, interiora folia ferè tota occupante, & virgatim in oras luteas desinente: unguibus magnis, flavis, apicibus cineraceis, pediculis luteis.

4. Folia exteriora medio dorso luteo, sanguineis virgulis distincta sunt, parte reliqua rubra, orisque luteis: interiora omnia ferè rubra, sed rubro colore in aureas oras radiatim desinente: interiore parte lutea, rubris radijs circa medium folium distinctis: ungues & pediculi lutei, apices nigri.

5. Folia omnia mucronata, externa, dorso lutei, reliqua parte sanguinei coloris, oris tamen extremis luteis, quæ internè sanguineis radijs tota resperfa: interiora foris sanguinis modo omnino rubent, oris luteis sive flavis coloribus se commiscuentibus, interna parte flavis, circa medium sanguineis radijs, instar orbis insignitis: ungues & pediculi lutei, apices nigri.

6. Folia mucronata, oris aureis, reliqua parte rubris, excepto dorso foliorum exteriorum, quod aureis virgulis aspersum: omnium ungues lutei, radiatim in rubro commixti, pediculi lutei, apices nigri.

7. Folia externa mucronata, interna orbiculata tota rubra, oris tamen aurei coloris radiatim in rubro desinentibus: exteriores saturatiores, interiore tamen parte magis aurea: ungues, stamina, pediculi cum præcedenti conveniunt: omnium istorum flores satis odorati sunt.

8. Folia sunt parvis oris aureis, per reliqua elegantissimi rubri coloris: ungues flavi, stamina veluti fuligine tincta, apices obsoletè purpurei.

11. Tulipa rosea variegata polyanthos.

Tulipa polyanthos præcox rosea, colore mixta, Eyster.

111. Tulipa præcox, lutea varia, Clus. hist.

Lilionarcissus luteolis adversa parte folijs, secundum ora strijs rubris decoratus: intus verò luteus amœnus, Lob. ico.

Hujus etiam differentiarum novem sunt.

1. Flos primis diebus totus luteus, at quarto, vel quinto, folia extrinsecus per oras rubris virgulis leviter distinguuntur, interna parte (præsertim tria externa) luteis remanentibus, & unguibus nonnunquam veluti fuligine tinctis, apicibus interdum luteis, pediculis fuscis.

2. Floris folia externa, circa medium rubris radijs raris insignita sunt, interiora autem frequentioribus, & ad extremum usque folium ferè excurrentibus: ungues aurei, stamina pallida.

3. Foliorum exteriorum ora, foris planè rubent, interiorius à medio ad oras extremas rubris virgulis distinguuntur: interiora folia externè omnino rubent: internè, à medio ad summum, rubrum nervum protensum, & latera rubentibus radijs exornata, habent.

4. Folia exteriora dorso luteo sunt, per oras verò diluoreis cinnabaris colore virgatim distincta: interiore parte, ad unguem usque cinnabaris color tota occupat: interiora folia cinnabaris colore infecta, nervo tamen duplici luteo secundum longitudinem, & luteis virgulis in oras externas excurrentibus: apices nigricant, pediculi lutei nonnulli fuligine infecti; ungues aurei, magni, stamina quodammodo saeperantes: Huc refer.

Lilionarcissum luteum coccineum rubentibus oris, Lob.

5. Flos odorosus est, cujus folia tria exteriora mucronata & lutea sunt, oris purpura rubescente radiatim interculante insignitis: dein orarum extrema lutea sunt, & interna parte, ad folij medium, radijs frequentes rubri coloris conspiciuntur: sic interiora folia orbiculata mucrone prædita, lineis rubris ab infimo ad extremas oras luteas distinguuntur: interior pars minus radiata, quàm exterior: ungues magni & cum staminibus & apicibus lutei.

6. Flos aliquantulum odoratus, cujus folia orbiculata, foris aurea, oris luteis, intus lutea, linea aurei, sive rubri coloris flavo permixti, radiatim & transversim folium medium secante pediculi lutei, apices cineracei.

7. Folia orbiculata, exterioribus, dorso ad extremum mucronem luteo, oris latè ex aureo rubris:

rubris: unguibus, flaminibus & apicibus luteis: nonnihil odor.

8. Flos priori par, sed dilutioris coloris, flaminibus & apicibus duntaxat variantibus; nec odore caret.

9. Flos luteus, oris strijs rubris distinctis, & unguibus subviridibus: hic est

Lilionarcissus luteus hilaris, oris rubris striatis, carinis subviridi, Lob. ico.

Huc referatur ex Eystett.

1. Tulipa lutea maculis minutis aspersis.

2. Tulipa lutea lituris aureis.

3. Tulipa lutea margine roseo.

4. Tulipa lutea maculis rubens.

5. Tulipa lutea prope calicem radio rubro.

6. Tulipa lutea lituris miniatis.

7. Tulipa ex pallido tota virescens.

8. Tulipa ex luteo citrini coloris lineis, dorsalibus viridibus.

9. Tulipa flava ex sulphureo colore pallescens lituris prope apices roseis flammiformibus.

10. Tulipa floride pallens oris coccineis.

IV. Tulipa præcox purpurea varia, Clus. hist. Hujus differentie decem sunt:

1. Folia omnia mucronata, quæ Peoniarum pleno flore purpureum colorem imitatur, oris ex albo purpurascens; unguibus ex luteo viridiq; coloribus permixtis, subobscuris, circulo exalbido eos ambiente: pediculi flavis veluti fuligine infectis: apicibus nigris: floribus magnis & admodum patulis.

2. Folia mucronata sunt, foris purpurea, internis media parte carnei coloris, oris ex albo pallescens, unguibus, flaminibus, & apicibus flavis sive luteis.

3. Folia mucronata, foris & intus purpurea, oris extremis albis: ungues lutei, albo orbe circumdati: apices obsoletè purpurascens initio, dein ubi obversi sunt, flavo polline aspersi: pediculi flavi.

4. Folia mucronata, saturatiore purpureo colore prædita, ora exalbida, ungues albi, in imo flavi, apices & stamina pallida.

5. Folia mucronata, coloris purpurei dilutioris magisq; floridi: ora exalbida, ungues ex viridi pallentes, pediculi nigricantes, apices pallidi: hic solus odor.

6. Folia mucronata, obscurioris purpuræ, & quasi amethystino colore prædita: magnis oris

albis: unguibus, flaminibus & apicibus flavis.

7. Folia orbiculatis oris, magnis & albis, reliqua parte saturatiore, nitentèque purpureo colore prædita: ungues flavos orbis albus ambit: apices cineraces, pediculi flavi.

8. Folia interiora aliquando orbiculata, dilutiorè purpureo colore splendent: interiore parte tota seise alba, omnium extremitates magnæ albæ: ungues, stamina & apices flavi coloris sunt: & hic est

Lilionarcissus rubellus nitidus candidis oris, Lobel.

9. Folia externa mucronata & reflexa, exterius obscure purpurascens: interna orbiculata & dilutius purpurascens: utraque in magnas oras albas desinentia, interiore parte veluti purpureum orbem, totum florem per medium ambientem, habentia; & ungues luteos vel flavos, albo orbe inclusos: apices obsoletè purpurascens obtinent.

10. Folia omnia mucronata, & externa tria foris purpurea, magnis oris albis prædita, interiore parte alba, & eorum mediam partem orbe purpureo secante: ungues flavos, circulus albus ambit: stamina cum apicibus pallent.

Huc pertinet ex Eystett.

1. Tulipa rosea venis luteis.

2. Tulipa miniata, linea viridi.

3. Tulipa floribus reflexis, interitis miniatis, exterius herbaceis, margine ex cinnabari rubente.

V. Tulipa præcox alba varia, Clus. hist.

Et hujus differentie octo notantur.

1. Folia externa albescent, exceptis oris, quæ elegantis & dilutè admodum purpurascens sive carnei coloris sunt: interna magis purpurascunt, ungues lutei, dein exalbidi: stamina cum apicibus flava. Huc refer Lilionarcissum candore & rubore confusum, Lobel.

2. Folia exteriora dorso sunt exalbido, virgulis purpureis aspersis, reliqua parte purpurascens, aut incarnato: interiora purpurea sunt: ungues stellatim flavi, dein albi: apices lutei: pediculi veluti fuligine aspersi.

3. Folia externa dorso albo sunt, punctis purpureis distincto, interiore parte dilutiorè purpura nitente: interna, saturatioris sunt purpuræ: ungues flavi, radiati, stellæ instar: apices nigri: pediculi fusi.



4. Folia externa oras magnas carneo colore præditas habent, reliqua parte alba: interiora verò quasi carnei coloris sunt.

5. Folia externa, dorso sunt palléscente, aliàs alba præter oras, quæ foris brevibus & raris purpurascens radijs exomantur: interiora albescunt, oris, lineis purpureis longioribus & frequentioribus foris insignitis.

6. Folia exteriora, dorso & mucrone extremo pallent, aliàs candida, ora interius paucis purpurascens radijs distinguuntur: interiora, à medio ad oras radijs purpurascens, foris aspersa sunt: intus alba, oris rarioribus virgulis distinctis.

7. Folia exteriora alba: interiora oras habent, nunc paucis, nunc multis virgulis purpurascens, sive carnei coloris distincta: unguis flavi: apices ac pediculi omnium pallent.

8. Folia omnia, coloribus albo & carneo permixtis prædita sunt: sed qui cineraceo carneo colori temerè perfusum referant: unguis exalbidi: apices obsoletè purpurascens, pediculi albi sunt.

Verùm si Tulipæ præcoci semina germinant, rarè nativum matris colorem retinent, sed in varios colores flores transformant, præsertim Albæ, ex quibus aut omnino albi, aut albo varij: vel lutei & luteo varij: aut rubri atque rubro varij: vel purpurei, ac purpureo varij, quorum videlicet purpurea folia albis oris ornata fuere. Quoad flavas, aut rubras, pleraque proles matris colorem retinet, sæpè etiam in alium commutatur. Huc referatur ex Eystett.

1. Tulipa candida lineis viridibus.

2. Tulipa alba maculis roseis.

3. Tulipa albicans maculis latis rubentibus.

4. Tulipa alba marginibus rubescens.

5. Tulipa argentei & albicans coloris.

6. Tulipa præcox ex albo in luteum lineis oblongis rubris.

7. Tulipa ex albo ruffa margine rubente.

8. Tulipa explicata flore candido lineis rubris.

VI. Tulipa præcox angustifolia.

Tulipa Persica præcox, Clus. cur. post. qui duplicem facit.

VII. Tulipa angustifolia altera sive folijs Hyacinthi.

Tulipa bicolor, tribus luteis & tribus rubris folijs Caccini, ad. Clus. cur. post.

## TULIPA SEROTINA.

I. Tulipa serotina lutea.

Tulipa sive Lilionarciss. luteus latifol. obtusus phœniceis rubentibus oris, Lob.

Tulipa lutea, Clus. pan. serotina flava, Eid. hist.

Serotina lutea latifolia, Cam.

Tulipa sive Lilionarcissus luteus latifolius, Lugdun.

Flos coloris dilutioris, & quidem modo flavi, vel palléscentis, vel intenioris & quasi auri modo rutilantis: est cujus foliorum oræ sanguineis guttis aspersæ sunt: unguis ceræ retentis coloris, interdum nigricantibus venis distincti, vel macula nigra notati: apices cum pediculis, vel flavi, aut cineracei, vel fuligine infecti, aut omnino nigri. Huc referatur ex Eyst.

Tulipa aurei coloris.

Tulipa lutea, ex rubro viridi coccineo variegata.

Tulipa globosa serotina aureo colore punctata.

II. Tulipa serotina alba: cujus varietates ex Eystett.

1. Tulipa albicans margine coccineo.

2. Tulipa albicans ex flavo purpureo, folijs prope calicem luteis unguibus.

3. Tulipa nivea oris rubeo purpurascens.

4. Tulipa nivea oris ex rubro purpureis.

5. Tulipa serotina stellata.

6. Tulipa diversæ coloris alba linea rubente.

III. Tulipa serotina coccinea: cujus varietates ex Eystett.

1. Tulipa coccinea albescens oris.

2. Tulipa globosa serotina cinnabari colore.

IV. Tulipa serotina rubra. Clus. hist.

Floris color plerumque saturatior & quasi nigricans: interdum dilutior & perelegans: unguis aut omnino flavi, aut nigri, qui, Sole illustrati, cæruleum quidpiam permixtum habere videntur: vel macula nigra majore, vel minore, (tenet orbe aureo inclusæ) flavum inscipient: apices cum pediculis, vel flavi, vel nigri: sic apices cinerei & pediculi flavi.

Ex his varietas observata, quod interdum ex rubra semine flava: contra ex flava semine rubra nata sunt, unguibus sæpè variantibus.

Huc referatur

Tuli-



Tulipa, versicolor, parte mediâ viridibus signaturis, alterâ verò rubrâ, Eyst.

V. Tulipa ferotina ramosa major.

Tulipa ferotina *polymorpha* major, Clus. hist.

Tulipa ferotina polyanthos, Eyst.

Huc referenda, Tulipa ferotina lutea latifolia dielonos, Cam. & ejusdem cristata papaveris modo sive *dispergatis*.

VI. Tulipa ferotina ramosa minor.

Tulipa ferotina *polymorpha* min. Clus. hist.

Utraque & rubro & flavo flore reperitur.

VII. Tulipa ferotina brasiæa floridæ similis, vel Tulipa viridis prima.

Tulipa viridis, Eyst.

Variat simpliciter & duplici folior. serie: & hæc

Tulipa ferotina viridis, duplici foliorum in flore serie, Clus. hist.

VIII. Tulipa viridis altera.

Tulipa ferotina viridis, oris pallidis & albis, Clus. hist.

IX. Tulipa ferotina flore pleno.

1. Tulipa ferotina flore pleno miniato, Eyst.

2. Tulipa ferotina tota lutea fl. pleno, Eyst.

### TULIPA DUBIA.

Tulipa dubia major.

Lilionarciss. luteus phœniceo confusè mixtus, Lob.

Tulipa media major prima, Clus. pan.

Tulipa dubia prima major, Clus. hist.

Differentiæ, hujus sunt novem.

1. Folijs est mucronatis, calice admodum pallido, vel flavo: unguibus ceræ recentis instar flavis.

2. Folia habet flava orbiculata ad aurei mali præmaturi colorem accedentia: stamina cum apicibus flava, & flos odoratus est.

3. Flos omnino aureus, cujus externa folia, dorso flavo prædita, oris dilutioris cinnabaris colore radiatim distincta: interna, cinnabaris coloris, binis nervis luteis, & radiolis flavis in latera excurrentibus: unguis magni, flavi: apices nigri: pediculi flavi, fuligine infecti.

4. Folia orbiculata flava, venis rubris secundum longitudinem excurrentibus, interdum totum dimidium folium inficientibus.

5. Flos dilutius rubet, cinnabaris colore, folijs mucronatis: vel saturatioris & quodammodo nigricantis coloris, exterioribus mucrona-

tis, interioribus orbiculatis: unguibus flavis veluti fuligine aspersis; vel in omnibus folijs, vel in exterioribus apicibus modo flavis & leviter nigricantibus, modo omnino nigris: pediculis flavis media ex parte nigricantibus.

6. Flos coloris albi exoleti, folijs ex albo pallescentibus, dorso flavescente: folijs interioribus orbiculatis, unguibus apicibusque pallentibus.

7. Folia orbiculata dilutissimi purpurei coloris & quodammodo carnei, unguis maximi albi, quorum principia cum staminibus & apicibus flavent.

8. Flores saturatius purpurascunt, prædulcium rufescensium vuarum instar, folia interiora orbiculata: unguis cum apicibus flavescent.

9. Flores saturæ admodum purpuræ, & cerasorum acidorum nigrorum succum referunt (Wiegelsfarb & nos vocamus) unguibus subcæruleis, vel ex cæruleo nigricantibus, staminibus fuscis.

II. Tulipa dubia major altera.

Lilionarcissus phœniceus peramœnus oris luteis, Lob.

Tulipa media major secunda, Clus. pan.

Tulipa dubia prima, major altera, Clus. hist.

Huc refer

Lilionarcissum luteis oris flore patulo, Lob. qui in Lugdunensi historia, Tulipæ sive Lilionarcisso luteo latifolio jungitur.

III. Tulipa dubia media sulphurei coloris.

Lilionarcissus striatus candidis suaverubentibus oris, Lob. ico.

Tulipa dubia secunda, media prima, Clus. hist.

Variat quoque:

1. Flos pallidi coloris costum sulphur refert, folia mucronata, unguis fuligine infecti.

2. Flos eleganter flavus, folia mucronata, unguis & apices nigri, pediculi fuligine infecti: hujus flos ex sedecim, mox tredecim, octo & sex folijs compositus.

3. Flos ex flavo & rubro coloribus permixtus, folijs sex magnis mucronatis & flavis constans, quæ ab ungue nigro rubras venas per folia radiatim excurrentes & in latera sparsas habet. Huc referantur ex Eyst.

1. Tulipa lutea lituris miniatis.

2. Tulipa sulphurei coloris, oris rubris.

IV. Tulipa dubia media altera.

Lilionarcissus totus luteus sanguineo puniceo

par & similis, odoratus Croci aut Narcissi æmulatione, & inodorus præcox & ferotinus, Lob. ico.

Lilionarcissus Chalcedonicus totus luteus sanguineo puniceo par & similis, Lob. obs.

Tulipa dubia tertia, & media secunda versicolor, Clus. hist.

Et hujus differentiæ novem:

1. Flos coloris flavi dilutioris, vel pallescens, cujus folia externa foris virescunt: alterius folia orbiculata, unguis subvirescentes: Item folia flava, interiora orbiculata & guttis sanguineis aspersa: vel folia flava, unguis cerei coloris: vel in unguibus macula nigra splendens: vel ex fusco & viridi colorib. commixtis.

2. Flore est flavo vario, initio flavo, tertio die tenui limbo rubeo exornato: cujus folia in una flava, oris cinnabaris colore infectis: in altera pallidiora, oris rubris venis ornatis, vel mali aurei præmaturi colore perfusus. Invenitur versicolor, flavo & rubro colore commixtis, instar sericeæ panni flavi, cujus subtegmen rubrum & unguis nigri sunt, & hæc dicitur Tulipa dubia 3. media 2. versicolor, Clus. hist.

3. Flos albus in flavum degenerans, folia vel omnia mucronata: vel interiora orbiculata; unguis, stamina & apices pallent.

4. Flos Ochreæ colore, cujus foliorum mucro rubro colore tingitur: pallidus, oris rubris vel purpureis, vel carnei coloris venis distinctis.

5. Flos albus, initio virescens colore perfusus, staminum apicibus fuscis.

6. Flos albus, varius, dilutior, folijs interioribus orbiculatis, unguibus exalbidis, macula purpurascens notatis, staminibus exalbidis, apicibus nigricantibus: vel unguibus & staminibus candicantibus: vel unguibus exalbidis, orbe subcæreuleo inclusis, staminibus albis, apicibus nigricantibus, vel folijs extrinsecus saturatoribus, oris candicantibus, unguibus exalbidis cum subcæreulea macula, staminibus albis, apicibus nigricantibus, folijs exterioribus mucronatis: vel folia mucronata, dilutioris aut saturatoris coloris: vel venæ purpureæ per totum folium dispersæ.

7. Flos purpureus, vel dilutioris & magis floridi coloris, folia interiora orbiculata, unguis exalbidi, stamina purpurascens, apices nigricantes, vel purpureæ dilutioris, oris candicantibus, unguibus vel flavis, aut veluti

fuliginis infectis, vel ex albo flavescens, aut ex cæreuleo, flavo, & subvirescente mixtis, modo saturatoris, venis albicanibus permixtis, unguibus ex flavo nigricantibus, aut flavis, aut ex viridi nigricantibus, aut subcæreuleis, vel ex cæreuleo flavescens, aut cæreuleis, orbe flavescens ambiente: sunt & dilute purpurei & remissè miniati, aurei mali coloris, & vel dilutiores internè & per oras, vel saturatioris: internum internè dilutissimi, foris saturatoris: unguis vel flavi, vel fuliginoso orbe cincti, vel ex viridi nigricantes, vel fusci sunt. Est humilior folijs interioribus orbiculatis, unguibus vel albis, vel candicantibus, superne cæreuleis, staminibus albidis, apicibus subfuscis, vel unguibus cæreuleis, aut ex cæreuleo virentibus, vel nigricantibus. Hue pertinet Lilionarcissus coccineus rubentibus medijs folijs candicans, & ad basin notulis rubris cordis effigie aspersis, Lob. & Lilionarcissus coccineus, candidis oris, Lob. ico.

8. Flores purpureo varij, folijs vel dilute purpurascens, vel saturatoribus, oris mucronatis, vel orbiculatis exalbidis: unguis sunt aut albi, aut subcæreulei, aut albi, orbe lato carnei coloris cincti, stamina plerumque nigricantia.

9. Flos rubet, foris purpurascens, intus carnei coloris: unguis, stamina, apices, flavie vel folijs exterioribus, flavo colore aspersis: & colore obscuro ad lateritium accedente, unguis flavi, vel nigri: vel subæ ferotinae similes, unguibus flavo orbe cinctis; Oculus folijs cognominatur: hinc est

Lilionarcissus coccineus puniceus rutilans, Lob.

10. Floris folia mucronata, initio viridia, dein oris pallescens, quæ in rubrum colorem mutantur, radiatim alteri colori se miscens, colore viridi, qui fescenscente flore languescit, præsertim intrinsecus.

Verum ex semine interdum ferotinus nascuntur: sic ex purpurea præcoci, purpurea ferotina dilutior, intrinsecus aurei mali colore, unguibus flavis, in exterioribus nigricantibus, nata: Item *ἀρχιάνθος*. E purpurea varia præcoce, purpurea ferotina ad rubrum tendente, vel dilutior eleganter: vel ad carneum colorem accedente: unguibus ex cæreuleo nigricantibus.

E pur-

E purpurea præcoci *αγγελικων* ferotina, rubra ferotina, unguibus & staminibus flavis; purpurea ferotina, unguibus nigricantibus: & purpurea varia ferotina. Sic ex ferotinis, aliquando præcoces, ut ex alba varia ferotina, natæ sunt præcoces, alba, flava, rubra, unguibus, flavis, rubra Oculus folis, & purpuro dilutor.

Nec omnes versicolores, tam præcoces, quam ferotina, singulis annis eandem coloris gratiam retinent: sed alternis sæpius variant: ut Flava varia & Alba varia, uno interdum anno nitidissimæ sunt, sequenti vix alius color quam flavus, vel albus conspicitur: sic Rubra varia & Purpurea varia, nonnunquam magnas oras flavas & albas habent, sequente valde exiguas. In summa, tanta in Tulipis colorum varietas, ita ut singulis annis adhuc nascantur, quibus pares nunquam antè conspiciuntur: ita Deus in ipsis floribus admirabilem suam potestatem ostendit, ut ex prædictis, ex Clusio, Lobelio, Camerario, propriaque observatione adductis, colligere est: ita ut ducentarum specierum numerum superare deprehensum sit. Sic in Florilegio Svertij, Tulipæ imprimis variegatæ differentia triginta duæ proponuntur: quemadmodum & in Florilegio de Bry, & etiam Pafini, aliquot species exhibentur: & in horto Eyllert. supra quinquaginta depinguntur.

V. Tulipa bulbos in foliorum alis ferens. Tulipa bulbifera, Cusius pan. & hist. Taber. Ger. Tulipa prolifera, Cam.

### TULIPA PUMILIO.

I. Tulipa pumilio latifolia alba. Tulipa pumilio alba unguibus luteis, Eyllert.

II. Tulipa pumilio latifolia sulphurea. Tulipa pumilio fulvo sulphurei coloris, Eyllert.

III. Tulipa pumilio latifolia rubra. Tulipa pumilio, Lob. ico. Tulipa dubia humilior, Clus. pan. Tulipa dubia pumilio, Clus. hist. Tulipam nanam sive pumilionem flore luteo, Camer. habuit.

IV. Tulipa pumilio angustifolia.

Tulida pumilio altera, Clus. hist. Tulipa pumilio angustifolia alba, Lobel. ad. part. alt.

V. Tulipa pumilio gramineo folio. Tulipa pumilio alba altera Lusitanica, Lobel. ad. part. alt.

### TULIPA MINOR.

I. Tulipa minor lutea Italica. an Narcissus octavus, Matth. comp. quem sub Narcisso Constantinopolitano primo Matthioli, ex ejus hist. latina, Lugd. proposuit. Lilionarcissus Bononiensis luteus, sive Tulipa, Lob. Lugd.

Lilionarcissus Bononiensis, Eyst. & *αγγελικων* *αγγελικων*, Cam. in Matthiolum. Lonchitis, Cæf.

Tulipa Apenninea, Clus. hist. Italica prima, Taber.

Tulipa Bononiensis, Ger. quæ plerumque polyclonos, Cam.

Senis, nonnunquam octonis folijs, flos constat.

II. Tulipa minor folio latiore. Tulipæ Byzantinæ genus alterum, Clusius hist.

III. Tulipa minor rubra. Tulipa rubra Apenninæ similis, Clus. hist. Tulipa rubra angustifolia facie Bononiensis, Lob. ad. part. 2.

IV. Tulipa bombycina Cretica. Tulipa bombycina flore rubro, Robert. Svert. & Bry. an Tulipa Cretica Caccini, Clus. cur. post.

Tulipam Bononiensem facie & formâ refert, sed bulbis lanugine obdus, & veluti remotus est.

V. Tulipa minor lutea Gallica. Tulipa minor Narbonensis, Dodonæ. minor, Lugdun.

Narcissolilium luteum, Ad. Lilionarcissus Narbonensis luteus montanus, Lobel.

Tulipa Narbonensis, Clus. pan. & hist. Cam. & Ger. tit. trans.

Tulipa Italica secunda, Tab. Clusius in cur. post. meminit Creticæ Caccini, Mompelianæ, & ejus quæ in montanis Placentinæ (at hæc quanam est?) nascitur.

VI. Tu-

VI. Tulipa minor ex luteo purpurascens.  
 Tulipa Hispanica, Clus. pan. & hist.  
 VII. Tulipa variegata Persica.  
 Tulipa Persica, Rob. Svvert. Bry. & Eystet.

Tulipa Persica minor altera, Clus. cur. post.  
 Folia tria interiora alba, tria exteriora rubra,  
 per oras albicantia, ungue nigrâ maculâ nota-  
 to, Raminibus violaceis.

## FRITILLARIA.

**F**ritillaria, ab abaco in quo Scacorum lusus exercetur, quem Fritillum dici existimant, nomen habet: alijs Meleagris à Meleagridis, avis plumis, quas, si non coloris specie, tamen varietate, & dispositione, & macularum magnitudine, refert.

I. Fritillaria præcox purpurea variegata.  
 Meleagris, Dod. Meleagris flos, Lugd.  
 Fritillaria, sive Lilionarcissus purpureus varie-  
 gatus, Lob. & ad. part. 2.  
 Fritillaria dilutior, Clus. pan. & hist. cui &  
 Lilium variegatum vulgo.  
 Fritill. & Narciss. Caparoni, ab inventore, Cam.  
 Fritillaria, Eyst.

Fritillaria vulgaris purpureo colore, Svvert.  
 Flos sâpissimè unicus, interdum bini, rarò  
 terni: sex folijs ut plurimum constans, rarius  
 octonis & duodenis: areolis nunc quadratis,  
 nunc longiusculis, colore partim candidi, par-  
 tim purpurei, sive saturatioris carnei: est alia  
 præcocior, alia serotina, & harum quadræ, ut  
 plurimum saturatius, interdum dilutius pur-  
 purascunt. Huc pertinet

Meleagris flore max. Ital. flore gemello, Eyst.

II. Fritillaria ramosa.

Fritillaria maxima purpurei coloris, Svvert.

III. Fritillaria polyanthos flavoviridis.

Fritillaria polyanthos lutea, Eyst.

Fritillaria triceps colore flavo viridi, du Bry.

IV. Fritillaria umbellifera.

Fritillaria Hispa. umbellifera, Rob. Svvert. & Bry.

V. Fritillaria flore magno pleno.

Fritillaria flore pleno, Cam. Eyst.

VI. Fritillaria alba variegata.

Fritillaria alba ex phaiopurpureo tessulata,  
 Lob. ad. part. 2.

VII. Fritillaria alba præcox.

Fritillaria alba altera, Lob. ad. part. 2.

Fritillaria alba, Clus. hist. app. alt. & in app. 2.  
 au. & unius flos totus albus: aliterius foris albus,  
 internè venis quibusdam purpurascensibus dis-  
 tinctus, & in cur. post.

Fritillaria albo flore, Svvert. alba, Eyst.

VIII. Fritillaria serotina atropurpurea.

Fritillaria saturatior, Clus. pan.

Meleagris altera, Dod.

Lilionarcissus variegatus atropurpureus Xan-  
 tonicus, Lob.

Fritillaria Xantonica serotina, Lob. ad. par. 2.

IX. Fritillaria serotina floribus ex flavo vi-  
 rentibus.

Fritillaria 2. Clus. pan.

Fritillaria Aquitanica, Clus. hist.

Fritillaria Clusij, & Brisotti serotina, Lob. ad.  
 part. 2.

Fritillaria minor obsoleto colore inodora, Eyst.

Fritillaria Aquitanica flore luteo obscuro, Svvert.

X. Fritillaria flava rubris maculis distincta:

Fritillariæ tert. genus, flavo colore, Clus. hist.

Fritillaria lutea Someri, Lob. ad. par. 2. Svvert.

XI. Fritill. angustifolia lutea variegat. magno fl.

Fritillaria, juncifolia, Eyst.

XII. Fritillaria angustifolia lutea variega-  
 ta parvo flore.

Fritillaria Lusitanica, Clus. cur. post.

XIII. Fritillaria flore minore.

Fritillaria Pyrenæa, Clus. hist. ap.

Fritillaria nigra Pyrenæa, Lob. ad. part. 2.

Fritillaria Pyrenæa obsoleto luteo colore, Eyst.

Flos exterior obsoleti color. venis flavescen-  
 tibus distinctus: interior, ex viridi flavescens,  
 maculis saturatè purpurascens, resularum  
 dispositis notatus: odore gravi.

Variat: 1. interne ex luteo virefcir, oris re-  
 flexis lineis viridibus striatis, à medio ad cen-  
 trum subfusca purpura tessulatus. 2. Flos hila-  
 rior purpurascens, tessulis similibus prædictis.  
 3. ex luteo magis viridi parum subfuscus, intra  
 minus tessulatus: 4. ex fusco & luteo subliv-  
 idus, intra minus tessulatus.

XIV. Fritillaria minima plurius floribus.

Fritillaria minima, Svvert.

## SECTIO TERTIA.

## CROCUS: COLCHICUM: ORNITHOGALON.

## CROCUS ET EJUS SPECIES.

**C**rocum puerum, cum Smilacem virginem adamaret, in hunc sui nominis florem ver-  
sum esse, Virgil. & Plin. Lib. 6. 33. restantur. Krokos vero, filum villumq; significat, cu-  
jusmodi sunt croci stamina, seu villi, qui kroxides appellantur, qui plerumq; serri, nonnun-  
quam etiam plures in floris medio conspiciuntur; & cum soli in usum veniant, per excellen-  
tiam Croci nomine donantur.

Genera duo secit Theophrastus, scilicet, de quo 3. hist. 6. 6. ejusdem 6. 7. ejusd. 9. & 10. Mon-  
tanum, de quo 6. hist. 7. At Dioscorides 1. c. 25. satvi meminit, qui pro ratione Regionum, in  
quibus plantatur, variat. Sic sylvestrem dicimus, alium majorem, alium minorem. Alium  
vernum, alium autumnalem: qui rursus colore & floris & foliorum variant.

## I. Crocus sativus.

Crocus, Brunf. Trag. Fuch. Tur Dod. Cord. Lac.

Gel. Lon. Lob. Tab. Sativus, Ang. Lugd.

Crocus sativus autumnalis, Eysf.

Crocum, Matth. Cast. Cies. hortense, Cam.

Hic aliquando bis per annum florere solet,  
alias nihil à vulgari differens: & hic dicitur  
Crocus biflorus, Eysf.

Habetur Crocus verus purpureo colore, apud  
Svèrè.

## II. CROCUS SEROTINUS.

a. I. Crocus alpinus autumnalis.

Crocum montanum, Clus. hisp. (r. in hist.)  
Lugdun.

Crocus montanus autumnalis, Lob.

Crocus sylv. autumnalis, Dod. Cam.

Croci alterum genus sylv. Cies.

Crocus montanus vernus, Eysfett.

Flores modò candicantes, modò purpura-  
scentes, instar sativi, sed dilutiores & mi-  
niores.

II. Crocus autumnalis florem sine folijs pro-  
mens odoros.

Crocus montanus 2. Clus. hist.

Crocus sylv. autumnalis, Lob. ad. par. 2.

III. Crocus autumnalis subcaeruleus mul-  
tiflorus.

Crocum montanum 3. Clus. hist.

Hic affinis

Crocus sylv. Byzant. serotinus, Lob. ad. par. 2.

IV. Crocus autumnalis flore minore.

Crocum Pyrenæum autumnale, Clus. hist. ap. 2.

V. Crocus autumnalis flore majore vari-  
egato.

Crocus montanus autumnalis, Portæ.

## CROCUS VERNUS

latifolius

I. Crocus vernus latifolius purpureus va-  
riegatus.

Crocus vernus latifol. purpur. versicolore flore  
vel 1. Clus. hist.

Variat flore, qui communiter sex, quandoq;  
octo folijs donatur.

II. Crocus vernus latifolius flore purpureo  
magno.

Crocus vern. latifol. purp. fl. majore, Clus. hist.

III. Crocus vernus latif. albus variegatus.

Crocus montanus sive alpinus, Ges. hor.

Crocus sylv. mont. fl. albo, Ad. Lob.

Crocus sylv. vernalis alter, Dod.

Crocus vernus major alter, Clus. hisp.

Crocus vernus latifol. albo flore, Eid. hist.

Variat, folijs externis venis purpurascen-  
tibus aspersis: aliquando foliorum mucrones



purpurascent: aliquando linea purpurea, vel nigra, per folium fertur, & hic est

Crocus flore albo lineis nigris, Svvert.

IV. Crocus vernus albus versicolor alter.

Crocus vernalis major 1. Clus. hisp. def.

Crocus vernus latifolius albus versicolore flore. 1. Eid. hist. def.

V. Crocus vernus latifolius purpureo violaceus.

Variat: 1. flore purpureo violaceo: 2. flore albo, purpureo violaceo basi: 3. aliquando flos superne purpureus inferius flavescent: 4. est & flore violaceo, vel caeruleo distincto: 5. vel caeruleo lineis violaceis variegato.

1. Crocus vernus purpureo violaceus, Lob.

Crocus sylv. vernalis prior, Dod.

Crocus vernalis major, Clus. hisp. & Lugd.

Crocus vernus latifolius purpur. flore minore, Clus. hist.

2. Crocus sylv. vernus 1. flore albo purpureo violaceo basi, Lob.

Crocus vernus albus fundo violaceo, Eyslett.

At Dodon. Clus. & Lugdun. utrumque una tabella exprimunt.

3. Crocus sylv. primus Dalech. Lugd.

4. Crocus vernus fl. violaceo, Eyslett.

Crocus violaceus & caeruleus distinctus, Svvert.

5. Crocus caeruleus lineis violaceis distinctus, Eid.

VI. Crocus vernus flore pleno.

Crocus vern. latifol. duplici flore, Clus. hist.

VII. Crocus vernus latifolius, multiflorus.

Crocus vernus polyanthos, isque duplex, Eyslett. alter purpureo violaceus, lineis candidis: alter floribus candidis, lineis purpureo caeruleis.

Crocus vernus multiflorus alb. facie lutei majoris, Svvert.

VIII. Crocus vernus minor albicans.

Crocus montani species, Gcf. hort.

Crocus sylv. minor prior, vel sylv. 4. Dod.

Crocus vernus serotinus primus, Lob. ico.

Crocus vernus latifolius albus versicolore flore 2. Clus. hist. ico.

IX. Crocus vernus minor purpurascens.

Crocus montanus flore ex candido & puniceo mixtis, Gcf. hort.

Crocus sylv. 5. vel minor sylv. alter, Dod.

Crocus vernus albus 2. Lob. ico.

Crocus vernus latifolius albus versicolore flore 1. Clus. hist. ico.

Crocus vernus flore vario, Cam.

Crocus serotinus, Lugd. quem preced. junxit.

Crocus purpureo rubens, Svvert.

X. Crocus vernus latifolius albus, vel cinericeus.

Crocus cinericeus, duplex, Svvert.

XI. Crocus columbinus duplex, Svvert. (quid?)

## CROCUS VERNUS LATIFOLIUS

luteus, aureus, &c.

### I. Crocus vernus latifolius flavus.

Crocus vernus latif. flavo flore, vel Croci sexti species prima, Clus. hist.

Crocus vernus luteus 1. Lob. ad. part. 2.

Crocus flore luteo, Svvert.

Crocus vernus polyanthos flore luteo, Eyslett.

Variat: 1. flore flavo sive fulvo nitido latiore, & majore. 2. minore & pallidior. 3. flore luteo corona phenicea, Lob. ad. part. 2.

### II. Crocus vernus latifolius aureus.

Crocus vernus Mexiacus, Clus. pan.

Crocus vernus latifol. fl. aureo, vel Croci sexti alia species, Clus. hist.

Crocus aureus, Lob. ad. part. 2.

### III. Crocus vernus latifolius pallidus.

Crocus vernus Mexiacus 2. Clus. pan.

Crocus vernus latifolius pallido flore, Eidem hist.

Crocus luteus flore pallido, Lob. ad. part. 2.

### IV. Crocus vernus latifolius flavo vario.

Crocus vernus latifolius flavo vario flore 1. vel

Crocus vernus 7. Clus. hist.

Crocus vernus latifolius flavo vario flore Constantinopolitanus, seu Crocus luteus alter, Lob. ad. part. 2.

Crocus luteus lineis nigris, Svvert.

### V. Crocus vernus latifolius flavo vario alter.

Crocus verni latifol. flavo vario flore, vel Croci verni septimalia species, Clus. hist.

Crocus sylv. vernus versicolor aureo rutilo panico color, Lob. ad. part. 2.

A priore potissimum differt radiis, foliorum exteriorum dorsum totum insensitibus.

### VI. Crocus vernus latifolius flavo vario flore duplici, Clus. hist.

Crocus vernus latifolius secundus Constantinopolitanus, Lob. ad. part. 2.



## CROCUS VERNUS ANGU-

stifolius.

I. Crocus vernus angustifol. magno flore.  
 Crocus syl. angustifolius, Ang.  
 Crocus vernus minor primus, Clus. hisp. Lugd.  
 (quem cum 3. jungit) Tab.  
 Crocus vernus angustifol. 1. Clus. hist.  
 Crocus syl. min. Hispanicus flore patulo, vulgo  
 Nozilicha minor, Lob.  
 Crocus vernus, Ger.

Variat: flores inferne flavescent, intus candi-  
 dant, reliqua ad caeruleum sive violaceum  
 vergunt: inveniuntur & toti candidi.

II. Crocus vernus angustifolius gemino  
 bulbo,

Crocus sylvestris, Lob.  
 Crocus vernus minor alter, Clus. hisp. Tab.  
 Crocus vernus angustifolius 2. Clus. hisp. desc.  
 Crocus syl. vernalis minor alter, Dod.  
 Croci verni minoris alterum genus, Lugd.  
 Crocus syl. 1. Dalech. Lugd.  
 Crocus vernus flore violaceo, Eysert.

Flos ex folijs sex, aliquando octo constat.

III. Crocus vernus angustifolius parvo  
 flore.

Crocus syl. vernalis 6. Dod.  
 Crocus vernus minor 3. Clus. hisp. Lugd. Tab.  
 Crocus vernus angustifolius 3. desc. at ico. 2.  
 Clus. hist.  
 Crocus sylvestris Hispanicus, vulgo Nozili-  
 cha major, Lob.  
 Crocus vernus minor, Ger.

IV. Crocus vernus junctifolius purpureus.  
 Crocus vernus angustifolius quartus, sive vio-  
 laceo flore, Clus. hist.

Hujus iconem figuræ primæ Lobelius in ico-  
 nibus junxit.

V. Crocus vernus capillari folio, Clus. hist.  
 ap. 1. & ap. 2. sine & cur. post.

Duplex est, unus purpurascens flore, ipsius  
 folijs tribus venis saturatoribus distinctis:  
 alter albo flore, qui etiam duplex, flore ma-  
 jore, & minore.

VI. Crocus vernus angustifol. variegatus.  
 Crocus vernus aureus variegatus, Eysert.

Flos interius aureus, exterius strijs ex pur-  
 pura nigricantibus radiatus.

## COLCHICUM ET EJUS SPECIES.

**K**ολχικόν, quod plurimum in Colchide nascitur, Dioscoridi lib. 4. cap. 84. ενι σπινθάρων,  
 quod eadem die, quâ sumptum, interficiat. Colchici appellatio apud Plin. lib. 22. cap. 9.  
 inter venena reperitur.

## Colchicum autumnale.

I. Colchicum commune.  
 Primula Veris, Brunf.  
 Colchicum, Trag. Tur. Fuch. Dod. Matth.  
 Lac. Gelsier. hor. Lon. Cast. descrip. at Epheme-  
 ritum, ico.  
 Colchicum ulgram & subrubens, Cord. hist.  
 Colchicum sive strangulatorium & Epheme-  
 ritum crocifolium, & bulbi folium, Ad. Costæo.  
 Lob.  
 Ephemeretum venenosum, Amato.  
 Hermodactylus vulgo & Crocus syl. Cæs.  
 Colchicum Ephemerum, Lugd.  
 Colchicum masculinum & femininum, Tab.  
 Germanicum, Ger. & album, Eid.  
 Colchicum commune pallido colore, Svvert.  
 Hermodactylus niger & rufus, Mesueo & Se-  
 rapioni.

Variat: nam in montibus folio est latiore,  
 in pratis angustiore: flore communiter dilute  
 vel saturate purpurascens, aliquando albo:  
 bulbo nigricante, aut rubente foris & interius.

Quare  
 Colchicum vulgare purpurascens flore, &  
 Colchicum vulgare album, Eysert. &  
 Colchicum autumnale flore albo & flore ru-  
 bello, Eidem.

Addit Svvertius  
 Colchicum, cui hoc solum peculiare, quod au-  
 tumno folia proferat.

II. Colchicum radice siccata alba.  
 Colchicum album, Cord. hist.  
 Hermodactylus legitimus, Dod.  
 Hermodactyli non venenati officin. Lobel.  
 ico.  
 Hermodactylus officin. Lon. Tab. Orientalis,  
 Cæsalpinia, & 301. 101.

*Hermodylus albus, Serapioni.*

III. *Colchicum Anglicum candidum angustifolius.*

*Colchicum candido flore Anglicum, Ad. & Lob.*

*Colchicum Anglicum Lobelij, Lugd. album, Clus. hist. Tab. & Ger.*

Huc referri potest quod flore dilutioris coloris & lactei candoris:

*Colchicum Lusitanicum serotinum, Lob. ob.*

*Colchicum pratense Salmanticum, Clus. hist.*

IV. *Colchicum montanum angustifolium.*

*Colchicum mont. Clus. hisp. Lugd.*

*Colchicum montanum Hispanicum & Aztecum, Clus. hist.*

*Colchicum minus, Lob. Tab. & montanum, Ejd. & Ger.*

*Colchicum Hispan. parvum, Cam.*

*Colchicum mont. minim. angustifol. autumn. Eyttett.*

V. *Colchicum pumilum croci folijs.*

*Colchicum minim. tenuif. Gallacium, Lob. ad. par. 2.*

VI. *Colchicum Illyricum, Ang. Lob. Lugd. Tab. Ger. Clus. hist. (quod sibi nunquam conspectum scribit) quid?*

VII. *Colchicum vere & autumn. florens.*

*Colchicum biflorum, Clus. hist. Lob. ad. par. 2. & Eyttett.*

*Colchicum variegatum.*

I. *Colchicum florum folijs albis & rubris alternatim dispositis.*

*Colchicum album & rubrum, Eytt.*

II. *Colchicum multiflorum.*

*Colchicum exoricum folijs ternis purp. ac alijs ternis albicantibus, variana: Eytt.*

III. *Colchicum alb. strijs variegatum.*

*Colchicum mixtum autumnale, Eytt.*

Flos albus, strijs saturatè rubris seu sanguineis maculis inæqualibus infectus.

IV. *Colchicum polydorum variegatum.*

*Colchicum versicolor polyanthes reslorescens, Eyttett.*

Flos in albo pallidus, strijs & maculis dilutè purpurascens variegatus, & ejus medio alius flos prolis modo exurgit.

V. *Colchicum latifol. variegatum.*

*Colchicum 4. sive latifolium, Clus. hist.*

*Colchicum Lusitanicum forte, Eidem.*

*Colchicum Byzantinum polyanthos Fritillariæ facie autumnale, Eytt.*

VI. *Colchicum purpureo lacteo variegatum.*

*Colchicum versicolore flore livej. & nemoros.*

*Clus. hist.*

Huc refer

*Colchicum album strijs purpureoceruleis variegatum, Eytt.*

*Colchicum album distinct. lineis rubris, Syver.*

VII. *Colchicum ex albo & purpurascens varium.*

*Colchicum nemoros.* alterum, *Clus. hist. ap. 2.*

VIII. *Colchicum flore Fritillariæ instar tessellatis.*

*Colchicum Neapolitanum, Clus. hist. & ap. 2.*

*Colchicum Fritillariæ facie pallidum, Syver.*

IX. *Colchicum florum folijs angustis & variegatis.*

*Colchicum montanum minus versicolore flore, Clus. hist.*

Floris folia longa & angusta, interius alba, exterius media parte viridia, altera carnis coloris.

X. *Colchicum pleno flore variegatum.*

*Colchicum fl. pleno maculatum autumn. Eytt.*

XI. *Colchicum latifol. multiflorum variegat.*

*Colchicum polyanthos candid. elegant. rubore varium, Lob. ad. par. 2.*

Folia latiora, cubitalia longitudinis.

*Colchicum polyanthes, sive multiflor. simplex & plenum.*

I. *Colchicum candidum multiflorum.*

*Colchicum Pannonicum multifloro albo flore, Clus. hist. Cam.*

*Colchicum candid. Pannon. polyanth. Lob. ic.*

*Colchicum polyanth. Tab. vulgare poly. Eytt.*

*Colchicum Pannon. Ger. albo flore, Syver.*

Septenis, denis, duodenis, vel pluribus floribus lactei candoris: floribus etiam eleganter rubentibus reperitur: & hoc dicitur

*Colchicum polyanthos, Lob. ad. par. 2.*

II. *Colchicum polyanthes lato Ellebori albi folio.*

*Colchicum Byzantinum multiflorum, Clus. hist.*

III. *Colchicum polyanthos multiplex.*

*Colchicum polyanthos flore multiplici autumnale, Eytt.*

IV. Col-

## IV. Colchicum pleno flore.

Colchicum *autumnale*, sive pleno flore, Clus. hist. & ap. 1.

Colchicum pleno flore, Lob. ad. par. 2.

Colchicum autumnale, Eystett.

Quod bulbosus major & vetustior, eo plures, majores & majore foliorum numero, flores constant. Sunt etiam flore albo vel purpureo, quod

Colchicum vernum fl. pleno purpureo, Eyst.

Colchicum album rubr. pleno flore, Svvert.

V. Colchicum polyanthes folijs latis convolutis.

Colchicum vernum flore purpureo plenum, Eystett.

*Colchicum vernum.*

## I. Colchicum vernum Helveticum.

Colchicum subobscuro flore & minore, Ges. Camer. Colchicum vere prodians, Eidem Matth.

an Colchicum brumale, Lob. Belg.

## II. Colchicum vernum Hispanicum.

Colchicum vernum, Clus. hist. ap. 2.

Colchicum vernum fl. purpureo, Svvert.

Flore est antequam se expandat albo, postea coloris purpurei dilutionis vel saturationis.

## III. Colchicum Alexandrinum, quid?

Colchicum Orientale, Matth. alterum Orient. Matthioli, Lugd.

Colchicum Syriacum Alexandrinum, Lob. Ad. Tab. Ger.

Tulipæ genus, quale Appenninæ videtur, Clus. hist.

Item scribit, se semen Colchico semine simile nomine Hermodactyli Syriaci accepisse.

## COLCHICUM LUTEUM.

## I. Colchicum luteum majus.

Lirium alterum, Theophrasti.

Helichryso Cratææ similis, Ang.

Narcissus in Apenino, Marcell. autumnalis quorundam, Clus. hisp. Lugd.

Narcissus autumnalis major, Dod. Clus. hist. Ger.

Narcissus autumnalis flore luteo, Eyst.

Narcissus autumnalis, Cæsalp. & Lob. ad. par. 2. (cui & Colchico-Narcissus) autumnalis luteus, Cam.

Colchicum luteum, Lob. Tab. luteo flore, Svvert.

Variat in hortis Belgij angustioribus folijs & cauliculo dodrantali surrecto, Lob. obs. & Dod. ac Clus. hist. aliquando largiore foliorum numero à præcedente discrepat, & est Narcissus autumnalis flore luteo multiplex, Eystett.

## II. Colchicum melino flore.

Narcissus Persicus, Clus. pan. & hist. Camer. Tab. Ger.

## III. Colchico luteo similis flore albo.

Sparganium Placæ, Clus. hisp. & hist.

## IV. Colchicum luteum minus.

Colchicum parvum mont. lut. Lob. ico. Ger.

Narcissus autumnalis minor, Clus. hist.

Colchicum mont. luteum minus, Tab.

## V. Colchicum luteum vernum.

Narcissus vernus præcocior flavo flore, Clus. hist. ap. 2.

Narcissus luteus vernus facie Narcissi autumnalis lutei, Lob. ad. par. 2.

Narcissus vernus flore luteo, Svvert.

an Colchicum vernum flavo flore Plateau, Clus. hist.

## ORNITHOGALUM ET EJUS SPECIES.

**O**rnithogalum, propter lacteum colorem, qui in flore nitet, similem ei, qui in alis aut orvis gallinarum observatur, nomen accepisse videtur. Dioscorides lib. 2. cap. 174. unius, ut & Plin. lib. 21. cap. 17. Ornithogale nominant, meminere. Sunt qui Bulbinum Theophr. 7. hist. 13. & Athenai censent.

## ORNITHOGALUM UMBELLATUM album.

## I. Ornithogalum umbellatum maximum.

an Narcissus quartus, Matth. Lugd. Tab.

Ornithogalum majus, Dod. Arabicum, Clus. pan. & hist. Eyst. italicum, Cam.

Lilionarcissus polyanthos, Lob. ob.

Lilium Alexand. Neotericorum, Lob. ico. Cam.

Hyacinthus de Padro nostro Italicorum, Clus. hist. ap. 2. negans esse Narcissum 4. Matthioli,

quod prius asseruerat.

Dulipan apud nos barbaro nomine, Cæsalp.

Orni-

Ornithogalum Arabicum multiflorum album, umbilico interiore nigro. Svvert.

II. Ornithogalum umbellat. majus angust. Ornithogalum medium, Eyst.

Flores intus candidi, exterius virescentes, flammibus ex viridi pallescentibus.

III. Ornithogalum umbellat. alb. medium latifolium.

Ornithogalum aliud vulgare, Clus. hist.

IV. Ornithogalum umbellat. med. angust.

Ornithogale, Manardo, Hermolao.

Ornithogalum Dod. gal. Tur. Ang. Ges. hor.

Ama. Ger. Cast. vulgo; Casalp. secundum, Matth. Lugd.

Ornithogalum s. five vulgare, Clus. hist. & pan.

Ornithogalum candido flore, Cord. in Dioscorid.

Ornithogalum candidum vulgare, Ad. Lob.

Bulbus Leucanthemos minor, Dod. Lugd.

Ornithogalum alterum minus, Cam.

Bulbus folsequius, Tab.

Ornithogalum spicatum, Svvert.

Est & folijs gramineis, ut in ceteris humistratis. Matthiolus duplex habet, & utrumque caule folioso pingit: quare in Lugd. historia utrumque à Dod. dissepte scribitur: sic Lacuna & Lugd. Matthioli utrumque figuram proponunt: at Lonicerus, primam tantum, quam fidem suspicatur.

V. Ornithogalum album minus.

Ornithogal. minus è Pyrenæis, Clus. hist. ap. I.

Ornithogalum minus, Eyst.

VI. Ornithogalum umbellatum flosculis ex albo subcæruleis.

Ornithogalum Hispanicum minus, Clus. hist.

## ORNITHOGALUM SPICATUM.

I. Ornithogalum latifolium & maximum.

Ornithogalum magnum Myconi, Lugd.

Ornithogalum maximum, Clus. hist. ap. I.

Ornithogalum vel Liliū Alexandrinum floribus albis innumerabilibus, Svvert.

Magna florum spica, aliquando centenis floribus nivei coloris.

II. Ornithogalum latifolium alterum.

Ornithogalum Æthiopieum, Clus. cur. post.

Ornithogalum Indicum promont. Bonæ spei, Svvert.

III. Ornithogalum angustifolium majus,

floribus ex albo virescentibus.

Asphodelus femina, Dod. Gal. Ges. hor.

Asphodelus Galeni, Lac. balbosus Gal. Dod. Lugd. Cam. Ger.

Asphodel. Hyacinthinus forrè Galeni, Ad. Lob.

obf. Hyacintho asphodelus, Lob. ico.

Ornithogalum majus, Clus. in pan. majus primum, Eid. hist.

Ornithogalum Pyrenæum, Clus. cur. post.

Ornithogalum aliud spicatum, Cam.

IV. Ornithogalum angustifolium, spicatum maximum.

Ornithogalum lacteum, spicatum max. Eyst.

V. Ornithogal. spic. seu comosum fl. lacteo.

Ornithogali lactei speciei major, Eyst.

VI. Ornithogal. majus spicatum flore albo.

Ornithogalum Narbonense, Dod. Lugd. spicatum, Cam.

Ornithog. spicatum Monspel. flore lacteo, Lob.

Ornithogalum alterum, Cam. apud. Matthiol.

qui vulgari adjunxit.

Bulbus Ornithogalo similis Cas.

Ornithogalum majus Monspel. Clus. pan. secundum, Eid. hist.

Ornithogalum spicatum flore lacteo, Eyst.

Mans. Dioscorid. lib. 3. cap. 14. Theophr. 7.

hist. II. & Epimedium Plinii, lib. 19. cap. 5.

VII. Ornithogal. majus spicatum alterum.

Ornithogal. 3. vel majus Byzantin. Clus. hist.

Ornithogalum spicatum minus, Lob. obf.

VIII. Ornithogal. majus spic. flore lacteo.

Bulbus Ornithogalo similis, flore lacteo, Cas.

IX. Ornithog. spicatum fl. viridi lactescente.

Ornithog. Pannon. albo flore, Clus. pan. & hist.

Ornithogal. Pannon. Tab. Ger. Eyst.

Ornithogalum flore albo viridique linea in dorso prædico, Svvert.

an Ornithogalum ferotinum, Cam.

X. Ornithogalum spicatum album.

Ornithogalum Hispanicum spicatum, Eyst.

XI. Ornithogalum cæruleo pallente flore.

Ornithogalum cæruleum pallens Hyacintho autumnali pene par, Lob. obf.

XII. Ornithogalum exoticum magnifloro, minore in pato.

Hyacinth. arborum Ornithogaloides, Colam.

Narcissus 4. Matthioli, Clus. hist. ap. 2.

Ornithogal. Neapolitanum, Eidem ap. 2. Eyst.

Ornithogalum Neapolitanum flore interius candido, exterius cinereo, Svvert.

Phalangij nomine, Honor. Belliæ Creta misit.

ORNI-

## ORNITHOGALUM LUTEUM.

I. Ornithogalum luteum sive pallidum majus.

Ornithogalum 7. sive pallido flore, Clus. hist.

II. Ornithogalum luteum magno flore.

Ornithogalum 8. sive Alcmarianum, Clus. hist.

III. Ornithogalum luteum.

Bulbus, Trag. (cepa agrestis) Lac. sylv. Ruel.

Fuch. Tur. Ges. cat. Dod. Lugd. Cam. Eyf.

Bulbus sylv. alius bifolius, Ges. hor.

Silybriichium, Cord. hist.

Bulbus esculentus, Cast. Lon.

Ornithogalum luteum, Cord. in Diosc. Ad Lob.

Tab. Lugd. Col. Syvert.

Bulbus Ornithogalo similis florib. luteis, Cae.

Ubi adolevit, folia inferiora amittit, quare apud Tabernam. & Cera. duæ figurae.

Ornithogali lutei, & Ornithogali majoris, Taber.

Ornithog. lutei & Cepæ agrarie nomine, Ges.

IV. Ornithogalum luteum minus.

Ornithogalum 10. sive Pannonic. luteo flore, Clus. pan. & hist.

Ornithogali lutei species minor, Lob. obs.

V. Ornithogal. angustifol. bulbiferum.

Ornithogalum angustifolium campestre luteum minimum bulbosum, Colum.

Variat: nam locis pinguioribus folia latiora & plura, sicut & flores: folia circa bulbillos hirsuta & candidiora sunt.

## SECTIO QUARTA

## CEPA: PORRUM: SCILLA:

## ALLIVM ET MOLT.

## CEPA ET EJUS SPECIES.

**A**egyptiorum numina, Cepas & Allium (Plin. l. 19. c. 6.) prosequamur. Cepa à capitis magnitudine, Græci κεράυων, in regem ovipeden mētē: quod oculis popillam comprimere cogat, ut pore secundum Aristot. 20. probl. 22. mordaci nimium vapore lancinando & lacrymas movendo.

Genera Theophrast. 7. hist. 4. à locis cognominata refert, Gardiam, Cnidiam, Samothraciam, Satanicam, Afcaloniam, & fiftolem. At Dioscorides l. 2. c. 181. longe, rotunda, flava & candida meminit. Plin. l. 9. c. 6. Cepa, inquit, genera apud Græcos Sardica, Samothracia, Afcidena, Sesania, Schista, Afcaloniam, &c.

Quare alia major est, alia minor: alia candida, alia viridis, alia rufa, alia subrubens: alia est rotunda, alia oblonga: omnes ut plurimum duplici aut triplici membrana, quas Feflum & allas, alij tunicas vocant, vestita. Sic alia acerrima, alia mediocriter acris, aut nihil ferè acedinis habentes. Sic alia feruntur, alia deponuntur: aliquando feminis loco bulbos gerant, ut Dalechampius notavit.

I. Cepa vulgaris.

Cepa, Brunf. Ges. Lob.

Cepa, Trag. Fuch. Tur. Matthiol. Lat. Cord. in

Diosc. Ang. Cast. Cae. capitata, Matth.

Cepa rotunda, Dod.

Cepa sativa Matthioli, Lugd.

Cepa alba & rubra, Ges. hort. Lon. Tab.

Variat colore florib. vel candido, vel purpurascens: tunicarum quoque, coloris rubri, aut candidi: radice forma, major est, & minor oblonga, scissilis, vel orbiculata, turbinata, qui-

busdam communioribus, in compressam laticrem circumferentiam bulbaceam abit.

Cepas porraceas, vocant stolones, qui primo Vere, dum tenelli sunt, antequam caulescunt, in cibis eruntur.

II. Cepa oblonga, Dod. Ges. hor.

Cepa Hispanica oblonga, Lob. icon. Cam.

III. Cepa radice candida dulci,

Cepa quarta, Ges. hort.

IV. Cepa plurium caulium.

Cepa ovata à radice figura, Cord. hist.



V. Cēpa scetilis, Matth. Cast. Lugd.  
an Gethyon Græcis, & Cēpola Columellæ.

VI. Cēpa fissilis, Matth. Lugd. cui & Cēpa  
Portæ.

Cēpis affinis Muligia, Cæf.

VII. Cēpa scetilis, Trag. Geth. hor.

Cēpa Ascalonica, Matth. Lugd. cui fortē Bul-

bus Serapius, quem Theoph. & Plin. Cēpa ge-  
nus esse testantur.

Cēpæ species sunt Ascalonia, Cast.

Cēpis affinis, Ascalonia vulgo, Cæf.

Scaliones, Tur.

Verūm & Lobelius hist. Belgica Ascalonidem  
antiquorum exhibuit, fortē a priore diversam.

## PORRUM EJUSQUE SPECIES.

**Q**uod *περα* Dioscorides L. 2. c. 179. vocavit, & in καφαλιτη, capitatum, & αμυλο-  
περα distinxit: id Latini Porrum, quod porro eat, & longe lateq. grassetur, voca-  
runt. Theophrast. 2. caus. 20. & 3. ejusdem 23. in καρις περα, tonsum porrum addidit: alius  
7. hist. 1. 2. 3. 4. 5. & 6. de Porro egit. At Plin. L. 2. c. 6. est scetivum & capitatum: & illud  
L. 9. c. 6. duplex fecit.

### I. Porrum commune capitatum.

Porrum, Brunf. Cord. in Diof. Dod. (& Porrus  
Palladij) Geth. hor. Ang. Lon. Cæf. Cast. Tab.

Porrum commune, Matth. Lugd. vulgare, Lob.

Porrum capitatum, Fuch. Tur.

Porrum capitatum Plinio, Hermol. Ruel. (cui

Gethyllidas Græcorum) Dodon. gal. vulgare,  
Camer.

### II. Porrum scetivum latifolium.

Porrum scetivum, Plin. Dod. Cæf. Lugd. Portæ.

Porrum scetivum capitatum, Matth. & (scetile)

Lac. Lugd.

Porrum tonsile & capitatum, Lob.

Porrum tonsile sive scetile, Cam.

Hæc duo genere non differunt, cum ex eo-  
dem semine generentur, & cultura solum dif-  
crepent: quia id quod ad culinaria juncula sa-  
pius deronderi solet, Scetivum aut Scetile Co-  
lumbellæ & Palladio nominatur: quod verò  
capitatum fieri debet, non tendendum, & au-  
tumnali tempore transferendum: etiam Plin-  
io monente.

### III. Porrum scetivum junceifolium.

Porrum scetivum, Trag. Fuch. Geth. hor. Lon.  
Lugdun.

Porrum scetile, Matth.

Cēpa Ascalonia, Matth. def. Ger.

Cēpa fissilis & Gethion. Tur.

Schenoprasum, Dod. Ad. Lob. (cui Ascalonia  
Matth.) Tab. Ger.

Porro tonsile cognatum, Cam.

Gethyllis, quam Cēparum genus Nicandri

Scholiastes dicit, Geth. hor. in Porro scetivo.

Differt à veterum Scetivo, cum illi folia lata,  
huic pro folijs junci inanes sint: hinc nomine  
ex Junco & Porro composito, Schenoprasum  
vocatur.

Majus & minus habetur: illud rarius & ad  
condimenta mitius, quod Gethium Gesniero  
minus vero Gethyllis.

Gethyllidem sylvest. Geth. lib. de hor. proponit.

### IV. Porrum folio latissimo.

Porrum Syriacum, Tab. Franco.

Porrum Indicum, Cam.

Scorodoprasum, Ger.

V. Porrum sylv. inodorum.

Porro simile, exilius & inodorum, Lob.

VI. Porrum sylv. gemino capite.

Ampeloprasum, seu Porrum syl. Lob. Lugd. cui  
à Matthioli diversum.

Porrum sylvestre primum, Tab.

VII. Porrum sylvestre vinearum.

Ampeloprasum, Matth. Ruel. Am. Ang. Gesn.  
hor. Cæf. Port. Lugd.

## SCILLA EJUSQUE SPECIES.

$\Sigma$ κῶλα Theophrast. 1. hist. 7. & 10. proposuit, & 7. hist. 11. Scilla Epimenidia vocata, &  
quæ ab usu muncipationem sortita sit, meminit. Sic Dioscorid. L. 2. c. 202. eubæas habet,  
& cap.



& cap. seq. *μακροκίων*, quod Scillam aliqui nominant. Genera duo Scilla medica, Plin. l. 19. c. 5. mascula albis folijs, fœmina nigris: & tertium genus cibus gratum, Epimenidium vocatam &c. Et l. 20. c. 9. Scillarum in Medicina alba est, quæ mascula, fœmina nigra: candidissima utilissima.

I. Scilla vulgaris radice rubra.

Pancratium & Scilla Dioscor.

Scilla fœmina, Plinio.

Squilla, Brunf.

Squilla, Trag. (& Cepa muris) Matth. Fuch.

Tur. Cord. in Dioscorid. Gesn. hort. Lac. Lugdun. Lon. Camer. Cæsalp. cujus bulbus rufi coloris, & nigra in montibus non longè à mari, reperitur.

Scilla communis & Pancratium, Dod. gal.

Scilla nigra & fœmina Plinij, & Pancratium Dioscoridis, Costæo.

Scilla major, Cast.

Pancratium, Ang. & Scilla vulgaris, Guil. Cluf. hisp. & hist. Dod. Lugd. Tab.

Scilla rubentibus radicis tunicis folio aloës carinato, Lobel.

II. Scilla radice alba.

Scilla, mascula Plinio: fœmina, Myreps.

Scilla, Marcell. Hermol. Manard. Ruel. Guil.

Dod. Hispanica, Cluf. hisp. & hist. Castap. Lug. alba, Eyft.

Scilla (sive cepa marina) Lob. major, Tab.

Scilla minor, sive Pancratium, Cast.

III. Scilla esculenta.

Scilla epimenidia, Theophr.

Scillæ 3. genus epimenidia, Plin.

Scilla vera & legitima, Ang.

Scilla dulcis & candida in Cephalonia, & Creta, Costæo in Mesuem.

## ALLIUM EJUSQUE SPECIES.

**A**llium forsè ab ἀλλοδαῖς exilire, quod exiliendo crescat. *Σκόροδος* Dioscoridi l. 2. c. 182. vel quæσι αἰώνιος ἴδιος, id est, rudis rosa, propter odorem gravem: vel quod comestum, vapores excrementitios ad cutem pellat, & vescentibus paniculationes moveat. Sunt qui ab halante gravi odore deducant, & Allium scribant.

Genera Dioscoridi, sativum & hortense, quod vel multiplici in Aegypto, vel singulari, ut Porrum, capite constet, cujus nucleos Græci ἀγλιδας nominant: aliud sylvestre, quod ὀξυγόδος. At Theophrasto 7. hist. 4. aliud præcox, aliud serotinum: differunt præterea magnitudine singulari: quedam etiam non nucleis, quedam verò multis consgmentantur, quos γίλας Theophr. ἀγλιδας, Galenus: σκελλιδας, Argineti l. 4. c. 33. οὐχας, Aetius lib. 6. cap. 11. vocat. Verum Plinio l. 19. c. 6. Generum Allij differentia, in tempore, præcox maturescit 60. diebus: sum in magnitudine. Ulpicum quoque, in hoc genere Græci appellavere. Allium Cyprium, alij Anisicoronon (fortè rectius Aphroscorodon) &c. sunt qui velint Allium Ulpicum Plinij, Allium Aegyptiacum Dioscoridi esse.

In Virginea multis locis Allium nascitur, ab Anglicano parum differens: desc. Virgin. quod ut & Cepe in Hispaniola, vix nunquam bonum evadit: par. 4. Amer. c. ult. Et Indi ex omnibus Europæis radicibus Allium eligunt, quo ventriculum reficiunt: Joseph. Acosta l. 4. c. 58.

I. Allium sativum.

Allium, Brunf. Trag. Matth. Ruel. Cord. in Dioscorid. Tur. Lac. Ang. Lon. Lobel. domesticum, Matth. Cast.

Allium hortense, Fuch. vulgare, Cam.

Allium sativum, Dod. Gesn. hor. Ad Cæs. Lugd.

Allium sativum multifidum, Cord. hist.

Verum Matthiolum, Lobelium & Dodonæum, una figura Allium sine flore, Allium cum flore,

& Allium ampicarpon; & Tabernæmon. sub Porro sylv. latifolio proposuit.

Genus quoddam capitibus ingentibus ex Africa adferri, Cæsalpini auctor est.

II. Allium sativum alterum: sive Allioprasum caulibus summo circumvoluto.

Allium sativum ampicarpon, quod & radicibus nucleis feritur, & seminibus, quæ nucleos similitudine referunt, Cord. hist.

*Allium sativum secundum, Dod.*  
*Scorodoprasum secundum, Clus. pan. & hist.*  
*Allium Creticum, sive Serpentinum, Cam.*  
 III. *Allium sativum radice simpliciter.*

*Μάλαρα, Hippocrati.*

*Allium mas, Matth.*

*Allium simplex, Cord. hist.*

*Allium sativum singulari capite, & Allium maculatum, Vercell.*

*Allium Ægyptiacum, Portæ.*

IV. *Allium Cyprium, Theoph.*

*Allium Ulpicum, Plin.*

*Allium Ulpicum vel Punicum, Columell.*

*Aphroscorodon, sive Allium Ulpium, Ruel. Gesner.*

*Allium Cyprium, sive Ulpicum, Portæ.*

*Allium sativum tertium, Dod.*

V. *Allioporum sive Scorodoprasum.*

*Scorodoprasum, Dioscor. l. 2. c. 183. Gal. Ægin.*

*Scorodoprasum, Trag. Matth. Cord. in Diosc.*

*Ges. hort. Lac. Cast. Lugd. Portæ.*

*Allium porrinum, Car. Stephano.*

*Scorodoprasum & porrum Turcicum, Amat.*

VI. *Allium sphaerico capite, folio latiore, sive scorodoprasum alterum.*

*Ampeloprasum primum, Dod.*

*Scorodoprasum sive allioporum, Ad.*

*Scorodoprasum, Lob. Cæs.*

*Scorodoprasum 1. Clus. pan. & hist.*

*Scorodoprasum alterum, Lug. qui cum sequenti eadem tabellâ pinxit.*

*Porrum Indum, Cam.*

VII. *Allium sphaerico capite folio angustiore.*

*Scorodoprasum alterum, Lob. Lugd.*

VIII. *Allium sylvestre latifolium.*

*Allium syl. quod urinum vocant, Plin. l. 19. c. 6.*

*Allium syl. Brunf. Trag. (& colubrinum) Eric. Cordo: syl. latioris folij, Dod.*

*Allium urinum, Matth. Fuch. Dod. gal. Ama.*

*Gescol. Tur. Clus. hist. Lugd. Thal. Cæs. Cast. Cam. Eystet.*

*Allium urinum latifolium, Ad. Lob. Lugd.*

*Allium sylvestre bifolium & arctoscorodum, Ges. hort.*

*Allium sylvestre ophioscorodon appellatum, Cord. in Diosc.*

*Ophioscorodon, Lon.*

*an Scorodoprasum.*

*Moly sive Allium Ursinum, Svvert.*

*Sunt qui Dioscoridis Scorodoprasum, aut ejus Ampeloprasum, aut Ophioscorodon, sed male, censent.*

IX. *Allium montanum, latifolium maculatum.*

*Allium anguinum, Matth. Lugd. Portæ, serpentinum, Cast.*

*Allium latifolium maculosum, sive serpentinum, Ad.*

*Ophioscorodon, Lob.*

*Victoralis longa, Ges. hort. Clus. pan. & hist. (cui & major) Eyst.*

*Allium alpinum, Gesn. hort. Dod. Tab. cui & Victoralis mas.*

*Est mas & femina, illa latioribus, hæc angustioribus est folijs, quare*

*Victoralis mas, & femina, Camerario dicitur.*

X. *Allium syl. campestre purpurascens.*

*Allium caninum primum, Trag.*

*Allium syl. primum, Fuch.*

*Allium campestre, Cord. in hist.*

*Allium sylvest. Ges. hort. Cæs. Cast. syl. minus, Dod. gal.*

*Allium tenuifolium, Cam.*

XI. *Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens majus.*

*Allium in arvis, Plinio.*

*Allium syl. quod Ophioscoridon, Ruel. Matth.*

*Allium syl. tenuifolium, Ad. Lob. ico. Dod.*

*Allium syl. vulgare seu caninum, Thal. tenuifolium, Franco.*

XII. *Allium syl. capitatum purpurascens minus: quod à primo potissimum magnitudine differt, cum palmare sit, & folijs juncis.*

XIII. *Allium syl. bicorni flore obsoleto.*

*Allium caninum alterum, Trag.*

*Allium syl. Tur. syl. alterum, Fuch.*

*Allium sylvestre majus, Dod. gal.*

*Allium rubentibus nucleis, Lob. ico.*

*Est majus & minus.*

XIV. *Allium aquaticum.*

*Allium fluviatile in sabulo ad Albim fluvium in Misnia, Franc. hort. Lusat.*

## ALLIUM MONTANUM.

I. *Allium montanum bicorni latifolium flore dilute purpurascens.*

*Allium sive Moly mont. latif. 1. Clus. pan. & hist.*

*Allium montanum bicorni angustifolium flore purpurascens.*

*Ampe-*

Ampeloprasson proliferum, Lob. ico. Cam.  
 Ampeloprasum 1. Cam. apud Matth.  
 Allium sive Moly montanum 2. Clus. pan. (&  
 Moly montanum gramineo folio) & hist.  
 Moly montanum carmesino colore, Svvert.

III. Allium mont. bicornie flore exalbido.  
 Allium sive Moly montanum 2. Clus. pan. (&  
 Moly montanum junceo folio) & hist.  
 an Gethioides syl. Colum.

IV. Allium mont. bicornie flore obsoletiore.  
 Allij montan. quarti species 2. Clus. pan. & hist.

Huc referri potest

Moly lurido colore, Svvert.

V. Allium mont. bicornie fl. pallido odore.

Allij mont. quarti species 1. Clus. pan. & hist.

VI. Allium juncifol. bicornie luteum: quod  
 1. est in Prod. Monspelio D. Saltzman. attulit.

VII. Allium mont. capite rotundo.

Allium sive Moly montanum 5. Clus. pan. (&  
 Moly montanum purpureo flore) & hist.

VIII. Allium Pyrenæum.

Moly Pyrenæum purpur. flore, Clus. hist. ap. alt.

IX. Allium mont. folijs narcisfi majus.

Allium sive Moly narcisfi fol. 1. Clus. pan. & hist.  
 an Moly folijs narcisfi, Lob. Lugd.

Variat: 1. est, folijs splendentibus viridibus,  
 floribus purpurasc. 2. folijs magnis cinereis &  
 mollioribus, floribus dilutioribus, hoc posterius, est  
 Moly narcisfi. folijs primi altera spec. Clus. hist.

X. Allium montan. folijs narcisfi minus.

Allium sive Moly narcisfinis folijs 2. Clus.  
 pan. & hist.

Allium saxatile & Bulbus vomitorius, Cam.

Et hujus altera species folijs longioribus &  
 angustioribus, floribus dilutioribus, & est  
 Moly narcisfi. fol. secundi alt. spec. Clus. hist.

XI. Allium mont. radice oblonga: quod  
 2. in Prod.

an Allium mont. sive Petroselinon, Gesf. hor.

Allium mont. radice oblonga, Eid. col. stirp.

XII. Allium montanum minus: quod  
 3. in Prod.

## MOLY ET EJUS SPECIES.

**M**ῆλυ, ἀπὸ τῆ μολῶσαι τὰς νόσους, ab amolendis morbis. Unius Theoph. 9. hist. 15. &  
 Dioscorid. lib. 3. cap. 54. meminere: at Plin. lib. 25. cap. 4. duplex proposuit: alterum  
 radice rotunda: alterum verò longa.

I. Moly latifolium liliflorum.  
 Moly Theoph. fortè & Plinij radice rotunda.  
 Moly Theoph. Ang. Dod. Clus. hisp. & hist. Cam.  
 Moly liliflorum, Ad. Lob. Lugd.  
 Moly latifolium, Moly Theoph. Dod.  
 Moly Homericum, Scillæ alterum genus, &  
 Pancratium, Diosc. Cæs.  
 Moly Indicum flore purpureo, Svvert.  
 Flore est candido, vel subrubente.

II. Moly latifolium Indicum.

Duplex figura proponitur: altera priori simi-  
 lis, paucis folijs, caule oblongo, capite rotun-  
 do: altera, folijs plantaginis, caule brevi, capite  
 ex pluribus bulbulis compacto: illud dicitur  
 Caucafon, Moly Indicum vocatum, Lob.  
 Moly Indic. Dod. Lugd. Indicum 1. Tab. 2. Cam.

Alterius figuræ nomina:

Caucafon, Lob. ico.  
 Moly Indic. Clus. hisp. & hist. Indicum 2. Tab.  
 Narcissus sive Pancratium Clusij, Svvert.

III. Moly latifolium Hispanicum.

Moly Hispanicum purpureum, vel Moly mon-  
 tanum latifol. purpur. Hispan. ad Clus. cur. post.

Flores plus minus 60. dilutè rubentes, aut  
 purpurascences. Huc refer  
 Moly latifolium, Eyst.

IV. Moly latifol. luteum odore allij primum.  
 Moly mont. latifol. flavo flore, Clus. hist. ap. alt.  
 Moly luteum Botanicorum perperam Ornithogalum luteum latifolium, Lob. ad. par. 2.  
 Moly flavo flore, Svvert.

V. Moly latifol. luteum odore allij secundum.

Moly latifolium flore flavo, Eyst.

VI. Moly African. umbella purpur. in Prod.

VII. Moly exoticum floribus alboboviridibus.

Moly flore albo lineis viridis coloris, Svvert.

VIII. Moly angustifolium umbellatum.

Moly, Matth. Cast. Lugd. Lon. angustifolium,  
 Dod. Lon.

Myle, Gesfner. cat.

Moly Dioscoridis putatum, Ad.

Moly Dioscoridis, Lob. Clus. hisp. & hist. Cam.  
 an Allium urinum alterum, Cæs.

IX. Moly humile folio gramineo.

Chamæmoly, an Moly Dioscorid. Colum.

X. Moly parvum caule triangulo.

Ornithogalum Arabicum multiflorum album, umbilico interiore nigro, Svvert.

II. Ornithogalum umbellat. majus angust. Ornithogalum medium, Eyst.

Flores intus candidi, exterius virescentes, flaminibus ex viridi pallescenibus.

III. Ornithogalum umbellat. alb. medium latifolium.

Ornithogalum aliud vulgare, Clus. hist.

IV. Ornithogalum umbellat. med. angust. Ornithogale, Manardo, Hermolao.

Ornithogalum Dod. gal. Tur. Ang. Ges. hor. Ama. Ger. Cast. vulgo, Cæsalp. secundum, Matth. Lugd.

Ornithogalum s. five vulgare, Clus. hist. & pan.

Ornithogalum candido flore, Cord. in Dioscorid.

Ornithogalum candidum vulgare, Ad. Lob.

Bulbus Leucanthemos minor, Dod. Lugd.

Ornithogalum alterum minus, Cam.

Bulbus folsequius, Tab.

Ornithogalum spicatum, Svvert.

Est & folijs gramineis, ut in cæteris hémistracis, Matthiolus duplex habet, & utrumque caule folioso pingit: quæ in Lugd. historia utrumque à Dod. differre scribitur: sic Lacuna & Lugd. Matthioli utrumque figuram proponunt: at Lonicerus, primam tantum, quam fidam suspicamus.

V. Ornithogalum album minus.

Ornithogal. minus è Pyreneis, Clus. hist. ap. 1.

Ornithogalum minus, Eyst.

VI. Ornithogalum umbellatum flosculis ex albo subcæruleis.

Ornithogalum Hispanicum minus, Clus. hist.

## ORNITHOGALUM SPICATUM.

I. Ornithogalum latifolium & maximum.

Ornithogalum magnum Myconi, Lugd.

Ornithogalum maximum, Clus. hist. ap. 1.

Ornithogalum vel Lilium Alexandrinum floribus albis innumera bilibus, Svvert.

Magna florum spica, aliquando centenis floribus nivei coloris.

II. Ornithogalum latifolium alterum.

Ornithogalum Æthiopitum, Clus. cur. post.

Ornithogalum Indicum promont. Bonæ spæ, Svvert.

III. Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus.

Asphodelus femina, Dod. Gal. Ges. hor.

Asphodelus Galeni, Lac. bulbosus Gal. Dod. Lugd. Cam. Ger.

Asphodel. Hyacinthinus fortè Galeni, Ad. Lob. obl. Hyacintho asphodelus, Lob. ico.

Ornithogalum majus, Clus. in pan. majus primum, Eid. hist.

Ornithogalum Pyreneum, Clus. cur. post.

Ornithogalum aliud spicatum, Cam.

IV. Ornithogalum angustifolium, spicatum maximum.

Ornithogalum lacteum, spicatum max. Eyst.

V. Ornithogal. spic. seu comosum fl. lacteo, Ornithogali lactei species major, Eyst.

VI. Ornithogal. majus spicatum flore albo.

Ornithogalum Narbonense, Dod. Lugd. spicatum, Cam.

Ornithog. spicatum Monspel. flore lacteo, Lob.

Ornithogalum alterum, Cam. apud. Matthioli, qui vulgari adjunxit.

Bulbus Ornithogalo similis Cæf.

Ornithogalum majus Monspel. Clus. pan. secundum, Eid. hist.

Ornithogalum spicatum flore lacteo, Eyst.

Mina Dioscorid. lib. 3. cap. 74. Theophr. 7 hist. II. & Epimedium Plinii, lib. 19. cap. 5.

VII. Ornithogal. majus spicatum alterum.

Ornithogal. 3. vel majus Byzantin. Clus. hist.

Ornithogalum spicatum minus, Lob. obl.

VIII. Ornithogal. majus spic. flore lacteo.

Bulbus Ornithogalo similis, flore lacteo, Cæf.

IX. Ornithog. spicatum fl. viridi lactescente.

Ornithog. Pannon. albo flore, Clus. pan. & hist.

Ornithogal. Pannon. Tab. Ger. Eyst.

Ornithogalum flore albo viridique tinea in dorso prædico, Svvert.

an Ornithogalum ferotinum, Cam.

X. Ornithogalum spicatum album.

Ornithogalum Hispanicum spicatum, Eyst.

XI. Ornithogalum cæruleo pallente flore.

Ornithogalum cæruleum pallens Hyacintho autumnali pene par, Lob. obl.

XII. Ornithogalum exotikum magni flore, minore innato.

Hyacinth. arborum Ornithogaloides, Colum.

Narcissus 4. Matthioli, Clus. hist. ap. 2.

Ornithogal. Neapolitanum, Eidem ap. 2. Eyst.

Ornithogalum Neapolitanum flore interius

candido, exterius cineraceo, Svvert.

Phalangii nomine, Honor. Belli ex Creta missi.

ORNI-

## ORNITHOGALUM LUTEUM.

I. Ornithogalum luteum sive pallidum majus.

Ornithogalum 7. sive pallido flore, Clus. hist.

II. Ornithogalum luteum magno flore.

Ornithogal. flavum Alcmarianum, Clus. hist.

III. Ornithogalum luteum.

Bulbus, Trag. (cepa agrestis) Lac. sylv. Ruel.

Fuch. Tur. Ges. cat. Dod. Lugd. Cam. Eyst.

Bulbus sylv. alius bifolius, Ges. hor.

Sisyrinchium, Cord. hist.

Bulbus esculentus, Cast. Lon.

Ornithogalon luteum, Cord. in Diosc. Ad Lob.

Tab. Lugd. Col. Syvert.

Bulbus Ornithogalo similis florib. luteis, Cae.

Ubi adolevit, folia inferiora amittit, quare apud Tabernem. & Gerar. duæ figurae.

Ornithogali lutei, & Ornithogali majoris, Taber.

Ornithog. lutei & Cepæ agrariæ nomine, Ger.

IV. Ornithogalum luteum minus.

Ornithogalum 10. sive Pannonic. luteo flore, Clus. pan. & hist.

Ornithogali lutei species minor, Lob. obs.

V. Ornithogal. angustifol. bulbiferum.

Ornithogalum angustifolium campestre luteum minimum bulbosum, Colum.

Variat: nam locis pinguioribus folia latiora & plura, sicut & flores: folia circa bulbillos hirsuta & candidiora sunt.

## SECTIO QUARTA.

CEPA: PORRUM: SCILLA:  
ALLIVM ET MOLT.

## CEPA ET EJUS SPECIES.

**A**gyptiorum numina, Cepas & Allivm (Plin. l. 19. c. 6.) prosequamur. Cepa à capiti magnitudine, Græci καπνίου, in vobis compo- nunt, quod oculi papillam comprimere cogat ut potest secundum Aristot. 20. probl. 22. mordaci nimium vapore lancinando & lacrymas movendo. Genera Theophrast. 7. hist. 4. à locis cognominata refert, Gardiam, Cnidiam, Samothraciam, Satanicam, Ascaloniam, & fissilem. At Dioscorides l. 2. c. 181. longa, rotunda, flava & candida meminit. Plin. Lig. c. 6. Cepa, inquit, genera apud Græcos Sardia, Samothracia, Alfidena, Setania, Schista, Ascalonia, &c.

Quare alia major est, alia minor: alia candida, alia viridis, alia rufa, alia subrubens: alia est rotunda, alia oblonga: omnes ut plurimum duplici aut tripli membrana, quas Felsus sallas, alij tunicas vocant, vestita. Sic alia acerrima, alie mediocriter acres, aut nihil ferè acedinis habentes. Sic alie feruntur, alie deponuntur: aliquando seminis loco bulbos gerunt, ut Dalechampiuz notavit.

I. Cepa vulgaris.

Cepe, Bruni. Ges. Lob.

Cepa, Trag. Fuch. Tur. Matthiol. Lat. Cord. in

Diosc. Ang. Cast. Cae. capitata, Matth.

Cepa rotunda, Dod.

Cepa sativa Matthioli, Lugd.

Cepa alba & rubra, Ges. hor. Lon. Tab.

Variat coloris floris, vel candido, vel purpurascens: tunicarum quoque, coloris rubri, aut candidi: radice forma, major est, & minor, oblonga, fissilis, vel orbiculata, turbinata, qui-

busdam communioribus, in compressam latorem circumferentiam bulbaceam abit.

Cepas porraceæ, vocant stolones, qui primo Vere, dum tenelli sunt, aequam cauliscunt, in cibos eruntur.

II. Cepa oblonga, Dod. Ges. hor.

Cepe Hispanica oblonga, Lob. icon. Cam.

III. Cepa radice candida dulci,

Cepa quarta, Ges. hor.

IV. Cepa plurimum caulium.

Cepa ovata à radice figura, Cord. hist.



V. Cēpa fectilis, Matth. Cast. Lugd.

an Gethyon Græcis, & Cēpola Columellæ.

VI. Cēpa fissilis, Matth. Lugd. cui & Cēpa

Portæ.

Cēpis affinis Muligia, Cæf.

VII. Cēpa sterilis, Trag. Gef. hor.

Cēpa Ascalonica, Matth. Lugd. cui forte Bul-

bis Serapius, quem Theoph. & Plin. Cēpe ge-  
nus esse testantur.

Cēpæ species sunt Ascalonia, Cast.

Cēpis affinis, Ascalonia vulgo, Cæf.

Scaliones, Tur.

Verum & Lobelius hist. Belgica Ascalonitidem

antiquorum exhibuit, forte a priore diversam.

## PORRUM EJUSQUE SPECIES.

**Q**uod *περα* Dioscorides l. 2. c. 179. vocavit, & in *κεφαλήν*, capitulum, & *ἀμπελον*, *περα* distinguit; id Latini Porrum, quod porro eat, & longe lasēg, grassetur, voca-  
runt. Theophrast. c. causas. & 2. ejusdem 23. *ἡ κεφαλή*, consum porrum addidit: aliis  
7. hist. 1. 2. 3. 4. 5. & 6. de Porro egit. At Plin. l. 20. c. 6. est *sestivum* & *capitatum*; & illud  
l. 19. c. 6. duplex fecit.

### I. Porrum commune capitatum.

Porrum, Brunf. Cord. in Diosc. Dod. (& Porrus

Palladij) Gef. hor. Ang. Lon. Cæf. Cast. Tab.

Porrum commune, Matth. Lugd. vulgare, Lob.

Porrum capitatum, Fuch. Tur.

Porrum capitatum Plinio, Hermol. Ruel. (cui

Gethyllidas Græcorum) Dodon. gal. vulgare,

Camer.

### II. Porrum festivum latifolium.

Porrum festivum, Plin. Dod. Cæf. Lugd. Portm.

Porrum festivum capitatum, Matth. & (festile)

Lac. Lugd.

Porrum tonsile & capitatum, Lob.

Porrum tonsile sive festile, Cam.

Hæc duo genere non differunt, cum ex eo-

dem semine generentur, & cultura solum dif-

ferent: quia id quod ad culinaria juncula fac-

pius deronderi solet, Sestivum aut Festile Co-

lummelle & Palladio nominatur: quod verò

capitatum fieri debet, non tondendum, & au-

tumnali tempore transferendum: etiam Pli-

nio monente.

### III. Porrum festivum juncifolium.

Porrum festivum, Trag. Fuch. Gef. hor. Lon.

Lugdun.

Porrum festile, Matth.

Cēpa Ascalonia, Matth. def. Ger.

Cēpa fissilis & Cētion. Tur.

Schœnoprasum, Dod. Ad. Lob. (cui Ascalonia

Matth.) Tab. Ger.

Porro consili cognatum, Cam.

Gethyllis, quam Cēparum genus Nicandri

Scholiasies dicit, Gef. hor. in Porro festivo.

Differat veterum Sestivum, cum illi folia lata,

huic pro folijs junci inanes sint: hinc nomine

ex Juncis & Porro compositis, Schœnoprasum

vocantur.

Majus & minus habetur: illud rarius & ad

condimenta mitius, quod Gethium Gesnero

minus vero Gethyllis.

Gethyllidem sylvest. Gef. lib. de hor. proponit.

IV. Porrum folio latissimo.

Porrum Syriacum, Tab. Franco.

Porrum indicum, Cam.

Scorodoprasum, Ger.

V. Porrum sylv. inodorum.

Porro simile, exilius & inodorum, Lob.

VI. Porrum sylv. gemino capite.

Ampeloprasum, seu Porrum syl. Lob. Lugd. cui

à Matthioli diversum.

Porrum sylvestre primum, Tab.

VII. Porrum sylvestre vinearum.

Ampeloprasum, Matth. Ruel. Am. Ang. Gef. hor. Cæf. Port. Lugd.

## SCILLA EJUSQUE SPECIES.

**Σ**κίλλας Theophrast. 1. hist. 7. & 10. proposuit; & 7. hist. 11. Scilla Epimenidia vocata, &  
quæ ab usu nomenclationis forsita sit, meminit. Sic Dioscorid. l. 2. c. 202. οὐκ ἔχει, & cap.



& cap. seq. *μαυροῦ*, quod Scillam aliqui nominant. Genera duo Scilla medica, Plin. l. 19. c. 5. *mascula albis folijs, femina nigris*: & tertium genus cibi gratum, Epimenidium vocatam &c. Et l. 20. c. 9. Scillarum in Medicina alba est, quæ mascula, femina nigra: candidissima utilissima.

I. Scilla vulgaris radice rubra.

Pancratium & Scilla Dioscor.

Scilla femina, Plinio.

Squilla, Brunf.

Squilla, Trag. (& Cēpa muris) Matth. Fuch.

Tur. Cord. in Dioscorid. Gefn. hort. Lac. Lugdun. Lon. Camer. Cæsalp. cujus bulbis rufi coloris, & nigra in montibus non longè à mari, reperitur.

Scilla communis & Pancratium, Dod. gal.

Scilla nigra & femina Plinij, & Pancratium Dioscoridis, Costæo.

Scilla major, Cast.

Pancratium, Ang. & Scilla vulgaris, Guil. Clus. hisp. & hist. Dod. Lugd. Tab.

Scilla rubentibus radicis tunicis folio a loës carinato, Lobel.

II. Scilla radice alba.

Scilla, mascula Plinio: femina, Myreps.

Scilla, Marcell. Hermol. Manard. Ruel. Guil.

Dod. Hispanica, Clus. hisp. & hist. Cast. Lug. alba, Eyst.

Scilla (sive cepa marina) Lob. major, Tab.

Scilla minor, sive Pancratium, Cast.

III. Scilla esculenta.

Scilla epimenidia, Theophr.

Scillæ 3. genus epimenidia, Plin.

Scilla vera & legitima, Ang.

Scilla dulcis & candida in Cephalonia, & Creta, Costæo in Mesuem.

## ALLIUM EJUSQUE SPECIES.

**A**llium forè ab ἀλλεῖον exilire, quod exiliendo crescat. *Σχοδόον* Dioscoridi l. 2. c. 182. vel quasi οὐαῖον ῥόδον, id est, rudis rosa, propter odorem gravem: vel quod comestum, vapores excrementitios ad cutim pellat, & vescentibus pandiculationes moveat. Sunt qui ab balante gravi odore deducant, & Allium scribant.

Genera Dioscoridi, sativum & hortenfe, quod vel multiplici in Aegypto, vel singulari, ut Porrum, capise confles, cujus nucleos Græci ἀγλιδας nominant: aliud sylvestre, quod ὁ φιοσκόπον. At Theophrasto 7. hist. 4. aliud praxox, aliud serotinum: differunt præterea magnitudine singulari: quedam etiam non nucleis, quadum verò multis coagmentantur, quos γίλλας Theophr. ἀγλιδας, Galenus: σακκιδας, Aegineta l. 4. c. 33. ὀνυχας, Acisus lib. & cap. 11. vocat. Verum Plinio l. 19. c. 6. Generum Allij differentia, in tempore, praxox maturefcit 60. diebus: sum in magnitudine. Ulpicum quoq. in hoc genere Græci appellavere. Alliam Cyprium, alij Antiscorodon (forè rectius Aphroscorodon) &c. sunt qui velint Allium Ulpicum Plinij, Allium Aegyptiacum Dioscoridis esse.

In Virginea multis locis Allium nascitur, ab Anglicano parum differens: desc. Virgin. quod ut & Cepe in Hispaniola, vix unquam bonum evadit: par. 4. Amer. c. ult. Et Indi ex omnibus Europæis radicibus Allium eligunt, quo ventriculum reficiant: Joseph. Acofta l. 4. c. 18.

I. Allium sativum.

Allium, Brunf. Trag. Matth. Ruel. Cord. in Dioscorid. Tur. Lac. Ang. Lon. Lobel. domesticum, Matth. Cast.

Allium hortenfe, Fuch. vulgare, Cam.

Allium sativum, Dod. Gef. hor. Ad Cæf. Lugd.

Allium sativum multifidum, Cord. hist.

Verum Matthiolus, Lobelius & Dodonæus, una figura Allium sine flore, Allium cum flore,

& Allium amphicarpon; & Tabernæmon, sub Porro sylv. latifolio proposuit.

Genus quoddam capitibus ingentibus ex Africa adferri, Cæsalpinus auctor est.

II. Allium sativum alterum: sive Allioprasum caulis summo circumvoluto.

Allium sativum amphicarpon, quod & radicem nucleis feritur, & seminibus, quæ nucleos similitudine referunt, Cord. hist.

Allium sativum secundum, Dod.

Scorodoprasum secundum, Clus. pan. & hist.

Allium Creticum, sive Serpentinum, Cam.

III. Allium sativum radice simplici.

Μάλυα, Hippocrati.

Allium mas, Matth.

Allium simplex, Cord. hist.

Allium sativum singulari capite, & Allium masculum, Vercell.

Allium Ægyptiacum, Portæ.

IV. Allium Cyprium, Theoph.

Allium Ulpicum, Plin.

Allium Ulpicum vel Punicum, Columell.

Aphrosorodon, sive Allium Ulpium, Ruel. Gesner.

Allium Cyprium, sive Ulpicum, Portæ.

Allium sativum tertium, Dod.

V. Alliaporum sive Scorodoprasum.

Scorodoprasum, Dioscor. l. 2. c. 83. Gal. Ægin.

Scorodoprasum, Trag. Matth. Cord. in Diosc.

Gesner. hort. Lac. Cast. Lugd. Portæ.

Allium porrum, Car. Stephano.

Scorodoprasum & porrum Turcicum, Amat.

VI. Allium sphaericeo capite, folio latiore, sive scorodoprasum alterum.

Ampeloprasum primum, Dod.

Scorodoprasum sive alliaporum, Ad.

Scorodoprasum, Lob. Cæs.

Scorodoprasum 1. Clus. pan. & hist.

Scorodoprasum alterum, Lug. qui cum sequenti eadem tabellâ pinxit.

Porrum Indum, Cam.

VII. Allium sphaericeo capite folio angustiore.

Scorodoprasum alterum, Lob. Lugd.

VIII. Allium sylvestre latifolium.

Allium syl. quod urinum vocant, Plin. l. 19. c. 6.

Allium syl. Brunf. Trag. (& colubrinum) Eric. Cordo: syl. latioris folij, Dod.

Allium urinum, Matth. Fuch. Dod. gal. Ama.

Gesner. col. Tur. Clus. hist. Lugd. Thal. Cæs. Cast. Cam. Eyflet.

Allium urinum latifolium, Ad. Lob. Lugd.

Allium sylvestre bifolium & arctoscorodum, Gesner. hort.

Allium sylvestre ophioscorodon appellatum, Cord. in Diosc.

Ophioscorodon, Lon.

an Scorodoprasum.

Moly sive Allium Urinum, Svert.

Sunt qui Dioscoridis Scorodoprasum, aut ejus Ampeloprasum, aut Ophioscorodon, sed male, censent.

IX. Allium montanum, latifolium maculatum.

Allium anguinum, Matth. Lugd. Portæ, serpentinum, Cast.

Allium latifolium maculosum, sive serpentinum, Ad.

Ophioscorodon, Lob.

Victoralis longa, Gesner. hort. Clus. pan. & hist. (cui & major) Eyflet.

Allium alpinum, Gesner. hort. Dod. Tab. cui & Victoralis mas.

Est mas & femina, illa latioribus, hæc angustioribus est folijs, quare

Victoralis mas, & femina, Camerario dicitur.

X. Allium sylv. campestre purpurascens.

Allium caninum primum, Trag.

Allium sylv. primum, Fuch.

Allium campestre, Cord. in hist.

Allium sylvest. Gesner. hort. Cæs. Cast. syl. minus, Dod. gal.

Allium tenuifolium, Cam.

XI. Allium campestre juncifolium capitatum purpurascens majus.

Allium in arvis, Plinio.

Allium syl. quod Ophioscoridon, Ruel. Matth.

Allium syl. tenuifolium, Ad. Lob. ico. Dod.

Allium syl. vulgare seu caninum, Thal. tenuifolium, Franco.

XII. Allium sylv. capitatum purpurascens minus: quod à primo potissimum magnitudine differt. cum palmare sit, & folijs junceis.

XIII. Allium sylv. bicorni flore obsoleto. Allium caninum alterum, Trag.

Allium sylv. Tur. syl. alterum, Fuch.

Allium sylvestre majus, Dod. gal.

Allium rubentibus nucleis, Lob. ico.

Est majus & minus.

XIV. Allium aquaticum.

Allium fluviatile in sabulo ad Albim fluvium in Misnia, Franc. hort. Lusat.

## ALLIUM MONTANUM.

I. Allium montanum bicorni latifolium flore dilute purpurascens.

Allium sive Moly mont. latif. i. Clus. pan. & hist.

Allium montanum bicorni angustifolium flore purpurascens.

Ampel-

Ampe loprasſon proliferum, Lob. ico. Cam.

Ampelopraſum 1. Cam. apud Matth.

Allium ſive Moly montanum 2. Cluſ. pan. (&

Moly montanum gramineo folio) & hiſt.

Moly montanum carmeſino colore, Svvert.

III. Allium mont. bicornē flore exalbido.

Allium ſive Moly montanum 3. Cluſ. pan. (&

Moly montanum juncēo folio) & hiſt.

an Gethioides ſyl. Colum.

IV. Allium mont. bicornē flore obſoletiore.

Allij montan. quarti ſpecies 2. Cluſ. pan. & hiſt.

Huc referri poteſt

Moly lurido colore, Svvert.

V. Allium mont. bicornē fl. pallido odore.

Allij mont. quarti ſpecies 1. Cluſ. pan. & hiſt.

VI. Allium juncifol. bicornē luteum: quod

1. eſt in Prod. Monſpelio D. Saltzman. attulit.

VII. Allium mont. capite rotundo.

Allij ſive Moly montanum 5. Cluſ. pan. (&

Moly montanum purpureo flore) & hiſt.

VIII. Allium Pyrenæum.

Moly Pyrenæum purpur. flore, Cluſ. hiſt. ap. alt.

IX. Allium mont. folijs narcifſi majus.

Allium ſive Moly narcifſ. fol. 1. Cluſ. pan. & hiſt.

an Moly folijs narcifſi, Lob. Lugd.

Variat: 1. eſt, folijs ſplendentibus viridibus,

floribus purpuraſc. 2. folijs magnis cinereis &

mollioribus, florib. dilutiorib. hoc poſterior eſt

Moly narcifſ. folijs primi altera ſpec. Cluſ. hiſt.

X. Allium montan. folijs narcifſi minus.

Allium ſive Moly narcifſinis folijs 2. Cluſ.

pan. & hiſt.

Allium ſaxatile & Bulbus vomitorius, Cam.

Et hujus altera ſpecies folijs longioribus &

angſtioribus, floribus dilutioribus, & eſt

Moly narcifſ. fol. ſecundi alt. ſpec. Cluſ. hiſt.

XI. Allium mont. radice oblongâ: quod

2. in Prod.

an Allium mont. ſive Petroſcorodon, Gef. hor.

Allium mont. radice oblonga, Eid. col. ſtirp.

XII. Allium montanum minus: quod

3. in Prod.

## MOLY ET EJUS SPECIES.

**M**Ωλυ, ἀπὸ τῆ μωλῶδου τῆς νόσου, ab amoliendis morbis. Unius Theoph. 9. hiſt. 15. & Dioſcorid. lib. 3. cap. 54. meminere: at Plin. lib. 25. cap. 4. duplex propoſuit: alterum radice rotunda: alterum verò longa.

I. Moly latifolium liſiſorum.

Moly Theoph. forē & Plinij radice rotunda.

Moly Theoph. Ang. Dod. Cluſ. hiſp. & hiſt. Cam.

Moly liſiſorum, Ad. Lob. Lugd.

Moly latifolium, Moly Theoph. Dod.

Moly Homericum, Scillæ alterum genus, &

Pancratium, Dioſc. Cef.

Moly Indicum flore purpureo, Svvert.

Flore eſt candido, vel ſubrubente.

II. Moly latifolium Indicum.

Duplex figura proponitur: altera priori ſimi-

lis, paucis folijs, caule oblongo, capite rotun-

do: altera, folijs plantaginis, caule brevi, capite

ex pluribus bulbulis compacto: illud dicitur

Caucaſon, Moly Indicum vocatum, Lob.

Moly Indic. Dod. Lugd. Indicum 1. Tab. 2. Cam.

Alterius figuræ nomina:

Caucaſon, Lob. ico.

Moly Indic. Cluſ. hiſp. & hiſt. Indicum 2. Tab.

Narcifſus ſive Pancratium Cluſij, Svvert.

III. Moly latifolium Hiſpanicum.

Moly Hiſpanicum purpureum, vel Moly mon-

tanum latifol. purpur. Hiſpan. ad Cluſ. cur. poſt.

Flores plus minus 60. dilutè rubentes, aut

purpuraſcentes. Huc refer

Moly latifolium, Eyſt.

IV. Moly latifol. luteum odore allij primum.

Moly mont. latifol. ſavo flore, Cluſ. hiſt. ap. alt.

Moly luteum Botanicorum perperam Orni-

thogalum luteum latifolium, Lob. ad. par. 2.

Moly ſavo flore, Svvert.

V. Moly latifol. luteum odore allij ſecundum.

Moly latifolium flore ſavo, Eyſt.

VI. Moly African. umbella purpur. in Prod.

VII. Moly exoticum florib. albo viridibus.

Moly flore albo lineis viridis coloris, Svvert.

VIII. Moly anguſtiſolium umbellatum.

Moly, Matth. Caſt. Lugd. Lon. anguſtiſolium,

Dod. Lon.

Myle, Gefner. cat.

Moly Dioſcoridis putatum, Ad.

Moly Dioſcoridis, Lob. Cluſ. hiſp. & hiſt. Cam.

an Allium urſinum alterum, Cæſ.

IX. Moly humile foliogramineo.

Chamæmoly, an Moly Dioſcorid. Colum.

X. Moly parvum caule triangulo.

Moly parvum Pefarenfe, Ponn. Ital.

XI. Moly angustifol. floribus majoribus.

Moly minus, Cluf. hift.

Moly minimum albo flore, Svvert.

XII. Moly angustifolium folijs reflexis.

Moly serpentinum vocatum, Lob Lugd.

Scorodoprasum alterum Clusij, quibusdam.

XIII. Moly atropurpureum Svvert. mihi incognitum.

XIV. Moly moschatum capillaceo folio.

Allium fyl. perpusillum juncifolium moschatum, Lob. ad part. alt.



## SECTIO QUINTA.

# LILIUM: MARTAGON: CORONA IMPERIALIS.

## LILIUM ET EJUS SPECIES.

**L**ilium, λίκιον & λίκιον Græcis, Theoph. 6. hift. 6. Lilij florem variare dixit, & purpureum esse, singulis caulibus, aliàs unum, aliàs plura exire. Dioscorides lib. 3. cap. 116. duo genera agnovisse videtur, dum scribit, & rubra lilia esse. At Plinio lib. 21. cap. 5. Lilium triplex, album, rubens, purpureum, quod aliquando gemino sit caule, quod Narcissum vocitens. Dravidimus in Lilium radice bulbosa & una, ut sunt Lilia alba, Martagon: vel pluribus, Asphodeli bulbis constante, ut Lilium luteum & rubrum.

### LILIUM ALBUM.

I. Lilium album flore erecto & vulgare.

Lilium sive rosa Junonis, Apuleio.

Ambrosia sive Lilium album Nicandri, Ang.

Lilium Brunsf. Dod. gal. Tur. Matthiol. Lac.

C. & Cæsalp.

Lilium album, Trag. Fuch. Gefner. hor. Ang.

Lon. Lugd. Tab. Ger. Eyst.

Lilium candidum, Cord. in Diosc. Ad. Lob.

Dod. Franco.

Lilium album vulgare, Cam.

Variat: aliquando circa caulis medium, fo-

liorum quasi cespices, ut pingit Bry, nomine

Lilij multifolij Stutgardiae nati.

Aliquando ex caule plano trium unciarum la-

to, numerosi flores exurgunt, ut idem figuram

habet, cui titulus

Lilium liliorum, sive 122. lilia ex eodem bul-

bo enata.

II. Lilium album floribus dependentibus,

sive peregrinum.

Sultan Zambach ( sive Martagon Constanti-

nopolitanum ) Cluf. pan. & hift. Eyst. du Bry.

Martagon album, Lilium candidum Byzanti-

um, Lob. ico.

Lilia candida Martagonis Constantinopoli-

tani nomine insignita, Lob. ad. par. alt.

Lilij albi species alia, Cam.

Hoc nonnunquam sexagenos flores in plano & lato caule prorulit, quare.

Lilium album Byzantinum *πελαγονίς*, Clusio.

Sic Lobelius ad. part. alr. in caule palmaris latitudinis, humanæ proceritatis, ducentos & plures candidissimos & suavissimos flores observavit.

Huc referendum

Lilij pulchri albi & ignoti species Theophrasti, Rauvvolf.

Lilium album Syriacum, Lugd. in ap.

an Lilia candidissima in Baya, medicinz tota utilia, Linsc. par. 4. Ind. Orient. cap. 14.

### LILIUM PURPUROCEUM.

I. Lilium purpureoceum majus.

an Bulbus cruentus, Hippocrati.

Lilium purpureum Diosc. rubens Plinij.

Hemerocallis Diosc. Matth. Amat. Ang. Lac.

Cast.

Hemerocallis 1. Matthioli, Cam. & Lugd.

Hya-

Hyacinthus & Cosmofandalos Poëtarum, Dod. & Portæ.

Lilium rubrum, five aureum, Brunf.

Lilium rufum, Trag. Dod. gal.

Lilium rubens, Gef. cat. Fuch. ico.

Lilium rubens vel croceum alterum, Gef. hor.

Lilium croceum, Fuch. Lon. fyl. croceo flore, Cæfalp.

Lilium purpureum, Tur. Ad. purpur. majus, Lob. Dod. & Cynorrhodon Plinij, ut & Ang. & Portæ) Lugd. Eyst.

Lilium aureum Ger. majus, Tab.

Martagon, Cast. ico.

Martagon radice alba, Ang.

Martagon Chymistarum, Lob. ico.

Vidi & candido flore.

II. Lilium purpureocroceum flore pleno.

Hemerocallis 1. Matthiol. flore pleno, Cam.

Lilium cruentum puniceum flore pleno, Eyst.

III. Lilium purpureocroceum minus.

Lilium purpureum minus, Ad. Lob. Dod.

Lilium purpureum alterum minus, Lugd.

Lilium rubrum minus non bulbiferum, Cluf. pan.

Martagon 3. Hyacinthus Poëtarum, Ang.

Lilium puniceum non bulbiferum minus, Cluf. hift.

Variat: communiter flore puniceo & quasi rubente, numero paucioribus: aliquando viginti & plures observantur: reperitur & pleno flore, duodecim, viginti, aut plurium foliorum textura, constans.

IV. Lilium phœniceum.

Martagon phœnicum dilutum, Lob. belg.

Martagon Chymistarum alterum, Lob. ico.

Lilium puniceum non bulbiferum majus flore diluto, Cluf. hift.

Flores nonnunquam sexaginta vno caule.

V. Lilium Sandycis colore polyanthos.

Lilium cruentum polyanthos, Eyst.

Flores 84. in hoc observati.

VI. Lilium cruentum plantaginis folio.

Lilium cruentum latifolium, Tab. quid?

## LILII BULBIFERUM.

I. Lilium bulbiferum latifolium majus.

Lilium cruentum bulbos majusculos squamatis compactos gerens, summo alis diviso caule, Lob. ico.

Lilium cruentum bulbos gerens, Lugd.

Martagon bulbif. majus, Cluf. pan. vel primum, Eid. hift.

Martagon rubrum, Tab.

Lilium cruentum latifolium, Ger.

II. Lilium bulbiferum angustifolium.

Martagon cruentum angustifolium, Lob. ico.

III. Lilium bulbiferum minus.

Lilium rubens vel croceum alterum, &

Lilium rubens seminferum, Gef. hor.

Lilium cruentum 4. secundum caulem bulbulis donatum, Lob. cruentum aliud, Lugd.

Lilium purpureum tertium, Dod.

Martagon bulbiferum minus, vel pratense, Cluf. pan.

Martagon bulbiferum 3. vel lilium puniceum bulbiferum 3. Cluf. hift.

Hemerocallis prima Matthioli bulbifera, Camer.

Lilium cruentum bulbiferum, Eyst.

IV. Lilium bulbiferum incanum.

Martagon bulbifer. incanum, Cluf. pan. vel 2. Eid. hift.

Hujus iconem Lobelius primo adjunxit, & apud Lugdunensem, sub Lilio cruento bulbos gerente pingitur.

## LILII FLORIBUS REFLEXIS latifolium.

I. Lilium floribus reflexis montanum.

Affodillus, Brunf.

Hyacinthus Poëtarum, vel 5. Trag.

Asphodelus femina, Fuch.

Lilium purpureum, Fuch. ico. Gefner. hor. fyl. Thal.

Lilium fyl. Dod. Cam. alterum, Cluf. pan.

Lilium fyl. purpureo flore, Cæf.

Lilium alterum, Martagon Italis, quod Petilium Plinius appellat, Ama.

Lilium montanum, Ad. Lob. five fyl. 2 minus, Cluf. hift.

Martagon, Matth. Lac. Lugd. Cast. desc.

Martagon primum, Ang.

Hemerocallis, Dod. gal. Cord. in Diosc. Gef. hor. Lon.

Lilium montanum flore purpurascente punctatum, Eyst.

Variat floris colore, qui plerumque subruber, aliquando dilutus albicansque: sic & maculæ rubræ inordinatæ florum folijs, & intus & foris, maximè circa foliorum exortum, intrinsecus

asperguntur : hujus tres differentias Clusius agnoscit : huc referre oportet Martagon Pannon. flore suaverubente , ipsius Bry.

Reperitur etiam longiore spica, & dicitur Martagon montanum longiore spica, Bry : & etiam quasi duplici corolla ab eodem pictum, Francofurti narum.

II. Lilium floribus reflexis alterum, lanugine hirsutum.

Lilium purpureum mas, Ges. hor.

Lilium syl. primum & majus, Clus. pan. & hist. Hemerocallis flore rubello, Lob. ico.

Lilium Saracenicum, Tab.

Flores priore plures, saturate purpurascetes, maculis nigricantibus distincti : aliquando dilute purpurascetes, maculis carentes ; Lilium flore purpurascete non punctatum, Eysler.

Pingit insuper Bry.

Martagon exoticum flore spadiceo, &

Martagon flore carneo.

III. Lilium floribus reflexis, varijs, sive tertium.

Lilium montanum sive syl. tertium, Clus. hist.

Lilium montanum maximum polyanthos variegatum, Eysler.

Simile Clusiano.

Flos antequam explicetur, foris carneus : explicatus, intus alb. notis purpureis insignitus.

Clusius & quattum genus addit, floribus saturate purpurascensibus serius florentibus, & odore non insuavi præditis.

IV. Lilium fl. reflexis albis non punctatis.

Lilium montanum albo flore, Clus. hist. ap. alt. & cur. post.

Lilium mont. minus alb. non punctatum, Eysler.

Martagon imperiale niveum sine maculis, Bry.

V. Lilium flor. reflexis albis punctatis.

Lilium montanum albis floribus maculis purpureis insignitis, Clus. cur. post.

Lilium montanum majus album punctatum, Eysler.

VI. Lilium flor. reflexis polyanthos album punctatum.

Lilium mont. maximum polyanthos album varijs maculis rubris maculis aspersis, Eysler.

VII. Lilium Byzantinum miniatum.

Lilium rubrum Zuphniare, sive miniatum Chalcedonicum, Clus. pan.

Lilium rubrum sive miniat. Byzant. Eid. hist.

Hemerocallis Byzantina altera, Lob. ico.

Lilium Chalcedonicum miniatum serotinum, Lob. ad. par. alt.

Hemerocallis Constantinopolitana phœnicea unico flore, Lugd.

Flos colore elegantissimi minij aut ceræ rubræ recentis, rarius profusus nivei, aliquando flavi coloris : modò unius, modò duo, quatuor, quinque, sex, tredecim.

VIII. Lilium Byzant. miniat. polyanthos.

Lilium Byzantinum miniat. saturatiore flore *notu arboris*, sive Zuphniare, Clus. hist.

Lilium Chalcedonicum miniatum præcox, Lob. ad. par. alt.

Flotes quinos, senos, denos ut plurimum profert, rarius 20. 30. vel 40. in caule duorum triumve digitorum latitudine, aliquando saturatiore, aliquando dilutioris coloris, hocque Lilij Byzantini miniat. dilutioris floris nomine pingitur à Clusio in hist.

Lilium Byzantinum serotinum, Eysler.

Lilium Byzantinum flore multiplici, Eid.

Hoc florum foliorum numero duodenatio, & staminum multitudine à priore discrepat.

Varietas in folijs : quæ flore est dilutior, caulem & folia viridiora habet : quæ verò saturatiore, hujus caulis & folia plerumque ex purpurea nigricant. Aliquando flores in modum corollæ dispositi nascuntur, ut Bry pingit, nominans Martagon corollam præbens.

IX. Lilium purpureo sanguineum fl. reflexo.

Hemerocallis alteta, Matth. Lugd. quam cum

Lilio Zuphniari eandem vult, Clus.

Lilium sylvestre alterum, Dod. ico.

Hemerocallis Chalcedonica purpureo sanguinea polyanthos, Lob. Cam. (cui idem cum Lilio Zuphniari Clusij) Bry.

X. Lilium pyramidale moschatum.

Lilium sylvestre sive Hemerocallis moschata polyanthos, &

Martagon imperiale nuperot. Lob. ad. pat. alt. Martagon imperiale moschatum, Eysler.

Est florum centum & viginti & plurium, rosæ moschatæ odore, qui diluti & lividi coloris maculis ex fusco purpureis notati : florum 20. ferax in horto Eysler. conspectum fuit.

## LILIUM FLORIBUS REFLEXIS xii angustifolium.

I. Lilium rubrum angustifolium.

Lilium



*Lilium rubrum præcox*, Clus. hist. Bry.

Uno, duobus, tribus est floribus: & quia aliquando angustioribus est folijs, vel latioribus, idcirco Clusius in hist.

*Lilium rubrum præcox* 1. & 2. facit.

II. *Lilium brevi* & gramineo folio.

*Lilium rubrum præcox* 3. angustifolium, Clus. hist.

*Lilium miniat. tenuifol.* Clus. hist. ap. alt.

*Hemerocallis Macedonica* & *Martagon Pomponium*, Lob. ad. par. alt.

*Lilium montanum rubrum præcox*, Eyst.

Floribus aliquando 35. 46. & 48. sed in plano caule, vel miniati, vel cruenti coloris.

III. *Lilium miniatum* odorum angustifol. *Lilij* miniati tenuifol. aliud genus, Clus. hist. ap. alt.

*Martagon Pomponij*, Eid. & cur. post. & Eyst.

IV. *Lilium flavum angustifolium*.

*Lilium montanum flavo flore* maculis distinctum & non distinctum, Clus. hist. ap. 1. & alt.

*Lilium montan. flavo flore*, Lob. ad. part. alt.

*Lilium montanum flore luteo punctatum* & non punctatum, Eyst.

*Martag. sive Hemerocallis punctata flavo fl.* & *Martagon non punctatum, flore flavo*, &

*Martagon sive Lilium de Cana auri colorem referens, fl. intus nigris maculis asperfo*, Bry.

*Lilium montanum magis flavo flore* & atrioribus maculis, Clus. cur. post.

Variat flos colore flavo, vel dilutiore quasi pallente, in alio maculis nigris distincto: in altero flores nullis punctis internè distinguuntur, sed omnino flavi sunt: rarius quadraginta & plures flores penè flavos, sed in caule plano profert, quod multiflorum Clusius in hist. ap. alt. nominat: variat etiã subviridi fl. & dicitur *Martagon subviridi flore*, Bry.

## LILIAM SIVE CORONA imperialis.

I. *Lilium sive Corona Imperialis*.

*Corona Imperialis*, Dod. Lugd. (& *Chalcedonicum Lale*) Lon. Tab. Cam. Eyst. Rob. qui & *Coronam imperialem majorem* addit.

*Lilium sive Corona Imperialis*, Lob.

*Tusai sive Lilium Persicum* 1. (& *Hemerocallis Dioscoridis*) Clus. pan. & hist. & du Bry.

*Corona imperialis procerior rubra*, sed alia rubicunda, Svvert.

Variat flos colore luteo, vel verius pallente, vel purpurei *Lilij* instar rubente, aut *Sandaracæ* colorem refert, & hæc dicitur *Tusai* 2. Clusij hist.

At Lobelius ad. part. alt. varietatem in caule, flore & folio adfert: cui alia præcocior, alia ferotina: præcocior altera folio lato dilutè virente, flore pallidior; altera media, quæ elatior, folio pallidior, angustiore, flore dilutiore. At ferotina folijs latioribus, atroviuentibus, flore saturo phœniceo.

II. *Lilium*, sive *Corona imperialis multiflora latoque caule*.

*Tusai*, sive *Lilium Persicum* 3. & *Tusai nardus*, Clus. hist. pan. & rar.

*Corona imperialis polyanthes*, Eyst.

*Corona platycaulis*, sive *laticaulis*, Lob. ad. par. alt.

Flores 20. 30. 40. 50. & etiam 70. in caule lato, qui sequenti anno caulem rotundum acquirit, cum 3. 5. 7. aut octo floribus.

III. *Lilium sive Corona imperialis duplici corona*.

*Corona imperialis phœnicea duplici corona*, aut serie florum, Lob. ico.

*Corona imperialis polyanthes*, Tab. ico.

*Corona imperialis florum classe duplici*, Eyst.

*Corona polyphyllis sive foliosa*, Lobel. ad. part. alt.

*Tusai*, sive *Lilium Persicum* 2. du Bry.

*Corona imper. duobus coronis ornata flore flavescente*, Svvert.

Et hujus varietas apud Lob. caule numerosis folijs stipato, corona duplici nonnullis floribus in caulis fastigio: altera, flore dilutiore minus propendente, ob florum acervum caulem ambiente: & hæc est

*Corona polyphyllis* & *polyanthes altera*, Lob. ad. par. alt.

IV. *Lilium sive Corona imperialis non ferens*.

*Tusai quarta differentia*, Clus. hist.

V. *Lilium sive Corona Imperialis ramosa*.

*Tusai Andros*, Clus. hist.

Ramis singulis 11. flores: vel in altero 8. vel plures: in altera, 5. vel sex.

## LILIAM PERSICUM.

*Lilium Persicum*, Dod. (& *Hyacinth. spurius* 6.) Lob.

6.) Lobel. (& Pannachio Persianorum) Lugd. Taber.  
 Lilium non bulbosum, sive arundinaceum flore subcroceo & alterum luteo, Cam. Eyst. Rob. Svert. Bry.  
 Lilium Sulianum, Clus. pan. & hist. Bry.

### LILIUM ASPHODELI radice.

I. Lilium luteum asphodeli radice.  
 Lilium non bulbosum luteum, Dod. Lugd. Ger.  
 Liriosphodelus luteus liliflorus, Ad. Lob.  
 Lilia sphodelus luteo flore, Clus. pan. hist. Cam.  
 Liliago minor asphodelo affinis, Hemerocal-  
 lis Dioscoridis videtur, Cæs.

Asphodelus liliaceus, Eyst. luteus, Tab.  
 Flore est communiter luteo, rarius albo.  
 II. Lilium rubrum asphodeli radice.  
 Hemerocallis Diosc. Theoph. & Plinij.  
 Lilium rubens harundinaceum, Gesl. hort.  
 Lilium non bulbosum obsoleto colore rubens,  
 Dodon.  
 Liriosphodelus phœniceus, Lob.  
 Lilia sphodelus puniceus Clus. hist.  
 Lilium rubrum non bulbosum, Lugd.  
 Liliago major asphodelo affinis, Cæs.  
 Asphodelus liliaceus rubens, Tab.  
 Lilium non bulbosum sive arundinaceum, Ca-  
 mer. sive phœniceum, Ger.  
 Lilium fatuum, Eystet.

\*\*\*\*\*

## SECTIO SEXTA

### ORCHIS: SATYRIUM: DENS CANIS: OPHIRYS: OROBANCHE.

#### ORCHIS EJUSQUE DIFFERENTIÆ

**O**ρχη, sive Testiculus, à Theophrasto 9. hist. 19. & Dioscoride l. 3. c. 141. proponitur: Dioscorides, inter Orchidem, & Satyrion differentiam hanc fecit: Ὀρχιδας vocans, quæ radicem bulbosam habens, eamq. geminam, oblongam olivæ modo angustam, superiorem plenior, & inferiorem molliorem, ac rugosior. Satyrion autem, quod radicem habet unam, eamq. bulbosam, mali magnitudine.

Genera Orchidis, Dioscorides duo fecit; unum, Κυνὸς ὄρχη, testiculum canis: alterum, ὀρχιδὰς a cognominatum. Sic Satyrium duplex, alterum αὐτοειδὲς τε; Φυλλὸν; alterum αὐτόειον ἰσχυρότερον, vel ἰσχυραίων. Plinius l. 26. c. 30. Orchion Satyriorumq. descriptiones confundit: & l. 22. c. 8. Cynosorchidis nomine repetiit.

Lubet distinguere in eas, quæ radices habent, vel rotundas testiculorum forma, vel palmas manusve referentes. Ilias, in eas quæ radices habent vel geminas, quas Orchides: vel unicam, quas Satyria nominabimus: has verò Orchides palmas appellabimus. Orchidis genera facimus, Cynosorchin sive Canis testiculum, Testiculum morionis, Orchin satidam, sive Testiculum hircinum: Orchin Serapiada, vel Testiculum vulpinum & Testiculum odoratum: ad quæ genera quinq. Orchidum species reduci possunt.

#### CYNOSORCHIS, SEU TESTI- culus canis.

I. Cynosorchis latifol. hiant. cucullo major.  
 Satyrium primum, Brunf. mas, Trag.  
 Orchis mas latifolia, Fuch. vel major, Lon.  
 Orchis & Testiculum canis officin: Ama. lati-

folia, Eystett.  
 Orchis sive Testiculus & Cynosorchis, Ang.  
 Orchis prior Dioscoridis, Corn.  
 Orchios primum genus, Dod. gal. Lugd. Thal.  
 Testiculus s. Matth. 3. Lac.  
 Cynosorchis, Ad.

Testi-

Testiculus latifol. Taber. & Saryrion triphyl-  
lon, Eidem.

II. Cynoforchis latifolia hianthe cucullo  
altera.

Cynoforchis mas nostra, vel 4. testiculus, Trag.

Cynoforchis nostra major, Lob. Lugd.

Cynoforchis prior, Dod. media, Cam.

Cynoforchis major 3. Tab. & altera, Ger.

Serapias Dioscoridis, sive Basilica Siderites, vel

Erythraea, Gemmae.

III. Cynoforchis latifolia spica compacta.

Cynoforchis tertia, Dod. Lugd.

Cynoforchis major altera nostra, Lob.

Cynoforchis major quarta, Tab.

Cynoforchis palustris, Ger. ico.

Orchis, Cynoforchis & Testiculus canis major

flore incarnato, Cam.

Serapias Dioscoridis secunda, sive Orchis ba-

silica altera syderites flore candidiore, Gem.

Saryrion sive Orchis major rubra, Svercius.

du Bry.

IV. Cynoforchis latifolia hianthe cucullo

minor.

Cynoforchis altera, Dod. Lugd. Tab.

Cynoforchis major, Ger.

Cynoforchis majoris secunda species, Lob.

Hæc communiter latioribus, rarius angustiori-

bus folijs reperitur.

V. Cynoforchis angustifolia hianthe cucul-

lor quæ 1. in Prod.

### CYNOSORCHIS MILITARIS.

I. Cynoforchis militaris major.

an Testiculus 4. cum Cynoforchide 2. Trag.

Testiculus alius tertio loco, Cord. hist.

Cynoforchis quarta, Dod.

Orchis strateumatica sive striatites major, sive

militaris, Gemmae, quæ Basilica 3. Lob.

Orchis strateumatica major, sive Basilica tertia

Gemmae, Lugd.

Orchis latifolia altera, Clus. pan. & hist.

Testiculus 5. militaris, Tab.

Ornithophora candida, Ger. ico.

Orchis purpurea, du Bry.

II. Cynoforchis militaris media.

Orchis flore rubro elegantissimo, Clus. pan. ac

secunda. Eid. in hist.

III. Cynoforchis militaris minor.

Orchis strateumatica minor Gem. Lob. Lugd.

Orchis strateumatica, Ger.

Testiculus strateumaticus minor, Tab.

IV. Cynoforchis militaris montana spica

rubente conglomeratâ: quæ 2. in Prod.

V. Cynoforchis militaris pratensis latior,

floribus variegatis quæ 3. in Prod.

VI. Cynoforchis militaris pratensis huius

milior.

Orchis Pannonica 4. Clus. pan. & hist.

Orchis minor flore incarnato, Eyst.

Orchis Pannonica, du Bry.

Hujus species altera ampliore, et alio modo

longiore spica.

VII. Cynoforchis montana purpurea o-

dorata.

Orchis quinta odora serapiada Diosc. Trag.

Orchis quarta Dodonæo, Lugd.

Testiculus primus, Matth. species 4. Eidem

comp.

Testiculus candidus, Cord. hist. ico.

Orchis femina, major, Fuch.

Orchis femina, Eid. ico. Tur.

Orchis tertium genus, Dodon. gal.

Testiculus 12. Taber.

Major & minor habetur, quare species duæ

Trago.

VIII. Cynoforchis obscure purpurea o-

dorata.

Orchis Pannonica tertia, Clus. pan. & hist.

Cynoforchis flore purpurascente, Eyst.

IX. Orchis globoso flore.

Orchis rotunda Dalechampi, Lugd.

an Orchis species, floribus quasi in umbella,

Thal.

X. Chamæorchis alpina folio graminæo;

quæ 4. in Prod.

### ORCHIS MORIO.

I. Orchis morio mas folijs maculatis.

Saryrion mas, Brunf. Cynoforchis, Eid. Ang.

Testiculus 1. Matth. icon. 4. Eidem folio, Lac.

Castor.

Orchis altera Dioscoridis, Corn.

Orchis mas angustifolia, Fuch. Tur.

Orchis mas minor, Lon.

Orchis Delphinia palustris, Gem.

Orchis 2. genus, Dod. gal. Thal.

Testiculus morionis mas, Dod. Lugd.

Cynoforchis morio, Lob. Franc.

Cynoforchis morio mas, Tab.

Cynoforchis maculata, Ger.

Satyrium Apulei, Svvert. du Bry.

Flore est purpureo, vel ex roseo candido, purpureis maculis notato.

II. Orchis morio folijs sessilibus maculatis. Cynoforchis delphinia sessilibus maculosis obtusioribus folijs, flore purpureo violaceo, caule sesquicubitali, Lob. ico.

Cynoforchis maculata, Tab.

Cynoforchis morio mas, Gerico.

III. Orchis folijs sessilibus non maculatis. Orchis colore vario, vel s. Clusij, pan. & hist. descript.

Variat floris colore, modò purpureo saturatiore, modò dilutiore, modò carneo, modò omnino lacteo; nunc maculis, interdum nullis, asperis.

IV. Orchis morio femina.

Testiculi species tertia, Marth.

Testiculo alteri adjungit, Lac.

Orchis, sive Cynoforchis femina minor, Fuch.

Orchis angustifolia femina altera, Fuch. ico.

Orchis tertium genus, Dod. gal.

Orchis delphinia montana, Gem.

Testiculus morionis femina, Dod. Lugd.

Cynoforchis morio femina, Lob. Lugd. Ger.

Cynoforchis morio; Tab. Cynoforchis femina, Eyfster.

an Testiculus alius, Cord. hist. Ab hac sola radice, triplici bulbo constante differt, que

Triorchis Serapias mas, Fuch. Lugd.

Triorchis mas minor, Fuch. in ico. Tur. Tab.

Triorchis mas, Lon.

Orchis Serapias mas, Dod. gal.

Huc referri potest

Orchis angustifol. femina altera, Fuch. ico.

Orchis, sive Cynoforchis femina minor, Fuch.

Orchis quantum genus, Dod. gal.

Orchis morio minor, folijs maculatis.

Cynoforchis minimis & secundum caulem pe-

dalem & cubitalem maculosis folijs, floribus purpureis, Lob. ico.

Satyrium maculosum, Svvert.

VI. Orchis flore nudi hominis effigiem representans, mas.

Orchis Antrophora oreades altera, Colum.

VII. Orchis flore nudi hominis effigiem representans, femina.

Orchis antrophora oreades, Colum.

VIII. Orchis flore simiam referens.

Orchis Zoöphora cercopichetum exprimens Oreades, Colum.

## ORCHIS FOETIDA.

I. Orchis barbata odore hirci, brevior et latiorque folio.

Tragorchis, Dod. gal. maximus, Ger.

Testiculus hirci, Dod. Lob. obs. primus, Tab.

Testiculus, sive Tragorchis, Ad.

II. Orchis odore hirci longiore angustiorque folio.

Testiculus hircinus vulg. & leporis testis, Lob.

Testiculus hircinus secundus, Tab.

Testiculus lingua bifurcata, Cus.

Orchis saurodes, vel scincophora lacertarum emulatione, Gemma, Lugd.

Testiculus hircinus vulgaris, Lugd.

Tragorchis mas, Ger.

III. Orchis odore hirci minor.

Tragorchis minor & verior, Gem. sive Coriof.

mires, vel coriophora flore instar cimicum, Lob.

Tragorchis minor & verior, Lugd.

Testiculus hircinus tertius minor, Tab.

Tragorchis femina, Ger.

IV. Orchis odore hirci minor spica purpurea rascens.

Orchis Baravica sexta, Clus. hist.

V. Orchis spica purpurea fetida.

Orchis reterrimo odore fetida, Clu. pan. & hist.

## ORCHIS SERAPIAS.

Serapiades dicuntur, quod horum flores insecta sacunda & lasciva referant, tanquam & Serapiade Alexandrinorum olim Deo nomen habentia: cujus templum excellens Canope erat, ubi lascivij, cantibus & saltationibus colebatur, Strabone 17. sue Geographia referente.

I. Orchis bifolia latissima.

Orchis latifolia maxima, Clus. pan.

Orchis prima amplosimimis folijs, Clus. hist.

Orchis bifolia latifolia, Thal.

II. Orchis bifolia altera.

Orchis latifolia altera, Clus. pan. & hist.

Orch. hermaphroditica, Lug. Ger. secund. Gem.

Testicul. vulpin. Eyfster. hermaphroditicus, Tab.

Orchis ptychodea diphylla, Lob.

Orchis bifolia, Tab.

Testi-

Testiculi species quinta, Cam. epis.

III. Orchis alba bifolia minor calcare oblongo.

Orchis altera serapias, Gef. cat.

Orchis altera Satyrium vulgò, Ang.

Orchis serapias, Bras. at primus, Dod. Lugd.

Orchis bifolius, Cam. Orch. fl. albo minor, Eysl.

Testiculus bifolius, Cord. hist.

Testiculi tertij species prima, Matth. Lugd.

Testiculus vulpinus, Franco.

Testiculus vulpinus primus, Lob. latifol. Tab.

Satyrium trifolium, Eid.

Orchis Ornithophora, Ger. ico.

Orchis flore albo, du Bry. minor & Testiculus leucanthemos, Eysl.

IV. Orchis trifolia major.

Testiculus sacerdotis, Ruel.

Orchidis undecima species, Trag.

Testiculus candid. odorat. major, Cord. hist.

Testiculus vulpis, Dod. gal. Lugd.

Satyrium trifolium, Fuch. Tur. Lon. qui tres bulbos adpingit.

Triorchia trif. Tab. & triorch. major mas, Eid.

Satyrium trifolium, Ama.

Flore communiter est candido: reperitur & purpureo, si quis cum præcedenti eandem volet, facile assentiatur.

V. Orchis trifolia minor.

Culices minores triphyllæ, Lob. ico.

VI. Orchis hermaphrodita.

Orchis batrachites, Gem. Lob. Tab. Lugd.

Orchis Melitrias, Ger. ico.

VII. Orchis fucum referens major foliolis superioribus candidis & purpurascens.

an Orchis Serapias Dioscoridis.

Satyrium quartum, Brunf.

Orchis sexta, & satyrium alterum, Trag.

Orchis sive Testiculus minor violacea floribus, Cord. hist.

Orchis serapias femina, Dod. gall.

Orchis serapias secundus major, Dod. Lugd.

Orchis secunda species Dodonæi, Lugd.

Orchis sphegodes, Gem. Lob. ob. Lugd.

Testiculus vulpinus major, Lob. ico.

Testiculus 7. sphegodes, Tab.

Orchis strateumatica, Ger. ico.

Testiculi species 2. Matth. Lac.

Testiculus figura & colore apem referens, Cæf.

Orchis serapias 2. Dodonæi, Lugd. Eysl.

Triorchis femina, Fuch. Lon.

Satyrium floribus apes referens, Tur.

Satyrium, testiculus vulpinus, Svvert. du Bry.

VIII. Orchis fucum referens flore subvirgata.

Orchidis sextæ species altera, Trag.

Testiculus vulpinus minor, Ad.

Orchis serapias secunda minor, Dod.

Orchis melitrias sive apes cadaverulum exprimens, Lob. Lugd. Tab.

Triorchis femina, Tab.

Orchis myodes & Testiculus vulpinus major, Ger. ico.

IX. Orchis fucum referens colore rubiginoso.

Testiculo vulpino similis minor, Ad.

Testiculus vulp. 2. sphegodes, Lob. ico.

Satyrium minus, Svvert.

Hæc non longè Monspelio in pratis à Latres, caeruleis, punctatis, albis, pallidis, purpureis, variegatis floribus, reperitur.

X. Orchis muscam referens major.

Orchis myodes altera, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus muscarius quartus, Tab.

XI. Orchis muscæ corpus referens minor, vel galeæ & alis herbidis.

Satyrium exiguum & 7. Trag. Satyrium, Tur.

Testiculus pumilio, Cord. hist.

Orchis quintum genus, Dod. gal.

Orchis angustifolia femina tertia, Fuch. ico.

Orchis femina minor, Lon.

Orchis serapias tertius, Dod.

Orchis myodes prima, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus muscarius primus, Tab.

Serapias batrachites, Ger. ico.

Triorchis serapias tertius, Lugd.

XII. Orchis muscam referens lutea.

Testiculus vulpinus luteus, Ad.

Orchis myodes lutea Narbonensis, Lob. Lugd.

Testiculus muscarius tertius luteus, Tab.

Orchis myodes minor, Ger. ico.

Orcheos genus humile, Lugd.

XIII. Orchis angustifolia.

Testiculus 16. minor, Tab.

Orchis andrachnites, Ger. ico.

XIV. Orchis papilionem expansum herbacei coloris referens.

Cynosorchis quintus, Dod.

Orchis Ornithophora, vel ornithes folio lavi, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus vulpinus, Tab.

Orchis Ornithophora folio maculoso, Ger. ico.



Orchis, du Bry.

XV. Orchis papilionem referens, folijs maculatis.

Orchis ornithophora folio maculoso, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus 15. Ornithophorus, Tab.

Testiculus sphegodes, Ger. ico.

Variat foliorum forma, est prægrandibus, parvis, ovalis figuræ ex acuto in latum, vel in rotundum defluentibus: florum colore purpureo, subpurpurascente, albo.

XVI. Orchis papilionem referens angustifolia alba.

Ornithophora candida, Lob. ico.

Orchis ornithophora alba, Lugdun.

XVII. Orchis araneum referens.

Orchis andrachnitis, Lob. ico.

XVIII. Orchis montana Italica flore ferrugineo lingua oblonga: sub Orchide 5. in Prod. desc.

Testiculi tertij species prima, Matth. fig. major.

Testiculi 3. species Matthioli, Lugd. fig. 2.

Testiculus 13. Taber.

XIX. Orchis montan. Ital. lingua oblonga altera.

Orchis macrophylla, Colum.

### MONORCHIS ET TRIORCHIS.

I. Orchis odorata moschata, sive Monorchis.

Orchis pusilla pallida odorata, vel 6. Clus. pan. at 7. in hist.

an Testiculi species minor bulbo singulari, Ges. hort.

Variat folio brevior, latior, longior, & angustior.

II. Orchis lutea hirsuto folio.

Orchis Frisia littoralis, Lob. Lugd. qui & quinram junxit.

Orchis Frisia, Ger.

Testiculus luteus, Tab.

III. Triorchis lutea folio glabro.

Triorchis lutea, Gem. Lob. Lugd. Triorchis lutea 2. Tab.

Testiculus odoratus. Ger. quem cum seq. junxit. Modò terni, modò quaterni pusilli, penduli testiculi subsunt.

IV. Triorchis lutea altera.

Orchis minor Leodiensis, Lob.

Triorchis lutea, Gem. Lugd. prima, Tab.

V. Triorchis lutea radice oblonga.

Triorchis lutea tertia Gemmæ, Lobel. (qui in icon. etiam 2. junxit, ut & Lugd.) Tab.

Orchis Leodiensis, Ger.

VI. Triorchis, vel Tetrorchis alba odorata major.

Tetrorchis, vel Triorchis alb. spiralis, vel autumnalis, Gem. Lob. Lugd.

Testiculus odoratus major, Dod.

Triorchis, Ger. Triorchis odorata, Tab.

Aliquando ternos, aliquando quaternos testiculos oblongos fibrosos obtinet.

VII. Triorchis alba odorata minor.

Satyrium 3. vel odoriferum, Brunsf.

Testiculus candid. odoratus minor, Cord. hist.

Testiculus odoratus, sive Orchis spiralis minor, Lob.

Testiculus odoratus, Ad. Lugd.

Testiculus odoratus minor, Dod. Tab.

Orchis flore albo odorato, Cam.

VIII. Pseudorchis.

Orchis minor radice repente, Cam.

Palma Christi radice repente, Ger.

Orchis repens, Eyst.

IX. Chamaorchis lilifolia.

Orchis lilifolia minor fabuletorum Zelandiæ & Bataviæ: sive

Chamaorchis æggerum Zelandiæ & Bulboerophoro similis bulbis, Lob. ad. part. 2.

an Pseudorchis peripera, Clus. hist.

## ORCHIS PALMATA ET

Satyrium.

Quas Orchides palmas vocamus, eas recentiores *Saryria basslica* nominant. Brunfelsius verò & Tragus, Orchidum feminas faciunt, eo quod præter duas radices instar duarum palmarum junctas (hinc vulgo *Palma Christi*) notam impudicam, vulva muliebri similem, habeant. Digito citrino Avicenna, Matthiolus censet.

Diosco.



*Dioscorides lib. 3. cap. 143. 144. asper duplex proposuit: alterum, quod alij resquid vocant, quod in plurimum verna folia, rumici aut lilio similia, sed minora atque rubescentia habeant, canie nudo cubitali: flore lilij candido: radice bulbosa mali magnitudine, rufa, intus alba, ovi instar, sapore dulci, orig. grato.*

*Alterum quod quidam suo quod quidam cognominatum, quod semine est lini majore, firmo, splendente ac levis: radice cortice aliquantum gracili ac rufa, internis alba, dulci & grata: quæ non secus ac prior viderem potenter stimulat. Plinius, Satyrium cum Orchide confundit, ut lib. 26. cap. 10. videre est, & Satyrij aliud genus erythraicon appellari scribit.*

*Matthioli videtur ad descriptionem Dioscoridis, duplex Satyrium proposuisse: de utroque autem dubitatur.*

### Satyrium.

I. Satyrium primum, Matth. Lugd.

Satyrium trifolium, Cast.

Hoc alij Phallum Hollandicum, alij Faufel, cœtria folia affigunt, censent.

II. Satyrium erythronium, Matth. Lugd. Cast.

De utroque dubij sumus, & Camerarius in suo emaculato Matthiolo omisit.

III. Satyrium à Guinea, Rob. Svvert. nec dum vidimus.

### Orchis palmata.

I. Orchis palmata pratensis latifolia longis calcaribus.

Palma Christi major, Matth. desc. Franco.

Palma Christi altera, Cord. hist.

Palma Christi & Serapias mas levi folio, Lob.

Palma Christi mas, Ad. Ger. prima, Tab.

Satyrium basilicum, Corn.

Satyrium basilicum mas, Gesl. col. Dod. Lon. descript.

Satyrium basilicum majus recentiorum, Lugd. descript.

Satyrium recentiorum Græcorum, & basilicum mas latifolium alterum, Thal.

Palma Christi erecta variegata, Eyst.

Satyrium sive Palma Christi, Svvert.

Flores saturato rosei, maculis purpurascensibus insigniti.

II. Orchis palmata pratensis angustifolia major: quæ 6. in Prod.

Palma Christi; Eyst.

III. Orchis palmata pratensis maculata, Orchis femina altera, Frag.

Satyrium basilicum Græcor. & officin. Christi-palma, Ruel.

Satyrij genus, basilicum Græcum, Gesl. cat.

Satyrium basilicum femina; Gesl. col. Lon. Dod.

Palma Christi, Ama. Cord. hist. Cæs.

Palma Christi femina, Ad. Ger.

Palma Christi maculata, Tab. Franco, Eyst.

Palma Christi, serapias femina pratensis, Lob.

Satyrium femina folijs maculatis, Thal.

Serapias femina pratensis, Lugd.

Orchis serapias, Cam.

Satyrium femina, Svvert. du Bry.

Variat: flore, qui in purpura vel rubet, vel dilute ad cœruleum inclinatur, vel albus est: vel variegatus, albis maculis ac venulis rubescentibus distinctus: interdum maculis caret: huc

Palma Christi erecta flore candido & fl. variegato, &

Palma Christi candidis floribus; Eyst.

IV. Orchis palmata pratensis maxima.

Cynosorchis macrocaulos, sive conopsea, sive galericulata, Gem. Lob.

Cynosorchis conopsea; Lugd.

V. Orchis palmata minor calcaribus ob-

longis:

Serapias minor, Lob. minor rubra Gemme, Lugd.

Serapias minor nitente flore, Ger.

Palma Christi minor mas, Tab.

VI. Orchis palmata angustifolia minor.

Satyrium femina, Brunf.

Satyrium alterum, Trag. desc.

Orchis femina, Trag. ico.

Palma Christi major, Matth. ico. tertia, Cord.

hist.

Satyrium basilicum majus, Lugd. ico.

Satyridul basilicum mas, Fuch. Dod. gal. Lon.

ico.

Satyrium basilicum mas, tenuifol. Thal.

Satyrium regale, Tur.

Palma Christi femina, Tab.

Palma Christi peregrina flore rubro, Eyst.

VII. Orchis palmata angustifolia minor odoratissima: in Phytopinacé, & sub 7. in Prod. descripta.

VIII. Orchis palmata caryophyllata.

Orchis serapias caryophyllata, Lob. ico.

IX. Orchis palmata sambuci odore.

Orchis serapias 7. Clus. pan. Pannonica 8. hist.

Duplex est: 1. floribus exalbidis, foliolis sub floribus pallidis. 2. floribus purpureis, foliolis purpureiscentibus.

X. Orchis palmata batrachites.

Serapias batrachites, vel Myodes, Lob. ico.

XI. Orchis castrata.

Satyrium castratum vel eunuchum, Lob.

Satyrium castratum, Gemmæ, Lugd.

Testiculus sextus castratus, Tab.

Serapias castratum, Ger.

XII. Orchis palmata palustris latifolia.

Serapias palustris latifolia, Lob. Ger.

Satyrium basilicum foliosum, vel 3. Dod.

Satyrium basilicum mas latifolium 1. Thal.

Cynosorchis palustris platyphylla, Gemmæ, Lugd.

Palma Christi palustris, Franco 3. Tab.

Satyrium latifolium, Syvert. du Bry.

Palma Christi flore purpureo, Eyst.

XIII. Orchis palmata palustris altera.

Serapias palustris altera leptophylla, Lobel. Lugd.

Cynosorchis palustris altera, Gem. & Ger.

Testiculus galericulatus, Tab.

XIV. Orchis palmata palustris tertia.

Cynosorchis palustris lævi folio, Lob.

Cynosorchis leptophylla, Gem. Lugd.

Palma Christi palustris 2. Tab.

Serapias palustris latifolia, Ger.

XV. Orchis palmata palustris maculata.

Cynosorchis palustris altera lophodes, vel nepelodes, Gem. Lob. Lugd.

Palma Christi palustris 1. Tab. Ger.

XVI. Orchis palmata palustris tota rubra.

Cynosorchis Dracontias, Gem. Lob. Lugd.

Tragorchis, Tab. ico.

Serapias palustris leptophylla, Ger. ico.

XVII. Orchis palmata flore viridi: quæ 8. in Prod.

XVIII. Orchis palmata montana maxima: quæ 9. in Prod.

XIX. Orchis palmata montana altera.

Serapias montana folio lævi, & Cynosorchis montana, Lob.

Serapias maxima folio lævi, Gem. Lugd.

Serapias mont. Tab. Serap. caryophyll. Ger. ico.

XX. Orchis palmata montana maculata.

Cynosorchis mont. folio maculoso. Gem.

Serapias candido flore (montana) Lob. Lugd. Ger.

Palma Christi major, Cast.

Palma Christi maculata montana, Tab.

Satyrium folijs macularis, Syvert.

XXI. Orchis palmata angustifolia alpina nigro flore.

Satyrium basilicum alpinum, Gef. hor.

Satyrium basilicum odoratiss. Gef. cit.

Satyrium basilicum minus, Dod.

Palma Christi minor, Matth. Lugd. Franco. Cast. descript.

Orchis minor odoratus, Ad.

Palma Christi minor femina, Tab.

Orchis serapias odoratiss. flore minima alpina, Cam.

## ORCHIS ABORTIVA.

I. Orchis abortiva fusca.

Coagulum terræ Plinii quibusdam.

Satyrium nonum, Trag.

Orobanche, Gef. col.

Orchis sylvestris, Lon.

Neottia, Dod. Franco.

Nidus avis, Dod. gal. Lob. ico. Lugd. Eyst.

Satyrium abortivum (spec. Hypocistidis) Lob.

ico. part. alt. & Ger.

Orchis abortiva Lobelij, Clus. hist.

an Orobanche prima, Tab.

II. Orchis abortiva violacea.

Limodorum Austriacum, Clus. pan.

Pseudolimodorum, Eidem hist.

## OPHRIS.

**A**D Orchides propter formam referenda videtur Ophris à Plinio lib. 6. cap. 15. nominata, quam vocem aliqui Supercilium reddunt.

I. Ophris

I. *Ophris bifolia*.*Perfoliata sylvestris mas*, Brunf.*Satyrium* 10. & *bifolium*, Trag.*Allima*, Cord. Ges. hort.*Ophris*, Matth. Fuch. Ang. Ges. cat. Cast. Tab.

Cam. Cæs. Thal. Franc.

*Bifolium*, Dod. gal. Ad Lob. Lon. Cam.*Pseudorchis seu bifolium*, Dod.*Ophris bifolia*, Ger.

Est major &amp; minor, tam in hac, quam in trifolia.

II. *Ophris trifolia*.*Perfoliata sylvestris foemina*, Brunf.*Ophris trifolia*, Tab. Ger.III. *Ophris bifolia bulbosa*.*Pseudorchis*, seu *Bisfol*: *bulbosa*, Dod. ed. Belg.

&amp; post.

IV. *Ophris minima*: in Prod. descripta.an *Ophris pumilum* & *tenellum* genus, Clus. cur. post.

## DENS CANIS.

I. *Dens canis* latiore rotundioreque folio.*Mithridatum Cratevæ* Plinij, Ang. Cæs.*Pseudohemodactylus*, Matth. Lugd. Tab.*Hemodactylus Meluzæi*, folio maculoso, &*Dens canis*, Gesn. hort.*Satyrium erythronium*, Ges. col. Ad. Lob. ico. Taber.*Dens caninus*, Dod. (Ephemero Diosc. convoniens) Cæs. Cam. Ger.*Dentali* 1. Clus. pan.*Dens caninus purpurascens* flore, Clus. hist.*Satyrium* & *Dens caninus*, Lob.*Satyrium rubrum Dalech.* Lugd.*Dens canis* flore rubro, Eyst.

Flos ex purpura rubet, aut candore micat,

aut purpure ex candore confusus pallet: qui flore

rubro est, maculis rubris: qui albo, laeteis

maculis variegatur: sic folia aliquando macu-

lata, aliquando ijs carent: &amp; communiter bina

habet: tantùm bina, Cæs. Galp. plurimum ternas,

Advers. rariora, Clus. quina etiam, Lugd.

II. *Dens canis* angustiore longiore folio.*Erythronium* flore albo angustioribus folijs, Lob. ico.*Dentali* 2. Clus. pan.*Dens caninus* albo flore, Clus. hist. Cam. Eyst.*Satyrium trifolium* & *Satyrium Dalech.* Lugd.

Flos lacteus, aut ex purpurascens alboque

mixtus.

## OROBANCHE.

**O** *ῥοβάγχη*. *Ervangina Gaze*, quod ῥοβόρα γὰρ, erum strangulet, dicitur. Duplex est, aliud Theophrasti 2. hist. 5. aliud Dioscoridis l. 2. c. 172. & *Orobanchè* Plin. l. 18. c. 17. & l. 22. c. ult. nominatur.

I. *Orobanchè major garyophyllum olens*.*Limodorum* (quasi famem adferens) Theophrasto.*Orobanchè*, Dioscorid. Galen. Oribasi. Eginet. Aëtio.*Cynomotion*, à canini genitalis similitudine, Plinio.*Leonina herba*, Hermolao, & *Legumen leoninum*, Ruel.*Leob herba*, Constantino.*Orobanchè*, Matth. Ama. (herba tauri, vel vaccae) Arg. Cord. in Diosc. Lac. Ges. cat. (Leontobotanos) Lon. Lob. Cast. Thal. Cæs. Eyst.*Orobanchè vera*, Ges. hort.*Limodorum*, sive *Orobanchè*, Dod.*Orobanchè* 1. Clus. hist. altera, Lugd. Tab.*Rapum genista*, Dod. gal. Ger.

Variat: quæ genistæ vulgari adnascitur, flore

est subviridi: quæ Hispanicæ, floribus majoribus luteis.

Hæc semper asicujus vicinæ plantæ fibris

adnascitur: observavi ad Genistam, florem tin-

ctorum, Hieracium Sabaudum, Trifolium, A-

stragalum sylvaticum.

II. *Orobanchè flore majore*, ex cæruleo pur-

purascens: quæ 1. in Prod.

III. *Orobanchè Monspelica floribus ob-*

longis.

*Orobanchè major*, Lob. ico.*Limodorum Monspetiatum*, Clus. pan.

IV. Orobanche majore flore.

Orobanche quarta, Lob. ico.

Orobanche, Eyslet.

V. Orobanche quæ Hypopytis dici potest: quæ 3. in Prod.

VI. Orobanche ramosa.

Orobanche 5. Lob. ico.

Orobanche altera brevior & ramosa, Cæf.

Orobanche, Cam. ad Matth.

Orobanche 3. Clus. hist.

Variat 2. floribus aliquando caeruleis, aliquando purpureis, aliquando subalbidis, & libenter inter Cannabem nascitur.

VII. Orobanche radice dentata major.

Dentaria major, Matth. Lob. Lugd. Cam. Franco, Ger. Eyslet.

Anblatum (id est aphyllon, quod folijs careat)

Cord. hist. Dodon. (& radix squamata) Thal.

Squamaria, Lon.

Dentaria major, five 1. Clus. pan. & hist.

Dentaria abique folijs, Cast.

Dentaria crocodilia, Tab.

Arachidum è genere Orobanches, Cæf.

Egoletros Plinij, malus Henricus vinitoribus, Gef. in hist. bovis & col.

VIII. Orobanche radice dentata minor.

Dentaria altera, seu min. Clus. pan. & hist.

An Anblati species minor, Thal.

Clusius, suæ flores ex albo purpureas tribuit: Thalius, candidam totam scribit.

IX. Orobanche radice coralloide.

Dentaria 3. Clus. pan.

Dentaria coralloide radice, Clus. hist. Eyslet.

Dentaria minor, Ger. aphyllus minor, Tab.



# CASPARI BAUHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER TERTIVS. OLERA ET OLERACEA.

## SECTIO PRIM A.

RAPA: RADICES INDIS EDVLES: RAPVNCV-  
lus: Campanula: Rapistrum: Napus: Raphanus: Lepidium: Ibe-  
ris: Dracunculus esculentus: Eruca: Sinapi: Rhedra: Luteo-  
la: Erysimum: Hydropiper, sive Persicaria: Capsi-  
cum, sive Piper Indicum.

## RAPA ET EJUS SPECIES.

**R**apa, quasi ruapa, quod è terra eruatur, Varroni l.4. ling. Lat. at verisimilius à Græco  
ῥάπα, Athenæo l.9. c.2. ῥαπα, Dioscoridi l.2. c.134. à rotunda orbicularve radicis  
figura. Genera: Theoph. l.7. hist.4 ait alios diversitatem generis putare, alios negare, sed mare  
santum saminas, differe, & ambas ex eodem semine nasci, sed ut effaminentur raras de-  
ponendas: nam si densa posita sint, omnes mascullescere: at 7. hist.6. Rapa sylvestris meminit.  
Sic Dioscorides, sativum & sylvestre agnoscit. Plin. l.18. c.13. Græcos secutus, duo prima fecit  
genera, masculum, saminemq;, & modum eas ferendi ex eodem semine. Species verò omni-  
um tres (addit) aut in latitudinem fundi, aut in rotunditatem globari: tertiam speciem  
sylvestrem appellavere, in longitudinem radice procurrente: & l.19. c.5. Medici, masculini  
sexus faciunt in his rotunda: latiora verò concava saminini.

Dividimus in sativam & sylvestrem: illam in longam & rotundam, sive saminam  
& marem: rotundam, in sessilem & orbiculatam. Raparum solum in India tam ferax  
est, ut ea in vijs quosq; publicis sponte proveniant: ita ut cum Indi in nonnullis locis agros  
frugibus consituri essent, propter ingentem Raparum propaginem, ab insituto ipsis desisten-  
dum fuerit: Joseph. Acosta l.4. c.18.

### I. Rapa sativa rotunda.

Rapa mas, Theoph. Plinij: Rapum, Dioscorid.  
Rapa sativa, Brunf. Cord.  
Rapum sativum, Fuch. Ruel. vulgare, Trag. Dod.  
Rapum vel Rapa, Ang. Tur. Lac. Gef. hor. Cast.  
Rapum rotundum, Matth. Lon. Ama.  
Rapum sessili rotunditate, Cæs.

Rapum majus orbiculat. seu turbinat. ad. Lob.  
Rapum sativum orbiculatum, Lugd.  
Rapum orbiculatum, Franco, Taber.  
Rapum rotundum, utrumque majus & minus,  
Taber.  
Rapum majus & minus rotundum, Ger. at ro-  
tundum Rapum utrumq; sub Buniade.



Variat colore externo radicis, viridi, candido, puniceo, obsoletè nigricante: habentur aliquando in Alsatia, quæ foris & intus flavescent: magnitudine & parvitate, Plinius & Tragus 40. Amatus verò 50. & 60. libras excedentes viderunt: communiter forma tuberosa, rarè globi instar orbiculata, frequentius in latitudinem effusa.

II. Rapa fativa oblonga, seu fœmina.  
Rapa fœmina, Theoph. & Plinio.  
Rapum oblongum, Trag. oblongius, Dod.

Rapum longum, Matth. Lon. Cast. Lugd. Franc. Tab. qui majus & minus facit: utrumque sub Raphano fativo Gerardus habet.

Rapum tereti, rotunda, oblonga quæ radice, Ad. Lobel.

Rapa oblonga, Ama. Cæf.

Aliquando cubitalis, rariùs sesquicubitalis est: sic 30. librarum Matthioli notavit.

III. Rapa sylvestris: & Cæf.

Rapum sylvestre, Matth. Lugd. Rab. Ger.

Rapum sylvestre non bulbosum, Ad. Lob.

## RADICES VARIAE, QVIBVS INDI vescuntur & utuntur.

**Q**uemadmodum varijs fructibus ob insignem arborum fructiferarum varietatem vescimur: sic in India Occidentali, varijs radicibus in cibis utuntur. Quare Josephus Acofta lib. 4. c. 18. vel par. 9. Ind. Occid. recenset, Papas (de qua inter Solana agemus, Solani tuberosi esculenti nomine) quæ ipsi præcipua est, Manihot, Ocas, Yanocas, Camoses, Batates, Xiquimas, Yuca, Cochucho, Cavi, Totoras, Mans: addens & alias infinitas esse, & inter ceteras Batates, quæ instar cibi delicati & suavisimi comeduntur. Sic etiam radices ex Hispania ad Indos delatas magis propagari, quàm Indicas, si in Europam deferantur. Et Ulricus Faber, ut in par. 7. Amer. cap. 9. habetur, apud Carios Indiae populos, Trivicum Turcicum, vel Meijs & Mandeochade, Padades, Mandeoch parpij, Mande poere, Mandurijs, Yache Ku, &c. invenisse refert.

I. Rapum Americanum folijs Bryoniae.  
an Oetum Plinij l. 21. cap. 15. mandunt (scilicet Aegyptij) & Oetum, cui pauca folia minimaq; verum radix magna.

oetum (alii ὄγγον legunt) sive Vingum ut Gaza reddit, Theophr. l. 1. c. 11. quod Aegyptij Vingum appellant, folia habet ampla & germen pusillum, sed radix longa & in modum fructus, & cibo idonea.

Hetich Indis & Aethiopicibus, Dalech. in Plinium.

Hetich Americum Theveti, Lugd. Lerio desc. Brafc. c. 12.

Radix rapis magnis similis, longitudine sesquipedali, crassitudine amborum pugnorum: cuius tres species Lerus censet: nam inter coquendum alia violaceum, ceu pastinacæ: alia aureum, ut cotonea mala: alia denique album colorem acquirit.

II. Rapum Brasilianum, sive Americanum alterum.

Igname in Insula S. Thomæ, Scalig. Lugd.

Ignames, Advers.

Iniamos in Guinea cibis Negritarum vulgarissimus, quo & panis loco utuntur: par. 6. Ind. Or. c. 38. & 57. & Linfco. par. 4. Or. c. 11.

Ingnamos, par. 6. Ind. Or. c. 12. & 23.

Inhame Lusitanorum, sive Igname, Clus. hist. & notis in Garzi.

Tres species propter medullæ colorem: at lutea, Carotæ colore in pretio est: magnitudine etiam variat: ac Clusius duplex genus agnoscit.

Alterum à priori differens cortice inæquali & tuberculis obfita, cum viticulis spinosis, quam Ycam Perun nominant.

III. Mandioca: radix in Insula S. Catharinæ: hist. Brasil. sive par. 3. Amer. c. 4. 9. 11. 15. 17.

IV. Manihot Indorum, sive Yuca folijs canabinis.

Arachidna, Theoph. & Aracidna Plin. quibusd. Manihot, Theueti, Lugd. Lerio desc. Brafc. c. 8.

Yuca, Gomaræ, hist. gen. Lugd. Joseph. Acoftæ l. 4. c. 17.

Yuca



Yuca Peruana, Frag.

Jucca, Benzoni, l. r. c. 28. vel par. 4. Ind. occid.

Mandoechade radix apud Carios: par. 7. Am. 7.

Mandioca: par. 3. Amer. l. r. c. 4. 9. 17.

Cocushavv, Hariot in Virginea.

Hujus folium latum in septem lacineas divisum esse scribitur: at radix brachij crassitie, ex qua Indi farinam conficiunt, (par. 2. & 3. Amer.) qua cum carne & piscibus, ut nos pane utuntur: ex ea & placentas & panem conficiunt, quem Cazabis, Benzo: apud Monardes & Acofta, Cacavi nominant: sic in Hispaniola ex hac secundarium panem, quem Cazabi vocant, conficiunt, (par. 5. Ind. occid. 12.) ex hujus succo potionem parant: par. 3. Amer. lib. 2. cap. 15.

Huc referre oportet

Maniel folijs pconiae: par. 3. Am. ep. 2. de Bras.

V. Hatle radix in Florida, ex cujus farina in annonae penuria panis fit: par. 2. Amer.

VI. Aypi Brasilianorum, radix sesquipedalis, femoris crassitudine, ex qua farinam duplicem conficiunt: aliam percoctam & duram, quo diutius conservetur: aliam minus coctam & molliorem, panis candidi medullae saporem referens: illam Ovy-entan, hanc Ovy-pou appellant folijs pconiae similitudine: Lerio descript. Brasil. sive par. 3. Amer. c. 8.

VII. Yuca folijs Aloës.

Yuca, Gerardo.

Yuca nova gloriose elata & opinata, Lob. ad altera parte.

VIII. Batatas, Camotes Hispanorum, Clus. hisp. & hist. Lugd. Cast.

Battades, Ad.

Batata Hispanorum, Camotes sive Amotes & Ignames, Lob.

Batatas Indiae occid. Benzoni, Monard.

Potates & Potate, quas Camotes nominant: par. 8. Ind. occid.

Camotes, Joseph. Acoftae, lib. 4. cap. 18. Frag.

Batates radix: par. 9. Ind. occid. l. 4. c. 18. cibis

Nigritarum vulgaris: par. 6. Ind. orient. 38.

Batatas fructus in Angra; Linscot. par. 3. Ind.

orient. 6. & par. 4. cap. 12. & par. 8. & par. 9.

addit. Ind. occid.

Pina sive Batata radix: par. 8. Ind. occid.

Sifaram Peruvianum, Tab. Ger.

Radix Raphani praegrandis amplitudine: genera tria, corticis colore vel purpurascens, vel pallente, vel candido, quae assata fructuum, vel leguminum loco Indis est.

IX. Hajas Indiae occident. similis Batate,

nisi quod minor & suavior sit: Benzon. sive

par. 4. Amer. cap. 28.

Aies, Clusio.

X. Cochucho, radix parva, dulcis, quam

aliqui, quo magis in delicijs sit, condiunt: Jo-

seph. Acoft. lib. 4. cap. 18.

XI. Xiquimas, radix qua aestate utuntur ad

refrigerandum sitimque sedandam: Idem, l. c.

XII. Mandoech parpie, radix Castanea-

rum sapore: par. 7. Ind. occid. 7.

XIII. Mandoech Mandapore, radix ex qua

vinum conficiunt, l. c.

XIV. Bacheke radix: par. 7. Ind. occid. c. 18.

XV. Mandues, Carios populi edunt par. 7.

Ind. occid.

XVI. Mandepore: apud Siberos radix su-

pra terram eminens amplissimis folijs, quae

aquam continet, non secus ac si in vase asserva-

retur, & ex radice saepe dimidius cantharus

exprimitur, qui colorem lactis habet, par. 7.

Ind. occid. cap. 26. etiam ex hac radice vinum

conficiunt: Idem cap. 7.

XVII. Cardes radix, qua Indi ad levan-

dum sitim utuntur: par. 7. Ind. occid. c. 3. & 21.

XVIII. Cassavi radix: par. 8. Ind. occid.

XIX. Tagari, radix in Naupon pro lavan-

do corpore: par. 4. Ind. orient. cap. 8.

## RADICES VARIÆ IN INSULA

Virginea.

**R**adices quarum in Insula Virginea pro cibis usus est, Thomas Hariot recenset, & sunt Opinavvk, Okcepenauk, Koishucpenauk, Tsinavv, Cocushavv, Habascon.

I. Opinavvk; idem cum Papas Acoftae, quod Solanum tuberosum esculentum nominamus.

II. Okcepenauk, radix rotunda, capitis humani magnitudine, quam cum carnibus & pi-

scibus in panis penuria comedunt: Hariot.

III. Koishucpenauk; radix alba, ovi galinacei magnitudine & forma, qua elixa vescuntur, Hariot.

IV. Τήσιν αὖ; radix, Chinæ similis, ex cuius succo cum aqua, panis pinfitur, & puls, gelatinæ similis, conficitur, Hariot.

V. Cocuschavv, Hariot; est Manihot

Indorum, de quo antè.

VI. Habascon; radix magnitudine & figura pastinacæ, quæ cum alijs coquitur: Hariot.

## RAPUNCULUS ET CAMPANULA GLABRA.

**R**apunculus vulgò dictus, γογγύλη ἀγρία, rapum sylvest. Dioscoridis, lib. 2. cap. 135. male censetur: & à Plinio lib. 20. cap. 3. Rapi sylvestris nomine proponitur. Alijs Falsione ejusdem, l. 22. c. 22. creditur, cuius tamen verba, ut quidam censent, rectius ad Smilacem levem referuntur. Erinus Nicandri & Dioscorid. l. 4. Erineon Plinij, l. 23. c. 7. ex Columna sententia. In hanc Classem & Campanula, à floribus forma nominata, referenda sunt.

### I. Rapunculus esculentus.

Raponeoli, Brunf.

Rapunculus vulgare, Trag.

Rapunculus, Matthioli. Lac. Dod. Camer. Tab.

Cast. Cæs. Portæ.

Rapum sylvestre, Gesf. hort. Fuch. Dod. gal.

Rapuntium parvum, Ad. Lob. (& pes locustæ Avicennæ) Ger.

Rapunculus minor, Matth. & Dodonæi, Lugd.

Erinus Nicandri & Diosc. Colum.

Flore est cæruleo, purpureo, aliàs candicante.

### II. Rapunculus minor folijs incisif.

Erinus, Cæsalp.

Erini seu Rapunculi minimum genus, Colum.

### III. Rapunculus spicatus.

Rapunculum sylvestre, Trag. Lon.

Rapi syl. genus, in syl. & mont. Gesf. hor.

Rapum sylvestre majus, Dod. gal.

Rapunculum alopecuron & Rapi sylvestris 6. genus, Dod.

Rapuntium majus alopecuron comoso flore, Ad. Lob.

Rapunculus alopecuroides longa spica, Clus. hist.

Rapunculus syl. spicatus, Thal.

Rapunculus major Dodonæi, Lugd.

Phyteuma folijs Rapunculi, Cæsalp.

Rapunculus flore spicato purpureo & albo, Camer.

Rapunculus nemorosus primus, Tab.

Rapuntium majus, Ger.

Spica vel longior, vel brevior alba, vel cinericea; hæcque variat folijs modo maculis nigris ad umbilicum notatis, & marem; modo non maculatis, & feminam dicunt; est & coloris violacæ elegantis & saturi.

### IV. Rapunculus folio oblongo spicâ orbiculari.

Rapunculus Alopecuroides orbiculari penè spica, Clus. hist.

Rapuntium corniculatum montanum, Colum.

Spicâ est orbiculari; folijs etiam variat.

V. Rapunculus scabiosæ capitulo cæruleo. Scabiosæ 3. genus sive ovium, Dodon. gal. Gesf. hort.

Scabiosa minor, Dodon. ico. 3. descript. minor 5. Tab.

Scabiosa media servato angustifolio flore globulariæ, Ad.

Scabiosa media, Lob. Lugd.

Scabiosa ovilla, Cam.

Aphyllantes 1. Theoph. Lugd.

Rapuntium alterum leptophyllum capitatum, Colum.

Scabiosa syl. minor cærulea, Eysl.

Caulis habet 5. 7. etiam 30. flores cæruleos, rarius albos: folia aliquando crenata, aliquando solum hirsuta.

Huc pertinet

Rapunculus syl. spicatus cæruleus, Thal.

VI. Rapunculus umbellatus Sonchi folio.

Rapunculus Sonchi folio, Clus. hist.

VII. Rapunculus umbellatus latifolius.

Rapunculus syl. cæruleus umbellatus minor, Thal.

Rapunculus syl. umbellatus 2. Cam.

VIII. Rapunculus umbellatus angustifol.

Rapunculus syl. cæruleus umbellatus major, Thal.

Rapunculus syl. umbellatus 1. Cam.

IX. Rapunculus umbellatus foliogramineo.

Rapunculus syl. umbellatus 3. Camer. ico. ad.

Thal.

Rapun-

Rapuntium alterum angustifolium alpinum, Colum.

X. Rapunculus persicifolius magno flore.

Phyteuma, Matth. Lugd. Cam. Cæs.

Campanula cærulea sativa, Dodon. gal. sive hortens. Lugd.

Campanula media, Dod.

Campanula hortensis persicæfolia lacticiniosa flore volubilis, Ad.

Campanula Persicæfolia, Lob. Clus. hist. Ger.

Rapunculus campanulatus Nerijfolius 1. Thal.

Campanula angustifolia, Tab.

Flore est cæruleo, aliquando albo, & sub Campanula alba & cærulea persicifolia, Eyst. pingit.

XI. Rapunculus nemorosus angustifolius magno flore major.

Rapunculus nemorosus 2. Tab. nemorosus, Ger.

Rapunculus campanulatus Nerijfolius 3. Thal.

Rapunculus syl. major, Eyst.

XII. Rapunculus nemorosus magno flore minor.

Rapuntium sive Erinus magno flore, Colum.

XIII. Rapunculus nemorosus angustifol. parvo flore.

Rapunculus nemorosus 3. Tab.

Campanula lutea linifolia, Ger. ico.

XIV. Rapunculus hort. latiore folio seu Pyramidalis.

Campanula major, Dodon. major lactescens, Lob. Lugd.

Campanula lactescens foetidior, Clus. hist.

Pyramidalis, Cast. Lugd. Lutetiana, Eyst.

Campana Pyramidalis, Cam.

Campanula lactaria, Tab.

Campanula lactescens pyramidalis, Ger.

Folio est oblongo, quandoque subrotundo.

XV. Rapunculus Creticus, seu Pyramidalis altera.

Petromarula seu lactuca petraea Cretica Belli, Ponæ: & apud Clus. in epist. 1. Belli. Petromarula, Rapunculus Creticus, Imperato.

XVI. Rapunculus alpinus, seu pyramidalis minor: qui 1. in Prod.

an Campanula, folijs ferratis cærulea, Eyst.

XVII. Rapunculus alpinus corniculatus, quem sub Rapunculo alpino spicato simili, in Phytopinace & Matthiolo, & 2. in Prod. descripsimus.

Trachelium petraeum minus, Ponæ.

Rapuntio corniculato affinis, Colum.

XVIII. Campanula alpina latifolia flore pullo.

Rapunculi alpini latifolij nomine, Doct. Burserus ex Austria misit; sub 3. in Prod.

XIX. Campanula alpina linifolia cærulea: in Phytopin. sub. 3. in Prod. sub. 4. descripsimus, quæ cum sequenti minimè confundenda.

XX. Campanula minor rotundifolia vulgaris.

Rapi syl. genus minus, quod Campan. cærulea, agrestis, Ges. hor.

Campanula sylvestris minima, Dod.

Campanula minor, Ad. (Clus. hist. solo nomine) sive minor rotundifolia, Lob. Lugd.

Campanula minor alpina rotundioribus imis folijs, Clus. hist. ico.

Rapunculus campanulatus linifolius seu 7. Thal.

Capunculus sylvestris minor, Tab.

Campanula rotundifolia, Ger.

Rapuncula minor sylvestris flore cæruleo, Eystett.

Floribus communiter cæruleis, subinde candidis.

XXI. Campanula minor rotundifolia flore in summis cauliculis.

Rapunculus sylvestris flore ex purpureo candicante, Tab.

Rapunculus sylvestris flore albo, Eidem.

Rapunculus sylvestris minor, Eyst.

Campanula minor alba: & purpurea, Ger.

XXII. Campanula minor rotundifolia alpina.

Campanula minor alpina, Clus. pan. & hist. descrip.

Phyteuma alterum montanum, Cæs.

Flos nunc cæruleus, nunc purpureus, aut violaceus, modò colore dilutiore, & quasi cinereo, interdum niveo.

XXIII. Campanula rotundifolia minima. Cantabrica Plinij, Ang.

In Phytop. & in Prod. sub. 5. descripta.

XXIV. Campanula Cymbalariae folijs, vel folio hederaceo: in Phytop. & in Prod. pro 6. descripta.

XXV. Campanula serpillifolia.

In Phytopinace, & in Prod. pro 7. descripta.

# TRACHELIVM SIVE CAMPANULA hirsuta.

**T** *Rachelium* dicitur, quod in colli affectibus commendetur; hinc *Cervicaria*, imò & *Uvularia*: & à forma, *Campanula*.

I. *Campanula maxima folijs latissimis.*

*Trachelium majus* Belgarum, Lob. (& *Trachelium majus* Anglicum septentrionale candidum, Eid.) Clus. hist.

Hæc instar suffruticis est & perennis, florum colore varians, albo, cæruleo, & etiam cinereo.

II. *Campanula hortenſis* Rapunculi radice. *Trachelium* in maritimis, Ad.

*Trachelij* genus molliorib. fol. Clus. pan. & hist. *Cervicaria* 4. Dod. major syl. Eyst.

III. *Campanula folijs subrotundis* : pro *campanula hirsuta* prima in Prod. describitur.

IV. *Campanula hortenſis folio & fl. oblongo.* Medium, Matth. Gef. hor. vulgare, Cam.

*Rapi* syl. genus maximum, Gef. hor. *Viola Mariana*, Gef. hor. Ad. Lob. Dod. cui & *Rapum* syl. Dioſc. Lugd. Clus. hist. Tab. alba & purpurea, & Ger.

*Rapunculi alterum* genus grandius, Cæf.

Flore est communiter cæruleo, est & purpureo, subalbido & lacteo: hinc figuræ quatuor apud Eyst.

Medium fl. albo: cæruleo: purpureo & argenteo. (flore pleno reperiri asserunt.)

V. *Viola mariana laciniatis folijs peregrina.* Medium Dioſcor. vel *Mindium Rhafis*, Rauwolfſſ. in Itin. & Lugd. & Cam. in Matth.

VI. *Campanula Drabæ minoris folijs*: est *Campanula hirsuta*, 2. in Prod.

VII. *Campanula vulgatio* folijs urticæ, vel major & asperior.

*Uvularia major*, Trag.

*Campanula*, Ang. major, Fuch.

*Trachelium majus*, Dod. gal. Lugd. Ger.

*Cervicaria*, Lon. & *Digitalis purp. altera*, Eid.

*Cervicaria major*, Dod. Tab.

*Trachelium* five *Cervicaria*, Ad. Lob.

*Trachelium folijs urticæ*, Clus. pan. five vulgare, Clus. hist.

*Archangelica*, Cæf.

*Rapi* syl. genus majus folijs ferè urticæ, Gef. hort.

*Cervicaria maxima*, Thal.

Flore est communiter subcæruleo, est dilute

purpureo, est & candido; tota planta strigosior reperitur, hinc tres figuræ apud *Tabernæmontanum* & *Gerardum*: & apud Eyst. duæ, *Cervicaria hortenſis* flore cæruleo.

*Cervicaria hortenſis* flore albo.

VIII. *Campanula urticæ folijs oblongis minus asperis.*

*Cervicaria major altera*, Dod.

IX. *Campanula media folijs inferius candida lanugine vestitis.*

*Cervicaria media*, Thal.

X. *Campanula folijs Echij.*

*Cervicaria major tenuifolia*, Thal.

*Trachelium* *hirsutius* Clusij, ipsi Cam.

XI. *Campanula folijs Echij floribus villosis*: quæ 3. in Prod.

XII. *Campanula folijs Anchusæ floribus oblongis.*

*Trachelium montanum*, Lugd.

XIII. *Campanula alpina pumila lanuginosa.*

*Trachelium pumilum alp.* Clus. pan. & hist.

XIV. *Trachelium saxatile folijs pulmonariæ Gallorum.*

*Pyramidalis villosa saxatilis latifolia*, vel *Rapunculus montanus pulmonariæ Gallorum folio & Trachelij flore*, Clus. cur. post.

XV. *Campanula alpina sphærocephalos.*

*Trachelium majus petræum*, Ponæ.

XVI. *Campanula Alpina Tragopogi folio.*

*Trachelium montanum*, Colum.

*Trachelium Tragopogi folijs*, Clus. hist.

XVII. *Campanula pratensis flore conglomerato.*

*Uvularia exigua*, Trag.

*Rapi* syl. genus, *Uvularia* in pratis, Gef. hort.

*Trachelium minus*, Dod. gal. Ad. Lob. Clus. hist. Lugd. Ger.

*Cervicaria tertia*, five minor, Dod.

*Cervicaria minor*, Thal. Tab.

Duplex est: alteri flores in summo caule confertim in orbem nascuntur: ijque vel majores, vel minores: alteri singulares per caulem sparguntur. &

Cervi-

Cervicaria sphaerocephalos duplex, Clus. hist.

XVIII. Trachelium Gignanteum &

XIX. Viola Calathiana, apud Gerard. quid?

XX. Cervicaria Valerianoides caerulea.

Trachelium umbelliferum caeruleum, Ponæ Ital.

## R A P I S T R V M.

**R**apistrum, à similitudine cum Rapa folijs dictum videtur: unde quibusdam Rapa syl. altera nominatur: alij Erysimum Theoph. consent: alij ad Sinapi: alij ad Lampsanam referunt, & recte, cujus Dioscorides lib. 2. c. 142. inter olera sine descriptione meminit. Et Plin. l. 20. c. 9. inter syl. Brassica & Lanipsana est, pedalis altitudinis, hirsutis folijs, napi similibus nisi candidior esset flore.

I. Rapistrum flore luteo.

Rapistrum, Brunf. Dod. Gef. hort.

Rapistrum arborum, Ad. Lob. & Thal.

Sinapi agreste quartum, Trag.

Irion, Fuch. Corn. Cord. Tur. sive Erysimum, Dod. gal. Cam. ep. Cast.

Lampfana, Matth. (quibusdam etiam Irion ejusdem) Gef. hort. Ang. Lugd. Lon. Ger.

Lampfana vera, Lugd. flore melino, Tab.

Rapa sylvestris altera, Cæf.

Folij aliquando incisus, vel sinuatis: aliquando minimè: hinc quidam duas species faciunt.

II. Rapistrum flore albo filiquâ articulata.

Sinapi agreste tertium, sive Lampfana veterum, Trag.

Lampfana, Tur. Cæf.

Rapistrum flore albo Erucæ folijs, Lob. ico.

Armoracia, quibusdam Rapistrum album, Tab.

Raphanus sylvestris, Ger. ico.

Rapistrum purpureum, Tab. arborum, Ger.

Flore est albo, subcaeruleo, aliquando purpurascens.

III. Rapistrum flore albo lineis nigris depicto.

Lampfana Apula, Plinij & Dioscoridis, Colum.

IV. Rapistrum floribus Leucoij marini: hoc 1. est in Prod.

V. Rapistrum Italicum filiquis longissimis.

Rapistrum montanum sive sylvestre Irionis folio, Colum.

VI. Rapistrum monospermon.

In Phytopinace & Matthiolo: & in Prodr. pro secundo descripsimus.

## N A P V S.

**B**oniàs Dioscoridi l. 2. cap. 136. significatione à tumente figura deducta, quare Rapis, hoc nomen magis competere, sunt qui velint: γογγύλης species Galeno.

Differentias duas & in Medicina Græcos servare, Plinius l. 20. c. 4. scribit, alterum Bunion, alterum Buniada vocantes: sunt qui Buniaden, Napum sylvestrem esse velint. At l. 19. c. 5. Naporum genera quinq. facit, ubi legendum est Raphanorum, cum ex Theophrasto 7. hist. 4. desumpta sint, ubi τῶν ῥαφανίδων genera quatuor dicit.

I. Napus fativa.

Napus, Brunf. Ang. Matth. Tur. Gef. hort. Dod. Lac. Cord. in Diosc. Cast. Cam. Lon. cui prima.

Rapum fativum alterum & Napus veterum, Trag.

Napus Bunias fativus, Fuch. Lugd.

Bunias sive Napus, Ad. Lob. Ger. def.

Radix colore albo, vel luteo, sive buxæo est; radix nigra.

II. Napus sylvestris.

Rapum sylvestre, Trag.

Napus agrestis, Tur. sylv. Dod. Lugdun. cui & Buniads.

Bunium & Napus sylv. Ad.

Napus Bunias sylvestris, Fuch.

Napus 2. Lon. Bunias sylv. Lob. ico.

an Napum sylv. Cæf.

Nascitur etiam ex non transplantatorum semine.

III. Napus syl. Cretica; in Prod. descripta.

RAPHA.

## RAPHANVS.

**P**ΑΡΑΝΙΣ (quasi radix perspicua) Dioscoridi l.2. c.137. Posterioribus dicitur παρῶν, πῶν, πῶν, παρῶν, quia satum statim oriatur. Theophrastus utrumque, voce usus quidem est, sed quem Raphanum vocamus, ipse παρῶν appellavit: at παρῶν, ipsam Brassicam nominavit: quæ causa erroris fuit Plinio, dum l.19. c.15. scribis, Græcos Raphani genera tria fecisse, foliorum differentia, &c. quæ de Brassica intelligenda, cum ex Theoph. 7. hist. 4. desumpta sint. Latinis radix (ipse Theophr.) quod ceteras amplitudine corporis superet, vel quam paucissimis magnitudine cedat: siquidem in frigidis locis, quibus gaudet, sicuti in Germania, infansium puerorum magnitudinem æquet. l.19. c.5. teste. Sic in regno Congiano, crassitudine humana tibi, gratiæ, saporis sponte provenire, Pigasessus in ejus regni descripsi. l. 6. cap.1. testatur: aliàs copiosissime in India provenire, asserit Linsc. part.4. Ind. Orient. 10. par. 7. cap.19. & part.8.

Genera duo Dioscoridi, sativum & sylvestre: at Theoph. sex, Corinthium, Cleonæum, Lithalassium, Batium, & genus quod solis cruca simili constat: hac Theophrasti, Plin. l.19. c.5. Naporum nomine recenset, posterius genus sylvestre statuens: at ibidem, ex Romanorum sententia, inquit, nostri Raphani alia fecere genera, Algidenſe à loco, longum atq. translucidum: alterum Rapi figura, quod vocant Syriacum, suavissimum ferè ac tenerrimum, &c. etiamnum subjungit, unum sylvestre, Græci agrion vocant, nostri Armoraciam.

Quare observavimus alium præcoccem, serotinum alium: præcox, corpore est oblongo, gracili, semine majore, in quod facile abit. Serotinus albus, qui vel oblongus, vel orbicularis: niger, qui rotundus, rarius oblongus, siliquis quidem majoribus, sed semine minore: ruber, oblongus, cortice rubro, fibris nonnullis rubentibus, per substantiam dispersis. Radice lutea Camerarius notavit: meminit & Byzantini, semine Constantinopoli accepto, qui postea in communem degeneravit, radice penitus languescente.

I. Raphanus major orbicularis, vel rotundus.

Raphanus, Brunf. Trag. Ang. Cord. in Diosc.

Raphanus vulgaris, Gef. hort. primus, Matth.

Raphanus magnus, Ad. & Lob. sive Radicula sativa, Dod.

Raphanus sativus, Fuch. Lac. Cast. Lugd.

Raphanus rotundus, Lon. Tab. & orbiculatus,

Tab. Ger. & pyramidalis.

Radix vulgò, quibus Radicula, Cæf.

Floribus purpureis aut candidis, & radice rotunda, vel orbiculata, variat. In India frequentes sunt: & licet brachij humani crassitudine proveniant, tamen substantiæ teneræ & suavis saporis sunt, quibus pro vulgari cibo utuntur: Joseph. Acosta. l.4. c.18.

II. Raphanus niger.

Raphanus cortice nigricante, Gef. hort.

Raphanus niger, Lobel. icon. radice nigra, Camer.

Raphanus sylvestris, Cast. ico.

Radix & parva & crassa, pro sationis tempore.

III. Raphanus minor oblongus.

Raphanus Cleonæus, Theophrast. Algidenſis, Plinij.

Raphanus longus, Trag. Matth. Lon.

Raphanus prælongus, Gef. hort.

Raphanus secundus, Matth. l.ugd.

Raphanus minor purpureus, Ad. Lobel. Lugd.

Radicula sativa minor, Dod.

Cortice est albo, rubello, præsertim parte quæ extra terram eminet.

IV. Raphanus Creticus: de quo in Prodromo.

V. Raphanus rusticus.

Thlaspi alterum, Diosc. l.2. c.186.

Raphanis sylv. Dioscorid. l.2. c.138. &

Raphanus sylv. seu Armoracia Plinij, quibus Armoracia aut Raphanus major, Brunf.

Rapha-



Raphanus major, Trag. Gef. hort.  
 Raphanus fyl. Fuch. marinus, Tab.  
 Raphanus vulgaris & rusticus, Matth.  
 Amorracia Plinij, Lac.  
 Thlaspi majus, Cord. in Dioscorid. Lon. magnum, Cæs.  
 Raphanis magna, sive Radicula magna, Dod.  
 Raphanus rusticus, Ad. Lobel. Ger. rusticus, Cam. Lugd.  
 VI. Raphanus aquaticus folijs in profundas lacinijs divisis.

an Raphanus ejus folia Eruce familia Theoph. & Napi fyl. genus, Plinij.  
 Radicula sylvestris, Dod.  
 Raphanus fyl. officin. aquaticus, Lob. ico.  
 Raphanus aquaticus, Tab. Ger.  
 Raphanus fyl. & Raphanus palustris, Lugd.  
 an Raphanus fyl. Cord. in Diosc.  
 Sisybrium fyl. Cæs.  
 VII. Raphanus aquaticus Rapiſtri folio.  
 Rapiſtrum aquaticum, Tab. Ger.  
 an Raphanus fyl. Cæs.

## LEPIDIVM.

**Λ**επίδιον Dioscoridi l. 2. c. 205. sic dictum, quod λεπίδες, seu squamas & maculas faciei delet: vel à τῇ λεπίδι, id est, ἐκδιείρι dictum, quod sua acrimonia urenti ulceret, excoriet, eaq. facultate, vel ferro notas fronti servorum inuſſas delet; de quo forſan Columella l. 10. Lepidium Plinio l. 20. c. 17.

I. Lepidium latifolium.  
 Piperitis, Brunf. Lon. Dod. gal.  
 Lepidium ſive Piperitis, Trag. Matth. Cam.  
 Lepidium magnū. Fuch. Tur. majus, Cord. hiſt.  
 Lepidium Dioscorid. Ang.  
 Lepidium Pauli & Plinij, Matth. Lugd. Cæs.  
 Lepidium Æginetæ, Gef. hort. Tab.  
 Lepidium Plinij, Lac. Dod.  
 Raphanus fyl. officin. Ad. Lob. Ger.  
 II. Lepidium glaſtiſolium.  
 Lepidium annuum, Lob. Lugd.  
 III. Lepidium Dentellaria dictum.  
 Dentellaria Monſpel. & Flamula, Gef. hor.

Herba S. Antonij Romæ, Gef. ap. ad. Cord. hiſt. in Chamænerio.  
 Molybdæna Plinij, Ang. Cam. cui & Crepanella Italorum.  
 Sarcophago Cretenſibus: Phrocalida in Lemno: Mauronia Leſbijs, Bellonio.  
 Dentaria, ſive Dentillaria Rondeletij & Natbonenſium, Ad. Lob.  
 Plumbago, Cluſ. hiſp. & hiſt. Caſt. Tab.  
 Dentellaria & Enneaphyllon Plinij, Lugd. & Dentellaria Rondeletij.  
 Glaſtum ſylveſtre, ſive Iſaris fyl. Dioſc. ſecundum ipſius notha, Cæs.

## IBERIS.

**Ι**βερὶς ἢ καρδ ἀμαυλὴν Dioscoridis l. 1. c. 189. Galenus ejus descriptionem ex Damocrate in curatione doloris iſchiadici proponit, ſolia Naſturtij, cum Dioſcoride, tribuens. Plinius Iberida remedia diverſis in locis recenset.

I. Iberis Naſturtij folio.  
 Iberis & Lepidium, Matth. ſig. folio major.  
 Iberis, Caſt. Cæs. ſalp. cui Lepidium fyl. forte Columellæ, ſecunda, Tab.  
 Iberis Cardamantica, Ger.  
 Lepidium campeſtre, Ang.  
 II. Iberis latiore folio.  
 Iberis & Lepidium, Matth. ſig. min.

Iberis, Lugd. Dod. Lac. Gef. hort.  
 Lepidium hortenſe, Ang.  
 Iberis Cardamantica, Ad. Lob. cui & Lepidium Iberias Pauli.  
 III. Iberis naſturtij folio minor.  
 Iberidis puſilla ſeu Naſturtij fyl. nomine ex Thuringia D. Fürerus miſit.

## DRACUNCVLVS ESCVLENTVS.

**T**Aggior Simeonis Serbi lib. de alim. facult. reliquis Græci & Mauritanis inditæ, aliqui ad Drabam, alij ad Chryfocomen Dioscoridis referunt.

## I. Dracunculus hortensis.

Draco, Ruel. Hermol. Scal. Dod. gal. Ad. Eöb.

Dracunculus hortensis, Matth. Cast. Tab. Eyst.

Tarchon Avicen. & Sethi, Gef. hort.

Draco herba acetaria, Cord. ob.

Draco herba, Dod. Ger. hortensis, Gef. hort. seu

acetarius, Lugd. (& Chryfocoma, Diof.) Cam.

Dragone vulgo, Cæf.

Tragum vulgare, Cluf. hist.

## II. Dracunculus pratensis serrato folio.

Pyrethrum, Brunf. ico. Gallorum, Ruell.

Tanacetum album seu acutum, Trag. (& Mil-  
lefolium y.) Tab.

Parmica, Matth. Fuch. Tur. Gef. hor. Lon. Cast.

Lugd. Cam. Ger.

Parmica folio Tarac. vel Sternutator. Ad. Lob.

Parmica vulgaris sive pratensis, Cluf. hist. Lö-  
bel. (& Parmica folio Taraconis, vel Sternu-  
tamentoria) Lugd. Cluf. hist. (& Parmica pra-  
tensis) Cam. Ger.

Pyrethrum syl. Dod. gal. syl. ac parvum, Cord.  
in Diof.

Tarchon syl. vel aquaticum, Gef. hor. & col. &  
Draco aquaticus.

Parmica syl. Germanica, Thal.

Draco syl. sive Parmica, Dod.

Menta Saraçenica Myconi, Lugd.

Parmica vulgaris, Eyst.

## III. Dracunculus pratensis flore pleno.

Parmica vulgaris pleno flore, Cluf. hist.

## IV. Dracunculus alpinus folio Scabiofæ: in

Prod. descriptus.

## ERVCA ET EJVŠ SPECIES.

**E**RUCA, quod vellicando linguam quasi erodat: *Aggior* Dioscoridi l. 2. c. 170. & Theophr. l. hist. 9. ob suavi-  
tatem qua ei in condiciendis obsonijs inest. Plinio l. 20. c. 13.

Genera duo Dioscoridi, sativum & agreste, cuius semina pro Sinapi in Iberia utuntur. Et Plinio l. 20. c. 13.  
*Eruca sylvestris* meminit. At Theophr. 7. hist. 4. *Erucæ* generi differentias omnino desse volum.

## I. Eruca latifolia alba: sativa Dioscoridi.

Eruca, Brunf. Hermol. Ruel. Corn. Matth. Ang.

Cord. in Diof. Gef. hort. Cast.

Erucæ, sive Rucula marin. maj. & Sinapi, 8. Trag.

Eruca sylvestris, Fuch. ico. Lon.

Sinapis alterum genus, Fuch.

Sinapi hortense, Tur. syl. Dod. gal.

Erucula major, Cord. hist. ico.

Eruca sativa, Matth. Lac. Ad. Lob. Dod. Lugd.

Sinapi hortense, Lugd. ico.

Eruca folio latiore, Cæf.

Eruca major, Cam.

Flores pallentes: venas nigras aliquando  
obtrinent; Et hæc est

Eruca, sive Rucula marin. maj. & Sinapi 8. Trag.

Eruca major, Cord.

## II. Eruca latifolia semine nigro.

Eruca gentilis, sive Erysimon Marnardo, Port.

Eruca major sive Hispanica, Ad.

Eruca altera fruticosa, Cæf.

III. Eruca latifolia: pro Eruca i. in Prod. def.  
an Eruca tertia Anglica, Cam.

## IV. Eruca sylvestris, major lutea caule aspero.

Eruca syl. Matth. Ad. Lob. Dod. Lugd. (cujus E-  
rysimum verum etiam videtur.) Cast. Tab. Ger.  
Erucæ genus, sponte nascens, Cæf. qui flores  
albos tribuit.

Flore majore, circa Monspelium in horto  
Dei, crescit.

V. Eruca sylv. minor luteo parvoq; flore.

Sinapi l. genus syl. Fuch. ico.

Eruca sylv. Fuch. Tur. Lugd.

VI. Eruca palustris & Nasturtij folio, si-  
qua oblonga.

Eruca sylv. fortida, Gef. col.

Eruca palustris minor, Tab.

Sinapi palustre, Ger.

VII. Eruca syl. minor lutea burse pastoris  
folio, quæ 2. in Prod.

VIII. Eruca syl. minor incana: quæ 3. in Prod.

IX. Eruca lutea latifolia, sive Barbaræ.

Herba S. Barbaræ (& Sinapi agreste y.) Trag.  
Lon. Cast.

Scopa regia (sive Sideritis latissima) Fuch.  
ico. Ang.

S. Barbaræ herba, Fuch. Gef. hort.

Pseudobunias, Dod. gal. Ad.  
Carpentorum herba, Ruel.  
Nasturtium palustre, Gef. hor. hybernium, Thal.  
Barbarea, Dod. Lob. Tab.  
Eruca palustris, Lugd.  
Bunium adulterinum, Cam.

Variat foliorum magnitudine, nam in hortis ad acetaria culta, acutiora habet, quæ femina dicitur, Tabernæmontano: nonnunquam rubent & nigrescunt.

XI. Eruca lutea five Barbarea pleno flore: quæ Eruca 4. in Prod.

XI. Eruca cærulea in arenosis crescens.

Hæc est Eruca palustris cærulea, in Phytopinacæ, & Matthiolo (& in Prod. pro 5.) descripta pictaque: magnitudine & parvitate variat.

XII. Eruca maritima Italica siliquâ hastæ cuspidi simili.

Cakile Serapionis, Anguil. Ad. Lobel. Lugd. Camer.

Eruca maritima, Lugd.

Nasturtium maritimum, Eid.

Erucae genus in maritimis, Cæs.

Eruca Kackile dicta, Colum.

Habetur latifolia & angustifolia: hæc si in hortis seratur, oblongo angustoque folio excrescit.

XIII. Eruca maritima Cretica, siliquâ articulata: quæ 6. in Prod.

XIV. Eruca Monspeliciaca siliquâ quadrangulâ echinata: quæ 7. in Prod.  
Sinapi echinatum, Lugd.

XV. Eruca angustifolia Austriaca.

Eruca syl. angustifolia, Lob. Lugd.

XVI. Eruca folia napi radice.

Pycnocomon Ang. quid?

## SINAPI ET EIVS SPECIES.

*Sinapi*, ὄνιον Dioscoridi l. 2. c. 184. & Theoph. 7. hist. 3. & 6. κατὰ τὸ σινεῖον ὄνιον, oculos Senim ledit: dicitur etiam Theoph. vām, quasi immise, ob vehementem ejus acrimoniam & Athenienses Napy appellasse, Plin. l. 19. c. 3. author est, Sinapi nominans.

Unius Dioscorides & Theoph. meminere: at Plinius, generatim facit: unum gracile, alterum simile napi folijs, tertium Eruca.

I. Sinapi rapi folio.

Sinapi Diosc. & Theoph. Sinapi alterum Plinij.

Sinapi, Ang. Gef. hort. Cast. primum, Matth.

Lac. Cæs. Port.

Sinapi hort. Cord. in Diosc. Lon. Lugd. desc.

Sinapi sativum prius, Dod.

Sinapi sativum Erucae aut Rapi folio, Ad. Lob.

II. Sinapi hortenfe semine albo.

Sinapi sativum album, Trag.

Sinapi alterum sativum, Ad. & Lob.

Sinapi album, Cam. & Eysl.

III. Sinapi apij folio.

Sinapi gracile, Plinio.

Sinapi, Brunf. luteum sativum, Trag.

Sinapi primum, Fuch. Tur. Cast.

Sinapi alterum, Matth. Lac. Cæs.

Sinapi hortenfe, Fuch. ico. Dod. gal.

Sinapi sativum, Lugd. sativum alt. Dod. Ger.

Sinapi agr. apij aut potius laveris fol. Ad. Lob.

Sinapi syl. luteum, Lon.

Eruca palustris major, Tab.

IV. Sinapi Erucae folio.

Eruca five Rucula mar. min. & Sinapi 9. Trag.

Eruca, Dod. gal. sativa, Fuch. hortensis, Tur.

Eruca sylvestris, Gef. hor.

Sinapi tertium, Matth. Cast. Cæs.

Sinapi sylvestre, Dod. Lugd.

Sinapi (syl. minus irionis veri folio, aut bursæ pastoris, Ad. Lob.

V. Sinapi parvum siliquâ asperâ.

In Phytopinacæ & Prod. descriptum est.

VI. Sinapi umbellâ purpureâ.

Sinapi alterum agreste nostras, Colum.

VII. Sinapi Indicum.

Safeni, semen est Sinapis, magna copia in Sundan: par. 4. Ind. orient. 2.

VIII. Sinapi simile Indicum semen.

Nachani semen nigrum minutum sapore Secales, ex cujus farina panes conficiuntur, Garz.

Semen sinapi simile sed nigrius, cujus farinâ in panes orbiculares subactâ vescuntur tota Æthiopia ora maritima, Clus. in notis.

## R E S E D A.

*Reseda* a doloribus sedandis dicta, cum collectiones & inflammationes omnes discutere, Plin. l. 28. c. 12. scribat: propter saporem Erucae, & quod aliqui ex Erucarum syl. genere esse censent, bucculata est.

I. *Refeda maxima.*

*Refeda*, quæ *Sesamoides* majus *Ghino*, *Gef. hort.*

*Sesamoides* magnum, *Lac. at alterum, Cæs.*

*Refeda maxima*, *Lob. Ger.*

*Refeda tenuifolia*, *Tab.*

*Refeda* *Plinij, Eyll.*

*Refeda lutea*, *Lugd. recta, Cam.*

*Erucago vulgaris*, *Col.*

II. *Refeda vulgaris.*

*Rheseda* *Plinij Neoteritorum. Eruca peregrina Italica*, vel *Cantabrica, Ad. Lob. Rheseda Plinij, Ger.*

*Refeda latifolia*, *Tab. at supina, Cam.*

*Refeda major*, *Thal.*

*Refeda lutea*, *Lugd.*

*Sesamoides primum, Cæs.*

*Ludit folijs simplicioribus, & in unoquoque pediculo plurimis: major & minor est.*

III. *Refeda linearæ folijs in prodromo descripta.*

IV. *Refeda alba minor.*

*Sesamoides parvum Salmanticum, Clus. hisp. & hist. (quam duplicem facit) Lob. Tab. Ger.*

V. *Refeda lapidea.*

*Planta marina Refedæ facie, Clus. exor.*

VI. *Refedæ affinis Phyteuma.*

*Phyteuma Monspelienium, Gesner. Ad. Lob. Narbonensium, Lugd.*

*Sesamoides parvum, Lac. tertium, Cæs.*

*Erucago Apula, Colum.*

Variat folijs nunc oblongis, nunc in aliquot lacinias, & quidem frequentius quatuor, modò quinque divisis.

## LUTEOLA.

**C**um *Luteolam* aliqui *Refedam* *Plinij* faciant, & in multis cum *Refeda* convenias, de ea nunc; quæ sic dicta, quòd eà panni lanei & tela lineæ, candida quidem, colore luteo, virente verò, qui antè caruleo tincti, inficiantur. Quare *Plinius*, lib. 33. cap. 5. *Luteam. Virivius* 7. *Architell.* 14. *Luteum, & Virgil. Ecolg.* 4. *Lutum* nominat. At *Casalpinus*, lib. 9. cap. 35. *Myagron seu Melampyron Dioscoridis* statuit.

I. *Luteola herba falicis folio.*

*Antirrhinon*, *Trag. Lugd. Thal.*

*Pseudostruthium*, *Matth. Cast. Lugd. Eyll.*

*Struthium*, *Lac. Gef. hor.*

*Lutea vel Luteum Vitruvij, Gef. hor. Cam.*

*Herba lutea*, *Dod. gal. Lugd.*

*Lutum herba*, *Dod.*

*Luteola*, *Ad. Lob. Ger.*

*Giadrella vulgo, Cæs.*

*Catanance*, *Lon. Tab.*

II. *Luteola Cretica.*

*Struthium legitimum Dioscoridis* quæ *χρυσό* in tota Græcia appellatur, quâ fullones in tingendo serico luteo utuntur, *Hon. Belli ep.* 2. ad. *Clus.*

II. *Luteola herba folio cannabinæ.*

*Lutea maxima Cretica Belli, Ponæ in Bal.*

*Lutea major frutescens Cretica, Ponæ ed. Ital.*

IV. *Luteola herba sterilis.*

*Lutea major sterilis Cretica, Ponæ ed. Ital.*

## ERYSIMUM.

**E**ρύσιμον *Dioscoridi*, lib. 2. cap. 188. alijs àντὶ τοῦ ἰσχυροῦ, foliorum multiplici sectione: alijs quasi ἰσχυροῦ. quod est pretiosum: alijs àντὶ τοῦ ἰσχυροῦ, quod ob suam caliditatem trahendi facultate pradisum sit, dictum: nam *Sinapis* sapore est, & multæ *Sinapis* syl. species est. *Plin.* lib. 22. cap. 25. *Iris*, *Erysimum* *Gracis*: ubi *Erysimum* *Dioscoridi*, cum *Erysmo* fruge *Theophrasti* 8. *hist.* 1. & 4. *caus.* 16. (*Gaza Trionum vertis*) confundit.

I. *Erysimum vulgare.*

*Hierobotane foemina*, *Brunf.* 4.

*Verbena foemina & Sinapi* 7. *Trag.*

*Sinapi alterum genus syl. Fuch. ico.*

*Verbena*, *Tur. recta five mas, Fuch. Lugd.*

*Erysimum, Synapi* syl. species, *Gef. hort.*

*Erysi-*

Erysimum Dioscoridis, Dod. gal. Ger.  
Irio, Matth. Cord. in Diosc. Lac. Lugd. Lon.  
Cæsalp.

Irio sive Erysimum, Ad. Lob. Dod. Cast.  
Cleome Octavij, Ang.

Erysimum nostrate, Thal. primum, Tab.

II. Erysimum alterum siliquis Erucæ.

Erysimum 2. Tab. sub Eruca sativa, Ger. ico.

Majus est & minus.

III. Erysimum polyceration, vel corniculatum.

Irio alter, Matth. Lugd. Gam.

Erysimum verum, Ang.

Dentilaria alia, Irio aliquibus, Ges. hor.

Erysimum alterum Italicum, Ad. Lob.

Iris tertius species, Cæf.

Saxifraga Romanorum, Lugd. desc. figura sub  
Saxifraga aurea.

IV. Erysimum latifolium majus glabrum.

Irio Apulus alter lævi folio Erucæ, Colum.

an Irio altera, Cæf.

Ex semine Iriionis nomine, à D. Imperato  
misso, & nomine Rapiſtri Hispanici non scri-  
pti, à D. Gillenio, in horto meo crevit.

V. Erysimum angustifolium majus.

Rapistrum sylvestre Iriionis folio, Colum.

VI. Erysimum similis lævis laciniata fl. luteis.

Herba S. Alberti, Cæf.

an Barbarea minor, Lob. ob.

VII. Erysimum similis hirsuta non laciniata  
alba.

Variat folijs latioribus, angustioribus: ma-  
gis minusve crenatis & hirsutis: icon & de-  
script. in Matth. & Prodromo habetur.

Barbarea muralis, Joh. Bauhino, lib. de Plan-  
tis à Sanct.

## HYDROPIPER SEV PERSICARIA.

**Υδροπiper**, Dioscoridis lib. 2. cap. 191. id est, *Aquaticum piper*, à loco & sapore nomen  
habet; *Latinis Persicaria*, à foliorum forma: hac vel mitis acidulæ sapore, vel acris  
est: illa folijs maculosis, vel ijs carentibus.

I. Persicaria mitis maculosa & non ma-  
culosa.

Pulicaria fœmina, Brunf. Persicaria fœmina,  
Eid. Ruel. Lon.

Persicaria, Fuch. Dod. Ang. Cast. Lugdun. cui  
& Plumbago Plinij quibusdam.

Persicaria altera, Trag. Matth. Tab.

Persicaria maculata, Ericio Cord. Ger.

Persicaria maculis nigris, Ges. hor.

Persicaria mitis, Ad. Lob. ico. maculosa, Lob.

Persicaria prima, Britannica Plinij, Cæf.

Cratægonum, Lac.

Plumbago Plinij, l. 25. c. 13. quibusdam: alijs  
Britannica ejusdem, l. 25. c. 3. alijs Lapathum  
quoddam videtur.

Floribus est communiter purpurascens, ali-  
quando candidis: folijs aliquando macu-  
lam nigram in medio habentibus, aliquando  
ea carentibus.

II. Persicaria urens seu Hydropiper.

Persicaria mascula, Brunf. Ruel. cui & major,  
mas, Lon.

Persicariæ primum genus, Trag. Tab.

Hydropiper, Fuch. Ang. Dod. Matth. Cord. in  
Diosc. Lac. Cast. Cæf. Lugd. Ger.

Cratægonon, Ang.

Persicaria hydropiper, sive aquaticum piper  
urens, Ad.

Persicaria urens, Lob. mordax, Thal.

Flore est ex roseo rubicundo: colore Bersi-  
lico: candido: aliquando folijs macula rubra  
aspera est.

III. Persicaria angustifolia: in Prod. desc.

Persicaria major, Lob. ob. Thal.

IV. Persicaria minor.

Pulicaria pusilla repens, Lob. Lugd.

Persicaria pumila, Tab.

Floribus est albis, aut purpureis.

## CAPSICVM SEV PIPER INDICVM.

**Κάψαρον** Actuarius, à καίω mordeo, quod semen comestum mordeat, imò adurat. Plin.  
lib. 19. cap. 12. Siliquastrum, quod ob piperis saporem Piperitidis nomine sit acceptum:  
Axi, Indis. Piper: Piper Brassilianum: piper Indicum in Guiana: piper Indicum cornutum,  
à quibusdam Siliquastrum: Auctoribus bifloriat. Indicarum.

*Differentia in foliorum latitudine, vel angustia; in fructus colore & forma: colore, qui in initio alijs viridis, alijs niger; in maturitate, aut ruber, aut croceus, flavusve; rarius albus. Figura alijs longa, eaq; vel crassa, vel gracili, vel incurvata: alijs brevis eaq; lata, cordata, vel rotunda cerasi forma, vel angulosa: & vel erecta, vel dependens: denig; & caule piloso.*

*Axi aroma in Ind. Occid. quod in Cusco, Veho: in Mexico, Chili: in Castilia, piper Indicum appellatur. Est viride, & rubrum, & croceum. Aliud vehementius mordicat, quale Caribbe vocatum: aliud lenius, & moderatius: est & genus quoddam dulcissimum, quod e manibus vellunt, & edunt: & quoddam aliud exilius, quod moschum fragrat, & gustu admodum sapidum. Joseph. Acosta lib. 4. c. 20. vel pars. 8. Ind. Occid.*

### I. Piper Indicum vulgatissimum.

Siliquastrum, Trag. (una figura tres species proponit) Lac. Tab.

Capficum rubrum & nigrum, Fuch. ico.

Siliquastrum majus & minus, Fuch.

Piper Indicum, Matth. Gesn. hort. (cui & Calcuticum) Cæs. (cui Circa Diofcorid. forte)

Cast. Cam.

Cardamomum Arabicum, Gesn. hort.

Piperitis seu Siliquastrum Peruvian. Cord. hist.

Piper Indic. 3. rubrum & nigrum, Gesn. hort.

Capficum, Clus. in Mon.

Capficum vel Piper Indicum longioribus filiquis, Lob. Capficum Actuarii, Eid. ico. & Ad.

Capficum sive Piper majus & minus, Lugd.

Piper Americanum vulgarij, Clus. cur. post.

Piper Indicum medium, Eyst.

Piper Indicum Occid. quod Axi vocant, Frag.

II. Piper Indicum propendentibus filiquis

oblongis recurvis.

Capficum oblongius, Fuch. ico. Dod. gal. Lugd.

Capficum longioribus filiquis, Ger.

Siliquastrum tortum, Fuch.

Capficum oblongiorib. & recurvis filiquis, Dod.

Piper oblongum recurvis filiquis, vel 9. Regio. in Clus. cur. post.

Hujus differentia tres sunt.

1. Siliquis longissimis, deorsum spectantibus in mucronem recurvum abeuntibus, quod

Piper Indicum maximum longum, Eyst.

2. A priori sola magnitudine differt, quod Piper Indicum minus, recurvis filiquis, Eyst.

Piper decimum, Regio.

3. Siliqua flava, vel aurea, eaque oblonga vel lata, vel ovali figura, quod

Piper duodecimum, Regio.

Piper Indicum filiquis flavis, &

Piper Indicum aureum latum, Eyst.

### III. Piper Ind. propendentib. filiquis rotund.

Siliquastrum latis filiquis, Trag.

Capficum latum, Fuch. ico. Dod. gal. Lugd.

Siliquastrum quartum, Fuch.

Piper Indicum rotundum, Gesn. hor.

Capficum cordatum, Cam.

Siliquastrum fructu propendente rotundo, Regio, in Clus. cur. post.

Et hujus differentia quatuor sunt.

1. Siliqua lata, rugosa, quod

Piper octavum, Regio.

2. Cordata, eaq; oblonga vel rotunda, quod

Piper Indicum cordatum oblongum, &

Piper Indicum cordatum, Eyst.

Piper sextum, Regio.

3. Siliqua olivari.

4. Siliqua rotunda Cerasorum modo, eaque majore vel minore, rubri vel nigri coloris, quod

Piper minimum filiquis rotundis, Eyst.

Piper septimum, Regio.

IV. Piper Indicum fructu dependente pomi amoris forma.

Piper Indicum rotundum maximum, Eyst.

an Piper ex Ind. Melopeponis forma Monardi.

Folia sunt Solani vulgaris, fructus rotundi, sulcis aliquot distincti pendunt, rubore coralli.

V. Piper Indicum fructu aculeato.

Majus est & minus: illud rotundum, hoc orbiculatum, utrumq; rubet: & innoxium quasi in aculeum abit, quod

Piper Indicum rotundum aculeatum, &

Piper Indicum orbiculatum medium, Eyst.

VI. Piper Indicum filiquis surrectis & oblongis.

Piper oblongum erectum majus pyramidale. vel secundum, Reg. in Clus. cur. post.

Hujus differentia quatuor.

1. Pyramidale majus.

2. Pyramidale minus: quod

Piper erectum minus pyramidale vel 3. Regio.

Piper



Piper Indicum medium longum erectum, Eyst.  
3. Oblongum surrectum majus & min. quod  
Piper oblongum exiguum erectum pyramida-  
le, vel quartum, Regio.

Piper Indicum minimum erectum, Eyst.

4. Siliqua bifurcata, quod

Piper undecimum, Regio.

Piper Indicum bifurcata siliqua, Eyst.

VII. Piper Indic. siliquis surrectis rotundis.

Piper rotundum majus surrectum, Reg. in Cluf.  
cur. post.

Hujus quoque differentiae quatuor:

1. Rotundum maximum obrutum, quod

Piper majus surrectum vel primum, Regio.

Piper Indicum maxim. rotund. erectum, Eyst.

2. Rotundum minus parum acuminatum:

3. Cordatum majus:

4. Cordatum minus angulosum.

Verum Piperis Indici differentias novende-  
cim, du By in suo Florilegio proposuit: at scul-  
ptor linguae Latinae ignarus, omnes siliquas  
propendentes sculpsit, licet recte depictas & no-

minibus notatas ad ipsum transmisissimus.

VII. Piper Ind. siliquis surrectis cerasi forma.

Capficum brevioribus siliquis, Lob.

Capficum Brasilianum, Clusio Monard. Lugd.

Capficum minimis siliquis, Dod. Ger.

Siliquastrum rotundum, Cam. ep. Matth.

Piper Indicum surrectis corniculis, Cam.

Siliquastrum rotundum angustifolium, Tab.

Huc referendum

Piper oblongum erectum minimum, Regio.

Piper Indic. surrectis corniculis parvulis, Cam.

IX. Piper Indic. caule piloso flore majore.

Piper Indic. caule pilis albis praedito, Cam.

X. Piper Indicum radice eduli.

Piperis tertium genus minoribus granulis,  
cui sunt radices letiki dictae, facis boni saporis,  
quas in minima frusta conscindunt & plantant,  
& sarmenta in modum Lupuli, supra terrae su-  
perficiem spargunt: Stad. par. 3. Americae.

XI. Tomates, grana sunt recentia & viridia  
quae cruda esitare solent. Et ex ijs plerumque con-  
dimenta parantur: par. 8. Ind. Occid. l. 4. c. 20.

\*\*\*\*\*

## SECTIO SECUNDA.

NASTURTIIUM: THLASPI: BURSA  
PASTORIS: MYAGRVM: DRABA: AL-  
LIARIA: COCHLEARIA.

### NASTURTIIUM EJVSQVE SPECIES.

**N**asturtium Καρδ. αμω. Dioscoridi lib. 2. c. 185. Theoph. 7. hist. 1. quasi Καρδ. αμω, quod ca-  
pus calore suo & acrimonia sentes: vel ἀντὶ τῆς Καρδίας, quod cordatos faciat; vel  
quod in Syncope Cardiaca dicta, plurimum valeat. Latinus Nasturtium, à naribus torquendis;  
quod odore & seminis acrimonia sternutamenta provocet: hinc Plinio l. 19. c. 8. (& Varro)  
à narium tormento velus torporem excitans.

Genera, Theoph. 4. hist. 7. plura esse dicit. Dioscorides tantum Nasturtium Babylonium  
optimum esse scribit. Plinio l. 20. c. 13. est hortenfe sive sativum, latioribus folijs, est & sylve-  
stre: illud album, hoc nigrum, ubi de semine eum loqui censemus. Dividimus in hortenfe,  
pratense, aquaticum, montanum.

#### NASTURTIIUM HORTENSE.

I. Nasturtium hortenfe latifolium.

Nasturtium Hispanicum, Gef. hort. Tab. Ger.

Nasturtio, tale folium Cam. ep. Matth. adpin-  
git: descripto & figura Matthiolo addita.

II. Nasturtium hortenfe vulgatum.

Nasturtium album, Plinio,

Nasturtium, Brunf. Ang. Matth. Cæsalp. Cast.  
Tabern.

Nasturtium hortenfe, Trag. Fuch. Tur. Lac. Ad.  
Lob. Dod. Lugd. Ger. Csm.

Aliud est folijs simplicibus, quod læve & al-  
bium, vel subhirsutum minusque album; aliud fo-  
lijs valde divisis, & vel majus, vel minus.

III. Na-

III. Nasturtium hortenſe criſpum. Hujus ſemen etiam nuper Naſturtij Mauritij nomine Lugduno Batavorum accepimus.

Eſt latifolium & anguſtifolium, utrumq; in Matth. deſcriptum & depiſtum, ſicut & in Prod.

*Nasturtium pratense.*

Nasturtium pratense magno flore.

Flos cuculi, Brunf. Dod.

Nasturtium pratense (vel 3.) Trag. Gefn. Tur. Hiberis, Fuch. ico.

Nasturtium agreste, Fuch. sylvestre, Lon.

Lepidium minus, Cord. in Dioſc.

Sisymbrium Cardamine, Dod. gal. Lac. tertium, Dod. Lugd.

Sisymbrium aquaticum, alter. quoad folia, Matth. Tab. & Lugd.

Cardamine altera, Lob. Lugd. Ger.

Cardamine 1. & Sisymbrium alt. Dioſc. Tab.

Cardamine altera simpliciter flore, Cluſ. hiſt.

Cardamine latifolia, Ger. quoad folia.

Sisymbrium aquaticum non abſimilis, Cæſ.

Iberis ſive Cardamantica naſturtij folio 1. Thal.

Naſturt. aquat. ſimpliciter flore, Eyt.

Flos communiter ex candido, leviter purpurascit, aliquando prorsus albus eſt.

II. Nasturtium pratense flore pleno.

Cardamine altera pleno flore, Cluſ. hiſt.

Naſturt. aquaticum flore pleno, Eyt.

III. Naſturt. prat. parvo flore: quod 2. in Prod. Sisymbrij aquat. alterius nomine, Matth. Lugd.

& Tab. Si flores ſpectes exprimere videntur.

Naſturtij ſiliquoſi ſylvatici, ſeu montani majoris Thalij nomine, D. Futerus.

Naſturtij pratenſis congereris, D. Jungermanus Lipſian miſit.

IV. Naſturt. prat. folio rotundiore, ſi. majore.

Cardamine ſive Sisymb. alterum Dioſc. Ad. Lob.

Cardamine, Ger. ſecunda, Tab.

Et hæc floris colore variat, hinc

Cardamine 2. ſpecies altera florib. lacteis, Tab.

Cardamine lactea, Ger.

V. Naſturt. praten. rotundifol. minuto flore.

Sisymb. alter. ſeu Naſturt. aquat. 3. ſpecies, Thal.

VI. Naſturtium pratenſe odoratum radice granulis tuberoſa.

Cardamine quinta, Dalech. Lugd.

VII. Naſturt. ſylv. minus: quod 3. in Prodr.

*Nasturtium aquaticum.*

I. Naſturtium aquaticum ſupinum.

Sisymbrium alterum vel Cardamine, Dioſc.

Naſturtium aquat. (& 2.) Trag. Lon. Dod.

Vella Galeni, Ang.

Sium & Laver, Dod. gal.

Cardaminum Sion, Ruel.

Creſſo, Laver odoratum, Eri. Cordo.

Sisymbrium Cardamine, Fuch. Lugd.

Sisymbrium aquaticum, Matth. Cæſ. Caſt. primum, Tab. & Portæ.

Sisymb. alterum, Cord. in Dioſc. Gef. hor. Thal.

Sisymbrium tertium, Lac.

Sion Cratevæ, Sisymb. 2. Dioſc. & Senecio Serapionis, Ang.

Sion Cratevæ Erucæſolium, Ad. Lob.

Sium majus, Ger.

an Naſturtio ſimilis herba Scorbutum curans;

par. 9. Ind. occid. additam.

II. Naſturt. aquatic. majus & amarum.

Sisymbrij alterius ſpecies ſecunda, Thal.

III. Naſturt. aquat. erectum folio longiore.

Sium, Lac. Caſt. vulgare, Matth. Lugd.

Sion Matthioli & Itolorum, Lob.

Hoc licet glabrum ſit, tamen caule & foliorum cauliculis villoſis habemus.

IV. Nasturtium aquaticum minus.

Sisymbrium aquaticum alterum vel minus,

Cam. ep. Matth.

Cardamine quarta Dalech. Lugd.

Variat magnitudine & parvitate, forte ratione loci: nam in aquaticis major eſt: in vineris verò Wilenſibus riguis, uti & Patavij minorem multò obſervavimus: ſic caule erecto, & penè aphyllò, in arenoliſ prope Wiſam fluvium, reperitur.

*Nasturtium Montanum.*

I. Nasturtium montanum luteum.

Sium alterum aquaticum luteum, vel Cardamine tenuifolium montanum, Colum.

II. Naſturt. montanum luteum folijs ſativi.

Naſturtium montanum minus, Thal. quid?

III. Naſturtium alpinum trifolium.

Cardamine trifolia, Lob. Lugd. Tab. Ger.

Cardamine alpina 1. trifolia, Cluſ. pan. & hiſt.

IV Naſturtium alpinum minus reſedeſ folijs.

Hoc in Phytopinace, ſub Naſturtio 8 in Prod.

ſub 4. deſcripiſimus, quod aliquando altius, aliquando ad tres tantùm uncias exurgit.

V. Naſturt. alpin. minus fol. in orbem ſparſis.

Cardamine alpina media, Cluſ. pan. & hiſt.

VI. Naſturt. petreum folijs burſæ paſtoris.

Naſturt.

Nasturtium petræum, Tab. Ger.

VII. Nasturtium alpinum infidum,  
Cardamine alpina infida, Colum.

VIII. Nasturtium alpinum tenuissimè divi-  
sum.

Nasturtium, Ges. in epist.

Cardamine alpina 3. minima, Clus. pan. & hist.

Cardamine alpina, Tab. Ger.

Thlaspi montanum minimum, Lugd.

Cardamine pusilla saxatilis montana *Austriacis*,  
Colum.

IX. Nasturtium pumilum vernal, quo no-  
mine Monspelio accepimus.

Hoc rariùs palmare, frequenter unciam so-  
lum altum reperitur.

X. Nasturtium alpinum capsulâ Nasturtij  
hortensis. Hoc Cardamidij montani verni no-  
mine D. Furerus misit.

In Phytopinace sub Nasturtio 9. in Prod. sub 5  
descripsimus.

XI. Nasturtium alpinum bellidis folio ma-  
jus 6. in Prod.

XII. Nasturtium alpin. bellidis folio min.  
Plantula Cardamines æmula, &  
Sinapi pumilum alpinum, Clus. pan. & hist.

Folijs est modò longioribus, modò rotun-  
dioribus.

XIII. Nasturtium Barbareæ folijs: quod 7.  
in Prodr.

*Nasturtium sylvestre.*

I. Nasturtium sylv. O. y. idistolio.

Bursa pastoris minor, Brunf.

Thlaspidij genus & Nasturt. 5. Trag.

Bursa pastoris 2. & 4. Eidem.

Thlaspi angustifol. Fuch. Lug. minus, Dod. Ger.

Thlaspi minus hortense vulgare Lob. ico.

Thlaspi minus tenuifolium, Lon.

Iberis, Tur.

Nasturtium sylvestre, Thal.

Thlaspi minus Germanicum, Tab.

Luteum est & album, & quia acerrimum ad  
Nasturtium referimus.

II. Nasturtium sylv. tenuissimè divinum.

Seriphium Germanicum, Trag.

Nasturtium sylv. Fuch. ico. Ges. hort.

Seriphium abtythium, Fuch. Lon.

Thaliolum, Dod. gal. Lugd.

Thaliolum, Thal. (cui Nasturt. *εργασιουλον*)  
Tab.

Sophia Chirurgorum, Ad. Lob. Dod. Ger.

Accipitrina Cæf.

Folio est latiore, angustiorève, hinc

Thaliolum latifolium & angustifolium, Tab.

Sophia duplex, Gerardo.

Accipitrina duplex, Cæf. alpino.

III. Nasturtium sylvestre Erucæ affine.

Nasturtium sylv. Clus. hisp. & hist. Lugd.

Eruca Nasturtio cognata tenuifolia, Lob.

## THLASPI ET EJVS SPECIES.

**N**asturtio Dioscorides lib. 2. c. 186. *Ἐλάσπι* subjungit, quod à fructus forma, qua veluti  
infundulus & confusus, à *Ἐλάσπι* infringo, nomen accepit: ἡ *Ἐλασπίδιον*, quasi fructum  
chelyeatum ἢ σινητι ἀρχιον.

Genera duo Dioscoridi & Plinio lib. 28. c. 13. alterum angustis, alterum latis folijs, quod  
Persicum Sinapi Crateve dicitur: forisè Raphanus rusticanus.

*Thlaspi arvense.*

I. Thlaspi arvense filiquis latis.

Thlaspi & Thlaspidium vulgare, &

Bursa pastoris prima, Trag.

Thlaspi, quod vulgo Nasturt. rectorum, Ruel.

Thlaspi latifolium, Fuch.

Thlaspi cardamoides, sive Nasturtiarium,  
Cord.

Thlaspi minus latifolium, Lon.

Thlaspi Dioscoridis (& Scorodathlaspi) Dod.  
gal. 1. tab. Ger.

Thlaspi 2. Matth. Lugd. majus, Tab.

Thlaspi 1. Diosc. Creticum Galeni, Ang.

Thlaspi drabæ folio, Ad. Lob.

Thlaspi Dioscor. Drabæ & Chamelinae filio,  
Eidem ico.

Thlaspi latius Dod. platycarpon, Cam.

Thlaspi, & Thlaspi nigrum Galeni, Cæf.

Varietas in filiquis: aliud majoribus, aliud  
exilioribus reperitur.

II. Thlaspi arvense Acetosæ folio.

Thlaspi majus, Tab. Ger.

III. Thlaspi Vaccaræ folio burse pastoris  
filiquis: primum in Prod.

O

IV. Thla-

IV. *Thlaspi arvense* Vaccariæ incano folio majus.

*Thlaspi primum*, Matth. Lac. Cast. Lugd.

*Thlaspi alterum*, Dod. Lugd. 3. sive *Cratervæ*, Ang.

*Thlaspi minus*, Cord. in Diof.

*Thlaspi vulgatissimum* Vaccariæ folio, Ad. & Lobel.

*Thlaspi vulgatiss.* Ger.

*Thlaspi verum* cujus semine in Theriaca utimur, Camer.

*Thlaspi officinarum*, Colum.

Folij est aliquando leviter crenatis, aliquando ijs caret: hinc diversa authorum figura: quare apud Matthiolum posuimus *Thlaspi* 1. & *Thlaspi serrato* folio.

V. *Thlaspi Vaccariæ* incano folio minus: quod 2. in Prodr.

VI. *Thlaspi villosum* capsulis hirsutis.

In *Phytopinace*. & pro 3. in Prodr. descriptum, & in Matthiolo nostro sub *Thlaspi villosi* figura habetur.

VII. *Thlaspi arvense* perfoliatum majus.

*Thlaspi oleraceum*, Tab. sub *Thlaspi incano*, Ger. ico.

*Thlaspi primum* Dalech. Lugd.

*Thlaspi alterum* miris rotundifolium bursa pastoris fructu, Colum.

In *Phytopinace* sub 5. descriptum.

VIII. *Thlaspi perfoliatum* minus.

*Thlaspi pumilum*, vel *Thlaspi montanum* minus, Clus. pan. & hist.

*Thlaspi minimum*, Tab. minus, Ger.

### *Thlaspi umbellatum.*

I. *Thlaspi umbellat. arvense* Iberidis folio.

*Thlaspi* aliud minus, vel 3. Tiag.

*Thlaspi amarum*, Tab. Ger.

*Thlaspi* Alobrogicum Cretico, par. Clus. hist.

Flores æcerulo alboq; communiter mixti, rarius penitus albi, vel flavescentes. in *Phytopinace* sub 14. descriptum.

II. *Thlaspi umbellatum* Creticum Iberidis folio.

*Draba* sive *Arabis*, aut *Thlaspi Candix*, Dod. Ges. hort. Lugd.

*Thlaspi* 4. Matth. Lugd. cui & *Thlaspi* 4. Donzel.

*Thlaspi* Cappadocicum, Ang. flore incarnato vel late albo, Eysl.

*Thlaspi Creticum*, Ges. hort. Cusalp. Tabes. Camer.

*Thlaspi Candix umbellatum* Iberidis folio, Ad. & Lob.

*Thlaspi Candix*, Ger.

Flore est purpureo, aliquando albo, luteo haberi ajunt & communiter in umbella, rariis in oblonga spica.

III. *Thlaspi Cretic.* flore albo majus. sive 4. in Prodr.

IV. *Thlaspi umbell.* Cretic. flore albo minus.

*Thlaspi* quartum parvum odorato flore, Clus. hist.

*Thlaspi Cappadocici* minoris annui nominis D. Doldius nescit.

V. *Thlaspi umbell.* nasturij folio Martius, hancum.

*Thlaspi* alterum minus umbellatum Nasturij hortensis folio Narbonense. A. L. Lobel. con.

*Thlaspi* aliud umbellatum Penæ, Lugd. & Nasturium sylv. Daleham. Lobel.

*Thlaspi Narbonense* folio Nasturij, Tabes. Camer.

### *Thlaspi montanum.*

I. *Thlaspi montanum* sub *Eximium* majus.

*Thlaspi* primum vel *montanum* petatum, Clus. pan. & hist.

*Thlaspi parvifolium*, Lobel. icon. Camera. Tab. Gerard.

II. *Thlaspi montanum* gl. st. folio minus.

III. *Thlaspi alpinum* belidis, & 1. uleæ folio.

*Thlaspi* secundum & Barense, Clus. pan.

*Thlaspi montanum* 2. Cl. hist.

*Thlaspi album* supinum. Lob. ico. Tab. Ger.

*Thlaspi montanum* burse pastoris fructu, Colum.

Siquis non nihil variat, hinc apud Tab. & Ger. figure duæ ad Clus. & Lobel. imitantem: sic & flores aliquando in umbella, uti & Columna pinxit: communiter in modica spica dispositi.

IV. *Thlaspi montanum* semper virens.

*Thlaspi montanum* can. Clus. Lugd.

V. *Thlaspi* saxatile rotundifolium, quod 5. in Prodr.

VI. *Thlaspi* montanum minus.

*Thlaspi* tertium, Matth. Lugd. Tab. Lobel. non diversum deditur.

He Matthiolas praeigit ex Italia habemus, verum et in nostris alpidibus provenit, ab illo plane diversum, in nostro Matthiolo & Prodromo figura exhibetur.

VII. Thlaspi alpinum minus capitulo rotundo.

Thlaspi tertium saxatile, Cam. epit. Matth. & hort.

Thlaspi petrarum myagroides, Ponæ.

Thlaspi saxatile minore folio, in nostro Matth. ubi figura & descriptio, ut & sub 6. in Prodr.

VIII. Thlaspi alpinum repens: pro 7. in Prodromo descript.

IX. Thlaspi parvum saxatile flore rubente. Lithothlaspi quartum carnosio rotundo folio, Colum.

Ex Provinciae saxosis & hoc, & 9. & 11. à D. Bursero habemus: simile cum 11. sed folijs & thecis majoribus, ex Hispania D. Albinus attulit.

X. Thlaspi saxatile Polygalæ folijs: cauliculis est pedalis, folijs polygalæ forma, sed longe minoribus: flosculis exiguis, albidis, thecis rotundis infractis, semine minutissimo in saxosis circa Monspelium.

XI. Thlaspi saxatile vermiculato folio. Lithothlaspi montanum fruticosius vermiculato acuto folio, Colum.

XII. Thlaspi montanum incanum luteum serpilli folio majus.

Thlaspi spinum luteum, Lob. ico.

XIII. Thlaspi saxatile incanum luteum serpilli folio minus.

Jonthlaspi luteo flore, incanum montanum *Aurea*, Colum.

*Thlaspi Alysson dictum, sive Alysson.*

I. Thlaspi Alysson dictum campestre majus. Alysson, Matth. Ang. Lugd. Cum.

Thlaspi Græcum, Ad. & Lob. ico. Ger.

Thlaspi Græcum polygonati folio, Tab.

Alysson minimum. Clus. pan. & hist.

Flosculi est albus, interdum luteis.

II. Thlaspi Alysson dictum campestre minus.

Thlaspi, Tab. d. 1.

Alysson minus Dalech. Lugd.

Thlaspi minimum, Tab.

Thlaspi alpinum flore luteo, Eyt.

Si cum precedenti non idem, saltem affine.

III. Thlaspi Alysson dictum maritimum.

Thlaspi Narbonense centunculi angustifolio, Ad. Lob. ico. Lugd. Tab.

Thlaspi umbellatum Narbonense Ger. ico.

Thlaspi maritimum Dalech. Lugd.

Thlaspi syriacum, vel Græcum alterum aureo lobo bitori pericarpio lentifolio, A. Veslingii proponunt: sed quid?

*Thlaspi clypeatum.*

I. Thlaspi bifidum asperum Hieracifolium & majus.

Thlaspi parvum hieracifolium, sive Lunaria lutea Monspelienfium, Ad. Lob.

Thlaspi clypeatum, Clus. pan. & hist.

Thlaspi quoddam genus, in monte S. Juliani Cæsalp.

Lunaria lutea Dalech. Lugd.

Thlaspi bifidum, vel Lunaria bifidum, Camer.

Thlaspi majus clypeatum, Ger.

Thlaspi minus clypeatum 1. Tab.

Leucium montanum 1. Thal.

Leucium alisoides umbellatum montanum, Colum.

Hoc ipsum ex Creta Thlaspi nomine, Honorius Belli misit, quod folijs minus asperis, sed tota planta incana est.

II. Thlaspi bifidum asperum minus.

Jondraba alisoides Apula spicata, Colum.

Folij est brevioribus, crassioribus, in totaque planta humilior: ex Hispania D. Albinus attulit: at multo minoribus, minusque asperis ex montibus Tyrolensibus habemus.

III. Thlaspi bifidum villosum luteo caris donato.

Leucium montanum flore pedato, Colum.

Hoc sub 8. in Prodromo describitur.

IV. Thlaspi clypeatum serpilli folio.

Thlaspi alterum minus clypeatum serpilli folio, Ad. Lob. ico.

Thlaspi minus clypeatum Ponde, Lugd.

Thlaspi minimum spicatum, lunatum, Col.

Lunaria Græca quarta, Cæs.

Aliquando thecæ veluti in longam spicam dispositæ sunt, quomodo in D. Col. mna polycarpa, quando datus in semine compactæ, ut in

*Thlaspi fruticosum.*

I. *Thlaspi fruticosum* Leucoij folio latifolium: hoc 9. est in Prod.

Est majus circa Mafsilium à D. Bursero: est minus pauloque angustioribus folijs, in Italia collectum.

II. *Thlaspi fruticosum* Leucoij folio angustifolium.

*Thlaspi fruticosum* folio Leucoij marini minoris, Lob. Lugd. Tab.

*Thlaspi* semper virens, Cam.

III. *Thlaspi fruticosum* folio thymbræ hirsuto.

*Thlaspi fruticosum* alterum. Lob. Lugd. Tab.

*Thlaspi fruticosum* minus, Ger.

*Thlaspi* 5. Hispania albo flore, Clus. hist.

IV. *Thlaspi fruticosum spinosum*.

*Thlaspi fruticosum spinosum* Narbonen. Lob. Lugd.

*Thlaspi spinosum* f. Tab. Ger.

Folia habet Leucoij oblonga, incana: oblonga, ut in monte Lupi observavi: at in hortu Monspeliensem translatus, unde D. Burserus attulit, breviora & rotundiora obtinet.

V. *Thlaspi fruticosum incanum*.

*Thlaspi incanum* Mechlinense, Lob. Lugd. Clus. pan. & hist.

an *Thlaspi incanum fruticosum* Franconicum, Cam.

an Iberis prima, Tab. quod sub *Thlaspi fruticoso*, Ger. ico.

*Thlaspi exoticum.*

I. *Thlaspi repens* hederæ folio.

*Thlaspi hederaceum*, Lob. Lugd.

II. *Thlaspi Alexandrinum*.

Hoc in Phytopinace sub 12. in Prod. sub 10. descripsimus.

## BURSA PASTORIS.

*Thlaspi species apud antiquos fuit, qua nunc Bursa pastoris, à marsupiolis comprehensa (alys Capsella) dicitur: quibusdam Sanguinaria & Crispula.*

*Bursa pastoris folijs sinuatis.*

I. *Bursa pastoris* major folio non sinuato: in Phytopinace & Prodromo sub prima descripta.

II. *Bursa pastoris* major folio sinuato.

*Bursa pastoris* major, Brunf. Trag. Ges. hor. cui & *Thlaspi fatuum*.

*Bursa pastoris*, Matth. Lac. Lon. Corn. (cui Medica, Diosc.) Cord. in Diosc. Ad. Lon. Lob.

Thal. Cæf. (& *Thlaspi* genus antiquorum) Lugd. Cast. & herba Cancræ, Ger.

*Pastoria bursa*, Fuch. Dod. major, Tab.

Folij variat: aliquando eleganti est folio, instar Coronopæ repentis.

III. *Bursa pastoris* media.

*Bursa pastoris* sexta, Trag. minor, Ges.

*Bursa pastoris* minor, Tab. minima, Ger.

IV. *Bursa pastoris* minor folijs incis: & Thal. qui alterius, folijs integris meminit.

*Pastoria bursa* minor, Dod. minima. Lob. ico.

Hæc aliquando ad duas tresve solum uncias apud Monspelienfes exurgit, aspectu ob foliorum incisuram elegantissimo, quam *Thlaspi* minus nominant.

*Bursa pastoris folijs integris loculis oblongis.*

I. *Bursa pastoris* major loculo oblongo.

*Draba minima*, muralis Dioscoridis, Colum.

*Thlaspi Veronicæ* folio, Richerio.

in Phytopinace sub 6. in Prod. sub 2. descripsimus.

II. *Bursa pastoris* minor loculo oblongo.

*Genfiblum*/id est, anserum flos. Brunf.

*Paronychia alfinefolia*, Ad. Lobel. Lugdun. Camer.

*Paronychia vulgaris*, Dod. latifolia, Ger.

*Herbula burse pastoris* affinis. Cæf.

*Thlaspi* minima species, Thal.

*Alfine minima*, Tab.

*Pilosella filiquata minima*, Cam. ad Thal.

*Myosotis parva* Dalech. Lugd.

Folij communiter integris, rarissime incinatis.

III. *Bursa pastoris alpina* hirsuta: quæ 3 in Prod.

IV. *Burse pastoris* similis filiquosa major, seu majoribus folijs.

*Pilosella*



Pilosella siliquata major, Thal.

Aizoon telephium Dalech. Lugd.

V. Burſæ paſtoris ſimilis ſiliquoſa minor, ſeu minoribus ſolijs.

Paronychia altera myagri folio, Geſneri, amer.

Pilosella ſiliquata minor, Thal. & Cam. fig. hort. D.

## MYAGRVM.

**M**ΥΑΓΗ Dioſc. l. 4. c. 17. meminit, cui Rubia ſolia tribuit. & Plinio, l. 27. c. 12. Myagros dicitur: verum quid ſit, nunc non decernimus. Sunt qui noſtrum Myagrum, Eryſimum Theoph. & Galeni velint: alijs Sefamum, ob ſemini ſimilitudinem, & olei ubertatem.

I. Myagrum ſiliqua longa.

Viola lutea ſyl. Trag.

Myagrum alterum Thlaſpi effigie, Lob. Lugd.

Myagrum 1. Tab. Eryſimum 3. Eid.

Camelina, Ger. Eruca ſyl. anguſtifolia, Eid.

Ratione ſoli variat, cubitalis, ſolijs latis, aliquando trium quatuorſe unciarum anguſtis: & inter hæc eſt medium.

II. Myagrum fativum.

Linaria quinta, Trag.

Sefamum, Trag. Lac. Lon. Sefamum non eſt Geſ. hor.

Myagrum Dioſcoridis, Ruell. Ang. Dod. gal.

Ad. Lob. Lugd. Ger.

Myagrum primum, Tab.

Pſeudomyagrum, Matth. Lugd.

Camelina ſive Myagron, (& Eryſimum cereale) Thal. Dod. Thal.

Dorella, Cæſalp.

Aliquibus in locis ſeritur olei cauſa, & latioribus ſolijs eſt: multis locis ſpontè provenit

& hoc ſtrigoſus, hinc figurarum varietas, ut in Matthiolo noſtro videre eſt.

III. Myagrum ſylveſtre.

Pſeudomyagrum alterum, Cam. in Matth.

Paronychia 2. Tab.

Huic ſimile minus, quod

Myagrum 3. in arvis, Cam.

IV. Myagrum fœtidum; quod 1. in Prod.

V. Myagrum monospermon latifolium.

Myagrum hortenſe monospermon, Eyſt. Bricourres nomine ſemen miſſum fuit; Pſeudoſaridem Alpinus nominabat.

Hoc in Phytopinace ſub 5. & in Matth. ubi & figura exhibetur, & ſub 2. in Prod. habetur.

VI. Myagrum monospermon minus, 3. in Prod.

VII. Myagro ſimilis ſiliqua rotunda.

In Phytopinace ſub Myagro 6. in Prod. ſub 4. deſcripta, Thlaſpi nomine Norinbergâ: Lepidij, Monſpelio: Myagri Monſbelgardo, habemus.

## DRABA.

**D**RABAM Δραβή Dioſcorides, lib. 2. cap. 136. ipſi Thlaſpi ſubjungit, unus ſactâ mentione.

I. Draba umbellata, vel Draba major capitulis donata.

Arabis ſive Draba, Matth. Ang. Ad. Lob. (& Nailurrium Babylon) Lugd.

Arabis, Lac. Lon. Arabis verior, Cam. Drabe, Matth.

Draba vulgaris prima, Cluſ. pan. & hiſt.

Draba Dioſcorid. Cæſ. Caſt. Colum.

Folijs dentatis obſervavimus; ſunt qui non dentatis pingant.

II. Draba tenuifolia velut ſpicata: 1. in Prod.

Drabæ ſerventis vernæ nomine, Phorenia Doct. Agerius attulit.

III. Draba minor capitulis orbicularibus; Draba minor, Cluſ. hiſt.

IV. Draba alba ſiliquoſa.

Draba ſecunda, Cluſ. pan. & hiſt.

V. Draba alba ſiliquoſa repens.

Draba altera, Lob. ico.

Draba ſucculento folio, Cluſ. pan. & hiſt.

Arabis ſeu Draba altera, Lob. ob. Lugd.

Eruca muralis, Lugd.

on Thlaſpios generibus cognata ſiliquoſa, Thal.

VI. Draba Eryſimi flore & ſiliquis.

Sinapi & Thlaſpi media Provincialis planta, Ad. Lob. ico. Lugd.

VII. *Draba lutea* siliquis strictissimis.  
*Arabis* quorundam, Cam. ep. Matth. & hor.

VIII. *Draba* flore cæruleo galeato hæc  
 2. est in Prod.

## ALLIARIA.

**A**lliaria est quod folia digitis comminuta, Allium seu Porrum Astrum cum Nasturtio & olea est quibusdam, Thlaspidium secundum Cræzæ. alij Alectorolophos Plinij, lib. 25. cap. 3.

Alliaria, Trag. (cui & Thlaspidium cornutum) Fuch. Matth. Dod. (cui & Pes asinus Pandest.) Lac. Ad. Lob. Cast. Lugd. Casalp. Thal. Lon Tab Cam. Ger. Alliaria altera, Ama. Allialtrum, Gesn. hort.

Rima marina, Euricio Cordo. Rima maris, Anguillara.

Alectorolophos Plinij quibusdam, Dalech. in Plinium.

Folio latissimo amplissimoque & sustundo, quandoque reperitur.

## COCHLEARIA.

**C**ochlearia, à foliorum forma modicè cava, parvum & non valde profundum co. l. & crescentia, dicta: quam aliqui Telephium, alij Britannicam Plinij, lib. 25. cap. 1. volunt, lucet forma & sapore Thlaspi & Nasturtij affinis sit) est quod ei malo, quod Stomachicum & Scolotriben vocant (Scorbutum esse volunt) auxilio esse Britannicam Plinius scribit.

I. Cochlearia folio subrotundo.  
 Cochlearia. Dod. Gesn. hor. Lugd. Cam. epit. Matth. & hor. & par. 3. Ind. orient. navig. 3. Telephium, Lac. Britannica, Gesn. hor. Cochlearia Batava, Ad. & Lob.

II. Cochlearia folio sinuato.  
 Cochlearia Anglica Attriphi is folio, Ad. Cochlearia Britannica, Ad. Lob. Dod. Lugd. Ger.

III. Cochlearia minor erecta: quæ in Prod. IV. Cochlearia Danica repens: quæ 2. in Prod.

## SECTIO TERTIA.

### BRASSICA EJVSQVE SPECIES.

**B**rassica Theophrasto 1. hist. 10. inter Olera est, quæ ἀπὸ τῆ βράζου à vorando, Dioscorido, lib. 2. cap. 14. καυβὴν, quasi καυβαν, quod oculorum pupillis Leda, dicitur. Theophrasto & paxaron de 1. in Raphano minimus.

Genera: Dioscoridi sive, sive & maritima. At Theoph. 7. hist. 4. alia crispata, alia levius, alia sylvestris. Plinius cum lib. 19. cap. 8. Brassica cauliumve tria genera ex ratione, cap. 157. enarrasset, plura adhuc esse refert, Cumanam, Aricinam, Pompejanam, Sabellianam, Eacuturrem. At lib. 20. cap. 9. Græcos in tres species divisile scribit. Cossiam, quam Solimada, à similitudine foliorum apij vocarint: alteram leam, lata folijs, quam Caulodes quibusdam. tertiam propriè Clambem appellatum.

Recentioribus differentiæ sunt pro foliorum colore, crispitudine, densitate, alijque qualitatibus. Alijs nim color varius, alijs candidus, alijs purpurascens. Crispitudo etiam in candida, quam in viridi, quam nigram vident, rarius in purpurea reperitur. Summa genera sunt sive, sylvestris: sive, alba & rubra. &c.

Brassica

*Brassica capitata.*I. *Brassica capitata alba.*

*Brassica alba*, Brunfels. quæ capitata & fœstilis, Cord. in Diosc.

*Brassica alba fœstilis* & glomerata, Lob. ico.

*Caulis* c. in latus, Trag.

*Caputium* *Brassicæ* 3. genus, Cumanum Plinij, Eric. Cord.

*Brassica capitata*, Matth. (& Lacuturris) Lac. Gef. hort. Lon. Tab. Lob. Cast. alba, Ger.

*Brassica alba fœstilis glomerata*, aut capitata *Lactuce hibernæ*, Ad.

*Brassica capitata albida*, Dod. (cui *Tritiana* Lugd.

*Brassicæ* 4. genus, Fuch. Tur.

*Brassica capitata* 1. genus, & Cumanum Plin. Cæs.

Hæc candida est, quæ Lacuturris Plinij: est & viridis, quæ *Tritiana*

II. *Brassica alba capite oblongo non penitus clauso.*

*Brassicæ* albae 2. species *Lacuturris*, Dod. gal.

*Brassica patula*, Sabauda vulgo, Ad.

*Brassica Sabauda hyberna*, Lob. ico.

*Brassica Sabauda*, Tab. Ger.

III. *Brassica ex capitibus pluribus conglobata.*

*Brassica capitata polycephalos*, Lugd.

In hæc aliquando quinquaginta capita ovorum magnitudine numerantur.

IV. *Brassica capitata rubra.*

*Brassicæ rubrae* 1. species, Dod. gal. Lugd.

*Brassica convoluta* & arcte occlusa rubro colore, Ad.

*Brassica capitata rubra*, Dod. Tab. Ger.

V. *Brassica gonolylea.*

*Brassicæ* albae 4. species, Dod. gal.

*Brassica thyrsifera*, Gef. hort.

*Caulis* 1. *Brassica peregrina*, medio caule turbinata, Cord. in Diosc.

*Brassica caule rapum gerens*, Dod. rapicaulis, Cam.

*Brassica raposa*, Rapitiuscolis Catoni, Lugd.

*Caulorapum*, Matth. Scalig. Lob. ob. Cam. ep. Taber.

*Rapa Brassica peregrina*, caule rapum gerens, Lob. ico.

*Brassicæ capitatae* 2. genus, Lacuturris Plinio, Cæs. alp.

Variis rapo rotundiore & longiore: illa *Caulorapum rotundum*: hæc *Caulorapum longum*, Tab. & Ger.

IV. *Brassica prostrata*, in Prodromo descripta.

VII. *Brassica cauliflora*

*Bell. Pompejana* aut *Cypria*, Dod. gal. Lug. Cam.

*Brassica florida*, Ad. Ger.

*Brassica cauliflora*, Dod. Cam. ep.

*Brassica florida botrytis*, Lob.

*Brassicæ capitatae* genus 3. Cæs.

*Brassica prolifera florida*, Tab.

An hæc Theophrasti, qui nullum aut parvum semen producere scribit?

*Brassica non capitata.*I. *Brassica alba vel viridis.*

*Brassica*, Brunf. lævis, Matth. Cæs. Cast.

*Brassica sativa majoris* species altera, Trag.

*Brassica candida*, Gef. hort. lata alba, Lon.

*Brassica alba vulgaris*, Lugd.

*Brassica vulgaris*, Ad. sativa, Lob. Dod. Ger.

*Brassica prima*, Tab.

*Brassica* in India, folia semper hiantia servat, nec unquam capita profert: part. 4. Ind. Or. c. 10.

Hæc est *Brassica lævis* Theoph. & Plinij, cui & *Caulodis*.

Hinc altitudine arbores adæquantem *Morardes Florentinae* vident

II. *Brassica rubra.*

*Brassica* 1. genus, Fuch. rubrae 1. genus, Lugd.

*Brassica Cumanæ* sive rubra, Dod. gal.

*Brassica prima*, Tur. vulgaris, Cord. in Diosc.

*Brassica rubra*, Gef. hort. Ad. Lon. Tab. Ger.

III. *Brassica spinosa*: huius in *Phytopinnace* & *Matthiolo* (ubi & icon) mentio fit: & in *Prod. sub 2. d.* describitur.

IV. *Brassicæ folia peregrina.*

*Achanaca* Theveto. & Lugd. quæ in regno *Melyut* nos *Guajaco* utuntur.

V. *Brassica Brasiliana folijs Nymphaeæ.*

*Cajova brassicae* genus, *Cajov-a* Lerio descript. *Brass. cap. 12.*

*Brassica crispa.*I. *Brassica alba crispa.*

*Brassica crispa*, Matth. Lac. Gef. hort.

*Brassica alba crispa*, Lugd.

*Brassica Sabauda*, Dod.

*Brassica Sabauda crispa*, Tab. Ger.

*Brassica patula crispa Sabauda æstiva*, Lob. ico. quibusdam *Lacuturris*, alijs *Sabellica* Plinij.

II. *Brassica asparagodes crispa.*

*Brassica asparagodes*, Dalech. Lugd.

*Brassica crispa prolifera*, Tab. Ger.

*Brassica epiphyllitis.*

Folia modò laciniata, modò plana & expansa: vel tota vires, vel venæ & costæ rubent: hinc prolifera, & prolifera crispa, Tab. & Ger.

III. *Brassica fimbriata.*

*Brassicæ* 2. genus, Fuch.  
*Brassica* Sabellica sive crispa, Dod. gal.  
*Brassica* crispa, Dod. Lugd.  
*Brassica* nigra, Dod. Lugd.  
*Brassica* nigra crispissima, Cæf.  
*Brassica* fimbriata, Lob. topfosa, Tab. Ger.

IV. *Brassica fimbriata pumila.*

*Brassica* Anglica, minima, Ad.

Tota nivea, oris fimbriatis purpureis, maculis aspersis.

*Brassica Apij folio.*

I. *Brassica lato Apij folio.*

*Brassica* folijs laciniatis, Matth.  
*Brassica* tenuifolia laciniata (prior,) Lob. Lug.  
*Brassica* Selinifolia latifolia, Tab. Selinifolia, Ger.

II. *Brassica angusto apij folio.*

*Selinada* & *Apiana*, Plinio.  
*Brassica* crispa seu *Apiana*, Trag. Lon. Lugd.  
*Brassicæ* rubræ 3. species, Dod. gal. Lugd.  
*Brassica* Selinoides, Dod. Selinifolia angustifolia, Tab.  
*Brassica* Selinoides, Ger. scissis folijs, Cæf.  
*Brassica* Apiana crispa, Cam.

*Brassica sylvestris.*

I. *Brassica arvensis.*

*Brassica* syl. Trag. Crambe dicta, Dod. Tab.  
*Brassica* 3. Fuch. Lugdun. 5. species, Dod. gal. 2. Tur.

II. *Brassica sylvest. Dioscoridis.* Dod. Port.

*Brassica* sylvestris, Ang. Matth. Lugd. Cæf.  
 Subhirsuta alijs, alijs lævis, alijs Hyoscyami modo hirsuta, Matth. Amat.

III. *Brassica maritima monospermos.*

*Brassica* sylvestris, Tur.  
*Brassica* marina monospermos, Lob. ico. sylv.  
 multiflora, monospermos, Ad. Lob. ico. Lugdun. Ger.

*Brassica* marina Anglica, Ger. ico.

*Brassica* Anglica, Tab.

IV. *Brassica campestris perfoliata flore albo.*

*Perfoliata*, Lon. altera, Trag.  
*Perfoliata* siliquosa sive major Tragi, Cam.  
*Brassica* agrestis, Cord. hist. Lugd. cui altera species.  
*Perfoliata* minor, Gef. hort.  
*Brassica* campestris 1. Clus. hisp. & hist. Cast. Lugd.  
*Brassica* sylv. sive campestris, Cam.  
 an *Brassica* sylv. folio betæ, Thal.  
*Perfoliata* Napifolia Anglorum siliquosa, Lobel. icon.  
*Perfoliata* siliquosa, Ad. Lob. ob. Ger. Napifolia, Tab.

*Brassica* sylv. perfoliata, Dod.

V. *Brassica campestris perfoliata flore purpureo.*  
*Brassica* campestris altera, Clus. hisp. & hist.  
 VI. *Brassica* syl. latifolia folijs non sinuosis.  
*Brassica* sylv. major latifolia, Thal.

VII. *Brassica* sylv. ramosa glabra.

*Brassica* sylv. virgata, Cord. hist.

*Brassica* sylv. procera, Thal.

*Brassica* sylv. prima Cordi, Lugd.

VIII. *Brassica sylvestris folijs circa radicem cichoraceis.*  
*Sinapi* album, Lugd.

*Brassica* sylvest. longifolia, Thal.

IX. *Brassica sylvestris hispida non ramosa.*

*Turritis*, Lob. ico. Tab. Ger.

*Turrita* vulgarior, Clus. hist.

*Vaccaria*, Taber.

X. *Brassica* sylv. ramosa hispida.

*Turrita* rarior, Clus. hist.

XI. *Brassica* syl. folijs membranaceis. sylvestrem mediam, & sylv. minorem Thalius habet, quas non novi.

XII. *Brassica* sylvest. alpina: quæ sub 3. in Prod. describitur.

*Turritis* alpinæ nomine D. Burserus misit.



## SECTIO QUARTA.

ISATIS SIVE GLASTUM: LAPATHVM: ACETOSA: SPINACHIA: RHA:  
CENTAURIUM MAJUS.

## ISATIS SIVE GLASTVM.

**I**ta ne sativa (Dioscoridi l.2.c.215.) folia habes plantaginis sylvestris, lactuca similis: quare genera duo fecit: & Plinio l.20.c.7. lactuca spontanea verum genus, quod Isatim vocant & quartum quod Glastum vocant, folijs priori simile aut laphato sylvestri.

I. Isatis sativa vel latifolia.

Isatis domestica, sive Glastum, Matth. Cast.

Isatis sativa, Trag. Fuch. Dod. ut Cord. in Diosc.

(cui & Latinorum Lutea & Glastum) Ges. hor.

Lac. Lon.

Glastum sativum, Tur. Ad. Lob. Cam.

Glastum, vulgo Guadum, Cæs. cui & Isatis syl. Dioscorid.

Isatis Græcorum, Nil Avicennæ, Indicum officinarum, Fragoso, & Anir aliud.

II. Isatis sylvestris vel angustifolia.

Isatis syl. Trag. Matth. Fuch. Dod. ut. Ges. hor.

Lac. Lon. Lob. Lugd. Tab.

Glastum, sive Isatis sylvestris, Ad.

Isatis agrestis, Cord. in Diosc.

Glastum sylv. Tur. Cam.

III. Isatis Indica folijs Rorismarini, Glasto affinis.

Anil herba folijs Mungiriqua (ocymo Clusi- us vertit) similibus, Garziæ & Acoftæ: cum

Isatide multum convenire, addit Clus. & Nil apud Avicennam, interpres Glastum vertit.

Nil sive Anil, Cam.

Anil sive Indigo, Gali sive Nil, herba roris- marini facie, Linc. 4. par. Ind. Or. 25.

Herba anil sive Enger, 4. per. Ind. Or.

Planta ex qua Anil sive Indigo conficitur, par. 9. Ind. Occid. l.4. c.23.

Agnir, Fragoso.

Pastellus herba ad colorandas lanas expetita, & cujus venditione in Insulis Azores victum

comparant: Lincor. par. 3. Ind. Or. 6.

Indigo in Sian crescit maxima copia: par. 8.

Ind. Or.

Color Indicus quem in Cambaja Anil vocant, par. 2. Ind. Or. 11.

IV Isatis montana.

Glastum montan. Dalechamp. Lugd. quid est?

V. W'allevovvr herba quam decoquunt pro rubri coloris tinctura in Virginea.

## RAPATHVM ET EJVS SPECIES.

**L**apathum à Theophr. l. hist. 9. inter olera numeratur: & 7. hist. 2. sylvestris tota forma cum perfectum est, Beta proximum cernitur. λαπαθον Diosc. l. 2. c. 140. ab effectu nominatur, à λαπαθω exinaniendo, quod foliorum decoctum album emolliat, & exinaniat: Latinus Rumez, ut Plinio l. 19. c. 21. qui Lapathum sativum & l. 20. c. 21. Oxalidis tribuit.

Genera quinque Dioscoridi, δρυλαπαθον, κυρδον, εχαλιδον, & καταπαθον. Theophr. 7. hist. 6. in sylvestrem & urbanam partitur. Plinius lib. 20. cap. 21. meminit sativum sylvestris, quod Oxalidem vocat. Oxylapathi, Hydrolapathi, Hippolapathi, & Bulapathi. Lutes ab Acetosa ordire.

## ACETOSA.

I. *Acetosa pratensis.*

*Capathum* 4. *Diofc. sylvestre, Plinio.*  
*Oxylapathum, Gal. Manardo.*  
*Oxalis* five *Rumex* proprie, *Herniolao.*  
*Rumex acetosus, Ruel.*  
*Acetosa Brunf. Lon. major, Cast. Colum.*  
*Oxalis, Trag. Matth. Lac. Fuch. Dod. Amar. Ad.*  
 (& *Lapathum oxalida*) *Lobel. Cæf. Tab. Ger.*  
*Portæ major, Thal. Lugd.*  
*Rumicis* 4. genus, *Tur. Cord. in Diofc.*  
*Lapathi alia species, efculenta dicta quibusdam*  
*Lapathum acutum, Ang.*  
*Lapath. minimum, Oxalis dicta major, Gef. hor.*  
*Acetosa major altera, herba S. quibusdam, Ren.*  
 Hujus folia aliquando media parte virent, altera  
 verbocandida sunt: aliquando in imoutrinque  
 bifurcata: nonnunquam folia crispantur, & hæc  
*Oxalis crispa, Tab. & Ger.*

II. *Acetosa montana maxima.*

*Oxalis major Brokenbergensis, Thal.*  
 an *Oxalis altera, Cæf.*

III. *Acetosa montana geniculis nodosis.*

*Oxalis amplissimo folio, Cluf. pan.*  
*Oxalis montana maxima, Eid. hist.*

IV. *Acetosa montana bulbosa.*

*Acetosa quarta, Colum.*

V. *Acetosa tuberosa radice.*

*Oxalis tuber. Lob. Dod. Lugd. Tab. Ger. Cam.*  
 an *Acetosa altera minor bulbosa radice, Colum.*

VI. *Acetosa Americana, folijs longissimis*  
*pediculis donatis: hæc i. in Prod.*

*Acetosa vesicaria peregrina, Eyf.*

VII. *Acetosa calthæ folio peregrina.*

*Oxalis Zarynthi, Alpino.*

VIII. *Acetosa rotundifolia hortensis.*

an *Lapathum tertium, Diofc.*  
*Oxalis Romana & Veterum, Dod. gal.*  
*Oxalis rotundioribus folijs, Gef. hort. rotundi-*  
*folia, Dod. rotunda, Lugd. Tab.*  
*Oxalis sativa Franca rotundif. repens, Ad. Lob.*  
*Oxalis Franca seu Romana, Ger.*  
*Oxalis tertia, Cæf.*

*Acetosa rotundis folijs, Cam. qui &*  
*Acetosa Hispan. grandissimis folijs meminit.*  
*Acetosa major quæ & repens, Renod.*

Ludit folijs, communiter subrotundis, rari-  
 us ad formam foliorum Boni Henrici oblongis  
 & in acutum desinentibus.

IX. *Acetosa rotundif. alpina: quæ i. in Prod.*

X. *Acetosa scutata repens: hæc j. in Prod.*

XI. *Acetosa Cretica semine aculeato.*

Hæc in *Phytopinace* sub 10. in *Prodr.* sub 4.  
 descripta, & *Matth. una cum figura adposita.*

XII. *Acetosa Oximi folio Neapolitana.*

*Acetosa tertia, vel Acetosa ocimi folio Neapo-*  
*litana, Bauh. pinax, Cæf. Colum.*

Hanc D. *Columia* misit.

XIII. *Acetosa arvensis lanceolata.*

*Oxalis minima, Trag. (& Lapatiolum) Dod.*

*Oxalis minor, Matth. Gef. hort. Lugd.*

*Oxalis tenuifolia sinuata vervecina, Ad. Lob.*

*Acetofella, Lon.*

*Acetosa minor, Cast.*

*Rumicis seu Lapathi 6. genus, Cord. in Diofc.*

*Oxalis spontè nascens, Cæf.*

*Oxalis ovina, Tab. tenuifolia Ger.*

*Acetosa syl. omnium minima, Renod.*

Ratione loci pinguioris aridiorisve, major  
 minorve, latioribus angustioribusve folijs re-  
 peritur.

XIV. *Acetosa lanceolata angustifolia re-*  
*pens: hæc 4. in Prod.*

Hujus species minor videtur, quæ dicitur

*Oxalis minima 1. Tab. minor, Ger.*

XV. *Acetosa arvensis minima non lanceolata.*

*Oxalis minima 2. Tab. minima, Ger.*

XVI. *Acetofella folijs similis villosa.*

Herba Joh. infantis, *Monardi, Lugd. Frag. Cast.*

## LAPATHUM.

*Lapathum hortense.*

I. *Lapathum hortense folio oblongo, five*  
*secundum Diofcoridis.*

*Rumex hort. vel 2. Trag. sativus, Cord. in Diofc.*

*Lapathum hortense, Gef. hort. Lugd.*

*Lapathum sativum, Ang. Dod. descr.*

*Hippolapathum syl. Matth. edit. prima, Lugd.*

II. *Lapath. hort. seu Spinacia semine spinoso.*

*Spinachia Manardo, & Atriplicis forte genus,*

*Bras. Brunf. Fuch. Dod. Tab.*

*Spinacia, Harmol. Matth. Ad. Lob. Cæf. I. Ger.*

*mas, Cam.*

*Spinachia. Atriplex Hispaniensis Ruellio, &*

*Seutomalachon, Lon. Cast.*

*Spinachium, Matth.*

*Spinacia sativa mas, Lugd.*

*Olus Hispanicum Spinachia vulgaris, Trag.*

*Spinaceum olus, & Spinachia mas, Gef. hort.*

*Spinachia, ob semina dura & spinosa, Cæf. i.*



recentioribus *seu* à raritate in usu Medico, alijs Scutolapathum, hoc est, mediæ naturæ inter Betam & Lapathum: alijs Scutomalache.

III. Lapathum hortense seu Spinacia semine non spinoso.

Spinachia nobilis & r. Trag.

Spinachia sylvestris, Lugd.

an Spinachia sylvestris, Cæsalp.

Hujus figuram in Matthiolo exhibemus.

IV. Lapathum hortense seu Spinacia sterilis.

Spinachia tertia, Trag.

Spinachia fœmina, Ruel. Scalig. Lugd. Cam.

*Lapathum syl.*

I. Lapathum folio acuro plano.

Oxylapathum, Diosc. & Plinij.

Lapathum acutum, Lob. Ger. desc.

Lapathum acutum, Trag. five acutifolium, Ad.

Oxylapathum, Herm. Corn. Amato, Ruel. Fuch.

Dod. gal. Matth. Lac. Cast. Lugd. Portæ.

Rumicis 1. genus, Tur.

Rumex & Lapathum sylv. Bras. acutus, Cord. in Diosc.

Lapathum syl. Gef. hort. Dod. sativum, Cam.

Lapathum seu Rumex, Matth. ico. Lon. Cast. Cæsalp.

Hippolapathum syl. Tab. videtur.

Hydrolapathum magnum, Ger. ico.

II. Lapathum folio acuto crispo.

Lapathum acutum crispum, Tab.

Hydrolapathum minus, Ger. ico.

Rumex minor, Thal.

III. Lapathum folio acuto rubente.

Lapathi tertij altera species, five Lapathum nigrum, Dod. gal.

Rumicis species folijs rubentibus venis distinctis, Cord. ob.

Sanguis draconis herba, Gef. hort. Lon.

Lapathum sanguineum, Ad. Lob. Cam. Ger. sine icone seu maculatum Renod. rubens, five nigrum, Dod.

Lapathum rubrum, Cam. in Matth.

Lapathi syl. 3. genus, Lugd.

Folij paulo latioribus, rotundioribusque vulgari scribit Cæsalpinus,

Lapathum rubrum Cretense, nominans.

IV. Lapathum folio acuto flore aureo.

Lapathi syl. 4. genus, Dalech. Lugd.

V. Lapathum minimum.

Iapathum acutum minimum, Lob. ico. Ger.

Lapathum minimum, Tab.

VI. Lapathum onctuosum, folio triangulo.

Bonus Heinrichus, Brunf. Trag. cui & Spinachia sylvestris, Matth. Tab. Ger.

Rumicis 2. genus, Tur. 3. genus, Trag. Fuch.

Atriplicis syl. species, Gef. col.

Atriplex canina, Lon. ico.

Tota bona Spinaciæ facie, Ad.

Tota bona, Lob. Dod. (quibusdam Chrysolanum) Thal.

Lapathi syl. secundum genus, Lugd.

Piger Heinrichus spinaceum olus syl. Renod.

Folij maximis Aaronis instar aliquando reperitur.

VII. Lapathum folio minus acuro.

Lapathi 3. species, Dod. gal.

Lapathum syl. Ang.

Rumex agrestis, Cord. in Diosc.

Lapathum folio retuso, Ad.

Lapathum folio minus acuro, Lob. ico.

*Lapathum hortense five Theophrasti.*

I. Lapathum hortense latifolium.

Hippolapathum Dioscoridi, Galeno, Plinio, & Rumex urbana, Theoph.

Rhabarbarum, Brunf.

Rhabarbarum in hortis Germaniæ, Corn.

Rhabarbarum Monachorum (Franciscanorum) Trag. Gef. hor. Cam. Portæ, Thal.

Hippolapathum, five Rhabarbar. Monachorum, Ang. Gefn. (aut ejus species) Dod.

Hippolapathum, & Hippolap. hortense Matthiolo: sativum, Cast. Tab.

Hippolapathum longifolium Alp. sativum latifolium, Ad. Lob. (& Patientia vulgi) Lugd.

cui & Hippolapathum hortense, Matthioli. & Lob. figura.

Rumicis 2. genus, Fuch. 3. genus, Tur.

Lapathum sativum, Dod. gal. hort. Lac. Lon.

maximum, Gef. hort. magnum, & Hippolapathum, Cæf.

Lapathum latifolium, Cam. Hippolapathum

veterum Bulapathum, Scalig.

Lapathi species, Cord. in Diosc.

Rumex major, idem cum Rhab. nisi quod sit

ylvestrior, Thal.

II. Lapathum hortense rotundifolium five

montanum.

Lapathum rotundum, Ang. an Lapathum folijs

fere rotundis, Gef. hort.

Lapathum rotundifolium, Clusio pan. Cam.

Hippolapathum rotundifolium, & Pseudo-  
Rharentiorum, Ad. Lob. Lugd.  
Lapathum montanum, Cæf.  
Rumex latifolius, Clus. hift.  
Rhabarbarum Monachorum triplex vidi 1. fo-  
lio oblongo, radice longa, fibris oblongis, in-  
trinsecus rufescente. 2. folio rotundo: 3. folio  
subrotundo, fibris transversis, radice intus flava.

*Lapathum aquaticum.*

I. Lapathum aquaticum folio cubitali.  
Rumex palustris, Trag. aquaticus, Thal.  
Rumicis 5. genus, Cord. in Diofc.  
Lapathum 1. Ang. palustre, Tab. sub Lapatho  
acuto, Ger. ico.

Hippolapathum, sive Lapathum 2. loco deferi-  
ptum, Dod. gal. Matth. Ges. hor. Lon.  
Hippolapathum sylv. Matth. desc. Cast. Thal.  
cui & Hydrolapathum.  
Hydrolapathum magnum sive aquaticum,  
Ad.  
Hydrolapathum majus, Lob. Lugd.  
Lapathum sativum, Dod. ico. qui in descri-  
ptione confundit, Hippolapathum & Hy-  
lapathum.

II. Lapathum aquaticum minus.  
Hydrolapathum minus, Lob. Lugd. Tab.  
Hippolapathum sativum, Ger. ico.

III. Lapathum maritimum sordidum: hoc  
in Prodomo describitur.

## R H A E T E J V S S P E C I E S.

Cum Hippolapathi utriusque radix, pro Rhabarbaro, sed in dupli, triplici & si ne-  
cessetur, nunc de Rhabarbaro deinde Rhapontico, quod quibusdam ex Lapathi generi-  
bus de Censaurio magna, cum id vulgò Rhaponticum & nominetur, & pro eo vendatur, & es  
aliqui Hippolapathi rotundi folij radicem subsistant.

Rhabarbarum, Dioscoridis, lib. 3. cap. 2. 8<sup>a</sup> & 9<sup>a</sup>. Rha, & Rheum, cuius tantum radicem  
describit, dictum volunt. Romanis Rhaponticum appellatum: Arabibus, Raved & Rhabar-  
barum: cuius tria genera Mesueo 2. med. purg. 5. Indicum quod optimum & Rheum  
vocant: alterum Barbarum: tertium Turcicum, quod describitur, in quo genere Rhaponticum  
fuerit, quale est Rhabarbarum acerbum officinarum, colore minus vario minus croceo, minus  
odorato, minus densum, ac facultate minus solvente. Verum videtur Dioscorides suo Rha-  
barbaro non Rhabarbarum nostrum, cuius Mesues meminit, sed Rhaponticum, cum non in Libano  
proposuit, intelligere.

I. Rhabarbarum Officinarum.  
Rhabarbarum nostrum, sive Raved Seni Ara-  
bum: idem genere cum Dioscoridis Rhaponti-  
co, tantum loco differens, Cord. in Diofc.  
Rhabarbarum seu Indicum, Cord. hift.  
Rhabarbarum & Rhaponticum idem, nisi  
quod hoc immaturum sit. Ang.  
Reobarbarum, Lac.  
Rhabarbarum cholagogon, Ad.  
Rhabarbarum Gaziaz, Acoftæ, Frag. Lob.  
Rhabarbarum tertium, Tab. secundum, Ger.  
Rhabarbarum Americanum, Monar.  
Rheon offic. Dod.  
Rhabarbari 2. nomine, aliam cum folijs & ra-  
dice pingit Tab. sub Hippolapatho rotundi-  
folio apud Ger.  
Rhabarbaricum verum, Lapathorum generis  
videtur, Gesn. hort.

Rhabarbaricum, Cord. hift.

Rhabarbarum, nullibi, nisi in China pro-  
nit, quæ inde per Usbeken in Turciam, hi-  
Venetias deferitur; & quidem vel navibus,  
quod citius corrumpitur, vel itinere terrestri,  
quod durabilius & carius, Linsc. par. 4. Ind.  
orient. 29. quæ forte ex Pauli Veneti, lib. 2. de-  
sumpta.

II. Rhabarbarum Matthioli pingit, quem  
sequuntur, Lon. Lugd. Cast. Tab. & Ger. an  
idem sit cum superiore, cum Rhabarbari nec  
folia, nec flores visæ sint, ignoramus: meminit  
quoque Alpinus Rhabarbari, quid habeat folia  
Rumice latiora, crassiora, & lanugine alba  
obrita, Cam. suo Matthiolo radicis fragmen-  
ta addit.

III. Rhaponticum folio Lapathi majoris  
glabro, Rha & Rheum Dioscoridis.

Ponti-

Ponticum Rha antiquorum, Ad. Lob.  
 an Rhapontica, Lon. Rhaponticum verum  
 offic. Tab.  
 Rha Græcis cognitum Monardi.  
 Rhaponticum siccatum, Ger.  
 Rhaponticum Thracicum, Alpino.  
 an Rhaponticum, vetusto Codice, Tab.  
 an Rheum antiquis appellatum, Cæf.  
 I V. Rhaponticum folio Helenij incano.  
 Rha, Rhecoma & Rhacoma Plinij, Dod. gal.

Rhaponticum, Lac. Cast.  
 Centaurium majus montanum folijs Enulæ,  
 forte, Gesn. hort.  
 Rha capitatum folio Enulæ Centaurij majoris  
 facie, Ad. Lob.  
 Rha live Rhei, ut existimatur icon, Dod.  
 Rhaponticum icon, lia, Tab.  
 Rha capitatum, Ger. Helenij folio, Lugd.  
 V. Rhaponticum angustifolium incanum.  
 Rhaponticum alt. angustiore folio, Lob. Lugd.

## CENTAVRIVM MAJVS.

**C**entaurei majoris Dioscoridis, lib. 3. cap. 8. & Plinius, lib. 25. cap. 4. & 6. Item, L. 26. c. 15.  
 & alibi meminere, Theophrastus 1. hist. 19. ubi Fel terra Garza reddit, ut & 9. hist. 14. at  
 3. hist. 5. Centaurium vertit.

I. Centaurium majus folio in lacinias plu-  
 res diviso.  
 Rhapontica, quæ hodie Centaurea major,  
 Trag. Er. Cord.  
 Centaurium majus, Ang. Tur. Lac. Ad. Lon.  
 Lob.  
 Centaurium majus alterum, Gesn. hort.  
 Centaurium magnum, Matth. Dod. Cast.  
 Centaurium majus, Rhaponticum Pharma.  
 Cord. in Diosc. & hist. Cam. Tab.

Centaurea major, Cæsalp.  
 Centaurium majus 1. vulgare, Clus. hist.  
 II. Centaurium majus folio non dissecto.  
 Centaurium majus alterum, Clus. hisp. & hist.  
 Dod. Ad. Lob. Lugd.  
 Rheu Baldense quonondam Ponæ.  
 III. Centaurium Alpinum luteum.  
 In Phytopinace lib. 3. & in Piodrom. Descripsi-  
 mus, & postmodum Rhaponticum Lusitanici  
 nomine, ex herbo Patavino accepimus.

\*\*\*\*\*

## SECTIO QUINTA.

BETA: BLITVM: ATRIPLEX: HALI-  
 MVS: AMARANTHVVS: PARIETARIA:  
 MERCVRIALIS: PHYLLON.

## BETA ET EJVS SPECIES.

**B**ETA Dioscorides, L. 2. c. 149. πύτλον nominat, dicitur & πύτλον ab impulsu, quod facile  
 exerescat: Beta vero, quoniam figuram literæ B dum semine surgit referre videatur.

Genera: Dioscorides nigram & candidam fecit: & Theoph. 7. hist. 4. candida sapore  
 nigra præstantior, quæ Sicula (nunc Cicla Practicus) appellatur: at 6. hist. 3. & Sylvestris  
 in genere Carduorum meminit, quæ tamen folia aculeata non habeat. Plinius, lib. 19. cap. 8.  
 ex Theoph. Beta à colore duo genera Græci faciunt, nigrum & candidum, quod præferunt  
 appellantq. Siculum: nostri (subjungit) Beta genera faciunt Vernum & Autumnale. Idem,  
 lib. 20. cap. 8. Candida nigræq. usum proponit, & Sylvestrem, quam Limonium vocant,  
 addit, quam Dioscorides, lib. 4. cap. 16. λυμύιον nominat.

*Beta minor.*

I. Beta communis live viridis.

Beta agrestis, Trag.

Eandem cum Beta sequenti qui volet, dicat.

II. Beta alba vel pallescens, quæ Cicla offic.

Beta, Brunf. Tab. Ger. candida, Trag. Fuch.

Tur. Cord. in Diosc. Dod. Lac. Lugd.

Beta alba, Matth. Anguil. Gef. hort. Lon. Ad.

Lob. Cast. Cim.

Beta folio brevior & viridior, Cæf.

Variat foliorum colore, viridi, vel ex obscuro magis virente, quam nigram vocant etiam Adverl. & Lob. in obser.

III. Beta rubra vulgaris.

Beta rubra, Brunf. Trag. Lon. Dod.

Beta nigra, Ang. Matth. Fuch. Dod. gal. Lac.

Gef. hort. (& rubra) Cast. Lugd.

Beta rubra vulgarior, Ad. Lob. Lugd.

IV. Beta rubra radice rapæ.

Beta rubra, Matthiol. Gefn. hort. (cui & Seuclostaphylinum) Ad. Lob. Cast. Lugd. rubra

Romana, Dod.

Rapum rubrum, Fuch. Gef. hort.

Rapum sativum rubrum, Fuch. ico.

Beta nigra, Cord. in Dioscor. nigra Roman.

Dod. gal.

Betæ species 3. Ang. Cæfalp.

Beta erythrorrhizos, Lugd.

V. Beta Cretica semine aculeato.

In Phytopinace sub 6. & Matthiolo & Prodr.

(addita figura) descripsimus.

VI. Beta lato caule.

Beta *παραίνανλα*, Dalech. Lugd.

VII. Beta syl. maritima.

Beta syl. spontanea marina, Lob. ob.

*Beta major folijs latissimis.*

I. Beta pallide virens major.

Beta altera, Cæfalp.

II. Beta rubra major.

III. Beta lutea major.

Beta flava, Gefn. hort. lutea, Cam.

Beta quarta radice buxæ, Cæfalp.

## BLITVM ET EJVS SPECIES.

**B** *βίβλη* Dioscoridi, lib. 2. cap. 143. quasi βλατὸν abijciendum, vel propter inertiam & vilitatem, vel ob insulsam sativumve saporem. Festus, à βλαξ pisce omnino inutili, deduxit: licet & stolidum & insulsam significet. Blitum, Plinius, lib. 2. cap. 22.

Genera Theophr. s. hyst. 9. plura dixit, at nec Dioscorides, nec Plinius, differentias proposuerunt. Aliud majus est, aliud minus: utrumque album & rubrum.

I. Blitum album majus.

Blitum album, Matth. Cast. majus, Dod.

Blitum majus album, Dodon. gal. Ad. Lobel.

Lugd.

Blitum, Lac. sativum album, Gefn. hort.

II. Blitum album minus.

Blitum, Trag. ico. Fuch. Tur. Dod. gal. I. op.

Blitum minus, Dod. minus album, Ad.

Blitum sylv. album, Gefn. hort. sylv. minus,

Thal.

III. Blitum polyspermon à feminis copia.

Blitum 3. Trag. syl. Cam. in Matth.

Polyspermon Calsiani, Anguil. Lugd. Lobel.

obser.

Polyspermon, Lob. icon. Tab.

Atriplex sylv. live Polyspermon, Ger.

IV. Blitum rubrum majus.

Blitum rubrum, Matth. Ad. Lob. ico. Camer. Cæfalp.

Blitum rubens, Dod. majus rubrum, Dod. gal.

hortense rubrum, Gefn. hort.

Blitum rubrum minus, Matth. in ico. Lugd.

Blitum nigrum, Ang.

Blitum, Lob. ob. Tab. Ger.

V. Blitum rubrum minus.

an Sanguinaria, Brunf.

Blitum nigrum, Trag. minus rubrum, Dod.

gal.

Blitum sylv. rubrum, Gefn.

Blitum rubrum minus, Ad. rubrum supinum,

Lob. ico.

Blitum alterum sylv. Cæfalp.

Hoc vel caule tantum, vel omnibus partibus rubet.

## ATRIPLEX ET EJVS.

## Species.

**A** Τραχάκτις, παρά τὸ ἀσπρὸν αὐτῆν, cum octavo die à saturo prodeat, Theoph. 7. hist. 1. ζευλαχαυον, olus aureus, à luteo flore, quem fert, Diosc. lib. 2. cap. 143.

Genera duo Diosc. & Plinio, lib. 6. cap. 20. sylvestris & sativum. Drividimus in hortensem, sylvestrem & marissimam.

*Atriplex hortensis.*

I. Atriplex hort. alba sive pallide virens.

Atriplex sativa, Trag. Dodon. gal. Lac. Ad. Lugd.

Atriplex sativa alba, Lob. ico.

Atriplex, Matth. ico. Cæsalp. hortensis, Fuch. Cast.

Atriplex domestica, Ang. Matth. fol.

Atriplex alba, Gesn. hort. sativa viridis, Cord. in Diosc.

Atriplex alba viridis, Lon.

Folio est in luteum languescente, vel pallide virente: est & nigricante.

II. Atriplex hortensis rubra.

Atriplex sativa folio rubicundo, Trag.

Atriplex rufo folio, Cord. in Diosc.

Atriplex sativa altera, Dod. gal. Lugd.

Atriplex hortensis, Dod. hortensis rubra, Lon.

Atriplex sativa, Lob. ob. sativa altera folio & flore purpureo livens, Ad. Lob. ico.

Atriplex rubra, Tab. sub sativa alba, Ger. ico.

Atriplex purpurea grandis, Cam.

*Atriplex sylvestris.*

I. Atriplex sylv. folio sinuato candicante.

Atriplex sylv. 2. Matth. Lugd.

Atriplex sylv. Ang. Cord. in Diosc. Gesn. col. Cæf. Tab. sub Atrip. marina, Ger. ico.

Atriplex sylv. sinuata, Ad. vulgarior sinuata, Lobel.

Atriplex sinuata major, Thal.

II. Atriplex sylv. altera.

Atriplex agrestis, Trag. sylv. prima, Matth. edit. 2. Lugd.

Atriplex sylv. Fuch. Dod. Lon.

Atriplex sinuata minor, Thal.

Cynocrambe 1. Cæsalp.

III. Atriplex sylv. latifolia.

Blitum 4. & Solanum 4. Trag.

Atriplex sylv. 3. Matth. Lugd.

Atriplex sylv. sive Pes anserinus latifolia, laceris lacinijs, Ad. Lob.

Pes anserinus, Fuch. Dod. Lon. Lugd. Cam.

Cynocrambe alterum genus, Cæsalp.

Chenopodium 1. Tab.

IV. Atriplex sylv. latifolia acutiore folio.

Blitum 5. & Atriplicis sylv. genus, Trag.

Bliti species, Lon.

Chenopodium 2. Tab. sub Atriplice sativa purpurea, Ger. ico.

V. Atriplex syl. fructu compresso roseo: hæc 1. est in Prod.

VI Atriplex sylv. mori fructu.

Atriplex sylv. baccifera, Clus. hist.

VII. Atriplex sylv. lappulashabens.

Hæc in Phytopinace sub 8. & in Prod. sub 2. descripta, in Matthiolo quoque nostro depicta. In monte Ventoso Gallie Narbonensis, major existit.

VIII. Atriplex scærida.

Atriplex canina & Blitum fetidum, Trag.

Tragium Germanicum, Dod. gal.

Garofinum, Cord. hist. Dod.

Atriplex sylv. altera, Gesn. hort.

Atriplex pusilla. olida, hircina, Ad.

Atriplex olida, Lob. Ger. canina, Lon.

Vulvaria, Cast. Tab. Lugd.

Cynocrambe affinis, Connina vulgo, Cæf.

IX. Atriplex angusto oblongo folio.

Atriplex sylv. altera, Dod. gal.

Atriplex sylv. 1. Matth. & 2. Lugd.

Atriplex sylv. polygona aut Helixines folio, Ad. Lob. Cam.

Atriplex sylv. humilime, Dod.

Atriplex sylv. 3. Cam. in Matth.

Folij est oblongis angustis non sinuatis, rarius foliorum principio alis duabus appositis.

X. Atriplex Virginiana.

Atriplicis genus, ex cui. semine particula fit, ex caulis cineribus Sal, quo ad saliendo cibos utuntur; in desc. Virginie, vel Ind occid. par. 1.

*Atriplex*

*Atriplex maritima.*

- I. *Atriplex maritima laciniata.*  
*Atriplex marina*, Matth. Cast. Dod Lugd. Cam.  
*Atriplex marina repens*, lutea & xerampeli-  
 na, Ad.  
*Atriplex marina repens*, Lob.

*Cynocrambe* 3. genus, Cæs.

Reperitur rubro & etiam herbaceo semine.

II. *Atriplex halimi folio.*

*Atriplex halimoides*, Lob. ob.

III. *Atriplex maritima angustifolia*: nec  
 3. in Prodomo.

## H A L I M V S.

**A**triplex ③ Dioscoridi l. c. 21. id est, marinus, eo quod in maritimis proveniat: vel rectius  
 ut Plinius l. c. 22. *Oliv. maritimum* salsum, & inde nomen nam & a salinis sp.  
 maritimis provenit: quod & cro Plinius sine aspiratione legit. forse factum quia  
 non in Creta nasci prodidit, mirabili effectu, quod ea admorsa interdiu nulla fames frui-  
 tur, ut inde ei nomen impositum sit, quod famen arceat. Et apud Theophr. 4. l. 3. 20. *Halimus*  
 legitur, ubi Gaza *Auronem* vertit.

Generum duorum Plinius l. c. scribit, sive sive & mitius: per mitius sativum intelli-  
 quem Tholofani, ut Lugd. historia vult, in hortu habent & ab effectu in rham *Halimus*  
 sic & sive sive non longe Tholofa, in quibusdam sepibus nascitur.

- I. *Halimus latifolius* sive fruticosus.  
*Halimus*, Dioscoridi. *Alimus mitius*, Plin.  
 an *Halimus*, Ang.  
*Halimus*, Ad. Lob. primus, Clus. hisp. & hist.  
*Halimus alter latiore folio*, Cæs.  
*Portulaca marina*, Dod. ico.

II. *Halimus verus Dalech.* Lugd. quid? cu-  
 jus Clusius in hist. meminit, ejus fidem dubiani  
 scribens.

III. *Halimus angustifolius procumbens.*

*Halimus* 2. Clus. hisp. & hist. descr.  
 sub *Portulaca* obiter, Dod.

IV. *Halimus seu Portulaca marina.*

*Halimus vulgaris*, Matth. Eys.

*Halimialia* species, Sandalida Cretens. Anp.  
*Portulaca marina*, Dod. ut. Tur. Lem. Ad. Lob.  
 Lugd. Tab.

*Halimus* 3. Clus. hisp. & hist. sed figur. in hist.  
 est sub 2.

*Halimus* 1. tenuiori folio, Cæs.

Videtur *Alimus* sylv. Plinij: licet Lem. &  
*Halimus* esse neget & Advers. & Lob. ut  
 Crithmum Dioscoridis 1. p. centur.

V. *Halimus minor*: qui in Prodr. describitur,  
 & nomine *Halimi aurei arvi* D. Feurerus  
 Northusâ misit.

## A M A R A N T H V S E T E J V S

## Species.

**A**maranthus ③ dicitur, quasi immar, scilicet, eo quod hujus flos decerpitur non marcescit,  
 & cum cuncti flores defecere, aqua madefactus reviviscat, & hybernus vernali salsu-  
 ut habet Plin. l. 21. c. 8. At Theophr. 6. hist. 6. ③ 1/2 dicitur, Gaza *Flammam* vertit.

- I. *Amaranthus maximus.*  
*Blitum*, Mart. l. 1. c. 1. m. 10. Eid. fol.  
*Blitum rubrum majus*, Cast. Lugd.  
*Amaranthus purpureus* 3. Do. l. gal.  
*Amaranthi* species arboreus, Gesl. h. ar.  
*Amaranthus major floribus paniculatis* spica-

tis purpureis, Ad. Lobel.

*Amaranthus major* fl. obsoletus coloris, Dod.

*Bliti peregrini* genus 1. Cæs.

*Blitum Indicum*, Tab.

*Amaranthus major*, Cam.

*Amaranthus paniculatus* 3. ar. 3. Ger.



Quinoa sive Blitum majus Peruanum, Clus. hist.  
Amaranthus major paniculis rubris, Eysl.  
Petrus Cieca, granis dicit rubris, quo se Quinto  
incolæ sustentent; noster alba fert.

Variat: altera hujus species paulo humilior,  
dilutior panicularum colore & folijs angu-  
stioribus.

II. Amaranthus paniculâ incurvâ.

Amaranthus purpureus 2. Dod. gal.  
Amaranthus holosericeis sanguineis reticulatis  
floribus, Ad. Lob.

Amaranthus holosericeus, Lugd. cristatus, Cam-  
mer. Eysl.

III. Amaranthus paniculâ conglomeratâ.

Amaranthus, Cæf. primus, Cast.

Flamma, Ang.

Amaranthus Plinij major, Gef. hort.

Amaranthus purpureus saturo coccineus, Ad.  
Lobel.

Amaranthus saturo cocci colore, Dod.

Amaranthus purp. Lugd. Ger. purp. major, Tab.

IV. Amaranthus simpliciter paniculâ.

Circæa, Trag.

Amaranthus, Matth. parvus, Cam.

Amaranthus purpureus, Fuch. Tur. Dod. gal.  
Cord. in Diosc. & hist.

Amaranthus Plinij minor, Gef. hort.

Amaranthus communis minor, Eid. col.

Amaranthus angustifolius simpliciter spicatâ pa-  
niculâ, Lob.

Amaranthus angustifolius, Lugd.

Amaranthus vulg. Tab. sub Amarantho coccineo,  
Ger.

Amaranthus spicatus, Eysl.

V. Amaranthus folio variegato.

Celofia, Trag.

Blitum maculatâ peregrinum, Theombrotum

Plinij quibusd. Corchoro cognatum, Gef. hort.

Blitum maculosum & herba Papagalli, Dod.

Amaranthus tricolor, Ad. Lob. Tab. Ger. Eysl.

Amaranthus altera, Cast.

Amaranthus pictus, Cam.

Symphonia Plinij & Gomphrena, Lugd.

Bliti peregrini alterum genus, Cæf.

Varietas colorum, in altero hilarior extremo  
flavo, medio puniceo, reliquæ viridi; aliquan-  
do viridi, luteo, rubro: in altero obscurior, il-  
lum fœminam, hunc marem faciunt.

## P A R I E T A R I A.

**E** *Aster Dioscoridi l. 4. c. 86. à semine aspero vestibulo tenaciter adherente: neque sine Galeno 6. simpl. quoddam Perdicem hac delectentur. Plinio l. 22. c. 17. Helxine & Perdicium. Parietaria, quod in parietibus exeat: unde Muralis herba, Cels. l. 2. c. 33.*

I. Parietaria Officinarum & Dioscoridis.

Helxine, Brunf. (cui & Parthenij 7. species)

Matth. Dod. gal. Fuch. Lac. Gef. hor. Lon. Cast.

Lugd. Cam. cui & Urceolari Scribonij.

Helxine, Ad. (Vitriola, sive Perdicium) Lob. Cæf.

Helxine altera, Cord. in Diosc.

Parietaria, Brunf. Tur. Cord. hist. Dod. Tab. Ger.

Parietaria vulgaris & major, Trag.

II. Parietaria minor ocimi folio.

Parietaria exigua vel 1. Trag.

## M E R C U R I A L I S. *Sp. Li. aretta.*

**A** *linosyris, maxillaria, seu bithurios Dioscoridi l. 4. c. 91. Linosyris sive Parthenium, Mercurij inventum (Plin. l. 25. c. 5.) ideo Græci, bermudæ, apud nos Mercurialis: Theophr. g. hist. 19. quoddam censetur.*

Genera: Dioscoridi, fœmina est & mas, & Linosyris syl. mas, quam novius à novæpaulis vocat. Theophrastus, fœminifera & mascula: Plinio, masculum & fœmina.

I. Mercurialis testiculata, sive mas, Diosc.

& Plinij.

Mercurialis, Brunf. (cui parthenij 6. species)

Trag.

Mercurialis mas, Ang. Matth. Fuch. Dod. Lac.

Gef. hort. Lon. Ad. Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Camer.

Mercurialis mascula, Tur. Cord.

Mercurialis fructum ferens, Cæf.

Phyllon arthenogonon Theop. Cord. in Diosc.

II. Mercurialis spicata, sive fœmina, Diosc.

& Plinij.

Mercurialis vulgaris & 1. Trag.

Mercurialis fœmina, Ang. Matth. Fuch. Dod.

Tur. Gef. hor. Lac. Cord. in Diosc. Ad. Lob. Cast.

Lugd. Tab. Ger.

Mercurialis florens, Cæf.

Phyllon Theligionon Theophr. Cord. in Diosc.

Hæc unciam vix superans, Monspessuli locis sterilibus reperitur.

### III. Mercurialis montana testiculata.

Mercurialis syl. Trag. Lon. quæ Cynocrambe, Gef. hort.

Mercurialis mascula syl. Cord. hist. Thal. Cynocrambe, Matth. Fuch. Dod. Lac. Ad. Lob. qui una figura utramq; expressit, Cast. Lugd. Cam.

Mercurialis mas, Fuch. Cam. ep. Matth.

Mercurialis altera vel montana, Cæf.

Mercurialis canina mas, Colum.

### IV. Mercurialis montana spicata.

Cynocrambe sive Mercurialis sœm. syl. Cam.

Cynocrambe sœmina, Eid. ep. Matth.

Mercurialis canina sœmina, Colum.

Mercurialis sylv. sœmina, Cord. hist. Thal. ac Cordo in Diosc. sœmina non invenitur.

Hæc aliquando magis foliosa est.

### V. Cynocrambe Dioscoridis.

In Matthiolo nostro & Prodomo descripta figurâ additâ.

Alsine, Cæfalp.

Alsines facie planta nova, Colum.

Cynocrambe legitima, Belli apud Ponam.

## PHYLLO

**Φ** *Phyllon* ἡ θάλαμος Theophr. 9. hist. 19 habet: quem secutus Diosc. 3. c. 140. *βίχθ' ἐκείνου* quoq; nominavit, ad differentiam Mercurialis, quæ etiam Phyllon dicitur: videntur autem ambo subiectâ plantam intellexisse: in hoc solum dissentiunt, quod Theophr. *ἡ φλόγιον*, Dioscorid. *θάλαμος* vocat, & contrâ.

### I. Phyllon testiculatum.

Phyllum, Matth. qui marem, at Cam. in Matth. utramq; proponit.

Phyll. mas seu Arrhenogonum, mariparum, Ad.

Phyllum Arrhenogonon, Lob. ico. Lugd.

Phyllum mariscum, Clus. hisp. & hist. mas. Lob.

ob. Dod. (sœminam exprimit) Cast. Tab. sub.

Cynocrambe, Ger.

### II. Phyllon spicatum.

Phyllon theligonon, Dod. in ico. Ad. (sive sœminiparum) Lob. ico. Dod. Lugd. Ger.

Phyllum, Gef. hort.

Phyllon sœminificum, Clus. hisp. & hist. Tab.

Phyllon sœmina, Cast.

Et si oleo folio sit, aliquando tamen, licet rarius, serratis folijs circa Monspesium observatur.

\*\*\*\*\*

## SECTIO SEXTA.

LACTUCA, SONCHVS, LAMPSANA, ENDIVIA,

CICHORIUM, DENS LEONIS, HIERACIUM, CHON-

DRILLA, SENECIO, JACOBÆA.

### LACTUCA ET EJUS SPECIES.

**L** actuca, quod copia lactis exurperet, & lac augeat, *ἐκταλὺς* Dioscoridi l. 2. c. 165.

Genera: Dioscoridi sativa est & sylvestris: Theophr. 7. hist. 3. genera plura sunt, candida, cujus tria genera s. laticaulis, rotundam, & Laconicum: de sylvest. 7. hist. 6. agit: sic Plinius l. 19. c. 8. Lactuca tria genera Graeci fecere, unam laticaulis, alteram rotundicaulis, tertium sessile, quod Laconicum vocant. Alijs colore & sativæ tempore genera discernere: nigras, quæ Januario feruntur: albas, quæ Martio: rubentes, quæ Aprilis: diligenter: plura genera faciunt, purpureas, crispas, Cappadocias, Gracas, &c.

Dividimus in sativam & sylvestrem. Sativam, in crispam, rotundam, capitatam Cypriam: Folio enim alia est latiore, alia longiore, crispa, plano, sinuato: colore, alia obscurius, vel etiam pallide virens, rubro, vel etiam maculis purpureis aspersis: sic capitata, alia alba, alia rubra, ac si vinum aspersum esset, alia nigra: sicq; duobus posterioribus semina nigra, alijs verò candida sunt.

*Lactuca borrensis.*

### I. Lactuca sativa.

Lactuca, Trag. Gef. hor. Cæf. Tab.

Lactuca florescens, Matth. Lac.

Lactuca sativa, Ang. Dod. Cord. in Diosc. Lugdun. Taber.

Lactuca sativa folio Scariolæ, Ad. Lob.

Lactuca capitata, quoad ico. Fuch. Tur.

Lactuca rotunda, Lon. ico.

### II. Lactuca folijs Endiviæ.

Endivia major, Trag. desc. & Lon.

Lactucæ 4. genus, Matth.

Lactu-

*Lactuca intybaea*, Tab. Ger.

III. *Lactuca maculosa*.

*Lactuca quinta*, Dod. gal.

*Lactuca Romana*, Matth. Ges. hort.

*Lactuca rubra*, Cæf.

*Lactuca fusci* ac rubente purpurei coloris, rubens Plinij, Dod.

IV. *Lact* folio obscuri virente, semine nigro.

*Lactuca* 2. folijs obscurius virentibus, nigra Plinio, Dodon.

*Lactuca Romana* dulcior, nigriore & Scariolæ hortensis folio, Ad.

*Lactuca nigra*, Cæf. *Lactuca Romana*, Cast.

Folia simul ligata ut in Endiviâ albescent.

V. *Lactuca* folio oblongo acuto.

an *Lactuca Gallica*, Cast.

Hanc in Phytopinace, Prodr. descripsimus.

VI. *Lactuca Italica* laciniata: de qua in Prodr.

VII. *Lactuca capitata*.

*Lactuca sativa* major, quæ in caput coit, Trag.

*Lactuca* 3. Dod. gal.

*Lactuca capitata*, Matth. Dod. Cast. Tab. Ger.

*Lactuca fessilis*, Ges. hort. Lon.

*Lactuca capitata* crispis brasicæ folijs, Lob. ob.

*Lactuca sativa* fessilis, five capitata, rugosis crispis brasicæ folijs, Ad. Lob. ico.

*Lactuca* caput cognominata, Cæf.

VIII. *Lactuca crispa*.

*Lactuca crispa* & 3. Trag.

*Lactuca*, Tur. crispa, Matth. Dod. Lugd. Cæf.

*Lactuca sativa* crispa, Fuch.

*Lactuca crispa* non capitata, Ad. Lob.

*Lactuca crispa* 1. & 2. Tab. Ger.

Folij latoribus & pauld angustioribus variat: hinc duæ apud Tab. & Ger. icones. Habetur alba & rubra: hæc verd durior est.

IX. *Lactuca crispa* altera.

*Lactuca Intybaea* crispa, Tab.

*Lactuca Sabaudica* crispa, Ger.

X. *Paravas herba refrigerans*: par. 4. Ind. or. 8.

*Lactuca sylvestris*.

I. *Lactuca sylvestris* costâ spinosâ.

*Lactuca sylvest.* Diosc. Theophr. & Plinij, quæ Thridacine Galeni videtur.

*Endivia*, Brunf. sylv. Lon. desc.

*Lactuca* syl. prior, Trag. *Endivia* vulg. & 2. Eid.

*Lactuca* sylv. Ang. Matth. Fuch. Tur. Dod. Lac.

Lon. Cast. Lugd. Thal. Cæf. Col.

*Lactuca agrestis*, Cord. in Diosc. & hist.

Seris domestica, altera *Lactucina* Dioscor. Ad.

*Chondrylla* prima forte Dioscor. quæ *Endivia* sylv. quibudam Ruellio.

Seris domestica, Lob.

*Lactuca* sylv. vera, Lugd. desc.

*Scarriola* & *Serriola*, Eric. Cord.

II. *Lactuca sylvestris* odore viroso.

*Endivia* major & 1. Trag. Lon. ico.

*Lactuca* sylv. verior & Thesion, Lugd. ico.

*Lactuca agrestis*, Cord. hist. ico. Lob. ico.

*Lactuca agrestis*, Scariolæ hortensis folio, *Lactuca* flore, Opij odore, Ad.

*Lactuca* sylv. Anglica, odore Opij similis, Cam.

III. *Lact.* montana purpureo cærulea major.

*Lactuca* sylv. purpureo flore, Ges. hort.

*Lactuca* sylvaria, in Cord. hist. cap. de Soncho.

*Sonchus* arborescens puniceo flore, Ges. hort.

*Lactuca* sylv. *apocynifolia*, Thal.

*Libanotis* Theophr. sterilis, Tab.

*Sonchus* 3. Eid. sub Erythimo sylv. Ger. ico.

*Sonchus* mont. purpur. *tripanictator*, Col.

IV. *Lactuca* mont. purpureo cærulea minor.

*Sonchus* 2. vel lævis purp. flore, Clus. pan.

*Sonch.* lævior Pannonia. 4. purp. flore, Eid. hist.

V. *Lactuca* sylvestris Peruana.

*Lactuca* sylv. pumila, Monardi & Lugd. quid?

VI. *Lactuci* folia renalis.

Herba ad renum morbos utilis Monardi, &

Lugd. quid?

## SONCHUS EJUSQUE SPECIES.

Σ ο γ γ ο Dioscoridi l. 2. c. 159. & Theophr. 6. hist. 4. ἀνὰ τὴν σελὴν χιόν, quod succum salubrem, qui stomachi rotones lenit & nutritibus lac auget, fundat, Latinis Cicerbita, *Lactucella*, *Lacteron*, quod caule dissecto, lac copiosum defluat.

Genera duo Diosc. alter sylvestrior, magisq; spinosior: alter, qui teneritate quadam mollescit: Theophrastus spinosior meminit. Plinio l. 1. c. 22. *Sonchus albus* & *niger*, *Lactuca* similes ambo, nisi spinosior essent.

I. *Sonchus asper* non laciniatus.

*Intybus* sylv. seu erratica acutis folijs, Trag.

*Sonchus asper* major, Cord. hist.

*Sonchus* tenerior aculeis asperior, aut horridiuscula, Lob. ob.

*Sonchus lævis* tenerior, Ad. Lob. ico.

*Sonchus asperior*, Lugd. 3. *asperior*, Dod.

*Sonchus alia* in *rueribus*, Cæfalp.

II. & III. *Sonch. asper laciniat. & non lacin.*

*Cicerbita asperior*, Eri. Cord.

*Sonchus spinosus*, Ang.

*Sonchus aspera*, Matth. Fuch. Tur. Lac. Gefn. hort. Lob. ico Cast. Lugd. *asper*, Lon. Tab. sub *lævi* habet, Ger.

*Sonchus sylvestrior aspera*, Dod. gal.

*Sonchus asper*, Eid. fol.

*Sonchus*, Cord. in Diofc. Cæf. cui & *Sonchus* alter *Dioscoridis*.

*Sonchus asper minor*, Cord. hist.

*Sonchus lævis tenerior latifolia*, Ad. Lob. ob.

*Sonchus lævis*: I. *trifolius*, Lugd.

*Andryala major*, Dalech. Lugd.

Folia habet *laciniola* *dentis leonis*, ubi solo *squalidiore* oritur: at si *lætior*, non *laciniata*, *Dipsaci* aut *Lactucæ*: & *fenum septemvne cubitorum* *proceritatem* aliquando *assequitur*.

IV. *Sonchus asper laciniatus Creticus*: qui 1. in *Prodomo*.

V. & VI. *Sonchus asper subrotundo folio*: est *major & minor*: qui 2. in *Prod.*

VII. *Sonchus asper arborescens*.

*Sonchus* 3. Cluf. Pan. vel 3. *lævis altissimus*, vel *Sonchus lævior Austriac.* 3. *altissimus* Eid. hist. *Sonchus arborescens*, Tab. & Ger.

*Sonchus lævis*.

I. *Sonchus lævis laciniatus latifolius*.

*Intybus sylv.* seu *Erratica tertia*, Trag.

*Sonchus lævis*, Matth. Gefn. hor. Dod. Cast. Lug.

*Sonchus lenis* seu *lævis*, Cord. hist.

*Sonchus non aspera*, Fuch. tener, Ang.

*Sonchus tenerior non aspera*, Dod. gal. &

*Lactuca leporina* Apuleij.

*Endivia sylv.* Lon. ico.

*Sonchus lævis vulgaris*, folijs *laciniatis dentis Leonis*, Lob.

*Sonchus lævis laciniatis folijs*, Lugd.

*Sonchus in collibus umbrosis*, Gefn.

*Andryala minor*, Dalech. Lugd.

*Sonchus lævis alter flore luteo*, & *tertius flore niveo*, Tab.

*Sonchus lævis flore albo*, & *alter fl. niveo*, Ger.

Flore est *luteo*, *rarius niveo*, vel *albo*.

II. *Sonchus lævis* in *plurimas & tenuissimas laciniatas* *divisus*: hic 3. in *Prod.*

III. *Sonchus lævis laciniatus muralis parvis floribus*,

*Scariola sylv.* *Lactucæ species* Galeno, Ang.

*Sonchi genus læve*, Gefn. hort. Eid. in ap.

an *Sonchus lævis alter*, Matth. Cast. Lugd.

*Sonchus alter folio profundis lacinijs sinuato hederaceo*, Lob.

*Sonchus* 4. *lævis alter*, Lugd.

*Sonchus lævior vulgaris*, Cluf. hist.

an *Lactuca montana*, Cæfalp.

*Sonchus sylvaticus* 4. Tab.

*Major & minor* *reperitur*.

I V. *Sonchus lævis minor pauciorib. lacinijs*.

*Sonchus lævis latifolius*, Tab. Ger.

Est *angustioribus folijs* in *incultis*: *latioribus* in *vinetis*.

V. *Sonchus lævis angustifolius*.

*Sonchus lævis Matthioli*, apud Lob. ico.

*Sonchi genus*, terra *crispa*, Gefn. hort.

*Terracrepulus* in *Hetruria*, Cæf.

*Crepis Dalechampi*, Lugd.

VI. *Sonch. angustif. maritim.* qui 4. in *Prod.*

*Sonchus montanum*.

I. *Sonchus lævis laciniatus cæruleus*, vel *Sonchus alpinus cæruleus*.

*Intybus πασιφύων* Hærcynica, Thal.

*Sonchus lævis flore cæruleo*, Cluf. pan. &

*Sonch. lævior Austriac. cæruleo flore*, Eid. hist.

*Sonchus cæruleus & Sonchocichoreum*, Cam.

in Matth.

*Sonchus cæruleo flore*, Eid. hort. (*quiduum generum dicit.*) & Ger.

*Sonchus lævis* 4. *flore cæruleo*, Tab.

*Floribus etiam albis* *Thalius* notavit.

II. *Sonchus lævis laciniat. lut. mont. major*.

*Sonchus Dendroides Dalechampi*, Lugd.

III. *Sonchus lævis laciniatus luteus minor*: qui 5. in *Prod.*

*Sonchus hirsutus five villosus*.

I. *Sonchus villosus luteus major*.

*Sonchus lanatus Dalechampi*, Lugd.

*Magnitudine variat*, *caule aliquando se- quicubitali, cubitali & pedali*.

I I. *Sonch. villos. lut. minor*: hic 6. est in *Prod.*

III. *Sonchus latifolius leviter hirsutus*.

*Cichoreum syl. alterum anapicis*, five *Cichoreum dulce*, Colum.

*Soncho affinis Lampfana vulgò. sed malè.*

I. *Soncho affinis Lampfana domestica*.

*Chrysolachnum Plinii*, Ruel.

*Lampfa-*

Lampsanam negant, Advers.  
 Lampfana, quibusdam Napium, Dod. gal.  
 Sonchis cognatum, Gesn. hort.  
 Cichorium vel Sonchi genus, Eid. col.  
 Lampfana, Ad. Lob. Dod. Lugd. Thal. Cam.  
 cui & Papillaris in Prussia.

Sonchus sylv. 1. Tab. & 3. Eid. ico.  
 Sonchus sylvaticus, Ger.  
 Folij aliquando prorsus integris, aliquando  
 in laciniis aliquot dissectis, Thalius notavit.  
 II. Soncho affinis Lampfana sylvatica.  
 Sonchus sylvaticus 2. Tab.

## INTYBUS SIVE ENDIVIA, CICHOREVMVE ejusque species.

**S**oncho subjungit Dioscorides, l. 2. c. 260. *Σίφων*, cujus verba sic interpretamur: Seris duum generum, quorum sylvestru Picris, & Cichorium vocatur: qua verò ex hac latioribus est solijs stomacho commodior est hortenfi: Et hujus etiam duæ species sunt, quarum hac lactuca similior & latifolia: altera verò angustior est folio & amara. Intubi meminit Theoph. 7. hist. 7. inter olera numerando, & universa genera Intyborum amara dixit. 2. c. 1. plant. 7. Cichorea quoque mentio 7. hist. 9. anti & Intybi erratici 1. hist. 15. Plinio, l. 20. c. 8. Intubum erraticum Ambugiam appellavere: in Aegypto Cichoriam vocant, quod syl. sit, sativum autem Serin, quod est minus & venosius. Et syl. genm alij Hedynoida vocant, latioris solij. Seru & ipsa Lactuca similis duorum generum est: sylvestru melior, nigra ista & æstiva s deterior hyberna & candidior.

I. Intybus sativa latif. sive Endivia vulgaris.  
 Seris domestica latifolia, Dioscoridi.  
 Intubum & Seris hyberna, Plinio.  
 Scariola Arabum interpretibus.  
 Cichorea sativa, Trag.  
 Intubus, Tur. major, Matth.  
 Intubum sativum latif. Fuch. Dod. gal. Lob. Lug.  
 Intybum sativum, Cord. in Diosc. Dod. Ger.  
 Intybum latifol. Italicum, Gesn. hort.  
 Cichorium sativum, Eid.  
 Intybus hortensis, Læc.  
 Seris hortensis altera, Ang.  
 Intybus sativa major, Cast.  
 Seris (sive Endivia alba) Gesn. hort. Lob. ico.  
 Seris sive Intybum sativum latifolium, Ad.  
 Endivia, Gef. hor. cui & Hypochæris Theoph.  
 hortensis, Cam.

Intyb. major sativa, sive Cichor. domestic. Tab.  
 Florib. est cæruleis, raro cædis, ut & minor.

II. Intybus sativa angustifolia.  
 Intubus sive Endivia minor, Matth.  
 Intybum sativum angustifol. Fuch. Dod. gal.  
 Lugd. qui & Dod. & Matth. figuram habet.  
 Intybus hortensis alter, Lac.  
 Intybum angustif. Scariola aliquibus, Gesn. hor.  
 Cichorium sativum, Cord. h. st.  
 Cichorium angustifolium, Lon.  
 Seriola, aut Endiviola, Ad.  
 Intybus minor 1. & Intyb. minus album, Tab.  
 Serium, Cichorium sativum minus, Eid. ico.  
 Intybum syl. & Intyb. syl. latifolium, Ger. ico.  
 Intybus sativa minor, Cast.  
 an Cichorium R. manum Cæsalp. cui Apate  
 Theoph. quia semina nigra habet.

III. Intybus crispa: Matth. Tab.  
 Seris sive Intybus crispa, Ad.  
 Intybum crispum, Lugd.  
 Endivia crispa, Ger. Romana crispa, Cam.  
**CICHORIUM.**

I. Cichorium sativum.  
 Seris sylv. quæ colitur & sativa dicitur, Ang.  
 Seris, Lob.  
 Cichorium domesticum, Matth. Cast.  
 Cichorium hedynois, Lac.  
 Cichorium sativum cæruleum, Ad. Lob. ico.  
 Cichorium latioris solij, Dod.  
 Cichorium sativum latifolium, Lon.  
 Intubum syl. latifolium, Lugd.  
 Cichorium sativum duplici figura & album  
 sativum, tres fig. apud Tab. & Ger. sub sativo,  
 sativo latifolio, & sylv.

II. Cichorium sylv. sive Officinarum.  
 Seris *nigra* Dioscoridi: cichorea Theoph. *nigra*  
 Amarugo Gaza vertente, Theoph.  
 Intubum erraticum, Plinio.  
 Solsequium, Brunf.  
 Cichorea, Trag. sylvestris, Matth.  
 Seris sylv. Ang. Lob. Seris picris, Lob. ico.  
 Seris sylv. picris, Cichorium, Ad.  
 Cichorium syl. Gef. col. Dod. Castagreste, Lon.  
 Intybum agreste, Er. Cord. Gesn. hor. sylv. Fuch.  
 Dod. gal. (cui & Ambubeja) Cord. Diosc. Thal.  
 Intubum sylv. angustifol. Marthioli, Lugd.  
 Hypochæris Dalechampi, Lugd.  
 Cichorium, Lac. Cord. hist. Cæst. Tab.  
 Hieracium latifolium, Ger. ico.  
 Duplex est, alterum folio prors. integro, un-  
 Q 3 ciarum

ciarum duarum quandoq; latitudine: alterum, in lacinias diviso, Thal. At hujus floris color communiter cæruleus, est & candido & roseo: aliquando caulis latitudinem digitorum quatuor acquirit.

III. Cichorium spinosum, quod in Matthiolo, Tabernæmontano emaculato, & in Prodomo, addita figura deferipimus.

Cichorium spinosum Creticum Belli, Ponæ.

Cichorium spinosum, vulgè *γῆραςπιπλίσ*, h.e. Hydriæ spina, Belli in ep. 4. ad Cluf. (hist.

Chondrillæ genus elegans cæruleo flore, Cluf.

*Cichorium syl. luteum,*

I. Cichorium pratense luteum hirsutæ asperum, vel Hieracium hirsutum folijs caulem ambientibus.

Cichorea 3. sive lutea, Trag.

Hieracium prat. asperum, Gefn. col.

Cichorium luteum, Tab. Ger.

Intybus syl. seu Cichorium syl. fl. luteo, Thal.

Lactariola altera, Cæf.

Variat: nam aliud folijs est integris, aliud divisis: illud, quadruplex est: 1. caule & folijs spinulis horret: 2. folia infernè aspera, supernè glabra in ambitu exasperata: 3. folijs angustioribus asperis: 4. caule brachiato folijs palmatis, in ambitu profunde, ut Dentis leonis, divisis: ut Thal. monet. flore albo notavit, Tab. & Cichorium luteum 2. facit.

II. Cichorium prat. hirsutum vesicarium. Cichorium syl. vesicarium pratense, Colum.

III. Cichorium montanum angustifolium hirsutæ asperum.

Hieracium intybaceum asperum, vel 9. Tab.

Hieracium asperum, Ger.

IV. Cichorium prat. luteum lævius. Hedypnois Plinij, Dod. gal. Ad. cui & Cichorium luteum, Lob. cui & Aphaca, Theoph.

Dentis leonis 3. species, Dod. Tab.

Aphace Dalechampiij, Lugd.

Endivia syl. Cæf.

Dens leonis cichorizata, Ger.

*Dens Leonis.*

I. Dens Leonis latiore folio.

Aphaca exolerū genere, Theoph. 7. hist. 7. & 10. Aphace, Plin. lib. 21. cap. 15. & 17. & Hedypnois, Plin. lib. 28. cap. 8.

Dens leonis, Brunf. Matth. Dod. Lob. (& corona & caput Monachi) Tab. Ger.

Hieracium maj. Trag. parvum, Cord. in Diosc.

Hieracium minus, Gefn. hort.

Hedypnois major, Fuch.

Chondrilla Galeni, Ang. quibus, Taraxacon.

Chondrilla altera & rostrum porcinum, Dod. gal. Thal.

Dens leonis vulgi, sive Urinaria, Ad.

Taraxacon minus, Lon.

Aphaca, Cæfalp.

Hedypnois Dalechampiij, Lugd.

Habetur & major & media quæ vulgarior est: folio acutiore, aliquando obtuso.

II. Dens leonis angustiore folio.

Aphaca angustioris folij, Cæf.

III. Dens leonis aphodeli bulbulis.

Cichorium Constantinopolitanum, Matthioli.

Cast. Lugd. sicā Matthiolo appellatum, Colum.

Dens leonis Monspelienis, Ad. Lob. ob.

Chondrilla altera Dioscoridis, Lob.

Dens leonis altera, Tab.

IV. Dens leonis latifolium caulescens, qui 1. est in Prod.

V. Dens leonis tenuissimo folio: qui 2. in

Hieracium foetidum 3. Colum. (Prod.

VI. Dens leonis minor folijs radiatis: 3. in

an Trinciarella, Cam. (Prod.

VII. Dens leonis minus aspero folio: hic

4. in Prod.

VIII. Dens leonis minimus.

Cichorium syl. pumilum sive Hedypnois, Cluf.

cur. post.

## HIERACIUM EJVSQVE SPECIES.

**I** Epithetum Dioscoridi, l. 3. c. 72. Latinū Accipitrina, ab accipitre, qui signat, nomen habet. (Hieracia ab alijs Plinio) quoniam accipitres scalpendo eam succoq; oculos ringendo, obscuritatem cum sensere discutiant, Plin. l. 20. c. 7. ubi inter Laticam sylvaticam refert, & cum ea confundit: dicitur & *Ερῃφύρα*.

Genera: magni & parvi Diosc. meminit: recentioribus plures sunt differentia.

*Hieracium dentis leonis folio acuto.*

I. Hieracium majus folio Sonchi, vel Hieracium Sonchites.

Intybus syl. 2. acutis folijs, Trag.

Hieracium majus, Matth. Fuch. Dod. gal. Lac.

Tur. (sub Hippoglossi figura) Ad. Lob. Cast.

Thal.

Hieracium latifolium majus, Cam.

Taraxa-



Taraxacon majus, Lon.

Hieracium minus Dalechampi, Lugd.

an Hieracium magnum, Cæs.

Aliquando folio asperiore inter segetes reperitur: communiter erectum: nonnunquam reclinatum.

II. Hierac. majus folio Sonchi angustiore.

Hieracium alterum, Dod.

III. Hieracium majus folijs Sonchi semine curvo.

Hieracium majus Creticum sativum, Ges. hor.

Hierac. Cretic. pro Endivia lutea missum, Cam.

IV. Hieracium majus erectum latifolium caule aspero.

V. Hieracium majus erectum angustifolium caule aspero.

Hæc ut & priori, aliquando prima folia obtusa sunt.

VI. Hieracium majus erectum angustifolium caule lævi.

Hieracium majus Dioscor. Tab. Ger.

VII. Hieracium dentis leonis folio, flore suaverubente.

Hieracium Apulum, suaverubente flore, Colum.

VIII. Hieracium dentis leonis folio monoclono subasperum.

Hieracium intybaceum, vel 6. Tab.

Variat: culmo unico nudo ex radice: rarissime culmo bipedali ramoso, subaspero, cujusmodi in Italia reperitur.

IX. Hieracium dentis leonis folio monoclono glabrum.

X. Hieracium minus glabrum, folijs elegantius virentibus: hoc æst. in Prod.

XI. Hieracium asperum flore magno dentis leonis.

Hieracium folijs & floribus dentis leonis bulbosi, Lob. ico.

Viperea vel Scorzonera Italica, Cast. ico.

XII. Hieracium dentis leonis folio hirsutie asperum minus laciniatum.

Hieracium alterum saxat. montan. Colum.

XIII. Hieracium dentis leonis folio hirsutie asperum magis laciniatum: quod in Prod. 1. est.

XIV. Hieracium hirsutum ferè umbellatum, Hieracium nonum, Clus. hist.

*Hieracium dentis leonis folio obtuso.*

I. Hieracium dentis leon. folio obtuso majus.

Hieracium minus primum, Dod. gal.

Hieracium longius radiculatum, Ad. Lob. Ger.

Hieracium 3. Dod.

Hieracium macrorrhizon, Tab.

Apargia Dalechampi, Lugd. quoad descript.

II. Hieracium dentis leonis folio obtuso minus, flore magno: hoc 3. in Prod.

III. Hieracium dentis leonis folio floribus parvis: quod 4. in Prod.

IV. Hieracium dentis leonis folio bulbosum: hoc 5. est in Prod.

V. Hieracium minus dentis leonis folio subaspero.

Hypocharis. Porcellia, Tab. Ger.

Hieracium pumilum 4. Colum.

VI. Hieracium minus dentis leonis folio oblongo glabro.

Hyoferis altera vel angustifolia, Tab.

VII. Hieracium minus flore ex albo carneæ.

Hieracium parvum Creticum, Clus. hist. ap. 1.

VIII. Hieracium minus folio subrotundo. Hieracium minimum vel 8. Clus. pan. in hist. 9. ico. at descriptio 11.

Hyoferis latifolia vel mascula, Tab.

Hyoferis mascula, Ger.

Variat ratione loci: nam in siccioribus natum minus est, quemadmodum Clusius pingit: at locis lætioribus, pluribus est caulibus palmaribus.

an Hieracium minus Hyoseridis latifoliæ facie, Eyst. Sed hoc semen papposum fert.

IX. Hieracium Bæticum, Clus. in cur. post.

*Hieracium Chondrilla folio.*

I. Hieracium maximum Chondrillæ folio asperum: quod 7. est in Prod.

II. Hieracium Chondrillæ folio hirsutum.

Hieracium folijs & facie Chondrillæ, Lob. ico. Camer.

Hieracium 11. Tab.

Variat: in German. hirsutius & majus, Monspelli minus & lævius: at utrobique folijs laciniatis: in Italia & minus & lævius, & folijs solum dentatis, provenit.

III. Hieracium Chondrillæ folio glabrum.

Hieracium 5. sive aphacoides, Tab. Ger.

IV. Hieracium Chondrillæ folio glabro radice succisâ, majus.

Hieracium minus, Trag. Ang. Matth. Fuch. Lac.

Ges. Cast. Tab. minus alterum, Dod. gal.

Succisa tertia, Trag. hirsuta folia tribuit.

Hieracium minus præmorsâ radice, Ad. Lob.

Hieracium 4. Dodon.

Sonchus,

Sonchus, Lon.

Picris Dalechampij, Lugd.

Hieracium leporinum, Ger.

Variat foliorum incisuris profundioribus, & hoc Hieracium nigrum, Tabern. & Ger. (quod Hieracium folijs Coronopi dici posset) nominant: vel minus profundis.

V. Hieracium Chondrillæ folio glabro radice succisâ, minus.

Lagopus 3. vel Lactuca leporina, Trag.

Lactuca leporina Apuleij, Ang.

Hieracium quintum, Dod.

Apargia Dalechampij, Lugd.

At si quis 4. & 5. solum magnitudine, foliorum latitudine, & angustia differre velit, facile assentiar.

*Hieracium Intybaceo folio.*

I. Hieracium intybaceum flore luteo: hoc 10. in Prodr.

II. Hieracium intybaceum flore magno albedo: hoc 11. est in Prod.

III. Hieracium intybaceum flore ex purpura rubentibus.

Hieracium intybaccum 10. Clus. hist.

*Hieracium Cichoraceo folio semine adunco.*

I. Hieracium capitulum inclinans semine adunco.

Hieracium facie hedypnois, Lob. ico.

Rhagadiolus, Cæs.

Magnitudine & parvitate, folijs magis minusve sinuosis, ad agros Monspelienfes variat: & in hortum translatum asperitatem penè amittit.

II. Hieracium siliqua falcata.

Hieracium Narbonense falcata siliqua, Lobel. Lugdun.

Rhagadiolus alter, Cæs.

Hieracium Monspeliac. & Narbonense, Tab.

Hieracium falcatum, Ger.

Quod Monspelij crescit, folijs est latioribus: quod Patavi, angustioribus, à quibus Sonchus stellatus, Chondrilla stellata, & Cichorium stellatum nominatur.

III. Hieracium proliferum falcatum: quod 12. in Prod.

Hieracium calyce barbato, Colum.

IV. Hieracium minimum facultatum: quod 13. in Prodr.

*Hieracium montanum hirsutum.*

I. Hieracium echinoides capitulis Cardui benedicti.

Hieracium montanum folio Cycopsis, Ad. Buglossum echinoides luteum Hieracio cognatum, Lob. ico.

Buglossum luteum, Cam. Ger.

Hieracium echinoides, Tab.

II. Hieracium mont. rapifolium: quod 14. in Prod.

III. Hieracium alpin. asperum conyzæ facie. Hieracium Britann. vel 4. Clus. pan. & hist.

IV. Hieracium mont. dentis leonis folio incano, vel laciniatum lanuginoso folio.

Hieracium mon. laciniato folio, vel 7. Clus. pan.

Hieracium 8. folio hedypnoidis, Eid. hist.

Hierac. mont. angustif. folijs Cichoraceis, Tab.

Hieracium 7. Clusij, Ger.

V. Hieracium alpinum folijs dentatis flore magno: quod 15. in Prod.

VI. Hieracium alpinum latifolium hirsutius incanum flore magno.

Hieracium 1. latifolium, Clus. pan. & hist. Ger.

Hieracium phlomoides, Tab.

Hieracium latifolium Pannonicum, Cam.

an Pilosella major Gallorum, Thal.

an Costa, Cam.

Folio est interdum sinuoso, interdum laciniato: maculis aliquando lividis insignitis, plerumq; carentibus.

VII. Hieracium alpinum latifolium villosum magno flore.

Hieracium alpin. hirsuto folio, vel 5. Clus. pan.

Hieracium 5. villosum, Eid. hist.

Hieracium latifolium montanum, Tab.

Hieracium 5. Pan. Cam. 5. Clusij, Ger.

VIII. Hieracium ramosum magno flore: quod 16. in Prodr.

IX. Hieracium montanum hirsutum ramosum parvis floribus.

X. Hieracium alpinum non laciniatum flore fusco: quod 17. in Prod.

Hieracium Germanicum 1. Colum.

XI. Hieracium hortense floribus atropurpureiscentibus: quod 18. in Prod.

Hieracium latifolium peregrinum phlomydes, Eyß.

Pilosella major quibusdam.

XII. Hieracium pumilum saxatile asperum radice præmorsa: quod 19. in Prod.

an Hier.

XIV. Hieracium mont. lanuginosum laciniatum parvo flore: quod 20. in Prod.

XV. Hieracium alpinum pumilum folio lanuginoso.

Hieracium pumilum 2. Colum.

XVI. Hieracium montanum angustifol. nonnihil incanum.

Hieracium mont. vel 6. Clus. pan. & hist. Cam.

Hieracium montanum angustifol. 2. Tab.

Hieracium 6. Clusij, Ger.

Variat folijs magis minusve incanis, ijsque integris vel minimis laciniatis. est & tertia folijs integris, atrovirentib. minimeq; incanis.

*Hieracium montanum glabrum.*

I. Hieracium mont. latifol. glabrum majus. Hieracium montanum majus latifolium, Tab. sub Chondrilla Hispanica, Ger. ico.

II. Hieracium montanum latifolium glabrum minus.

Hieracium montan. latifol. minus, Tab. Ger.

III. Hieracium alpinum pumilum chondrillæ folio: quod sub 7. in Prod.

IV. Hieracium Tragopogonis folio. Scorfonera 4. Clus. pan.

Hieracium 7. vel pumile, Eid. hist.

V. Hieracium capillaceo folio: quod 21. in Prodr.

*Hieracium Murorum, Pulmonaria Gallica dicta.*

I. Hieracium murorum folio pilosissimo. Alfine seu Auricula muris major, Trag. Pulmonaria Gallica, Scopa regia fortè Plinij, Gesn. hort.

Sideritis Plinij latissimo folio, Eid.

Pulmonaria Gallor. flore Hieracij, Ad. Lob.

Clus. hist. Lugd. cum figura Carthon.

Pulmonaria Gallica sive aurea, Tab.

Corchorus Dalechampiij, Lugd.

Lactariola, Cæsalp.

Variant in pictura; Tragus, Lugd. & Tab. folijs subrotundis & pilosis: at Lobelius, glabris & oblongis pingit: sic folia quandoque parte infera rubent: aliquando albis maculis aspersa, conspiciuntur.

II. Hieracium murorum laciniatum minus pilosum.

Pulmonaria Gallica fœmina, Tab.

Lobelij cura melius huic, quam præcedenti convenit.

Hoc folio est modò latiore, modò angustiore, & hæc

Pulmonaria Gallica tenuifolia, Tab. dicitur.

III. Hieracium murorum angustifolium non sinuatum: quod 22. in Prod.

*Hieracium pratense*

I. Hieracium profunde sinuatum pubescens: quod 21. in Prod.

II. Hieracium pratense latifolium non sinuatum majus.

Intybus *ἀπὸ δένδρου* major, Thal.

III. Hieracium prat. latifol. non sinuatum minus.

Intybus *ἀπὸ δένδρου* minor, Thallio.

*Hieracium fruticosum.*

I. Hieracium fruticosum latifolium folijs dentatis glabrum: quod 22. in Prod.

Hieracium majus latifol. vel 2. Clus. pan. & hist. Intubi 6. species, Thal.

Hoc etiam caule graciliore & folijs angustioribus, in reliquis conveniens, reperitur.

II. Hieracium fruticosum latifol. hirsutum. Erinus, Matth.

Basilicum aquaticum, Cast.

Hieracium frutescens latifol. polyanthos, Eytt.

Variat: 1. folijs uncias quinq; longis, selsquinciam latis, subrotundis, dentatis & asperis, quemadmodum Patavij provenit, & à Guilandino, Militaris Galeni & Lactaris Plinij, dicebatur, 2. folijs est multò longioribus, angustioribus, parum dentatis, molli lanugine pubescentibus, quod apud nos reperitur, licet rarius.

III. Hieracium fruticosum subrotundo folio: quod 25. in Prod.

Hieracij foliati nomine D. Jungerm. mist.

IV. Hieracium fruticosum angustif. majus:

Hieracium Sabaudum, Ad. Lob. Lugd.

Hieracium alterum grandius, Lob. ico. Cam.

Hieracium primum, Dod.

Hieracium majus angustifol. vel 1. Clus. pan.

Hieracij 3. generis alterum angustif. Eid. hist. ico.

Intubi 7. species Thal.

Hieracium montanum angustifolium 1. Tab.

Hieracium intybaceum, Ger. ico.

Caule est aliquando magis, aliquando minus, aspero, folijs magis minusve crenatis, longioribus & angustioribus, brevioribus, & latioribus.

V. Hieracium fruticosum minus: quod 26. in Prodr.

## CHONDRILLA ET EJUS SPECIES.

**X** *Chondrilla* 4 *μηρία* Diosc. l. 2. c. 161. dicitur: & propter formam, quibudam *Seridu* agreste *Spicata*. Anserie apud Theoph. 7. hist. 9. & 11. *Α'νάρη*, *Fraus* Cæzæ.

Genera duo *Dioscoridi*: Plinius, l. 6. c. 22. unus meminit.

*Chondrilla lutea*.

I. *Chondrilla juncea viscosa arvensis*: quæ prima *Dioscoridis*.

*Cichorea procera* vel 5. *Trag.*

*Chondrilla*, *Tur. altera*, *Cord. in Diosc.*

*Chondrilla viminea viscosa vinearum*. *Ad. Lob. ico. Lugd.*

*Cichoreum syl. luteum*, *Dod.*

*Chondrilla species in collibus & vineis*, *Cæf.*

*Chondrilla viminalibus virgis*, *Cluf. hist.*

an *Chondrilla Bellonio*.

*Chondrilla juncea*, *Tab. Ger.*

*Chondrilla prima Dioscoridis*, *Colum.*

II. *Chondrilla viminea viscosa Monspeliæ*: quæ 1. in *Prod.*

III. *Chondrilla viscosa caule foliis obdueto*.

*Chond. saxatilis viscosa caule* *neupolopis*, *Col.*

IV. *Chondrilla viscosa humilis*: quæ 2. in

V. *Chondrilla viscosæ affinis*. (*Prod.*

*Ixopus*, *Cord. hist.*

*Seris longifolia Mutoni*, an *Chondrilla altera* *Dioscor.* *Lob. ob. quid est?*

VI. *Chondrilla bulbosa sive Chondrilla 2.*

an *nepturus*, *Theoph. 1. hist. 11.* (*Diosc.*

*Chondrilla pusilla marina lutea bulbosa*, *Ad.*

*Lob. ico.*

*Cichorium bulbosum Dalechampij*, *Lugd.*

*Cichorium strumosum Myconi*, *Lugd.*

*Herba terræ crepolaë similis*. *Cæf.*

an *Chondrilla 2. species*, cui *florem purpureum* tribuit, *Ang.*

*Chondrilla altera Diosc. putata*, *Cluf. hist.*

*Chondrilla altera Diosc. Cluf. hist. Columb.*

*Chondrilla marina*, *Tab. Ger.*

VII. *Chondrilla bulbosa major & ramosa*.

*Chondrilla secunda*, *Cæfalp.*

*Hæmorrhoidalis*, *Cast.*

VIII. *Chond. bulbosa Syriaca foliis latiorib.*

*Chond. alterius aliud genus*, *Rauv. v. Cluf. hist.*

*Chondrilla aliud genus*, *Diosc. Lugd.*

IX. *Chondrilla bulbosa*, *Cyriaca foliis angustioribus*.

*Chondr. Diosc. altera*, *Rauv. Lugd. Cluf. hist.*

X. *Chondr. verrucaria fol. cichori viridibus*.

*Cichorium verrucarium*, *Matth. Cast. Cluf. hist.*

*Zacintha Matth. ico. Cast. Lugd.*

*Verruca Chondrilla*, *Ad.*

*Verrucaria*, *Seridis species*, *Ges. hort.*

*Chondrilla species in ruderibus*, *Cæf.*

XI. *Chondrilla foliis Cichorei tomentosis*.

*Chondrilla prior*, *Diosc. legitima*, *Cluf. hist.*

*Chondrilla verrucaria*, *Lob. Lugd.* (*h. h.*

*Chondrilla prior*, *Dod. Cluf. Lugd.*

*Hieracium magnum Dalechampij*, *Lugd.*

*Chondrilla græca*, *Tab.*

XII. *Chondrilla tota hirsuta*, *Cam. quæ 3.*

XIII. *Chondrilla prior Matthioli*, *Cast. &*

*Chondrilla altera*, *Lac.* (*Lugd.*

*Figmentum ex Cichorio*, aliqui existimant.

*Chondrilla cærulea & purpurea*.

I. *Chondrilla cærulea latifolia lacinia 2.*

*Chondrilla altera*, *Matth. Cast. prima*, *Lac.*

*Chondrilla prima Cichorio similis*, *Cord. 1.*

*Chondrilla tenera*, *Eid. hist.* (*Diosc.*

*Chondrilla latifolia cærulea*, *Tab. Ger.*

*Chondrilla purpurascens flore*, *Lugd. ico.*

II. *Chondrilla cærulea altera*, *Cichori* (*sy. f.*

*Chondrilla cærulea Belgarum*, *Ad. Lob.*

*Chondrilla*, *Dod. gal. altera*, *Eidem.*

*Apate Dalech: Lugd.*

*Chondrilla cærulea & alba*, *Tab.*

*Chond. cærul. & lutea*, *Ger.*

*Chond. cæruleo flore*, *Caccia lepore Italici*, *Cam.*

*Chondrilla*, *Cæf. & prima*, *Ang.*

*Flore est cæruleo*, rarius albo.

III. *Chondrilla foliis lacinia ferratis* *2.*

*purpurea flore*.

sub *Superba recetiorum* anonymos habent. *Ad.*

*Chondrilla rara purpurante flore semine* *1.*

*do deciduo*, *Lob.*

*Chondrilla rara purpurea Lobeli*, *Lugd.*

*Chondrilla Hispanica Narbonensis*, *Tab.*

*Senetio Carduus Apulus*, *Colum.*

In hortis latioribus est foliis, ut *Tab. p. 11.*

*Columnæ optima est*, prout sponte provenit.

IV. *Chondr. purpureo flore*, radice *2.* *ca.*

ceis congener, *Cam. quid?*

V. *Chondrilla purpurascens foetida*.

*Chondrilla rubra foetida*, *Eyst.*

In *Phytopinace* & in *Prod. pro 3. descripta*.

VI. *Chondrilla cærulea cyani capitulo*.

*Sesamoides parvum*, *Matth. Cast. Cam. Tab.*

*Ger. minus Matthioli*, *Lugd.*

*Chondrilla*

Coronepus quidam flore cæruleo, Gefn. col.  
Sesamoides parva Diosc. Ad. Lob.  
Chondrilla species tertia, Dod.  
Catanance quorundam, Lugd.

Cyanus forsitan Paimij, Colum.

VII. Chond. cærulea cyani capitulis altera.  
Sesam. parvū fl. magis completo, Cam. ad Mart.  
Chond. Sesam. dicta cærulea fl. completo, Eyf.

### SENETIO EJVSQVE SPECIES.

**S**enecio *ἔριγον* Dioscoridi, l. 4. c. 97. quasi Vernus senex quoddam flores Vere capillorum ritu canescant, & in lanuginem abeant. Theoph. 7. hist. 7. inter olera & iutubacea numerat. quod per totum annum penè assidue germinet florum productione, hist. 10. semper enim alterum alteri succedens, tempora omnia occupat, idq. propter alimentum quandam mediocritatem, ut loquitur i. caus. plant. 27. Plinio, l. 25. c. 13. Eriogon, quod a nostro vocatur Senecio. At nullas differentias, Theoph. & Diosc. proponunt. Plinio vero monente quidam & alterum genus fecere, non quale esset demonstrare.

I. Senecio minor vulgaris.  
Eriogon, Dioscoridi ac Plinij.  
Verbena femina, Brunf. qui in postrema editione se errasse fateor.  
Senecio vulgaris & i. & Herbulum Trag.  
Senecio minus Match. Fuch. Tur. Cord. in Diosc.  
Ang. Gefn. liort. Lac. Lon. Ad. Lob. Lugd. Cæf.  
cui & Carduncellus. Senecio minor, Cast.  
Eriogon secundum, Dod. gal. minus, Eid.  
Senecio i. Tab. sub Eriogono tomentoso, Ger. ico.  
Eriogon seu Senecio vulgaris, Thal.  
II. Senecio minor latiore folio sive montana.  
Senecio in montibus, Cæf.  
Senecio 2. vel montana, Tab.  
Eriogon, Ger.

Eriogon primum, Dod. gal. majus, Eid.  
Senecio feridus, Gefn. hort. Lugd.  
Eriogon tomentosum alterum, Lob.  
Eriogon feridum seu majus, Thal.  
Jacobæa i. vel Pannonica mollior, Clus. pan.  
Jacobæa Pannonica i. Eid. hist.  
IV. Senecio hirsutus.  
Senecio 2. Trag. Aphaca, Theoph.  
Eriogon tertium, Aphaca, Theoph. Thal. Dod.  
Eriogon tomentosum & Senecio incana, Lob.  
Senecionis species Dodonæi, Lugd.  
Senecio tomentosa 3. Tab.  
V. Senecio ambrosiæ odore.  
Senecio flore odorato, Cam.  
VI. Senecio folio non laciniato.  
Senecionis genus Myconi, Lugd.

III. Senecio incanus pinguis.

### JACOBÆA ET EJVS SPECIES.

I. Jacobæa vulgaris laciniata. (Lon.  
Flos S. Jacobi, Brunf. Trag. & Senecio major,  
Senecio major sive flos S. Jacobi, Matth. Cast.  
Lugd. qui & Fuch. & Matth. figuram habet.  
Herba S. Jacobi, Fuch. Cæf.  
D. Jacobi herba vel flos, Gefn. col.  
Jacobæa, Dod. Ger. vulgaris, Clus. hist.  
Jacobæa Senecio, Ad. Lob.  
Herba Jacobæa, Tab.  
Artemisia *ωελάνθη* Dodonæi, Thal.

Achavon abiat, id est, Artemisia alba, Alpin.

IV. Jacobæa incana altera.

Jacobæa marina, Dod. gal. Lugd.

Jacobæa altera, Dod.

Cineraria marina, Eyf.

Eandem cum præcedenti dicerem, nisi Dodonæus edit. lar. à Cineraria distingueret: & in Eyf. horro, à Cineraria Lobelij alia dicitur.

V. Jacobæa marit. sive Cineraria latifolia.

In Phytopinace, & sub i. in Prod. descripra.

VI. Jacobæa alpina laciniata fl. buphthalmi.  
Jacobæa 3. Clus. pan. & Jacobæa Pannon. 3. latifolia i. Eid. hist. (ratis.)

VII. Jacobæa alpina folijs subrotundis serconyæ alpina genus, Gefn. hort. & fra&.

Conyza montana, Gefn. col.

Jacobæa latifolia altera, Clus. pan.

Jacobæa 4. vel latifolia 2. Eid. hist.

VIII. Jacobæa mont. lanuginosa angust. non

Jacobæa Pannonica 2. Cl. pan. & hist. (laciniata)

IX. Jacobæa rotundif. incana: quæ 2. in Prod.

Variat folijs: alterius sunt instar Erucae laciniata: alter. ad Raphani fol. accedunt, sed minus hirsuta: retr. querc. tenuifol. instar divisa sunt. Senecio major, Cam.

II. Jacobæa subrotundo min. laciniato folio. Verbasculum minimum, Lugd.

III. Jacobæa maritima.

Jacobæa marina, vel Chrysanthemum, & Artemisia marina neotericorum, Ad. Lob. ico.

Cineraria 2, Dod. Lug. Cæf. (cui Artemisia Diosc.)

Jacobæa maritima Penæ, Lugd. (Cam.)

Eriogon, Eid.

# CASPARI BAVHNI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER QVARTVS.

## SECTIO PRIMA.

TANACETUM; PARTHENIUM; CHRYSANTHEMUM,  
BUPHTHALMUM; CHAMÆMELUM; COTULA.

### TANACETUM EJUSQUE SPECIES.

**T**anacetum, foris à Tannaco quo nomine Parthenium appellatum fuisse, Plin. l. 21. c. 30 restatur. Pathe-  
non microphyllon foris à Hippocrato, Hermolao. & Dioscoridis l. 3. c. 128. quibus non  
videtur, nobis non item.

Tanacetum odoratum.

I. Tanacetum vulgare luteum.

Tanacet. Matricariae z. species & Parthenium,

Tanacetum vulgare, Trag. Eyst. (Brunf.

Tanacet. Matth. Gef. hor. Lon. Dod. Cæf. Ger.

Tanacetum citrin. Thal. maj. Dod. gal. (fol.

Artemisia tenuif. Fuch. in ic. monoclonos, Fuch.

Ambrosia Amato: recentiorum, Cord. in Diof.

Athanasia vulgaris, Lac.

Tanacetum millefolij folijs, floribus Abrotani

feminae, aur Agerati, Ad. Lob.

Athanasia seu Tanacetum, Lugd. Cast.

Artemisia Dioscoridis, Tab.

Flore est luteo, rarius albo, & dicitur

Artemisia flore albo, Taber.

II. Tanacetum folijs crispis.

Tanacetum argutioribus simbrisis, Ad.

Tanacet. specios. cristat. Anglic. Lob. Lug. Eyst

Tanacetum crispum, Dod. crispum & Angli-

tum, Cam. in Matth & hort Ger.

Artemisia sativa Anglica, Tab.

III. Tanacetum minus album odore cam-

phorae, five Achillae, Diof.

Millefolium nobile & stratiotes vera, Trag.

### TANACETUM AFRICANUM.

**P**lantam hanc aliqui Orthonnam Diof. l. 2. c. 213. & Plin. l. 27. c. 12. alij majorem quidem Orthonnam, mi-  
norem vero Argemonem Diof. l. 2. c. 208. & Argemoniam, l. 25. c. 9. alij Lycopersicum Galeni: alij Caltham  
Plin. l. 25. c. 6. quam gravem odori dicit: alij Petilium florem Plin. l. 21. c. 8. suspicantur: alij ad Chrysanthemum  
vulgo referunt, ut Matth. Afric. vel Tunet. annu flos dicitur. eò quòd primum hic flos in German. fuerit illat. si quan-  
do Carol. V. Imp. ad Tunetum victoria potius est; cum in Africa sponte proveniat. Tanacetum appellare lubet.

I. Tanacet. five flos African. major flore pleno.

an Othonna Dioscoridis & Plinij.

Caryophyllus Indicus major, Matth. Lugd.

Flos Africanus major, Dod. gal. multiplex, Eid.

Rosa Indica magna, Gef. hort.

Flos & Caryoph. Indic. & Pedua Punica lingua.

Achil. Mat. Lac. Cord. in Diof. & hist. Thal. Ca.

Millefolium stratiotes, & Stratiotes, Gef. hor.

Achillea five millefolium nobile, Tab. Ger.

Tanacet. minus, Dod. candidis florib. Lob. Lug.

Achillea sideritis, Lugd.

Scopa regia Plinij, Dalech. in Plin.

Floribus candidis, purpureis & auium æmu-  
lantibus, Matthiolo.

IV. Tanacetum alpinum odoratum.

Iva moschata Rhætis, Tanaceto cognata he-  
bula, Gef. hort.

Tanacetum parvum alpinum, Lugd.

Tanacetum inodorum.

I. Tanacetum mont. inodor. minore flore

Sideritis z. Matthioli, quoad folia, & Lugd.

Tanacet. inodor. Dod. Ger. fl. bellidis maj. Eyn.

Tanacetum non odorum sylv. Ad.

Tanacet. inodor. z. Clus. pan. & hist. (Lob.)

Tanacet. non odor. perperam sideritis Italor.

Tanacetum album seu dooper, Thal.

Athanasia Leucanthemos, Lugd.

Tanacetum Leucanthemum, Tab.

II. Tanacetum inodorum flore majore.

Tanac. inodor. i. vel ampliore fl. Clus. pa. & hist.

Caltha Africana fruticosa, Eid.

Othonna major polyanthos, Ad. Lob.

Flos seu Caryophyllus Indicus major, Cast.

Flos Indiae vulgo, Othonna veterum, Cæf.

Flos Indicus major flore pleno, Cam.

Flos Africanus major aureus multiflorus, Tab.



Flos Africanus major polyanthos, Ger.  
Caryoph. Indic. fl. multip. luteo pleno major, &  
Caryoph. major Indic. fl. multip. aureo, Eyst.  
Caryophylli Hisp. dicti prima varietas, Col.

Variat flore, qui aliquando ad Pugni magnitudinem crescit, & in globum colligitur; hinc Svvert. & Bry.

Aphricanus flos max. flore aurantij colore.  
Aphricanus major flore pleno: addit Bry.  
Caryophyllum Indicum majorem luteum, vel aureum; sic & colore est luteo, pallido, aureo. Aliquando in uno flore observata folia 230 bifida & trifida, & per margines punctis notata.

II. Tanacet. African. majus simplicij flore.  
Caltha Africana flore simplicij, Gesf. hort.  
Flos Africanus major simplicij flore; Lobel. ico. Tab. Ger.

Flos Ind. major flore simplicij, Cam.  
Africanus flos maximus simplex flore luteo, Svvert Bry.  
Caryophylli Hispanici dicti tertia & quarta varietas, Colum.

Variat: colore est croceo, est pallente: petalis octonis, aliquando novenis.

I. Tanac. African. seu flos Africanus minor. an Argemone Dioscorid. Argemonia Plinij.  
Caryophylli Indici, Trag.  
Flos vel Caryophyllus Indic. minor, Gesf. hor.  
Caryophyllus Indicus minor, Matth. Gesf. col. Lugd. Cast.

Flos Africanus, Dod. Lob. Indian. minor, Lon.  
Flos Indianus seu Viola flammea, Fuch.  
Tagetes Indica, Eid. Lugd.  
Othonna, Lac. Icalorum & ocellus African. Ad Tanacetum Peruvianum, Cord. hist.  
Caltha Africana minor flore simplicij, Gesf. hor.  
Viola flammea quibusdam, Eid.  
Flos Portugalicus vel Indicus minor, Eid. col.

Pedua Pœnorum, Guil. pap.

Flos Indiæ alter minor, Argemone veter. Cæf.  
Flos Africanus minor flore simplicij & multiflorus, Tab. Ger.

Flos Ind. minor flore simplicij & pleno, Cam.  
Caryophyllus Indicus fl. luteo, simpl. minor & Caryoph. Indic. fl. aureo, simpl. minor, Eyst.

Variat flore simplicij & pleno: quamvis multiplex rarus sit: croceos, melleos & albos reperiri, Amatus scribit; adde & rubros: aliud citius, aliud tardius flore.

Africanus flos simplex & Africanus flos alter pleno flore, Svvert. Bry.

Caryoph. Indic. fl. luteo rubescence simp. min. & Caryoph. Indic. plenus fl. luteo rubescence minor, Eyst.

Caryophylli Hisp. dicti altera varietas, Colum.

IV. Tanacetum Africanum minimum sericea hirsutie obsitum.

Caryophylli Hispanici dicti varietas septima & octava, Colum.

Variat flore simplicij quinis petalis, & altera polyanthos, Colum.

V. Tanacetum sive Flos Mexicanus flore fistuloso simplicij.

Caryoph. Mexican. fistuloso flore simp. Colum.

VI. Tanacetum sive Flos Mexicanus flore fistuloso pleno.

Caryophyllus Mexicanus alter polyanthos fistuloso flore, Colum.

VII. Tanac. African. folijs tenuissimè divisiss.

Caryophylli Hisp. dicti varietas nona, Colum.

VIII. Flos Indicus.

Jolo Suchil, id est, flos cordialis, figura & magnitudine cor representans: Joseph. Acosta l. 4. hist. Ind. Occid. cap. 27.

IX. Angiers, Indiæ flores holofericum tactu referentes, in odori, alpectu amabiles: Idem.

## PARTHENIUM.

**P**appios, quasi Virginali, quod morbo mulierum merini medetur (hic vulgo Matricaria) Diosc. l. 3. c. 153. cui & antiquior, ut & Galeno & Aegineta. Plin. & Artemis. l. 2. 3. c. 6. & Mercur. l. 2. c. 5. & hinc, Parthenium, nomen tribuit: at de Matricaria agit l. 21. c. 30. quod in hortorum sepib. flore albo nasci scribit. Unum meminere.

I. Matricaria vulgaris, seu sativa.  
Amaracus Galeno & Aeginetæ, Crispula Man.  
Matricaria, Parthenij 2. species Brunf.  
Artemisia tenuifolia, Fuch. Tab.  
Artemisiz ramosa altera species, Fuch. ico.

II. Matricaria sylvestris flore toto luteo.  
Matricaria sylvestris, Trag.

Artemisiz tenuifolia altera species, Thal.

Matricaria, Trag. Lon. Dod. Lugd. Cæf. Camen. Ger.

Matricaria nostras, Ad. Lob. fl. simplicij, Fyff.

Parthenium, Matth. Dod. gal. Lac. Cord. in Dioscor. Gesf. hor. Cast. Thal. 2. Tur.

Amaracus Galeni, Eric. Cord.

III. *Matricaria odorator.*

*Matricaria altera ex illa, Cam.*

*Artemisia tenuifolia odorata, Tab.*

IV. *Matricaria flore pleno.*

*Matricaria duplici flore, Lob. ico. Ger.*

*Matricaria pleno flore, Cam. Eysl.*

*Parthenium pleno sive polyphylo flore, Clus. pan. & hist.*

*Artemisia tenuifolia flore pleno, Tab.*

V. *Matricaria inodora.*

*Achaovan, Parthenium inodorum, Alpi.*

VI. *Matricaria alpina Chamæmeli folijs*

*Parthenium alpinum, Clus. pan. & hist.*

*Matricaria sive Parthenium alpinum, Cam.*

VII. *Matricaria folijs abrotani.*

*Parthenium σμυκερόλης, Myconi, Lugd.*

VIII. *Matricaria maritima.*

*Cotula sive Parthenium marinum minimum, Ad. Lob. ico.*

*Parthenium maritimum minimum, Lugd.*

*Chamæmelum minimum, Dalech. Eid.*

## CHYSANTHEMVM ET BUPHTHALMVM.

**X**ρυσανθῆμα, propter flores luteos aureo fulgore splendentes, Dioscoridi, l. 4. c. 58, & quia orbem oculi imitantur, etiam βυφθαλμὸν dicitur.

Βυφθαλμὸν adjungimus, quod flore simile sit boum oculis, Plin. l. 27. c. 5. de quo Dioscorides, l. 3. c. 116. p. 1. Parthenium egit, qui utrique planta βυφθαλμὸς nomen tribuit. Deinde, quia forma & viri utriusque continentur, ita ut dubitari possit, sint ne apud Diosc. & Plinium diverse plantæ, an tamen eadem, quod ex apud utrumque collatione clarum fiet: quare Gaicnu & Aegineta, Buphtalmi, non vero Chrysanthemi, meminerunt.

Genus Chrysanthemi unicum est Dioscoridi & Plinio, licet, l. 26. c. 8. Chrysanthemi primum meminerit, ubi pro primo, potum legendum censuimus.

I. *Chrysanthemum folijs matricariæ.*

*Tinctorius flos 4. Trag.*

*Chrysanthemum, Matth. Lac.*

*Chrysanthemum & Chalcitis, Tab.*

*Chrysanthemum segetum, Ger.*

II. *Chrysanthemum flore partim candido, partim luteo.*

*Buphtalmi altera species, Gesn. hort.*

*Chrysanthemum Creticum mixtum, Eysl.*

III. *Chrysanthemum majus folio profundius laciniato magno flore.*

*Chrysanthemum Creticum 1. Clus. hist. luteum, Eyslert.*

IV. *Chrysanthem. majus folio in minores lacinias diviso.*

*Chrysanthemum Creticum 2. Clus. hist.*

*in Chrysanthemum, quod crudum edunt in Lemno insula, Bellon.*

*in Chrysanthemum quod μωλιδία vocatur & a rusticis editur, Belli epist. l. ad Clusium.*

*Chrysanthemum alpinum.*

I. *Chrysanthemum alpinum incanum folijs laciniatis.*

*Chrysanthemum alpinum 1. Clus. pan. & hist.*

II. *Chrysanth. alp. folijs abrotani multifidis.*

*Achillæa montana Artemisiæ tenuifoliæ facie, Ad. Lob. ico.*

*Achillæa montana, Lugd. Tab.*

*Ageratum ferulaceum, Lugd.*

*Chrysanthemum alpinum 2. Clus. pan. & hist.*

III. *Chrysanth. alp. fol. longis tenuiter incis.*

*Chrysanthemum alpinum 3. Clus. pan. & hist.*

*Buphtalmum.*

I. *Buphtalmum, Tanacetum minoris folijs.*

*Buphtalmum, Trag. Matth. Lac. mille folijs*

*folio Chrysanthemi flore, Ad. Lob. Cast. Lugd.*

*Cam. Tab. sub Buphtalmo albo, Ger.*

*Buphtalmus & Chrysanthemum, Gesn. hort.*

*Buphtalmus qui & crispula herba, Amato.*

*Buphtalmum vulgare, Clus. pan. & hist.*

*Chamæmelum chrysanthemum, Fuch.*

*Cotula lutea, sive tertia, Dnd.*

*Chrysanth. Cord. in Diosc. Tur. tenuifol. Eysl.*

*Chrysanthemum verum, Gesn. col.*

*Aster Atticus, Cord. hist. ico.*

*Cotula non foetida, Lon.*

II. *Buphtal. fl. luteo subtus purpurascente.*

*Buphtalmum Narbonense, Clus. Pan. & hist.*

*Buphtalmum tenuifolium Narbonense, Lob.*

*obs. describe.*

*Buphtalmum verum, Dalech. Lugd.*

*Buphtal. flore purpurascente, Cam. in Matth.*

III. *Buphtalmum cotulæ folio.*

*Buphtalmum alterum folio & facie cotulæ*

*foetidæ, Ad. Lob. ico.*

*Buphtalmum alterum Penæ, Lugd.*

IV. *Chry.*

IV. Chrysanth. fruticosus subcandidum.  
Chrysanthemum alterum ex Sicilia, Cæs.  
Bupthalmum, Camer. in Matth. icon. verum,  
Tab. Ger.  
Chrysanthemum primum, Cæs.

V. Bupthalm. lanuginos. folijs millefolij.

an Dioscoridis?

Chrysanthemum Valentinum, Clus. Hispal.  
pan. & hist. Lob. ico. Ger.

Bupthalmum tenuifolium Narbonense, Lob.  
ob. quoad icon.

Chrysanthemum Hispanicum, Tab.

## CHAMÆMELVM ET COTVLA.

**A**nthem. Dioscoridi, lib. 3. cap. 14. ἀνθέμιον Theop. 7. hist. 13. dicitur & χαμαιμύλον, quoddam mali odorem habeat, Plinio, lib. 22. cap. 21. cui & Anthemum.

Genera plura Theophrasto: at Dioscoridi & Plinio tria, floreatantum distantia: flores in medio auri, orbiculato ambitu candidi & λευκὰνθημιον • melini & χρυσάνθημιον: aut purpurei, & propriè ἡερδνθημιον vocatur.

I. Chamæmelum vulgare, Leucanth. Diof.  
Chamæmelum (Parthenii 3. species) Brunf. Lac.  
Cæs. Cast. Thal. Tab. Ger.

Chamomilla Amato 3. & vulgaris Trag. Lon.

Chamæmilla Ang. Chamæmelon, Thal.

Chamæmelum Leucanth. Fuch. Gefn. hort.

Chamæm. syl. Dod. gal. vulgare Gef. hor. Dod.  
& arvense Cam.

Chamæmelum vel Anthemis vera, Gef. hor.

Anthem. Tur. Cord. in Diof. Matth. Gef. col.

Anthemis vulgariter five Chamæmill. Ad. Lob.

Chamæmelum sylv. Matthiol. & Dod. utriusque figura posita, Lugdun.

II. Chamæmelum nobile five Leucanthemum odoratius.

Parthenium Diof. & nobilis Chamom. Trag.

Chamæmelum Leucanthem. Dod. gal. Tur.

Leucanthemum odoratum, Dod.

Chamæmel. hortense, Gef. hor. vel nobile, Eid.

Chamæmel. leucanthemum odoratum, Dod.

Parthenium nobile, Eid. ap.

Chamomilla nobilis, Lon.

Anthemis, five Leucanth. odorati\*, Roman. Ad.

Anthemis seu Leucanthemis odorata, Lob.

Anthemis Leucanthemus, Lugd.

Chamæmel. odorat. Ital. simplici flore, Cam.

Chamæm. Roman. Tab. Ger. fl. simplici, Eysf.

III. Chamæmelum leucanthemum Hispanicum magno flore. quod. i. est in Prod.

IV. Chamæmelum Chrysanthemum Hispanicum quod 2. in Prod.

V. Chamæmelum nobile flore multiplici.  
an Leucanthemum Plinij, Ang.

Leucanthemum niveum Anglorum flore multiplici, Ad. Lob. ico.

Chamæmel. leucanth. odorat. multiplex, Dod.

Anthemis leucanthemum nivea Angl. flore multiplici, Lugd.

Chamæmelum Romanum flore multiplici,  
Cam. in Matth. Tab. Eysf.

Chamæmelum Anglicum flore multiplici, Ger.

Floribus variat, qui altero globosus albus, ut apices lutei non conspiciantur: in altero adhuc conspiciuntur: est 3. & 4. species, Tab. aliquando flores latitudine Ducatum Ungaricum exæquant.

VI. Chamæmel. luteum capitulo aphylo.

Chamæmelum Chrysanthemum, Dod. gal.

Chamæmel. Chrysanth. odoratum, Eid. post.

Anthemis Chrysanthemus herbariorum, Ad. Lob. Lugd.

Chamæmelum hort. alterum, Gefn. hort.

Chamæmelum luteum odoratum, Eid. ap.

Chamæmelum luteum, Tab. fig. trans.

Chamæmelum nudum odoratum, Ger.

Chamæm. inodor. & foetidum, five COTULA.

VII. Chamæmelum inodorum.

Cotula, Brunf. Tab.

Chamomilla fatua, & 4. Trag.

Buphth. Fuch. Er. Cord. majus, Cord. in Diof.

Cotula non foetida, Dod. gal. Gef. ap. Lugd.

Cotula inodora, Ad.

Cotula alba non foetida, an Melandrium Plinij, Dod. post.

Solo odore à Chamom. vulgari distinguitur.

VIII. Chamæmelum foetidum.

Parthenion leptophyllum Hippocratis.

Cotula foetida, Parthenij 4. species Brunf.

Chamomilla 2. & sylv. Trag.

Cotula foetida, Dod. gal. Er. Cordo (cui & caninum anethum, Germ.) Lac. Gefn. hort. Guil.

Lon. Lob. ico. Lugd. Cast. Cam. Eysf.

Parthenium, Fuch. Ad. Tab. primum, Tur.

Bupthalmum minus, Cord. in Diof.

Cotula alba, Dod.

Chrysanth. Parthenium vel virgines, Lob.

Chamæ-



Santolina vulgo, alijs Crespolina, Cæf.

Absinthium marinum, Tab.

II. Abrotanum fœmina flore majore, folijs villosis & incanis.

Santonicum majus, Cord. hist.

Santolina altera, Dod.

Seriphium Diofc. abrotani fœm. facie, Ad. Lob.

Seriphium verum Penæ Lugd.

Absinthium marinum 1. Tab.

Abrotanum fœmina 3. Cluf. hist.

Polij altera species major, Colum.

III. Abrotanum fœmina folijs Ericæ, vel

Santolina 3. Dod. (Sabinæ.

Chamæcyparissus Dalechampi, Lugd.

Unguentaria Lutetianorum.

IV. Abrotanum fœmina folijs Cupressi.

Abrotanum peregrinum Cupressi folijs, Ad.

Santolina 4. Dod.

V. Abrotanum fœmina Sabinæ folio.

Hujus Lobelius in observationibus meminit.

VI. Abrotanum fœmina repens canescens.

Santolina 5. Dod.

VII. Abrot. fœmina folijs minus incanis.

Abrotanum fœm. 2. Cluf. hist.

Abrot. fœm. folijs magis viridibus, Cam. hort.

Polij altera species non ita incana, Colum.

VIII. Abrotanum fœmina viridis.

Abrotanum fœm. Salmantic. 2. Cluf. hisp. at

6. in hist.

IX. Abrotan. fœm. folijs rorismarini majus.

Abrotanum fœmina Salmanticensis prima,

Cluf. hisp. at 4. in hist.

X. Abrotanum fœmina folijs rorismarini

minus.

Abrotani fœminæ Salmanticensis 1. altera spe-

cies, Cluf. hisp. & Abrot. fœmina 5. Eid. hist.

## ARTEMISIA EJVSQVE SPECIES.

**A** Artemisia Diofcoridis, l. 3. c. 127. sic dicta ab Artemisia Mansoli Caria Regis uxore, quæ hanc sibi, ut loquitur Plin. l. 25. c. 7. adoptavit, cum antea nupsisset id est. Virginali; quod virgo Dea illi nomen dederit, vocaretur: quare Apulejus etiam nupsisse dici affirmat. Sunt qui ab Artemide Ilythia cognominatam putent, quoniam privatum seminum malum, quibus ægerit, id est, Diana præst. medeatur.

Genera duo Diofc. proposuit: in quibusdam verò codicibus Græci, ut Marcelli, Goupyli, Assulani, Saracen, sequitur & aliud caput de Artemisia, quod spurium videtur: quare Ruellius, in sua interpretatione omisit. Marcellus Virgilium, ut adscititium damnavit: Cornarus, ut supposititium ex textu Latino tenuit: non immerito, cum nec apud Galenum, Orbasium, Aeginetani, Aëtium, nec apud Serapionem, de tertia specie quidquam legatur, qui tamen simplicia ex Diofcoride enumerant. Sic Plinius genera duo, alterum folijs latioribus, alterum tenuioribus.

I. Artemisia vulgaris major.

Artemisia, Parthenij 2. species, Brunf.

Artemisia, Trag. Ang. Marth. Lac. Cord. in Diof.

Amat. Gesn. hort. Ad. Cam. communis, Dod. gal.

Artemisia vulgaris, Tur. Cluf. hist. Thal.

Artemisia major, Cord. hist.

Artemisia latifolia, Fuch. Lon. Dod.

Artemisia mater herbarum, Lob. Ger.

Artemisia 1. vulgaris, Lugd.

Artemisia vulgaris, & Artemisia altera poly-

clonos dicta, Diofc. Cæf.

Artemisia rubra & alba, Tab.

Variat colore caulis & floris: una, caule & fl.

robore purpurascens, seu subpurpurascens:

altera, caule ex viridi albicante vel subpallente

spadiceo: hinc apud Tab. & Ger. figuræ duæ.

II. Artemisia vulgaris minor.

Artemisia minor, Marth. Cast.

Priore minor est & unum tantum caulem

prodit.

III. Artemisia montana.

Artemisia leptophyllos montana, Lugd.

IV. Artemisia polyspermos.

Artemisia monoclonos quorundam, alijs Am-

brofia, Lugd.

an Ambrosia 2. Tab.

## AMBROSIA.

**A** Ambrosia Diofcorid. lib. 3. cap. 120. Artemisia subijcit, Veteribus τὴν θιὸν ἀμύμην, id est, Deorum cibum dicitur, quod mortales eam non edant: vel quod, qui eam ederint, immortales evadant, ita eximia fragrantia gratia, etiam Dijs exposita. Sunt qui Ambrosiam Diofcorid. Conyzam Hipp. de morbis mulieb. & Artemisiam secundam Plinij voluer.

## I. Ambrosia maritima.

Conyza Hippocratis, Ang. ut quidam nominant, Gef. hort. Cam. (Gef. hor. Ambrosia quibufd. dicta, Artemisiæ forsan species, Ambrosia sativa hortensis, Lob. Ambrosia, Dod. Ad. Cæs. Cam. prima, Tab. Ambrosia hortensis procerior, Lugd. Artemisia monoclonos, Eid.

Plerumque ramosa est, rarius unicaulis; hinc duæ figuræ in hist. Lugd.

## II. Ambrosia campestris repens.

Ambrosia, Matth. Ambrosia spontanea strigosior, Lob. Ambrosia prima Matthioli, Lugd. Coronopus Ruellij, Dod. gal. Gef. hor. Lugd. Coronopus repens, Lob. Lugd. Tab. Cam. Cornu cervi alterum repens, Dod. Pseudoambrosia, Nasturtium verrucarium quibufdam, Cam. in Matth. Carara, Cæs. salp.

## BOTRYS.

**B**οτρὺς Diof. l. 3, c. 130. quæ Cappadoces Ambrosiam, alij Artemisiam vocant: Botrys Plin. l. 27, c. 8, quam L. 25, c. 7, cum Artemisia confundit: sic dicta a semine, quod ut acutissimi ramuli adnascitur.

## I. Botrys Ambrosioides vulgaris.

Botrys, Trag. Matth. Fuch. Tur. Ang. Dod. Lac. Amat. Ruell. Cord. hist. Gef. Ad. Lob. Cæs. Cæs. Lugd. Tab. Cornaro. Ger. Cam. cui & Patientia Italicorum.

Botrys Artemisia Turcica, Eyst.

Botrys, altera Ambrosiæ species, cujus semen Amomum officin. quibufdam, Cord. in Diof.

II. Botrys Ambrosioides Mexiocana: cujus semen Parote Mexiocanæ nomine missum, in horto D. D. Plateri, feliciter Anno 1619. & sequentibus crevit.

## III. Botrys Chamædryoides.

Chamæcyparissus agrestis & Chamæpitys altera Diofcoridis, Trag.

Chamædrys altera, Matth. Cæs. Lugd. Thal. Chamædrys fœmina, Dod. gal. Tur. Cæs. Lugd. Cam. Ger. vera fœmina, Fuch. ico.

Trixago vera, Lon.

Chamædrys laciniatis folijs, Lob.

Chamæpitys altera, Dod.

Chamædrys minima, Lugd.

Iva moschata, Tab.

Aiuga, vel Chamæpitys multifidis fol. Clus. hist.

## ABSINTHIUM EJUSQUE SPECIES.

**A**ψίνθιον Diofcoridi l. 3, c. 26. Sic dictum quasi ἀψίνθη Comicu. quasi importabile, propter insignem amarorem, in αὐτῷ τῷ αἵματι περιέχεται: unde & πικρὸν ποτὶ, intense amaritudinum.

Generatrica Diofcoridi, Ponticum, Marinum sive Scribium, & Santonicum, & Galeno & Plinio lib. 27, cap. 7. Theophr. 9, hist. 18. Absinthij in Ponto proveniunt tantum meminit.

Absinthium Ponticum.

I. Absinthium Ponticum, seu Romanum officinarum, seu Diofcoridis.

Absinthium, Brunf. Matth. Cord. in Diof. & hist. Lon. Cæs.

Absinthium Pontic. Ruel. legitimum Bellon.

Absinth. vulgare, Trag. Fuch. ico. Lac. Gef. Gil. Ad. Iob. Cæs. Tab. Lugd. seu Rom. Pontic. Eyst.

Absinthium commune, Tur. Gefn. Cam. quod Ponticum Trincavellæ dicit.

Absinthium nostrum rusticum, Thal.

Absinthium Santonicum, Dod. gal.

Absinthium majus & vulgare, Clus. pan.

Absinthium latifolium, Dod. Ger.

II. Absinthium Ponticum montanum.

Absinthium commune minus, Gef. hort.

Absinth. mont. Cam. in Matth. seu Roman. Tab.

Absinthium tenuifolium pont. Galeni, Ger. ico.

Absinthij alterum genus, tale quale Ponticum

traditur, Cæs. salp.

Simile vulgari, nisi quod exiliciora omnia, & amaritudo gravior.

III. Absinthium pont. Creicum grati odoris. Absinthium in Græcia communissimum, quod ἀψίνθη vocant, Ang.

Absinthium Ponticum Belli, quod ἀψίνθη non ἀψίνθη in Græcia vocatur: ut ad me Honorius Belli, & scripsit, & plantam misit, ut in Appendice Phycopinacis & sub 1. in Prod. videre est.

IV. Absinthium Pontic. tenuifolium incanum. Abrotanum minus & 1. Trag.

Abrotanum fœmina, Fuch. à Cordo existimat.

Absinthij genus porius, Gef. hor. Lon. Lugd.

Abrotanum album, sive fœmina, Cord. in Diof.

Absinthium Santonicum, Ruel. Cæs.

Absinthium Pontic. Matth. Fuch. ico. Dod. gal.

Fuchij Gef. hor. append. Guil. Lug. Tab. vulgare, Clus. pan. & hist.

Absin-



Abſinthium Roman. Meſuei, Tur.  
 Abſinthium tenuiſolium, Dod.  
 Abſinth. Galarium Sardonium Dioſc. Ad. Lob.  
 Abſinthium Romanum vulgare, Cam.  
 Abſinthium Ponticum album, Eyiſt.

Hoc medium eſt inter Abſinthium & Abro-  
 tanum, & eſt duum generum : 1. planè inca-  
 num, 2. cauliculis purpureſcentibus, folijs ſu-  
 pina parte viridioribus.

V. Abſinth. Pont. tenuiſolium Auſtriacum.  
 an Abſinth. Pont. Trident. herbarior. Lob. Lug.  
 Abſinth. tenuiſol. Auſtriacum, Cluſ. pan. & hiſt.  
 Abſinthium Seriphium, Dod.  
 an Abſinthium Nabathæum Avicennæ, Tab.  
 an Abſinthium tenuiſol. ſeu Romanum, Ger.

VI. Abſinth. Pontic. repens vel ſupinum.  
 Abſinthium ſupinum, Gefn. hort.  
 Abſinth. Pont. ſupinum Herbariorum, Lob. ob.  
 Abſinthium repens, Tab.

Abſinthium marinum latiſolium, Ger. ico.  
 VII. Abſinth. inſipidū abſinthio vulgari ſimile.  
 Abſinthium inſipidum, Gefn. hort. Lob. ob.  
 an Abſinthium dulce, Cluſ. hiſt.  
 Abſinthium inodorum, inſipidum, vel ſatuum,  
 Dod. deſc.

*Abſinthium Seriphium ſive maritimum.*

I. Abſinth. maritimum Lavendulæ folio.  
 Abſinth. marinum ſive ſeriphium, Matth. Lugd.  
 Abſinthium Seriphium, Lac.  
 Abſinthium maritimum Volmaro, Gefn. ap.  
 an Abſinthium Seriphium, Amat.  
 Abſinthium marinum, Tur. Cæſ.  
 Artemiſia marina, Ad. Lob. Lugd. Tab. Ger.  
 Artemiſia folio Lavendulæ, Cluſ.  
 Abſinthium anguſtiſolium, Dod.  
 Seriphia Paludio, Lugd. (Eyiſt.)  
 Abſinth. latiſol. marin. aromatico odore, Cam.

Hoc folijs ludit, ſuperioribus in aliquot laci-  
 nias diviſis, potiſſimum ſi in hortos transfera-  
 tur; & hujus peculiaris figura habetur, nomine  
 Artemiſiæ marinæ folijs ſuperior. inciſis, Lob.  
 Artemiſia marina Lobelij, Lugd.  
 Abſinth. anguſtiſolij ramul. folijs ſciſſis, Dod.  
 Abſinthij marini Patavini, Cluſ. pan. & hiſt. ubi  
 ſcribit ab Artemiſia folio Lavend. diſſerre.  
 Artemiſia marina minor, Tab.  
 an Abſinth. latiſol. rarius Artemiſiæ folio, Col.

II. Abſinthium Seriphium Germanicum.  
 Abſinthium Seriphium, Gefn. hort.  
 Abſinthium maximum Miſnenſe, Seriphium  
 Belgico ſimile, Cluſ. pan. & hiſt.

III. Abſinthium Seriphium Belgicum.  
 Abſinthium Seriphium ſeu marinum, Ang.  
 Abſinthium Seriphium, Dod. gal. Lugd.  
 Abſinth. Seriph. vulg. perperam Dioſc. Lob. ico.  
 Abſinthium Seriphium, Dod. deſcript. vulgo  
 dictum, Cam. in Matth.

Abſinth. marinum ſive Seriph. in Belgicis &  
 Anglicis maritimis, Cluſ. pan. & hiſt.

IV. Abſinthium Seriphium Gallicum.  
 Abſinth. Seriphium tenuiſolium Monſpelieneſe.  
 Joh. Bauhino lib. de Abſinth.

Abſinth. Seriph. vulgo dictum, Cam. in Matth.  
 Abſinth. Seriph. Narbon. Cluſ. pan. & hiſt. Dod.

*Abſinthium Santonicum.*

I. Abſinthium Santonicum Judaicum.  
 Abſinthium Santonicum, Scheha Arabum, un-  
 de ſemen lumbricorum colligitur, Rauvv.  
 Scheha Arabum, Lugd. ap.

II. Abſinth. Santonicum Alexandrinum.  
 Abrotanum mas, Ang.  
 Semen Sanctum ſive ſementina, Matth. Semen  
 Sanctum, vel contra, Ad. (& Semen Zedoariæ,)   
 Lob. Lugd. Caſt.

Abſinthium Seriphium, Alexandrinum ſe-  
 men, aut Zinzæ ſemen, Cord. in Dioſc. & hiſt.  
 Sementina, Dod. Tab. (cui & Santonicū vulg.)  
 Santonicum, Semen Sanctum, Lon. (Ger.)

III. Abſinthium Santonicum Ægyptiacum.  
 Abſinth. Seriphium Ægyptium, Matth. Lugd.  
 Abſinth. aliud peregr. ſive Ægyptium, Ad. Lob.  
 Abſinthium Ægyptium, Dod. Tab. Ger.

IV. Abſinthium Santonicum Gallicum.  
 Abſinthium Santonicum vulgare, Lob. ob.  
 Abſinthij Santonici ſpecies, Cam. in Matth.

*Abſinthium montanum.*

I. Abſinthium Seriphium mont. candidum.  
 Abſinthij genus, in Valeſia herba alba dicta, &  
 Abſinthium Seriphium ſœmina, Gefn. hort.  
 Abſinthium album è Valeſia, Eid. ap.

Abſinth. externum & ſpurium primum, Dod.  
 Abſinthium Santonicum nonnullis, Cam.

II. Abſinth. alpin. incanum: quod 2. in Prod.  
 Abſinthium alpinum 2. Ponæ in Baldo Ital.  
 an Abſinthium parvum & incanum quod Gef-  
 nero humile, Cam.

Abſinth. pumilum Camerarij, Cluſ. Pan. & rar.  
 III. Abſinth. alpinum candidum humile:  
 quod 3. in Prodr.

IV. Abſinth. alpinum umbelliferum latiſol.  
 Abſin-

Abfinchium album capitulis squarrosis, florib.  
 albis, umbella Achilleæ montanæ, Lob. ob.  
 Abfinchium album, Lob. ico. Tab. Ger.  
 Abfinchium album capitulis scabris, Lugd.  
 Abfinchium Alpinum seu umbelliferum flor.  
 albis, Pona in Balde.  
 Abfinrh. alp. umbelliferum, Clus. pan. & hist.  
 Abfinchium pannonicum flore albo, Cam.  
 Abfinchium umbelliferum, Clavenæ, Pharma-  
 copæi Bellunenſis.

Hujus varietatē, sub 4. in Prod. exhibuimus.  
 V. Abfinchium umbelliferum hortense.  
 Abfinth. umbellifer. alterum italicum, Lob. ob.  
 VI. Abfinchium alpinum umbelliferum te-  
 nuifolium & minus.  
 Abfinthium 3. alp. umbelliferum, Pona Ital.  
 VII. Abfinchium montanum Chamemeli  
 flore magno.  
 Abfinthium montanum abrotani feminæ flo-  
 re, Colum. in Phytobas.



## SECTIO TERTIA.

ACHILLEA SIVE MILLEFOLIUM TERRE-  
 STRE; MILLEFOLIUM AQUATICUM SIVE VIOLA  
 AQUATICA; CONSOLIDA REGALIS; FVMARIA;  
 CHELIDONIA; AQUILEIA; NIGELLA.

### ACHILLEA SIVE MILLEFOLIUM

**M**illefolium χιανόφυλλον, à foliorum multitudine, recentioribus triplex est, majus, minus, & aquati-  
 cum. Majus χιανόφυλλον, & χιανόφυλλον οικόγειν Dioscoridū, lib. 4. cap. 36. censetur, ut umbellam floribus  
 candidis & aurum emulantibus (addit interpretes & purpureis) tribuit: quin & Achilleam, odore multo &  
 medicato, dicit: quare Achilleam Dioscoridū, Tanacetum minus censemus. At Achillea, ab inventore Achille  
 Chironis discipulo nomen habet, Plin. lib. 25. cap. 5. Minus verò χιανόφυλλον, Millefolium Stra-  
 tiotes, Eidem, lib. 4. cap. 103. quod floribus parvis & candidis esse scribit. Aquaticum ipsi, lib. 4. cap. 113. ου-  
 χιανόφυλλον, Millefolium, quod folijs sit plurimum fasciculo similibus.

Plinius Achilleæ sideritides plures habet: cujus prima eadem est cum Dioscoridū: secunda χιανόφυλλον  
 Dioscoridū: tertia, Sideritū Heraclea, prima Dioscoridū: quarta & quinta, Sideritū Heraclea Crateva, &  
 sexta Dioscoridū: sexta, Sideritū secunda Dioscoridū.

#### Millefolium terrestre.

I. Millef. max. umbellā alba: quod 1. in Prod.  
 II. Millefolium vulgare album.  
 Millefolium album, Brunf. flore albo, Eysf.  
 Millefolium vulgare, Trag. Gesn. hort.  
 Stratiotes 2. Ang.  
 Stratiotes terrestris, Eric. Cord.  
 Stratiotes millefolia, Fuch. Lac. Cast.  
 Milicaris, sive Millefolium flore albo, Ad.  
 Stratiotes major, Lugd.  
 Millefolium terrestremajus, Cord. hist. Tab.  
 Achillea, Dod. gal. Lon.  
 Millefolium Stratiotes, Cord. in Diosc.  
 Millefolium sive Achillea, Dod.  
 Millefolium, Thal. Cam. majus, Cæf.  
 III. Millefolium purpureum majus: quod  
 5. in Phytopinace & 2. in Prod.  
 Millefolium majus, Matth.

Millefolium rubro flore, Clus. hist. Eysf.

IV. Millefolium vulgare purpureum minus.  
 Millefolium vulgare flore diluti ruboris, Trag.  
 Millefolium minus, Matth. parvum, Cæf.  
 Millefolium flore purpureo, Ad.  
 Millefolium terrestre purpureis floribus, Lob.  
 Millefolium purpurei floris, Dod. purpur. Tab.  
 Millefol. rubro colore, Clus. hist. fl. rubro, Ger.  
 Stratiotes millefolia minor, Lugd.

V. Millefolium incanum Creticum.  
 Stratiotes millefol. Hon. Belli ep. 2 ad Clus.  
 In Phytopinace sub 8. at in Prod. sub 3. de-  
 scripsimus.

VI. Millefolium alp. incanum carneo flore.  
 Millefolium rubrum, Gesn. hort.  
 Millefolium alpinum, Clus. pan. & hist.  
 an Millefolium purpureum minus sive 5. Tab.  
 VII. Millefolium tomentosum luteum.

Sub 4. cap. 103. & 113. Stratiotes

Stratiotes vel militaris millefolia, Dod. gal.  
 Helichrysum Italicum Matth. Cam. Lugd.  
 Stratiotes lutea, Clus. hisp. Lugd.  
 Stratiotes millefolia flavo flore, Clus. hist.  
 Millefol. minus sive Stratiotes Chiliophyllos,  
 Dodon.  
 Millefolium luteis floribus, Gesn. hort. Cam.  
 Millefolium luteum, Ad. Lob. Tab. Ger.  
 Tanacetum lanuginosum, Lugd.

*Millefolium aquaticum.*

I. Millefol. aquat. umbellat. Coriandri folio.  
 Millefolium aquaticum, Matth.  
 Millefolium aquaticum alterum Coriandrifo-  
 lium, Ad.  
 Stratiotes Millefolium aquaticum, Lugd.  
 Folij Coriandri & umbella subpurpu-  
 rescens, necdum videre licuit.

II. Millefolium aquaticum umbellatum  
 capillaceo brevique folio.  
 Myrioph. Matth. Lac. Cast. prius Matthioli,  
 Lugd.  
 Millefolium aquatile, Dod.  
 Myriophyllum aut Maratriphyllum palustre,  
 Ad. Lob.  
 Myriophyllum alterum, Cæs.  
 Millefolium, Lon. Ger. Tab. cui & Fœniculum  
 aquaticum.

III. Millefol. aquat. f. osculis ad folior. nodos.  
 Myriophyllum aquat. minus, Clus. pan. & hist.

IV. Millefolium aquat. seu Viola aquatica,  
 caule nudo.  
 an Potamogeton Caloris apud Plin. l. 26. c. 5.  
 Myriophyllum alterum, Matth. Lac. Lugd.  
 Stratiotes fluviatilis, Gesn. hort.  
 Viola aquatilis, Dod. palustris, Ger.  
 Myriophyllum, Cæs. equisetifolium fluviatile,  
 Ad. Lob. ob.

Fœniculum aquaticum 2. Tab.

V. Millefol. aquat. equisetifol. caule nudo.  
 Myriophyllum equisetifol. palustre, Lob. ico.  
 Violæ aquatilis altera ico. Dod.  
 Viola palustris, Lugd.

Sunt qui cum priore idem velint: at illud  
 foliolatiore, hoc vero angustiori multo est.

VI. Millefolium aquat. folijs abrotani, ra-  
 nunculi flore & capitulo.

Alga prima, Trag.

Alga palustris & fluviatilis, Gesn. col.

Millefolium maratriphyllum tertium, flore &  
 semine ranunculi aquatici Hepaticæ facie,  
 Lob. ico. Ger.

Fœniculum aquaticum 3. Tab.

Millefolium aquat. flore albo, Clus. hist.

Ranunculus tricophyllum aquaticus mediolu-  
 teus, vel

Ranunculus aquat. fœniculaceus *repens*,  
 Colum.

VII. Millefolium aquat. folijs fœniculi ra-  
 nunculi flore & capitulo.

Myriophyllum maratriphyllum palustre alte-  
 rum, Lob. ico, ubi flores omittuntur, ne capitu-  
 la rectè exprimentur.

Fœniculus aquaticus Dalech. Lugdun. figura  
 imperfecta.

Myriophylli species coliculis fluitantib. Thal.  
 Peucedanum aquaticum, Tab.

Ne quis hoc cum præcedenti, vel cum Ra-  
 nunculo aquatico folio capillaceo, confundat  
 nam ab illo folijs longissimis, floribus quadru-  
 plò majoribus: ab hoc, quod Ranunculo & ro-  
 tunda & capillacea sint folia: & flos minor.

VIII. Millefol. aquat. pennatum spicatum.  
 an Alga 3. Trag.

Hoc, quemadmodum & subsequens in Mat-  
 thiolo & Tab. ac pro 4. & 5. in Prodromo ad-  
 dita figura, descripsimus.

IX. Millefol. aquaticum cornutum majus.  
 X. Millefolium aquaticum cornutum mi-  
 nus, necdum descriptum.

XI. Millefolium aquat. lenticularum.  
 Lentibularia, & Meon aquaticum, Gesn. col.  
 Millefolium aquat. flore luteo galericulato,  
 Lob. ico.

Fœniculum aquat. galericulatum, Tab.

XII. Millefolium marinum filicis folio.

Myriophyllum pelagium Cortusij, Clus. hist.

XIII. Stellaria aquatica, Lob. ico.

Fœniculum aquaticum stellatum, Tab.

## CONSOLIDA REGALIS, EJVSQUE SPECIES.

**C**onsolidam regalem, Veteres inter flores coronarios reposituræ, Hyacinthum nominantes, cuius Diosc.  
 l. 3. c. 25. an Delphinio altero, quod & Hyacinthum vocatur, meminit. Siquidem Plin. l. 21. c. 10. scribit di-  
 stinctos non inesse, ut Græcæque litteræ figuræ A. I. inscriptæ legatur: quod in Consolida regali horten-  
 sis

observatur, cum in floribus solum sit implicatum, quod in albo characteres habet occurratos, ex virgulis caruleis duas literas. A. I. aut tres A. I. A. exprimentes. Delphinium duplex est Dioscoridi, cujus altera species Romanu Buccinum dicatur. Quare si apud Dioscoridem, vox *Δελφινίου* ad flores referatur, tum *Consolida regalis hortensis* delphini erit: at *Consolida regalis segetum*, alterum ejusdem Delphinium.

Variat: est major & minor, utraque flore simplici vel pleno: colore caruleo pallido, caruleo intenso, purpureo, incarnato, albo, variegato ex albo & caruleo.

I. *Consolida regalis hort. flore majore & simplici.*

Delphinium, Dod. gal.

Delphinium 4. & majus, Gefn. hort.

Consolida regalis, Matth. ico. Ang. Cast.

Consolida regalis fativa, Tab. Ger.

Cuminum sylv. alterum, Matth. in prim. edit.

Lac. Lugd.

Consolida regia sive Calcaris flos recentiorum,

Ad. Lob.

Flos regius, Dod.

Delphinium elatius flore caruleo, Clus. hist.

Consolida regalis flore caruleo majore, Cam.

Flos qui vulgo in Hetruria Fior capuccio, Cæs.

Flores communiter carulei elegantiss. aut ex caruleo purpurei, carnei, vel saturati, vel diluti, nivei vel exalbidi, cineracei, purpurei seu violacei: hinc figuræ quatuor.

1. Delph. elatius fl. incarnato, Bry, Svvert.

2. Consolida regalis simpl. fl. rubro, Eyst.

3. Delphinium elatius purpureo-violaceum, Svvert.

4. Delphinium elatius flore albo, Bry.

II. Consolida regalis hort. flore minore.

Calcatrippa, Cord. hist.

Delphinium 2. flore candido, & 3. flore roseo, Gefn. hort.

Consolida regalis flore rubro, Lob. ico.

Consolida regalis fativa, fl. albo: rubro, Tab.

Flos regius flore purpureo, Dod.

Consolida regalis flore incarnato, purpureo albo, Cam.

Delphinium elatius simplici flore, Clus. hist.

Flos caruleus, cinereus, albus, rubeus, incarnatus.

III. Consol. regal. fl. majore & multiplici.

Delphinium elatius pleno flore, Clus. hist.

Consolida regalis flore pleno, Cam.

Flores carulei, albi, nullo, aut perexiguo, calcaris præditi: hinc

1. Consolida regal. fl. pleno incarnato, Eyst.

2. Consolida regal. fl. pleno purpureo, Eyst.

3. Consol. regal. multiplici fl. argenteo, Eyst.

Delphinium elatius albo flore, Bry, Svvert.

4. Consol. regal. fl. multiplici cineraceo, Eyst.

5. Consolida regal. fl. pleno albo, Eyst.

6. Consolida regal. fl. pleno rubro, Eyst.

7. Consol. regal. multiplici incarnato fl. Eyst.

8. Consol. regal. multiplici violaceo fl. Eyst.

IV. Consolida regalis arvensis.

Consolida regalis, Brunf. Lac. Gefn. hort. Cast.

Consolida regia, Trag. Fuch. Lon. Thal.

Chamaemelum eranthemum, Fuch.

Buccinum & Delphinium alterum, Dod. gal.

Segetum consolida regia strigosior tota, Lob.

Flos regius 2. vel sylv. Dod.

Anthemum eranthemos, sive Consolida regalis,

Cuminum sylv. Gefn. hort. (Lugd.

Delphinium sylv. Eid. vulgare, Clus. hist.

Consolida regalis arvensis, Tab. sylvestris, Ger.

Consolida regalis flore caruleo minore, Cam.

Flore est caruleo, albo, candicante, rubro & dilutius rubente, violaceo, & hoc est

Consol. regal. arvensis fl. simpl. violaceo, Eyst.

Consolida regalis fl. variegato.

Delphinium arvense flore versicolore, Clus. ap. alt. ad 16.

Flores quidam tam simplices quam multiplices media parte carulei: altera parte suaviter rubentes, vel caruleis punctis notati: sic partim carulei, partim albi: & in eadem plantata flores varij coloris, ita ut vix bini flores ejusdem coloris conspiciantur: hinc

Delphin. elatius fl. albo caruleo distincto, Bry.

Delphinium elatius purpureo-viol. distincto, Bry.

Delphinium elatius pleno variegatum, Svvert.

V. Consolida regalis vulgaris fl. multiplici.

Delphinium humilius sive vulgare pleno flore, Clus. hist.

Consolida arvensis fl. rubro pleno vel suaviter rubente, Eyst.

VI. Consolida regalis latifolia parvo flore. Delphinium Dioscoridis, Imperato.

In Phytopinace sub 7. & in Prodromo, in Matthiolo quoque & Tabernæmontano, figura adposita descripsimus.

## FUMARIA EJUSQUE SPECIES.

**F**umaria, nomen Diof. l. 4. c. 110. eo quod herba succus oculi indurum, iustar. sumi oculos molestando, lacrymas moveat. Genera: Diof. l. 1. flore purpureo, meminit: at Plin. l. 25. c. 13. Capnos duplex est: prima, quae pes gallinaceus vocatur, & altera Capnos fruticosa, illam Fumariam bulbosam, hanc vero Capnos Diof. sensimus.

*Fumaria non bulbosa.*

## I. Fumaria officinarum &amp; Dioscoridis.

Fumus terræ, Brunf. Cam. Thal.

Fumaria, Trag. Matth. Fuch. Cord. in Diof. Gef. hor. Dod. Lon. Cæf. Lugd. 1. & 2. flore albo, Tab.

Capnos, Ang. Ad. Lob.

Fumaria major, Cast. ico.

Fumaria purpurea & alba, Ger.

Flos coloris purpurei violacei, pallefcentis, albi: alia circa Monspelim, folijs tenuissimis floribus albis reperitur.

## II. Fumaria viticulis &amp; capreolis plantis vicinis adhaerens.

Fumaria phragmites, Dod. gal. Lugd.

Fumaria altera, Cæf.

Flosculi candidi, caeruleo colore aliquando distincti, circa Monspelim in sepibus ad Frontignanum: at circa Neapolim flosculis subflavis, in summitate nigricantibus.

## III. Fumaria minor tenuifolia.

Capnos minor, Ad.

Capnos tenuifolia, Clus. hisp. & hist. Lob.

Fumaria minor, Cast. ico.

Fumaria species Myconi, Lugd.

Fumaria tenuifolia, Tab. Ger. Eyst. fl. niveo.

Fumus terræ seu Fumaria tenuifol. Hisp. Cam.

Fumaria rubra tenuifolia, Eyst.

Variat floribus colore, hilari purpureo rubet, est & variegato, ex rub. albo, viridi & luteo: cauliculis modo surrectis, modo proci bentibus, & caducis. Similem Montispeffuli observavimus, quam Fumariam nobilem vocant.

Fumaria minor, Ad.

## IV. Fumaria minor folie oblongo capillaceo.

Fumaria altera tenerior Syriaca, Cam.

Selterays nomine ex Syria D. Paludan. attulit, an Capnos Cret. floribus candidis fuscâ maculâ,

V. Fumaria lutea. (Clus. hist.)

Fumaria corydalidis, quibusdam Split, Match.

Fumaria montana, Gef. hor. Tab.

Fumaria phragmitidis altera, Eid.

Fumaria lutea montana, Ad. Lob. (cui & Chelidonium capnites Aërij) Lugd. Ger.

Split vulgo, Cæf.

Corydalidis, Cast. Cam. (hæc est)

Floribus commun. luteis, aliquando candidis, &

Fumaria fl. albis, Ad.

Fumaria Illyrica alba, Tab.

## VI. Fumaria claviculis donata.

Capnos Plinij & phragmites, Dod. gal. Gef. hor.

Capnos alba latifolia & Splich album quorundam, Lob. Lugd.

Fumaria altera, Dod.

Capnos altera Belgica albo flore, Clus. hist.

Folijis latioribus & angustioribus variat, floribus est albis & dilutè admodum rubentibus.

Fumaria latifolia major & minor, Tab. Ger.

Fumaria Clematites & Clematis minim. Cam.

*Fumaria bulbosa.*

## I. Fumaria bulbosa radice cava major.

Capnium sive Fumaria phragmitis, Aërio.

Aristolochia rotunda, Brunf. Eric. Cord.

Aristolochia rotunda vulgaris, Trag. Fuch. (cui & Pistolochia) Gef. hor. Cam.

Hyacinthus 3. candidus & purpureus, Trag.

Fumaria altera, Match. Cast.

Capnos phragmitis, Tur.

Pistolochia Fuchij, Apios species videtur, Lac.

Aristolochia phragmites, Gef. col.

Capnos chelidonia, Lon.

Capnos sive Capnium phragmites major, & Pes gallinaceus, Cord. in Diof.

Chelidonia phragmites altera, Cord. hist.

Radix cava major, Dod. Cast. Clus. hist.

Radix cava herbariorum, Ad. Lob. Clus. pan.

Fumaria bulbosa, Lugd.

Lentopetalum genus quibusd. haud planè ineptè, Lentopetalon alterum, Cæf. (Guil.)

Chelid. capnites quorundam rad. pertusa, Thal.

Aristolochia vulgaris flos purpureo, Eyst.

Est major & minor: huic folia angustiora, illi paulo latiora, sed solum loci ratione differunt.

Variat colore floribus albo, pallido, sublavescente, rubro dilutiori, vel egregie rubente: quod si flos minor sit, saturatius rubet, & pro mascula habetur: si major, languidioris coloris. Figuræ 8. apud Tab. & Ger.

Fumaria bulbosa purpureo flore nomine, quatuor: eodem flore albo.

Viridi flore Lobelius observavit, & nomine

Radice cava viridi flore, in iconib. proposuit.

Radix

observatur, cum in floribus solum sit implicatum, quod in albo characteres habet occultatos, ex virgulis caruleis duas literas. A. I. aut tres A. I. A. exprimentes. Delphinium duplex est Dioscoridi, cujus altera species Romanum Eucinum dicitur. Quare si apud Dioscoridem, vox *Andromeda* ad flores referatur, tum *Consolida regalis* hortenſis delphinium erit: at *Consolida regalis segetum*, alterum ejusdem Delphinium.

Variat: est major & minor, utraque flore simplici vel pleno: colore caruleo pallido, caruleo intenso, purpureo, incarnato, albo, variegato ex albo & caruleo.

### I. *Consolida regalis hort. flore majore & simplici.*

Delphinium, Dod. gal.

Delphinium 4. & majus, Gesn. hort.

*Consolida regalis*, Matth. ico. Ang. Cast.

*Consolida regalis fativa*, Tab. Ger.

*Cuminum* sylv. alterum, Matth. in prim. edit.

Lac. Lugd.

*Consolida regia* sive *Calcaris flos* recentiorum,

Ad. Lob.

*Flos regius*, Dod.

Delphinium elatius flore caruleo, Clus. hist.

*Consolida regalis* flore caruleo majore, Cam.

Flos qui vulgo in Hetruria Fior capuccio, Cæs.

Flores communiter carulei elegantiss. aut ex caruleo purpurei, carnei, vel saturati, vel diluti, nivei vel exalbidi, cineracei, purpurei seu violacei: hinc figuræ quatuor.

1. Delph. elatius fl. incarnato, Bry, Svvert.

2. *Consolida regalis* simpl. fl. rubro, Eyst.

3. Delphinium elatius purpureo-violaceum, Svvert.

4. Delphinium elatius flore albo, Bry.

### II. *Consolida regalis hort. flore minore.*

*Calcatrippa*, Cord. hist.

Delphinium 2. flore candido, & 3. flore roseo, Gesn. hort.

*Consolida regalis* flore rubro, Lob. ico.

*Consolida regalis fativa*, fl. albo: rubro, Tab.

*Flos regius* flore purpureo, Dod.

*Consolida regalis* flore incarnato, purpureo albo, Cam.

Delphinium elatius simplici flore, Clus. hist.

Flos caruleus, cinereus, albus, rubeus, incarnatus.

### III. *Consol. regal. fl. majore & multiplici.*

Delphinium elatius pleno flore, Clus. hist.

*Consolida regalis* flore pleno, Cam.

Flores carulei, albi, nullo, aut perexiguo, calcaris præditi: hinc

1. *Consolida regal. fl. pleno* incarnato, Eyst.

2. *Consolida regal. fl. pleno* purpureo, Eyst.

3. *Consol. regal. multiplici fl. argenteo*, Eyst.

Delphinium elatius albo flore, Bry, Svvert.

4. *Consol. regal. fl. multiplici* cineraceo, Eyst.

5. *Consolida regal. fl. pleno* albo, Eyst.

6. *Consolida regal. fl. pleno* rubro, Eyst.

7. *Consol. regal. multiplici* incarnato fl. Eyst.

8. *Consol. regal. multiplici* violaceo fl. Eyst.

### IV. *Consolida regalis arvensis.*

*Consolida regalis*, Brunf. Lac. Gesn. hort. Cast.

*Consolida regia*, Trag. Fuch. Lon. Thal.

*Chamaemelum* eranthemum, Fuch.

*Buccinum* & Delphinium alterum, Dod. gal.

*Segetum consolida regia* strigosior tota, Lob.

*Flos regius* 2. vel sylv. Dod.

*Anthemis* eranthemum, sive *Consolida regalis*,

*Cuminum* sylv. Gesn. hort. (Lugd.

Delphinium sylv. Eid. vulgare, Clus. hist.

*Consolida regalis arvensis*, Tab. sylvestris, Ger.

*Consolida regalis* flore caruleo minore, Cam.

Flore est caruleo, albo, candicante, rubro & dilutius rubente, violaceo, & hoc est

*Consol. regal. arvensis fl. simpl. violaceo*, Eyst.

*Consolida regalis fl. variegato*.

Delphinium arvenſe flore versicolore, Clus. ap. alt. ad l. 6.

Flores quidam tam simplices quam multiplices media parte carulei: altera parte suaviter rubentes, vel caruleis punctis notati: sic partim carulei, partim albi: & in eadem plantata flores varij coloris, ita ut vix bini flores ejusdem coloris conspiciantur: hinc

Delphin. elatius fl. albo caruleo distincto, Bry.

Delphinium elatius purpureo-viol. distincto, Bry.

Delphinium elatius pleno variegatum, Svvert.

### V. *Consolida regalis vulgaris fl. multiplici.*

Delphinium humilius sive vulgare pleno flore, Clus. hist.

*Consolida arvensis fl. rubro pleno* vel suaviter rubente, Eyst.

### VI. *Consolida regalis latifolia parvo flore.*

Delphinium Dioscoridis, Imperato.

In Phytopinace sub 5. & in Prodromo, in Matthiolo quoque & Tabernæmontano, figura adposita descripsimus.



## FUMARIA EJUSQUE SPECIES.

**F**UMARIA, *nactus* Dioscl. 4. c. 110. eo quod herbe succus oculis indutus, instar fumii oculos molestando, lacrymas moveat. Genera: Dioscl. flore purpureo, meminit: at Plin. L. 27. c. 13. Capnos duplex est: prima, quæ per gallinaceus vocatur, & altera Capnos fœtiosæ, illam Fumariam bulbosam, hanc vero Capnon Diosc. censens.

*Fumaria non bulbosa.*

I. Fumaria officinarum & Dioscoridis.

Fumus terræ, Brunf. Cam. Thal.

Fumaria, Trag. Matth. Fuch. Cord. in Diosc. Gef. hor. Dod. Lon. Cæs. Lugd. 1. & 2. flore albo, Tab.

Capnos, Ang. Ad. Lob.

Fumaria major, Cast. ico.

Fumaria purpurea & alba, Ger.

Flos coloris purpurei violacei, pallefcentis, albi. alia circa Monspelium, folijs tenuissimis floribus albis reperitur.

II. Fumaria viticulis & capreolis plantis vicinis adhaerens.

Fumaria phragmites, Dod. gal. Lugd.

Fumaria altera, Cæs.

Flosculi candidi, cæruleo colore aliquando distincti, circa Monspelium in sepibus ad Frontignanum: at circa Neapolim flosculis subflavis, in summitate nigricantibus.

III. Fumaria minor tenuifolia.

Capnos minor, Ad.

Capnos tenuifolia, Clus. hisp. & hist. Lob.

Fumaria minor, Cast. ico.

Fumariæ species Myconi, Lugd.

Fumaria tenuifolia, Tab. Ger. Eyst. fl. niveo.

Fumus terræ seu Fumaria tenuifol. Hisp. Cam.

Fumaria rubra tenuifolia, Eyst.

Variat floris colore, hilari purpura rubet, est & variegato, ex rub. albo, viridi & luteo: cauliculis modo surrectis, modo proci bentib. & caducis. Similem Montispestuli observavimus, quam Fumariam nobilem vocant.

Fumaria minor, Ad.

IV. Fumaria minor folie oblongo capillaceo.

Fumaria altera tenerior Syriaca, Cam.

Selterays nomine ex Syria D. Paludan. attulit, an Capnos Cret. florib. candidis fuscâ maculâ,

V. Fumaria lutea.

(Clus. hist.)

Fumaria corydalis, quibusdam Split, Matth.

Fumaria montana, Gef. hor. Tab.

Fumaria phragmitis altera, Eid.

Fumaria lutea montana, Ad. Lob. (cui & Chelidonium capnites Aëtij) Lugd. Ger.

Split, vulgo, Cæs.

Corydalis, Cast. Cam.

Florib. commun. luteis, aliquando candidis, &

Fumaria fl. albis, Ad.

Fumaria Illyrica alba, Tab.

VI. Fumaria clavicularis donata.

Capnos Plinij & phragmites, Dod. gal. Gef. hor.

Capnos alba latifolia & Split album quorundam, Lob. Lugd.

Fumaria altera, Dod.

Capnos altera Belgica albo flore, Clus. hist.

Folij latioribus & angustioribus variat, floribus est albis & dilutè admodum rubentibus.

Fumaria latifolia major & minor, Tab. Ger.

Fumaria Clematites & Clematis minim. Cam.

*Fumaria bulbosa.*

I. Fumaria bulbosa radice cava major.

Capnium sive Fumaria phragmitis, Aëtio.

Aristolochia rotunda, Brunf. Eric. Cord.

Aristolochia rotunda vulgaris, Trag. Fuch. (cui & Pistolochia) Gef. hor. Cam.

Hyacinthus, candidus & purpureus, Trag.

Fumaria altera, Matth. Cast.

Capnos phragmitis, Tur.

Pistolochia Fuchsij, Apios species videtur, Lac.

Aristolochia phragmites, Gef. col.

Capnos chelidonia, Lon.

Capnos sive Capnium phragmites major, & Pergallinaceus, Cord. in Diosc.

Chelidonia phragmites altera, Cord. hist.

Radix cava major, Dod. Cast. Clus. hist.

Radix cava herbariorum, Ad. Lob. Clus. pan.

Fumaria bulbosa, Lugd.

Lentopetalus genus quibusd. haud planè inepetè,

Lentopetalon alterum, Cæs. (Guil.)

Chelid. capnites quorundam rad. pertusa, Thal.

Aristolochia vulgaris flos purpureo, Eyst.

Est major & minor: huic folia angustiora, illi paulo latiora, sed solum loci ratione differunt.

Variat colore floris albo, pallido, subflavescente, rubro dilutiorè, vel egregiè rubente: quod si flos minor sit, saturatius rubet, & pro mascula habetur: si major, languidioris coloris. Figuræ 8. apud Tab. & Ger.

Fumaria bulbosa purpureo flore nomine, quatuor: eodèdè flore albo.

Viridi flore Lobelius observavit, & nomine

Radix cava viridi flore, in iconib. proposuit.

Radix

Radix cava, Cast.

II. Fumaria bulbosa radice non cava major. Aristolochia rotunda vulg. radice solida, Trag. Arist. rot. altera species radice solida, Gesl. hort. Capnos sive Capniū phragmites min. Cord. in Chelid. Capnites radice integra, Thal. (Diosc. Aristolochia rotunda fl. albo, Eysl.

A prima diff. radice, quæ in illa cava, in hac solida: dein in illa, folia quæ flores inerecedūt, integra sunt, in hac verò incisa: cum in illa flores pauciores & majores colore variâtes: in hac minores, copiosiores, eleganti purpura rubêtes;

alterius coloris hæc tunc non observavitandem, nunquam utramque eodem loco reperimus, illa enim pinguiori solo delectatur.

III. Fumaria bulbosa radice non cava minor, Chelidonia phragmitis 1. Cord. hist. Fabacea radice Capnos altera, Ad. Lob. Radix cava minor. Dod. Cast. Clus. hist. Ger. Capnos fabacea radice, Lugd. Fumaria bulbosa seu ruberosa minor, Tab. Aristol. rotunda vulgaris minima, Cam. A majore diversa est, & florum herbaceis rudimentis variat.

## CHELIDONIUM

**X**ENOKRATES Dioscoridis l. 2. c. 217 cui χελιδών, id est, hirundo avis, nomen imposuit: vel quod hæc primum invenerit, oculis pullorum excacatorum, visum hæc restituens, ut ex Dioscoride. Plin. l. 25. c. 8. refert: vel ut idem l. 8. c. 27. Chelidonium visus saluberrimum birundinis monstravit, vexatis pullorum oculi eam dederit: quibusdam sic dicitur, quod in birundinum adventu floreant, & discessu marcescant. Apud Theophr. 7. hist. 2. Hirundinariam Gaza vertit.

Genera duo Diosc. & Plin. l. 25. c. 8. majus & minus, quæ cum figurâ multum differant; de minore alibi agemus.

I. Chelidonium majus vulgare. Chelidonia, Brunf. major, Ang. Chelidonium majus, Trag. Mart. Fuch. Tur. Lac. Cord. hist. Gesl. hor. Dod. Ad. (& Hirundinaria major) Lob. Cast. Cæs. Lugd. Thal. Tab. Ger.

vulgare, Clus. hist. II. Chelidonium majus foliis quernis. Chelid. majus laciniato flore, Clus. hist. In Phytopinace, Mathiolo, & Tabern. descriptum.

## AQVILEGIA.

**A**quilegia, quæ quibusdam Chelidonia sylvestris, videtur dicta quæst Aquilina, ob florum mucrones adnatos, ut sunt aquilinus unguis: Veterum Porboi Costæ, Jassone Theophr. 11. hist. 21. Celsapino: Jovis flor, Dalechampi in Athenæum: Isopyrum Dioscoridis l. 4. c. 21. Columba: at Gesnero Leonostemum dicitur. Variat potiss. flore: est communiter majore, rarius minore ex corniculis composito, colorum diverso: rarius roseo est flore cœq, vel simplici vel pleno.

Aquilegia simplex.

I. Aquilegia sylvestris. Aquilegia, Treg. Fuch. Lugd. Lon. Cæs. (columbina quibusdam) Ger. fl. cæruleo, Suvver. Aquileia, Fuch. Er. Cord. Gesl. Dod. syl. Thal. Aquileia simplex, Cam. Aquilina, Marth. Ad. Lob. Cast. Tab. Isopyrum Dioscoridis, Colum.

Flore est cæruleo, & vix alterius quàm puniceo coloris, in sylvestribus reperias.

II. Aquilegia hortensis simplex.

Aquilina rubra, Lob. ico. Aquilina, Cast. alba, Tab. Aquileia rubra, Ger.

1. Aquilegia fl. albo simplici, Bry. Eysl. Aquilegia alba cærulea, Suvver.

2. Aquilegia castanei coloris, Suvver.

Hæc diversorum colorum reperitur, cæruleo, candido, incarnato rubro, variegato ex cæruleo & purpureo: candido, nonnullis veluti lituris cæruleis aspersis.

III. Aquilegia mont. magno fl. quæ 1. in Prod.

IV. Aquilegia montana parvo flore, Thall. tri folio: quæ 2. in Prod.

Aquilegia pleno flore.

I. Aquilegia hort. multiplex flore magno. Aquileg. multiflora variegata, Lob. ico. & multiplici vario colore flore, Eid. pleno fl. 1. 2. Cam. Aquileia multiplici flore, Dod. multiplex, Ger. Aquilina pleno flore, Clus. hist. multiplex sive 4. 5. 6. 7. & 8. Tab.

Flos cæruleus, violaceus, cinereus, blandè vel saturè rubens, albus, ex albo cæruleo, violaceoq; variet mixtus, maculatus.

1. Aquilegia

1. Aquilegia fl. cæruleo pleno, Eyst.  
 2. Aquilegia fl. albo pleno, Eyst.  
 3. Aquilegia fl. pleno incarnato, Eyst.  
 4. Aquilegia flore purpureo, Eyst.  
 5. Aquilegia flore rubro, Eyst.  
 Aquilina flore rubro, Bry. Svvert.  
 6. Aquileia variegata, Bry.  
 Aquilegia fl. variegato duplici, Svvert.  
 II. Aquilegia hort. multiplex flore parvo.  
 A priore floris magnitud. & pullo colore differt.  
 III. Aquilegia hort. multiplici flore inverso.  
 Aquilina plenis multiplicib. flor. Lob. ico. Lug.  
 Aquilina inversa multipl. albo colore, Lob. ico.  
 Aquilina pleno inverso flore, Clus. hist.  
 Aquilegia inversa, Cam.  
 Aquilina 9. Tab.  
 Aquilina carnei coloris, Bry.  
 Aquilegia alba, Svvert.

Aquilegia cærulea inverso flore, Eyst.  
 IV. Aquilegia flore roseo multiplici.  
 Aquilina pleno roseo flore, Clus. hist. Bry.  
 Floris color communiter cæruleus, est & albus, rarissim. carneus sive blandè rubens: vel albus nigris punctis aspersis: hinc  
 1. Aquilegia stellata flore purpureo, Eyst.  
 2. Aquilegia stellata rubescens, Eyst.  
 3. Aquilegia stellata flore violaceo, Eyst.  
 Aquilegia stellata cæruleo violacea, Svvert.  
 4. Aquilegia stellata flore albo minutissimis nigris punctis ornata, Eyst.  
 V. Aquilegia degener virescens: & Cam.  
 Aquilegia degener virescens. Lob. ico.  
 Aquilina degener, Clus. hist. Bry.  
 Aquilina 10. Tab.  
 Aquilegia stellata rosea, Svvert. (rascens.  
 Flos vel viridis omnino, vel ex viridi purpu-

## NIGELLA SEU MELANTHIUM,

eiusque species.

**N**igella, à nigro seminis colore communiter dicta, Dioscorid. l. 3. c. 93. Μαύσθρον est: de qua Theophr. 7. hist. 9. Plinios l. 20. c. 17. Girbex Græci, alij Melanthion, alij Melanthermon vocant, & quod odor asissimum & nigerrimum, optimum est.

Genera: Dioscorides & Veteres unum meminere: nobis, sativa est & sylvestris: Sativa simplici & pleno, magno & parvo flore: semine nigro, subflavo, luteo.

I. Nigella arvensis cornuta.  
 an Melanthium & Gith Dioscoridis.  
 Nigella sylv. & 2. Trag.  
 Melanthium sylv. Fuch. Dod. Ger.  
 Cuminum syl. alterum, Fuch. ico. Cord. in Diosc.  
 Melanthium sylv. alterum, Matth. Cast. Lugd.  
 Nigella sylv. altera, Dod.  
 Melanthium capitulis reflexis aquilegiæ, Lob.  
 Nigella cornuta, Cord. hist.  
 Nigella vulgò dicta, Cæs.  
 Nigella sylv. Gesn. hort. Lon. Cam.  
 Melanthium agreste, Tab. arvense, Clus. hist.  
 Meminit Tab. Melanthij agrest. alterius, quod folis capitulis magis reflexis, à priori differat.  
 II. Nigella latifolia flore majore simplici cæruleo: quæ l. in Prod.  
 Melanthium Hispanicum majus, Eyst.  
 III. Nigella angustifolia flore majore simplici cæruleo.  
 Nigella Damascena, Trag. Cord. hist.  
 Nigella, Cord. in Diosc.  
 Nigella hort. altera, Euch. Lon.

Melanthium sive Nigella, Ad.  
 Melanthium sylv. Matth. Lac. Lob.  
 Melanth. sylv. quod Damascenum cognominatur, Clus. hist.  
 Melanth. sylv. prius Matthioli, Lugd. qui duas figuras habet.  
 Melanthium Damascenum, Dod. Tab. Cam.  
 Melanthium Damascenum alterum, Fuch. ico.  
 Melanthium sativum flore simplici, Eyst.  
 Isopyrum, quod Matth. Durantes, Lugd. & Taber. pingunt: nil aliud censemus, nisi quod folia Anisi infernè sint adpicta, quo Dioscoridis Isoporum exprimere videatur.  
 IV. Nigella flore majore pleno cæruleo.  
 Nigella flore majore & numerosioribus folijs, Suneg. Ægyptijs, Alpino.  
 Melanthium Damascenum pleno flore, Clus. hist. Eyst.  
 V. Nigella flore minore simplici candido.  
 Nigella hort. Trag. sativa, Lon.  
 Melanthium sativum, Matth. Lac. Dod. Cast. Lugd. Tab.

Melanth. Fuch. ico. hortense primum, Eid. fol.  
 Melanthium sive Nigella Romana odora, Lob.  
 Git sive Nigella Romana, Tur.  
 Nigellæ alterum genus, Cord. hist.  
 Melanth. Ger. sativum simplici flore, Clus. hist.  
 Nigella, Gef. nostra, Ang. altera, Cæf.  
 Melanth. Damascenum semine pallido.

Semine est nigro, aliquando pallide flavente: semine luteo in horto habuimus: rarius candido reperitur.

VI. Nigella flore minore pleno & albo.  
 Cardamomi 3. species, & Nigella citrina, Lac.  
 Nigella citrina, Ad. flore albo multip. Lob. Lug.  
 Nigella flore candido, Cæf.  
 Semen ex Oriente adfertur, inter Cardamomi

genera, & Nigella citrina dicitur, Cæf.  
 Melanthium citrinum multiflorum, Taber. sub  
 Damasceno, Ger. ico.  
 Melanthium pleno flore, Clus. hist.  
 Melanth. sive Nigella flore pleno, albo, Cam.  
 Nigella peregrina flore multiplici, Eyft.

VII. Nigella Cretica.  
 Melanthium simplici flore, Creticum, Clus. hist.  
 Hujus descriptionem in Phytopinace sub 6.  
 in Prod. sub. 2. & in Matthiolo cum figura exhibuimus: in Tabern. nostro figura sub titulo Nigellæ flore pleno, malè posita fuit.

VIII. Nigella Cretica folio fœniculi.  
 Melanthium peregrinum sive Creticum, Ponzæ in Baldo Ital.



## SECTIO QUARTA.

## UMBELLIFERÆ.

CUMINUM; FOENICULUM; ANETHUM; MEUM; PYRETHRUM; FERULA; THAPSIA; TURPETUM; PEUCEDANUM;

Daucus; Pastinaca tenuifolia; Gingidium; Chærophylum; Scandix;  
 Causalis; Apium; Sifon; Sion.

## CUMINUM.

**K** *varior Dioscoridis l. 3. c. 63. Theoph. 7. hist. 4. at Plinio l. 19. c. 8. & l. 20. c. 14. & 15. Cuminum.*

*Genera: Dioscoridi sativum est, cui Aethiopicum, quod Hippocrates regium vocavit, præfert: secundum locum tenet Aegyptium, reliqua sequuntur. Est & sylvestre: alterum, capitulum in cacumine rotundum: alterum, quod à singulis floribus cornicula in sublime erecta promit. Theophrasto genera plura sunt: quare Plin. l. 20. c. 25. Sativum est & sylvestre, Aethiopicum & Africanum: at l. 19. c. 8. alterum sylvestre rusticum vocatum, alijs Thebaicum: Aethiopicum, Africanum, palma est: quidam huic Aegyptium præferunt.*

### I. Cuminum semine longiore.

Cuminum sativum, Brunf. Trag. Matth. Lac.  
 Cord. hist. Lob. Cæs. Lugd.

Cuminum, Tur. Lon. Ad.

Cumin. Officin. Cumini syl. 3. genus Diosc. Cæs.

Cyminum, Ang. Cord. in Diosc. (cui & Cyminum Romanum) Tab. sativum, Cam.

Cuminum Aethiopicum, Carnabadium Calsi  
 Bafsi & Myrepfij, Guil.

### II. Cuminum semine rotundiore & minore.

Cuminum dulce Melitenfibus.

Hujus plantam non vidim: at cum Dalechampi in Plin. l. 20. c. 15. notus legissemus, ex Melita duplex Cuminum, utpote acre & dulce adferri: & apud Megiserum in Melitæ descriptione, idem invenissemus, ejus nomine ut haberemus labo-

ravimus: quare, utriusque semen è Melita insula transmissum fuit: alterum oblongum, acuminatum, coloris sordidi, graveolens & sapore acri, cui Cimonagero, i.e. Cuminum syl. inscriptum erat: quod cum Cymino Aethiopico officinarum convenit. Alterum verò multò minus, Aniso simile, candidius, gustus lenioris & subdulce, quod nomine Cimonagero dulce, missum. Apud Melitenfes copiosè feritur, ad panem condiendum & ad mercaturam cum eo exercendam.

### III. Cuminum syl. capitulis globosis.

Cuminum syl. 1. Matth. Lugd. Cast.

Cuminum syl. Ang. Dod. Ad. Lob. ico. Ger.

Lago chymeni, id est, leporis cubile in insula Lemno, Bellon.

Cymin. syl. sive erraticum, Tab. syl. globos. Cam

FOENI-

## F O E N I C U L U M.

**M** *Agadpor* Dioscoridi, l. 3. c. 81. *ἄνισός τε παρὰ τὸν δαυδ*, à marcescendo, quod ejus cum inaruerit, ad epudienda plurima, multus usus sit. Plinio, l. 19. c. 9. Feniculum anguib' gratissimum, ad condienda plurima cum inaruit: & l. 20. c. 23. Feniculum nobilitare serpentes, gustata senectam exuendo, oculorumq; aciem succo ejus rescicendo. Latini Feniculum, quod satum magno cum sanore semen reddat: vel potius Græcorum imitatione, quod quasi sanum in hyemes arefactum ac marcidum reponatur.

Genera: Dioscoridi est sativum, sylvestre, quod innotat *Agadpor* & duplex est: alterum semine magno, *Cachrys* simile: aliud semine Coriandri. Idem Plinius, l. 20. c. 23.

Recentioribus est vulgare sive sativum, dulce, rotundum, & erraticum, sive Hippomarathrum.

I. Feniculum vulgare Germanicum. Fenicul. Brunf. Trag. Fuch. Dod. gal. Tur. Cord. in Diosc. Tab. commune. Gesf. hor. vulgare, Ger. Fenicul. syl. cujus semen exilius & acrius, Cæs. Feniculum nostrum vulgare, quibusdam Hippomarathrum putatum, Cam. hort.

Huic accedit Mediolanense, quamvis vulgato Germanico gratius sit.

Variat foliorum colore: nam commune folijs est virentioribus, altera subnigricantibus, rubentibus, aliàs non differens: quare Feniculum 1. & 2. facit Dodonæus.

II. Feniculum vulgare Italicum semine oblongo gustu acuto.

Fenicul. Matth. Lac. Cast. vulgare, cujus semen pallidum sive luteum oblongum, Lugd.

Feniculum acre, Ang.

III. Feniculum dulce.

Feniculum dulce, Matth. Lac. Ang. Gesf. hort. Ad. Cast. Ger. defc.

Fenic. 3. Dod. solo sapore à primo distinctum.

Fenicul. sive Marath. vulgatus dulce, Ad. Lob.

Fenicul. hort. semine crasso in rotunditate oblongo, Cæs. quod anno secundo in sylv. transit.

Fenicul. dulce semine majore, gustu anisi, Lugd.

Feniculum Romanum cujus semen pallide luteum, Tab. quod tertio anno in comunc transit.

Feniculum Italicum fortè hort. veterum, quod etiam in nostrum transit. Cam. ep. Matth.

Feniculum majus, Eid. hort.

Hoc semine est vel rotundiore, quod Romanum & Florentinum dicitur: vel in rotunditate oblongo, quod omnium gratissimum & dulcissimum, & Bononia adfertur.

IV. Feniculum semine rotundo minore. Feniculum rotundum, Tab. vulgare, Ger. ico.

A vulgato sapore & odore non differt, sed humilior est, umbella candida, semenque vulgari minus & Carui forma.

V. Feniculum sylvestre.

Feniculum erraticum, Matth. Lac. sponte virens in agris Narbonensium, Adv.

an Hippomarathrum, Ang.

VI. Hippomar. Creticum: de quo in Prod. an Hippomarathrum cujus semina magna cachrysimilia, Hon. Belli ep. 1. ad Cluf.

VII. Chaa, herba in Japonia, ex cujus pulvere decoctum preciosum parant, & hospitibus dignioribus propinant: & olla in qua hujus herbæ decoctio facta, in eo apud ipsos precio, in quo apud nos Adamantes sunt: Linscot. par. 2. Ind. Orient. cap. 28.

## A N E T H U M.

**A** *Anethum* Dioscoridi, l. 3. c. 67. *ἄνιθον* à *ἀνέθω*, quod cito crescat: Theophr. 1. hist. 8. cui 7. hist. 4. pluræ ejus genera, quæ non recenset. Plinio l. 20. c. 18. Anethum.

I. Anethum hortense.

Anethum, Brunf. Trag. Matthiol. Fuch. Tur. Dodon. Cord. in Dioscorid. Gesf. hort. Ang.

Lac. Ad. Lob. Cast. Lon. Cæsalp. Lugd. Tab.

Cam. Ger.

Abinthium dulce, Pundeft. Monach. in Mef. Toxites.

II. Anethum sylvestre majus.

Aneth. syl. grandius sativo, folijs feniculi Cæs.

III. Anethum sylv. minus: in Prod. defc.

## M E U M.

**M** *ἔνθεν ἀναγερμένον ἢ μάθω*, Meum *Asbamant*. Diosc. l. 1. c. 3. Similiter à Plinio, l. 20. c. 23. nominatum, Meum, scribit, in Italia non nisi à Medicis ferriur, & ijs admodum paucis. Duo genera ejus (Macedonicum scilicet & Hispan. non quidem ea duo diversa genera sunt) in locis plurimum gignitur: hac addit





Thapsia 2. vel tenuifolia, Clus. hisp. & hist.  
Thapsia angustifolia, Tab. tenuifolia, Ger.  
V. Thapsia carotæ folio.  
Thapsia, Matth. Ang. Lon. Lug. Cast. Cæs. Cui &  
Turbit album Mesuei.  
Thapsia major, Cord. hist.

Thapsia vera & Turbith montis Gargani, Ges.  
hort.  
Thapsia vulgaris carotæ effigie, Ad. Lob.  
An hæc Ferula Sagapenifera.  
Huj. radix sæpe pro Costo, magno errore venditur, uti supra inter Costi genera ostensum fuit.

## T V R P E T V M.

**T**urbith vox Arabica est, ab Avicenna & alijs usurpata, quamvis aliqui à turbando deducant, quòd propter magnam violentiam, purgando corpus turbet. Duplex est, aliud Arabicum, aliud Indicum. Arabicum, Mesueo 2. simpl. est radix herba. folia Ferula minora ferunt & lacteo succo turgentis: qua sanè causa, cur alijs Pityusa, alijs Alzpi, nonnulli Tripolij Græcorum radicem esse voluerint: cujus genera varia Mesueo, domesticum, sylvestre, inagnum, parvum, album, nigrum & flavum. Indicum; radice non est magna, nec longa, caule hedera modo per solum extenso, digiti crassitudine: folijs & floribus Althea similibus, cujus tantum cauli pars inferior juxta radicem gumuosa, utilis est, Acofta, Frag. Dodonæo ex Garzia monentibus. Quare hoc ab eo, quo in Officinis vulgo utuntur, longe aliud est, monente etiam Clusio in Garziam. Idcirco inter se differre volunt, Turbith Avicenna, & Turbedh aut Tarbadh.

I. Turpetum Acabum, seu Turbit Officin.  
Turbit Mesuæi, Matth.  
Turbitum sive Turbit Arabum, Cord. hist.  
Turbith Alexandrinum, Ad. Lob. ico Ges. Cast.  
Tripolium Diosc. si Serapioni credimus, nil aliud est quam Turbith, Cord. in Diosc.  
Turpetum Mesues, rithymalli myrsinitis radix, Bras. at Fuch. Thapliæ radix.  
Turbit, Off. & Hispaniæ officinæ, Thapsig radice pro Turpeto legitimo utuntur, & multis per Europam locis, Scammonææ radicem concisam pro Turpeto legitimo ostendunt, Clus. in Turpetum, Tab.

Addit Fragosus Turbit aliud genus, à paucis annis in Officinis usitatum, quo vocitent de la Tierra, quod quarundam arundinum radicem esse dicant.

II. Turpetum repens folijs Altheæ, vel Ind. Turbith Garziæ, Acoftæ, Trag. Dod.

III. Pseudoturpetum Garganicum.

Turpetum, quod potius Pseudoturpetum dixeris, ex Gargano Apuliæ monte duplex, utrum de Thapliæ, alterum de Pityusæ radicibus, impositores concinnant, Garz.

Turbith ex Apulia, turbith non est, sed ex la Garz. & secundu aliquos Thapsia, Acoftæ.

## P E V C E D A N V M.

**P**eucedanum Dioscorid. l. 3. c. 92. Theoph. 9. hist. 14. est qui velint, nomen ab amaritudine sortitum esse, tamen à nonnā, qua Lat. Pinus, dictum videtur, cuius hujus folia cum Pini folijs similitudinem quandam habeant: unde & Pinastellum aliquibus nominatur. Peucedanum Plin. lib. 25. c. 9.

I. Peucedanum majus Italicum.  
Peucedanum, Matth. Ang. Lac. Lugd. Cæs. Cast.  
Peucedanum Italicum, Tab.  
Peucedanum majus Italicum, Lobel. Lugd. majus, Ger.

Peucedanum folijs longioribus, Dod.

II. Peucedanum Germanicum.

Peucedanum, Trag. Fuch. Dod. Cord. in Diosc.

& hist. Gesf. hort. Tur. Ad. Lob. (cui & Fœniculum porcinum) Lon. desc. Lugd. Ger. Tab. cui & cauda porcina.

III. Peucedanum minus.

Saxifraga 3. Matth. Lugd. Cast.

Saxifragum, Lac.

Peucedani facie pusilla planta, Lob. ico.

Peucedanum Pannonicum, Clus. pan. & hist.

## D A V C V S.

**Δ**αυν Diosc. lib. 3. cap. 83. Daucus, Daucum, & Daucium Latinū.

Genera tria Diosc. primum Creticum folijs fœniculi: alterum apio sylvestri simile: tertium folijs Coriandri Dioleis verò, l. 3. de salub. quartum addidit nempe Straphylinum. Plin. l. 25. c. 9. ait. Dauci genera quatuor, Petronius Dioscorum fecit, cum sint differentia duæ: probatissimum in Creta fœniculi similitudine; alterum

*folijs Coriandri : si tertium genus facere libeat, est simile Staphylino, quod Pastinacam erraticam appellant. Idem, lib. 19. cap. 5. Pastinaca quartum genus, quam nostri Gallicam vocant, Græci verò Daucon, cujus generis etiam quatuor fecere. De Dauco Theophrasto capite sequetur.*

**I. Daucus folijs scæniculis tenuissimis.**

Daucus 1. Matth. Lugd.

Daucus, Lac.

Daucus Cretensis verus Diosc. Ad. Lob. ico. Ger.

Daucus Creticus, Cast. desc. Gefn. Tab.

**II. Daucus alpinus multifido longoque folio, sive montanus umbella candida.**

Daucus Creticus, Gefn. hort. Cam. ep. Matth. & hort. Clus. pan.

Daucum montanum, Cæs.

Variat aliquantum: nam qui in Baldo, folijs est brevioribus compactioribus: qui verò in Helvetiorum alpib. & monte Wasserfall/longioribus & rarioribus: & Lujus Gefn. in ap. meminit, quem cum eo in Baldo eundem, aut certe similem, & earundem virum scribit.

**III. Daucus mont. multifido breviq; folio. Saxifraga Pannonica, Clus. pan. & hist.**

**IV. Daucus montan. multifido folio Selini semine.**

Selinum mont. pumilum, Clus. pan. & hist.

Oreoselinum, Tab. ico. Ger. tertium, Tab. fol.

**V. Daucus mont. apij foliis major.**

Daucus 2. Trag. (cui & Sefeli 2.) Matth. Lugd.

Dauci 3. genus, Fuch.

Libanotidis alterum genus, Dod. gal. Lugd.

Libanotis nigra Dodonæi, Gefn. hort.

Sefeli peloponense, Fuch. ico. Gefn. hort. Cam.

Elaphoboscum nigrum, Lon.

Saxifraga Venetorum, Ad.

Daucus Selinoides 2. Ad. Lob.

Sefeli pannonicum 2. Clus. pan. ico. 2. montanum, Eid. hist. ico.

Libanotis nigra, communiter Cervaria nigra, Thal.

Libanotis Theoph. nigra, Tab. Ger.

Varietas; 1. est folijs pallide virentibus & splendentibus. 2. folijs latioribus, forte obculturam, quam Pseudo-costum Cortusius nominabat. 3. folijs minus divisis, supina parte dilutius virentibus & aliquantulum splendentibus. 4. pronam subcinereis, quam Cervariæ nigrae nomine, Lipsiâ D. Jungermannus misit.

**VI. Daucus mont. apij folio minor.**

Apium mont. & Oreoselinum nigrum, Gef. hor.

Dauci secundi Selinoidis varietas, sive Selinoides Cordi, Lob. obs.

an Daucus Selinoides latifolius, Cord.

an Apium sylvaticum, Thal.

**VII. Daucus mont. apij folio albicans.**

Seli 2. mont. pannonicum, Clus. hist. desc. Sefeli peloponensis Jenensium nomine, D. Jungermannus misit.

**VIII. Daucus mont. apij folio flore luteo: qui 1. in Prodomo.**

**IX. Daucus prat. apij folio: qui 2. in Prod.**

**X. Daucus campestris apij folio.**

Dauci 2. genus Dalechampij, Lugd.

An fortè Pimpinella Saxifraga.

**XI. Daucus petroselinii vel coriandri folio.**

Bunium Dalechampij, Lugd.

**XII. Daucus Cret. nodosus umbella lutea.**

Daucus 3. Cret. Belli, Ponæ & ep. 1. ad Clus.

**XIII. Daucus pratensis millefolij palustris folio.**

Daucus prat. Dalechampij, Lugd.

Hic folijs & umbellâ, quæ tamen alba est, cum Millefolio aquatico Matthioli convenit, folijs tamen inferioribus, Coriandro simili- bus, exceptis.

## PASTINACA.

**Σ** Tapoviv. Diosc. l. 3. c. 59. fortè à colore uve nigricantis, cujus coloris, unius radix est: qui sylvestris, in cujus umbellâ candida medio, exiguum quid coloris purpurei, cernitur: & etiam sativi meminit. *Daucon* Theophrasto (Pastinacam Gaza vertit) 9. hist. 15. cui Daucus specie Lauri, colore croci apud Archades nascitur: & in Patrensi agro præstantior ceteris: huic vi calefactoria est, radix nigra: & c. 22. Daucum agro Spartensi Achaja laudatissimam referunt: naturâ calefactoriam, radice nigram.

Pastinaca (quæ à pascendo dicta videtur, cum corpus alat) nomine, Latinus quatuor plantas significavi, Plin. l. 19. c. 5. ostendit; Pastinaca, inquit, unum genus agreste, sponte provenit. Staphylinum Græcè dicitur: alterum feritur radice, vel semine: est & quartum genus in eadem similitudine Pastinacæ, quam nostri Gallicam vocant, Græci verò Daucon: at l. 20. c. 5. Staphylinum, pastinacam erraticam appellant.

*Duplex est Pastinaca, tenuifolia & latifolia: detenuifolia tam sativa, quàm sylvestri nunc: de latifolia, sectione quinta.*

I. *Pastinaca tenuifolia* syl. Dioscoridis, vel  
*Daucus Officinarius*.  
*Daucus agrestis*, Gal. de alim.  
*Pastinaca erratica*, Plinio, Fuch. Cord. in Dioscorid. Tab.  
*Staphylinus* sylv. Trag. Dod. gal. Cæs.  
*Pastinaca* sylv. Matth. Lac. Lon. Cast. Lugd. syl.  
*tenuifolia*, Dod. Ger.  
*Daucum Officin. usitatus*, Ad.  
*Pastinaca* sylv. genuina Diosc. Lob.  
*Pastinaca* 2. Tur. 4. Plinij, Cam.  
*Dauci* 3. genus, Dod. gal. Thal.  
*Daucus vulgaris*, Clus. hist.

Differt magnitudine & parvitate: sic & ratione umbellæ, in cujus medio aliquando macula purpurea, subnigræ, aliquando crocea: folijs etiam, aliquantum lationibus, in altera multò tenuioribus: quare Thal. illam, *Daucum* 3. Dodonæi, hanc verò *Daucum* 3. *tenuifolium* nominat.

II. *Pastinaca tenuifolia* syl. umbella majore.  
*Pastinaca* sylv. *daucoides* Apula, Col.

Umbellæ est majore, obscure purpurascens, quæ non in totum, ut in priore, conglobatur.

III. *Pastinaca* sylv. hirsuta echinato fructu.  
an *Daucus angulosus*, Cordi hist.

*Daucus* *hirsutus* Thal. id est, hirsuto caule, Thal.

IV. *Pastinaca* syl. angustifol. fructu echinato.  
*Pastinaca echinophora* Apula, Colum.

Hanc ad D. Columna accepimus.

V. *Pastin. tenuif. sativa* radice lutea, vel alba.  
*Staphylin. sativus* & *Daucus domesticus*, Gal.

*Staphylinus* 1. & 2. Trag. luteus, Dod. gal.

*Sifer*, Lac. alterum, Matth. Tab.

*Carota crocea* malè *Sifer*, Guil.

*Pastinaca sativa* 1. Fuch. *sativa flava*, Lon.

*Pastinaca sativa* 1. & 2. Tab.

*Pastinaca radicebus* luteis, vel albis, Ges. hor.

*Pastinaca sativa* Diosc. Lob. Cord. in Diosc.

*Pastinaca tenuifolia sativa*, Dod. Ger.

*Carota vulgaris* radice flava, Ad.

*Carota radice buxei coloris*, Cæs. ex albo flavescens, Cast. nostra lutea, Cam.

*Pastinaca* 3. *Daucus Staphylinus altis* & *hortensis*, vulgo *Carota*, Cam. hor.

Variat solum radice colore, quæ vel alba, vel pallide lutea, vel lutea est.

VI. *Pastinaca tenuifolia sativa*, radice atterubente.

*Staphylinus sativus* Dioscoridi.

*Daucus radice nigra*, Theophrasti.

*Pastinaca sativa*, Plinij.

*Staphylinus* 3. Trag. niger, Dod. gal.

*Carota*, Matth. altera, Lugd. radice sanguinei coloris, Cæs. radice rubra, Cast.

*Pastinaca sativa altera*, Fuch. prima, Tur. *sativa rubens*, Dod. Tab. *atterubens*, Lob.

*Daucus niger* Theoph. *Carota vulgaris*, Ad.

*Pastinaca radicebus* purpureis, Ges. hor.

*Been rubrum* & *album*, an *Daucus sativus* & sylv. Galeni, Ang.

*Carota Italica* radice rubra & alba, *Been rubri* & *albi* *αἰνισανίμων* esse volunt aliqui, non malè, Camer.

## GINGIDIUM.

*Γύγγινος* Dioscorides lib. 2. cap. 167. *herbam sylvestri Staphylino similem dicit: & Plin. lib. 20. cap. 5. Gingidium similitimum Staphylino.*

I. *Gingidium folio fœniculi.*

*Gingidium Dioscoridis*, Ravv. Lugd. ap.

*Gingidium Syriacum*, Cam.

II. *Gingidium umbella oblonga.*

*Seseli*, Trag. ico.

*Vifnaga*, Matth. Ad. Lob. Lugd. Cast. & *Pastin. sylv. major*.

*Gingidium*, Ang. Cord. in Diosc. & hist. Dod.

gal. Clus. hist. cui & *Bifnaga*.

*Seseli Mafsiliense*, Fuch. Dod. gal. ico.

*Dauci genus tertium*, Fuch. ico.

*Cumini sativi alterum* genus, Cæs.

*Gingidium alterum*, Dod. tertium, Tab.

*Gingidium Hispanicum*, Ger.

III. *Gingidium folijs Chæresfolij.*

*Gingidium*, Matth. Lugd. Cast. primum, Tab.

IV. *Gingidium folijs Pastinacæ latifoliæ.*

*Gingidium folijs Bauciæ Syriacum*, Lob. Lugd.

*Gingidium primum*, Dod. secundum, Tab. (& latifolium) Ger.

## CHÆROPHYLLUM.

**C**hærophyllum Columella habet : an Plinij l. 19. c. 8. sit Cerephyllum, quod Pederota Græci vocitant, propter brevitatem asserere non licet : & potius ejusdem Anthriscus, lib. 6. cap. 22. fortè Theophr. 7. hist. 7. cideuon, Enthusium Gaza vertit. Ο'ρουθων Dioscoridū quibusdā videtur.

I. Chærophyllum sativum.  
Cherofolium, Brunf. Dod. sativum, Trag.  
Cerefolium, Matth. Cast. Lugd. vulgare, Ger.  
Cerefolium, Ang. Dod. gal. Gef. hort. Lon. Ad.  
Lob. (cui Gingidij species) Cæf. Cam. Tab.  
Oreofelinum, Ang. & Cæf. putant.  
Gingidium, Fuch. Tur. Lac.

II. Chærophyllum sylvestre.

Dauci sylv. genus, Gef. ap.  
Daucus separius, Gef. col.  
Anthriscus Plinij, Lugd.  
Cerefolium sylv. Tab. Apium sylv. Ger. icō.

III. Chærophyllum nonnihil similis.  
Percheper (i.e. Saxifraga) Anglorum, Ad. Lob.  
Scandix minor, Tab. (Lugd.)  
Alchimilla montana minima, Col.

## SCANDIX.

**Σ**καυδix Dioscoridi lib. 2. cap. 168. sylvestre oliv est, quod Gingidio subjungit : Theophrast. 7. hist. 8. Plinio lib. 6. cap. 22.

I. Scandix umbella ex apicibus coagmentata.  
Scandix, Lugd.

II. Scandix femine rostrato vulgaris.  
Peſten Veneris, Matth. Ang. Gef. hor. Ad. Lob.  
Cast. Lugd. Cam. Ger.  
Scand. Dod. Lac. Cord. in Diof. Gef. h. Cæf. Tab.  
Peſten Veneris, ὀβριοναύρισμα vulgo dicitur, Hon.  
Belli ep. 1. ad Cluf.

III. Scandix Cretica major : quæ 4. in Phytopin. prima in Prod.

IV. Scandix Cretica minor : quæ 3. & 5. in

Phytopin. at. 2. in Prod.  
Anthriscus Plinij, Cluf. hist.  
Anthriscus vulgo τριλιμνία, quod vulvæ purgamentum significat, cum Venerem excitet,  
Hon. Belli ep. 1. ad Cluf.  
an Scandix legitima quæ παύρισμα ὀβριοναύρισμα quæ comeditur, Eid. l. 1.  
Anisomarathrum Apulum, Colum. & Cluf. hist. flor. ap. alt.  
an Apium sylv. Dalech. Lugd.  
Duplex est odora & inodora.

## CAUCALIS.

**K**αυκαλις apud Dioscorid. lib. 2. c. 169. Scandicem sequitur, quam aliqui Daucum sylv. nominens, Plin. lib. 21. c. 15. secutus Dioscoridem, inter Olera recensuit.

I. Caulalis maxima Sphondilij aculeato  
femine.

Caulalis major, Cluf. hist.

II. Caulalis lato apij folio.  
Caulalis, Matth. Lac. Cast. Lugd.  
an Caulalis, Cord. in Diof.  
Daucoides majus, Cord. hist. Thal.  
Caulalis vulgior, Ad.  
Caulalis flore rubro folio latiore, Lob.  
Caulalis rubello flore, Cluf. hist.  
Gingidium, Cæf.

III. Caulalis arvensis echinata latifolia.  
Echinophora major platyphyllos purpurea, Colum.

an Caulalis saturè rubente flore, Cluf. hist.

IV. Caulalis arvensis echinata magno flore.  
Lappa agrestis, Trag.

Lappula canaria Plinij, Ang.  
Caul. Dod. (& Daucus sylv.) Gef. hor. Tab. Ey.  
Caulalis alia vulgaris, Lugd.  
Caulalis albis flor. vulgaris, Lob. Ger. albo flore proxime ad Dioscoridis accedens, Cluf. hist.  
Caulalis coronata umbella, Cam.  
Tribulus sylv. & Lappa campestris, Lon.  
Myrrhis lappa Dalechampi, Lugd.  
Dauci genus arvenſe, Gef. cat.  
Daucus αραβίακη seu ἑχινάκη, sive ἑχινάκη minor, Thal.  
Echinophora αραβίακη, an Gingidium Dioscor. Col.

V. Caulalis arvensis echinata parvo flore & fructu.

Caulalis flore minuto, Cam.  
an Echinophora leptophyllon purpurea, Col.

VI. Cau-

V I. *Caucalis Monspeliaca echinato magnofructu.*

*Lappa boaria Plinij, Lugd.*

*Caucalis secunda, Tab.*

*Daucus ixerinae major, Thal.*

*Echinophora alt. asperior, Col.*

V II. *Caucalis femine aspero flosculis rubentibus.*

*Daucoides minor, Cord. hist. Thal.*

V III. *Caucalis nodoso echinato femine: quod. 7. in Phytopin. at. 1. in Prod. & in Matth. nostro depictum.*

*Scandix, Colum.*

*IX. Caucalis peregrina femine rugoso.*

*Caucalis Hispanica, Cam. Clus. hist.*

*Gingidio congener, Cæf.*

*X. Caucalis tenuifolia montana: quæ 2. in Prodr.*

*XI. Caucalis pumila maritima.*

*Caucalis pumila, Clus. cur. post.*

*XII. Caucalis folio peucedani.*

*Caucalis Anguil. Ad. Lob. tertia, Tab.*

*Caucalis Anglica, Eid.*

*Caucalis Penæ, Lugd.*

## A P I U M.

*Σ* *Ελιον Dioscorides l. 3. capitibus sex 7 4. & seq. proposuit; hortense, ελασιλιον, in humidu: εγυαλιον in montosis: πετροελιον in Macedonia: ιπποελιον: tande η οριον in Cilicia proveniens. Theoph. hist. 4. de Selino egit, cuius plura esse genera 6. caus. 2 2. scribit: hec 7. hist. 4. inter se cum solijs, tam caulibus differunt: aliud enim folio spisso, crispo, densoq;: aliud rariore, latioreq; cauleq; maiore: horum iterum aliud candidi caulis, aliud purpurei, aut versicoloris. Plinius lib. 20. cap. 11. de Apio, Hippo selino, Eleo selino, & Oreo selino: & cap. seq. de petro selino & buselino egit.*

*I. Apium hortense, seu Petroselinum vulgo. Selino seu Apium, Theoph. & Diosc. Apium mas, Plinij.*

*Petroselinum, Brunf. Trag. Cord. in Dioscor. Anguil.*

*Petroselinum vulgare seu sativum, Lon.*

*Petroselinum sylv. Fuch. ico. vulgo Apium verum, Gef. hort.*

*Oreoselinum, Fuch.*

*Apium hortense, Matth. Lac. Dod. Ad. Lobel. Castor. Ger. (hor.*

*Apium commune, non rectè Petroselinum, Gef. Petroselinum vulgi, petroselinum verum pri-*

*scorum, Guil.*

*Apium domesticum, Cæf. sativum, Tab.*

*Apium sativum vulgare sive Petroselinum, Col.*

*II. Apium vel Petroselinum crispum.*

*Petroselinum crispum, Cam.*

*Apium hortens. crispatum, Ad. Lugd.*

*Apium crispum vel multifolium, Tab. Ger.*

*Apium sativum Sardum, Col.*

*III. Petroselinum Creticum.*

*Agriopastinaca vulgo in Creta, Belli ep. 5.*

*Duplex est, colore corticis radicum tantum differens: nam unius rufus, alterius niger conspicitur.*

*Buselinon fortè Plinij l. 20. c. 12.*

*IV. Apium hortense latifolium.*

*an Apium verum, Ang.*

*an Apium sativum Anglicanum, Col.*

*Hoc in Phytopinace, Matth. & Prodr. descriptum.*

*V. Apium montanum folio tenuiore.*

*Petroselinum Dalechampij, Lugd.*

*an Petroselini succedaneum, quod in Apulia*

*Anethum sylv. dicitur, Col.*

*VI. Apium montanum folio ampliore.*

*Oreoselinum sive Veeltgutta, id est, multibona, Dodon.*

*Oreoselinum, Ad. Lobel. (sive Petroselinum) Clus. hist. Ger.*

*Oreoselinum primum, Tab.*

*Apium montanum, Cast. Lugd.*

*Variat ratione loci, nam solijs tenuius divisus, in nostris pratis udis Michelfeldæ reperitur.*

*VII. Apium sylv. lacteofucco turgens.*

*Apium sylv. Dod. Lugd.*

*Daucus palustris, Gef. hort.*

*Olsenichium, Cord. hist. Thal.*

*Thyselinum Plinij, Lob.*

*VIII. Apium montanum nigrum.*

*Oreoselinum Parisiensium, Lugd.*

*IX. Apium peregrinum folijs subrotundis.*

*Selinum peregrinum 1. Clus. hisp. & hist.*

*Saxifraga tertium, Cæf.*

*Daucus tertium Diosc. 2. Plinij, Col.*

*X. Apium peregrinum cicuta folio.*

*Selinum peregrinum 2. Clus. hisp. & hist.*

Oreofelinum aliud, Lugd.

XI. Apium palustre & Apium Officinarium.

Apium, Brunf. Fuch. Lon. vulgare, Trag.

Apium palustre, Matth. Fuch. ico. Gef. hor. Lac.

Cast. Lugd.

Apium sativum & palustre, sola cultura differe-  
rens, Cord. in Diosc. & hist.

Eleofelinum, Tur. Dod. Lob. Ger. spontan. Col.

Paludapium, Ad. Tab.

Apij aliud genus, Cæs.

XII. Apium Macedonicum.

Petrofelinum Macedonicum, Matth. Ad. Lob.

Dod. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Apij alterum genus peregrinum, Cæs.

Daucus secundus Dioscoridis, Col.

XIII. Hippofelinum Theophr. vel Smyr-  
nium, Dioscor.

Petrofelinum Alexandr. Trag. Macedonicum  
verum, Ger.

Smyrnium, Matth. Cord. in Diosc. Gef. hor. Cast.

Lugd. Cam. Col. qui Dioscoridis vult.

Hippofelinum, Ang. Dod. Fuch. Lac. Cord. hist.

Gef. hor. Ad. (sive Olusatrum) Lob. Tab.

Alexander, Tur.

Olusatrum, Cord. in Diosc. Gef. hort. (quibus-  
dam Petrofelinum Macedonicum) Lon. Cæs.  
& Macerone vulgi.

XIV. Smyrnium peregrinum rotundo folio.

Smyrnium Creticum, Matth. Cast. Lugdun. Ca-  
mer. Ger.

Smyrnium Creticum putatum, Col. cui Hippo-  
felinum aliud Diosc.

Smyrnium, Dod. gal. Ad. Lob. Tab. verum, Gef.  
hort. Lugd.

Smyrnium Amani montis, Dod.

Olusatri alterum genus peregrinum, Cæs.

Perfoliata altera, Lugd.

XV. Smyrnium peregrinum folio oblongo:  
hoc in Prodromo descripsimus.

Pingit Columna sub titulo an Hippofelinon.

## S I S O N.

*Σίσων Dioscoridi lib. 3. cap. 64.*

Sison, quod Amomum Officinis nostris.

Amomum Germanicum, Trag.

Amomum Officin. falsò dictum, Gef. hort.

Sison, Ang. Tur. Gef. hort. Lugd. Tab. Cam.

Sison sive Sison, Cord. in Diosc. & hist.

Petrofelinum Macedonicum, Fuchsij, Dodon.  
Lon.

Amimi parvum, Gef. hort.

## S I O N.

*Σίσων Diosc. lib. 2. cap. 154. ἀνὸ τῷ σίσων, quod in aquis vacillando, ab aquis praterlabentibus succutitur  
vel potius ab excutiendū calculū, Plinio l. 6. c. 22. Sison fortè ejusdem l. 26. c. 8. Laver.*

I. Sion sive Apium palustre folijs oblongis.

Sion odoratum, Trag.

Sium, Cord. hist. Gef. hort. Dod. primum mi-  
nus, Taber.

Sium verum, Matth. Thal. Lugd. cui & Sium

Cratevæ majus.

Sij primum genus quod Laver, Fuch.

Laver, Dod. gal. Tur.

Apium palustre, Fuch. ico. Gef. col. Lon. Lugd.

Silaum Plinij, Ang.

Sium sive Laver Diosc. Olusatri folio, sive aqua-  
tica palestina, Ad. Lob.

Crescione vulgo, Cæs.

II. Sium latifolium.

Sium majus latifolium vel 3. & Sium medium,  
vel 2. Taber.

Sium majus, Ger.

III. Sium erucæ folio.

Sium alterum, Dod. Olusatri facie, Lob.

Sium alterum erucæ folio, Lugd.

Sium majus angustifolium, Tab.

Cicuta maxima quorundam, Eyst.

an Crescionis alterum genus, Cæs.



## SECTIO QUINTA.

PASTINACA LATIFOLIA; SISARVM; ANGELICA; IMPERATORIA; LASERPITIVM; PANAX; SPONDYLIVM; LIBANOTIS; CARVI; CORIANDRVM; ANISVM; AMMI; Pimpinella; Myrrhis; Cicuta & Cicutaria; Sefeli; Ligusticum; Bulbocastanum; Oenanthe & Filipendula; Pedicularis seu Fistularia, & Barba Capræ.

## PASTINACA LATIFOLIA.

**E** *Ἀνγίσθονος* Dioscoridi, lib. 3. cap. 80. & Plinio, lib. 6. cap. 22. id est, pabulum cervi, hoc enim pabulum cervos serpentibus resistere fama est, Diosc. & Plinio auctoribus.

- |  |   |
|--|---|
| I. Pastinaca sativa latifolia.                       | Pastinaca, Brunf. sylv. Trag. Ang. Cord. Gefn. horp. Thal. Cam. sponte nata, Cæs. |
| Pastin. sativa, Trag. Lac. ico. Lug. Gesl. hor. Cam. | Sifer sylv. Fuch. Tur.  |
| Pastinaca vulgaris, Dod. gal. Cæs.                   | Elaphobosum, Matth. Dod. gal. Cast. syl. Lac.                                     |
| Pastinaca domestica, Matth. Ang. Cast. Ad. Lob.      | Baucia, Pastinaca syl. Arabum, an Elaphob. Ad.                                    |
| Pastinaca latifolia sativa Dod. latifolia syl. Ger.  | Elaphosum erraticum, Tab.   |
| Sisarum sativum magnum, Fuch. Tur.                   | Pastinaca sylv. gallica, Cord. in Diosc.  |
| Sifer Dioscoridis, Col.                              | Pastinaca latifolia sylv. Dod.  |
| Elaphobosum sativum, Tab.                            | Spondylium, Ger.  |
| II. Pastinaca sylv. latifolia.                       |   |

## SISARUM.

**S** *ῥαπὺν* Diosc. l. 2. c. 139. vulgo cognitum, cujus radix elixa, ori grata est. Sifer Plinio. l. 19. c. 5. quod olim in Germania cibi causa ferebatur, quare eam quotannis à Germanis Tib. Cæsar, Plinio scribente, flagitavit.

- |  |   |
|--|---|
| I. Sisarum Germanorum.                               | Sifer Germanicum, Cæs. alp. cui Elaphobosum |
| Sifer, Brunf. Matth. Cord. in Diosc. Gesl. hor. Lon. | Diosc. & Plinij.                            |
| Sifer alterum, Lac.                                  | (Cam. Elaphobosum Dioscoridis, Col.         |
| Sifer sativum, Fuch. minus, Tur.                     | II. Sisarum Syriacum.                       |
| Sisarum, Trag. (& Rapunculus hortensis) Dod.         | Secacul Arabum & Maurorum sive Pastinaca    |
| Aug. Ad. Lob. Tab. Ger. majus, Lugd.                 | Syriaca, Rauvv. Lugd. ap.                   |

## ANGELICA.

**A** Angelica, quam aliqui ad Smyrnium, alij ad Laserp sive Sulphurum Cyrenaicum referunt: etiam S. Spiræur radix dicitur, vel à radice suavissimo odore, vel à facilitate singulari, quæ contra venena valet.

- |   |  |
|---|--|
| I. Angelica sativa.   | Huc referenda est Angelica Scandiacæ, sive     |
| Angelica, Brunf. Ang. Gefn. hort. Lac. Ad. Lob.   | Archangelica Tabernæmontani, quæ umbella       |
| Cast. Tab.  | est flava, semine rotundiore, & ex Norvegia ac |
| Angelica major, Dod.  | Pomerania adfertur.                            |
| Angelica sativa, Trag. Matth. Fuch. Dod. gal.   | II. Angelica sylvestris major.                 |
| Lon. Lugd. Cæs. Ger.  | Angelica sylv. Trag. Matth. Fuch. Dod. Lon.    |
| Angelica odorata, Gefn. col. Cam.   | Ad. Lob. Lugd. Thal. Cam. Tab. Ger.            |
| Smyrnium, Cord. in Diosc. & hist.   | In locis humidioribus, folijs est tenuioribus. |
| Laserpitium, Lac.   | III. Angelica syl. minor sive erratica.        |
| Variat radice; nostra enim crassior, Bohemica minor & nigricans; illa citius, hæc tardius | Pycnocomos, Brunf.                             |
| corruptitur.  | Angelicæ vitium (& Osteritium sylv.) Trag.     |
|   | Lon. Herba Gerardi, Dod. Ger.                  |

Elaphobosco similis, Cord. in Diosc.  
 Corchorus quibusdam, Gesn. hort.  
 Podagraria, Ad. Lob. Cast.  
 Angelica erratica, Thal. sylv. communis, Cam.  
 Eriopodium, Tab.  
 Foliorum incisuris mirè variat.  
 IV. Angelica sylvest. hirsuta inodora : in  
 Prodr. descripta.  
 Herba Podagrarie cognata, Franco.

V. Angelica sylv. montana.  
 Archangelica, Clus. pan.  
 Angelica, Cæs. Huc etiam referenda  
 Angelica minor montana, Tab.  
 VI. Angelica aquatica.  
 Archangelica, Lob. Dod. Clus. pan. & hist. Cast.  
 Lugd. Cam.  
 Angelica aquatica, Gesn. hort. & col.  
 Angelica altera, Cæs.

## IMPERATORIA.

**I**mperatoria, qua ob raras & præstantes facultates, sic nominata fuit, inter Laserepitium & Panacem media videtur.

I. Imperatoria major.  
 Astrantia, Brunf. Gesn. hor. & col. Dod. Clus. hist.  
 Smyrnion hortense, Trag. Gesn. hort.  
 Laserepitium Germanicum, Fuch.  
 Laser sive Laserepitium, Tur.  
 Struchion, Cord. hist.  
 Ostrutium, Dod. gal. Lon.

Imperatoria, Matth. Gesn. hort. & fra. Lac. Ad.  
 Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.  
 Ligusticum, Ang.  
 Herba rena vulgi, Cæs.  
 Magistrantia, Cam.  
 II. Imperatoria minor.  
 Imperatoria vel Astrantia alpina, Cam. ep.

## LASERPITIVM.

**L**aserepitium, *Σίλφιον* Dioscoridi, lib. 3. cap. 94. cuius caulis serulaceum *μαρμαίον* appellatur, folia sunt apio similia, semen verò latum : ex cuius caulibus & radice incisus, *μαρμαίον*, i. e. succus colligitur : quibusdam cauli *μαρμαίον* radix, *μαρμαίον*, & solum *μαρμαίον* dicuntur : sic Theoph. 6. hist. 3. Silphium cuius solium *μαρμαίον* vocant : Et Plin. lib. 19. cap. 3. Laserepitium, quod Græci Silphion vocant, in Cynnaica provincia reperitur, cuius succum Laser vocant : Avicenna planta Laserefera Aliter dicitur, interpretum aliqui *Asarum* reddunt, forè voce ex Laser corrupta.

I. Laserepitium veterum.  
 Silphion, Dioscoridis & Theophrasti.  
 Laserepitium, Plinio.  
 Aliter Avic. Asa quibusdam.

II. Laserepitium Gallicum.  
 Laserepitium, A. J. Lob. (sive Silphium) Lugd.  
 Laserepitium Massilioticum, Tab.

## PANAX.

**Πάνης**, quasi *πανός ανός*, omnibus remedium adferens, cuius Theoph. 9. hist. 10. genera quatuor : 1. Syriacum : 2. Chironium : 3. Aesculapicum : 4. Herculanum : Chironium, folio rumici simile : Aesculapium, folio Thapsia : Herculanum, folio magno & amplo, ut quoquo versus tres palmos perficiat. Dioscoridi, lib. 3. cap. 55. 56. 57. tria genera sunt : *πανός ανός* *πανός ανός*, ex quo Opopanax colligitur, folijs ficulneis, quinquepartitis : *πανός ανός* *πανός ανός*, folijs feniculi : *πανός ανός* *πανός ανός*, folio amaraci.

I. Panax Pastinacæ folio, an Syriac. Theoph.  
 Sagapenum existimatum, Gesn. hort.  
 Panaces peregrinum, Dod.  
 Panax altera recentiorum Olusatris aut Pastinacæ folio, Ad. Lob.  
 Panax Chironium, Lugd. Herculeum 2. Tab.  
 Panax herculeum majus, Ger.  
 an Panacis heraclei alterum genus, Cæs.

*Σαγαπένιον* Sagapenum & Serapinum in Officinis, an hujus forè lachryma, cum sit plantæ

serulacæ in Media provenientis, medio inter succum Silphij & Galbanum colore, Dioscor. lib. 3. cap. 95.

II. Panax costinum.  
 Costus, Matth. Lon. vulgaris, Cam ep.  
 Costus spurius, Matthioli, Lob. ob. Cam.  
 Pseudocostus, Matth. Lugd.  
 Herba costa, Cæsalp.

Panax Chironium Theoph. Cam.  
 Panaces costinum & Costus Illyricus, Tsb.

**III. Panax sphondylii folio five Hera-  
cleum.**

**Panaces Heracleum, Matth. Ang. Gefn. hort.  
Lac. Cast. Lugd.**

**Panax Heracleum Herculeæ, five Heraclia  
fronde pastinacæ, Ad.**

**Panax Heracleum, Lob. Dod. Ger.**

**Panax Herculeum, Cæs. primum, Tab.**

**Sphondylium alterum, Dod. 8.**

Floribus est albis, luteis dicit Diofco. tales se  
vidisse, Lobelius testatur.

**IV. Panaci Heracleo similis Ungarica.**

**Tataria Ungarica, Clus. hist.**

(bari  
an Baltracan in Tartaria nascens, Josephi Bar-  
Hujus radice, Ungari Agriæ vicini, alterius

panis penuria vescuntur: & Tartari,  
folium in aqua decoctum refrigeratum, Vini in-  
star bibunt.

## SPHONDYLIIUM.

**Σφονδύλιον folia habet platano similia ad Panachi foliorum effigiem accedentia, Dioscoridi lib. 3. cap. 90.  
Spondylium Plinio, lib. 12. cap. 26 & 1. 24. c. 6. sic dictum fortasse ob odorem graviorem, a Spondyle insecti  
genere, odorem gravem, ut Pena tradidit.**

**I. Sphondylium vulgare hirsutum.**

**Branca urliua, Brunf. Trag. Cord. in Diofco.  
( cui & Bupleuron Nicandri ) Germanica,  
Dod. gal.**

**Acauthus vulgaris five Germanica, Fuch.**

**Sphondylium, Matth. Lac. Gefn. hort. Lon.**

**Cast. Cæs. Tab. vulgare, Dod. 8.**

**Sphondylium, Ad. Lob. Dod.**

Var. at ratione loci, prout in montosis &  
planis provenit, hinc duæ apud Tabern. icon-  
nes: aliquando ita ludit, ut in caulibus summo,

folia sint breviora quidem, attamen in ternas  
& quaternas lacinias divisa. Floribus est com-  
muniter albis: Sed & purpureis, licet rarius,  
reperitur.

**II. Sphondylium hirsutum folijs angustio-  
ribus: hoc in Prod. primo loco descriptum est.**

**III. Sphondylium alpinum parvum: quod  
2. loco in Prod. describitur.**

**IV. Sphondylium alpinum glabrum: quod  
in Phytopinace sub. 2. in Prodr. sub. 3. propo-  
nitur.**

## LIBANOTIS.

**Λιβανotis, quod radix ὀσμυλίου, thus redoleat, duplex est, latifolia & serula folio: latifolia Theoph. 1. 9.  
c. 12. genera duo fecit, alterum sterile, alterum fertile, & alterum tam fructu, quam folio utile, alterum  
sanum radice: fructiferum. folium palustri apio simile, sed majus, habet: sterile, folio lactuca amara con-  
stat. Plin. 1. 19. c. 12. de Libanotide confusus egit, sicut & Læo. c. 16. cum Conyev miscuit.**

**I. Libanotis latifolia major.**

**Rosmarinus Theoph. Ang.**

**an Ligusticum alterum, Matth. Cast.**

**Libanotis Theoph. major, Lob. Lugd. Ger.**

**Libanotis alba major, Tab.**

**Elaphoboscum album, Lon.**

**Seseli æthiopicum 2. Clus. pan. & hist.**

**II. Libanotis latifolia altera five vulgatio.**

**Seseli primum, Trag. æthiopicum, Matth. ico.**

**Fuch. ico. Tur. Lac. Gefn. hor. Lon. Lugd. Clus.**

**pan. & hist.**

**Dauci alterum genus, Fuch. Tur. Lugd.**

**Libanotis alba, Gefn. hort. Tab.**

**Libanotis tertia Dodonæi, Lugd.**

**Libanotis Theoph. Dodonæo gal. Ad. Lobel.**

**altera, Thal.**

**Libanotis minor, Ger.**

**Seseli æthiopicum herba, Dod.**

**III. Libanotis latifolia minor semine cri-  
spo: hæc 2. in Prodrumo.**

**IV. Libanotis minor apij folio.**

**Daucus anguloso caule, Cord. hist.**

**Libanotis Theoph. minor, Lob.**

**Libanotis alba minor, Thal.**

**Libanotis panacea, Tab.**

**V. Libanotis apij folio semine aspero.**

**Rosmarinus folijs Selino similibus, quæ Liba-**

**notis legitima Theoph. perperam Siler Cretic-**

**um, Hon. Belliep. 1 ad Clus.**

**VI. Libanotis latifolia aquilegiæ folio,**

**quæ 1. est in Prodrumo.**

**Seseli æthiopicum alterum, Cam.**

**VII. Ligusticum vulgare: an Libanotis**

**fertilis Theophrasti?**

**Levisticum, Brunf. Lob. & Laferpicium Ger-**

**manicum, vulgare, Matth. Dod. Ad. Cæs.**

Ligusticum, Brunf. Cord. in Diof. Gefn. hort. Laferpitiū, Ang. Ger.  
 Lon. Tab. fativum, Trag. Cord. hist. vulgare, Smyrniū, Lac. Fuch.  
 Dod. gal. Cam. Hippofelinū, Lugd.  
 Libyiticū vulgare, Fuch. ico.

## LIBANOTIS FERULÆ FOLIO & Panax Asclepias.

**A** Libanotis Diofcoridi, l. 3. c. 87. duum est generum: unum facundum, cujus semen rotundum, angulosum, acre, linguam exurens, & naxia vocatur, solijs fœniculis cui alterum confimile, semine lato, minus exurente. Sterile illorum similitudinem refert, sed neque caulem, neque florem, neque semen promittit.

- I. Libanotis ferulæ folio semine anguloso. Libanotis 2. Dod. Tab.  
 Libanotis seu Rosmarinum, Matth. Lac. Lugd. Libanotis nigra, Cæf.  
 Rosmarinum 1. Ang. Cast. IV. Libanotidi secundæ similis seu Panax  
 Libanotis 1. Dod. vel cachryfera, Cam. Asclepium primum.  
 Rosmarinum ferulaceum, fertile, Diof. cujus Panaces Asclepium, Matth. Lac. Cast. Lugd.  
 semen Cachris dicitur, Ad. V. Panax Asclepium umbella lutea.  
 Cachrys verior Libanotis Galeno, Lob. Panax Asclepium alterum, Lugd.  
 Libanotis candida, Cæf. VI. Panax Asclepium semine folioso.  
 II. Libanotis ferulæ folio & semine. Panax Asclepium Apulum, Col.  
 Panax Asclepium ferulæ facie, Ad. Lob. VII. Libanotis minor umbella candida.  
 Panaces Asclepium, Dod. Cæf. Tab. Libanotis Septentrionalium herbariorum, Ad.  
 III. Libanotis fœniculi folio semine foliaceo. Libanotis minima, Lugd. (minor.  
 Rosmar. alt. ferulaceum Diofcoridis, Lob. ob VIII. Libanotis tenuif. German. major &  
 Panax Asclepium, Ang. Cam. Libanotis naxia vel naxia major & minor, Thal.

## CARUI

**K** Apud Diofcoridi, lib. 3. cap. 66. napros, Aëtio, naprosæ seu Simeoni Sethi, lib. de alim. Caruum Plin. lib. 19. cap. 8. à Caria regione in qua laudatissimum nascitur.

- I. Cuminum pratense, Carui Officinarum. Cuminum equinum & syl. Trag.  
 Caros, Brunf. Trag. Dod. gal. Gefn. hor. Fœniculum erraticum alterum, Lon.  
 Careum, Fuch. Peucedanum, Eid. ico.  
 Carum, Tur. Cord. in Diof. Matth. Lac. Ang. Hippomarathrum, Bot. Franc.  
 Lob. Dod. Cast. Lugd. Tab. Ger. Fœniculum sylv. Loniceri, Lugd.  
 Carui, Lon. Ad. Cæf. Thal. Alia latioribus, alia angustioribus folijs est.  
 II. Carui alpinum: in Prodomo descript. IV. Podi farina seu Hosculus quo flatu  
 III. Carui folia. ventris exiguunt: pat. 4. Ind. Orient. 7.

## CORIANDRUM.

**K** O'eur à napros Diof. lib. 3. cap. 71. dictum putant, quod folia & caules cinijces redolent. Kopiauor, Theoph. 7. hist. 1. & 4. caus. 3. cujus genera plura esse 4. hist. 7. dicit. Coriandrum Plinio, lib. 3. cap. 20. quod inter sylvestria non invenitur.

- I. Coriandrum majus. Semina in calidiorib. regionib. majora sunt.  
 Coriandrum, Brunf. Trag. Fuch. Matth. Ang. II. Coriandrum minus testiculatum.  
 Cord. hist. Gefn. hort. Lac. Lon. Ad. Lob. Cast. Coriandrum alt. minus odorum, Lob. Lug. sub  
 Cæf. Cam. Tab. Ger. Coriandri alterius icoe, Dod.  
 Coriandrum, quod recens frigidum, exsiccatur verò calefacit, Guil. Coriandrum 2. inodorum, Tab.  
 Coriander, Tur. III. Coriandrum sylvestre foetidissimum.  
 Coriandrum sylv. Myconi, Lugd.

## A N I S U M.

**A**nism Diof. lib. 3. cap. 65. Anisum. quidam auctore Plinio, lib. 20. cap. 17. quasi anisum vocare, quia appetentiam cibi præstaret, & forsan sic dictum, uti anisus talis imperis anisus, quod tensiones flatulentas internas & externas remittat & laxet.

I. Anisum herbarijs.

Abfinthium dulce, Roef.

Major est semine & minore, hocque apud

Bohemos habetur.

II. Anisum peregrinum.

Anisum Philippinatum Insularum, Clus. hist.

## A M M L

**A**mmi Diofcorid. lib. 3. cap. 70. quod majus est dicitur, vel Basilicoides vocant. Plinio lib. 20. cap. 15. Ammi quod Græci vocant, Cumino est simillimum: quidam Cuminum Aethiopicum esse existimant Hippocrates regium appellat.

I. Ammi majus.

Ammi, Brunf. Trag Tur. Cord. in Diof. & hist.

Gef. hort. Lon. Lugd.

Ammi commune live vulgare, Dod. Cam. Ger.

Ammi vulgatus, Lob.

Ammiofelinum, Tab.

Quibusd. Bibon. Hipp. alijs Bupleuron Plin.

Variat fol. plurim. incisis & non nihil crispis.

II. Ammi alterum semine apij.

Ammi majoribus & ferratis folijs semine apij,

Gef. hort.

Ammi Creticum aromaticum, Ad. Lob.

Ammi tertium Creticum, Tab.

III. Ammi parvum folijs feniculi.

Ammi, Matth. Ang. Lac Cast. Cæf. Lugd. Cam.

Ammi verum, Gef. hort.

Ammi parvum, Dodon. gal. alterum parvum, Eidem f.

Ammi perpusillum, Lob.

Ammium primum Alexandriacum, Tab.

IV. Ammoides.

Ammi pusillum, Cæf.

## P I M P I N E L L A.

**P**impinella & Bipinella à recentioribus, à foliorum binis ordinibus, pennatim sive plumatim digestis, nominata, veteribus, indistincte existimantur: quæ etiam Bipennula & Pampinella vocantur. Hæc duplex est, Pimpinella saxifraga, seu saxifraga, à facultate calculorum à renibus expellendorum: altera Pimpinella Sanguifraga, vel Sorbastrella, quod sanguinosus fluxus sistat: quæ pampinella à pappo, & quibusd. Siderium 2. Diof. censetur.

I. Pimpinella saxifraga maj. umbellâ candidâ.

Pimpinella, Brunf. Cord. in Diof. Lou. Trag.

Fuch. Tur. Gef. hor. Lob. Cast.

Pimpinella nostras communis major, Thal.

Bipinella, Saxifraga major, Ad.

Pimpinella saxifraga, Matth. Ger. major, Cam.

Bipennula, Lac.

Saxifraga major, Dod. gal. Saxifraga 1. Cæf.

Saxifraga, Cord. hist. magna, Dod. hircina major,

Gef. hor. vulgaris major, Clus. pan.

Tragofelinum majus, Tab.

Folia in una atrovirentia, splendentia: in altera minime invenitur & in laciniis divisa. Ad hujus radicem quibusdam in locis, grana reperiuntur, quorum medulla in colore rubeum mutatur, cujus ad tincturam carmesini usus est, momentibus Lacuna & Anguillara, & Cocculus radicem quibusdam dicitur.

Fraxinus 1. & 2. videtur Cocchenilla misti-

masse: Cocchinilla, inquit, quædam grani species adfertur ex Peru, quod nascitur in certis plantis parvis Pimpinellæ vulgari similibus, cujus radicibus adhæret, similitudine ovarum sylvestrium: quidam putarunt falsò, esse Cocconidium verum: alij esse Chermes Arabum, à Cocco Baphico Græcorum differens, quod manifestè falsum est, hæc ille. At Oviedus, ex arbore colligi vult, ut suo loco dicitur.

II. Pimpinella saxifraga major altera.

Pimpinella secunda species, Trag.

Tragofelinum minus, Tab.

Bipinella sive saxifraga minor, Ger.

Cauliculi & foliorum venæ, interdum purpurascent: hæc fervore & acrimonia primum genus superat.

III. Pimpinella saxifraga major umbellâ rubente: Saxifraga major in alpi. flore rubente, Gef. h.

Pimpinella major umbellis purpureis, Gef. h.

IV. Pim-

IV. *Pimpinella saxifraga minor*.  
*Pimpinellæ* 3. species, Trag.  
*Pimpinella minor*, Fuch. Tur. Cam. ep.  
*Pimpinella saxifraga minor*, Lugd. Cam.  
*Pimpinella nostras communis minor*, Thal.  
*Bipinella*, *Saxifraga hircina*, Ad.  
*Pimpinella*, *Saxifraga hircina minor*, Lob.  
*Saxifraga minor alt.* Dod. gal. *Saxifrag.* 2. Cæs.  
*Saxifraga hircina minor*, Gef. hort. Cam.  
*Saxifraga parva*, Dod.  
*Saxifraga vulgaris minor*, Clus. pan.  
*Saxifraga pimpinella Germanica minor*, Clus. hist.  
*Daucus Selinoides*, Cord. hist.  
*Dauci* 3. genus, Lugd.  
*Tragofelinum petraeum*, Tab.  
*Tragium Dioscoridis*, Col.

Folia interdum laciniata, interdum incisuris angustioribus & oblongis divisa: aliquando folijs petroselinii.

V. *Pimpinella saxifraga tenuifolia*: in Prodromo descripta.

VI. *Pimpinella Sanguisorba major*.  
*Pimpinellæ Italicae* 2. genus, Trag.  
*Pimpinella seu Sanguisorba major*, Matt. Cast. Lugd. Cam.

*Pimpinella major*, Dod. gal. sylv. Dod.  
*Pimpinella Italica major*, Clus. hist. Thal.  
*Sanguisorba major*, Fuch. Cord. hist. Tab.  
*Sanguisorba altera major*, Ad. (sive *Pimpinella*) Lob.  
*Pimpinella sylv.* Ger.

*Sideritis secunda Diosc. major*, Col.  
 VII. *Pimpinella Sanguisorba minor hirsuta*.  
*Pimpinella Italica*, Trag. Lon. minor, Thal.  
*Pimpinella*, Ad. Lob. Cæs. minor, Dod. gal. Lug.  
*Pimpinella sylv. hirsuta*, Gef. hor.  
*Pimpinella sanguisorba*, Dod. minor, Matth. Cast. Cam.

*Pimpinella hortensis*, Ger.  
*Sanguisorba minor*, Fuch. Cord. hist. Tab.  
*Sideritis* 2. Ang. Guil. quæ *Pimpinella Italica*.  
*Sideritis* 2. Diosc. minor, Col.  
 an *Sideritis altera Diosc. l. 4. c. 34. & Sissitietoris Plinij l. 4. c. 17.*

Hæc apud Monspelienfes minor & valde pilosa reperitur.

VIII. *Pimpinella sanguisorba minor levis*.  
*Pimpinella sativa lævis*, Gef. hor.

Cultura solum à priori differre videtur, cum in usum acetariorum ab Italis in hortos feratur.

IX. *Pimpinella sanguisorba inodora*: in Prod. descripta.

## M Y R R H I S.

**M**yrrrha, sive *myrrha* Dioscoridi lib. 4. cap. 116. Myrrhu, quæ alijs Smyrrhiza, alijs Myrrba dicitur, Plinio lib. 24. cap. 16.

I. *Myrrhis major*, vel *Cicutaria odorata*.  
*Myrrhis*, Matth. Cord. in Diosc. Gef. hor. Lac. Ad. Lob. Dod. Cast. Lugd. sativa, Cam.  
*Seseli Peloponense*, Ang.  
*Cicutaria tertia*, Cæs.  
*Cerefolium Hispanicum*, Tab.  
*Cerefolium magnum & Cicutaria tenuif.* Ger.

II. *Myrrhis minor*.  
*Myrrhis altera*, Ad. parva, Lob. Lugd.

*Cicutaria secunda*, Cæs.  
*Myrrhis sativa minor*, Cam.  
*Myrrhis montana*, Tab.

III. *Myrrhis sylv. feminibus lævibus*.  
*Myrrhis*, Fuch. Dod. gal. Tur. Lugd. sylv. Cam.  
*Cicutaria*, Gef. hor. Lon.

IV. *Myrrhis sylv. feminibus asperis*.  
*Myrrhis sylv. nova Æquicolum*, Col.

V. *Myrrhis Broccenbergensis*, Thal. quid!

## CICUTA ET CICUTARIA.

**K**ακρον Theophr. 1. hist. 8. c. 6. ejusd. 2. Diosc. l. 4. c. 79. Etymologicum uita nominatum tradit, ὅτι τὸν γόνυ μορον ἔχει, ὃ ἐνέχει τοῖς ἀνθρώποις. Quare Gal. lib. quod animi mores 3. quod cicuta epota stultitiam pariat, νεμερὸς δὲ δὲ, desumpto nomine ab eo affectu, quia corpus ipsum torquetur. Plin. l. 25. c. 13. Cicuta, cujus caulem viridem à plerique ediscribit: verum qui sapiunt, ab hujus esu, Socrateo exemplo moniti, abstineant.

I. *Cicuta major*.  
*Cicuta*, Trag. Matth. Ang. Fuch. Dod. Tur. Lac. Ad. Lob. Lon. Cast. Lugd. Cæs. Tab. Ger.  
*Cicuta major*, Cord. hist. Cam. vera, Gef. h. Thal.

*Cicutaria vulgaris*, Clus. hist.  
 Variat folijs aliquando latioribus, aliquando tenuioribus.

II. *Cicuta minor petroselino similis*.

Petro-



Petroſellini vitium, Trag.  
Cicuta minor, Cord. hiſt. Cam.  
Apij comes vitium, Gef. hort.  
Dauci inutilis genus, Gef. col.  
Sifon, Lon.  
Apium cicutarium, Thal.  
Cicuraria furus, Ad. (quæ minus fœtida) Lob.  
Petroſelinum caninum, Tab.

III. Cicutaria latifolia fœtida.  
Sefeli Peloponenſe, Matth. Gef. hor. Lac. Caſt.  
Lon. Lugd.

Cicutaria latifolia fœtidiffima, Lob. Lugd.  
Cicutaria, ſive Cicuraria Myrthis, Thal.  
Cicutaria, Caſt. ico. fœtida, Tab.  
Cicuta latifolia fœtidiffima, Ger.

IV. Cicutaria latifolia tertia.  
Cicutaria maxima Brancionis, Lob.

V. Cicutaria paluſtris latifolia alba.  
Cicutaria alba, Lugd.

Cicutaria paluſtris fl. candido, Cam.  
an Meum Sileſianum, Ejuſd.

VI. Cicutaria paluſtris latifolia rubra.  
Cicutaria rubra, Lugd.

Cicutaria paluſtris fl. purpureo, Cam.

VII. Cicutaria paluſtris tenuifolia.

Ligüſticum ſylv. Trag.

Fœniculum ſylv. Eid.

Cicuta paluſtris, Cord. in Dioſcorid. aquatica,  
Gef. hort. Thal.

Cicutaria paluſtris, Lob. Tab. Ger.

Cicutaria paluſtris alia, Cam.

Phellandrium, Dod. Lugd.

Silaus Plinij, Cæſ.

Phellandron eſt Plin. l. 28. c. 12. alijs Silaumi. 27.

VIII. Cicutaria bulbosa. (c. 8.)

Cicutaria pannonica, Cluſ. pan. & hiſt.

Bulbocaſtanum comiophyllon, Cam.

Myrthis cicutaria, Tab.

## S E S E L I.

Σεſελι Dioſcor. l. 3. c. 60. quatuor generum, μαλακισμένη, ſolijs fœniculi: ἀδινονέν, ſolijs hederae: πλεονονομένη, ſolijs cicuta latioribus: κρημνία ſive τρυφύλλιον: Plin. l. 2. c. 32. ex Ariſtoſeli l. 9. hiſt. Ceteras ante partum, purgari herba quadam quæ Seſeli dicatur, ſcribit: & l. 25. c. 8. Seſeli cervaenixe ἀπαιτῖ mon-  
ſtravere: & l. 20. c. 22. Tordylium, eſt ſemen ex Seſeli.

I. Seſeli montanum Cicuta folio glabrum: Tordylium majus alt. luteum λαιμαργόν, Col.  
an Peloponneſiacum Dioſc.

Ligüſticum alterum Belgarum, Lob. Lugd.

Ligüſticum 2. herbariorum, Tab.

Seſeli mont. 1. vel alpinum, Cluſ. pan. & hiſt.

Latioribus ſolijs ex horto Cl. Contareni  
habemus.

II. Seſeli mont. Cicuta folio ſubhirſutum:  
quod in Prodromo deſcriptum eſt.

III. Seſeli Creticum majus.

Tordilium ſive Seſeli Cretic. majus, Lob. Lugd.

Pimpinella Romana alterum genus ſyl. Cæſ.

Seſeli Creticum majus, Cam. 2. Tab.

IV. Seſeli Creticum minus.

Ordilium Nicandri & Tordylium Dioſc. Ang.

Seſeli Cretici ſpecies, Eid.

Caucalis, Bellonio, Gef. hor. Belli ep. 1. ad Cluſ.

Tordylium & Gordilium, Dod. gal. Gefn. hort.

Lugdun.

Seſeli Creticum, Lac. Ad. Lob. Dod. Caſt. Ta-  
bern. Ger.

Seſeli Creticum minus, Cam.

Pimpinella Romana vulgo, Cæſ.

Tordilium Creticum, Eyſt.

V. Seſeli Creticum fructu majore.

VI. Seſeli Creticum minimum.

Tordylium minimum Apulum, Col.

VII. Seſeli Æthiopicum ſalicis folio.

Seſeli Æthiopicum alterum, Matth. Gef. hort.

Seſeli Æthiopicum, Ang. Ad. Lob. Caſt. Tab. ve-  
rum, Lugd. Cam.

Seſeli Æthiopicum frutex, Dod. Ger.

Herba quæ pro Seſeli Æthiopico oſtenditur,  
Cæſalp.

VIII. Seſeli Maſſilienſe ſerula folio.

Seſeli Maſſilienſe ſerula aut Dauci Cretici fa-  
cie, Lob. ob.

Seſeli Maſſilienſe, Matth. Lac. Gefn. hort. Lbn.

Caſt. Lugd. Tab. nuperorum, Lob. ico.

Siler montanum Officin. Ger.

IX. Seſeli Maſſilienſe fœniculi folio, quod  
Dioſcoridis cenſetur.

Seſeli Maſſil. Ang. Dod. Lugd. Cæſ. Seſeli Maſ-  
ſilienſe forte, Cluſ. hiſp. nonnullorum, Cam.

Seſeli Maſſilienſe folio fœniculi craſſiore, Ad.  
Lobel.

Seſeli Maſſilienſe Dioſcoridis, Cluſ. hiſt.

Fœniculum tortuoſum, Lugd.

Fœniculum petraeum, Tab.

IV. *Pimpinella saxifraga minor*.  
*Pimpinellæ* 3. species, Trag.  
*Pimpinella minor*, Fuch. Tur. Cam. ep.  
*Pimpinella saxifraga minor*, Lugd. Cam.  
*Pimpinella* iustrotras communis minor, Thal.  
*Bipinella*, *Saxifraga hircina*, Ad.  
*Pimpinella*, *Saxifraga hircina minor*, Lob.  
*Saxifraga minor* alt. Dod. gal. *Saxifrag.* 2. Cæf.  
*Saxifraga hircina minor*, Gef. hort. Cam.  
*Saxifraga parva*, Dod.  
*Saxifraga vulgaris minor*, Clus. pan.  
*Saxifraga pimpinella Germanica minor*, Clus. histor.

*Daucus Selinoides*, Cord. hist.

*Dauci* 3. genus, Lugd.

*Tragofelinum petraeum*, Tab.

*Tragium Dioscoridis*, Col.

*Folia* interdum lacinia, interdum incisuris angustioribus & oblongis divisa: aliquando folijs petroselin.

V. *Pimpinella saxifraga tenuifolia*: in Prodromo descripta.

VI. *Pimpinella Sanguisorba major*.

*Pimpinellæ Italica* 2. genus, Trag.

*Pimpinella* seu *Sanguisorba major*, Matt. Cast. Lugd. Cam.

*Pimpinella major*, Dod. gal. sylv. Dod.

*Pimpinella Italica major*, Clus. hist. Thal.

*Sanguisorba major*, Fuch. Cord. hist. Tab.

*Sangui. altera major*, Ad. (five *Pimpinella*) Lob.

*Pimpinella* sylv. Ger.

*Sideritis secunda* Diosc. major. Col.

VII. *Pimpinella Sanguisorba minor hirsuta*.

*Pimpinella Italica*, Trag. Lon. minor, Thal.

*Pimpinella*, Ad. Lob. Cæf. minor, Dod. gal. Lug.

*Pimpinella* sylv. hirsuta, Gef. hor.

*Pimpinella sanguisorba*, Dod. minor, Matth.

Cast. Cam.

*Pimpinella hortenensis*, Ger.

*Sanguisorba minor*, Fuch. Cord. hist. Tab.

*Sideritis* 2. Ang. Guil. quæ *Pimpinella Italica*.

*Sideritis* 2. Diosc. minor, Col.

an *Sideritis altera* Diosc. l. 4. c. 34. & *Sisistietaris* Plinij l. 4. c. 17.

Hæc apud Monspelienfes minor & valde pilosa reperitur.

VIII. *Pimpinella Sanguisorba minor levis*, *Pimpinella sativa lævis*, Gef. hor.

Cultura solum à priori differre videtur, cum in usum acetariorum ab Italis in hortos feratur.

IX. *Pimpinella sanguisorba inodora*: in Prod. descripta.

## M Y R R H I S.

**M**yrre, five myrre Dioscoridi lib. 4. cap. 116. Myrrhis, qua alijs Smyrrhiza, alijs Myrrba dicitur, Plinio lib. 2. 4. cap. 16.

I. *Myrrhis major*, vel *Cicutaria odorata*.

*Myrrhis*, Matth. Cord. in Diosc. Gef. hor. Lac. Ad.

Lob. Dod. Cast. Lugd. sativa, Cam.

Seseli Peloponense, Ang.

*Cicutaria tertia*, Cæf.

*Cerefolium Hispanicum*, Tab.

*Cerefolium magnum* & *Cicutaria tenuif.* Ger.

II. *Myrrhis minor*.

*Myrrhis altera*, Ad. parva, Lob. Lugd.

*Cicutaria secunda*, Cæf.

*Myrrhis sativa minor*, Cam.

*Myrrhis montana*, Tab.

III. *Myrrhis* sylv. seminibus lævibus.

*Myrrhis*, Fuch. Dod. gal. Tur. Lugd. sylv. Cam.

*Cicutaria*, Gef. hor. Lon.

IV. *Myrrhis* sylv. seminibus asperis.

*Myrrhis* sylv. nova Æquicorum, Col.

V. *Myrrhis Broccenbergenfis*, Thal. quid?

## CICUTA ET CICUTARIA.

**K**orom Theophr. 1. hist. 8. & 6. ejusd. 2. Diosc. l. 4. c. 79. Etymologicum ita nominatum tradit, ὡς τὸν ποταμὸν ἐν ἡρώδῃ, ὃ ἐν ἡρώδῃ τοῖς ἰσχυροῖς. Quare Gal. lib. quod animi mores 3. quod cicuta epot a stultitiam pariat, nomen dicta, desumpto nomine ab eo affectu, quia corpus ipsum torquetur. Plin. l. 25. c. 13. Cicuta, cuius caulem viridem à plerisque ediscribit: verum qui sapiunt, ab hujus usu, Socrateo exemplo moniti, abstineant.

I. *Cicuta major*.

*Cicuta*, Trag. Matth. Ang. Fuch. Dod. Tur. Lac.

Ad. Lob. Lon. Cast. Lugd. Cæf. Tab. Ger.

*Cicuta major*, Cord. hist. Cam. vera, Gef. h. Thal.

*Cicutaria vulgaris*, Clus. hist.

Variat folijs aliquando latioribus, aliquando tenuioribus.

II. *Cicuta minor petroselino similis*.

Petro-

Petroselinum vitium, Trag.

Cicuta minor, Cord. hist. Cam.

Apij comes vitium, Gef. hort.

Dauci inutilis genus, Gef. col.

Sifon, Lon.

Apium cicutarium, Thal.

Cicuta furca, Ad. (quæ minus foetida) Lob.

Petroselinum caninum, Tab.

III. Cicutaria latifolia foetida.

Sefeli Peloponense, Matth. Gef. hor. Lac. Cast. Lon. Lugd.

Cicutaria latifolia foetidissima, Lob. Lugd.

Cicutaria, sive Cicutaria Myrrhis, Thal.

Cicutaria, Cast. ico. foetida, Tab.

Cicuta latifolia foetidissima, Ger.

IV. Cicutaria latifolia tertia.

Cicutaria maxima Brancionis, Lob.

V. Cicutaria palustris latifolia alba.

Cicutaria alba, Lugd.

Cicutaria palustris fl. candido, Cam.

an Meum Silesianum, Ejusd.

VI. Cicutaria palustris latifolia rubra.

Cicutaria rubra, Lugd.

Cicutaria palustris fl. purpureo, Cam.

VII. Cicutaria palustris tenuifolia.

Ligisticum sylv. Trag.

Fœniculum sylv. Eid.

Cicuta palustris, Cord. in Dioscorid. aquatica,

Gef. hort. Thal.

Cicutaria palustris, Lob. Tab. Ger.

Cicutaria palustris alia, Cam.

Phellandrium, Dod. Lugd.

Silaus Plinii, Cæf.

Phellandrium est Plin. l. 28. c. 12. alijs Silaum l. 27.

VIII. Cicutaria bulbosa. (c. 8.)

Cicutaria pannonica, Clus. pan. & hist.

Bulbocastanum comophyllon, Cam.

Myrrhis cicutaria, Tab.

## S E S E L I.

**S**eseli Dioscor. l. 3. c. 60. quatuor generum, μαλακισμίν, folijs fœniculi: αἰθιονόη, folijs hedera: πικροπονητικόν, folijs cicuta latioribus: πρῶτος sive τορδύλιον: Plin. l. 1. c. 32. ex Aristoteli l. 9. hist. Cetera ante partum, purgati herba quædam quæ Sefeli dicatur, scribit: & l. 25. c. 8. Sefeli cetera enim ἀραγίον mon-  
strare: & l. 20. c. 22. Τορδύλιον, est semen ex Sefeli.

I. Sefeli montanum Cicuta folio glabrum: Τορδύλιον majus alt. luteum λαίμαρξ, Col.  
an Peloponnesiacum Diosc.

Ligisticum alterum Belgarum, Lob. Lugd.

Ligisticum 2. herbariorum, Tab.

Sefeli mont. 1. vel alpinum, Clus. pan. & hist.

Lacioribus folijs ex horto Cl. Contareni habemus.

II. Sefeli mont. Cicuta folio subhirsutum: quod in Prodomo descriptum est.

III. Sefeli Creticum majus.

Τορδύλιον sive Sefeli Cretic. majus, Lob. Lugd.

Pimpinellæ Romanæ alterum genus syl. Cæf.

Sefeli Creticum majus, Cam. 2. Tab.

IV. Sefeli Creticum minus.

Ordilium Nicandri & Τορδύλιον Diosc. Ang.

Sefeli Cretici species, Eid.

Caucalis, Bellonio. Gef. hor. Belli ep. 1. ad Clus.

Τορδύλιον & Gordilium, Dod. gal. Gef. hort.

Lugdun.

Sefeli Creticum, Lac. Ad. Lob. Dod. Cast. Ta-

bern. Ger.

Sefeli Creticum minus, Cam.

Pimpinella Romana vulgo, Cæf.

Τορδύλιον Creticum, Eyst.

V. Sefeli Creticum frustu majore.

Τορδύλιον majus alt. luteum λαίμαρξ, Col.

VI. Sefeli Creticum minimum.

Τορδύλιον minimum Apulum, Col.

VII. Sefeli Æthiopicum salicis folio.

Sefeli Æthiopicum alterum, Matth. Gef. hort.

Sefeli Æthiopicum, Ang. Ad. Lob. Cast. Tab. ve-

rum, Lugd. Cam.

Sefeli Æthiopicum frutex, Dod. Ger.

Herba quæ pro Sefeli Æthiopico ostenditur,

Cæsalp.

VIII. Sefeli Mafsiliense ferulæ folio.

Sefeli Mafsiliense ferulæ aut Dauci Cretici fa-

cie, Lob. ob.

Sefeli Mafsiliense, Matth. Lac. Gef. hort. Lon.

Cast. Lugd. Tab. nuperorum, Lob. ico.

Siler montanum Officin. Ger.

IX. Sefeli Mafsiliense fœniculi folio, quod

Dioscoridis censetur.

Sefeli Mafsil. Ang. Dod. Lugd. Cæf. Sefeli Ma-

filiense forrè, Clus. hisp. nonnullorum, Cam.

Sefeli Mafsiliense folio fœniculi crassiore, Ad.

Lobel.

Sefeli Mafsiliense Dioscoridis, Clus. hist.

Fœniculum tortuosum, Lugd.

Fœniculum petræum, Tab.

Variat in foliorum crassitie, tenuitate, longitudine, brevitate & divisura: in omnib. tamen glauca sunt. Aliàs nomine Seseleos Mass. habemus, de quib. cum adhuc dubitemus, ut & alijs umbelliferis, de ijs in Theatro, si Deus volet.

X. Sefeli montanum feniculi folio.

Sefeli mont. 3. vel mont. angustifol. Clus. pan. & hist. qui vult à Libanoride Diosc. altera fructifera, non multum differre.

XI. Sefeli palustre lætescens.

Sefeli palustre, Cam.

XII. Sefeli pratense, Silaus forte Plinio lib. 26. cap. 8.

Ligusticum Matthioli censet. Ges. hor.

Pastinaca pratensis Theoph. Cord. in Diosc.

Pastinaca nigra sylv. Cord. hist.

Sefeli prat. Montpellier. Ad Lob. Lugd. Cam.

Siler alterum pratense, Dod.

Hippomarathrum primum Tab. sub Feniculo dulci, Gerico.

XIII. Sefeli prat. tenuif. sive Daucus pratensis tenuifolius: pro 2. in Prodr. descriptus.

## LIGUSTICUM.

**L**ιγυστιν (Galeno λεγυστιν) ut plurimum in Liguria nascitur, quare à ληγυστα nomen traxit, in monte scil. Apenino disse: incolæ μωμιν dicitur. Diosc. l. 3. c. 83. Ligusticum sylvestre est, in Liguria sua montibus: panaceum aliqui vocant. Plin. l. 19. c. 8. & l. 20. c. 15. Siler nunc appellat nomine à Sile deducto, quia pro Sefeli semine utuntur, ut Veteres ipsum Sefeli, etiam Sili & Seli vocabant.

I. Ligusticum quod Sefeli Officinarum.

Siler montan. Trag. Guil. Ad Lob. Dod. Clus. h.

Ligustic. Matr. Lac. Cast. Lugd. verum, Dod. gal.

Ges. hor. Tab. sub Levistico vulgari, Gerico.

Sefeli Mafilioticum, Cord. in Diosc.

Sefeli, vulgò Siler montanum, cum nullo Sefeli conveniens, Ges. hort.

Sefeli Italicum, Cast.

Ser montanum, Sefeli peloponense, Cæs.

Semine larioie & breviorie variat.

II. Ligusticum folijs cicutæ.

Siler Creticum, Cam.

III. Ligusticum sive Siler montanum angustifolium: in Prodromo descriptum.

## BULBOCASTANUM.

**B**ολβοκασταν, enim Trallianus l. 7. c. 2. meminit, à radici figura bulbosa, & sapore castaneæ exprimentis, nomen habet. Diosc. l. 4. c. 124. aliqui censent, cuius videretur, seq. cap. subiungit.

I. Bulbocastanum majus folio apij.

Oenanthe prima, Matth. Cast. Lugd.

Bunium, Dod. gal. Lic. Ges. hor.

Apios, Tur.

Bulbocastanum, Ges. hor. Dod. Cast. Tab. Ger.

Bulbocastanum grandius, Lugd.

Bulbocastanum mas Tralliani, Lugd.

Nucula terrestris Septentrionalium, Ad Lob.

Paincaecolus vulgo, Cæs.

II. Bulbocastanum minus.

Ornithogali species, Lon.

Bulbocastanum alterum, Cam.

Hoc ratione loci, folior. incisuris variat: quod ex Anglex Pyren. & monte Calcaris habemus.

## OENANTHE ET FILIPENDULA.

**O**enanthe Diosc. l. 3. c. 135. quasi stors ynosus quòl odore & quadam tenui colore, non sine viris dissimiles: vel primum, quod cum vite floreat: & λεβανος, a storum candore, quos producit: cuius radix magna, in multa rotunda capitula extuberans. Plinio l. 21. c. 23. Oenanthe radice magna numerosa, &c. Recentiorum Oenanthes subjungamus, ut & Filipendulas, quæ cum Oenanthe viribus aliquantum conveniunt: Filipendula, à numerosis illis & rotundis in radice capitibus, quæ velut ex filo quodam pendere videntur, nomen habet.

I. Oenanthe apij folio.

Oenanthe secunda, Matth. Lugd.

Oenanthe angustifolia, Lob. species, Lugd.

Filipendula, Cast. ico. 2. vel tenuifolia, Tab.

Filipendula angustifolia, Ger.

Cyminum bulbosum Plinij, Col.

II. Oenanthe pastinacæ syl. fol. semine atro-

Oenanthe species altera, Lugd.

III. Oenanthe chærophylli folijs.

Oenanthe tertia, Matth. Lugd.

Oenanthe cicutæ facie, Ad Lob. Lugd.

Filipendulæ altera species, Ges. hor.

Filipendula 3. Oenanthe selinophylla, Tab.

IV. Oenanthe aquatica.

Oenan-

Oenanthe 4. Matth. Lugd.  
 Oenanthe aquatica, Lob. aquat. repens, Cam.  
 Laver minus, Lon.  
 Bulbocastanum femina, Lugd.  
 Sifer palustre, Lugd.  
 Petroselinum sylv. vulgo, Cæs.  
 Filipendula aquatica vel palustris, Tab. Ger.  
 Juncus odoratus aquaticilis, Dod.

Differentiæ ratione magnitudinis & parvitatibus, multæ reperiuntur: sic aliquando bulbulis carens, quemadmodum Dod. pingit, & Lobel. duas alias icones subiungit: sic apud Montpellierenses, capitulo est majore, per omnia hispidiore: apud nos minore, ne hispidior.

V. Oenanthe hederæ folijs.

Oenanthe Myconi, Lugd.

VI. Oenanthe prolifera Apula.

Oenanthe Cretica, Ponæ in Bal. ital.

## PEDICULARIS SEU FISTULARIA

**P**edicularis, ab effectu nomen habens si enim, à pecoribus inter cætera pabula devorata fuerit, pedicularum ingentem copiam procreat. Nāquid idem seu Crista apud Plin. l. 27. c. 5. censetur, cui folia similia gallinaceæ cristæ tribunt. Imò ob florum congeriem, multiplici & densa Gallinaceæ cristæ modo fastigiatam, sic posteriori dicitur: aliqui Fistulariam nominant, quod ad fistulas & sinuosa ulcera utilis esse credatur.

I. Pedicularis alpina lutea.

Filipendula alpina, Lugd.

an Oenanthe, Cæs.

II. Pedicularis alpina filicis folio major.

Pedicularis major alpina, Lugd.

In hac varietas occurrit.

III. Pedicularis alpina filicis folio minor.

Alectorolophus alpin. minor, Clus. pan. & hist.

IV. Pedicularis alpina folio ceterach.

Herba folijs aspleno persimilis, Gesn. fra.

V. Pedicularis pratensis purpurea.

Pedicularis campestris prior, Trag.

Alectorolophus, Dod. gal. Thal.

Pedicularis, Lob. Cast. Tab. altera, Lon.

Fistularia, Dod.

Alectorolophi 3. genus, Clus. pan. & hist.

Crista galli altera, sive Phehirion, Lugd.

VII. Filipendula vulgaris, an Molon Plin.

lib. 26. cap. 7.

Filipendula, Trag. Dod. Matth. Cord. hist. Ang. Gesn. hort. Lon. Thal. Cast. Lugd. Tab. (cui & Saxifraga rubra) Ger.

Oenanthe, Fuch. Lac. Cord. in Diof. Lob.

Oenanthe vulgaris, Ad.

Filipendula vulgaris, Eyst.

VIII. Filipendula minor: in Prod. descripta.

IX. Filipendula montana fl. pedicularie.

Filipendula mont. Dod. Tab. Ger.

Oenanthe sive Filip. alt. mont. Ad. Lob. Lugd.

Alectorolophus vel alp. major, Clus. pan. & h.

Oenanthe alia Myconi, Lugd.

Crista quædam in alpinis, Cæs.

X. Filipendula montana altera.

Alectorolophus alpinus 2. Clus. pan. & hist.

Floribus est modò pallidis, modò purpureis.

Ruta pedicularis, Tab.

Floris color vel purpur. vel car. vel candid.

VI. Pedicularis prat. lutea, vel Crista galli.

Pedicularis campestris 2. Trag.

Alectorolophus, Ang.

Crista gallinacea, Dod. gal. l. ugd. Clus. hist.

Crista galli, Lob. Dod. Thal. simplici caule, Cæs.

Pedicularis lutea, Tab.

Mimulus Plinij quibusdam: mimuli herba

in prato pessima l. 18. c. 28. quamvis alij Num-

mulum legant, Nummulariam dictam censentes.

Variat magnitudine & foliorum latitudine,

caulium numero: floribus luteis, rarius candi-

dis: semine nigro, aut subluteo.

VII. Crista galli umbellata.

VIII. Crista galli angustifolia montana:

illa pro 2. hæc pro 2. in Prodro. descripta.

## BARBA CAPRÆ.

**B**arba capra, à florum figura, qua barbam caprinam aliquo modo refert, nomen obtinuit: & prima Melandryon Plinij. l. 26. c. 7. censetur, cuius descriptio talis: Melandryon nascens in segete ac prati flore albo, odorato. Altera ejusdem l. 24. c. 19. Rhodora: herba, inquit, quam Galli Rhodoram vocant, caulium habet virgæ siculnæ modo geniculatæ, folia arctica, in medio ex albidis, eadem procedente tempora tota rubescentia, florem argenteum.

I. Barba capræ floribus oblongis.

Barbula capræ & barba caprina sylv. Trag.

Barba capri, Fuch. Dodon. gal. ico. capræ,

Lugdun. Eystett.

Barba caprina, Gesn. hort. altera, Lon.

Potentilla 2. Ang.

X 2

Drymo-



Drymopogon 1. Tab.

II. Barba capræ floribus compactis.

Barbula caprina prior, Trag.

Barba capri, Dod. gal. desc.

Potentilla 1. Ang.

Medefusium (à Ger. Medifus) Cord. hist.

Barba caprina 1. Lon.

Barbi capra, Ad. Lob.

Regina prati, Dod. Ger.

Ulmaria (à foliorum forma) Gesn. cat. Clus.

pan. & hist. Lugd. Cam. Tab.

Argentilla major, Thal.

\*\*\*\*\*

## SECTIO SEXTA. VALERIANA; NARDVS.

**V**aleriana Dioscoridi, l. 1. c. 10. φάρινα & αγγιν, eo quod radices cum quadam odori gravitate Nardum amulenter: imò & viribus Nardo similes, Galeno & Aegineta auctoribus. Plinio, l. 12. c. 12. Nardum Creticum, aliqui agriam vocant, alij phu folio olusatri, &c. & l. 21. c. 20. Nardus quod Phu appellatum, Officinis & herbarii Valeriana, à multis quibus valet facultatibus: quare & Theriacaria dicitur.

Genera duo, una descriptione Dioscorides proposuisse videtur: solia namque olusatri, majori Valeriana; solia Elaphobosci, media: radices priori, floru color, media convenit.

I. Valeriana hortenſis: Phu folio Olusatri Dioscorid.

Valeriana vera, seu Nardus agreſtis, Trag.

Phu magnum, Fuch. Matth. Tur Lac. Lon. Lug.

Phu majus, Matth. Cord. hist.

Phu verum, Cord. in Diosc. Fuch. hortense,

Gesn. hort.

Phu ponticum, Tab.

Valeriana major, Ang. Ad. Lob. Cam. Eyſt.

Valeriana optima, Cæs. hortensis, Dod. Ger.

Carpeſium, Caſt.

II. Valeriana ſolijs Calcitrapæ.

Valeriana annua ſeu æſtiva, Cluſ. hiſt.

III. Valeriana peregrina purpurea albave.

Valeriana Indica, Cluſ. hiſt.

Valeriana peregrina ocimi folio, Col.

In Phytopinace, ſub 4. in Prod. ſub 6. & in Matth. figurâ additâ, deſcripſimus.

IV. Valeriana ſylv. major.

Phu ſimilitudine Elaphobosci, Dioscoridi.

Valeriana, Brunn. Gefn. hort. altera, Cæs.

Valeriana vulgaris, Trag. Cord. in Diosc. Lac.

Valeriana ſylv. Ad. Lob. Dod. Cam. Eyſt. prima, Cluſ. hiſt.

Valeriana major, Dod. gal. Lugd. Thal.

Phu Dioscoridis, Brunn. Colum. vulgare, Fuch.

Tur. Tab.

Phu Germanicum, Fuch.

Phu majus commune, Gefn. hort.

Phu parvum, Matth. Lac. Caſt.

Valeriana major, Tab. major ſylv. Ger.

V. Valeriana ſylv. major montana.

Valeriana 3. Trag.

Valeriana montana & 3. Tab.

VI. Valeriana paluſtris major: quæ 1. in Prod.

VII. Valeriana cæreulea.

Phu græcum, Dod. gal. Lugdun. peregrinum,

Gesn. hort.

Valeriana peregrina, Ad. Lob. Cam.

Valeriana græca, Dod. Tab. Ger.

Pſeudovaleriana dici poteſt, nam præter ſoliorum ſimilitudinem, nil cum Valeriana commune habet: flore eſt communiter cæreuleo,

aliquando albo.

Valeriana Græca ſi. cæreuleo &

Valeriana Græca ſi. albo, Eyſt.

VIII. Valeriana paluſtris minor.

Valeriana exigua vel 4. Trag.

Valeriana min. five pal. Thal. Ger. minor, Ad.

Valeriana minor ſyl. Lob. Lugd. minima, Dod.

ſylv. five paluſtis min. Cam.

Phu parvum, Dod. gal. minus, Gefn. hort. Lon.

Tab. minimum, Matth. Caſt. Lugd. Cam. ep.

IX. Valeriana paluſt. media parum lacinia-

ta: quæ 2. in Prod.

X. Valeriana alpina prima: quæ pro 4. in

Phytop. pro 3. in Prodr. deſcribitur.

XI. Valeriana alpina altera.

Phu ſaxatile ſeu petræum, Gefn. hort.

Valeriana ſylv. alpina 1. latifolia, Cluſ. hiſt.

XII. Valeriana alpina ſcrophulariæ folio,

quæ 6. in Phytop. 4. in Prodromo.

an Vale.



an Valeriana inodora 1. Cæf.

XIII. Valeriana montana subrotundo folio.

Valeriana montana, Lugd.

XIV. Valeriana montana inodora.

Valeriana inodora altera, Cæf.

Valeriana annua ex illa, Cam.

XV. Valeriana alpina Nardo celticæ similis.

Valeriana sylv. alpina 2. saxatilis, Cluf. hist.

XVI. Valeriana alpina minor: quæ 5. in Prodr.

XVII. Valeriana rubra.

Polemonij altera species, Dod. gal. Gefn. hort.

Limonium Monspeliensium, Gefn. hort.

Ocymastrum Valerianthos, Ad. Lob.

Valeriana rubra, Dod. Tab. Cam. Ger. Eyf.

Valeriana inodora 3. Cæf.

Phu peregrinum, Cam. ep.

Sunt qui Narcissum Virgilij & Columellæ

in hortis: alij Behen rubrum: alij Struthium:

alij Condurdum Plinij, l. 26. c. 5. velint.

XVIII. Valeriana rubra angustifolia: quæ 7. in Prodr.

XIX. Valeriana campestris inodora major.

Bupleuron Hipp. apud Plin. l. & c. 22. videtur.

Locusta quibusdam, Gefn. hort.

Phu minimum alterum, Lob. Lugd.

Album olus, Dod.

Polypremon Cassiani: Chalceum Plinij, l. 26.

c. 7. à foliorum colore, Lugd.

Valeriana campestris, Cam.

Laëuca agnina, Tab. Ger.

Bupleuron, Cæf.

an Valerianella altera nudo umbilicato & brevifemine, Col.

Variat magnitudine, folijs angustioribus,

latioribus & integris: quare figurae duæ apud

Tab. & Ger. reperiuntur, & abortiva, floris explicatione ab insectis prohibita.

XX. Valerianella echinata.

Valerianella cornucopoides echinata, Col.

XXI. Valerianella femine stellato.

Phu minus petrum, Tab.

Valeriana petraea, Ger.

Valerianella altera tenuifolia femine Scabiosæ

stellato, Col.

XXII. Valeriana sylv. folijs tenuiss. divisiss.

Phu minimum, Ad. Lob. Lugd.

## NARDUS MONTANA ET CELTICA.

**N**ardus montana, *νάρδος ὀρεῖν & βελανίτιν*, Diosc. l. 1. c. 7. at Celtica, quæ Spica Celtica, vel Romana Officinis, Eid. cap. 8. *νάρδος ὀρεῖν & βελανίτιν* sive Salinica, & l. 6. cap. 19. *νάρδος* dicitur. Salinica Plinio l. 21. c. 7. & 20. & Nardus Gallica, l. 6. c. 12. & l. 21. c. 20.

I. Nardus montana radice olivari.

Nardus montana, Matth. Ang. Ad. Lob. Lugd.

Cluf. hist. Cæf. Cam. Tab.

Radices binas, ternas & quaternas asphodelimodo, habet.

II. Nardus montana radice oblonga.

Nardus mont. longius radicata, Cam. ep.

III. Nardus Cretica filipendulæ radice.

Nardus Cretica Valerianæ simillima, Hon.

Belli ep. 4.

Nardus Cretica Belli, Pon.

IV. Nardus Celtica Dioscoridis.

Nardus Celtica, Matth. Cord. hist. Gefn. hort.

Tur. Guil. (cui & Salinica) Ad. Lac. Lob. Cast.

Cam. Tab. Ger.

Nardus alpina seu celtica, Cluf. pan. & hist.

Nardum gallicum, Cæf.

Spica Celtica, Lugd.

V. Nardus Celtica altera.

Spica celtica, fastigiato flosculorum ordine, Cam. ep.

Spica celtica, Tab.

Nardus celtica repens, Ger.

VI. Nardus ex Apulia.

Salinica Neapolitana, Lugd.

Phu minus Apulum, Tab.

VII. Nardo celticæ similis inodora: in

Prodromo descripta.

VIII. Nardo celticæ similis hirculus,

Hirculus, Ad. Lob. Cam. ep. Cæf. Tab. Ger.

Hirculus veterum, Cluf. in Gar. Lugd.

Hirculus & Nardus Samphorica, Ang.

# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER QUINTVS.

## SECTIO PRIMÆ.

SOLANVM; MANDRAGORA; HYOSCYAMVS; NICOTIANA; PAPAVER; HYPECOON; ARGEMONE

### S O L A N U M.

*Solanum*. ὄψις Græci vocant, quod vitæ, vel acinû, aut tale quid signat. Theoph. 19. hist. 2. 14. & 21. duo genera habet, ubi Gal. 4. Vesciarum reddidit: ad Diosc. 1. 4. c. 71. genera 4. recensuit: 1. ὄψις ὀνάνδιον, *Solanum bonense*; 2. ἄμμανα ἢ προκρίδα, *halicacabum*, aut *Vesciarum*; 3. ἄντρον, *somniferum*; 4. ἡνιόχον, *manicum*. Plin. 1. 27. c. 13. *Solanum* inquit, Græci *Strychnon* vocant: & 1. 21. c. 31. *Strychni* genera 4. enumerat.

*Solanum bacciferum.*

#### I. *Solanum Officinarium.*

*Solanum*, Brunf. vulgare, Trag. minus, Cæs. *Solanum*, Lon. hort. Matth. Fuch. Ang. Dod. Gesn. hort. Lob. Lugd. Cam. Ger. fativum, Tab. *Solanum nigrum*, Cord. in Diosc. & hist. quod edendo est.

Cuculus & Cacubalum Plinij, Ang.

*Solanum* hort. Circeæ aut Phaeoli folio, Ad.

Variet folijs magis laciniatis, ut Fuch. figura: alia *halicacabi*, ut Lob. ex primit: acinû nigricantibus & fuscis: puniceis, quod *Solanum puniceum* Cord. hist. rubris, luteis, quod *Solanum luteum* Gesn. hort. Sic in arenosis Michelsdæ vix palmam excedens, reperitur.

II. *Solanum vesciarium*, quod folliculi vesciæ inflatæ similes: vel ut Plin. 1. 21. c. 31. quoniam vesciæ & calculis profit.

*Saxifraga rubra* & 4. Brunf.

*Solan. halicac.* Trag. Matth. Lac. Ad. Lob. Lugd.

*halicacabum*, Ang. Cast. vulg. Fuch. Tur. Eyf.

*halicacabum, vesciarium*, Cam.

*Vescaria*, Cord. in Diosc. Gesn. hort. Cæs.

*Vescaria vulgaris*, Dod. gal. prima, Cast.

*Solanum vesciarium*, Gesn. hort. Dod.

*halicacab. five vescaria*, Cord. hist. Gesn. hort.

*Alkekengi*, Lon.

#### III. *Solanum vesciarium Indicum.*

*halicacabum five Solanum Indic.* Cam. Eyf.

#### IV. *Solanum manicum.*

*Solanum hortense nigrum*, Trag.

*Mandragora*, Theoph. Dod. gal. Ang. Guil. morion, Fuch. ico. Lon. tertia species, Cord. in Diosc.

*Solanum majus*, Matth. Cast. Cæs. Corn.

*Solanum somniferum*, Fuch. Tur. Ad. Lob. Lug.

*Solanum lethale*, Dod. Clus. hist.

*Solanum sylvat.* Gesn. hor. syl. five *lethale*, Thal.

*Belladonna*, Clus. pan.

Duum est generum: 1. folijs amplioribus & flore majore: 2. folijs & floribus minoribus.

V. *Solanum somniferum bacciferum.*

*Solan. somnifer.* alt. Matth. Gesn. hor. Lug. Cam.

*Solan. lethalis aliud genus*, Dod.

*Solanum somniferum*, Lon.

*Solanum de Hiericho*, Cast.

VI. an *Solanum manicum* ex Guinea.

Fructus minor 8 Paludani, Clus. ex 1. 2. c. 20.

VII. *Solanum somniferum verticillatum.*

*Solan. somnifer.* Matth. Guil. Gesn. hor. Lac. Cl.

hisp. & hist. Dod. Ad. Lob. Cast. Lugd. Cæs. Cam.

Acinû in folliculis hirsutis, per maturitatem

nunc rubri, nunc ex rubro crocei sunt.

VIII. Herba à militib. ad civitatem Philippî

evulsa & gustata, eos prope ad furorem & insani-

am redegit, qui tamen affectus paulo post mi-

nor redditus: par 9. Ind. occid. addit. quid est?

IX. *Solanum fruticosum bacciferum.*

*Strychnodendron*, Gesn. hort. Ad. Lob. ob. Eyf.

*Amonum*, Gesn. hort. Lob. ico. Plinij, Ger.

*Solanum arborecens*, Cast. Cæs. Cam.

*Solanum fruticosum*, Gesn. hort. Tab.

*Solanum Americanum*, Lugd.

Pseudo.

Pseudocapicum, Dod.

X. Solanum quadrifolium bacciferum.

After sed non Articus, Trag.

Herba paris, Matth. Ang. Dod. Cast. Cæs. Lugd. Thal. Ger.

Paris herba, Lon. Cam.

Aconium Pardalianches, Fuch. Tur.

Aconitum sive Pardalianches monotoëcon, Cord. in Diosc. & hist.

Solanum tetraphyllum, Gesf. hor. Ad. Lob.

Aconitum salutarium, Tab.

Folia habet communiter quatuor, aliquando tria, quinque, & sex.

XI. Solanum triphyllum Brasiliatum, loco in Prodromo describitur.

XII. Solanum scandens seu Dulcamara.

Dulcis amara, Trag. Dulcamara, Dod. Lugd.

Amara dulce, Cord. in Diosc.

Amara dulcis, Gesf. hor. Ang. Lob. ic. Lon. Tab.

Viris sylv. Matth. Lac. Cast. Cam. (Ger.

Solanum thymifolium, Thal.

Salicasterum Plinii, Guil. the. Cæs.

Circæa Monspelienfium, Ad. Lob. ob. Cam.

Videtur quibusdam *apocynum* in Diosc. l. 4. c. 183. sed muscolum florem suum Viti tribuit.

Salicasterum Plinii lib. 12. c. 1. Alijs Cyclaminus altera Diosc. & Melocroon Theophrasti.

Floris color communiter cæruleus, rarius albus est.

Dulcis amara flore pleno, &

Dulcis amara flore cæruleo vulgarior, Eyst.

XIII. Solanum tuberosum esculentum, sub 19 in Philop. sub 1. in Prod. & Matth. descriptum.

Picrococcus Dioscoridis, Cortuso.

Papas radix ex qua edulium Chunno dictum conficitur: Joseph. Acosta l. 4. c. 7. imò panis locum tenet, quem Chunno vocant: Eid. l. 3. c. 20.

An Papæ radicis genus tuberosum specie, sed exiguæ saporis: part. 6. Ind. Occid. c. 20.

Arachidna Theoph. Papas Peruvian. Clus. hist.

Papas Peruanorum, Eyst.

Hujus aliud genus in calidioribus sandis, ex quo fercula Locro appellata parant: Joseph. Acosta l. 4. c. 17.

XIV. Solanum racemosum cerasorum forma: pro 2. in Prod. descriptum.

*Solanum pomiferum.*

I. Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli.

Lycopersicon Galeni, Ang.

Poma amoris, Dodon. gal. Ad. Lobel. Cam. ep. Tab. Ger.

Poma amoris, Dodon. gal. Ad. Lobel. Cam. ep. Tab. Ger.

Pomum amoris, Lugd. Cam.

Malum & pomum aureum, Gesf. hor.

Aurea mala, Dod. Cast.

Solani pomiferi genus aliud, Gesf. hor.

Tumac Americanorum, Guil. pap.

Mala insana, Cæs.

Aliqui ad Solan. furiosum referunt: alijs Glaticium Dioscorid. est. Vide de Lycopersico, Dod.

Fructus communiter lutei, auricolores, aliquando pulchre rubentes: rarius albi est & sutrectis cubitalib. calliculis, quod per omnino minus est.

Poma amoris fructu luteo, &

Poma amoris fructu rubro, & Mala Peruv. Eyst.

II. Solanum pomiferum fructu rotundo striato duro.

Solanum pomiferum, Lob. Lug. Tab. Ger. Eyst.

Mala Æthiopica, Dod. Lugd. Ger.

Capficum rotundum Dalechampi, Lugd.

Folia magis minùve sinuosa: in caule alia quando ut & in folijs, modo inferat, modo superne, parvi aculei.

III. Solanum peregrinum fructu rotundo. Hyoscycamus peregrinus Dalechampi, Lugd.

I. Solanum pomiferum fructu oblongo.

Mala insana, Trag. Fuc. Dod. Lac. Lon. Tab. Ger.

Malum insanum, Gesf. hor.

Melongena, Matth. Cord. hist. Ad. Lobel. Cast.

Lugd. Cam. & Verengena Toletanorum.

Solanum hortense & Pyramfana, Cæs.

Melanazana fructu pallido, Eyst.

Videtur Strychnon hort. Dioscoridis, verum Theoph. Esculentum Galeni, & tertium genus Plinii.

Variat flore purpureo, albo: fructu, albo, purpureo, luteo: figura quandoque oblonga, alia quando inflexa mali rotunda.

V. Solanum pomiferum fructu inverso.

Melanazana, Arabum Melongena & Rodengiana, Rauvv. Lugd.

Variat colore fructus, qui flavus, cinereus, & purpureus.

*Solanum pomiferum fructu spinoso.*

I. Solanum pomiferum fructu nigro spinoso.

Melanazana nigra, Bathschain, Æthiopica, Rauvv. Lugd.

Fructus est longo, rotundo, atro, sub nigro.

II. Solanum spinosum fructu rotundo.

Pomum

Pomum Hiericoniticum, Imper.

III. Solanum pomiferum folio rotundo tenui.  
Cachos Indorum Monardi, Lugd.

IV. Solanum pomo spinoso rotundo, longo flore.

Stramonia sive pomum spinosum, Trag.

Nux metella, Matth. Cast. Acost. Cam.

Nux methel Avicennæ, Ang. Fuch. Ges. hor.

Hyoscyamus Peruvianus, Cord. hist.

Tatula Turcarum, Guiland. pap.

Paracoccalon sive barycoccalon, Græcis recentior.

Melospinus Venetis: Malus Peruviana.

Callisæprona regia quibusdam: Solanum Romanum Monspel. Guiland. l. c.

Stramonia, Fuch. Dod. Ges. hor. Lac. Lugd. Dodon. Cam. Eyst.

Stramonium peregrinum, Ad. (an Solanum manicum) Lob. Ger.

Hippomanes Cratevæ, Ang. Ges. hort.

Solani pomiferi genus 3. Ges. hor.

Solanum spinosum, Tab.

Solani pomiferi genus 3. Cæf.

Malum spinosum, Cæf.

V. Solanum fœtidum pomo spinoso oblongo.

an Manicum Diosc. ex hoc Muslac fieri ajunt.

Tatoula, quæ Nux methel Arabum: Græcis,

Solanum somniferum, Bellon.

Datura, Garzia, Acost. Cast. Lugd. prima, Cast.

Nuci metellæ congener, Cam. ep. Tatula, Ei. hor.

Solanum manicum, Col.

Stramonium spinosum, Ger.

Datura Turcarum, Eyst.

Dutroa, Linsc. part. 2. Ind. Or. c. 33. part. 3. c. 1. & part. 4. c. 17.

Dutros, Hispanis, Burlatoria: Arabibus: Mariana: Persis & Turcis, Datula, Palod. in Linsc.

Variat floribus colore: est vulgari flos albus

magnus: alterius flavus: tertij, Hyoscyami floribus accedit: quare tres Daturæ, Costæo: nunc

& purpureæ habetur.

IV. Solanum fœtidum pomo spinoso rotundo semine pallido.

Datura Ægyptiaca flore pleno, Pon. Ital.

Stramonia Ægyptiaca flore gemino altero alteri innato, C Bauhini, du Bry.

Commoniter duo flores alteri innascuntur.

VII. Solanum Ægyptiacum flore pleno.

Stramonia Ægyptiaca flore pleno extrinsecus purpurascens, intrinsecus albicante C. Bauhini, du Bry.

*Solanifolia.*

I. Solanifolia Circæ dicta major.

Lappa sylv. Trag.

Ocimum verrucarium, Ges. hort.

Circæ Lutetiana, Lob. Dalech. Lugd. Ger.

Helxine sylvestris, sive fluvialis, Thal.

Herba D. Stephani, Tab.

Circæa, Eyst.

II. Solanifolia Circæ alpina.

Circæa minima, Col.

III. Solanum Mexiocanum flore magno.

Magnæ admirationis herba Peruviana, Lobel.

Castor.

Marabillas, del Peru & Hachal Indi, Clus. part.

Admirabilis Peruviana, Eid. hist.

Gelfeminum rubrum & Mandragora Theophr.

Cæf. alp.

Gelfeminum sive Jasminum Indicum, Cam.

Jasminum rubrum Dalechampi, Lugd.

Viola Peruviana, Tab.

Mirabilia Peruviana, Ger.

Jasminum Indicum seu flos mirabilis Peruanus, Eyst.

Jasminum Indicum flore rubro & variegato, Eidem.

Flores purpurei seu Kermesini coloris, laterici, flavi aut pallentes, obsoletè rubentes, exal-

bidi, binis coloribus ex purpureo & luteo mixtis: sic ex rubro, luteo, albo, in uno flore magna

varietas: nonnunquam albo & purpureo simul

dimidiarim in eodem flore tingitur: sive inae-

qualibus vel latis, vel minutis maculis purpureis tam punctatim, quàm virgatim album co-

lorem intercurrentibus, quandoq; radijs flavis

per longitudinem flores distinguuntibus.

IV. Solanum Mexiocanum flore parvo: sub

Solano 4. in Prodomo describitur.

V. Solanum Indicum hirsutum corymbiferum.

Solani Indici genus, Clus. exot. l. 4.

## M A N D R A G O R A.

**M**andragora, à mandra, à quædam Dioscor. l. 4. c. 76. Mandragora, quod ad mandra pecorum, alia, à pelum, à quædam. Circæa, quædam à Circæ deducto, quoniam radin ad amatoria conducere videatur.

Genetia

*Genera Diofc. nigra femina, que deſolans, & candida mas, ut vocitata: tertium niger, quod mari quidem ſimile, ſed omnibus partibus minus eſt. Plinio l. 29. c. 13. Mandragora alia candida mas, alia nigra femina. At Theophr. 6. hiſt. 2: 9. hiſt. 9. & 6. cauſ. 4. Mandragora, à prædictis diuerſa eſt.*

### I. Mandragora fructu rotundo.

Mandragora mas, Trag. Fuch. Matth. Dod. gal. Lac. Cord. in Dioſc. Ad. Lob. Lugd. Cam. maſculus, Tur.

Mandragora, Ang. Mandragoras, Gef. hor. Cæſ. Mandragoras albus ſeu maſculus, Cord. hiſt. Mandragora mas vel alba, Cam.

### II. Mandragora fructu pyri.

Mandragoras femina, Trag. Matth. Cordo in Dioſc. Lac. Ad. Lob. Dod. Lugd. Cæſ. Cam. Mandragor. niger ſeu femina, Cord. hiſt. Cam.

III. Mandrag. flore ſubæruleo purpureſcente. Mandragora femina, Clu. hiſp. & hiſt. Caſt. Eyiſt. Mandragora, Lon. altera, Cæſ.

## HYOSCYAMUS.

**Y** *oeniaque Dioſcorid. lib. 4. cap. 69. id eſt, ſaba ſuilla, vel porcina, quod apri ejus paſtu reſolvantur & convellantur, præſentis morbi periculo, niſi aqua copioſa, ſtatim ſe ſerui & intus polluerent, ut Aelianus prodidit. Dioſcorides differentias tres propoſuit: unam ſemine nigro, floribus penè purpureis: alteram ſemine ſulſavo, floribus luteis: tertiam miſiſſimam, candidi floris & ſeminis. At Plin. lib. 25. c. 4. Apollinarius genera plura ſunt: unum ſemine nigro: alterum candidum: tertium Irionis ſemini ſimile: quartum candidi ſeminis in maritimo: item ruſi ſeminis.*

### I. Hyoſcyamus vulgaris vel niger.

Hyoſcyamus, Brunf. Tur. Matth. Lac. Lug. Cæſ. Hyoſcyamus vulgaris, Gef. hort. Thal. Eyiſt.

Hyoſcyam. 1. Ang. Tab. ſecundus Galeni, Trag.

Hyoſcyam. niger, Dod. Lon. Ad. Lob. Caſt. Ger.

Hyoſcyamus flavus, Fuch. niger vulg. Cluſ. hiſt. Apollinarius, Cord. in Dioſc.

Folia integra, diſſecta, in lacinias acutas diſiſa.

### II. Hyoſcyamus albus major, vel 3. Dioſcor.

& 4. Plinij.

Hyoſcyamus candidus, Trag.

Hyoſcyamus albus, Matth. Dod. Gef. hort. Tur. Lac. Ad. Lob. Lon. Caſt. Lugd. Cam. Ger. Eyiſt.

ſecundus, Tab.

Hyoſcyami alterum genus in maritimis, Cæſ.

Apollinarius 3. Cord. in Dioſc.

### III. Hyoſcyamus albus minor.

Hyoſcyamus alter, Ang.

Hyoſcyamus albus minor, Lob. ico. alb. vulgaris, Cluſ. hiſt.

### IV. Hyoſcyamus Creticus luteus minor.

Hyoſcyamus 4. vel albus Creticus, Cluſ. hiſt.

V. Hyoſcyamus Cretic. lut. major: hic ſub ſ. in Phytopinace, in Prod. etiam & Matthiolo deſcriptus & pictus.

Hyoſcyamus Creticus alter, Cluſ. hiſt.

### VI. Hyoſcyamus rubello flore.

Hyoſcyamus peregrin. rubello flore, Cluſ. pan.

Hyoſcyamus Syriacus, Cam.

Alterum Camerarius addit, Hyoſcyami peculiaris nomine, qui ſola foliorum latitudine à prædicto differt.

### VII. Hyoſcyamus cauliculis ſpinofiſſimis.

Ægyptiacus.

Hyoſcyamus Ægyptiacus, Cluſ. hiſt.

## NICOTIANA.

**N**icotiana à Jo. Nicotio Regi Gallie conſiliario diſta, cujus opera, Anno 1560. Gallijs Innotuit, quam Ulyſſipona, dum legati munere fungeretur, à Belga è Florida Inſula allaſam, accepit.

### I. Nicotiana major latifolia.

Hyoſcyami tertia ſpecies, Gef. hor.

Sana Sancta Indorum, Ad. Lob. Ger.

Tabacum (ab ejus nominis Inſula) Monar. Fra.

Tabacum latifolium, Cam. Eyiſt.

Petum, Theu. latifolium, Cluſ. ad Monar.

Hyoſcyamus Peruvianus, Uod. Cam. ep.

Nicotiana, Lon. Lugd. major, Tab.

Perebecenuc, Oviedo, Lugd.

Tornabona, qui à Tornabonio miſſa, Cæſ.

Herba S. Crucis femina, Caſt.

Tubac & Tubackæ par. 5. Ind. Or. & par. 6. & 8.

Tabacum, Tabaco & Tabacca: par. 8 & 9. Ind.

Occid.



Uppónvoc, Virginæ indigenis: desc. Virgin.  
Petum Brasiliæ, Stadio, l. 2. c. 13.  
Arbustum cujus folia exsiccant & accensorum  
fumo inebriantur, Benzon. l. 1. c. 26.

Lerius asserit Nicotianum licet apud nos Petum nominetur, attamen verum Petum Brasiliæ non esse, seque ne quidem in hortis Galliæ vidisse, & apud nos ob cæli inclementiam ægrè adolescere posse credat.

Ex hujus herbæ fumo, octo aut novem dierum famem tollerare posse, in par. 3. Amer. ep. 1. scribitur: at Lerio per triduum aut quadriduum.

II. Nicotiana major angustifolia: & Eyst.

Herba Sancta sive Tabacum minus, Lob. ob.

Tabacum sive herba Sancta minor, Lob. ico.

Petum angustifolium, Clus. ad Monar.

Hyoscyamus Peruvianus alter, Dod.

Herba Sanctæ Crucis mas. Cast.

Tabacum angustif. Cam. alterum minus, Lugd.

III. Nicotiana minor: & Eyst.

Hyoscyamus niger vel 3. Matth. Cast. Lugd.

Hyoscyamus luteus, Dod. Ges. hort. Lon. Cam. Ger. multum cum 2. Diosc. convenit, Ang.  
Hyoscyamus dubius luteolus Solanifolius, Ad. Lobel.

Hyoscyamus Peruvianus, Tab. Priapeja, à forma fructus, Ges. hor.

Petum quartum, Clus. ad Monar.

Tornabonæ congener, Cæf.

Nicotiana minor seu Hyoscyamus luteus, Eyst.

IV. Nicotiana minima.

Tabacum sive sana Sancta minima, Lob. Lugd.

Tabacum minimum, Cam.

Petum tertium, Clus. ad Monar.

V. An Nicotiana species in Insula Mambonit, pyratæ herbam quandam comedunt, quæ inebriati & demerati, omnia pericula postponunt: par. 7. Ind. Or. 20.

VI. Calsina herba è cuius succo potionem conficiunt in Florida, quam bibunt ubi in locum periculosum se conferunt, quo famem & sitim per horas 24. tollunt: part. 2. Amer. navig. 4.

## P A P A V E R.

**M**HNOR à πῶν ἡνὲν, non ministrando, quod vescentes sui muniji fungi non possint. Latinis Papaver, Dioscoridi, lib. 4. cap. 64. 65. & 66. quinque genera proposuit: 1. MHNOR ποῖον, papaver erraticum, à flore protinus deciduo, qui puniceus, interdum albus. II. MHNOR ἰσμεῖον & papaver sativum, quod semine candido, quod vulgarior. III. Sylvestre duplex, unum nigro semine, quod mHNOR & quibusdam ποῖον, quod è scapo succus lacteus emanet: alterum majus sylvestre & ad medicinas valentius. IV. MHNOR παρὰ λίον, si alii παραλίον papaver corniculatum, à calyculo in corniculorum modum inflexo, aut maritimum. V. MHNOR ἀρρῶν, alii papaver spumeum, quia herbula tota est spumosa, quibusdam ἀρρῶν Heracleum. Theophrastus sativi 3. hist. 15. & 9. hist. 8. meminit: Sylvestrum verò genera 9. hist. 13. plura notavit: ut corniculatum: nigrum: erraticum flore ruffo: Herculanum folio Struthij. Plinius l. 20. c. 13. sativum album & nigrum proposuit, & ex hujus scapo inciso, opium colligi monet: at cap. 19. inter sativa & sylvestria medium genus, RHNOR sive erraticum consuevit. Sylvestrium unum genus Ceratium, quod aliqui glaucion, alij παραλίον vocant: alterum est betacleon, ab alijs apbron: tertium genus est tithymalon, mecona vocant, alij παραλίον.

I. Papaver hortense semine albo: sativum Diosc. album, Plinio.

Papaver, Brunf. Ang. Lon.

Papaver sativum, Matth. Dod. gal. Lugd. Tab.

Papaver sativum purpureum, Tur.

Papaver album, Trag. Dod. candidum, Ad. Cæf.

Papaver album sativum, Gesn. hort. Lob. Cast. Gerard.

Papaver sativum semine candido, Fuch.

Flos candidus, vel leviter purpureus: aliquando flore est cinereo, ungue purpureo: vel candido, rubris maculis infecto & semine flavo: & hoc

Papaver tertium & luteum est, Trag.

II. Papaver hort. nigro semine: sylv. Dioscoridi: nigrum, Plinio.

Papaver nigrum, Brunf. Cast. minus, Ges. hort.

Papaver sativum alterum vulgo nigrum, Cord. in Diosc.

Papaver sativum semine atro, Fuch.

Papaver nigrum sativ. Dod. flore malvæ hortensis aut Pconix, Ad. Lob. Lugd.

III. Papaver vulgare cujus capitula foraminibus hiant, semine incano, ἀρρῶν, Dioscoridi.

Papaver vulgare & 1. Trag.

Papaver tertium, Dod. delect.

Papaver patulum, Ad.



Papaver spontaneum sylv. Lob.

IV. Papaver flore rubro semine fusco.

Papaver rubrum, Trag. Gesn. hort.

Papaver sylv. Dod. gal. Lugd.

Papaver nigrum, vel 2. Dod.

V. Papaver cristatum floribus & semine album.

Papaver candidum alterum, vel 6. Trag.

Papaveris sat. species folijs dissectis, Dod. gal.

Papaveris albi altera species florum folijs crenatis, Gesn. hort.

Papaver Memphiticum, floribus multifidis, Gesn. ap.

Papaver sativum 4. Dod.

Papaver fimbriatum aut cristatum album, Ad. Lob. Lugd.

Papaver flore fimbriato, Cæs. flore niveo, Tab.

Papaver sativum nigrum, Ger.

VI. Papaver cristatum floribus rubris, semine nigro.

Papaver rubrum alterum, vel 7. Trag.

Papaveris rubri species folijs florum crenatis, Gesn. hort.

Papaver sativum nigrum cristatum, Ad.

Papaver fimbriatum aut cristatum nigrum, Lob.

Papaver 2. folijs dissectis, Dod.

Papaver sativum rubrum fimbriatum, Lugd.

Hæ duæ species floris colore variant, subinde albus, frequenter rubeus, quandoque ex utroque mistus: & qui rubet, aliquando colore purpureæ, aliquando dilutius rubet: hinc

Papaver flore pleno rubeum.

Papaver flore multiplici incarnato.

Papaver flore multiplici purpurascente.

Papaver flore miniato pleno.

Papaver flore pleno argentei coloris.

Papaver multiplex album oris rubicundis, ex hort. Eyf.

VII. Papaver pleno flore album.

Papaver flore multiplici, Gesn. hort. Cam. ep.

Papaver polyanthos, Tab.

Papaver alb. polyanthon seu multifi. Lob. Ger.

Papaver flore multiplici numero denso, Cæs.

Est majus & minus: floris colore purpureo, rubro, rubeo saturato, albo, violaceo & mixto: hinc septem figuræ apud Tabernæmontanum & Gerardum habentur.

VIII. Papaver pleno flore nigrum.

Papaver nigrum polyanthon, Lob. Ger.

IX. Papaver laciniatis floribus,

Papaver laciniatum rubrum, aliud unguibus purpureis, aliud unguibus albis, Eyf.

X. Papaver errat. majus: *puls* Dioscoridi, Theoph. Plinio.

Papaver rubrum, Brunf. erraticum, Eid.

Papaver erraticum, Matth. Cord. in Dioscorid. Gesn. hort. Lac. Lon. Dod. Cast. Cæs. Thal. Tab.

rubrum, Eyf.

Papaver erraticum primum, Fuch.

Papaver Rhœas, Lob. Ger. prius, Lugd. alterum, Dod. gal.

Papaver rhœas sive caduco flore puniceo, Ad. Lob. ico.

Flore est puniceo, rarissimè albo.

XI. Papaver erraticum pleno flore.

Argemone multiplex, Trag.

Papaver rhœas flore pleno, Cam.

XII. Papaver errat. Pyrenaicum flore flavo: quod pro primo in Prodomo describitur.

XIII. Papaver erraticum minus.

Argemone exigua, & 2. Trag. Lugd.

Argemone, Lac. Lon.

Papaver rhœas, Dod. gal. rhœas minus, Lugd.

Papaver erraticum alterum, Fuch. Dod.

Papaver erraticum minus, Tab.

XIV. Papaver corniculatum luteum: *puls* Diosc. Theoph. sylv. ceratitis, Plinio.

Papaver sylv. corniculatum, Trag.

Papaver corniculatum, Matth. Lac. Ad. Lobel. Cast. Cæs.

Papaver corniculatum primum, Tab. majus, Dodon.

Papaver corniculatum luteum, Fuch. Tur. Eyf.

Papaver corniculatum flavo ore, Clus. hist. Eyf.

Papaver cornutum, Dod. gal. Cord. in Diosc. & hist. Gesn. hort. Lon. Lugd. Cam.

XV. Papaver cornic. phœniceum hirsutum.

Papaver cornutum rubro flore, Gesn. hort. Ger.

flore phœniceo, Ad. Lob. Clus. hist.

Papaver cornutum alterum florib. rubris, Cam.

Papaver corniculatum, rubrum, Dod.

Papaver corniculatum alterum, Lugd. Tab.

Flos interdum intensè rubens, interdum languidus, aliquando pallidus.

XVI. Papaver corniculatum phœniceum glabrum.

Papaver corniculatum phœniceum alterum, Lob. ico. phœniceo pallescente flore, Clus. hist.

XVII. Papaver spinosum: quod sub 1. in Phytopinace, sub 2. in Prodr. & in Matthiolo

descriptum & pictum: quo etiam nomine postea Clus. in sua hist. & Eyst. proposuere.

Ficus infernalis Italarum.

an Glaucium Dioscoridis: γλαυκίον succus est herbæ folijs ferè papaveris corniculati, quæ crocei coloris succo copioso prædita sunt Dioscorid. lib. 3. cap. 100. Et hujus papaveris folia, succo flavescente, instar Chelidoniij majoris, abundant.

XVIII. Papaver corniculatum violaceum. Papaver cornutum flore violaceo, Gesn. hort Ger.

Papaver corniculatum violaceum, Lob. Dod. Lugd. Cast. violaceo flore, Clus. hist.

Anemone Narbonensis major corniculata, Adversf.

Anemone major corniculata Penæ, Lugd. Flores cærulei, & nigra violæ æmuli.

## HYPECOON.

**Y** *ὑπεκόν* si dicitur *ὑπεκόν*, papaveri Dioscorides, lib. 4. cap. 68. subicit, cum eadem eis sit natura, quæ succo papaveris. Et Plin. lib. 27. cap. 11.

### I. Hypocoum.

Cuminum sylv. alterum, Matth. Cast. Lugd. Tab. Cam.

Hypocoum, Gesn. hort. Dod. Clus. hisp.

Hypocoum legitimum, Eid. hist.

Cumino siliquoso persimilis, Ad.

Cuminum sylv. alterum Dioscorid. Italarum, Lob. ob.

Cuminum sylv. alterum siliquosum, Eidem icon.

Cuminum corniculatum, Ger.

### II. Hypocoi altera species.

Cuminum alterum Diosc. siliquosum, Ad.

Cuminum alterum Dioscor. sylv. siliquosum, Lob. icon.

Cuminum sylv. siliquosum Penæ, Lugd.

Cuminum sylv. 3. & siliquosum minus, Tab.

Cuminum siliquosum, Ger.

A priore differt folijs angustioribus, longioribus, glaucis, siliquis deorsum recurvis.

## ARGEMONE.

**A** *ἄργεμον* in totum papaveri sylv. simile Dioscorid. lib. 2. cap. 208. radicem rotundam tribuendo, quod nostra non convenit. Sic dicta, quod ἄργεμον oculorum & nubes expurget. Plin. lib. 25. cap. 9. Argemonia: nostri tria genera faciunt, & id demum probant, cujus radix ihu redolet. Sed videtur Plinius quatuor genera agnoscere, ut lib. 21. cap. 23. Anemonem, quam Argemonem vocari dixit: 2. genus hoc est: 3. genus, lib. 24. cap. 19. lappam Canariam, cujus radix jucundum odorem, thuri similem spirat, Argemonem nuncupari tradit: 4. genus statui potest, Inguinaria, quam lib. 26. cap. 9. etiam Argemonem appellari testatur.

### I. Argemone capitulo brevior.

Anemone minor, Coriandri folio, flore Pulsatillæ, capitulis hirsutis, Ad.

Argemone capitulo torulis canulato, Lob. Ger.

Argemone minor capitulis brevioribus, Lugd.

Argemone, Cast. prima, Tab.

Anemone minor Penæ, Lugd.

### II. Argemone capitulo longiore.

an Argemone, Cord. hist.

Anemone Narbonensis major corniculata, Ad.

Argemone capitulo longiore, Lob. Lugd. Ger.


Papaver erraticum alterum, Cæs.

Argemone 2. Tab.

III. Argemone alpina folijs Scandicis lutea: in Prodr. descripta.

IV. Argemone alpina Coriandri folio.

Argemone lutea, Penæ Ital. qui in Baldo collectam transmisit,



## SECTIO SECUNDA.

ANEMONE; PULSATILLA; ADONIS.

## ANEMONE.

**A**νέμωνε Dioscoridi, lib. 2. cap. 207. Anemone, Plinio, l. 21. c. 23. ἀνὸ τῷ ἀνέμῳ, à vento, quòd flos tantum vento flante aperitur, unde & Herba venti quibusdam.

Genera duo Diosc. & Plinio, sylvestre & sativum: hujus, inquit, multa species, phæniceo flore, altera candidante, aut lacteo, aut purpureo.

*Anemone latifolia simplicis flore.*

I. Anem. Cyclamini seu malvæ folio lutea.

Anemone latif. Clus. hisp. Lob. Lugd. Tab. Ger.

Anem. hort. latifol. 1. simpl. flavo flore, Clus. hist.

Flos 10. aut pluribus folijs constans, externè flavus, internè aureus.

II. Anem. Geranei rotundo fol. purpurascens.

Anemone latifol. altera, Clus. hisp.

Anemone hort. latifol. simpl. flore 3. Eid. hist.

Anemone 1. Dod. Cæs.

Anem. tuberosa bulbocastani radice, Lob. Ger.

Anemone papaveracea, Tab. Ger.

Anemone stellata purpurea & alba, Eid.

Geranium 1. quorundam Dalech. Lugd.

Flos ex 12. aut 15. folijs, foris cineraceis hirsutus, interius rubedine purpurea nitentibus componitur: quare in dilutiore purpura rubet: aliàs interius intensiore, exterius remissiore: rarius totus albet.

III. Anemone Geranei rotundo folio dilute purpurascens.

Anemone hort. latifolia 4. simpl. flore, Clus. hist.

Flos externè exalbidi obsoleti coloris, internè ex purpura dilutior albicat.

IV. Anem. Geranei rot. folio dilute rubens.

Anemone hort. latifol. 5. simpl. flore, Clus. hist.

Floris folia octona foris obsoletè rubent, lagnine pubescunt: interius dilutior rubore & ad carneum tendente nirent, unguib. albicant.

V. Anemone latifol. simplici carneo flore.

Anemone hort. latifol. 6. simpl. flore, Clus. hist.

Flos 10. aut 12. foliorum purpurei ferè coloris, unguibus albicantibus.

VI. Anemone latifolia flore purpureo saturo.

Anemone hort. latifol. 8. simpl. flore, Clus. hist.

Flos 8. foliorum, coloris purpureo saturo, exterius splendentis unguibus magnis & ad pediculum purpureis.

VII. Anemone latif. purpureo violaceo flore.

Anemone hort. latif. 12. simpl. flore, Clus. hist.

Flos octo folijs constans, externè dilute purpurascens splendet: internè violaceus, unguibus magnis & argentei coloris.

VIII. Anemone latifolia flore purpureo violaceo altera.

Anemone hort. latifol. 13. simpl. flore, Clus. hist.

Flos qui ex 12. folijs constat: foris ex purpureo albescit & splendet: interius ex violaceo purpureo splendet, unguibus albis.

IX. Anemone latifolia violaceo flore.

Anemone hort. latif. 9. simpl. flore, Clus. hist.

Flos octo vel plurium foliorum, externè subpurpureus & splendens, internè ex purpureo violaceus, unguibus rubescantibus, orbe albicante cinctis.

X. Anemone latif. fl. violaceo saturo colore.

Anemone hort. latifol. 11. simpl. flore, Clus. hist.

Flos sex folijs præditus, violacei saturationis coloris, unguibus majorib. magisq; candidis.

XI. Anemone latifolia flore variegato.

Anemone hort. latifolia 7. simpl. flore, Clus. hist.

Flos qui octifolius, foris ex purpureo saturatius rubet, interius ad unguem usque albus saturat purpura & quasi Kermelina nitet: oris coccineis, in quæ radij purpurascences sparguntur: ungues maguos & albos habet.

XII. Anemone latifolia punctato flore.

Anemone hort. latifol. 10. simpl. flore, Clus. hist.

Flos octifolius violaceus, interna parte maculis albis aspersis.

XIII. Anemone latifolia flore carneo.

Anemone hort. latifol. 14. simpl. flore, Clus. hist.

Floris modò majoris, modò minoris, octo folia extrinsecus nonnihil purpurascunt, intrinsecus ferè carnei, vel saturationis, vel dilutioris, unguibus albis.

XIV. Anemone latifolia Saniculæ folio.

Anem. simplex latif. dilute purpurascens, Fyft.

Y 3

XV. Ane-

XV. *Anemone latif. flore orangei coloris.*  
*Anemone hort. latif. 15. simpl. flore, Cluf. hift.*

Floris octo vel novem folia, externè carnei coloris, unguibus saturatè purpurascens, internè carnei diluti: Habetur major & minor.

XVI. *Anemone latifolia flore coccineo.*

*Anemone latifolia coccineo flore, Cluf. pan.*

*Anemone hort. latif. 16. simpl. flore, Cluf. hift.*

Floris octo folia, internè elegantissimo coccineo nitent, unguibus orbis pallescens ambit, externè quadam lanugine pubescunt: huc pertinet *Anemone latifolia fl. coccineo simplici, Eyst.*

Flos coccinei coloris, medium è fusco nigricans & capitulum multis folijs staminulis pallidè virentibus septum.

XVII. *Anemone latif. flore magno coccineo.*

*Anemone hort. latif. 17. simpl. flore, Cluf. hift.*

Floris octo folia internè elegantissimo coccineo colore fulgent, nullis unguibus apparentibus, externè color dilutior; & lanuginosa.

XVIII. *Anemone latifolia flore coccineo phœniceo.*

*Anem. latif. Byzantina coccin. colore, Cluf. pan.*

*Anemone hort. latif. 18. simpl. flore, Eid. hift.*

Flos amplius octifolius, coloris ex coccineo phœnicei, ut in Rhœade, unguibus parvis subpallidis.

*Anemone tenuifolia simplici flore.*

I. *Anemone Geranei Ropertiani folio cærulea: an Dioscoridis?*

*Anemone tenuifolia tertia, Cluf. hifp.*

*Anemone hortensis tenuifolia simplici flore 1. Eid. hift.*

*Anemone 2. Dod. Lugd.*

*Anemone tuberosa Geranifolia, Lob.*

*Anemone montana, Cæf.*

*Anemone Ropertiana, Tab. geranij folia, Ger.*

Flos ex 14. aut 15. foliolis mucronatis compositus, coloris est cærulei, vel rubri, vel ex utroque mixti: est externa parte subcærulei, interna albi: sic flore nunc cæruleo, nunc rubro, nunc albo reperitur: quare Tabern. tres species, alba, cærulea & rubra.

II. *Anemone tenuifolia flore multifido dilutè purpurascens.*

*Anemone hort. tenuif. 9. simpl. flore, Cluf. hift.*

Flos ex 14. & plurib. foliolis dilutè purpureis, & quasi carneis, nullis unguibus vestigijs constat.

III. *Anemone oenantes folijs flore violaceo hexaphyllo.*

*Anemone tenuifolia altera, Cluf. hifp.*

*Anemone hort. tenuif. simpl. flore 2. Eid. hift.*

*Anemone tertia, Dod. Lugd.*

*Anemone bulbosa radice, Ad.*

*Anemone tuberosa radice, Lob. ob. Ger.*

*Anemone, Cast. angustifolia, Tabern. tenuifol. Cam. at. 1. in epist.*

*an Anemone altera, Cæf.*

*Anemone tenuifol. fl. purpureo violaceo, Eyst.*

Flos, qui ex 6. interdum 7. & 8. folijs compositus est, communiter est purpureus seu violaceus, externa parte lanuginosus: est ruber seu phœniceus, vel ex purpura rubens: est & albus: quare apud Tabernæmontanum.

*Anemone corallina violacea & alba: &*

*Anemone angustifolia, & 4. & apud Gerard. figurâ tres.*

IV. *Anemone tenuifol. fl. pallidè coccineo.*

*Anemone hort. tenuif. 16. simpl. flore, Cluf. hift.*

Flos hexaphyllus, foris tenui lanugine pubescens, coloris dilutè rubescentis, internè coccinei valdè diluti, unguibus amplis albis.

V. *Anemone tenuif. coccineo fl. hexaphyllo.*

*Anemone hort. tenuif. 3. simpl. flore, Cluf. hift.*

*an Anemone alterum genus, Cæf.*

Flos floridi coccinei coloris, unguibus magnis, ex pallido, fusco & albo mixtis.

VI. *Anem. tenuif. coccineo flore octophyllo.*

*Anemone hort. tenuif. 4. simpl. flore, Cluf. hift.*

Flos internè coccineus, unguibus albis, & externè coccineus, tenui lanugine pubescens & splendens.

VII. *Anemone tenuifolia flore magno coccineo hexaphyllo.*

*Anemone tenuif. coccineo flore simp. Cluf. pan.*

*Anemone hort. tenuif. 5. simpl. flore, Eid. hift.*

Flos intus elegantissimus coccineo colore nitet, foris lanugine pubescit: unguibus albi sunt.

VIII. *Anem. tenuif. flore coccineo sanguineo.*

*Anemone hort. tenuif. 7. simpl. flore, Cluf. hift.*

Flos 5. 6. interdum 7. foliorum, coloris coccinei, ad sanguineum vergentis, unguib. magnis exalbidis, purpureis venis distinctis: aliquando flos ad costæ lateris colorem accedit, nec splendet.

IX. *Anem. tenuif. flore sanguineo coccineo.*

*Anemone hort. tenuif. 8. simplici flore, Cluf. hift.*

Floris sex folia, externè lanugine obducta, coloris sunt sanguinei saturatoris & splendentis, internè sanguinei coccinei permixti.

X. *Anem.*

X. *Anemone tenuifolia* flore sanguineo coccineo altera.

*Anemone hort. tenuifol. 20. simp. flore, Clus. hist.*  
Flos major hexaphyllus, sanguineo colore, vel inter coccineum & cochinellem medio, unguibus minoribus, & albicantibus.

XI. *Anemone tenuifolia* flore ex sanguineo & coccineo medio.

*Anemone hort. tenuifol. 19 simp. flore, Clus. hist.*

Flos hexaphyllus, coloris ex sanguineo & coccineo medij, diluti, ei prorsus similis quem vulgus cochinellem appellat: unguis magni, albi & quasi argentei.

XII. *Anemone tenuifolia* flore amplo sanguineo hexaphyllo.

*Anemone hort. tenuifol. simp. flore 6. Clus. hist.*

Flos coloris sanguinei elegantissimi, unguibus magnis albis.

XIII. *Anemone tenuifolia* flore amplo atrorubente.

*Anemone hortensis tenuifolia 17. simplici flore, Clus. hist.*

Flos hexaphyllus, coloris sanguinei ex atrorubentis & quasi sericei panni villosi Kermesino colore præditi, cærulei.

XIV. *Anemone tenuifolia fl. rubro saturo.*  
*Anemone hort. tenuifol. 16. simp. flore, Clus. hist.*

Flos hexaphyllus, ruber, seu potius sanguineus, unguibus magis saturis, venis albicantibus distinctis.

XV. *Anemone tenuifolia* flore niveo.

*Anemone hort. tenuifol. 13. simp. flore, Clus. hist.*

Flos hexaphyllus niveus, cujus unguibus carnei quid aspersum: apicibus ex obscura purpura nigricantibus.

XVI. *Anemone tenuif. flore amplo candido.*

*Anemone hort. tenuifol. 12. simp. flore, Clus. hist.*

Flos hexaphyllus, prorsus candidus, unguibus externè virefcentibus, apicibus nigris.

XVII. *Anemone tenuifolia Cretica* flore magno albo: quæ in Prodr. sub 1. descripta est.

XVIII. *Anemone tenuifolia fl. albicante.*

*Anemone hort. tenuifol. 35. simp. flore, Clus. hist.*

Flore est hexaphyllo candicante, staminibus albis, apicibus subcæruleis.

XIX. *Anemone tenuifolia* flore exalbido majore.

*Anemone hort. tenuifol. 10. flore simp. Clus. hist.*

*Anemone tenuifolia carneo flore, Clus. pan.*

Flos magnus, hexaphyllus, coloris primum

exalbidi virefcentis, dein ad carneum tendentis, unguibus externè virefcentibus, internè albis, staminibus carnei coloris.

XX. *Anemone tenuif. fl. exalbido minore.*

*Anemone hort. tenuifol. 11. simp. flore, Clus. hist.*

Flos minor ex 6. & pluribus foliis compositus, coloris extrinsecus carnei albo mixti: intrinsecus verò prorsus ferè albi: unguibus & venis ex albo paululum virefcentibus.

XXI. *Anemone tenuif. flore furvo albicante.*

*Anemone hortensis tenuifolia 21. simplici flore, Clus. cur. post.*

Flores cineraceo sive furvo, albicans, & tenui velut rubedine perfusus, ut ferè est Capucinatorum pannus.

XXII. *Anemone tenuif. flore carneo striato.*

*Anemone hort. tenuifol. 14. simp. flore, Clus. hist.*

Flos hexaphyllos externè carneus, oris albicantibus: internè exalbidus, venis carneis ad medium folium sparsis, staminibus purpurascentibus, apicibus nigricantibus.

XXIII. *Anemone tenuifolia* flore magno suaverubente, unguibus albis.

*Anemone tenuifolia flore suaverubente Caccini: ad Clus. cur. post.*

Has varietates, ratione fieri credibile est, cum in alijs quibusdam plantis etiam contingere observatum sit. Nam natura, in floribus *Anemones* coloribus, non minus quàm in Tulipis & Iridibus ludit: ita ut plusquàm triginta discrimina in colore, aut unguum varietate, aut foliorum numero observata fuerint.

*Anemone Matthioli.*

Omnes *Anemones* singulares caules, interdum duos aut tres, vel pures, nullis ramis præditos proferre observatum fuit, nisi fortè id naturæ lusu contingat, uno alteròve ramulo inter superna folia summum caulem amplectentia, enato. Quare, quid *Matthioli* suis *Anemonibus* quatuor propositis velit, non assequimur: omittere tamen nolimus.

I. *Anemone prima*, *Matth. Lugd.*

II. *Anemone secunda*, *Matth. Lugd.*

an *Ranunculus* flore globofo.

III. *Anemone quarta*, *Matth. (at in edit. secunda, 1.) Cast. Lugd.*

*Anemone. Lac. Anemone. ramosa purpurea, Tab.*

IV. *Anemone quinta*, *Matth. (at in edit. secunda Anemone altera) Cast. Lugd.*

*Anemone altera. Lac.*

*Anemo-*

Anemone ramosa lutea, Tab.

V. Anemone varia radice fibrosa peregrina.

Anemones genera varia, floris rosei, lutei, purpurei varietate distincta, aspectu pulchra: vario floris colore, aliàs rubro, aliàs purpureo, nonnunquam luteo, observavit Rauvolfius in suo Itinere Hierosolymam versus, & obiter Lugd. herb. attigit.

*Anemone flore pleno.*

I. Anemone latifolia maxima versicolor.

Anemone latifolia flore multiplici, Clus. hisp. & pan. Lugd.

Anemone hort. latifol. pleno flore 1. Eid. hist.

Anem. max. polyanthos Chalcedon. Lob. Ger.

Anemone Chalcedonica major, Tab.

Folia florum externa & majora dena aut duodena, viridia sunt, eorum mucronibus coccineo colore leviter & virgatim infectis: interna minora & angustiora, dilutiora purpura ex rubro nitent.

Aliquando, ex prædicto flore uncialis pediculus, minorem florem ex octo latiorum foliorum partim viridium, partim coccineorum compositum, sustinet, quam pro quarta posuimus.

II. Anemone latifolia flore coccineo.

Anemone hort. latifol. pleno flore 2. Clus. hist.

Differt à priore, quod in hac floris umbellum glomerata & reflexa folia non occupant.

III. Anemone latifolia coccineo flore duplo vel etiam triplo densiore & pleno, quam prior sit, Clus. cur. post.

IV. Anemone latifolia Pavo dicta major 1.

Anemone hort. latifol. Pavo major 1. Clus. hist.

Flos unicus 20. 30. aut pluribus folijs constans, eleganti, saturato splendidoque coccineo colore præditis, unguibus sanguineis, orbe pallido cinctis.

V. Anemone latifolia Pavo dicta major prolifera.

Anemone pavota latifolia multiplex flore miniat, Bry.

VI. Anemone latif. Pavo minus polyphylla.

Anemone hort. latifol. Pavo major 2. Clus. hist.

Anemone hort. fl. pleno coccineo variegata latifolia, Eyst.

Hæc flores minus plenos profert, interdum simplici, octo, novem, aut decem foliorum serie constantem.

VII. Anemone latifolia flava.

Anem. hort. latif. duplo flore flavo, Clus. hist. Eyst.

an Anemone multifido & lanuginoso folio, quod in Apulia luteo flore reperiatur, Ang.

VIII. Anemone tenuifolia multiplex rubra.

Anemone multiplex rubra, Clus. hisp.

Anem. flore polyphyllotenuifolia, Eid. pan.

Anem. hort. tenuifolia pleno flore, Eid. hist.

Anemone 4. Dod.

Anemone flore multiplicato coccineo, Lob. colore tenuifolia, Eyst.

Anemone coccinea multiplex, Ger.

Flore est rubro, cæruleo, albo.

IX. Anemone tenuifol. multiplex purpurea.

Anemone tenuifolia pleno purpureo flore Caccini, Clus. cur. post.

Est etiam quæ purpureo cæruleum florem, alia quæ suaverubentem & nitidum profert.

X. Anem. tenuif. multip. atropurpurascens.

Anemone tenuifolia pleno flore ex atropurpurascente, Clus. cur. post.

XI. Anemone Geranei rotundi folio plena.

Anem. latif. purpurorubescens plena, Eyst. desc. ab Anemone hort. latifolia 3. Clusij sola multiplici foliorum serie differt.

*Anemone sylvestris.*

I. Anemone sylvestris alba major.

Anemone 3. Matth. Cast. Lugd. flore albo, Lob.

Anemone alpina, Ges. fra.

Anemone pannonica, Dod.

Anem. sylv. 1. Clus. pan. & hist. Lob. ad. par. 2.

Anem. syl. flore candido, Thal. syl. fl. albo, Eyst.

Anemone major alba, Tab.

Ranunculi 11. species, Cord. hist.

Aconito cognata videtur, Ges. hor.

II. Anem. syl. alba minor: pro 1. in Prod. desc.

III. Anem. alpina alba major: quæ 2. in Prod.

IV. Anem. alpina alba minor: quæ 3. in Prod.

V. Anemone nemorosa flore majore.

an Anemone nemorosa, Theoph.

Sanicula minor quibusdam, Brunf.

Ranunculus candidus, Trag.

Ranunculi 4. species, Fuch. Cord. hist. Lugd.

Ranunculus 6. Tur. 8. Lon.

Ranunculus parvus, Dod. gal.

Ranunculus phragmitis, Ges. hor.

Ranunculus nemorosus, Ad. Lob. Tab.

Eneaphyllon, Ang.

Ranunculus sylvium, Clus. hist.

Anemone 5. Dod. sylv. vulgaris, Clus. pan. montana, Cæs.

Anem. nemorum alba, purpurea, coccinea: Ger.

Ranun-



Ranunculi 1. tertium & quartum genus, Thal.

Flore est candido, aut ex purpura rubente, modo dilutiore, modo intensiore colore, sub-ceruleo, carneo, roseo: hinc Taber. tres figuras habet, Ranunculi albi, purpurei, & ex rubro purpurei nomine. & Thalius tertio generi quod flore est candido, species tres tribuit, folijs & floribus majoribus, minoribus & medio modo donatis: quartum è candido rubet, & ratione foliorum majus & minus est.

VI. Anemone nemorosa flore minore: hæc in Prodomo 1. est.

an Ranunculi tertij generis species min. Thal.

VII. Anemone nemorosa sterilis folijs punctatis.

Ranunculi tertij quintum genus, Thal.

Ranunculi nemorosi vitium *ῥανουνόφιον*, Cat. Altorff.

VIII. Anemone nemorosa flore pleno albo. Anemone limonia pleno albo flore, vel

Ranunc. sylvar. pleno albo flore, Clus. hist. Eys.

IV. Anemone nemorosa flore pleno purpur.

Anemone limonia pleno purpureo flore, vel

Ranunculus sylvar. pleno flore purpurascente,

Clus. hist.

Ranunculus nemorosus flore pleno, Eys.

X. Anemone nemorosa affinis peregrina 1.

candido aut purpurascente flore.

Anemone *λεπανία* peregrina 1. Clus. hist.

XI. Anemone nemorosa affinis peregrina

2. flore herbacei coloris.

Anemone *λεπανία* peregrina 2. Clus. hist.

## PULSATILLA

**A** Nemones alterum genus quæ Limonia vocatur, Plin. l. 21. c. 11. ex Theop. 6. hist. 7. Anemone genus (Ga-  
za *Fremium* versit: Plin. l. 21. c. 23. Phenon habet) quod Leimonion vocant: hanc sunt qui Pulsatillam  
esse velint. Pulsatilla nominatur, quod seminum tremuli pappi levissimi statu, buc atq; illuc agitentur, unde  
& Herba venti dicitur, quare *ἄνεμος* dici potest.

I. Pulsatilla folio crassiore & majore flore.

Rüchschell/Brant.

Herba venti, Trag. Lon.

Pulsatilla Matthiol. Gesn. hort. Cast. Dod. Ad.

Lugd. Tab.

Pulsatilla vulgaris, Lob. Ger. recentiorum, Cæ-

salp. communis, Cam.

Pulsatilla vulgaris dilutior, Clus. pan. & hist.

Herba Sardoas, Dod. gal.

Anemone sylv. Fuch. communis, Tur. monta-

na, Gesn. hort.

Anemone species, Gesn. hor. Thal.

Anemone 10. vel leptophyllon, Cord. hist.

Anemone limonia & Samolus Plinij, Dalech.

in Plin.

Ranunculus 2. Lac. Diof. 2. species, Gesn. hor.

Colore ut plurimum violæ nigræ purpureo,

& obsoleto intensiore & remissiore pro loci

ratione: in umbrosis dilutiore, in apricis colo-

ratione: pleno etiam flore reperiri significatum.

II. Pulsatilla folio tenuius inciso & flore mi-

nore, sive palustris: hæc in Prodomo primo

loco describitur.

III. Pulsatilla flore minore nigricante.

Pulsatilla altera, Dod. Lugd.

Pulsatilla flore clauso, Lob. ico.

Pulsat. vulg. saturatiore flore, Clus. pan. & hist.

IV. Pulsatilla apij folio vernalis flore majore: quæ 2. in Prodomo.

V. Pulsatilla apij folio vernalis flore minore: quæ 3. in Prodr.

VI. Pulsatilla apij folio autumnalis: quæ 4. in Prodr.

VII. Pulsatilla folio Anemones secundæ, sive subrotundo: quæ 5. in Prodomo.

VIII. Pulsatilla flore rubro obtuso.

Pulsatilla rubra, Dod. Ad. Lob. Lugd. Tab. Ger.

an Anemone 4. Cam. ep.

IX. Pulsatilla flore albo.

Anemone alpina, Gesn. fra.

Anem. syl. 2. Clus. pan. & hist. Lob. ad. part. 1.

Pulsatilla alba, Lob. Lugd. Tab. Ger. flore can-

dido, Dod.

Flos intus lacteus, exterius nonnihil purpu-

rascens.

X. Pulsatilla lutea apij hortensis folio.

Pulsatilla secunda alpina, Lugd.

XI. Pulsatilla lutea pastinacæ sylv. folio.

Pulsatilla lutea, Gesn. hor. Ad. Cam. ep.

Pulsatilla tertia alpina, Lugd.

Anemone sylv. tertia, Clus. hist.

XII. Pulsatilla lutea alpina hispida.

Pulsatilla prima alpina, Lugd.

an Anemone lutea, Ang.

**A**donidu floris meminit Ovidius 10. Metamorph. qui Anemone esse a multis creditur: alij huic sequenti tribuunt. Verum quia ratione capituli cum Ranunculo conveniat, inter Anemones & Ranunculos repositum: Quibus dum p[ro]p[ri]e Theop[hrastus] à floribus flammeo igneo, colore: & 6. bist. 6. inter vernos flores recenset.

## I. Adonis hortensis.

Anemone hort. Trag. Lugd. Anemone, Lon.

Argemone tertia, Tab.

## II. Adonis flore majore.

Anthemis eranthemos Dalechampi, Lugd.

## III. Adonis hort. flore minore atrorubente.

Adonis recentiorum, aut Adonium Poëtarum,

Species Anemone, Ad.

Adonis recentiorum, Lob. ob. flos Adonis, Eid.

ico. Cam. Ger.

Flos Adonis vulgo, Clus. hist.

Eranthemum, Dod.

Adonium, Tab.

Flos habetur miniati, lutei coloris: hinc

Adonium &amp; Adonium luteum, Tab. (trib.

## IV. Adonis syl. fl. phœniceo ejusq; fol. longio-

Anemone agrestis, Trag.

Anemone tenuifolia, Cord. in Diof. Gef. hist.

Anemone tenuifolia, Cord. hist.

Adonis, Math. Lugd.

Chamæmelum eranthemum vel purpureum,

Dod. gal. rubrum, Gef. hort.

Aculeata, Lon.

Ranunculus arvensis flore rubicundo, Cæs.

Chamæmelum purpureum, Tab.

Variat floribus colore phœniceo, luteo, pallido &amp; albo; hinc


Anemone tenuifol. alt. flore pallido, Cord. hist.

Adonis flore pallido, Cam. ep. Lugd. Tab.

Adonis 2. &amp; 3. inter segetes, Tab.

Eranthemum flore flammeo, &amp;

Eranthemum folio rubro, Eysl.



## SECTIO TERTIA.

## RANUNCULUS EJUSQUE SPECIES.

**R**anunculus Diofcorid. l. 2. c. 206. ῥανυγγίον ἄγριον, Ranunculus & Apium agreste. Ranunculus, quod rana natiui more humidis limitibus & opacis marginibus lateat: aut quod rana, inter ejus frutes frequenter inveniatur. Apium, quod folijs apium emuletur.

Genera complura Diofcoridi: 1. Coriandri folijs (& ad malve latitudinem accedentibus, Plinio) floribus luteo, interdum purpureo: 2. Lanuginosius (foliosus Plinius) quod syl. apium appellat: 3. minimum flore aureo: 4. huic simile flore lacteo. Idem habet Plin. l. 25. c. ultimo.

## Ranunculus nemorosus.

## I. Ranunculus nemorosus luteus.

Ranunculi sylv. alterum genus, Trag.

Ranunc. 3. species, Cord. hist. tertij genus 2. Thal.

Ranunc. 4. species lutea, Fuch. Dod. gal. Lugd.

Ranunculus phragmites luteo flore, Gefn. hort.

nemorosus luteus, Lob. ico. Tab.

Ranunculus 7. Tur. 9. Lon.

Ranunculus nemorosus flore luteo, Ad. Eysl.

Anemone 6. Dod. Lug. mont. colore luteo, Cæs.

Anemone nemorum lutea, Ger.

Major est &amp; minor, Thal. Flore communiter unico, aliquando duobus &amp; tribus.

## II. Ran. nemorosus vel sylvat. folio rotundo.

Ranunculus dulcis, sub sylv. descrip. Trag.

Ranunculus 1. species, Fuch. Tur. Lon. Lugd.

Ranunc. auricomus, Dod. gal. Lob. ico. Thal.

Ranunc. nemorosus, Ger. dulcis nemor. Tab.

Polyanthemum, Ang.

## III. Ranunculus nemorosus Thaliatri folio.

Ranunculus Thaliatri folio, Clus. span. Cam.

Ranunculus præcox 2. Thaliatri folio, Eid. hist.

Aquilegia minor Dalechampi, Lugd.

## IV. Ranunc. nemorosus Muscatellina dictus.

Aristol. rotundæ concavæ similis herbula, Traga.

Aristol. vulg. alt. radice oblonga, Gef. hor.

Capnos Plinij Tur.

Moschatella, Cord. hist. Thal. Cam.

Ranunculus minimus Septentrionalium herbido muscoso flore, Ad. Lob. ico.

Denticulata, à radicis forma, Lugd.

Famuria bulbosa tuberosa minima, Tab.

Radix cava minima, Ger. ico.

## Ranunculus pratensis &amp; arvensis.

## I. Ranunculus pratensis erectus acris.

Ranunculus luteus, Trag.

Ranunculus pratensis surrectis cauliculis, Lob.

Ranunculus hortensis 2. Dod. Lugd.

*Ranunculus sylvestris*, & 2. Tab.

*Ranunculus lævis*, Cæf.

*Ranunculus batrachoides*, Ger.

*Ranunculus polyanthemus maculatus*, Thal.

In folij medio sæpè macula reperitur, & hic *Ranunculi* alter. species maculis notata, Trag. quâ communiter destituitur. Hic magis minusve hirsutus occurrit.

II. *Ranunculus pratensis erectus dulcis*.

*Ranunculus pratensis*, vel 1. Trag.

*Chrysanthemum simplex*, Fuch.

*Polyanthemum simplex*, Dod. gal. Lugd.

*Ranunculus* 7. Lon. dulcis, Tab.

*Ranunculus surrectis cauliculis*, Ger.

*Ranunculus hortenſis erectus flore simplici luteo*, Eyst.

Hic cum latioribus quoque folijs reperiatur, Idecirco apud Tab. & altera figura

*Ranunculi holeracei* majoris nomine: & apud Ger. sub titulo *Ranunculi auricomi*.

III. *Ranunculus pratensis repens hirsutus*.

*Ranunculi* 8. species, Cord. hist.

*Ranunculus pratensis reptante cauliculo*, Lob.

*Ranunculus polyanthemus* 1. Dod. Thal.

*Ranunculus hortenſis* 1. Dod. Lugd.

*Ranunculus vinealis*, Tab.

*Ranunculus pratensis etiamque hortenſis*, Ger.

Variat magnitudine, nam in hortis, quibus præ cæteris spontè tamen proveniens, familiarior, latioribus multo quam in pratis folijs reperitur. & nonnunquam veluti quædam maculæ inalbant.

IV. *Ranunculus pratensis radice verticilli modo rotunda*.

*Crus galli*, Brunf. *Coronopus parvus*, Eid. 4.

*Ranunculus exiguus*, & 1. Trag.

*Ranunculus* 5. Matth. Tur. Lac. Lon. Lugd.

*Batrachion Apuleij*, Dod. gal.

*Ranunculus minor* vel 3. Fuch. vel 9. Cord. hist. minor, Tab.

*Ranunculus flammula dictus*, Gefn. hort.

*Ranunc. bulbosus*, Ad. Lob. Cam. Thal. Ger.

*Ranunculus tuberosus*, Dod. Lugd.

*Ranunculus lanuginosus* 1. Cæf.

Magnitudine variat, nam in saxosis, vix duarum triumve unciarum reperitur: contra in hortorum areolis spontè nascens, cubitum excedit: in pratis mediæ altitudinis reperitur.

V. *Ranunculus arvensis parvus folio trifido*. *Ranunculus minimus Apulus*, Col.

*Ranunculus hortenſis flore pleno*.

I. *Ranunculus hortenſis erectus flore pleno*.

*Ranunculus luteus*, vel 3. flore multiplici, Trag. *Ranunc. multiplex*, Fuch. tertius, Tur. quartus, Lon.

*Ranunculi* 7. species coronaria, Cord. hist.

*Ranunculus sylv.* 2. Dod. Lugd.

*Ranunc. polyanthemus*, Ad. Lob. *polyanth.* 3. erectus, Cam. at. 2. epit.

*Ranunc. erectus hortenſis fl. pleno luteo*, Eyst.

Major & minor habetur: & ille dicitur

*Ranunculus multiflorus maximus*, Tab.

*Ranunculus maximus multiplex*, Ger.

Flores, Bellidum plenarum orbiculos imitantur, sæpius geminatim combinantur, ad quandoque sobolem aliam ex se emittunt.

II. *Ranunculus hortenſis inclinans*.

*Ranunculus hort. reptante cauliculo*, Lob.

*Ranunc. repens flore multiplici luteo*, Gefn. hort.

*Ranunculus polyanthos luteus repens*, Cam.

*Ranunculus hort. flore pleno*, Eyst. cui major & minor est.

III. *Ranunculus dulcis flore pleno*.

*Ranunculus pratensis cultura multiplex*, Trag.

*Polyanthemum multiplex*, Dod. gal. Lugd.

*Ranunculus dulcis multiflorus*, Tab.

*Ranunculus maximus multiplex*, Ger.

IV. *Ranunculus bulbosus flore pleno*.

*Pes corvi flore pleno*, Brunf. *Coronopus*, Eid.

*Coronopus quorundam multiplici luteo flore*, Gefn. hort.

*Ranunculus radice bulbosa flore pleno*, Cam.

*Ranunculus bulbosus major*, Eyst.

V. *Ran. radice tuberosa fl. pleno & prolifero*.

*Ranunculus tuberosus flore multiplici*, Dod.

*Ran. magnus Anglicus polyanthos*, Lob. ico.

*Ranunculus* 3. Cam. ep.

*Ranunculus tuberosus Anglicus*, vel 25. Tab.

Sæpius ex uno flore, unus & alter prodit.

VI. *Ran. folio aconiti flore albo multiplici*.

*Ran. mont. magnus flore multiplici*, Gefn. hort.

*Ranunculus niveus polyanthos*, Lob. Lugd.

*Ranunculus pleno flore albo*, Clus. hist. Eyst.

*Ranunculus albus multiflorus*, Tab. Ger.

*Ranunculus leucanthemos flore pleno*, Cam.

*Ranunculus echinatus*.

I. *Ranunculus arvensis echinatus*.

*Ranunculus albus sive echinatus*, Dod. gal.

*Ranunc. sativus*, Tur. arvensis, Gefn. hort. Tab.

*Ranunculus arvorum*, Lob. ico, Ger.

Ranunculus hortensis simpl. 1. species, Fuch. Lugd. altera species, Fuch. ico. quinta species vel fegetalis, Cord. hist.

Ranunculus sylv. tertius, Dod. Lob. ob.

Folio est aliquando latiore, aliquando angustiore, pro ratione soli pinguioris: hinc Ranunculus arvensis latifol. & angustif. Tab.

II. Ranunculus stellatus echinatus Creticus.

Ranunculus echinatus Creticus, Pon. Ital.

III. Ranunc. rotundifol. repens echinatus.

IV. Ranunculus palustris echinatus: ille sub 2. hic sub 3. in Prod. descriptus.

Ranunculus Apuleij quibusdam, Clus. hist.

*Ranunculus palustris & aquaticus.*

I. Ranunculus palustris apij folio laevis.

Ranunculus & Sardonica, Diof.

Ranunculus, strumca & apiastrum, Plin.

Scelerata, Apuleio.

Apium aquaticum, Trag.

Apiastrum, Cord. in Diof.

Ranunculus 1. Matth. Gesn. hort. Lac. Cast.

Lugd. 4. Tur. 3. Lon.

Ranunc. aquaticus, Fuch. ico. palustris, Cord.

hist. Dod. f. Lugd. Thal. Cam. Tab. Ger.

Herba Sardoia, Guiland.

Ranuncul. palustris rotundiore folio, Ad. Lob.

Ranunc. alter hirsuto semine folijs apij, Cæs.

Folij & caulibus est alibi maioribus, alibi minoribus, floribus luteopallidis; at Cordus, & purpureis observavit.

II. Ranunc. palustris apij folio lanuginosus.

Ranunculi 2. species, vel Sardonius Ranunculus, Cord. hist.

Ranunculus Sardonicus, Ang.

Ranunculus 2. Matth. Lugd.

Differt à priore, quod lanuginosus, pluribus foliorum incisuris spectetur.

III. Ranunc. aquaticus hederaceus luteus.

Ranunculus hederaceus Dalechampij, Lugd.

IV. Ranunc. aquaticus coryledonis folio.

Coryledon aquatica, Dod. gal. palustris, Eid. f.

Herba rotundo folio, aliquibus Acetabulum, Cord. in Diof.

Coryledon aquat. acris Septentrionalium, Lob.

Ranunculus aquaticus umbilicato folio, Col.

V. Ranunculus aquaticus, folio rotundo & capillaceo.

Polyanthenum palustre aut aquatic. Dod. gal.

Ranunculus 3. Gesn. hort.

Ran. aquatilis, Dod. Ger. aquat. hepaticæ facie,

Ran. in aquis nascens folio parum scisso, Cæs. Ranunculus fluviatilis, Tab.

Hepatica aquatica, Lugd. palustris, Thal.

In nostro duplicia folia observantur, quæ sub aqua multinda, capillacea; quæ extra aquam rotunda & crenata: quare Cæs. folijs alteri parum scissis, alteri in capillaceam tenuitatem hilla tribuit: addens, se vidisse quoddam utrumque genus foliorum habens, initio integrum, procedente tempore capillaceum: at in nostro foliorum diversitas simul conspicitur.

VI. Ranunculus aquaticus capillaceus.

Ranunculus in aquis folijs in capillaceam tenuitatem scissis, Cæs.

Ran. trichophyllon aquaticus mediolus. Col.

*Ranunculus folio longo tam palustris quam montanus.*

I. Ranunculus longifolius palustris major.

Ranunculus infectus 1. Cæs.

Lingua Plinij, Lugd.

Ranunculus *παραυγυλλον*, Thal.

Ranunculus lanceolatus major, Tab. flammeus major, Ger.

Folia prima aliquando subrotunda sunt, ad Chelidoniam minoris, aut Cochleariæ formam accedentia: quemadmodum Ranunculi latifolij nomine, hist. Lugd. exprimere videtur.

II. Ranunculus longifolius palustris minor.

Ranunculus 1. Ang. 12. Cord. hist.

Ran. flammeus aquatilis angust. Ad. Lob. Lug.

Flammula ranunculus, Dod.

Ranunc. aquaticus *απρυλλανισφυλλον* major, Thal.

Ranunculus lanceatus minor, Tab. flammeus minor, Ger.

Ægolethron Plinij, l. 21. c. 13. quibusdam: alijs Enneaphyllon, Eiusdem, l. 27. c. 9.

III. Ranunculus palustris serratus.

Flammula, Dod. gal. aquatica, Lugd.

Flammula ranunculus folio serrato, Dod.

Ranunculus alter, Gesn. hort.

Ranunc. aquatilis angustifolius serratus, Lob.

Ran. lanceatus serratus, Tab. flamm. serrat. Ger.

IV. Ranunculus mont. folijs plantaginis.

Ranunculus Pyrenæus albo fl. Clus. hisp. ap. 2.

an Ranunculus phœniceus Myconi, ob similitudinem cum palmæ folijs, Lugd.

V. Ranunculus montanus folio gramineo.

Ranunc. pumilus gramineis folijs, Ad. Lob. ico.

Ranunculus gramineus, Tab. Ger.

Hydropiper lanceolatum, Lugd.

VI. Ran. mont. folio gramineo multiplex. Ranunculus folio graminis, Dod.

Ranunculus gramineus 1. multiplex, Tab.

VII. Ranunculus gramineo folio bulbosus.

Ranunculus leptomacrophyllon bulbosus, vel

Ranunculus bulbosus gramineus mont. Col.

*Ranunculus grumosa vel etiam Asphodeli radice.*

I. Ranunculus lanuginosus angustifolius grumosa radice major.

Ranunculus Illyricus major, Clus. hist.

II. Ranun. lanug. angustif. grum. rad. minor.

Ranunculus Pannonicus, Clus. hisp.

Ranunculus grumosa radice 4. Eid. hist.

Ran. Illyricus, Dod. Lob. Tab. Cam. Ger. Eyst.

Ranunculus peregrinus alter, Caf.

III. Ranunculus lanugin. apij folio asphodeli radice.

Ran. alter saxatilis mont. asphodeli radice, Col.

IV. Ranunculus grumosa radice folio ranunculi bulbosi: hic 4. est in Prodomo.

V. Ranunculus grumosa radice flore phoeniceo minimo simplici.

Ranunc. Tripolitanus phoeniceo fl. Clus. pan.

Ranunc. Asiaticus grumosa radice 1. Eid. hist.

Floris foliola 5. aut 6. rarius 3. aut 4. foris phoeniceae, internè miniati coloris staminib. rubris.

VI. Ranunculus grumosa radice ramofus.

Ranunculus Asiaticus *παλινδωρ* sive grumosa radice 2. Clus. hist.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore phoeniceo ruberrimo, Eyst.

VII. Ranunc. grumosa radice fl. flavo vario.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore flavo rubris venis distincto, Clus. cur. post. Eyst.

VIII. Ranunculus grumosa radice fl. albo.

Ranunc. peregrinus grumosa radice 1. Clus. hist.

Flos quinquefolius albus suaviter rubente colore per oras mixto.

IX. Ranunculus grumosa radice flore albo, leviter crenato.

Ranunculus peregr. grumosa radice 2. Clus. hist.

X. Ranunculus grumosa radice flore niveo.

Ranunculus peregr. grumosa radice 3. Clus. hist.

Ranunculus Creticus grumosa radice flore niveo, Eid. hist. ap. alt. & Eyst.

XI. Ranunculus asphodeli radice Creticus.

Ranunculus Creticus latifolius, Clus. hist.

XII. Ranunculus latifolius bullatus asphodeli radice.

Clusius in hist. duas habet figuras, magne &

parvo flore, nulla in descriptione facta mentione: ille vocatur

Ranunculus grumosa radice 1. Clus. hist.

Ranunculus Lusitanicus Clusij, Lob. ico, Ger.

Ranunculus Lusitanicus 2. Tab. hic verò

Ranunculus autumnalis, Clus. hisp. Ger.

Ranunc. grumosa radice 1. species 2. Clus. hist.

Ranunc. Lusitanicus autumnalis, Lob. ob.

Ranunc. Lusitanicus, Dod. Lugd. primus, Tab.

XIII. Ranunculus cherophyllos asphodeli radice.

Ranunculus montanus leptophyllos Asphod. radice, Colum.

*Ranunculus grumosa radice flore pleno.*

I. Ranunc. asphodeli radice flore sanguineo.

Ranunculus Constantinopolitanus, Clus. hisp.

Dod. Lugd. Cam.

Ranunc. polyphyllus flore coccineo, Clus. pan.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice pleno flore, Eid. hist.

Ranunculus sanguineus multiplex, Lob. Ger.

Ranunculus Turcicus five sanguineus, Tab.

an Ranunculus primi generis purpurei floris apud Dioscor. quem simplici flore etiam nasci verisimile est.

II. Ranunculus asphodeli radice flore subphoeniceo rubente.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice pleno

flore 2. Clus. hist.

Ranunculus pleno flore ruberrimo, Eyst.

Flos ex centum & triginta folijs, foris subphoeniceae, dein miniati, interius elegantis rubri miniati ad coccineum tendentis.

III. Ranunculus asphodeli radice prolifer

miniatus.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice pleno

flore 3. Clus. hist.

Ranunculus Asiaticus grumosa radice flore

pleno sanguineo prolifero, Eyst.

*Ranunculus montanus.*

I. Ranunc. rutaceo folio flore suaverubente.

Ranunculus praecox 1. rutae folio, Clus. hist.

Ranunculus alpinus Coriandri folio, Pon.

II. Ranunculus alpinus humilis rotundifolius flore minore.

Ranunculi montani primi species 1. Clus. pan.

& histor.

III. Ran. alp. humilis rotundif. flore majore.

Ranunculus montanus minimus, Gesn. bore.

Ranunculi mont. primi species 2. Cl. pan. & tr.

2. Ranunc.



Ranunculus montanus, Dod. ed. belg.

Flos interdum duplici foliorum serie constat.

I V. Ranunculus mont. hirsutus albus altior.

Ranunculus alpinus albo flore, Clus. pan.

Ranunc. mont. 2. vel secundi species 1. Eid. hist.

V. Ranunculus montanus hirsutus humilior Narcissi flore.

Ranunculi 2. alterum genus, Clus. pan.

Ran. montani secundi species altera, Eid. hist.

VI. Ranunculus montanus hirsutus purpureo flore.

Ranunculus montanus 3. Clus. pan. & hist.

Aconitum candidum *ἀκωνίον* Dalech. Lugd.

Multum convenit cum Caryophyllata alpina quinquefolia majore: verum Caryophyllata radice est odora, flore pallide luteo in papum abeunte.

VII. Ranunculus montanus Aconiti folio albus flore majore.

Ranunculus 4. Matth. Lac. Ges. hor. (duntur.

Aconiti 5. nomine Matth. & Lug. exprimere vi-

Ran. albus major, Ges. fr. syl. simp. fl. Ges. hor. ap.

Ranunculus maximus leucanthemon Thal.

leucanth. folio aconiti, Cam.

Ranunc. montanus 3. Cæf. 4. Clus. pan. & hist.

VIII. Ranunculus montanus Aconiti folio albo flore majore.

Ranunc. flore albo, vel Ranun. 4. externus, Dod.

Ranunc. albus flore simplici, Lob. albus, Tab.

Ranunc. mont. albus, Lugd. alpinus albus, Ger.

Ran. montani quarti species alt. Cl. pan. & hist.

Aconitum barchofides, A. L. Lob. ico.

Ranunculus 4. Diosc. esset, nisi magnitudo obfaret, Dod.

IX. Ran. mont. Aconiti folio flore globoso.

Ranunculus sextus, Matth. Lugd.

Aconitum 3. Matth. Lac. Thal. Tab. cui & 5.

Aconitum lycoctonum 3. Lugd.

Ancemone montana quædam, Gesn. hort.

Trollius flos, Gesn. fr. Clus. pan.

Ran. flore globoso, Dod. fr. Lug. Eyst. glomerato

flore, Cl. hist. globosus, Ger. live montan. Cam.

Ranun. mont. alp. glomeratus Lob. mont. alter,

Ranunculus alpinus luteus, Tab. (Cæf.

Major ampliore fl. & quasi aureo: alter hu-

milior, fl. minore, colore ex viridi pallecente

albo reperiri scribit Tab.

Ranunculum alpinum album nominans.

X. Ranunc. mont. fol. Aconiti magno flore

Ranunculus mont. major flore luteo, Eyst.

XI. Ran. geranij tuberosi fol. qui 5. in Prod.

XII. Ranun. mont. latissimo folio hirsutus

Ranunc. platyphyllos flore luteo, Clus. pan.

Ranunculus montanus 5. Eid. hist.

XIII. Ran. mont. subhirsutus geranij folio.

XIV. Ran. mont. lanug. folijs ranunc. prat. re-

pentis: ille pro 6. hic pro 7. in Prod. describitur.

*Ranunculus saxatilis.*

I. Ranunculus saxatilis magno flore.

II. Ranunculus saxatilis folijs subrotundis:

ille pro 8. hic pro 9. in Prodomo describitur.

III. Ranunc. saxatilis minimis hirsutus.

IV. Ranunc. villosissimus Monspelicus:

ille pro 10. hic pro 11. in Prodomo describitur.

\*\*\*\*\*

## SECTIO QUARTA.

ACONITUM; DORONICUM; HELLEBORUS NIGER;  
HELLEBORUS ALBUS, ET HELLEBORINE.

### ACONITUM.

**A** *ἀκωνίον* Diosc. l. 4. c. 77. & 78. Aconitum Plinio, l. 27. c. 3. dictum, quoniam in nudis caulis, quas aconitum nominant, nascitur. Alij hanc nominis rationem attulerunt, quoniam vis eadem in morte esset, quæ ceteris ad ferri aciem deterendam statimq; ad mortem velociter sentiretur. At Theophr. 9. hist. 16. *ἀκωνίον* appellatum ab Aconii, pago quodam Mariandynorum, quoniam ibi precipue proveniat.

Genera duo Dioscoridis: alterum folijs Cyclamini, aut Cucumera, quod *πικραδίαχνης*, si *ἀκωνίον*, et *ἀκωνίον* appellantur, ut *ἀκωνίον* vocent. Alterum folijs effigie Platanus, crebra divisura, quod *κωνίον* appellantur: cuius tria genera: unum quo venatores utuntur: alia duo, quæ Medici in suum usum vertunt, è quibus tertium Ponticum nominatur. Theophr. l. c. Aconiti unius folio intubacco, (forsan pro *κωνίον* est, legendum *κωνίον*) meminist. Plin. l. 27. c. 2. & 3. de Aconito egit: describit folijs cyclamini aut cucumera: *κωνίον* dici, propter radicem cammaro marina similem (forte rectius *κωνίον*, quasi *κωνίον* pro *κωνίον* permissum, ut est apud Homerum) alijs *θηλυσβον*: aliquibus *scorpiion*, quia radix scorpiionum modo incurvetur: quibusdam *μυοκλον*, quoniam meret edore necet.

I. Aconi-



I. *Aconitum trifolium luteum bulbosum*. Bulbosus unifolius aut bifolius batrachoides, elleboracea herbula, Ad.

Bulbus parvus unifolius, aut bifolius batrachoides, Lugd.

*Aconitum lycoctonum* lut. min. Dod. Lugd.

*Aconitum hyemale* Belgarum, Lob.

*Aconitum* 1. & *hyemale*, Cam. ep.

*Acon. hyemale* & *Ranun. monophyllos*, Cam.

*Aconitum aliud Dalechampi*, Lugd.

*Elleborine*, Cæsalp.

*Aconitum hyemale Ponticum*, Eyst.

II. *Aconitum lycoctonum luteum*.

*Luparia*, Trag.

*Aconitum secundum*, Matth. Lac. Lugd. Tab.

*Aconitum lycoctonon*, Cord. in Diosc.

*Aconitum* 2. vel *lycoctoni species* 1. Gef. hor.

*Aconitum lycoctonum*, Lon. luteum, Fuch. Tur.

Cam. Thal. yst. majus Dod. Lugd. *lycoctonum*

*Ponticum*, Dod. gal.

*Aconitum lycoctonum vulgatus*, Clus. hist.

*Acon. luteum*, Gef. fr. Pontic. Ad. Lob. Tab. Ger.

*Napelli primum genus*, Cæf.

In montibus ampliore caule & folijs, alibi

humiliore ac folijs minoribus: flos ex pallido

luteus, interdum etiam pallidior.

III. *Aconitum lycoct. albis pallidive florib.*

*Aconitum secundum flore albo*, Gef. hor.

*Aconitum sextum*, Cam. ep.

an *Aconitum sextum*, Matth. Lugd. Tab.

Matthiolo. flos purpureus: Camerario, al-

bis quibusdam pallidus, venulis livescens.

IV. *Aconitum lycoctonum folijs serratis*

aliquis oblongis.

*Aconitum lycocton. ex Cod. Cæf. Dod. Lugd.*

V. *Aconitum cæruleum hirsutum flore con-*

*solidæ regalis.*

*Aconitum cæruleum aliud*, Gef. hor.

*Aconitum lycoctonum primum*, Clus. pan.

*Aconit. lycoct. fl. delphinij* 1. Eid. hist. Cam. Eyst.

VI. *Acon. cærul. glabrum fl. consolidæ regalis.*

*Aconiti genus floribus cæruleis*, Gef. hor.

*Aconitum lycoctonum fl. Delphinij*, Dod. Lob.

*Aconitum secundum*, Clus. hist.

*Aconitum lycoctonum cæruleum* 1. fl. Delphi-

nij, Lugd. an *Aconitum* 4. Matth. Lac. Lugd.

Matth. florem aureum; Cam. cæruleum tribuit.

VII. *Aconitum cæruleum napelli flore.*

*Aconitum lycocton. cæruleum secundum*, Dod.

*Acon. lycoct. 7. vel autumnale*, Clus. pan. & hist.

VIII. *Aconit. coma inflexa folijs angustiorib.*

*Aconitum* 7. Matth. Lugd.

*Acon. lycoct. 4. vel Lyncæanū*, Clus. pan. & hist.

IX. *Aconitum inflexa coma maximum.*

*Aconitum* 9. Matth. Lugd.

*Aconitum lycocton. coma nutante* 5. Clus. pan.

octavum, Eid. hist.

X. *Aconitum cæruleum seu Napellus* 1.

*Osenhütlein/ Brunf. Trag.*

*Napellus*, Matth. Lon. Dod. Cast. Lugd. Cam.

arboreus, Eyst.

*Napellus verus cæruleus*, Ad. Lob.

*Napellus major latifol. & angustifol.* Tab.

*Napellus reticulatus*, Cæf.

*Aconitum lycoctonum cæruleum*, Dod. gal.

*Aconit. 2. vel lycoctoni species altera*, Gef. hor.

*Aconitum lycoctonum* 6. Clus. hist.

*Aconitum cæruleum*, Gef. col. Thal.

Folius est latiorib. angustioribus, flore com-

muniter cæruleo, aliquando purpureo, roseo, al-

bo, & è cæruleo & albo colore variegatus, qui

*Napellus flore variegato*, Eyst.

XI. *Acon. violaceum seu Napellus secundus.*

*Acon. lycoct. 1. vel præcox Tauricum*, Clus. pan.

*Aconitum lycocton. 4. Tauricum*, Eid. hist.

XII. *Aconitum purpureum seu Napellus* 3.

*Aconit. lycocton. 3. vel Neubergense*, Clus. pan.

*Aconitum lycocton. 5. Neubergense*, Eid. hist.

XIII. *Aconitum cæruleo purpur. flore ma-*

*ximo, sive Napellus* 4.

*Aconit. lycoct. 6. vel Judenbergense*, Clus. pan.

*Aconitum Judenbergense*, Eid. hist.

*Aconit. flore cæruleo*, *Napellus ferotinus*, Cam.

an *Lycectonum sarivū pentacarpou*, Cord. hist.

XIV. *Acon. cærul. minus, sive Napellus minor.*

*Aconitum lycocton. cærul. parvum*, Dod. Lugd.

facie *Napelli*, Lob.

*Aconitum lycoctonum* 10. Clus. hist.

*Thora Italica*, Eid. pan. Cam.

In editioribus locis exilius provenit.

XV. *Aconitum ramosum parvo flore.*

*Aconitum octavum*, Matth. Lugd.

Floribus est luteis: Matth. purpureiscentibus

nitet: at Camerario rubefcentibus.

XVI. *Aconitum racemosum: an Adæa Pli-*

nio 127. c. 7. *Christophoriana*, Gef. hor. Dod. Ad.

Lob. Clus. hist. Tab. Cam. Ger. Eyst. & Costus

niger quorundam.

*Barba capri quibusdam*, Cæf.

*Napellus racemosus*, Lugd.

XVII. Aconitum salutiferum, seu Anthora.  
 Anthora dicta quasi *an-chora*, quod Thoræ Alexipharmacum sit. Avicen. Napellus Moysis & herba Napello similis, ejusq; veneno repugnās. Antora, Matth. Ges. hor. Lon. Cæs. Cast. Cam. Anthora, Ad. Lob. Dod. Taber. Ger. vulgaris, Clus. hist.

Aconitum salutiferum, Ges. hor.

Flore est luteo: Tab. secundæ meminit, quæ solo floris colore cæruleo à priore differt: habet & tertiam ex Pandestario, folijs asari crenatis, radice rotunda amara: sed quid est?

#### ACONITUM PARDALIANCHES.

I. Aconitum pardalianch. i. seu Thora major. Pseudoaconitum pardalianches, Matth.

Aconitum i. seu pardalianches majus, Ges. hor. Aconitum Ghini, Ang.

Limeum Plinij, Ang. Lugd.

Herba thora, limeū vocari falso creditur, Guil. Tora venenata, Ges. lun. (pap.)

Pthora Valdensium, Ad. Lob. ico. Clus. hist.

Thora Valdensis, Clus. pan. Cast. Lugd. Cam. mas & femina. Tab. Ger.

Tora major, Cam. ep.

Foliorum exortu, situ & numero variat: nascitur enim uno folio, duobus, idq; vel statim à radice, vel nullo à radice, sed in caule duobus majusculis, vel tribus, vel quatuor, vel quinque; ad summum: hinc Taber. feminam quatuor, marem duobus folijs magnis pingit.

II. Acon. pardalianches alter. sive Thora min.

Aconitum primum minus, Ges. hor.

Thora minor, Ges. de acon. Cam. ep.

Thora Valdensis, Dod.

(Ger.)

Thora Sabaudica & Thora montis Baldi, Tab.

Limeum pardal. genus uno folio, Lugd.

Ranunculus grumosa radice 3. Clus. hist.

Hujus folia breviora supernè latiora & magis incisa, quàm Thora Valdensis, vel è monte Baldo: hujus flos, Clusio quinis folijs, illorum, quaternis dundaxat folijs exprimitur.

III. Aconitum pardalianches Dioscoridis creditum Matthiolo.

Aconitum pardalianches, Matth. Lac. Dod. gal. Cast. Lugd. Tab.

Aconitum Matthioli, an in rerum natura sit dubitat, Ges. hor. & lun.

In Lugd. hist. primum Matthioli figura exhibetur: dein in append. iconi prius propositæ, ramulus floribus onustus adpingitur. Quod aliqui commentitium existimant: Lug. historiz author, plantam in Allobrogibus nasci scribit: quid sit ignoramus.

*Herba venenata & earum antidota.*

I. Ourari.

I. Torara.

II. Aparaeo.

II. Wape.

III. Corassi.

III. Cuturapama.

IV. Parapara.

IV. Macatto.

Hæ solo nomine, part. 8. Ind. Occid. proponuntur, sed quid?

### DORONICUM.

**D**oronici vox ab Arabibus petita, qui Doronigi sive Durnngi dicunt: hoc aliqui inter Aconita referunt, ed quod illo canes interficiantur: aliqui ab Aconito separant, siquidem sine noxa usi sint: & licet canes interficiat, dantur & alia quæ brutis, non tamen hominibus obfunt; ut vulpes, alvè saluberrima & Amygdalis amaris necari, Plurarchus auctor est.

I. Doronicum radice dulci.

Acon. pardalianches Theophr. Matt. Lug. Tab.

Doronicum Austriac. alterum, Clus. pan. Cam.

Doronicum 3. Austriacum 2. Clus. hist.

Doronicum 2. longifolium, Tab. minus, Ger.

Doronicum radice repente, Eid.

II. Doronicum radice scorpij brachiata.

Aconitum pardalianches Plinij, Matt. Dod. gal.

Lugd. Tab. alterum, Dod.

Doronicum brachiata radice, Lob. Lugd. Ger.

an Doronicum radice nigra, Col.

III. Doronicum radice scorpij.

Aconitum pardalianches minus, Matth. Lugd. Cast. primum, Dod.

Doronic. Ang. Cord. hist. Ges. hor. Lon. Cæs. Eyss.

Doronicum Romanum, Ges. hor. Lugd.

Doronicum alterum, Ad.

Doronicum primum, Tab. minus, Cam.

Doronicum majus, Ger.

Doronicum latifolium, Clus. pan. & hist.

Doronici tertij varietas, Ad. Lob.

Ob triplicem hanc Aconiti pardalianchis differentiam, triplicem esse Doronici varietatem, non sine causa suspicari licet.

IV. Doronicum plantaginis folio.

Doronicum primum, Ad.

Doronicum minus officinarum, Lob. Lugd.

Doronicum angustifolium, Clus. hist.

V. Do-

V. *Doronicum plantaginis folio alterum.*  
*Alisma*, Matth. Cast. Cam. Eyft. alpinum, Gesn.  
 hort. Thal.  
*Caltha alpina*, Gesn. hort. Tab.  
*Calendula alpina*, Ger.  
*Nardus Celtica altera*, Ad Lob. Lugd.  
*Chrysanthemum latifolium*, Dod. Lugd. Ger.  
*Doronicum quintum Germanicum & 6. Pan-*  
*onicum*, Clus. hist.  
*Damasonium sive Alisma*, Lugd.  
*Parmica montana*, Lugd.  
*Damasonium primum Diosc.* Tab.

Alij glabris, alij hirsutis folijs pingunt: ha-  
 tenus magis minusve hirsutis, licet diversis lo-  
 cis natum observavimus: sic floris color albus  
 est Matthiolo, ex pallido albicans, Cast. alijs lu-

teus, & recte: in Styriae pratis floribus caeruleis  
 reperitur.

VI. *Doronic. longifolium hirsutia asperum.*  
*Doronicum primum vel minus*, Clus. pan.

*Doronic. 2. Austriacum minus sive 1. Eid. hist.*

VII. *Doronicum latifolium flore magno.*

*Doronicum Austriacum 3. Clus. pan.*

*Doronicum 4. Striacum*, Eid. hist.

VIII. *Doronicum maximum folijs caulem*  
*amplexantibus.*

*Doron. Austriacum 5. sive maximum*, Clus. pan.

*Doronicum 7. sive Austriacum 3. Eid. hist.*

IX. *Doronicum Helveticum incanum.*

X. *Doronicum Helveticum humile*, crassis  
 folijs: illud pro 1. hoc pro 2. in Prodrôme de-  
 scribitur.

## HELLEBORUS.

**E**\* *ἄλβεος* secundum Etymologicum dicitur, *αγαλὶ τὸ ἴδιον τῆ βοτᾶς* quod esu perimat.

Genera duo sunt Dioscoridi l. 4. c. 150 & 151. albus folijs plantaginis, aut betae sylvestris: niger qui &  
*melampodium* (quoniam Melampus caprarum pastor, furentes in se Praxi filias, hoc primum purgasse & sanasse  
 fecit) folijs platani, Theophr. 9. h. 11. Elleborus niger & candidus aequivoce dicitur, cum alijs facie similes, sed  
 radicis colore candido & nigro inter se differre censeant. Alijs folium nigrum Laureum: candidi, porraceum red-  
 diderunt, radices autem similes, colore excepto. Niger ubiq; nascitur, sed optimus Helicon: at candidum locū  
 paucissimū exiit: optimi verō & usitatissimi quatuor sunt, Oetum, Ponticum, Eleaticum, Massalioticum. Et  
 quāvis formā conveniant, vires tamen proprias sortiuntur: nigrum, ab eo qui comperit & primo succidit,  
*Melampodium* quidam appellant; hac Theophrastum. Plinio l. 25. c. 5. Genera prima duo sunt, candidum & ni-  
 grum: hoc de radicibus tantum intelligi tradunt pleriq;: alijs folia nigri, platano similia, sed minora nigro-  
 raq; & pluribus divisuris scissa: albi, betae incipientis, &c. Latini Veratrum quod mentem vertat.

### HELLEBORUS NIGER.

I. *Helleborus niger feridus.*

Enneaphyllon Plinij l. 27. c. 9. quod longa folia  
 novena habere videtur.

*Pedicularia fetida 3. Trag.*

*Elleborus niger sylv. adulterinus*, Trag. Fuch.  
 Lugdun.

*Lycostonum primum*, Dod. gal.

Consiligo, Ruel. Gesn. hor. Lon. Ger.

Consiligo sylvestris, Tur.

*Pulmonaria Vegetij*, Gesn. hort.

*Helleborus niger alter*, vel *Helleborine major*,  
 Cord. hist.

*Veratrum nigrum tertium*, Dod. Clus. hist.

*Sesamoides magnum Cordi*, Lob.

*Helleboraster*, Ad. maximus, Lob. Ger.

*Helleborastrum magnum*, Tab.

*Enneaphyllon* Plinij, Cæf.

Magnitudine variat: hinc *Helleborastrum*  
*magnum & minus*, Tab. at Ger. sub Consilagine

Ruellij & *Helleboro maximo* proponit.

II. *Helleborus niger hort. flore viridi.*

Consiligo Plinij l. 26. c. 7. videtur.

*Helleborus niger*, Brunf.

*Elleborus niger adulterinus domesticus*, Trag.

*Elleborus niger adulterinus hortensis*, Fuch.

*Elleborus niger alter*, Matth.

*Elleborus niger vulgaris*, Gesn. hor. Cæf.

*Pseudohelleborus niger*, Dod. gal.

Consiligo, Tur. minor, Lugd.

*Helleborus niger nostras*, Cord. hist.

*Veratrum nigrum*, Cord. in Diosc. secundum,  
 Lac. Dod. Clus. pan. & hist. Tab.

*Elleborus niger tertius Dodonæi & Matthio-*  
*li*, Lugdun.

*Helleboraster alter*, Ad.

*Helleborastrum*, Lob. Ger.

Hujus radice multi in Medicina utuntur.

III. *Helleborus niger hortensis alter.*

*Veratrum nigrum 4. peregrinum*, Clus. hist.

Hujus folia atriora, florum oræ ex purpura nigricant.

IV. *Helleborus niger* flore roseo.

*Elleborum nigrum*, Matth. Cast. Lugd. Cam.

*Planta leoni*, Dod. gal.

*Elleborus niger* fl. magno purpureo, Gef. hor.

*Helleborus niger*, Ad. Lob. *niger* 2. *Dodonæi*, Lugdun.

*Veratrum nigrum*, Dod. legitimum, Clus. pan. *Stiriacum*, Tab.

*Ellebori nigri* alterum genus, Cæf.

*Elleborus niger* annuus, Ang. *niger* legitimus, Clus. hist. *niger* verus, Ger.

Flore est purpureo, candido: sic flos initio albidus, dein purpurascens, postremo virens; & qui albo flore marcescens purpurascit: flos albescit cum aliqua diluta rubedine.

V. *Helleborus niger* *Saniculæ* folio major. *Osteritium montanum*, Trag.

*Sanicula* femina adulterina, Eid.

*Sanicula* sem. Fuch. Gef. hor. Lugd. Clus. hist.

*Veratrum nigrum* *Dioscoridis*, Dod. Lac. Eyst. *nigrum* 2. Clus. pan.

*Astrantia nigra*, Gef. hor. Ad. Lob. Ger.

*Imperatoria nigra*, Tab.

*Elleborus niger* *Dodonæi*, Lug. verus *Dioscoridis* *Dodonæi*, sed fallitur, Gef. hort.

VI. *Helleborine* *Saniculæ* folio minor, in *Prodro*mo describitur.

VII. *Helleborine* *Saniculæ* facie.

*Epipactis*, Matth. Lac.

*Elleborine*, Matth. Lugd. Tab.

*Helleborine* *Matthioli* commentitia, Ad.

*Elleborine alpina* *Saniculæ* & *Ellebori nigri* facie, Lob.

VIII. an *Elleborinæ* *nigræ* species.

*Polyrhizos* *Plinij* *Dalechampi*, Lugd.

IX. *Helleborus niger* *tenuifolius* *Buphthalmi* flore.

*Elleborus niger* verus, Trag. Lon.

*Pseudoelleborum*, Matth. Lugd.

*Buphthalmum*, Ang. *Dodon*, Clus. pan. & hist. Lugd. Cam.

*Helleborine tenuifolia*, Cord. hist.

*Elleborastrum nigrum*, Gef. hor. Cam.

*Helleborus ferulaceus*, Ad.

*Helleborus niger* *ferulaceus* *Theoph.* Ad. Lob.

*Elleborum* alterum, Cast.

*Helleborus Hippocratis*, Tab.

*Sesamoides minus*, Cord. in *Diosc.* Gef. hor.

*Ellebori nigri* species quibusdam, Gef. hor.

# HELLEBORUS ALBUS.

I. *Helleborus albus* flore subviridi.

*Elleborus albus*, Brunf. Trag. Fuch. Cord. hist. Gef. hort. Ang. Lon. Lugd. Cam. Clus. hist. fl. her.

baceæ, Eyst.

*Helleborum album*, Matth. Ad. Lobel. Cæsalp. Castor.

*Veratrum album*, Dod. gal. Tur. Lac. Cord. in *Dioscorid.*

*Helleborus candidus* *Græcorum*, est *Consiligo* *Vegetij*, *Abfyrti*, *Columel.* & *Plinij*, Guil.

Flore est in viridi albescente *Taber.* qui iconem sequentis habet: dein flore pallide flavescente, & alterum eodem colore, nisi quod flos racemi instar coactus sit, quem

*Elleborum album* *fœminam*.

*Helleborum album* *præcoccem* Ger. nominat. Mas durior, fœmina mollior.

II. *Helleborus albus* flore atrorubente.

*Helleborum album* floribus atrorubentibus *præcox*, Lob.

*Helleborus albus* alter fl. nigricantibus, Dod. flore ex purpura nigricante, Clus. hist.

*Ellebori albi* alterum genus, Cæf.

*Hellebor. albus*, Ger. flore atrorubescens, Eyst. mas, Tab. ico.

Ex radicibus *Ellebori albi*, Hispani venenum conficiunt, de *Balestera* & de *Jerva* vocatum, quod idem quod *Pharicum* dictum, ut parum omnino ab eo differens. Et *Limeum* herbam à *Gallis* appellatam, ab *Elleboro* non discrepare, suspicari possumus. Guil. pap.

# HELLEBORINE.

I. *Helleborine latifolia* montana.

*Saryrium octavum*, Trag.

*Helleborine*, Dod. Ad. Lob. Lugd. Ger. 1. Tab. recentiorum 2. Clus. hist.

*Damaconium* *Calliphyllon*, Cord. hist.

*Epipactis* sive *Elleborine*, Cam. ep.

*Sigillum Salomonis*, Cæf.

*Epipactis latifolia*, Eyst.

Foliorum amplitudine (& quod altera folijs oblongis acutis, altera vero subrotundis est) & floris colore variat.

II. *Helleborine* altera atrorubente flore.

*Alisma botryodes* seu *racemosum*, Thal.

Variat foliorum amplitudine: florum colore atrorubente, rarius candido.

III. *Helle-*

III. Helleborine angustifolia palustris sive pratensis.

Elleborine 2. Clus. pan. recentiorum 3. Eid. hist.

IV. Helleborine flore carneo.

Elleborine 3. Clus. pan. 4. Eid. hist.

Sigillum S. Mariz alterum, Cæf.

V. Helleborine flore albo, vel Damafonium montanum latifolium.

Alisma quorundam, Cord. hist.

Alisma cymbalianthemum, Thal.

Helleborine albo flore, Tab. Ger.

Epipactis angustis folijs, Eysl.

VI. Helleborine montana angustifolia sp. Elleborine 4. Clus. pan. 5. Eid. hist. (cata.

VII. Helleborine montana angustifolia purpurascens.

Damafonium tenuifolium, Cord. hist.

Elleborine 5. Clus. pan. 6. Eid. hist.

Alisma tenuifolium, Thal.

Damafonium alpinum, Lugd.

Sigillum S. Mariz 3. Cæf.

Helleborine angustifolia, Tab. Ger.

Flore luteo reperiri Lugd. auctor est.

VIII. Elleborine 7. Clus. hist.

IX. Helleborine fl. rotundo, sive Calceolus.

Alismatis species flore ferrugineo, Gesh. hort.

Lonchitis prior, Dalech. in Diosc. Ama.

Damafonium nothum, Dod. gal.

Calceolus Marianus, Dod.

Pseudodamafonium, Clus. pan.

Calceolus Mariz, Ad. Lob. Eysl.

Elleborine recentiorum 1. Clus. hist.

Elleborine ferruginea Dalechampij, Lugd.

Alisma ~~induratum~~ aut ~~nudum~~, Thal.

Flore est luteo, sed folia adjuncta ferruginea: reperitur & albo & utriculo purpureo: apud Helvetios flore est duplo majore, quam apud Noricos.

X. Helleborine Indica floribus candidis.

Elleborines fortè genus, Clus. exot. l. 4. c. 20.

## SECTIO QUINTA.

GENTIANA; PLANTAGO; HOLOSTIUM;  
CORONOPUS; PSYLLIUM.

### GENTIANA.

**G**entiana Dioscoridi, l. 3. c. 3. quæ ab inventore Gentio Illyriorum rege, qui primus in bello ejus vires reperit, denominata. Diosc. est folijs juglandi, plantaginive similibus: at Plinio, l. 25. c. 7, folijs fraxini.

Verùm Gentiana alia sunt radice perenni, alia fugaci: illæ flore & semine prolato, interire non solent, sed singulis annis ex eadem radice, nova germina producant: hæ verò, flore emarcescente, & semine disperso, hyeme intereunt, & ex semine renascuntur.

Gentiana alpina major.

I. Gentiana major lutea.

Gent. Brunf. Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac. Dod.

Cord. in Diosc. & hist. Gesh. Lon. Cæf. Cast. Lug.

Gentiana major, Matth. Gesh. hort. ap. Ad. Lob.

flore luteo, Cam.

Gentiana veterum, Clus. hist.

Gentianæ 1. species, Trag.

Reperitur quoque florib. flavis, imò & albis, punctis carentibus campanulæ forma, in Pyre-

II. Gentiana major purpurea. (næis.

Gentianæ 2. species, Trag. Dod. gal.

Gent. punicea, Gesh. fr. purpureis floribus, Lob.

Gentiana major alia, Cam. ep. (ob.

Gent. major fl. purpureo, & 1. Clus. pan. & hist.

III. Gentiana major flore punctato.

Gent. major pallida punctis distincta, Clus. pan. & hist.

Variat floribus colore pallido: reperitur & cæruleo, quæ

Gentiana major cæruleo flore, Clus. hist.

IV. Gentiana asclepiadis folio.

Gentiana 3. Trag. Dod. gal.

Gentiana folijs hirundinariæ, Gesh. hort. sive

Asclepiadis, Clus. pan.

Gentiana 2. cæruleo flore, Clus. hist. Tab.

Gentiana minor altera, Dod.

Vincetoxicum 1. Cæf.

Flore est cæruleo saturato, nunc purpureo, nunc delicatioris & velut cinerei coloris.

Gentiana alpina minor sive Gentianella.

I. Gentianella alpina latifolia magno flore, quæ in Prodrómo descripta est.

II. Gentianella alpina angustif. magno flore,

Gentiana 4. Trag.

Gentianella alpina, Gesh. hort. pumila, Gesh. cat.



Gentianella campanulæ flore purpureo, Ad.  
Gentiana 5. & Gentianella verna major, Clus.  
pan. & hist.

Gentianella Helvetica, Lob. ico.  
Gentianella minima latifolia, Lugd.  
Helleborine Dalechampia ad Diosc.

III. Gentianella alpina verna major.  
Hippion, id est, Viola equina, Cord. ob. Gesn.  
Calathiana verna, Gesn. hort.

Gentianella verna minor, Clus. hisp. & hist.  
Gentiana 6. Clus. pan.

Gentianella alpina, Lob. Bavarica, Cam. hort.  
Gentianella angustifolia, Lugd.

Gentianella minima verna fl. cæruleo, Eyst.  
Vincetoxicis species pusilla, Cæs.

Flos plerisque cæruleus, quibusdam can-  
dicans.

IV. Gentianella alpina verna minor.  
Gentianella minor, Cam. hort.

an Gentianella purpurea minima, Col.

V. Gentianella alpina æstiva centaureæ  
minoris folijs.

Gentiana fugax 5. seu Gentiana 11. Clus. pan.  
& hist.

Gentiana minor, Tab.

Calathiana verna Dalechampi, Lugd.

VI. Gentianella brevi folio.

Gentiana minima, Ad. Lob. Cast.

Gentiana fugax 4. vel Gent. 10. Clus. pan. & hist.  
Vulneraria herba, Cast. ico.

VII. Gentianella cærulea oris pilosis.

Gentianella cærulea limbriata angustifolia au-  
tumnalis, Col.

VIII. Gentianella omnium minima: in  
Prodromo descripta.

*Gentiana pratensis.*

I. Gentiana cruciata.

Herba fullonum, Brunf.

Cruciata, Trag. Fuch. (cui & Gentianæ spe-  
cies) Dod. Ang. Gesn. hort. Lac. Lon. Lugd. Eyst.

Gentiana cruciata, Gesn. hort.

Gentiana minor, Matth. Ad. Lobel. Cast. Tab.  
media, Cam.

Gentiana 3. quæ duplex, Clus. pan. & hist.

Cruciata gentianella, Thal.

Vincetoxicum alterum, Cæs.

Altera est procumbens & minor: altera ere-  
cta & major: alterius flores intensè cærulei: est  
& tertia radice non pertusa.

II. Gentiana autumnalis ramosa.

Gentiana fugax sive annua 1. vel Gentiana 7.  
Clus. pan. & hist.

Gentiana 7. Tab.

Viola calathiana altera, sive polyanthemus,  
Thal.

Gentiana nella multiflora autumnalis è cæruleo  
purpurascens, Eyst.

Flore est cæruleo purpurascens, rarius can-  
dido.

III. Gentiana pratensis flore lanuginoso.

Gentiana fugax altera sive Gentiana 8. Clus.  
pan. & hist.

IV. Gent. pratensis flore breviorè & majore.  
Gentiana fugax 3. sive Gentiana 9. Clus. pan.  
& hist.

V. Gentiana utriculis ventricosis.

Gentianella cærulea cordata, Col.

VI. Gent. angustifolia autumnalis major.  
Pneumonanthe, Lob.

Calathiana viola autumnalis minor, Gesn. hort.  
Calathiana autumnalis, Gesn. cat.

Campanula autumnalis, Dod. Eyst.

Gentiana 4. sive angustifol. 2. Clus. pan. & hist.

Flore est cæruleo dilutior: est nigro: rarius  
albo.

VII. Gentiana angustifolia autumnalis mi-  
nor, floribus ad latera pilosis.

Pneumonanthe, Cord. hist. desc. Ad.

Viola calathiana autumnalis prima, Thal.

Gentianella autumnalis folijs centaureæ mi-  
noris florè cæruleo, Eyst.

*Gentiana palustris.*

I. Gentiana palustris angustifolia.

Gentiana minima, Matth. Cast. desc.

Calathiana viola in pratis udis, Dod. gal. Lugd.

Calathiana viola autumnalis, Gesn. hort.

Pneumonanthe (in humentib. ericetis) Lob.  
ob. Tab. Ger.

Gentiana angustifolia, vel 4. Clus. pan. & hist.

Cruciata sive Gentiana minima, Lugd.

Campanula pratensis, Lugd.

Floris color cæruleus, violaceus, purpureus.

II. Gentiana palustris latifolia flore pun-  
ctato.

Gentiana 12. & punctata, Clus. pan. & hist.

Alisma folio glabro, in Phytopinace.

Floribus est subcæruleis, purpureis, viola-  
ceis, punctis aspersis.



## PLANTAGO.

**P** *Plantago ἀνθώλου* Diosc. lib. 2. cap. 153. à forma, id est, lingua agnina dicitur: *αἰσι πελίνου* & *μυλτινερνία* & *ἐπιδυαυ* & *septinervia*. Latini, *plantago*, à *planta* ducto nomine.

*Plantago latifolia.*

I. *Plantago latifolia glabra*: quæ 1. in Prod.

II. *Plantago latifolia sinuata*.

*Plant. rubra*, Brunf. Trag. Matth. Lon. Lug. Cam.

*Plantago major*, Matth. Fuch. Tur. Gesn. hort.

Dod. Cast. Tab. Cam. *major latifolia*, Ang.

*Plantago latifolia*, Cord. in Diosc. Ger. latif. lævis, Ad. Lob. ico. vulgaris latifol. Eid. obs. Lugd.

*Plantago* & *Centinervia*, Cæs.

*Plantago* *πελίνου* & *major* five *rubra*, Thal.

III. *Plantago latifolia incana*.

*Plantago major*, Brunf. Trag. Matth. Lon. Lug. Cam.

*Plantago latifolia*, vel *media* & 2. Trag.

*Plantago media*, Fuch. Dod. Gesn. hort. Thal.

*Plantago major incana*, Ad. Lob. Clus. hist.

*Plantago minor*, Tur. minor *Dioscoridis*, Tab.

*Plantago incana*, Ger.

*Cynoglossa* quorundam, Lugd.

IV. *Plantago latifolia rosea*, flore expanso.

*Plantago rosea*, Cam. Ad. Lob. ico. Eyst.

*Plantagini* majori *florem* addidit, Camer. in

*Plantago rosea exotica*, Ger. (Matth.

V. *Plantago latifolia rosea*, floribus quasi

in spica dispersis.

*Plantago rosea*, Ad. Lugd.

*Plantago multiplex*, Tab.

*Plantago rosea spicata*, Ger. Eyst.

Hujus spicam, Cam. in Matth. *Plantagini*

majori, & Lob. in icon. *Plantagini roseæ* ad-

jecit. Unam esse, & differentiam in flore di-

solum tempore consistere, censemus.

VI. *Plant. latifolia spica multiplici sparsa*.

*Plantago major altera*, Dod. gal.

*Plantago major spica multiplici*, Dod.

*Plantago paniculâ sparsâ* *Sarothrodes* & *Co-*

*reniastrophora*, five *Scoparia*, Gemmæ, Lob.

*Plantago rosea* *Lobelij*, Lugd.

VII. *Plantago Indica*.

*Payco*, herba ex Peru, Monar. Lugd.

VIII. *Plantago peregrina sinuosa*.

*Plantago umbilicata*, latifolia & convoluta,

Lob. ad. par. 2.

IX. *Plantago latifolia incana spicis varijs*.

*Plantago peregrina latifolia* *Gareti*, Clus. hist.

Capitula varia: quædam rosam æmulantur,

quædam spicam: quædam ex media rosa bre-  
vem spicam producent: in alijs ex spicæ parte  
infima, alia capitula dependent.

X. *Plantago villosa*, seu *incana lanuginosa*.  
*Plantago Salmaticensis*, *Cynoglossum* forte  
Diosc. Clus. hisp. & hist.

XI. *Plantagini Hispanicæ* similis.  
*Planta* quæ *Alexipharmacum* est: in Epist. ad.  
Monard.

XII. *Plantago latifolia glabra minor*.

*Plantago latifolia minor*, Tab. Ger.

XIII. *Plantago latifolia hirsuta minor*.

*Plantagini* *mediæ* genus minimum, Thal.

*Plantago angustifolia.*

I. *Plantago angustifolia major*.

*Plantago minor*, Brunf. Fuch. Dod. Gesn. hort.

Lac. Lon. Lugd. *media*, Cast.

*Plantago lanceolata*, Trag. Ang. Tab.

*Plantago longa*, Matth. Lugd.

*Plantago quinquenervia*, Ad. Lob. Ger. *μυλτινερνία*, Thal.

*Lanceola major*, Cæs.

Variat: spicis aliquando bisdidis: aliquando  
loco spicarum sunt capitula, mirè variantia.

II. *Plantago angustifolia major*, caulium  
summitate foliosâ.

*Plantago quinquenervia rosea*, Ger.

III. *Plantago angustifolia prolifera*.

*Plant. angustifol.* *Gazetti*, vel *exotica*, Clus. hist.

IV. *Plant. angustifolia serrata* *Hispalensis*.

*Plantago angustifolia altera*, Clus. cur. post.

V. *Plant. angustif. fruticans*, Clus. cur. post.

VI. *Plantago angustifolia minor*, Tab. Ger.

*Plantago pentaneuros minor*, Thal.

*Lanceola minor*, Cæs.

VII. *Plantago pilosa bulbosa*.

*Plantago Apula laciniata bulbosa*, Col.

VIII. *Plantago angustifolia paniculis la-*

*gopi*, quæ 4 in Prod.

an *Planta peregrina plantagini acutæ* similis,

quæ Græcis *μυλτινερνία* dicitur, Raouv. Lugd.

Variat, modo paniculis *lagopi* est: modo ca-

pitulis rotundis, hirsutis, albis.

IX. *Plantago trinervia* sol. angustissimæ

3. in Prod.

X. *Plantago trinervia montana*.  
*Plantago altera minima trinervia montana*  
*incana*, Col.

*Plantago aquatica*.

I. *Plantago aquatica latifolia*.  
*Plantago aquatica*, Brunf. Trag. Matth. Fuch.  
 Dod. Tur. Gese. hort. Lon. Ad. Lob. Cast. Thal.  
 Cæs. Lugd. Tab. Ger.  
*Limonium*, Ang.  
 An huc referendum  
*Alisma sive Damasoniū*, quæ *Fistula pastoris* &

*Plant. aquatica Germanis*, Cord. in Diosc. Lon?  
 II. *Plantago aquatica angustifolia*.  
*Plant. aquat. humilis angust. & longifolia*, Lob.  
*Plantago aquatica minor*, Cæs. Tab.  
*Plantago aquatica humilis*, Ger.  
 III. *Plantago aquatica stellata*.  
*Alisma pusillum angustifoliū muricatum*, Lob.  
*Plant. aquatica minor altera*, Lob. ico. (ob.  
*Damasonium stellatum*, Lugd.  
 IV. *Plantaginella palustris*.  
*Plantago aquatica minima*, Clus. hist.

# HOLOSTEUM.

**O** *ἁγρον* Dioscorides, lib. 4. cap. 11. descripsit: & Plinius, lib. 27. cap. 10. inquit, *Holosteum sine durisia* est herba ex adverso à *Gracu* appellata, sicursi dulcis.

I. *Holosteum hirsutum albicans majus*.  
*Holosteum Salmaticum prius*, Clus. hisp. ma-  
 Jun. Eid. hist. Lob.  
*Holost. Salmaticense Clusij*, Lugd. Cam. Ger.  
*Holosteum majus*, Tab.  
*Holosteum quorundam*, Cam. in Matth.  
*Plantago angustifolia albida*, Dod.

II. *Holosteum hirsutum albicans minus*.  
*Holosteum Salmaticense minus*, Clus. hist.  
*Holost. parvum Monspelicense*, Ad. Lob. Ger.  
*Holosteum Monspelianum*, Tab.

III. *Holosteum hirsutum nigricans*.  
*Holosteum quorundam*, Lugd.  
*an Lanceola montana*, Gesn.

IV. *Holost. sive Leontopodium Creticum*:  
 in Phyt. & Prod. descriptum  
*Leontopodium Creticum*, Clus. hist.  
*Leontopodium legitimum*, quod *Catanance*  
*creditum*, Imperato.  
*Leontopodium*, *Catanance* non est, Belli ep. 1.  
 ad Clus.

V. *Holosteum Creticum alterum*.  
*Leontopodium Creticum aliud*, Clus. hist.

*Habbures*, Cam.  
*Gorne albi catartici nomine Alpinus misit*.  
*an Planta Plantagini similis*, Lugd. ap.  
 VI. *Holosteum strictissimo folio majus*.  
*Coronopus sive Serpentina*, Matth.  
*Coronop. syl. Matth. Gesn. Lob. Lug. Cast. Tab.*  
*Serpentina*, Dod. Ad.  
*Plantago marina*, Cam.  
*Coronopus*, Ger. ico. montanus, Cæs.  
 VII. *Holosteum strictissimo folio minus*.  
*Serpentaria omnium minima*, Lob. Dod. Lugd.  
*Coronopus altera*, Cæs. minor, Tab.  
*Coronopus sive Serpentina minima* Ger.  
 VIII. *Holosteum Mafiliense*.  
*Coronopi & Sedi montani media planta Maf-*  
*siliensium*, Ad. Lob.  
*Coronopus Mafiliensium*, Lugd. Tab.  
*Coronopus sive Serpentina minor*, Ger.  
 IX. *Holosteo affinis*, *Cauda muris*.  
*Coronopus sylvestris*, Trag.  
*Myofuros*, Dod. gal. Lob. ico. quorundam, Thal.  
*Cauda muris*, Dod. Ad. Lob. Lug. Tab. Cam. Ger.  
*Holosteon*, Lon. Lugd. Cam. Thal.

# CORONOPUS.

**K** *Coronopus* Dioscoridi, lib. 2. cap. 158. & Theophrasto 7. hist. 9. ubi *Gaza Silaginem vertis*: Plinio, lib. 27. c. 16. & 1. 22. c. 19. *Coronopus* dicitur. Latini, per cornici à foliorum forma: & cornu cervi, nominatur.

I. *Coronopus hortensis*.  
*Coronopus*, Trag. Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac.  
 Lon. Ad. Tab. Eyst.  
*Coronopus sativus*, Cord. hist. Cast. Cæs. Cam.  
 vertis, Cord. in Diosc. Gesn. hort.  
*Pseudocoronopus*, Dod. gal.  
*Cornu cervinum*, Lob. Ger.

*Herba stella, sive cornu cervinum*, Dod.  
 II. *Coronopus sylvestris, hirsutior*.  
*Coronopus sylvestris*, Cæs.  
*Coronopus Prochyta*, Col.  
 III. *Coronopus maritima major*.  
*Plantago marina*, Dod. gal. Ad. Lob. Tab. Ger.  
*Plantago maritima*, Gesn. hort. Lugd.

*Plantag.*

Plantago angustifolia, Dod.

Bibinella, Cæf.

Coronopus marinus, Cam.

IV. Coronopus maritimus tenuifol. lævis.

Coronopus minimus tenuifolius maritimus, Colum.

V. Coronopus maritimus minimus hirsutus: in Prod. descriptus.

## PSYLLIUM

**ΨΥΛΛΙΟΝ** Dioscorides lib. 4. c. 70. folijs Cornopo non dissimilibus scribit, bisutu, longioribus: sic dictum quod *Ψυλλας*, id est, pulices, si virens domum importetur, in ea gigni non sinat: vel ut Dioscoridi & Plinio. à semine pulicis simili. Theophrasto 7. hist. 8. novena dicitur: oculum canu & canariam Gaza vertit, Plinium forte imitatur, qui l. 25. c. 11. Psyllium & Cynceides nominavit, Latini pulicaria.

I. Psyllium Dioscoridis, vel Indicum crenatis folijs: pro i. in Prod. descriptum.

Psyllium primum, Ang.

II. Psyllium majus supinum.

Psyllium alterum, Matth. Cast. Lugd. Tab.

Psyllium perenne, Gef. hist. an Cam.

Psyllium Plinianum forte, majus radice perenni supinum, Ad. Lob.

Psyllium tertium, Ang. majus, Cæf.

Psyllium semper virens, Ger.

III. Psyllium majus erectum.

Psyllium, Trag. Matt. Fuch. Tur. Cord. in Diof. & hist. descr. Dod. Gef. hor. Ad. Lob. Cast. Ger.

Cynops Theophrasti, Gef. hort.

Pulicaris herba, Lugd.

Psyll. minus, Cæf. secundum, Ang. primū, Tab.

IV. Psyllium minus, quod Gottne rubri & Botrio rubro nomine accepimus, & pro 2. in Prodr. descr.

an Kaly 3. Alpini, minus rectè pictum.



## SECTIO SEXTA.

PYROLA; BISTORTA; LIMONIUM; POTAMOGETON; NYMPHÆA; TRIBULUS AQUATICUS; SAGITTA; DRACONTIUM;

Arum; Arisarum; Asarum; Tussilago; Petalites;

Cacalia & Lappa.

## PYROLA.

**Pyrola**, nomen à folio, quod pyri folium referat, accepit: quam aliqui Limonium, alij Britannicam volunt.

I. Pyrola rotundifolia major.

Pyrola Brunf. Matth. Ang. Dod. Gefn. hort. Ad.

Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger. Eyst.

Pyrola vulgarior, Clus. hist.

Limonium, Fuch. Tur. sylvestre, Trag.

Limonium & Pyrola, Lon.

Beta sylvestris, Cord. in Diof.

Pyrola major five Beta sylv. Thal.

Pyrola alia in campestribus, Cæf.

Hæc folio est vel ampliore molliquet: vel minore & duriore.

II. Pyrola rotundifolia minor.

Pyrola quarta five Beta, Clus. pan. & hist.

Pyrola minima, Eyst.

III. Pyrola folio mucronato serrato.

Ambrosia, Dalech. in Diof. montana, Lugd.

Pyrola 2. & tenerior, Clus. pan. & hist.

Pyrola minor, Thal.

Pyrola pannonica 2. Cam.

IV. Pyrola alfine flore Europæa.

Herba trientalis, Cord. ob. Franc.

Alsinanthemos, Thal.

Alfine alpina, Svenck.

Major est & minor, ut & sequens.

V. Pyrola alfine flore Brasiliana: in Prod. descr.

VI. Pyrola frutescens arbuti folio.

Pyrola 3. vel frutescens, Clus. pan. & hist.

BISTOR-

## B I S T O R T A.

**B**istorta dicitur, quod radice in se contorta & convoluta confset: quam alij Limonij, alij Britannica, alij Behen rubri speciem faciunt. Hujus Plinius l. 24. c. 16. & l. 25. c. 11. inter Dracontia meminisse videtur: forte ejusdem l. 25. c. 13. Molybdana, id est, Plumbago, quod plumbum, oculi vitium tollat.

I. Bistorta major radice minus intorta.  
Colubrina & Dracunculus major, Brunf.  
Bistorta foemina, Eidem.  
Bistorta major, Trag. Dod. gal. Ang. Gef. col. Ad.  
Thal. Tab. Ger. Cluf. hist.  
Bistorta, Cord. in Dioscor. & hist. Matth. Dod.  
Caef. Cast. Lugd.  
Bistorta Britannica, Lob.  
Serpentaria foemina & Colubrina, Fuch.  
Colubrina, Lon.  
Limonium, Gef. hort.  
Bulapathum seu Bistorta, Fracast.

II. Bistorta major radice magis intorta.  
Colubrina & Dracunculus minor, Brunf.  
Bistorta mas, Eidem.  
Colubrina minor, Trag.  
Serpentaria mas seu Bistorta, Fuch.  
Bistorta, Lon. minor, Dod. gal. Gef. ho. Lac. Tab.

Bistorta media, Ang.  
Bistorta latifolia, Ger.  
Bistorta major, Eyst.

In folijs & radice differentiae: folia alteri majora & rugosa: alteri minora & laevia: & hujus radix magis intorta: illius major, minusque complicata.

III. Bistorta alpina maxima: in Prod. desc. & Schvvenck.

IV. Bistorta alpina media.  
Limonij species minor, Gef. hort.  
Bistorta minor, Ad.

Bistorta minor seu alpina, Camerar. in Mat. thiolo.

V. Bistorta alpina minor.  
Bistorta minor, Ang. Cluf. pan. Ger.  
Bistorta alpina minor, Cluf. hist.  
Bistorta minima alpina alia, Cam.

## L I M O N I U M.

**L**εμόνιον ποσειδώνιος Dioscoridis l. 4. c. 16. quod οὐ ληνός in pratis (quamvis & in palustribus) proveniat, Plinio l. 20. c. 3. Beta sylvestris, quam Limonium vocant, alij neuroides.

I. Limonium maritimum majus.  
Limonium, Matth. Lac. (cui & Been rubrum)  
Ad. Lob. Caef. Cast. Lugd. Ger.  
Been rubrum, Limonio seu Bistortae cognata,  
Gef. hort.

Behen rubrum officinarum, Guil.  
Valerianae rubrae similis, Dod.  
Limonium primum, Tab. Cam.

II. Limonium alterum, Matth. Lugd. Tab.  
cui & Pyrola: quid est?  
Limonium Matthioli secundum, Ad.

III. Limon. maritimum minus oleae folio.  
Limonium parvum Narbonense oleae folium,  
Ad. Lob. ico. Tab.  
Limonium parvum Narbonense, Lugd. Cam.  
Limonium alterum exiguum, Caef.

Limonium parvum, Ger.

In hoc magna varietas occurrit.

IV. Limon. parvum bellidis minoris folio.

Limonium pumilum, Cluf. hist.

V. Limonium maritim. minus foliolis cordatis: quod i. in Prod.

VI. Limonium maritim. minimum: quod 2. in Prod.

VII. Limonium peregrinum folijs asplenij.  
Limonij elegans genus, Rauvv. & Lugd. ap.

Limonium peregrinum, Cluf. cur. post.

Limonium Syriacum, Eyst.

Cichorium globulare, Imper.

VIII. Limonium peregrinum folijs formae Aristolochiae.

Limonio congener, Cluf. hist.

## P O T A M O G E T O N.

**P**οταμογενής, quasi fluminibus vicina, quod palustribus & aquosis nascatur, Diosc. l. 4. c. 101. & Aeliano, l. 6. anim. c. 46. quo herinaceum interfici scribit, & ταχύνει, quasi spicata, ob caulem, quem floribus & semine spicatum ex se mittit. Plinio l. 26. c. 3. Potamogeton folijs Beta & c. subjungit: Castorem hanc aliter novisse tenui folio veluti equinis feris & byrsolongo & Levi, in aquosis nascentem: hoc Myriophyllum aquaticum videtur.

I. Potam.

I. Potamogeton rotundifolium.  
Potamogeton, Trag. Matth. Fuch. Ang. Lac. Lon.  
Cæf. Caft. Lugd. Tab.  
Potamogeton, Dod. gal. latifolium, Ger.  
Potamogeton, *Antipodiar*, Thal.  
Potamogeton: fimilis rotundiore folio, Cord.  
in Diofc.

II. Potamogeton, Salicis folio.  
Phyllis lacuus, Cord. hift.  
Potamogeton, Dod.  
Potamogeton: live fontalis & fpicata, Ad. Lo-  
bel. icth.

Potamogeton 2. Dalechampi, Lugd.  
Potamogeton, *Antipodiar*, Thal.  
Potamogeton angustifolium, Tab. Ger.

III. Potamogeton longo ferrato folio.  
Lapathi generis fylvefte, Gef. hort.  
Oxyapathum aquaticum, Lugd.

IV. Potamogeton folijs latis splendentibus.  
Potamogeton altera, Dod.  
Potamogeton *Antipodiar*, Thal.

Habetur major & minor species.  
V. Potamogeton folijs anguftis splenden-  
tibus.

Potamogeton alterum, Dod. ed. belg. & post.  
VI. Potamogeton folijs crispis, live Lacu-  
ca racarum  
Alga fecunda, Trag.

Fentilapathum pulillum Ad. Lob. ico.  
Tribulus aquaticus minor, Cluf. pan. & hift.  
Potamogeton *Antipodiar* seu crispum, seu fimbri-  
atum, Thal.

an Alga Hydrolapathi folio, Gef. col.  
Hæc duplex: altera farmentis planis, altera  
rotundis, & hæc brevioribus, mucronatis &  
minime in ambitu ferratis: utriusque Cluf. is  
meminit.

VII. Potamogeton ramosum angustifo-  
lium.

Tribuli aquatici minimi nomine, D. Francus  
mifit: quod 2. in Prodr.

VIII. Potamogeton gramineum ramosum.  
Fentilapathi graminei nomine, a D. Barfiero ex  
Austria: quod 2. in Prodr.

IX. Potamogeton minimum capillaceo fo-  
lio: quod 3. in Prod.

X. Potamogeton capillaceum capitulis ad  
alas trifidis: hoc 4. est in Prod.

## N Y M P H Æ A.

**N**ympha Theophrasto 9. hift. 13. Diofcoridi 1. 3. c. 148. cui sic dicta, quoniam aquosa amet. At Plinio 1. 25.  
c. 7. natam tradit ex Nympha Zelotypia erga Herculem, unde quibusdam Heracleon dicatur. Off. inu-  
Nenuphar. Genera duo Diofcoridi & Plinio: altera flore albo, radice nigra: altera flore luteo, radice alba.

## Nymphaea alba.

I. Nymphaea alba major.  
Nenuphar album, Brunf.  
Nymphaea alba, Brunf. Matth. Ang. Dodon.  
Cord. hift. Lon. Ad. Lobel. Taber. Thal. Ger.  
Cluf. hift.  
Nymphaea candida, Trag. Fuch. Tur. Cæf.  
Nymphaea major alba, Lugd. Caft. Eyfl.  
Lotus Ægyptia, Alpini.

Nymphaea folia D. Sigfridus Helmftadio ad-  
mifit, quæ latiffima, tenuiffima, pallide vi-  
rescens: antea ficut prima Nymphaea folia, &  
live sub aqua latitant, quæ dein extra aquam  
duriora & crassiora redduntur, ut cum mariti-  
mo confiderandum.

Ad E. yster, aliam quæ nullatenus primi fit  
diftinctio, nisi quod omnia minora habeat.

Nymphaea alba minor, Eyfl.

II. Nymphaea alba minor.

Nymphaea parva, Matth.

Nymphaea altera lutea minor, Lugd. ico.

Nymphaea alba minor, Ad. Tab. Ger.

III. Nymphaea alba minima.

Morus ranæ, Dod. Ad. Lob. ico. Caft. ap. Tab.

Nymphaea minor alba, Lugd.

Nymphaea parva, Cæf.

Florem ex tribus foliis subrotundis & gla-  
bris observavimus: at hift. Lugdun. flore ex  
quinque foliis oblongis & subhirsutis com-  
positum, pingit.

IV. Galum radix aquatica in Sunda valde  
refrigerans: par. 4. Ind. Ord. 8. quid?

## Nymphaea lutea.

I. Nymphaea lutea major.

Nenuphar luteum, Brunf.

Nymphaea lutea, Trag. Matth. Fuch. Ang. Tur.

Dod. Lon. Lob. Caft. Tab. Ger. Eyfl.

Nymphaea lutea major, Lugd. Cluf. hift.

Nymphaea altera, Cord. in Diofcoride extoto  
luteo, Cæf.

Nymphaea citræa, Cord. hift.

II. Nymphaea lutea minor magno flore.

Nymphæa lutea minor, Lug. Ger. Dod. ed. belg.

Nymphæa fecunda, Tab.

III. Nymphæa lutea minor parvo flore.

Nymph. lutea minor Septentrion. Ad. Lob. ico.

Nymphæa altera lutea, Lugd.

an Nymphæa parva alia. Cam. in M. 111.

IV. Nymphæa lutea minor flore imo...

Nymphæa alia minor, Lugd.

## TRIBULUS AQUATICUS.

**T**ribulus & *trivulpus* Dioscoridi l. 4. c. 15. Theophrasto 4. hist. 11. (id est Tribulus aquaticus) a triplici caule ad similitudinem machinularum serratarum, quæ forma trigona sunt, dicitur.

Genera duo Dioscoridi & Theophr. 6. hist. 5. alter terrestris folijs effigie portulacæ, vel ut Theophr. 4. hist. 11. folio: alter palustris vel aquaticus. Plinio l. 22. c. 10. Tribuli unum genus in hortis, alterum in fluminibus, utrumque: qui l. 21. c. 16. scribit Tribulum non nisi in palustribus nasci folio ad Ulmi effigiem: at in reliquo ovis genera duo, uni Cicercula folia, alteri aculeata esse.

Tribulus aquaticus: & Trag. Matth. Dod. Ang. Butomos Damocratis, Ang.

Lac. Cord. in Diof. Gesl. hort. Lon. Ad. Lob. Cæ-

salp. Cast. Lugd.

Tribulus lacustris, Cord. hist.

Tribulus aquaticus major, Clus. pan.

## SAGITTA.

**S**agitta, à foliorum forma tricuspidi, superne in unam, inferne in duas desinentium, nomine Phleum Theophrasti 4. hist. 9. & 11. esse voluit: Notandum tamen apud Theophrastum Phleum & Phleos differre: nam Phleum genere neutro, palustris planta est: at Phleos & Stæbe 6. hist. 1. palustris, & forte Poterium est. Plinio lib. 21. cap. 17. Magopisthanam dicit a Græcis vocari, quam inter ulmi sagittam vocant.

I. Sagitta aquatica major.

Sagitta major, Matth. Dod. Cast. Tab.

Pistana Magonis sive Sagittaria aquatica Plin.

111, Ad. (cui an Stæbe femina) Lob.

Phleomas latifolia, Lugd.

Barba sylvana recentioribus, Cæs.

Sagittaria major, Ger.

II. Sagitta aquatica minor latifolia.

Sagitta minor, Matth. Dod. Ad. Lob. 1. ed. Ca-

lor. Tab.

Pistana Plinij, Ang.

Sagitta & Sagittalis, Cord. hist.

Sagittaria minor, Lob. ico. Ger.

III. Sagitta aquatica minor angustifolia.

Phleos sive Stæbe Theophr. an pulchella, Lugd.

Sagitta minor angustifolia, Tab. Ger.

## DRACUNTIIUM.

**Δ**ρακύντης Dioscoridi lib. 2. cap. 196. à maculis purpureis, quæ in caule videntur, ita ut anguem pictum esse Diof. loquitur, referat: sic & Theophr. 7. hist. 11. & 9. ejusd. 22. At Plinio lib. 24. cap. 6. de Dracunculo & Dracuntio egit.

Genus a: in quibusdam vetustis Dioscoridi codicibus majori minori Dracunculo & Dracuntio distinctis, ut in istis capitulis adnotata, reperitur. Major quidem folijs runcis sibi invicem implicatis, caule binodiato, versicoloribus, draconum maculis notato, purpureis tamen eminentibus. Minor vero, folijs illi bideraceo majore caudis notis insignis, caule versicolore angui effigie, maculis purpureis resperso. Verum Galenus Apollonius Serapio, nisi simplicium materia Dioscoridem secuti sunt, unius tantum meminere, quare prius caput auctoris suppositum removerent. Plinius tria fecit: primum, folijs Beta Aro simili. alterum tamen e ligno athenico tertium, folio majore quam cornu radice arundinacea nodi geminata: at lib. 25. cap. 3. alium, quod versicoloribus viperarum maculis notatum proponit: de quo sic Theophr. sumi qui genus quoddam serpentum sumpsit Arum vocent, quod ejus cauli varietatem quandam habeat.

I. Dracunculus bifloræ folio.

Dracunculus major, Matth. Dod. gal. Cast.

Dracuntium majus, Tab. Ger. Eysl.

Serpentaria major, Lugd.





Faba Ægyptia, Bellonio, cui & Lotus & Faba Ægyptia.

Colocasía quæ faba Ægyptia non est, Ang. Colocasia, an Aron Ægyptium putatum, Ad. Culcas, Faba Ægyptia. Alpi.

Aron magnum, Colocasía vulgo. Pampina Paradyfi, Cæs.

Talasse, Javanensibus: Lolade, Malayce: Colcaz par. 4. Ind. Orient. c. 6. fig. 15.

Nec fructum nec florem ferre Bellonius asserit: at Lugd. ex Mycone cum flore pingit, qui imaginarius potius, ut rectè Doctiss. Columna: Horti Pisanii olim præfatus Casaubonus florem observavit, qui odoratissimus fuit, cum aliarum Aaronis specierum flores forteant.

VII. Colocasía, sive Faba Ægyptia veterum, Diosc. l. 2. c. 128. *Κύμα ἀγυψία* Faba Ægyptia, quam aliqui ponticam vocant, folium habet amplum instar petali florem rosæ: radix harundinis radice crassior, quæ *πολλήνη* vocatur, &c.

Et Theophrastus 4. hist. 10. inter cetera scribit, fabam Ægyptiam in paludibus, caput super caulem esse favo orbiculato vesparum non ab simile, inque singulis cellis singulas fabas contineri, paulo super id eminentes, multitudine plurimum terdenas: radicem habere validam spinis subhorrentem, &c. Et Plinius, l. 21. c. 15. in Ægypto nobilissima est Colocasía, quam cya-mon aliqui vocant. Hanc à Nilo metunt, &c. folijs latissimis, etiam si arboreis comparentur, ad similitudinem eorum, quæ Personata in nostris amnibus vocamus: adeoque Nili sui doribus gaudent, ut implexis Colocasíæ folijs

in variam speciem vasorum, potare gratum habeanr.

Ex his liquet, Fabæ Ægyptiacæ radicem Colocasiam veteribus dictam fuisse, & manere à Faba hac Colocasiam separandam: dein radicem non fuisse bulbosam, qualis est Colocasía recentiorum, sed arundinaceam & asperam. Quare rectè Doctiss. Columna, Aron Ægyptium (sive Colocasía recentiorum) non esse Colocasía, seu Faba Ægyptia veterum: Et Columna in Diosc. rectè, dum Fabæ Ægyptiacæ radicem Colocasiam dicit. At dum Anguillara, Colocasiam, Fabam Ægyptiam non esse asserit, de Colocasía recentiorum intelligendus est. Verum Matthiolus ne videretur (ut rectè Columna) Fabam Ægyptiam ignorasse, quam aliis rebus ab Aron Ægyptio diversam fecit, ex idæa aliâ depictam iconem historię accommodatam proposuit, non animadvertens vesparum fructum minime rectè fuisse expressum, ut Ciborium *βίβιον* à *πίβιον* quasi loculumentum Dioscoridi exprimeret, quod etiam genus vasculi poculi esse apud antiquos, Athenæus re. Hunc secuti sunt Lac. Lugd. Cast. Durante. Fabam Ægyptiam vocantes & pingentes. Lonicæ item & Durantes, sed Colocasiam nominantes. Et Guilandinus vult Matthiolum præ Faba Ægyptia Ari genus, quod in multis Italiæ locis frequens, perperam proposuisse.

VIII. Fabæ Ægyptiacæ Dioscoridis Arisari. Fructus peregr. an Faba Ægyptia, Diosc. Clus. exor. lib. 2. cap. 13. Fabæ Ægyptiacæ fructum peregrinum Clus. belle respondet, Colum.

## ARISARUM.

**A**risarum Dioscoridi, lib. 2. cap. 198. exigua herbula est, cujus radix olivæ magnitudinem implet: minor quam Aron acrimonia. Plinio, lib. 24. cap. 16. Arisarum simili Aro, minor tantum, minor in folijs & utique radice, quæ tamen olivæ grandis magnitudinem implet.

Genera duo Plinio: alba, inquit, geminum canlem: altera unum tantum emittit: utraque medetur moribus manentibus, &c.

I. Arisarum latifolium majus.

Arisarum latifolium alterum, Clus. hisp. & hist.

II. Arisarum latifolium alterum.

Arisarum alterum, Ang.

Arisarum N. rbonense, Ad. an idem sit cum latifolio Clus., dubitat Lob.

Arisarum latifol Clus. hisp. Dod Lob. Tab. Ger.

Arisarum primum, Clus. hist. (eiusdem.)

Arisari alt. genus, Cæs. an potius Aron parvum

Callæ alterum genus Plinij, Dalech.

III. Arisarum, Thal. in sua Hercynia recenset, quod ab alijs Arisari speciebus a Matthiolo exhibitis, diversum sit; quid sit ignoramus.

IV. Arisarum angustifolium, Dioscoridis, fortè.

Arisarum, Gesn. ap. Lat. Cæs.

Arisarum primum, Ang. alterum, Matth. Dod. gal. Lon. Lugd.

Arisarum

*Arisarum* *quallifolium*, Ad. Clus. *alp. & hist.*  
*Lac. Dod. Lugd. Cast.*  
*Alfarum* *terre-vallum*, Cam.  
*Pseudosilago*, Cast.

*Varia folijs latioribus aliquando: comitis-  
 lo item pumrafcenfe, aliquando viridi, vel ex  
 parvulo virefcenfe.*

## A S A R U M.

**A** *Asarum* *Dioscori*, l. 1. c. 17. quod in coronis non addatur *Plinio*, l. 21. c. 6. monente: quod ut & *Asarum* *Sedulij* *Agre*, ut eo quod odore *Nardum* amuletur. vel, ut *Plinius*, quod *Nardi* vini bibeat.

I. *Asarum*.  
*Asarum* *Bruii* *Trag. Match. Fuch. Dod. ur. Pers-*  
*petali, Valsgogii* *Lac. Cord. in Diosc. & hist. Tur-*  
*cor. L. in Cof. Cast. Lugd. Thal. Tab. Ger. Eyst.*  
*Asarum* *maccais* *liv. Baccas*, Ad. Lob. *ico.*  
*Sedulij* *quantum* *major* *reperiri* *ajunt,*  
*nescio* *quam* *verum*, *Gefn. hort. & Camerario,*  
*Asarium* *aliud* *multo* *maius* *ufitrat* *&* *odora-*  
*tius* *tu* *Cinjiblen/ Gesnero* *teste.*  
 II. *Asarina* *folijs* *asari.*  
*Asarina*, *Match. Cast. Lugd. Tab. Ger.*  
*Tussilaginem* *alpinam*, *Clus. in hist. suspicatur*

## T U S S I L A G O.

**T** *ussilago* *Dioscori*, l. 5. cap. 123. quod iussi medicatur, unde *Latini* *Tussilago* dicitur. *Plinio*, l. 26. c. 6. *subiungit* *Castellum*.  
*Altera* *quod* *dicitur*, *in v. ru. folijs* *majusculis* *quam* *edera*, *quinque* *aut* *septem* *suballida* *à* *terra*,  
*superius* *in* *floribus* *canis* *&* *flori. hinc* *semine*, *radice* *tenui*: *quidam* *eandem* *esse* *Bechion* *&* *alio* *nomine*  
*Chamaeleon* *perant*, *&c.* *Altera* *a* *quobusdam* *Salvia* *appellatur*, *similis* *verbasco*. *Sunt* *qui* *Plinum* *pos-*  
*terius* *non* *accipere* *alij* *Oriminum*, *alij* *Sphacelum*, *ut* *illigere* *existiment.*

I. *Tussilago* *vulgaris.*  
*Ungula* *canis* *ina*, *Bruii* *f. Trag.*  
*Ungula* *alpina* *&* *Leuca* *ultularia* *Germa-*  
*nica*, *Erico* *Cord.*  
*Tussilago*, *Match. Anguil. Fuch. Tur. Cord. in*  
*Dioscor. (& Farfarella)* *Lac. Gefn. hort. Lon.*  
*Dodon. Ad. Lobel. (& Farfara)* *Cæsalp. Cast.*  
*Lugd. (& Tiphium* *Theoph. quibusdam* *vul-*  
*garis*, *Cam.*  
 II. *Tussilago* *alpina* *rotundifolia* *glabra.*  
*Tussilago* *alpina* *2. Cl. pā. an* *Asarina* *Mar. Cl. h.*  
*Tussilago* *montana* *minima*, *Lob. qui* *hanc* *&*  
*sequentem* *sub* *uno* *titulo* *pinxit* *Lugd.*  
 III. *Tussilago* *alpina* *rotundifolia* *canescens.*  
*Tussilago*, *Gefn. frac.*  
*Tussilago* *alpina* *1. desc. 2. ico. Clus. pan.*  
*Tussilago* *alpina* *1. flore* *aperto*, *Clus. hist.*  
*Tussilago* *alpina* *1. flore* *candido*, *Eid.*  
*Tussilago* *altera* *alpina* *Clusij*, *Lugd.*  
 IV. *Tussilago* *alpina* *folio* *oblongo*: *in*  
*Phytopinace* *&* *Prod. descripta.*

## P E T A S I T E S.

**P** *etasites* *Dioscori*, l. 4. c. 101. *a* *forma* *folij*, *quod* *vernaculis*, *galeri* *modo* *amplum*. *Plin.* l. 24. c. 17.  
*Chamaeleon* *appellasse* *videatur* *sub* *verbo*: *Chamaeleon* *apud* *nos* *sarranum*, *sive* *larungium*  
*vocat*. *Natur* *secus* *fluvios* *folio* *populi*, *sed* *ampliore*: *At* *l. 26. c. 6. asserit*, *quodam* *putare* *Buchion*  
*alio* *nomine* *Chamaeleon* *dici.*

I. *Petasites* *major* *&* *vulgaris.*  
*Petasites* *(costi* *genus*, *Galerita)* *Trag. Fuch.*  
*Ang. Tur. Dod. Cord. hist. Gefn. hort. Lac. Ad*  
*Lob. Lib. (cui* *an* *Personata* *&* *Perfolata* *Plin-*  
*ius* *Cast. Lugd. Tab. Ger. Clus. hist.*  
*Petasites* *hore* *punicante*, *Thal. m. s. Cam.*  
*Tussilago* *major*, *Matth. Cast.*  
 II. *Petasites* *minor.*  
*Petasites* *flore* *albo*, *Cam. ep. Clus. hist. candi-*  
*do*, *Thal.*  
*Petasites* *odoratus*, *Lugd.*  
*Petasites* *fœmina* *&* *Leucanthemos*, *Cam.*

## C A C A L I A.

**C** *acalia* *quæ* *&* *asari* *Dioscori*, l. 4. c. 123. *folia* *profert* *candida* *&* *prægrandia*. *florem* *Brerri* *in* *monte*  
*perant* *in* *flore* *grana* *subna* *uneur*. *Et* *Plinio* *l. 25. c. 11. Cacalia* *sive* *Leonice*, *inter* *quosdam*  
*femen* *asari* *omni* *ut* *simile* *depen* *l. 26. c. 15. Cacalia*, *grana* *minora* *tribit* *et* *hinc* *omni* *grana* *&*  
*candida*, *et* *omni* *grana* *in* *monte* *trunt* *conferant*. *quia* *tamen* *infra* *flores* *in* *grana* *monte*,  
*Bb* *3* *in* *quod*

an quo semen quod non margaritæ simile, sed oblongum, later nudi de costa intelligenda sit, de qua non velimus assentiri Dalechampio, qui in florum umbilico, granum rotundum niveum, margaritæ simile pignere (cui recte Plinius comparavit) quod excusso flore nudum nitidumq; dependeat, scribit.

I. *Cacalia tomentosa*: in Phytop. & Prod. III. *Cacalia folijs cutaneis acutioribus* & *Cacalia*, Dalech. in Diosc. Ad. Lob.

II. *Cacalia folijs crassissimis hirsutis*. *Cacalia* 2. vel *Cacalia glabro folio*, Clus. h.

*Cacalia Ghini*, in desc. Pilati, Lugd. du Choul.

*Cacalia* 1 & vulg. incano folio, Clus. pan. & hist.

*Cacalia*, Ang. Cæf. Lugd.

IV. *Cacaliæ* congener planta, Cl. pan. & hist.

## LAPPA SIVE ARCIIUM.

**A**rcium sive *Perfonata* aut *Perfonata* (id est *Personata*, quasi *Larva*) folia habet cucurbitæ majora & minora, duriora, nigriora, & hirsuta, &c. Dioscoridi. l. 4. c. 107. *Personata* Græci *Arcium* vocant, folia habent majora, cucurbitium hirsutiora, nigriora & crassiora, &c. Plin. l. 25. c. 9. Genera duo Galeno & simp. primū & crassius simile, quod Diosc. l. 4. c. 106. *Ἀρκίου* & *Ἀρκίον* vocat & Plin. l. 27. c. 5. *Arction*: Alium folijs cucurbitæ quod Dioscoridi est *Ἀρκίου* & Plinij *Perfolata*, & etiam *Personata*, cui folio nullū sit latius, & grandis lappa fert. At vulgo alia est maior, quæ & *Arcium* & *Arctium* est Diosc. alia minor, quæ Diosc. l. 4. c. 138. *Ἐρδίου* (quæ vos capillos reddat) dicitur, & *Χοίρα* *Ἀρδίου*, quasi *strumarum* perniciēs: hinc quibusdā *Strumarum* nominantur.

I. *Lappa major*, *Arcium* Diosc.

*Lappa major*, Brunf. Trag. Tur. Cæf.

*Personata*, Lac. Lon. Ad. Lob. Lugd.

*Personata major*, Matth. Cast.

*Personata*, Fuch. Fracast.

*Bardana* sive *Lappa major*, Dod. desc.

*Arcium*, Ang. Dod. gal. Cord. in Diosc.

*Arction personata*, Thal.

II. *Lappa rosea*: in Prod. descripta.

III. *Lappa major montana*, capitulis tomentosis, sive *Arctium* Dioscoridi.

*Personata* seu *Lappa major altera*, Matth. Lug.

*Bardana* sive *Lappa major*, Dod. ico.

*Arction montanum*, an *Perfolata* Plinij Ad.

*Arcium* mont. & *Lappa minor* Galeni, Lob.

*Arctium*, Cæfalp.

IV. *Lappa montana altera lanuginosa*.

*Arcium* quorundam, Lugd.

V. *Arctium* ex cod. Cæf. Dod. Lugd. quæ?

VI. *Lappa minor*, *Xanthium* Dioscoridi.

*Lappa minor*, Brunf. Trag. Ericio Cæf.

*Xanthium*, Matth. Ang. Dod. ur: Fuch. Tur.

Cord. in Diosc. & hist. Gesn. hort. Lac. Lon.

Thal. Cæf. Cast. Tab. Lugd.

*Xanthium* sive *Strumarum*, Ad. Lob.

*Bardana minor*, Ger.

# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER SEXTVS.

## SECTIO PRIMÆ.

VIOLA; LEUCOIUM; HESPERIS; LYCHNIS  
ET SAPONARIA.

## VIOLA MARTIA.

**V**iola, l. 4. c. 122. alij, l. 4. c. 122. *Viola purpurea*, a florum colore. Theophr. l. 1. hist. 15. l. 1. hist. 21. l. 4. c. 122. *Viola*, negram violam, a florum colore nigricantem purpurea, vocat. Plin. l. 21. c. 6. Ex *Viola* quæ sponte apertis & maris locis proveniunt purpurea, latiore folio statim ab radice carnosio ex euni folijs Græci connoīe & cæteri discernuntur, appellata *Jas*, ut ab hujus *Janthina* vestu. l. 4. Græci vocatum in Geoponicis Nicander credidit, Hermolaoreferente, quod *Nympha* quedam *Jonia*, florenti eum *Jovi* primum muneri dedissent. Alj volunt dici, quod cum *Jupiter* puellam *Joadamatam* in vaccam convertisset, terra florenti hujus pabulo ejus produxerit, qui propter ipsam salutem, ab ipsa nomen accepertis. Hinc Latini *Viola*, quasi vitu.

Genera

Violæ, hæc sunt quæ præcipue lutes, albe, foliæ & purpureæ præcipue, quatinus multum genus apud Dioscoridum, & Galienum.

*Viola Martia rotundifolia.*

I. Viola Martia purpurea flore simplici odoro.

Viola canina, Brunf.

Viola Martia odorata nigra foliis in pures. Trag.

Viola Martia. Fuch. Mart. Luc. Ad. Cæs. C. R. I. ug.

Viola nigra, Dod. Canina. Di. Sc. Ger. Clus. hist.

Viola lutea, & Viola nigra Gef. hort.

Viola Martia purpur. Tab. præcox purpur. Lob.

Flos communis collis in cæruleo subnigro.

Quantum ad cultum, quæ cultura grandior sit, quan-

do, & ubi, & quando. Cælia hæc æmilia quæ

Viola Martia foliis purpureis, Eyst.

II. Viola Martia inodora sive cæcis.

Viola sylv. Brunf. Ang. inodora, Dod.

Viola purpurea sylv. & canina, Trag.

Viola nigra foliis fœcibus, Gef. hort.

Viola canina, I. n. Tab. sylv. Ger. desc.

Viola cæcis cæcis inodora sylv. ferotina, Lob. ic.

Viola Martia sylv. Thal. Martia canina, Eyst.

Flos æruleus, aliquando pallidus: duplex

est, altera major folijs majoribus & rotundiori-

bus, altera minor, folijs mucronatis oblongis

& striatioribus & Gesnerius in monte fracto

montana, & rancq. æ folium folijs minoribus

& solidioribus a vulgaris differat: est &

Viola Martia flore rubro purpurascente, Eyst.

III. Viola Martia alba.

Viola alb. Brunf. candida: Dod. Cæs. fl. albo, Ger.

Viola Martia candida, Trag. alba, Tab. Eyst.

Viola sylv. albo flore. Gef. hort.

Viola Martia alba hort. & camp. odora, Lob. ic.

Hæc quando odore, aliquando nullo aut

langido odore, & hæc, & illæ, & gracilioribus

IV. Viola Martia in lupuli flore.

Viola nigra flore pleno, Dod. g.

Viola dyspædion, dysphyll. malum, Ger. hor.

Viola Martia purpurea Lob. ic.

Viola purp. & alba multiplex, Tab. Ger. Eyst.

Viola flore multiplex, Dod. fl. pleno, Cæs. Cam.

Viola cærulea folijs numerosis folijs constantib. Cæs.

Varia floribus colore purpureo, rubello, candi-

do, & purpureo & albo variis, hinc

Viola Martia alba flore multo alba albo: flos al-

bis, & cæcis purpureo cæcis, ut Viola variegata

dicta palliat, Eyst. est & bitoria Viola species By-

zantina, Thour. Martia similis, folijs cæcis

folijs cæcis, & Rosam Damascenam æ-

quantem, in folijs similitudine, sed & colore

collas superante Costensis in Mesuic, & Cam.

V. Viola alpina folio in plures partes dissecto.

an Viola montana laciniato folio, Clus. hist.

VI. Viola alpina purpurea exiguis folijs.

Viola montana 2. Clus. an. & hist. (Lun.

an Viola Martia folio minus & solidiore, Gef. de

VII. Viola alpina rotundifolia lutea.

Viola luteola minore flore. Gef. hort.

Viola montana 2. luteis, Lob. obs.

Viola montana. 1. Clus. pan. & hist.

Viola lutea, Lob. ic. Cæs. Cæs.

Viola Martia lutea inodora alpina, Cam.

Gramen Parnassii aliud, Lugd.

*Viola Martia folio oblongo.*

I. Viola montana pumila angustifolia flore

niveo inodoro.

Viola montana pumila, Clus. cur. post.

II. Viola Martia arborecens purpurea.

Viola arborec. Mart. Cæs. Tab. vel potius recta,

Viola fruticosa, Gef. hort. (Cam.

Mater Violarum, D. Koch. Lugd.

Viola elatior, Clus. hist.

Viola erecta flore cæruleo, &

Viola erecta flore albo, Eyst.

Flore est ex cæruleo purpurascente, vel ex

cyaneo albescenre.

III. Viola tricolor erecta, an Jovis flos Theo-

phrast 6. hist. 6.

Viola assurgens tricolor, Dod. Ger.

Viola purpureæ varietas, Ad.

Viola Martia striculis cauliculis, Lob.

IV. Viola montana tricolor odoreatissima

Viola montana 3. sive tricolor, Clus. pan. & hist.

Viola flamm. major violaceo colore mixta, Eyst.

V. Viola tricolor hort. repens, an  $\rho\lambda\omega\gamma\phi\lambda\alpha$

1000. Theoph. 6. hist. 6.

Herba Trinitatis, Brunf. Fuc. I. on. sciva, Trag.

Jacea sive flos Trinitatis, Matth.

Jacea major sive Viola tricolor, Cæs.

Viola flammea, Dougl. Gal. Cæs.

Viola nigra perfoliata, flos Trinit. vel hepta-

chrum, Gef. hort.

Viola tricolor, Dod. Clus. Ger.

Viola flammea, coloris, calida, Ad. Lo.

Viola flammea sive tricolor major, Lugd.

Viola Trinitatis 1. Tab.

Flos colore & magnitudine variat. est flos

purpureo & cæruleo: albo & luteo: cum ill-

do cæ-

docæruleo, purpureus & luteus etiam permiscetur: quandoque lituris quibusdam notatur: rarò flore penitus albo reperitur, quæ est Viola trinitatis 2. Tab.

Datur quæ duplo majore flore est coloris unius, nigræ purpuræ, & instar holoserici nitente, vel pallido, hinc

Flos trinitatis major violaceus, & Flos trinitatis pallidus major, Eyst.

VI. Viola bicolor arvensis.

Herba Trinitatis sylv. Trag.

Jacea altera, Matth.

Jacea minor, Cast.

Viola nigræ similis arvensis minor, Gef. hor.

Viola sylvestris, Lob. ico.

Viola flammea minor, Lugd.

Viola trinitatis minor petræa, Tab.

Viola tricolor petræa, Ger.

Hætenus trium colorum non observamus, sed candido & luteo, cæruleo & luteo, cæruleo & candido: aliquando ramen vel totus luteus, vel totus albus occurrit: Alia est valde parva, Augusto florens.

VII. Viola montana lutea grandifolia, & Camer.

Viola nigræ perfoliatis mont. lutea, Gef. hor.

Viola mont. 3. aliud genus, Clus. pan. & hist.

Viola flammea lutea, Lugd.

Viola Martia arborecens lutea, Tab.

Viola flammea major pallido colore mixta, Eyst.

Flore est luteo, sed magna ex parte lineis purpureis intermixtis: aliquando sine lituris: rarior flore albo reperitur.

VIII. Viola montana lutea folijs non crenatis.

Viola sylv. longifolia, Tab.

Viola maritima lutea, Ger. desc.

## LEUCOIUM NON BULBOSUM.

**A** Boniv. Dioscoridi l. 3. c. 138. id est, Viola alba, non ratione florum, sed potius à canitie cinericeove olivorum colore: quamvis differentiam in floribus ostendat, siquidem aut cærulei, aut albi, aut purpurei, aut lutei reperiuntur. Plin. l. 21. c. 6. Viola lutea & alba agnoscit.

Leucoium incano folio hortense.

I. Leucoium incanum majus.

Viola candida, Trag.

Leucoium album, Matt. Lob. ob. Lug. Tab. Ger.

Leucoion, Dod. gal. Gef. hor. Ad.

Viola matronalis alba, Fuch. Tur.

Viola domestica, Ang.

Leucoium candidum majus, Dod.

Viola alba, Lob. ico.

Viola alba, quæ & matronalis, Cæf.

Leucoium album hortense fruticosum, Cam.

Leucoium flore albo simplici, Eyst.

Flore est albo, vel cinericeo.

II Leucoium purpureum vel rubrum.

Viola purpurea, Trag. Lob.

Viola matronalis purpurea, Fuch. Tur.

Leucoium purpureum, Mat. Dod. gal. Lug. Tab.

Leucoium rubrum & purpureum, Cam.

Viola matronalis floribus rubentibus, aut ad purpuram inclinantibus, Cæf.

Leucoium flore rubro simplici, Bry. Eyst.

Flore est rubente, ex purpura puniceo, violaceo, ex cæruleo purpureo, in summa ob colorem dilutiorem & saturatiorem differentie aliquot sunt: hinc

Viola matronalis purpurea, alia punicea, Fuch. Tur. Lugd.

Leucoium purpureum, & aliud violaceum Tab.

At cærulei coloris in hoc genere hætenus non vidimus, licet Dioscorides author sit, nisi forte id verbum superfluum fuerit.

III. Leucoium incanum minus.

Viola alifolia & minor, Trag.

Leucoium candidum minus & annuum, Dod.

Floribus est candidis, rubentibus, puniceantibus, à prioribus magnitudine differentibus, & quod hoc annuum sit.

IV. Leucoium incanum majus multiplex.

Leucoion duplis floribus, Ad.

Leucoium sive Viola purpurea, fl. pleno, Lob. ic.

Leucoium multiplici flore, Dod.

Flos est vel saturatioris, vel dilutioris purpuræ, vel purpureo violacei, vel albi. hinc

1. Leucoium flore rubro pleno, Eyst.

2. Leucoium flore purpureo pleno, Eyst.

3. Leucoium sive Keyri purpureo violaceo pleno flore, Svvert.

4. Leucoium flore albo pleno, Bry. Eyst.

V. Leucoium incanum majus variegatum simplici flore.

Hoc varium est & permixtum maculis albo rubris, vel purpureis, aut quasi strijs inæqualibus notatum: hinc

1. Leucoi. varieg. alb. rubris maculis, Bry. Eyst.

2. Leucoi.



2. Leucoium varieg. purpureis maculis, Eyst.  
VI. Leucoium incanum majus variegatum  
pleno flore.

Leucoium sive Keyri viola purp. variegata, Svver.  
Et hoc varium est:

1. Leucoium purpureum variegatum sanguineis maculis signatum, Bry.

Leucoium purpureum variegat. flore pleno, Eyst.

2. Leucoium five Keyri violaceo purpureum pleno flore, lineis viridibus distinctum, Svver.

3. Leucoium pleno flore album, sanguineis maculis signatum, Eyst.

4. Leucoium pleno flore album purpureis maculis signatum, Eyst.

VII. Leucoium livide rubente colore.

Leucoium melancholico colore, Eyst.

*Leucoium incanum maritimum.*

I. Leucoium maritimum latifolium.

Tripolium, Ang.

Leucoium marinum alterum latifol. Lob. Lug.

Leucoium marinum caeruleo purpureum, Tab.

Leucoium marinum latifolium, Ger. marinum aliud, Cam.

an Leucoium maritim. minus, Hesperis quotundam, Lugd.

II. Leucoium maritimum sinuato folio.

Leucoium marinum purpureum, Gef. hort. Ger.

Leucoium maritimum majus, Ad. Lob. ic. Clus. hisp. & hist. desc. Lugd. Cam.

Leucoium marinum majus purpureum, Tab.

Flos dilutioris purpuræ, ad vini rubri faciem tendente.

III. Leucoium maritimum angustifolium.

Leucoium marinum minus, Clus. hisp. & hist.

Ad. Cam. Tab. Ger.

Leucoium angustifolium, L. ob.

Leucoium sylv. angustifolium, Dod.

Flores sunt dilute purpureæ, quandoq; rubri: & luteos reperiri Lob. & Tab. scribunt: hinc

Leucoium marinum minus luteum, Tab.

Leucoium marinum minus, Ger.

IV. Leucoium maritimum repens.

Viola marina repens, Eyst. ico.

An ex semine prioris in horto natum: cum in hortis satum longioribus quidem sit cauliculis, sed in terram reflexis, folio latiore, flore purpureo, totaque æstate floreat.

V. Leucoium maritimum candidum.

Keyri marinum flore candido, Lob. ico.

Leucoium marinum majus, Clus. hist. ico.

VI. Leucoium maritimum minimum, quod 6. est in Prodr.

VII. Leucoium saxatile thymi folio hirsutum caeruleo-purpureum.

Lithoreoleucoion minimum supinum, Col.

*Leucoium Creticum.*

I. Leucoium Creticum thlaspi folium.

Leucoium marinum Creticum 1. Clus. hist.

Flos rubet mox ex caeruleo purpureo.

II. Leucoium Cretic. folijs oblongis crenatis.

Leucoium marinum Creticum 3. Clus. hist.

III. Leucoium Creticum floribus minoribus.

Leucoium marinum Creticum 2. Clus. hist.

In hoc flores prioris dimidio minores, pro-sus albi, paulatim purpureum contrahentes.

IV. Leucoium Creticum spinosum incanum luteum.

Leucoium Creticum spinosum, Clus. hist.

Glastivida Cretensem, Belli, ep. 3. & 4. ad Clus.

Clus. hist. ap. alt. ad.

Glastivida prima Cretica, Ponæ.

V. Leucoium Creticum minimum folio sub-rotundo.

an Leucoium Creticum, Ponæ Ital.

Hæc quinto loco in Prodr. describitur.

*Leucoium luteum folio hirsuto.*

I. Leucoium alyssoides clypeatum majus.

Lunaria aspera, Gef.

Alysson Dioecoridis, Dod. Cam. Lugd. cui &

Alysson Dalechampi fig. duplici.

Alysson Dioec. putatum, Lob.

Alysson, Gef. hort. & Lunariæ Græcæ similis.

Lunaria Græca tertia, Cæs.

Leucoium montanum lunatum, Col.

Minoris & congeneris plantæ Columna me-minit:

II. Leucoium alyssoides clypeatum minus.

Leucoium peltatum Romanum minus, Col.

III. Leucoium incanum siliquis rotundis.

Eruca peregrina, Clus. hisp. & hist. Lugd.

Leucoium marinum Patavinum, Lob.

Leucoium marinum luteum majus, Tab. Ger.

IV. Leucoium luteum erucæ folio.

Leucoium terrestre majus, Col.

V. Leucoium luteum sylv. hieracifolium,

quod 3. in Prodromo.

Leucoij lutei sylv. species, Thal.

Leucoium sylv. inodor. fl. parvo pallidiore Eyst.

VI. Leucoium luteum montan. ferrato folio.

Leucoium luteum montanum, Ponæ Ital.

*Leucoium folio viridi.*

I. *Leucoium album odoratissimum folio viridi: quarto loco in Prod. descriptum.*

*Leucoium rarius flore albo odorato, Cam.*

*Leucoium fruticosum fol. viridi, flore albo odorato Camerarij, Eyst.*

II. *Leucoium luteum maxim. folijs tuberculis obfiscis.*

*Flos Cheyri Eystettensis maximus, Eyst.*

*Flores amplitudine thalerum Philippicum superant.*

III. *Leucoium luteum magno flore 1. loco in Prodr. desc.*

*Flos Cheyri simplex medius, Eyst.*

IV. *Leucoium luteum serrato folio fl. grandiore: 2. in Prodr.*

V. *Leucoium luteum vulgare.*

*Leucoium Brunf. Cord. in Diosc. Lac.*

*Viola lutea, Trag. Fuch. Dod. gal. Cæs. Ger.*

*Viola petraea lutea, Tab.*

*Leucoium aureum, Matth. Lugd.*

*Leucoium luteum, Fuch. ico. Dod. Ad. Lob. Camer. stor. Camer.*

*Leucoium sativum luteum, Clus.*

*Keiri vel Cheiri, Ges. hor. Lon.*

*Flos Cheiri simplex minor, Eyst.*

*Quibusdam Theophr. quod torus flos flammei, id est, lutei coloris sit: luteum enim colore in flammam dici, ex Plin. lib. 22. cap. 2. colligunt.*

VI. *Leucoium luteum pleno flore majus.*

*Viola lutea multiplex, Lugd. Ger.*

*Leucoium flore luteo pleno majus, Eyst.*

VII. *Leucoium pleno flore minus.*

*Leucoium sive Keiri duplici flore, Ad. 3. ob. ick.*

*Leucoium luteum flore multiplici, Dod.*

*Viola petraea lutea multiplex, Tab.*

*Leucoium flore luteo pleno minus, Bry. Eyst.*

VIII. *Leucoium luteum sylv. angustifolium.*

*Viola lutea sylv. Trag.*

*Leucoium sylv. minus, Ges. hort.*

*Leucoium sylv. Clus. pan. & histor. Cam. Tab. Ger.*

*Leucoium sylv. flore luteo, Bry.*

IV. *Leucoium palustre flore subcaeruleo. Gladiolus palustris, Clus. cur. post.*

## VIOLA MATRONALIS SEU HESPERIS.

**V**iola Matronalis, quod à Matrona in hortu colatur dicta, apud Plinium l. 21. c. 7. Hesperis censetur. cum hac Viola noctu magis oleat, quod sua Plinius tribuit, addens, inde nomen invenisse.

I. *Hesperis hortensis.*

*Viola alba, persica Hermolai, Trag.*

*Leucoium & Viola purpurea, Fuch.*

*Leucoium Diosc. album, purpureum, Fuch. ico.*

*Viola alba, Tur.*

*Viola matronalis, Ges. hor. Dod.*

*Viola purpurea & alba, Lugd.*

*Viola matronalis sive Damascena, Ad. Lob.*

*Viola sylv. alba & purpurea, Cæs.*

*Hesperis 3. Clus. hist. ico. nostra, Cam.*

*Viola Damascena flore purpureo, Svvert.*

*Variat colore floris, candido, dilute purpureo, rubro: habetur & tota minor floribus albis & snavissimi odoris: hinc*

1. *Viola hyemalis flore purpureo, Tab. Ger.*

*Viola matronalis flore purpureo, Eyst.*

2. *Viola hyemalis alba, Tab. Ger.*

*Viola matronalis flore albo, Eyst.*

II. *Hesperis hort. flore viridi: hæc magnitudine, quoad omnes sui partes, à vulgata differt, flore est viridi & inodoro.*

III. *Hesperis montana pallida odoratissima.*

*Hesperis prima & montana, Clus. pan. & hist.*

*Viola sylv. species, Cæs.*

*Hesperis pannonica, Cam.*

*Variat ex semine nata, nonnulli flores matrem colorem retinent, alij aut dilutius pallescunt, aut magis obsoletum acquirunt, crebris venis ex atro purpurascensibus discurrentibus.*

IV. *Hesperis sylv. inodora.*

*Hesperis 2. vel altera pannonica, Clus. pah.*

*Hesperis tertia, Eid. hist. desc.*

V. *Hesperis sylv. flore parvo: 1. in Prodr.*

VI. *Hesperis peregrina filiquis articulatis.*

*Hesperis Syriaca, Cam. Clus. hist.*

*Leucoium Syriacum, Cam.*

*Leucoium melancholicum quibusdam.*

*Hesperis Syriaca Rauvolfij, ab hac non videtur aliter differre, quam quod strigosior sit, quod forte loci ratione contingit.*

VII. *Hesperis filiqua corniculata fl. obsoleto.*

*Leucoium corniculatum saxatile, Col.*

VIII. *Hesperis villosa flore obsoleto filiqua brevi.*

IX. *Hesperis sylvestris hirsuta folijs Hieracij: 2. in Prodr.*

**V**iola ratione florum, Lunaria verò à siliquarum forma dicitur, quæ lata, plana & propemodum rotunda sunt, & Lunam non falcatam, sed prope completam referunt: vel à siliquarum plenitudine, quæ per siccitatem videntur.

I. Viola Lunaria major siliqua rotunda.  
Viola latifolia, Dod. Clus. pan. Lugd.  
Bulbosa folliata, Officinarum Bolbonac, Ad.  
Lunaria Græca, Lon. Cæs. Lob. Cast. rotunda,  
Lunaria major, Cam. (Gef. h.  
Bulbonach (à radicibus bulbosis) Gefn. hort.  
Viola lunaris 1. Tab. Ger.  
Thlaspi montanum, Gefn. hort.  
Lunaria Græca annua, Eyst.  
Thlaspi alterum Cratæ quibusdam.

Vario florum colore & odore: colore purpureo, subcæruleo: odore, uni flores odorati, alteri inodori sunt.

II. Viola Lunaria major altera: & Cam.  
Viola latifolia altera, Dod. Lugd.

Præcedente minor & flore albo est.

III. Viola Lunaria major siliqua oblonga.  
Lunaria Græca siliquis longis, Gef. hor. Thal.  
Lunaria Græca siliquis oblongioribus, Thal.  
Lunaria odorata, alijs Lunaria Græca major, Gefn. hort.  
Lunaria Raphanitis, sive Bolbonac, radice rediviva, Lob. ico.  
Lunaria Græca altera, Cæs.  
Viola latifolia, Clus. hist.  
Viola lunaris 2. Tab. longioribus siliquis, Gef.  
Lunaria Græca perennis, Eyst.  
Flores ex albo subcærulei siliquæ longiores, laminosæ, ita ut aliquando tres membranulæ separatæ suis seminibus annexæ divelli possint.

# LYCHNIDES.

**L**yxris, id est, Lucernula. Dioscoridi, l. 3. c. 114. & 115. duas species, altera *lyxris trigynaparin*, Lychnis coronaria: altera *lyxris ægla*, Lychnis sylvestris dicitur. Primam, Lychnidem coronariam à recentioribus nominatam, videtur Theoph. 6. hist. 7. Lychnidem vocasse: & Plinij, l. 21. c. 4. Lychnis & Rosa Græca censetur: cujus Lychnis agria, Antirrhinum est. Recentiores, Lychnidu nomen plurimu imposuere, de quibus ordinetur.

Lychnis flore coccineo.

I. Lychnis hirsuta flore coccineo major.  
Ocymoides peregr. Gefn. hort. vel flos Hierosolymitanus, alijs Creticus: vel Croceus, Eid. ap.  
Flos Constantinopolitanus, Dod. Lugd. miniatus, Eyst.  
Lychnis Chalcedonica sive Constantinopolitana miniata, Ad. Lob.  
Lychnis fortè aliquorum coccineo colore splendens, Cæs.  
an Flos Scarlati, Lon.  
Lychnis Chalcedonica, Tab. Ger.  
Lychnis Constantinopolitana, Cast. ap. Cam.  
Lychnis byzantina minuto flore, Clus. hist.

Colore variat, cum communiter coccineo colore splendet: vel croceo est floris Calendulæ colore, vel lilij purpurei, subinde candidi: etiam incarnatus: hinc  
Flos Constantinopolitanus albus, &  
Flos Constantinopolitanus incarnatus, Eyst.  
Aliquando variegato: rarius flore pleno. Alia est flore ex puniceo purpurascens, folijs lævibus ac mollibus: est & miniato, quæ  
Lychn. Chalcedonica colore orengiaca, Svvert.  
Flos Constantinopolitanus miniatus, Eyst.

Hæc quibusdam veterum est *lyxris*: alijs *palj* Theoph. 6. hist. 6. Alijs *nifæ* apud Theoph. 6. hist. ult. cujus duo genera: unum cui flos hyacintho similis: alterum decolor, album. Idem & Plin. lib. 21. cap. 6. habet: sunt etiam qui Rosam Græcam Plinij velint.

II. Lychnis flore coccineo minor.  
Ocymoidis peregrini species minor, Gefn. hort.  
Flos Constantinopolitanus minor, Dod.  
Flos coccineus, Lugd.

Lychnis coronaria.

I. Lychnis coronaria Diosc. fativa.  
Rosa mariana fativa, Trag.  
Lychnis, Matth. Lac. Cam.  
Verbascum montanum, Cord. in Diosc.  
Lychnis fativa, vel coronaria, Dod. gal. Gefn.  
Lychn. coronaria, Lon. Ad. Lob. Dod. Cæs. Lug.  
Flamma vel Flammula Jovis, Gefn. hort.  
Jovis flos Theoph. Eidem.

Flos colore variat: est rubro veluti flammeo fulgens, est dilute rubente: habetur & albo: item floribus albis, lineis vel punctis rubris variegatis: & incarnatis punctatis: hinc

1. Lychnis candida, Lob. ico.  
Lychnis coronaria alba, Tab. Ger.

*Lychnis coronaria fl. albo simplici*, Eyst.

2. *Lychnis coronaria rubra*, Tab. Ger.

*Lychnis coronaria flore rubro simplici*, Eyst.

*Lychnis rubra*, Lob. ico.

3. *Lychnis coronaria flore incarnato punctato*, Eyst.

4. *Lychnis coronaria flore incarnato non punctato*, Eyst.

II. *Lychnis coronaria sativa multiplex*.

*Lychn. altera rubra*, Lob. ico. flore pleno, Cam.

*Lychnis coronaria floris foliolis multiplicatis*, Dod.

*Lychnis flore rubro pleno*, Bry.

*Lychnis*, Svvert.

*Lychnis coronaria flore rubro pleno*, Eyst.

Solum eam quæ flore rubro est multiplicem notavimus.

III. *Lychnis coronaria sylvestris*.

*Lychnis sylvestris*, Matth.

*Lychnis coronaria ruri nata*, Ad.

*Lychnis sylv. urbana* similis, Cæst.

Jovis florem sylv. reperiri ait Matth. Ges. hort.

Hanc in Rhætiæ alpinis, flore hortensi odoratiore inveniri, Gesn. hort. meminit.

IV. *Lychnis sylvestris alba simplex*.

*Rosæ marianæ similis tertia*, Trag.

*Ocymastrum seu ocymoides*, Matth. Lac. Tab.

*Ocymoides*, Gesn. hort. (Cæst.)

*Ocymoides majus*, Cæf. Lugd.

*Lychnis sylv. alba*, Dod. gal. Cam.

*Lychnis sylv. altera*, Ad.

*Struthio similis* Walcentraut/ Lon.

*Basilicum sylvestre*, Cæst. ap.

V. *Lychnis alba multiplex*.

*Lychnis sylv. multiflora*, Ad.

*Lychnis multiflora Anglica*, Penæ, Lugd.

*Lychnis alba sylv.* Lob. ico.

*Ocymastrum multiflorum*, Ger. Tab.

*Lychnis flore albo*, Bry. & Svvert.

*Lychnis sylv. flore pleno albo*, Eyst.

VI. *Lychnis prolifera flore viridi*.

*Lychnis agrestis abortiva*, multiplici viridi flore, Lob. ico.

*Ocymastrum fl. pleno viridi*, Cam. ep. Matth.

VII. *Lychnis syl. sive aquatica purp. simplex*.

*Rosæ marianæ similis quarta*, Trag.

*Ocymoides purpureum*, Gesn. hort. rubrum, Thal.

*Ocymastrum rubrum*, Tab.

*Lychnis syl. purpurea*, Dod. Lugd. rubra, Cam.

*Lychnis sylv. rubello flore*, Ad. Lob.

*Melandryum Plinij genuinum*, Clus. hist.

*Lychnis sylvestris*, Eyst.

Mas in hoc genere, cui apices è medio flore prominent: femina cui nulli, idque in utroque colore: nam & mas albus purpureusque reperitur, & femina similiter, Gesn. hort.

VIII. *Lychnis purpurea multiplex*.

*Lychnis sylv. in hortis plantata flore pleno*, Dod. & Gesn. in Ocimoides.

*Lychnis agrestis multiflora*, Ad. Lob. ico.

*Ocymoides flore pleno*, Cam. ep. Matth. & hort.

*Lychnis flore rubro pleno*, Svvert.

*Lychnis sylv. flore pleno rubro*, Eyst.

*Lychnu segetum*.

I. *Lychnis segetum major*.

*Nigella*, Brunf. vulgaris, Lac.

*Githago Rosæ marianæ* 6. genus, Trag.

*Lolium*, Fuch.

*Lolium quibusdam flore parvæ rosæ*, Cord. in Diosc.

*Anthemion*, Dod. gal.

*Pseudomelanthium*, Matth. Lac. Lon. Ad. Lob.

*Cast. Lugd. Thal. Ger.*

*Nigellastrum*, Dod.

*Lychnis alia inter triticum*, Cæf.

*Lychnis arvensis*, Tab.

Flore est communiter rubescente, rarissime albo: hinc

*Pseudomelanthium flore rubescente*, &

*Pseudomelanthium flore albo*, Eyst.

Nec *Lolium*, nec *Melanthium* est: quibusdam *arvensis* Theoph. 7. hist. 9.

II. *Lychnis segetum minor*.

*Alfene corniculata*, Clus. hisp. & hist. Lob. Cæst. Lugd. Tab. Ger.

III. *Lychnis segetum rubra folijs perfoliata*.

*Polygonaton sive Lychnis*/ Trag. ico.

*Thamecnemon*, Cord. hist.

*Vaccaria*, Dod. Gesn. hort. Ger.

*Lychnis quibusdam, nonnullis perfoliata rubra*, Gesn. hort.

*Glastum*, Ang.

*Glasto similis inter segetes*, Cæf.

*Isatis sylv. Vaccaria dicta*, Ad. Lob. Lugd.

*Vaccaria rubra major & minor*, Lugd.

*Myagrurn*, *Vaccaria quorundam*, Tab.

*Conduardum Plinij quibusdam*, l. 16. c. 5.

Variat magnitudine: folijs item latioribus & angustioribus: floris colore rubro, pallido: hinc tres figuræ apud Lugdunenses.

*Lychnis*

*Lychnis sylvestris.*

I. *Lychnis* sylv. quæ Been album vulgo.  
*Lupinus* & *Smilax hortenſis*, Brunf. ico.  
*Polygonatum* & *Rosa mariana* ꝑ. Trag.  
*Polemonium*, Dod. gal. Lac. Caſt. Lugd. Thal.  
*Polemonia*, Cæſ.  
*Polemonium pratense noſtrum*, Gefn. hort.  
 Been album, Gefn. hort. Dod. Ger.  
*Lychnis* ſylv. Lon. Eyſt. ico.  
*Papaver ſpumæum* (propter aſperginem ſputo ſimilem) Ad. Lob. (cui & *Ocymaſtrum alterum*), Cam.  
*Herba articularis*, Tab.  
*Melandrium* Plinij quorundam, Cluſ. hiſt.

Duum generum: 1. in pratis albicante flore; 2. in montibus, flore ex viridi purpureſcente. Eſt etiam alia folijs latioribus, alia anguſtioribus & acutioribus.

II. *Lychnis* ſyl. latif. caliculis turgidis ſtriatis.  
*Lychnis* ſylv. 3. Cluſ. pan. at 2. in hiſt.  
*Lychnis* ſyl. 3. cauliculis ſtriatis, Lob. Lug. Tab.  
*Lychnis* cauliculis ſtriatis, Ger.

III. *Lychnis* ſylv. anguſtiſol. cauliculis turgidis ſtriatis.  
*Lychnis* ſylv. altera incana cauliculis ſtriatis, Lob. Lugd.

IV. *Lychnis* flore obſoleto autumnalis caliculis turgidis.

V. *Lychnis* fruteſcens myrtiſolia, Been albo ſimilis.

*Ocymoides frutiſoſum*, Cam.  
*Lychnis* ſylv. ſemper virens, ſive *Ocymoides rubroreum ſemper virens*, Cluſ. hiſt.

VI. *Lychnis* noctiflora.  
*Ocymoides noctiflorum*, Cam. quod noctu tantum florem odorum explicet per æſtatem: autumno verò inodorum.

*Ocymaſtrum noctiflorum*, flore albo, Eyſt.  
 VII. *Lychnis* ſyl. pluribus folijs ſimul junctis.  
*Lychnis* ſylv. prima, Cluſ. hiſp. Lobel. Lugd. Tab. Ger.

*Lychnis* ſylv. octava, Cluſ. hiſt.

VIII. *Lychnis* maritima repens.  
*Lychnis marina* Anglica, Ad. Lob. Lug. Tab. Ger.

*Lychnis viſcoſa.*

I. *Lychnis montana viſcoſa alba latifolia*.  
 Floris cuculi ſyl. genus, Trag.  
*Hoherſtein* recte id eſt, *Saxifraga elatior*, Lon.  
*Polemonium petrzæum*, Gefn.

*Lychnis* ſylv. 2. vel albo flore. 1. Cluſ. pan. at ſylv. 9. in hiſt.

*Lychnis* ſyl. Tab. flore albo, Eyſt.  
*Ocymoides minus ſive album*, Lugd.  
*ſine calice* album, Thal.

*Odontis* quorundam flore candido, Cam.

II. *Lychnis viſcoſa alba anguſtiſolia major*,  
*Caryophyllus minimus humilis alter exorticus*, flore candido amœno, Lob. ico.

*Lychnis* ſylv. 3. vel albo flore 2. Cluſ. pan. at ſylv. 10. in hiſt.

III. *Lychnis viſcoſa alba anguſtiſolia minor*.  
*Lychnidis* ſylv. tertiæ ſecunda ſpecies, Cluſ. pan. vel 10. alba ſpecies, Eid. hiſt.

IV. *Lychnis* ſyl. viſcoſa rubra anguſtiſolia.  
*Lychnis* ſylv. 1. vel flore rubro, Cluſ. pan. ſylv. 4. Eid. hiſt.

*Lychnis* ſylv. purpurea, Tab.  
*ſine calice* Hesperis quorundam, Thal.  
*Lychnis viſcoſa ſylv. flore incarnato*, Eyſt.

V. *Lychnis* ſylv. viſcoſa rubra altera.  
*Muſcipula*, Adv. Lobel. cui & *Silene* Theoph. Aldroandro.

*Lychnis* ſylv. 4. Cluſ. hiſp. Lugd. Tab.  
*Lychnis* ſylv. 3. Cluſ. hiſt.  
*Viſcaria*, Caſt.

*Viſcago major*, Cam.  
*Lychnis* ſylv. incana, Ger. ico.

VI. *Lychnis viſcoſa purpurea latifolia lævis*.  
 an *Flos Conſtantinopolitanus* alter minor, Gef.  
*Armerius flos* 3. Dod. 8. at in folio 4.

*Lychnis* ſylv. 2. Cluſ. hiſp. Lugd.  
*Lychnis* ſylv. 1. Cluſ. hiſt.  
*Muſcipula*, ſive *Armoria altera*, Lob. Lugd.

*Alſine purpurea*, Lugd.  
*Lychnidis* fortè antiquorum 3. genus, Cæſ.  
*Muſcipula*, Cam.

*Viſcaria fativa*, Tab.  
 Alijs Been rubrum: alijs *Centaureum minus purpureum viſcoſum*: rectè ad *Lychnidem* reſertur, cum Dioſc. lib. 3. cap. 9. *Centaureum* dicat flore *Lychnidis*.

Variat floris colore, communiter eſt purpureo, rarius albo reperitur: hinc

*Muſcipula flore rubro*, &  
*Muſcipula flore albo*, Eyſt. (aſperſa)

VII. *Lychnis viſcoſa folijs brevi lanugine*  
*Lychnis* ſyl. 1. ex ſemine nata, Cluſ. hiſt.

VIII. *Lychnis viſcoſa floribus foris purpureaſcentibus*, intus albis.

*Lychnis sylv. 2. ex femine nata, Clus. hist.*

IX. *Lychn. viscosa fol. lanuginosis, fl. carnis.*

*Lychnis sylv. 3. ex femine nata, Clus. hist.*

X. *Lychnis viscosa flore muscoso.* (Ad.

*Muscipula sive Viscaria altera flore muscoso,*

*Muscipula altera flore muscoso, Lob. Lugd.*

*Muscipula sive Armoria altera, Lob. ico.*

*Sesamoides magnum Salmanticum, Clus. hisp.*

*& hist. Tab. Cam. Ger.*

*Crucigila, Thal.*

*Viscago, Cæf. major, Cam.*

*Orites, Lychnidis sylv. genus, Tab.*

Eodem semine duæ nascuntur: 1. flore majusculo, quæ sterilis: 2. feminifera, minore flore.

XI. *Lychnidi præcedenti affinis folijs lini.*

*Sesamoides Salmanticum parvum, Eyst.*

an *Sesamoidis Salmantici secundum genus,*

quod Behen floris parvi appellatione accepit,

*Clus. hist.*

XII. *Lychnis plumaria Tab. quid? an Mus-*

*scipula flore musculo.*

XIII. *Lychnis auriculæ Urfsi facie: i. in Prod.*

*Lychnis sylv. latifolia, Clus. hist.*

*Lychni hirsuta.*

I. *Lychnis sylv. campanulæ flore.*

*Lychnis sylv. species Myconii, Lugd.*

II. *Lychnis sylv. lanuginosa major.*

*Lychnis sylv. 4. Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.*

*Lychnis sylv. hirta, Lob. Ger.*

III. *Lychnis hirta angustifolia Cretica.*

*Lychnis sylv. 7. Clus. hist.*

*Ocimoides minus flore rubro Candia i. Cl.*

*fabona.*

IV. *Lychnis sylv. lanuginosa minor.*

*Lychnis sylv. 6. Clus. hisp. & hist. Lugd.*

*Lychnis sylv. hirta minima, Lob. Ger.*

*Lychnis sylv. minima, Tab.*

V. *Lychnis sylv. minima exiguo flore: pro*

*2. in Prod. describitur.*

VI. *Lychnis incana repens.*

*Ocymoides Lychnitis, Col.*

*Lychni alpina.*

I. *Lychn. vel Ocimoides repens montanum.*

*Cneoron, Matth. cui & Cneoron album.*

*Cneoron aliud Theoph. Matth. Lugd.*

*Myuros Aëtij, Ang.*

*Ocimoides alpinum, Gesn. hort.*

*Ocimoides repens, Cam. polygoni folio, Adv.*

*Lob. Lugd.*

*Ocymoides alterum genus parvum, Cæf.*

*Saponaria minor, Dalech. Lugd.*

II. & III. *Ocimoidis angustifolij flore ru-*

*bello: & alterius flore suaverubente, ex monte*

*Arba meminit Cam. sed quid?*

IV. *Lychn. alpina pumila folio gramineo, sive*

*Muscus alpinus Lychnidis flore.*

*Muscus floridus, Gesn. epist. & Frasco.*

*Caryophyllus pumilio alpinus, vel 7. Clus. pan-*

*ar in hist. sylv. 9.*

*Ocimoides muscosus, Ponæ.*

*Flos colote variat, est carni sive rubri dilu-*

*rioris: reperitur & totus niveus.*

## SAPONARIA.

**S**aponaria dicta, quod Saponis vicem præbeat ad pannos purgandos: Quibusdam Struthium Diosc. l. 2. c. 193. qui vulgo natum scribit, quo suffiones purgandi lanis utantur. Plin. l. 19. c. 3. Radicula lavandu lanis succum habet, mirum quantum conferens candore mollitiq;: addit Struthian Græcos vocare, florere æstate, gratam aspectu: verum sine odore, spinosam, & caule lanuginoso: semen ei nullum esse (cui Columella versus repugnat: à Syriisq; venit quæ semine radix) radicem magnam, quæ concidatur ad dictum usum. Et l. 2. c. 11. ringentibus & Radicula vatos præparas, quam Struthium vocari diximus à Græcis. Hac Saponaria quædam conveniunt, nisi spinosam diceret. Nonnulli Urceolaris Plinij. l. 2. c. 16. Sunt qui Alisma Diosc. l. 3. c. 169. censent, cum multas Alismatis notas habeat.

I. *Saponaria major lævis.*

*Saponaria, Trag. Lac. Gesn. hort. Dod. Ad. Lob.*

*Cæf. Tab. Cam. Ger. Eyst.*

*Viola agrestis, Trag.*

*Struthium, Fuch. Lon. Thal. Lug. sativ. Fuch.*

*Saponaria major, Lugd.* (ico.

*Floris color communiter dilute purpureus,*

*aliquando ex roseo rubet: nonnunquam candi-*

*duus est: interdum pro floribus sunt copiosiores*

*ramuli foliacei, paucis floribus intermixtis.*

II. *Saponaria concava Anglica: in Prod. de*

*Gentiana concava, Ger.* (scripta.

III. *Saponaria frutescens oleæ folio.*

*Saponaria altera frutescens ex Sicilia, Cæf.*

an *Saponaria Apula, Claudino.*

IV. *Saponaria Lychnidis folio flosculis al-*

*bis, an Condif Arabum.*

*Struthion Diosc. sive Radicula & Lanaria vulgo*

*Neapoli, quia succo foliorum & radicū ad lanas*

*purgandas utuntur, Imperato, qui ad nos misit*



## SECTIO SECUNDA.

## DE CARYOPHYLLEIS FLORIBUS SIVE ARMERIIS.

**C**aryophyllum florem ab odore Caryophyllorum, recentiores nominarunt: Hunc alij Cantabricum Plinij L. 2. c. 8. que in Hispania à Cantabris Divi Augusti tempore reperta fuit, esse volunt. Alysi est Veronica sive Betonica altera, inter nobis Dioscoridum: nec forte ineptè. Alijs herba tunica: quibusdam Iphium Theoph. 6. hist. 2. & 7. ejusd. 12. sed malè. Quidam inter Saxifragias numerant, præsertim sylvestre genus, quam Gal. s. tuend. sanis. Sarxiphagon appellasse viderur: nam & sylvestru nostra calculeum frangit & educit, colore Galen. de Cestri seu Betonica in Gallia proveniente, restatur, Hermelao norante. Forè & Theoph. 6. hist. 1. & 6. pro Jovis florem, inter coronarios frutices minus folijs conditum, cujus flos sine odore tantum in coronatum usu, sylvestrem Caryophyllam intellexit. Armerij flores dicuntur, à Gallico nomine Armoires & Armoiries.

Genera summa duo sunt: Altilis & Sylvestru. Altilis species multe, magnitudine, colore & foliorum numero differentes: flores namq; sunt vel minores vel medi, vel majores, vel maximi: vel multiplici, vel simplici florum textura, majoribus vel minoribus foliis constantes. Sunt colore nivi, delati purpuræ candicantes, crocei rutilantes, mixti: aut versicolores, ut candidi & crocei, candidi & rubei, candidi rubri punctulū aspersi rubentes aut violaceo admixto purpurei, aut rubei lactei notis aspersi, sicq; varietati, aut rose sylvestri, colore. Sic ex uno caule duo florum genera, partim candidi, rubriq; maculæ aspersi, partim crocei: sæpe etiam uno pediculo, flores diversi colores videntur: aliquando unus ex alio medius excrecere consuevit: aliquando in una planta flores trium colorum: et in summa mangonio & arte in his floribus magna varietas fit. Sylvestrinum quoq; magna diversitas existit: et in magnitudine, & coloris, & florum, & calycis figura, pleriq; ramentis simplicis flore sunt.

## Caryophyllus pleno flore.

## I. Caryophyllus maximus ruber.

Caryophyll. maximus plenus flore rubro, Eyst.

## II. Caryophyllus maximus variegatus.

Caryophyll. major rub. & albicans flore pleno, Lob. ico.

Caryophyllus multiplex maximus, Tab. Ger.

Caryophylli, Cast. ap.

Caryoph. multiplex max. variegatus, Eyst.

## In hoc varietates:

1. Caryophyll. maxim. & plenissimus, colore mixto carneo, quibusdam cornicul. lacteis, Bry.

2. Caryophyllus maxim. & plenissim colore vario in diversis folijs, Scarlatino, dilutius rubente, albo, Bry.

3. Caryoph. max. & pleniss. colore rubro saturatiore, flaminulis tribus niveis in medio, Bry.

## III. Caryophyllus altilis major.

Caryophyllæa, Frag.

Betonica altilis, Fuch. Gesf. col. coronaria, Lac.

Veronica altilis, Dod. gal. coronaria, Gesf. hor.

Viola flammea Scaligero, Gesf. hor.

Cantabrica, Tur.

Caryophyllus domesticus, Matth. Cam. Cast.

Flos caryophyllorum, Lon.

Caryophylli nostrates, an Cantabrica Plin. Ad.

Caryophyll. Lob. multiplex, Lob. ico. Tab. Ger.

Caryophyllus altilis, Lugd.

Flos Gariochilus, alijs Viola Damascena, Cæs.

Caryophyllus flore majore, Eyst.

Caryophylli flores etiam in Senarum regione,

sed non ita odore grati, Garz.

Herba tunica quibusdam.

## Varietas multiplex.

1. Caryophyllus multiplex flore albo, etiam rubro & carneo, Eyst. & apud Svvert.

Caryophyllus torus albus.

Caryophyllus rubeus & sanguineus.

Caryophyllus incarnatus.

2. Caryophyllus pleno flore coloris albi, mixta & sparsa rubedine, Bry.

Caryoph. albus lineis & notulis rubris distinctus, Svvert.

3. Caryoph. alb. flammulis ruberrimis, Svve.

4. Caryophyll. albus lineis rubris subtilissimè distinctus, Svvert.

5. Caryoph. multiplex flore ex purpura rubescente, Eyst.

9. Caryophyll. flore majore partim carneo partim albus, rubris strijs ac punctulis variegatus, Eyst.

7. Caryoph. multiplex singulis florum folijs rubro & albo colore dimidiatim divisis & punctatis, Eyst. qui.

Caryo-

Caryoph. hortorum multiplex major, Lob. ico.

8. Caryoph. plenus colore umbilicotenus rubescens instar florum Persici mali, folijs latioribus, Eyst.

9. Caryoph. plenus purpurascens, punctatis folijs, Eyst.

10. Caryoph. purpureus punctulis intense purpurei coloris, Svver.

10. Caryophyllus subviridi flore, Svver.

IV. Caryophyllus altis medius.

1. Caryoph. albus lineis cremesini coloris, & Caryophyl. minor albus lineis purpuroviolaceis distinctus, Svver.

2. Caryoph. miniatus medio albescens, Eyst.

3. Caryoph. pleno flore colore violaceo, Bry.

V. Caryoph. pleno flore mali arantij colore.

Caryoph. pleno fl. Silesiacus miniatus, Cl. hist.

Caryoph. plenus miniato colore, Eyst.

Varietas.

1. Caryophyllus dimidia parte arantij colore, altera candida & permista, Bry.

2. Ex semine libenter provenit, sed alij flores nativum eumque saturatiorem aut dilutiorem retinent: alij albi, alij rubri sunt: nonnulli simplici quoque foliorum serie constant, Cl. hist.

VI. Caryophyllus pleno flore minor.

Caryoph. hortorum multiplex minor, Lob. ico.

Caryophyl. pleno flore species exigua, coloris carnei, Bry.

VII. Caryophyllus supinus flore pleno rubro argenteis micis aspersis.

Caryophyllus 7. pleno flore, Clus. hist.

Caryophyllus flore minore pleno rubescens punctus, Eyst.

VIII. Caryophyllus multiplex laciniatus.

Caryophyllus purpureus flore multiplici profunde laciniato, Lob. ico.

Varietas.

1. Caryophyl. multiplici laciniat. flore incarnato, Eystet.

2. Caryoph. purpureo flore multiplici profunde laciniato, Eyst.

3. Caryoph. purpureo flore multiplici laciniato, Eystet.

Caryoph. purpur. flore multiplici, Bry & Svver.

*Caryophyllus hortensis simplex.*

I. Caryophyllus hortensis simplex flore majore.

Caryoph. sylv. major vulgarior, Lob. ico.

Caryophylli flos simplex, Ded.

Caryophyllus simplici flore, Svver.

Varietas magna in colore: est enim simplex miniatus, est pallide purpurascens, vel incarnatus: est vericolor, ob guttarum & rubrarum macularum asperginem: est variegatus, cujus folia albescentia stigmatibus rubris aspersa sunt: duo posteriores in Eyst. proponuntur, nomine Caryophylli simplicis hortensis vericoloris, & Caryophylli majoris sylv. variegati.

II. Caryophyl. arborefcens Cret. 1. in Prod. descriptus.

III. Caryophyllus simp. fl. minore pallide rubente.

Caryophyllus sylv. 3. flore pallido suaverubente, Lob. ico.

Caryophyllus hortulanus, Tab.

Caryoph. syl. simplex suaverubens, Ger.

IV. Caryoph. simp. minor flore punctato.

Caryoph. alter minimus, flore simplici micis aureis asperfo, Lob. ico.

Habetur & repens flore parvo punctato.

V. Caryoph. simplex supinus latifolius.

Caryophyll. minimus pulchellus supinus, miculis aureis argenteisve aspersus, Lob. ico.

Caryophyllus sylv. 2. Clus. hist.

VI. Caryoph. simp. supinus angustifolius.

Caryophyllus virgineus, Tab. Ger.

*Caryophyllus barbatus & prelofer.*

I. Caryophyllus barbatus flore multiplici, Armeria alba & rubra multiplex, Lob. ico. Bry. Svver.

Armerius pleno flore, Clus. pan. & hist.

Caryophyllus Carthusianorum 3. Tab.

Armeria rubra latifolia, Ger.

Armerius pleno rubro flore, Eyst.

Duplex est: vulgarior rubro flore, rarior albo: Hujus præter rubrum & album adhuc differentia apud Svvertium, quæ

Armeria alba multiflora.

II. Caryophyllus barbatus flore roseo.

Armeria multis & separatim positis floribus duplicibus & magnis, coloreque ruberrimis, Svver.

III. Caryophyl. barbatus hortensis latifolius.

Lychnis monachorum, Gef. hort.

Armeria altera, multis in latum orbiculum congestis floribus, Lob. ico.

Viola barbata latifolia, Lugd.

Caryophyllus Carthusianorum 1. Tab.

Armeria suaverubens, Ger.

an *Lychnis* fortè antiquorum altera, Cæf.  
Flos *Scarleti*, Lon. Gef. ap.

Flore est communiter rubro, habetur albo  
maculis lactei coloris notato: est & diversico-  
lor, ex albo rubro & medio: hinc

1. *Armeria simplex* flore rubro, Bry, & Svver.  
Flos *armerius* ruber, Eyst.

2. *Armeria* flore albo, Bry, Svver.  
Flos *armerius* albus, Eyst.

3. Flos *armerius* variegatus, Eyst.  
IV. *Caryoph. barbatus* horren. angustifolius.

*Armeria* altera suaverubente flore, Lob. ico.  
Flore est odor & inodoro purpureo: (sanpli-  
ci & pleno: hinc

*Armerius* simplici flore pannonicus, Cluf. hist.  
*Caryophyllus* *Carchusianorum* 2. Tab.

*Armeria* rubra, Ger.

Hujus differentie quinque: 1. eleganti est flo-  
re, eoq; aut planè rubro, aut lactei candoris ma-  
culis asperso, aut niveo, oris carnei coloris: 2. om-  
nino niveo: 3. flores pauciores dilutius ruben-  
tes & carnei coloris: 4. flos purpureus, can-  
doris albis: 5. flores die primo & secundo quo a-  
perti sunt, lactei prorsus candoris, sequentibus  
paulatim albedine evanescente, tandem omni-  
no purpurei fiunt, sic ut in eadem umbella flores  
lacteos, alios exalbidos, & media ex parte pur-  
pureos, alios omnino purpureos conspi-  
cere liceat.

V. *Caryophyllus barbatus* sylvestris.  
*Armeria* sylv. altera, Lob. ico.

*Viola* barbata angustifolia, Lugd.

*Caryophyllæ* sylv. prima, Thal.

Flos *Garioflus* syl. minimi floris saturatæ pur-  
pureæ, Cæf.

VI. *Caryophyllus* sylv. prolifer: & Eyst.  
*Caryophyllæ* sylv. quarta, Thal.

*Armeria* prolifera, Lob. ico.

*Armerius* flos proliferus, Cam.

*Caryophyllus* sylv. minimus, Tab.

*Viscaria*, Ger. ico.

Huic ex capitulo, sæpè septem, octo, aliquan-  
do novem flores prorumpunt.

VII. *Caryophyllo* prolifero affinis, unico  
ex quolibet capitulo flore.

*Caryophyllæ* syl. quarta, alia species, Thal.  
*Caryophyllus sylvestris*.

I. *Caryophyllus* sylv. vulgaris latifolius.  
Dondernaegelin, Brunf.

*Caryophyllæ* sylv. Trag.

*Caryophyllæ* sylv. Matth. Lugd. Cast.

*Betonica* sylv. prima, Fuch.

*Veronica*, Dod. gal.

*Cantabrica* sylv. Tur.

*Tunica* sylv. Lon.

*Caryophyllæ* sylv. 3. Thal.

*Armerius* flos primus, Dod. Lugd.

*Armeria* sive *Caryophyllus* minor sylv. minor  
odorus folijs latioribus, Ad. Lob.

Flos *Garioflus* sylv. Cæf.

*Caryophyllus montanus* primus, Tab.

*Armeria* alba, Ger. ico.

*Caryoph. minor* sylv. flore simplici, Eyst.

Flore est odor & inodoro purpureo: (sanpli-  
ci & pleno: hinc

*Caryophyllus* minor sylv. flore pleno, Eyst.

*Caryophyllus* montanus multiflorus, Tab.

*Caryophyllus* montanus purpureus, Ger.  
II. *Caryophyllus* sylv. vulgaris angustifolius,

*Caryophyllus* montanus albus, Tab. Ger.

III. *Caryophyll. sylv. biflorus*: 3. in Prod.

IV. *Caryoph. pumilio* latifolius: 4. in Prod.

V. *Caryoph. syl. flore magno inodoro* hirsuto.

*Caryophyllus* sylv. 2. Cluf. pan. & hist.

VI. *Caryoph. sylv. humilis* flore unico.

*Armerius* flos tertius, Dod.

*Caryophyllus* repens humilis minimus vulga-  
rissimus rubellus, Lob. ico.

*Caryophylli* sylv. Cast. ico.

*Caryophyllus* sylv. 1. Cluf. pan. & hist.

Singuli cauliculi unicum florem, diluta pur-  
pura rubentem odorem sustinent.

VII. *Caryophyll. albus* parvus repens, Cam.

*Osteocallion* Ab. y. ti Italis, Eidem.

VIII. *Caryoph. cæruleus* Monspeliensium.

*Aphyllanthes* Monspeliensium, Ad. Lob. ico.

*Caryophyllus cæruleus* Tab. Ger.

Rarius flore niveo reperitur.

IX. *Caryophyll. sylv. repens* multiflorus:  
2. in Prodr.

X. *Caryophyllus* sylv. *Carinthiacus* ruber.

*Caryoph. syl. 4. vel Tauricus*, Cluf. pan. & hist.

XI. *Caryoph. alpinus* calyce oblongo hirsuto.

*Caryophyllæ* pumilio *Tauricus*, sive 8. Cluf.

pan. sylv. 7. Eid. hist.

*Caryophyllus* montanus tertius, Tab.

*Caryophyll. mont. Clusij*, Ger.

*Caryophyllus simplex* laciniatus.

I. *Caryophyllus* flore tenuissimè dissecto.

Superba, Trag. Lon. Thal. Cam.

*Diosanthos* *Theophrasti*, Ang.

Vetonica altitilis minor, Dod. gal.

Vetonica sylv. tertia, Gef. hort.

Betonica sylv. altera, Fuch.

Caryophyllatae genus, Gef. col.

Caryophyllæus minor, Dod.

Superba recentiorum, Ad.

Superba alba media corolla purpureo violacea,

Bry: obsoleta cincta, Lob. ico.

Armeria, Vetonica coronaria, Lugd.

Caryophylli sylv. 5. species 3. Clus. pan. & hist.

Caryophyllus plumarius albus, Tab. Ger.

Caryophyllus sylv. flore albo picto, Eyst.

Superba alba, corollâ purpureo rubrâ, Svver.

Flos nunc alb. nunc diluvius rubens & carne<sup>o</sup>.

II. Caryoph. syl. flore laciniato albo inodoro.

Superba major flore albo, Lob. ico. Svver.

Caryophyllus sylv. plumarius albus, Tab. Ger.

III. Caryop. syl. alter fl. laciniato odoratissimo.

Armerius flos quartus, Dod.

Caryophyllus minor alter, Eid.

Caryophyllus sextus, Clus. pan. & hist.

Superba Austriaca, Lob. ico.

Carioph. sylv. flore laciniato carneo, Eyst.

Caryoph. species altera flore carneo, Bry.

Carioph. sylv. flore purpurascens, & alter flore incarnato, Eyst.

Flos aut candidus, aut purpurascens, suavis odoris.

IV. Caryoph. syl. terrius flore laciniato, staminibus corniculatis odoratis.

Caryophyllus 5. vel sylv. 1. al. o. ore, Clus. pan. sylv. 5. Eid. hist. (odoro.)

V. Caryoph. syl. fl. laciniato, sine corniculis,

Caryophyllæus syl. 3. fl. rubro, Clus. pan. & hist.

Caryop. syl. fl. simplici, laciniato rubro, Lob. ico.

VI. Caryop. syl. floribus lanuginosis hirsutis.

Superba altera & suaveruens, Lob. ico.

Caryophylli syl. 5. species 4. Clus. pan. & hist.

Caryoph. plumarius purpureo cærul. Tab. Ger.

Caryophyllus sylv. flore albo, Eyst.

Flos candidus est: aliterius flores purpurascens lanugine hirsuti.

VII. Caryophyllus pratensis flore laciniato simplici, sive Flos cuculi.

Flos cuculi prat. Trag. Flos cuculi, Lon. Gef. col.

Vetonica ylv. Dod. gal.

(Tab.)

Odontitis Plinij, Gef. hor. quorundam, Cam.

Odontitis simplici flore, Clus. hist.

Armerius sylv. Dod.

Armeria prat. sylv. Lob. 2. sylv. Lugd.

Armoraria sylv. pratensis, Ad.

Cariophyllus pratensis, Tab.

Armeria pratensis mas & foemina, Ger.

1. foemina altera, Thal.

Flore est rubello, rarius albo.

VIII. Caryophyllus pratensis flore pleno.

Odontitis flore pleno, Cam. Clus. hist.

an Caryophyllus mont. multiflorus, Tab.

Odontitis Plinij, Eyst.

Caryophyllus holostius arvensis.

I. Caryophyllus arvensis hirsutus fl. majore.

Caryophyllus holostius, Lob. ico. Ger.

Holostium caryophyllæum, Tab.

II. Caryophyllus holostius tomentosus latifolius: qui 9. in Prodr.

III. Caryophyllus holostius tomentosus angustifol. hic 10. in Prodr.

IV. Caryop. arvensis umbellatus folio glabro.

Holostium caryophyllæum arvense, Tab.

Caryophyllus holostius arvensis, Ger.

Alsine verna Dalechampi, Lugd.

Caulis aliquando rubet, aliquando viret, ramulis aliquor editis, aliquot verò cum floribus reflexis: communiter flos albus, aliquando subpurpurascens.

V. Caryophyll. arvensis glaber flore majore.

Euphrasia gramen, Trag.

Crægonum forte, Dod. gal.

Gramen, Fuch. Lac. leucanthemon, Dod. Thal. Lugd. Ger.

Gramen alterum, Matth.

Holostium Dios. fl. albis vel *albis* Aeginet. Ad.

Holostium Ruellij, Lob.

Euphrasia major, Lon.

Gramen fleridum, Cam. in Matth. majus, Tab.

VI. Caryophyllus arvensis glaber fl. minore

Holostij Ruellij diversis, Lob. ico.

Gramen floridum minus, Thal. Tab.

Gramen leucanthemum alterum, Ger.

Quandoq; è medio florù staminula rubra exeunt.

VII. Caryophyllus arvensis glaber minimus: hic 11. est in Prodr.

Caryophyllus holostius alpinus.

I. Caryoph. holost. alpinus latifol. 5. in Prodr.

II. Caryophyll. holostius alpinus angustifolius purpurascens: 6. in Prodr.

III. Caryoph. holost. alpinus gramineus: 7. in Prodomo.

IV. Caryophyllus holostius montanus angustifolius alter: 8. in Prodr.

Caryo-

*Caryophyllum montanum.*

I. Caryophyll. mont. major flore globofo.  
 Gramen polyanthemum majus, Dod.  
 Gramen marinum majus, Clus. pan. Tab.  
 Caryophyllo marino similis, Ad.  
 Caryophyllus mont. Lob. mediterraneus, Ger.  
 Statice, à sistendo sanguine, Lugd. Cam. cui videtur Britannica, Ang.  
 Armerius mont. tenuifol. major, Clus. hist.

II. Caryophyllus montanus minor.  
 Pseudomoly, Dod. gal. Gefn. hort. Lugd.  
 Gramen polyanthemum minus, Dod.  
 Gramen marinum minus, Clus. pan. Tab.  
 Caryophyllus marinus minimus, Ad. Lob. Ger.  
 Armerius mont. tenuifol. minor, Clus. hist.  
 Hic caule est aliquando prolifero.

*Caryophyllus saxatilis.*

I. Caryophyllus saxatilis folijs gramineis, umbellatis corymbis.  
 Symphytum petraeum, sive Gypsophyton majus, Thalia.

II. Caryoph. saxatilis folijs gramineis minor, Symphytum petraeum sive Gypsophyton minus, Thalia.

III. Caryophyllus saxatilis siliquosus: qui Caryophyllus 14. in Prod.

Gypsophyti siliquosinomen à D. Filsero accepit.

IV. Caryophyllus saxifragus. (pinus. Saxifraga magna, Matth. Lob. Lugd. Cam.

Saxifraga 5. Cast.  
 an Saxifraga Bavarica, Cam. Ponnæ.

V. Caryophyllus saxifragus strigosior, vel Caryophyll. sylv. flore minimo. (icd.


Saxifraga sive Saxifraga antiquorum, Ad. Lob.

VI. Caryophyllus saxatilis Ericæfolius umbellatis corymbis: 12. in Prod.

VII. Caryophyllus saxatilis Ericæfolius ramosus repens: 13. in Prod.

VIII. Caryophyllus saxatilis floribus rubris: 15. altera species in Prod.

IX. Caryophyllus minimus muralis. Tunica minima, Lugd.



## S E C T I O T E R T I A.

ANTIRRHINUM; LINARIA; LINUM; POLYGA-  
 LA; ONOBRCHIS; GLAUX; STOECHAS;

LAVENDULA; ROSMARINUS.

## A N T I R R H I N U M.

**L** Ichnidem agriam Plin. l. 25. c. 10. ipsum Antirrhinum ex Galeno (cui λυχνίς ἄγρια & βοωνόριον vocavit, quia flore sit Leucog, minore tamen ut Diosc. l. 4. cap. 133. loquitur. Quare post Lychnides & Caryophyllaeos flores, Antirrhinum (cum & ipsum flore placeat) subungere volumus.

Antirrhinum à λυχνίς Dioscoridi, l. 4. c. 133. dictum, quod fructu sit vituli navium simili. Theophrasto 9. hist. 21. ἀντίρριον fructum tanquam nares vituli parit. Plinio loco citato Antirrhinum sive Anarrhinon, sive Lychnum agria. Sunt qui velint ab eodem, l. 30. c. 2. Cynocephalum herbam dici, id est, canis caput, quod semini conceptaculum canis calvam, cute & carne exutam representet. Veteres unius tantum meminisse videntur, at recentioribus plures sunt differentie.

I. Antirrhinum majus rotundiore folio. Cynocephalus Plinij, Lugd.

Antirrhinum majus flore roseo, Cam. hort.

II. Antirrhinum majus altero folio longiore.

Antirrhinum 2. Matth. Lugd. (Cam.

Antirrhinum magnum, Dod. gal. Lugd. majus,

Antirrhinum, Gefn. Dod. Ad. (vulgo caput canis & caput vituli) Lob. Tab. cui Antirrhinū &

Antirrhinum album: at Ger. purpureum & al-

Os leonis vulgo, Cæf. (bum.

Antirrhinum flore rubro & flore albo, Eysf.

Flore habetur roseo, rubente, aliquando maculato, ex candido dilute purpurascente: candido: an hoc, quod flore est albo, sit

Antirrhinum 4. Matth. Lugd.

Est & flore albo, oris tantum rubris, vel tamen rubris, & dicitur

Antirrhinum flore albo oris rubentibus, &

Antirrhinum flore albo oris rubris.

Antirrhinum flore albo oris luteis, Eysf.

Folij quoque variat latioribus & angustiori-

III. Antirrhinum luteo flore. (bus.

Antirrhinum flore luteo, Gefn. hort. Ad. Lob.

ico. subluteo, Dod. luteo grandi, Cam.

Antirrhinum luteum, Tab. Ger.

Hoc à priore & floris colore & folio variat:

quod verò flore est albo non item.

IV. Antirrhinum folio dissecto: hoc inter

Dd 2

plantas

plantas siccas Monspeliuli collectas apud fratrem Joh. Bauhinum p. m. vidimus.

V. Antirrhinum arvense majus.

Antirrhinum, Eric. Cord. (cui & Rhinoceros) Tur. Lac. Lon.

Antirrhinum 1. Matth. 4. Lugd. Cam. ep. Matth. Orontium, Dod. gal.

Antirrhinum Cynocephala & Bucranion, Cord. in Diosc.

Antirrhinum minus, Gesn. hort. (vel folijs hysopi. Eid. col.) Tab. Ger.

Antirrhinum. minimum, Ad. (foran Archigenis Orontium, vel Aurantium) Lob. medium, Cam.

Antirrhinum parvum, sive caput Simiæ, Lugd.

Antirrhinum sylv. (sive Phyteuma) Dod. Eyst. Phyteuma *xanion* Cydoniæ, Belli ep. 12. ad Clus.

Os leonis alterum, Cæs.

Antirrhinum rubrum arvense, Thal.

Hoc quibusdam Phyteuma Dioscoridis, l. 3. c. 130. alijs Orontium Archigenis, quasi Aurantium, quod auriginem morbum levet: quod aliquando procerius, aliquando brevius pro ratione soli reperitur.

VI. Antirrhinum arvense minus.

Antirrhinum 3. Matth. Lugd.

Antirrhinum arvense, Gesn. col.

Antirrhinum minimum, Thal. Cam.

Antirrhinum alterum minimum repens, Lob. icon.

Antirrhinum sylv. Cast.

Os leonis in vineis, Cæs.

VII. Antirrhinum saxatile, folijs serpylli: quod in Prodr. describitur.

## LINARIA EJUSQUE SPECIES.

**C**um Linaria quibusdam Antirrhini species videatur, & an Antirrhinum Plinij sit quidam dubitent, hic proponemus. Quibusdam Osyris censetur, ex qua, Galeni seculo, ut & nunc in Italia, scopæ consuebantur. Quævis folijs est lini initio nigri, dein rubescentibus, &c. Dioscoridi, l. 4. c. 143. & Plin. l. 27. c. 12. Osyris folijs est nigri seu lini, semine initio nigro, dein rubescente, &c. Linaria latius, quod folijs lini sit.

*Linaria erecta latifolia.*

I. Linaria latifolia Dalmatica magno flore: quæ 1. in Prodr.

II. Linaria Americana, parvæ flore luteo: quæ 2. in Prodr.

III. Linaria latifolia triphylla major: 3. in Prodr.

Linaria Cretica latifolia, Clus. hist.

IV. Linaria triphylla minor lutea.

Linaria Valentina, Clus. hisp. Dod. Lob.

Linaria Hispanica 1. Clus. hist.

V. Linaria triphylla cærulea.

Linaria cærulea Apula, Col.

VI. Linaria tenuifolia, æruginei coloris.

Linaria Hispanica 2. Clus. hist.

VII. Linaria bellidis folio.

Linaria odorata, Clus. hisp. & hist. Dod. Lugd.

Linaria purpurea, Ad. odorata, Lob. Ger.

Osyris odorata purpurea, Tab.

*Linaria erecta angustifolia.*

I. Linaria scoparia.

Belle videre, Gesn. hort.

Scoparia, Gesn. hort. Ad. Lob. Lugd. Ger.

Osyris, Ang. Dod. Cast. Cam.

Linaria magna, Lugd.

Herba studioforum, Tab.

Osyris græcorum quibusdam: alijs id negantibus, quamvis hodie in Græcia *ἀσφὸς* nominetur: alij an Chamæcyparissus Plinij sit dubitant.

II. Osyris frutescens baccifera. (ep.

Cassia poetica Monspeliensium, Ad. Lob. Cam. Cassia quorundam, Clus. hisp. & hist. Tab.

Cassia lignea, Cæs.

Cassia lignea maritima, Lugd. (Plin.

Polygonum 4. Plinij quibusdam, Dalech. in

Variat: communiter atrovirens, aliquando

tota rubet & ramis & folijs, ideo quidam

Genistam rubeam vocant, Cæs.

Osyris Plinij, lib. 27. cap. 12. videtur, quæ ut habet ramulos fert nigros, tenues, lentos, & in ijs folia nigra seu lini, semendq; in ramulis nigrum initio, dein colore mutato, rubescens: smegmata mulieribus faciunt ex his: Galenus 8. simpl. ex Osyride *νερίνη* fieri tradit, quæ alij interpretantur smegmata, ut Plinius, alij scopas, alij *νερίνη* & *καυκάριον*.

III. Linaria vulgaris lutea flore majore.

Linaria (& Pseudolin.) Brunk Ger. 1. Dod. Lon.

Linaria vulgaris, Trag. Cam. Eyst. vulgo, Gessn. hort. Cæs.

Osyris, Matth. Fuch. Dod. gal. Cord. in Diosc.

Tur. Lac. Ad. Lob. Lugd. Cast. major, Tab.

Floris



**Floris color luteus, luteopallidus, rarius albus:** flore minore etiam, in agris reperiri Tragus asserit.

**IV. Linaria lutea montana** Genistæ tinctoriæ folio: hæc ad montem S. Bernhardi, floribus aureis, mediæ magnitudinis, reperitur.

**V. Linaria lutea flore minimo:** hæc in agris Provinciæ Galliæ, brevibus & angustis folijs & minutissimis flosculis luteis, occurrit.

**VI. Linaria folioso capitulo luteo major.** Linaria 3. & Heliochryso, Trag. quarta, Lon. Linaria aurea Tragi, Lobel. Lugdun. Tab. Ger. Eyfett.

**Linaria Austriaca, Cam.** Osyris Austriaca, Clus. pan. & hist. Chrysocome Diof. & Plinij, Guil. Col. Linosyris nuporum, Lobel. recentiorum, Lugd.

**VII. Linaria folioso capitulo luteo minor.** Linaria aurea minor, Tab. Osyris purpureo cærulea, Ger. ico.

**VIII. Linaria flore pallido rictu aureo.** Linaria pannonica 1. Clus. pan. & hist. Tab. Linaria purpurea altera, Ger. ico. an Osyris alba, Lob. ico.

**IX. Linaria flore pallido rictu purpureo.** Linaria flore albicante inodoro, Cam. Linaria flore albicante, Eyf.

**X. Linaria purpurea major odorata.** Osyris altera, Dod. gal. Linaria altera purpurea, Dod. Linariæ purpureæ varietas, Lob. Linaria cærulea, Cast. Lugd. Cam. Linaria purpurea elatior, Eyf.

**Variæ flosculis purpureis, purpureo-lanceis albis & cæruleis:** folijs etiam magis minusve angustis.

**XI. Linaria capillaceo folio odora, quæ 4 in Prod.** Linaria caryophyllata, Cam.

**Flore est albicante:** ex cæruleo & albo mixtis, rictu linea flavescente distincto.

**XII. Linaria capillaceo folio altera.** Linaria tenuifolia, Lugd.

**Flos priusquam hiet, rubet; cum apertus est ex rubro albicat:** est & coloris varij ex albo, cæruleo & luteo mixtis.

**XIII. Linaria folijs angustis ex viridi canescentibus.**

**Linaria Hispanica 3. Clus. hist.**

**Flos utuncque odoratus & externè exalbidus, internè purpureus, rictu ex flavo albicante, labio purpureo.**

**XIV. Linaria arvensis cærulea: 5. in Prodromo.**

**Flore est cæruleo, est & violaceo.**

**XV. Linaria montana flosculis albicantibus.**

**Anonymos tenuifolia, Clus. pan. & hist.**

**Anthyllis montana, Lugd.**

**Linaria montana sive sylvestica, Thal.**

**Linaria adulterina, Tab.**

**Linosyris nuporum, Ger. ico.**

**XVI. Linaria quadrifolia exiguis flosculis cinereis.**

**Linaria Cretica angustifolia, Clus. hist.**

**XVII. Linaria quadrifolia lutea.**

**Linaria tetraphylla lutea minor, Col.**

**XVIII. Linariæ aureæ affinis: quæ 6. in Prod.**

*Linaria pumila seu repens.*

**I. Linaria pumila supina lutea.**

**Linaria pumila, Clus. hist.**

**Linaria Hispanica 5. Clus. hist.**

**Osyris flava sylv. Lob. ico.**

**Osyris minor, Tab.**

**Linaria Valentina, Ger. ico.**

**II. Linaria pumila foliolis carnosis, flosculis minimis flavis.**

**Linaria 2. Moravica 1. Clus. hist.**

**III. Linaria folijs carnosis cinereis.**

**Linaria Hispanica 4. Clus. hist.**

**Flos cærulei dilutionis ad cineraceum tendentis, rictu flavo.**

**IV. Linaria cærulea repens.**

**Osyris purpureo cærulea repens, Ad. Lob. ico.**

**Linaria altera floribus purpurascens, Cast.**

**Linaria minor Dalechampi, Lugd.**

**Linaria parva flore cæruleo, Cam.**

**Linaria 4. Moravica 2. Clus. hist.**

**Floris color cæruleus, ex violaceo purpurascens.**

**V. Linaria quadrifolia supina.**

**Linaria alpina, Gesn. hort. & ep.**

**Linaria pannonica 2. Clus. pan.**

**Linaria alpina pumila, Tab.**

**Linaria 1. Styriaca, Clus. hist.**

**Linaria viatica repens, Eyf.**

**Dd 3**

**LINU**

## LINUM EJUSQUE SPECIES.

*Λ* *Yves* Dioscoridi, lib. 2. cap. 125. Theopb. 8. hist. 7. qui 3. caus. 21. in *Lolium mutari* scribit. *Linum* *Plinio*, lib. 19. cap. 1. cuius generatione loci natalis recenset.

*Linum latifolium.*

I. *Linum sativum.*

*Linum*, Brunf. Matth. Fuch. Cord. in Dioscor.

Tur. Lac. Lon. Cæs. Lugd. Cast.

*Linum sativ.* Trag. Dod.

*Linum vulgare cæruleum*, Ad. Lob.

II. *Linum arvense.*

*Linum sylvestre*, Trag. Tur.

Caulebus & folliculis crassioribus à priore differt, & inter avenam reperitur.

III. *Linum syl. latifol. hirsutum cæruleum.*

*Linum sylv.* 1. Clus. pan. Dod.

*Linum sylv. latifol.* Lob. ico. Clus. hist.

Flos cæruleus, aut vegetior, aut dilutior.

IV. *Linum sylv. latifol. hirsut. candidum*, purpureis venis distinctum.

*Linum sylv. latifol.* 1. Clus. hisp. at 2. in hist.

*Linum sylv. latifol. folijs hirsutis Tithymali helioscopij*, Lugd.

V. *Linum fruticosum niveum.*

*Linum sylv. fruticosum*, vel 3. Clus. hisp. at in hist. 7. fruticosum.

*Linum sylv. 2. flore albo*, Lugd.

VI. *Linum sylv. latif. caule viscoso floribus rubro*: ex montibus Bononiensibus & Sumano habemus, quod & circa Ingolstadtium reperitur.

VII. *Linum sylv. cæruleum flore aureo*: quod 2. in Prod.

VIII. *Linum sylv. latifolium luteum.*

*Linum sylv. 2. Clus. pan. at 3. in hist.*

*Linum sylv. pannonicum*, Tab.

*Linum sativum*, Ger. ico.

IX. *Linum sylv. luteum folijs subrotundis. Campanula lutea linifolia*, Ad. Lob. Lugd.

X. *Linum luteum ad singula genicula floridum.*

*Linum luteum sylv. latifolium*, Col.

XI. *Linum fruticosum subflavum*: quod 1. est in Prod.

XII. *Linum maritimum luteum.*

*Linum sylv.* Matth. Dod. Cæs. Cast. Lugd. Cam.

*Linum marinum luteum*, Adv. Narbonense, Lobel.

XIII. *Linum Virginianum.*

*Linum sponte prodit*, ab Anglico caule & fo-

lijs diversum, materia tamen perinde bona: in desc. Virgin.

*Linum sylv. angustifolium.*

I. *Linum sylv. angustifolium flore magno.*

*Linum sylv.* 4. Clus. pan. sylv. 5. angustifol. 2. Eid. hist.

*Linum sylv.* 3. Dod. Tab. Cam. ep.

*Linum sylv. floribus albis*, Lob. Ger.

*Linum sylv. 2. floribus albis*, Lugd.

*Linum sylv. tenuifolium*, Cam.

Flore est cæruleo intenso, violaceo, albo, albo lineis purpureis distincto. Reperitur colore cæruleo in candidum languescens & veluti cinereo, capitulis etiam longè amplioribus, quod Lini sylv. angustifol. albi aliud genus, Clus. pan. & hist.

II. *Linum sylv. angustifol. floribus dilutè purpurascens*, vel carneis.

*Linum sylv. angustifol. vel 2. Clus. hisp. Dod.*

*Lini sylv.* 4. species 3. Clus. pan. at 6. in hist.

III. *Linum sylv. angustis & densioribus folijs flore minore.*

*Linaria*, 4. Trag.

*Linum sylv.* 3. Clus. pan. Lugd.

*Linum sylv. tenuifolium*, Lob. Tab. Ger.

*Linum sylv. cæruleo flore*, Cam. ep. Eyf.

*Linum sylv. 4. angustifol.* 1. Clus. hist.

Flos ex diluta purpura albicat, & quasi carneus.

IV. *Linum syl. angustifol. folijs rarioribus.*

*Linum sylv. 2. Tab. sylv. tenuifolium*, Ger.

Flore est cæruleo; reperitur & albo.

V. *Linum sylv. minus.*

*Linum sylv.* 5. Clus. pan. at 8. in hist.

*Chamælinum*, Lob. Lugd. cæruleum, Tab.

*Chamælinum perpusillum*, Ger.

*Linum pusillum candicantibus floribus*, Cam.

Flore est candido, vidimus & luteo.

VI. *Linum minimum stellatum*: quod 3. in Prodromo, & quibusdam dicitur.

*Passerina minor saxatilis.*

VII. *Linum pratense flosculis exiguis.*

*Linum sylv. pusillum candicantibus floribus*,

*Linocarpus*, Thal.

(Cam.

*Linum sylv. exiguum*, Cam. ad Thal.

POLY-

## POLYGALA EJUSQUE SPECIES.

**Πολύγαλα** frutex brevis est, palmi altitudinem petens, folijs Lenticula, gustu subacervo (astrico Plinio) potius lactis abundantiam facere creditur (facit Plin.) unde nomen habet, Dioscoridi, l. 4. c. 142. Plinio l. 27. c. 12. Sunt qui nostram intellexisse velint, cum nostra potius ad Onobrychidem Diosc. referenda videatur.

## I. Polygala major.

Polygala vulgaris major, Clus. pan. &amp; hist.

Polygala major, Tab.

Variat flore, qui modo dilutioris purpuræ,

modo cæruleus, modo albus; hinc tres figuræ

Polygala major alba: cærulea: purpurea, Tab.

Polygala purp. flore cæruleo: rubris florib. Ger.

## II. Polygala vulgaris.

Polygalon, Frag.

an Thesion, Ang.

Polygala, Dod. gal. Tur. Lon. Thal. Cam. Tab.

Ger.

Polygala recensiorum, Ad. Lob.

Onobrychis vera Dioscoridis, Eid.

Flos ambervalis, Dod.

Amarella, Gesn. ep.

Crucis silos, Eid. col.

Polygala vulgaris minor, Clus. hist.

Floribus est cæruleis, violaceis, dilutioris

purpuræ seu rubris, vel bersilici, vel sanguinei coloris: rarius niveis albisve: hinc tres figuræ

Polygala recent. rubris floribus: albis floribus, Lobel.

Polygala cærulea: purpurea: alba, Tab.

Polygala obsoleto flore: albis floribus, Ger.

Polygalon flore rubro purpurascente: &amp; flore cæruleo, Eysl.

Est &amp; alia foliis circa radicem rotundioribus, flore cæruleo, sapore admodum amaro, qui in cæteris non ita insign. animadvertitur, Thal.

III. Polygala acutioribus folijs Monspelica. Onobrychis 3. Lugd.

IV. Polygala lutea.

Polygala, Ang. Cam.

V. Polygala repens nivea.

Polygala Cast. repens, Lob. Lugd. Tab. Ger.

VI. Polygalæ affinis.

Chamæmyrsine quorundam, Lugd.

## ONOBRYCHIS.

**Ονοβρυχis** folia habet Lentis fere longiora, caulem dodrantalem, florem punctum, radicem exigua, Dioscoridi, l. 3. c. 170. Alij Polygala vulgata, non adeo male: alijs Capiti gallinaceo, de quo inter Vitis agitur: alijs sequentibus tribuunt, & ab æsini rudu nomen habere volunt.

## I. Onobrychis 4. lutea, Dalech. Lugd. quid?

Onobrychis altera Belgarum, Lob. Eysl.

## II. Onobrychis arvensis: vel Campanula

Elatine, Cæsal.

arvensis erecta.

Onobrychis, Dod. gal. prima, Lugd.

Avicularia Syloij, Gesn. col.

Viola anonymos inodora, Eid.

Campanula parva tertia, Dod. 8.

Campanula arvensis minima, Dod.

Speculum Veneris, Ger.

Folijs ludit, superioribus latioribus caulem amplexantibus, inferioribus longioribus, nullis crenatis, sed quibusdam crispatis: hinc apud Tab. duæ figuræ, &amp; nomen

Violæ arvensis, &amp; Violæ pentagoniæ.

## GLAUX.

**Γλαύξ** folijs Cytiso aut Lenticula simili est, superne virens, inversa canalicans: ramulis quinque senisve a terra, tenuibus, a radice dodrantalibus: flores viola alba, purpurei exeunt, ac minores: nascitur juxta mare: in forbitione lactis uertatorem intermissam restituit, Dioscorides lib. 4. cap. 141. Plinius lib. 27. cap. 9. cui Glaux præcipuum eugalacon. Foriè γλαύξ quasi γάλαξ lac. Glauci nomen, Tragus Polygala flore rubro tribuit: at eam quæ flore est albo, Polygalam Dioscorid. facit. Sunt qui Glauci nomen eundam leguminosæ, de qua suo loco, tribuant.

## I. Glaux maritima.

Glaux, Dod. gal. Lugd. Cam.

Glaux exigua maritima, Ad. Lob. Ger.

Glaux marina minor, Tab.

II. Glaux latiore folio Thuringiaca.

Glaux, Cord. in Diosc. altera, Cam.

Varie.

Varietas in hac: alia enim major, folijs modo latioribus, modo angustioribus: alia minor densis cespitibus, cauliculo inferius ob folia delapsa, ceu geniculato: qualis circa Egram locis nitrosis provenit: Similem ex Scotia habemus.

### STOECHAS ARABICA.

ΣΤΥΧΑΙ, ab Insula ejusdem nominis, è regione Massilia, ubi nascitur, cognomentum accepit, teste Dioscoride 13. c. 32. Plin. l. 28. c. 12. Sunt qui rectius Stachyn, quasi spicam, dici existiment.

#### I. Stœchas purpurea.

Stœchas, Trag. Matth. Gesl. hor. Lac. Ad. Lobel.

Lon. Cast. def. Lugd.

Stichas, Fuch. Dod. gal. Tur.

Stichas Arabica, Cord. in Diosc. & hist.

Stœchas Arabica, Camer.

Spica Italica sylv. Cæf.

Stœchas brevioribus ligulis, Clus. hist.

Variat: names, quæ ex Arabia adfertur, densioribus estramulis.

#### II. Stœchas cauliculis non foliatis.

Stœchas, Cast. ico. Dod. 8. in Belgio nata, Eid. fol.

Stœchas nudis cauliculis summis, Lob.

Stœchas capitulis foliatis, Lugd.

Stœchas longioribus ligulis, Clus. hist.

III, Stœchas latifolia flore albo.

Folij est Lavendulæ flore magno albo: in Murena Castiliæ D. Albinus legit.

#### IV. Stœchas folio serrato: & Dod. Ger.

Stœchas prima, Clus. hisp.

Stœchas folio serrato & crispo, Lob.

Stœchas serrata, Tab.

Stœchas crispo folio, Clus. hisp.

Succudus Avicennæ Myconi, Lugd.

Ex horto Clarissimi Contareni accepimus.

#### V. Stœchas ladi serrati affinis.

Tragium alteri Dioscor. Secudus & Sucudus

Avicennæ, Rauvolf. & Lugd. ap.

### LAVANDULA.

LAVANDULA, quod lavacrum expetatur, huc refertur, & propter formam & propter nomen, cum Stœchas Arabica à Mesueo dicatur. Pseudonardus Plinij l. & c. 12. censetur. Alij Stœchadi veterum cognatum faciunt: alij Cneorum, sive Cassiam albam Theophrasti volunt: quidam Iphium Plinij suspicantur.

#### I. Lavandula latifolia.

Spica Nardus Germanica, Trag.

Nardus Italica, Matth. Lob. Germanica, Lon.

Lavandula, Ang. (cui & Cneorum Theophr.

Gesl. hort. Dod. Ad. fœmina, Dod. gal.

Lavandula major, Cord. in Diosc. & hist.

Pseudonardus, Matth. Cast. mas, Fuch. at in ico. fœmina.

Lavandula mas, Lugd. latioribus folijs, Cam.

Lavandula altera longiore folio & spica, Clus. hist.

Cassia alba Theophrasti, Dalech. in Plin.

Flore est cæruleo: habetur & albo, & purpureo: hinc figuræ duæ apud Tab. Ger. & Eyst. sub

Lavandula 1. & spica hortulana flore albo, Tab.

Lavandula flore cæruleo: & Stœchas sive Spica hortulana, Ger.

Lavandula flore cæruleo: & Lavandula flore albo, Eyst.

Quæ flore est albo, folia vulgari paulo latiora habet.

#### II. Lavandula angustifolia.

Lavandula, Trago. (cui & Cassia Germanica)

Matth. Lac. Lon. vulgaris, Cord. in Diosc.

Lavandula minor, Cord. h. fœmina, Lugd.

Pseudonardus fœmina, Matth. Fuch. (at in ico. mas) Cast.

Stachys, Ang.

Nardus vulgo dicta, Gesl. hor.

Lavandula mas, Dod. gal. altera, Eid.

Spica, Ad. Lavandula, Lob.

Spica Italica & domestica, Cæf.

Spica Nardi, Cam.

Lavandula brevior folio & spica, Clus. hist.

Flore est cæruleo: habetur & albo: huic duæ figuræ apud Lob. Tab. Ger.

Spica lavendula, & Lavandula alba, Lob. ico.

Lavandula alba, & Spica alba, Tab.

Lavandula flore albo, & Lavandula hort. minima, Ger.

Spica vulgaris flore cæruleo & flore albo, Eyst.

#### III. Lavandula folio dissecto.

Lavandula multifido folio, Clus. hisp. & hist.

Lob. Lugd.

Lavandula secunda, Tab.

Stœchas multifida, Ger.

## R O S M A R I N U S.

**L**ibanius Dioscoridi l. 3. c. 29. ab odore Thuri nomen habet, Galeno 7. sim. pl. λεβαντίνος γυμναμαριόν, id est, Libanotis coronaria, quod ea si γυμναμαρίνος coronatū, ad corollas utantur.

Genera tria fecit Dioscorides & Galenus: umbelliferi genera duo, unum secundum, alterum sterile: tertium non umbelliferum & coronarij expectum. Theoph. 9. hist. 12. duo genera proposuit, fructiferum folio helioselinij, semine & radice candidū: & sterilem folio Lactuca. Plinio lib. 24. c. 11. genera duo: alterum sterile: alterum cui & caulū & semen resinaceum, quod Cactrys vocatur: solij odor thuri. At lib. 19. cap. 12. Rosmarinum coronarium, cum alijs speciebus confundit.

Hic de coronario agimus (de alijs inter umbelliferas dictum fuit) quem aliqui Cneoron nigrum Theoph. & Cassia Hyginivolunt.

I. Rosmarinus hortensis angustiore folio.  
Rosmarinus, Brunf. Trag. Fuch. Tur. Lon.  
Rosmarinum coronarium, Matth. Ang. (cui & Cneoron Theophr. & Cassia Latinorum) Dod. gal. Lac. Ad. Lob. Cæs. Lugd. Cam. Eyf. Libanotis coronaria, Cord. in Diosc. Ges. hor. Rosmarinus minor sive tenuifolius, Ges. hort. Cassia nigra Theophrasti, Dalech. in Plin. Hysopus Hebræorum quibusdam.

Florib. est communiter subcæruleis, rarius albis.  
II. Rosmarinus spontaneus latiore folio.  
Rosmarinus sylv. seu major, Cord. hist. Rosmarinus alter ignobilior, Ges. hor. Rosmarinus sylv. Cæs. Hic sponte Monspeluli cum Epirosmarino reperitur. Est & alius Rosmarinus sylv. de quo inter Ledi genera.

\*\*\*\*\*

## S E C T I O Q U A R T A.

HYSSOPUS; SATUREIA SIVE THYMBRA; THYMUS; EPITHYMUS; CUSCUTA; SERPILLUM; POLIUM; AGERATUM; PULEGIUM; DISTAMNUS; ORIGANUM; TRAGORIGANUM; SAMPŒCHUS SIVE AMARACUS; MARUM SIVE MAJORANA; CLINODIUM & ACINOS; ERINUS; OCIMUM SIVE BASILICUM.

## H Y S S O P U S.

**Y**Leon. & Dioscoridi l. 3. c. 30. sic dici volunt quasi ὑψίστην (προχρισμένην τὴν ὕψος) quia super vultum effundatur: quam Dioscorides inter umbelliferas stirpes regulat: communis verò speciosa est.

Genera duo Dioscoridi, ἰσχυρὴ montana: & ἰσχυρὴ hortensis: Verum Græcorum Hysopum, ab Arabum & Officinarum Hysopo differt, qui a nonnullis Symphytum peritæum Diosc. l. 4. c. 9. esse videtur: alijs voluum Hysopum Dioscoridi est, Plinius Hysopi lib. 26. cap. 8. vires proposuit: & l. 14. c. 16. Hysopi ex Cilicia, ad vim confectionem, meminit, multum plantæ notum additū.

I. Hysopus officinarum cærulea, sive spicata.  
Hysopus, Brunf. Trag. Tur. Cord. in Diosc. Lac. Lon. Tab. Cam. flore cæruleo, Eyf. Hysopum, Matth. Cæs. Cast. Hysopus hort. Fuch. communis, Ang. Dod. gal. Hysopus vulgaris, Ges. hor. Dod. Clus. hist. Hysopus sativa, Cord. hist. Lugd. Hysopus Arabum, Ad. Lob. Ger.

Floret aliquando ex una, aliquando ex utraque parte, quæ

Hysopus utrinque florifera, Dod.

Alia odore moschum redolente à priore differt, quæ facile in vulgatam degenerat.

Hysopus moschata vel de Cilissa, Ges. hort.

Meminit Gesn. & Crispæ: habetur & folijs dissectis: item communiter est folijs atro-virentibus: est & pallide luteis: spica quoq; brevi & rotunda à priore variat: circa vulgatum & Epihysopum reperitur.

II. Hysopus rubro flore.

Hysopus Arabum flore rubro, Lob. Lugd. Cam. Ger. Eyf.

Hysopus Arabum, Tab.

Flores sæpius uno tantum, aliquando utroq; ordine digesti: satione quoq; in colorem cæruleum degenerare solet.

Ee

III. Hysc

- III. *Hyssopus vulgaris alba*.  
*Hyssopus albis florib.* utrinq; digestis, Lob. ico.  
*Hyssopus flore albo*, Lugd. Cam. Eyst.  
 IV. *Hyssopus Anglica*.  
*Hyssopus* ab una parte alba, altera viridis, Ad. Lugd. Tab.  
 V. *Hyssopus minor angustifolia*.  
*Hyssopus alter*, Dod. ut:  
*Hyssopus parva angustis folijs*, Lob. ico.  
 an *Hyssopus Hispanicus minor*, Clus. hist.  
 VI. *Hyssopus hirsuta*: in Prodr.  
 VII. *Hyssopus umbellata*.  
*Hyssopus vulgaris comosus*, Clus. hist.  
 VIII. *Hyssopus latifolia*, in Prodr. descripta.  
 IX. *Hyssopus rotundif. spicata*, fortè Dioscor.  
*Hyssopus folio Origani Dalechampi*, Lugd.

- X. *Hyssopus latifolia coma rotunda confert*.  
*Hyssopus* ex codice Cæsar. Dod. Lugd. Col.  
 XI. *Hyssopus angustifolia spicata*.  
*Hyssopus angustifolius spicato flore*, Clus. hist.  
 XII. *Hyssopus angustifolia montana aspera*.  
 an *Hyssopus sylv. & montana*, Ttag.  
*Hyssopus montana*, Matth. Lugd. Cast.  
 an *Hyssopus montana odora*, Cam.  
 XIII. *Hyssopifolia*.  
*Grasse poley*, Cord. ob.  
*Gratiola minor*, Ges. col.  
*Hyssopoides*, Cam.  
 Est major latioribus folijs, minor angustioribus: floribus est cæruleis minoribus, rarissimè albis: at ex Hispania habemus, floribus oblongis, saturatioris cærulei coloris.

## S A T U R E I A.

⊖ *Cuscuta Dioscoridi* l. 3. c. 25. *Convolv. Theophr.* 7. hist. 1. (fortè à *an: rō bōm* ob fragrantiam) dicitur ipsa *Satureia*. At *Satureia*, alijs a saturando dicta, quod cibi loco condimenti additur: atq; à *Saturu* nomen traxisse putant, ed quod coitus marcescentes stimulet.

Genera duo Dioscoridi: *sylvestris* & *fativa*. Theophr. 7. hist. 8. *sylvestris* urbana aspectu vicina: at 6. hist. 8. plura ejus Genera esse monet. Plinio l. 19. c. 3. *Thymbra*, quæ *Cunila*, quæ & *Satureia* dicta in condimentario genere: & l. 20. c. 16. *Cunila præter sativam*, plura sunt in iisdem diocina genera: est quæ bubula appellatur, alia *galinacea*, quæ *Origanum Heracleoticum*, &c.

- I. *Satureia hort.* sive *Cunila sativa*, Plinij.  
*Hyssopus agrestis*, Brunf.  
*Satureia*, Trag. Lac. Lon. Dod. Lob. Cæf. (cui & *Cunila* & *Thymbra agrestis*) Tab. Cam.  
*Satureia altera*, Matth. vulgaris, Dod. gal.  
*Thymbra secunda species*, Ang.  
*Satureia fativa*, Fuch. Tur. hortensis, Ges. hort. Ad. Lob. ico.  
*Thymbra vera*, Ges. hort.  
*Satureia sive Thymbra sativa*, Cord. in Diosc. & histon.  
*Satureia vulgaris hortensis*, Lugd.  
*Satureia sylv. altera*, Cast.  
*Satureia hortensis æstiva*, Ger.  
*Satureia domestica*, Eyst.

Flosculis est candidis, aut dilutè purpureis: aliquando caule & folijs subcæruleis. Addit Tabern.

*Satureiam Romanam* 2. quam sub.

*Hyssopo albo flore*. Ger. pinxit, quid est?

II. *Satureia montana*.

*Thymbra*, Dod. Cord. in Diosc. & hist. Lugd. Tab. Eyst.

*Thymbra sylv. Ang. agrestis*. Ges. hort.

*Satureia altera*, Lac.

- Satureia hortensis*, Lob. ob. Cæf.  
*Satureia sive Thymbra altera*, Ad. Lob. ico.  
*Saxifraga secunda*, Cam. ep. Matth.  
 an *Satureia perennis*, Cam.

Flosculis est purpureis, aut candidis: in hortis folijs est latioribus, ut Lob. in sylvestribus angustioribus, ut Dod. & Lug. pingunt; utramque Camer. in Matth. expressit. Huic *Cuscuta* etiam innascitur, quam

*Epithymbrium* sive *Cuscutam thymbrae adnata*, tam, Cord. in Diosc.

*Epithymbrium* & *ginetæ*. Cord. hist.

*Epithymbrium*, Cast. vocat.

III. *Satureia spicata*.

*Saxifraga prima*, Matth.

*Thymbra S. Juliani*, sive *Satureia vera*, Ad. Lob. bel. ico.

*Saxifraga vera*, Diosc. Lugd.

*Clinopodium*, Cæfal.

*Thymbra vera*, Lugd. Tab.

*Satureia S. Juliani*, Ger.

Duplex est: quæ in mente S. Juliani, folijs est angustissimis: quæ verò Romæ & Neapoli in tectis & parietibus provenit, folijs est latioribus.

IV. *Satureia Cretica*, Thym.



Thymbra Cretensis, Alpi.  
Thymbra legitima, Clus. hist.  
Thymbra Bellonij, antiquorum legitimam  
censet Belli ep. ad Clusium.  
Satureia legitima Dioscoridis, Ponæ.  
Hanc Thymbrae legitimæ nomine, & quæ  
vulgo *spicis* & *thymis* dicatur, ab Honorio Belli

ex Creta accepimus.  
V. Satureia thymi folio.  
Satureia Dioscoridis, Matth. Cast. Lugd.  
Polium foeminam recentiorum esse volunt, Ad.  
Thymū vulgatiorem folio tenuiore, dicit Eyst.  
Hanc ex horto Clarissimi Contareni Thym-  
brae nomine habemus.

T H Y M U S.

Thymus Dioscoridi l. 3. c. 44. & Theop. 4. hist. 7. & 6. ejusd. 2. & 1. caus. 5. dicitur vā bonū, quod iji qui animi  
deliquium patiuntur adhibeatur; alij dicit vā bonodorus, q. vā bonū deducunt, quod hoc veteres in sacris,  
quæque accensio fiebat, primum usifunt, ut apud Rhodiginum l. 3. c. 23. legere est.

Genera: Dioscorides l. cit. capitulum descripsit: at L. 4. c. 179. Thymi durioris meminit. Ex Theop. 4.  
hist. 2. duo genera, Plin. l. 21. c. 30. & 21. candidum & nigrum, proposuit.

I. Thymus vulgaris folio tenuiore: & Eyst.  
Thymus, Brunf. Trag. Fuch. Tur. Cord. hist.  
Lon. durior, Cam.  
Thymus nostras, Cord. in Dioscor. vulgaris,  
Gefn. hort.  
Thymum durius, Dod. gal.  
Serpillum hortense, Dod. ico.  
Pepolina, Cæf.

Thymum vulgare, Lugd.  
Thymus niger, Tab.  
Thymus alter durior, Cam.  
Flore est purpureo, nunc albicante.  
III. Thymus capitatus, qui Dioscoridis.  
Thymum, Matth. Ad. Lob. Creticum, Cord. in  
Diosc. Dod. gal. Lugd. Cæf. legitimum, Clus.  
hist. & hist.

Foliorum colore variat: alteri virentia &  
suaviodora: alteri candida & graveolentia,  
qui rariore est.

Thymum cephaloton, Dod.  
Thymus, Ang. Lac. Cast. 2. Alp.  
Thymus capitatus, Cord. hist.

II. Thymus vulgaris folio latiore.  
Thymum durius, Dod. Lob. ico, Clus. hist. Ger.

Thymus verus capitatus sive Creticus, Cam.  
IV. Thymum inodorum, in Prod. desc.

E P I T H Y M U M E T C U S C U T A.

Epithymus Dioscoridi l. 4. c. 179. & Plinio l. 26. c. 8. flos est à Thymo durior, Satureia simili. Verum non  
solum Thymo, sed & Thymbra, Polio, Distanno, Chamædri, Hyssope, Serpillo, Majorana, Origano,  
Stæbe, Ebulo alijsq. Cuscuta modo circumnasci observamus.

Cuscuta, recentioribus Græci vocant, quam aliqui Androsacen Dioscoridi l. 3. c. 150. aliqui Cadytam  
Theop. 2. caus. 3. & Plinij l. 16. c. 44. esse volunt. Sed ad Orobanchem Theop. 5. caus. 22. referri potest. Non-  
nulli podagra lini, quod linum amplexatur: *Androsacen*, Gesnero.

I. Epithymum sive Cuscuta minor.  
Epithymum, Matth. Lac. Ad. Cast. Lugd. (qui  
& Matth. & Lob. figuram habet) Cæfalp. (qui  
Thymo Italico innasci scribit) Alp. Tab.  
Epithymum Græcorum & Arabum, Lob.  
Cassurba minor, Dod.  
Epithymum vulgare, si ex Thymo simili abla-  
tum, verum Dioscoridis Epithymum est, Col.

menta purgat: & apud Sclavonios Verduun  
Xeglie, id est, Herba coleram purgans: hæc  
Anguil. Sed qui est?  
III. Cuscuta major.  
Adrosaces, vulgo Cuscuta, Trag.  
Adrosace Dioscoridis, si legatur *Androsacen*, id est,  
sine folijs, Ang.  
Cuscuta, Matth. Ang. (cui & Cuscuta) Lac. Lon.  
Cast. Cæf. Clus. pan. & hist. Ger.

II. Epithymum capitulis Platani crinitis.  
Epithymus, peculiaris planta à Thymo & Cu-  
scuta, quæ in Sclavonia provenit folijs Thym-  
brae hirsutis, in cauliculis summis capitula  
hirsuta rotunda, Platani pilulis similia, ex  
cujus flosculis capillamenta rufescentia pro-  
deunt: radicem habet crassam, nigram, intus  
albam, quæ exiccata non secus quam capilla-

Cassurba, Fuch. Tur. Dod. Lugd. Thal.  
Hæc passim herbis & fruticibus adnascitur,  
potissimum Urticæ majori, lino, trifolio eor-  
niculato, lupulo, rubo & vepribus: colore vel  
albo vel rufo.

## SERPYLLUM

**E** *Prænotat Dioſcoridi, lib. 3. cap. 46. àνι τὸ ἴσμεν ἃ ſerpento dictum: quia aliqua ejus particula terram tangente, ab ea radices demittantur: Sic & Plinio, lib. 20. cap. 22.*

*Genera duo Dioſcoridi ſunt: primum herienſe, odore ſampfuchi: alterum ſylveſtre Zygii dictum, quod non ſerpat, ſed in altitudinem excreſcat. Theophraſtus 6. hiſt. 7. duo genera agnoviſſe videtur. cum dicat Serpylli ſylveſtre quoque genuiſſe. Plinius & ſativi & ſylveſtris meminit, & hoc ſerpere tradit: quod non intelligendum de eo Serpyllo, quod lib. 16. cap. 44. arboribus ſe circumdare ſcribit.*

I. Serpyllum majus latifolium.

Thymum latifolium, Lob. ico.

II. Serpyllum latifolium hirsutum: quod  
1. in Prod.

III. Serpyllum ſativum.

Serpyllum, Matth. Lac. Lugd. Tab.

Serpyllum domesticum, Caſt.

Serpyllum folijs amaraci, Ger.

IV. Serpyllum vulgare majus.

Serpyllum majus flore purpureo, & aliud candido, Cam. Ger.

Serpyllum album 1. & 2. Tab.

Flore eſt albo, eſt & purpureo.

V. Serpyllum folijs citri odore.

Serpyllum alterum citratum, Matthioli. citrum olens, Gefn. hort. Thal. citratum, Tab. Eyſt.

Serpyllum ſylv. 1. citratum, Caſt.

Serpyllum referens planta, odore citri, Cæſ.

Serpyllum pannonicum 1. Cluſ. pan. & hiſt.

Thymum latifolium, Ger. ico.

VI. Serpyllum vulgare minus.

Serpyllum, Brunf. Trag. Fuch. Ang. Gefn. hort.

Tur. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæſ. Lugd.

Serpyllum vulg. Dod. Ger. & vulgare flore albo.

Serpyllum ſylv. Matth. Cord. in Dioſc. ſylv. alterum, Caſt.

Serpyllum minus flore albo, & flore purpureo, Tab.

Serpyllum vulgare repens, Cluſ. hiſt.

Aliud folijs eſt rotundis, aliud acuminatis & anguſtioribus: ſlos ſubpurpureus, roſeus, candidus: proceli & loci diverſitate odorem mutat, & inodorum reperitur: aliquando Thymum durius in Serpyllum degenerat: ſic Theoph. 5. cauſ. 8. Ocyum in Serpyllum tranſire ſcribit.

Hoc quandoque cum capitulis lanuginofis occurrit.

VII. Serpyllum anguſtifolium glabrum.

Serpyllum pannonicum 2. Cluſ. pan. & hiſt.

Aliquando inodorum eſt: aliquando odorem foliorum Nucis reſert.

VIII. Serpyllum anguſtifolium hirsutum: vel montanum repens hirsutum.

Serpyllum pannonicum 3. Cluſ. pan. & hiſt.

IX. Serpyllum folio Thymi.

Serpyllum alterum, Dod.

Serpyllum Narbonenſe folijs & facie perpuſilli anguſtfolij Thymi, Lob. Lugd.

Serpyllum ſylveſt. Zygii Dioſcoridis, Cluſ. hiſtor.

Serpyllum Creticum, Tab. Ger.

## POLIUM

**P** *Notat Dioſcoridi, lib. 9. cap. 124. ſic dictum propter canicem, qua in capitulis, ſecundum Dioſcoridem, at ſecundum Plinium, in folijs apparet: & duoſ navique canicem & canum ſignificat.*

*Genera duo Dioſcoridi agnovit, vulgare montanum, alterum fruticofum: Galenus 2. ſimpl. majus & minus. Plinius, lib. 21. cap. 7. campeſtre majus, & ſylveſtre minus propoſuit.*

*Polium montanum.*

I. Polium Lavandulæ folio.

Polium alt. Matth. Gefn. hort. Lac. Lugd. Cam.

Polium majus, Cord. hiſt. campeſtre, Lon.

Polium recentiorum ſæmina Lavandulæ folio, Adv. Lob.

Polium pannonicum 1. vel majus, Cluſ. pan.

Polium 2. flore albo, Cluſ. hiſt.

Polium folijs & facie Lavandulæ, Eyſt.

Variat folijs latioribus & anguſtioribus, hinc

Polium ſæmina, & Polium campeſtre, Tab.

Hujus ſpeciem per omnia majorem, cana lanugine candicantem, magis odoratam & aromaticam, Cordus in ſua hiſtoria notavit, Polium minus nominans.

II. Polium montanum luteum.

Polium, Tur. Dod. ico. at. deſc.

Polium luteum. Ad. Lob. Lugd. Cluſ. pan.

Polium 3. Cluſ. hiſt. montanum 1. Eid. hiſt.

Polium montanum luteum, Tab. Ger.

Flos modo luteus, modo pallidus, interior pallescens & foris exalbidus: interdum ex luteo

vire-

virescens : Ex hujus semine natum, flore ex albo purpurascens, quod

*Polium 4. Clus. hist.*

III. *Polium montanum album.*

*Polium montanum, Ang. Lob. Tab. Ger.*

*Polium minus & mediterraneum, Adv.*

*Polium alterum seu parvum, Dod. gal.*

*Polium tenuius & 1. Dod.*

*Polium montanum, 1. Clus. hisp. & hist.*

*Polium montanum alterum, Cæs.*

*an Polium minus, Cord. in Diosc. & hist.*

Est duplex: alterum cauliculis humi sparsis, folijs incanis & denticulis vix conspicuis: alterum cauliculis erectis, folijs angustioribus, capitulis longioribus, quod

*Polium montanum 2. flore albo, Clus. hist.*

IV. *Polium montanum repens.*

*Polium 4. & repens, Dod.*

*Polium 6. Clus. hisp. montanum 8. Eid. hist. & pannonicum minus, Eid. pan.*

*Polium mont. supinum minimum, Lob. Lugd.*

*Polium montanum 3. Cæs.*

*Polium montanum minimum, Tab. Ger.*

*Polium maritimum.*

I. *Polium larifolium incanum Creticum: in Prod. descr.*

II. *Polium angustifolium Creticum.*

*Polium erectum Creticum & forte frutescens Diosc. Ponæ.*

III. *Polium maritimum erectum Monspelicum.*

*Polium 1. Matth. desc. at 2. ico. Clus. hisp.*

*Polium, Lac. Matthioli, Lugd.*

*Polium 1. five montanum Diosc. Gefn. hort.*

*Origani 3. species Dioscoridis, Quadramio.*

Hoc & locis maritimis, & diversis collibus, & arenosis litoribus, ut ad Cetium montem, & Magalonam insulam Narbonensis Galliae fructificat, ita ut & maritimum & montanum dici possit: in quo Epipolium notavimus.

IV. *Polium maritimum supinum Venetum.*

*Polium 1. Dod. gal.*

*Polium repens 3. Dod. ico. at 4. desc.*

*Polium Venetum, Ad.*

*Polium 4. Clus. hisp. Lugd.*

*Polium montanum, Cast. Cæs.*

*Polium montanum purpureum, Lob. Tab. Ger.*

*5. purpureum, Clus. hist.*

*Origanum 3. genuinum Dioscoridis, Quad.*

*Hyslopus Apulus Diosc. & Serapionis, Col.*

Illud erectum est, & omnibus partibus crassius: hoc vero repit, tenuius & candidius est: utrumque loco natali legimus.

V. *Polium montanum supinum alterum.*

*Polium 5. Clus. hisp. 6. albo flore, Eid. hist.*

Sola teneritate & floris colore à priore differunt.

VI. *Polio affinis Guacatane.*

Guacatane plantula Polio montano haud ab illa similis, sed in odorem, Monard. & ex eo, Lugd.

Castor.

Guacatane pilosellæ comparare possumus,

Frag.

## A G E R A T U M.

**A**geratum Dioscoridi, lib. 4. cap. 59. cui nomen inditum, sed id in prælo id est in manu scriptoris perierit, quoniam flos in sua colorum specie diutissime conservetur: quasi dicat senectutis experti, quod & id est dicitur: vel ut Plinius, lib. 27. cap. 4. quoniam diutissime non marcescat.

I. *Ageratum folijs serratis.*

*Eupatorium Mesuæ, Trag. Gefn. hort. Matth.*

*Lon.*

*Ageratum, Matth. Gefn. hort. Lac. Cast. descrip.*

*Lugd. Cam. Tab. Col. Eyst.*

*Ageratum Septentrionalium, Ad. Lob. Eyst.*

*Mentha corymbifera minor, Cord. hist.*

*Costus minor hortensis, Gefn.*

*Herba folia, Ang. Gefn. coli.*

*Balsamita minor, Dod.*

*Balsamita femina, Ger.*

*Camphorata, Cæs.*

Floribus est laetis: rarius candidis, & hoc

*Ageratum florib. candidis, Ad. Lob. Tab. Cam.*

*Ageratum 2. Matth. Lugd.*

Hoc etiam majus est & minus: nam quod in

Hetruria provenit multo minus est, quod

*Ageratum minus, Cam. in Matth.*

Circa Monspelium etiam Corymbis longioribus & magis compactis reperitur.

II. *Ageratum folijs non serratis.*

*Ageratum 3. Matth. Lugd.*

*Ageratum minus, Lob. Cam. Tab.*

III. *Ageratum serratum alpinum.*

*Ageratum purpureum & Moschatella caerulea Germanis quibusdam, Lugd.*

Et 3

PULE.

## P U L E G I U M

**Γ**αλαξυ Dioscoridis lib. 3. cap. 36. cui & βαλαν, à βαλξ βαλatu, quoniam dum floret, gustatum à pecoribus βαλξ & βαλινιαυατα βαλatum concitet: quod & Plinius lib. 20. cap. 14. notavit. Pulegium latinum, quod rjux florere recens incensum, pulices interficiat.

Genera duo Plinius fecit, sativum & sylvestre: illud marem & feminam: mas candidum, semina purpureum florem habet, quo solo inter se differunt: sylvestre, quibusdam Dictamnus dicitur.

## I. Pulegium latifolium.

Pulegium, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Tur. Cord. in Diosc. & hist. Dod. Lon. Cæs. Cast. Cam.

Pulegium vulgatum, Ang.

Pulegium foemina, Fuch. in ico.

Pulegium aquaticum, Gesn. hort.

Pulegium regium, Ad. Lob. Lugd. Eyst.

Floribus est cæreuleis ex roseo albicantibus, rarissimè albis.

## II. Pulegium latifolium alterum.

Pulegium, Cast. mas Plinij, Lob. ico.

III. Pulegium folijs Nummulariae: in Prod. describitur.

IV. Pulegium angustifolium.

Pulegium cervinum, Gesn. hor. Lugd. Cam. Eyst.

Pulegium alterum folijs oblongis, Dod.

Pulegium angustifol. sive cervinum, Ad. Lob.

In folijs aliqua notatur differentia; hinc

Puleg. Cret. & Pulegium Mafsilioticum, Tab.

Pulegium mas & Pulegium regium, Ger.

## D I C T A M N U S.

**Δ**ιϰταμνυ Dioscorides lib. 3. cap. 37. meminit, & aliquibus γαλαξυ αργία Pulegium sylvestre dici. Videatur Antidaryn vex, απὸ τῶ τινος deduci, eò quod, ut Dioscorides & Theoph. agnoscunt ixi: cum non modo potum, sed appetitum quoque parum defunctis ejiciat. Διϰταμνυ Theoph. 9. hist. 16.

Genera tria Dioscoridis & Theoph. Creticum, pulegium simile ac majoribus & lanuginosioribus folijs: Pseudodictamnus minus illo acre, & ut Theoph. minus. & viribus longè inferius: & Dictamnus Creticum alterum folio Sisymbrij, floribus origani sylvestris: quod Theoph. veluti aquivocè sic appellatum scribit, nec enim speciem, nec vim eandem habere. Idem Plinius l. 25. c. 8. Officina Dictamnus album etiam habent.

## I. Dictamnus Creticus.

Dictamnus, Brunf. Dictamnus, Ang. Tur.

Dictamnus, Matth. Lac. Ad. Lob. Cast.

Dictamnus Creticum, Matt. Cæs. verum, Dod.

Dictamnus vera, Cord. in Diosc. Gesn. hor. (Lug.

Dictamnus Creticus, Trag. Dod. gal. Lon. Cam.

Qui ex Creta adfertur, crassioribus & villosioribus folijs: qui ex hortis Italicae majoribus, minusque incanis: monet Clus. hist. ap. in Sardinia minoribus, candidioribus & odoratissimis folijs reperiri.

## II. Pseudodictamnus verticillatus inodorus.

Pseudodictamnus, Mat. Dod. gal. Lac. Cast. Cam.

Lugd. qui & Matth. & Dod. figuram proponit.

Pseudodictamnus florib. verticillatis, Ad. Lob.

καλνυμνία, Ang. (Eyst.)

Dictamnus Plinii nomine ex Creta, Cæs.

Gnaphalium Dioscoridis, Ponæ.

## III. Pseudodictamnus alter odoratus, quid?

Dictamni 2. genus, sive Diq. non Cret. Dod. gal.

Pseudodictamnus, Eid. in ico.

## IV. Pseudodictamnus acetabulis Moluccæ.

Pseudodictamnus Cydonia, sive Dictamnus 2.

Theoph. Ponæ.

Ex horto Clarissimi Contareni.

V. Dictamnus albus vulgo, sive Fraxinella: quia vulgo Dictamnus dicitur, huc retulimus, alias rectius in aliam classem referretur.

Dictamnus putarus, Brunf. (Lon.

Dictamnus vulgaris, Trag. Gesn. hor. Cam. Offic.

Pæonia mascula, Eidem.

Dictamnus album, nonnulli pumila fraxinus,

Matth. Lac. Cæs. Cast.

Tragium, Dod. gal. Gesn. hor. (qui tamen negat)

primum Dioscoridis, Ad.

Tragium Creticum, Guil. the.

Dictamnus nostra, Cord. in dif.

Fraxinella, Cord. hist. Dod. Lug. Cl. pan. & hist.

Natrix Plinij, Ang. (Ger. Eyst.)

Diptamnus album, Belli ep. 3. ad Clus.

Polemonium, Tab.

Plinio l. 27. c. 12. Natrix vocatur herba, cujus radix evulsa virus hirci redolet. Tragium Diosc. l. 4. c. 49. in Creta tantum nascitur habes folia Lentisco similia & ramos & fructus, minora tamen omnia. Tragium negat Belli, quia hirci odor non spiret, sed gravem, neq; in tota Creta inveniri.

Duplex est 1. elatius, oblongiore spica saturatiore, folijs nigricantibus: 2. humilior laeviore spica, floribus & folijs dilutioribus.

ORIGA-

## O R I G A N U M

**O** *Παρα* Diofcoridi l. 3. c. 32. *ἀπὸ τῶ χαίρου ὕψιου* dicitur, Euflachio volente, qui ab *ἴρι* & *ἵρι* dert, vas: alij *ἡσπέρ* τὸ *ἵρι* ὡς *ἡσπέρ*, quia vifus claritati conducit, deducunt.

Genus quatuor Diofcoridi: *ἡρακλειoticum*: *ὄνιτις*, quafi afinu pabulo gratum fit: *ἐχινόφυλλον*, & *τραγοδύκνον*: Theophr. 8. hift. 2. duorum tantum meminit: nigri fterilis, & candidi fructuofi. Plin. l. 20. c. 16. *Origanum Heracleoticum Græcorum*, quod Cunilam gallinaceam Romani appellant, refert: at c. 17. *Onitidu*, quod *πρασιον* appellant Hyfopo non difimile, & *Tragoriganum Heracly*, conjuncta funt genera (Diofcoridu utrumq, *Tragoriganum* intelligenti) *Cretici*, *Smyrnæi*, tandem *Heracleotici*, quod *Oniten* vocent, hiftoriam fed confufiorem tradit.

I. *Origanum fylv. Cunila bubula*, Plinij.

*Origanum*, Brunf. Ang. Tur.

*Origanum vulgare*, Trag. Matt. Lon. Lug. Eyft.

*Origanum fylv. Dod. Cord. in Diofcor. Fuch. Gef.*

horr. Lac. Tab. Cam.

*Origanum onitis majus*, Ad.

*Agrioriganum* five *Onitis major*, Lob.

*Origanum Italicum*, Cæf. Anglicum, Ger.

Folijs longiorib. rotundiorib. variat: florib.

ex candido rubentibus, phœniceis, fanguineis.

*Tragoriganum* Diofcoridis quibufdam.

II. *Origanum fylv. album*.

*Origanum fylv. Cam.*

*Origanum album*, Tab. Ger. defc.

III. *Origanum fylv. humile*: in Prod. defcrip.

IV. *Origanum Heracleoticum*: *Cunila gal-*

*linacea* Plinij.

*Origanum peregrinum* 1. vel 6. Trag.

*Origanum Heracleoticum*, Matt. Gef. hor. Lac.

Ad Lob. Lugd. Caft. Cam. Ger. 1. & 2. Tab.

*Origanum Græcum*, Ang.

*Origanum alterum*, Cæf.

Eft flosculus ex albo purpufcentibus: eft & candidis.

V. *Origanum Creticum*.

*Origanum Heracleoticum* in Creta, Cord. in Diofcorid.

*Origanum Creticum*, Gef. hor. Cæf. Cam.,

*Origanum Anglicum*, Dod.

*Hyllopus Diofcoridis*, Ang.

*Origanum Syriacum* fylveltre, Ad.

VI. *Origanum Onites*: & Matth. Gef. hor.

Lac. Lon. Caft. Lugd.

*Origanum Heracleoticum*, Ruel.

*Marum* quibufdam, Dod. gal. Lac. Lugd.

*Hyllopus genuina* Græcorum, Ad. Lob.

*Hyllopus legitimus* & *Mefuzi*, fcarfapepe *Hetrufcis*, Cæf.

*Majoi ana major* Anglica, Tab. Ger.

*Origanum fyl.* potius quam *majorana*, Col.

VII. *Origanum Onites fl. albicantibus*.

*Origanum Onites*, aliud à Matthioli, Cam. hor.

*Origanum Onites dictum*, Eyft.

VIII. *Origanum folio fubrotundo*.

*Origanum Onitis Galloprovinciæ minus*, Ad.

*Origanum Mofpeliacum*, Cam. ep. Matth. & hort. Tab.

IX. *Origano cognata Zatarendi*: quid?

*Zatarendi*. Alpino, quod ficcatum, tuftat *Origanum* pro obfonio comedunt.

## T R A G O R I G A N U M.

**T** *Παρα* Diofcor. l. 3. c. 31. (*origani a. genus eadem*, quod aliqui *hircum* interpretantur. cum fic dicitur videatur, quafi capri gratum fit) quod pro locorum ratione variat: quoddam fpeciofus faporibus folijs: alterum gracilius, folijs exilioribus, quod aliqui *αἰνίου* vocant. Plinio l. 29. c. 17. *Tragoriganum* fimilius eſt *Serpyllo fyl.* Is *Tragoriganum* differentiâ à Diofcoride propofitus, ſub *Origano Heracleo* recenſet.

I. *Tragoriganum Serpyllifolium*.

*Tragoriganum*, Matt. Lac. Caft. Lug. Ger. 2. Tab.

II. *Tragoriganum latifolium*.

*Marum*, Matth. Caft. Lugd. Tab.

*Tragoriganum*, Dod. Lugd.

*Tragoriganum alterum*, Gef. hor. Ad. Lob.

*Thymum Creticum*, Ger. ico.

III. *Tragoriganum anguſtifolium*.

*Tragoriganum a. Cluſ. hiſp. & hiſt. Dod. Lugd. Cam. ep. Tab.*

*Tragoriganum flore albo*, Lob.

IV. *Tragoriganum Creticum*.

*Tragoriganum*. Cretenſe apud Venetos, Ad. Lob.

*Tragoriganum a. altera ſpecies*, Cluſ. hiſp.

*Tragoriganum Hiſpanicum* 3. Eid. hiſp.

*Thymum magnum*, Alp.



# SAMPSUCHUM, SIVE AMARACUS; MARUM SIVE MAJORANA.

**Σ** *Amorcan* in *Cyzico* & *Cypro* laudatissimum, secundum locum sibi vindicat *Aegyptium*: vocatur à *Cyzico* & *Sicula* *Amorcan*, *Dioscorides* l. 3. c. 47. Et *Theoph.* l. 1. hyst. 15. & hyst. 1 & 7. *Amaracum* (vel ut *Gaz.* a reddit *Sansucum* vel *Sampsuchum*) suffrutex est & coronaria herba minutis folijs condita ut *Serpillum*, &c. *Amaracum*, *Dioles medicum* & *Sicula* gens appellavere, quod *Aegyptum* & *Syria* *Sampsuchum*. *Plinius* l. 21. c. 11. & 12. *Sampsuchum* sive *Amaracum* in *Cypro* laudatissimum & odoratissimum, ex quo oleum, quod *Sampsuchinum* & *Amaracinum*, &c. *Μαρών ὀνόματι*, *Dioscoridi* l. 3. c. 49. *Majoranam* esse volunt.

Genera duo *Plinio* l. 12. c. 24. *Maron* in *Aegypto* nascitur pejus quam *Lydium*, majoribus folijs ac varijs illa brevior ac minuta & odorata.

I. *Sampsuchus* sive *Marum*, *Masticen* redolens.

*Clinopodium*, *Dod. gal.* *Gef. hor.* (cui & herba *Sampsucho* cognata) *Cam.* (Ang.

*Helenium*, *Theoph.* fortè *Tragoriganum* *Diof.* *Marum*, *Gef. hor.* *Cast. Tab. Ger.* peregrin. *Eyst.*

*Marum*, *Mastic Gallorum* & *Anglorum*, *Ad.* *Marum*, an *Helenium* odorum *Theoph. Lob.*

*Marum* verum, vulgo *Mastic*, *Lugd.* *Marum* vulgare sive *Clinopodium*, *Dod.*

*Tragoriganum* 1. *Clus. hisp.* & *Tragoriganum* *Hispanicum* 1. cujus semen *Ambræ* dulcis nominemissum, *Eid. hist.*

Ludit folijs nunc longioribus, nunc rotundioribus, modò angulolis & hederaceis.

II. *Marum* repens verticillatum.

*Sampsuchus* *Diof.* sive *Amarcus* serpens, *Ad.* *Marum* supinum, *Lob.*

*Marum* ex *Sicilia* allatum, *Sampsuch.* *Diof. Cef.* *Marum* repens, *Tab.*

*Pulegium* angustifolium, *Ger. ico.*

III. *Majorana* *Syriaca* vel *Cretica*.

*Marum* *Syriacum*, *Ad. Lob. Lugd. Tab. Ger.* *Marum* *Cretense*, *Alp.*

IV. *Majorana* natiuifolia.

*Majorana* nobilis, *Brun. Ang. fativa*, *Trag. Lon.* *Majorana* gentilis, *Tur. tenuifolia*, *Tab. Ger.*

*Amaracus* sive *Major. tenuif.* *Matt. Cast. Lugd.*

*Amaracus*, *Sampsuchum*, *Gef. hor.*

*Majorana* tenuior & minor, *Dod.*

*Amarac. tenuior*, *Ad. Lob. tenuif. urbana*, *Cam.* Hæc apud nos in *Majoranam* vulgarem degenerat: & huic *Cuscuta* circumnascitur, quæ

*Epimajorana*, *Tab. Ger.*

V. *Majorana* vulgaris.

*Majorana*, *Brunf. Dod.*

*Amaracus*, *Matth. Fuch. Lugd.* qui *Matth. & Fuch.* iconem proponit.

*Sampsuchus* sive *Amaracus*, *Latinis* *Majorana*, *Cord. in Diof. & hist.*

*Amar. vulgarior*, *Ad. Lob. ico. Eyst. major*, *Cast. Amaracus*, *Majorana*, *Sampsuchum*, *Gef. col.*

*Sampsuchus*, *Lac. Lob.*

*Majorana* vulgo, *Maron*, *Diof. Cæf.*

*Majorana* sive *Amarac. major*, *Gef. h. Tab. Ger.*

*Amaracus* *sylv. annua*, *Cam.*

Hanc latis admodum folijs & capitulis rotundioribus sub *Majorana* latifolia *Eyst.* proponit.

VI. *Majorana* *sylv. perennis*: & *Cam.*

*Majorana* *sylv. Trag. Gef. hor.*

*Origano* cognata *majorana* major, *Eid.*

Hanc *Londino* folijs sublevis accepimus.

VII. *Majorana* *sylv. latifolia.*

*Amaracus* *sylv. folijs latioribus*, *Cam.*

*Majorana* *sylv. Eid.*

Hanc ex horto *Sprengeri* *Heidelb.* habemus.

## CLINPODIUM ET ACINOS.

**K** *Λινποδιον* *Dioscoridi* l. 3. c. 109. quod flores habeat ac ut *oxione* *ocimo* *quain*: Et *Plinio* l. 24. c. 15. quod orbiculato florum ambitu speciem pedum lecti prabeat, ex intervallu *Marrubij* modo dispositu: quod sanè *Clinopodio* primo pulchro convenit. Verum ab alijs *Ocymoides* nominari monet, & *Serpillo* similem surculo *Sampalme* alius udine: quæ de secundo dici rectè possunt, propter foliorum formam cum *Serpillo* & odorem cum *Ocimo*. *Ακινος* à *ἀκινος* herba coronaria *ocimo* similis, sed *hirsutior* atq; odorata, *Diof.* l. 3. c. 50.

I. *Clinopodium* *Origano* simile.

*Origano* quartum & minus, *Trag.*

*Clinopodiu*, *Cord. in Diof. Gef. h. Lac. Cast. Tab.*

*Clinopodium* vulgare, *Matth. majus*, *Cam.*

*Betoni.*



Erini in Pauli, Guil.  
 Erini, in Matth. Lon.  
 Origani sylv. Fld. verticillatus, Thal.  
 Celastri lappina, Th.  
 A y m a f e l l i c i s, Ad.  
 Acinos, Ger.  
 Acinos, live Clinopodium sylv. Lugd.  
 Clinopodium primum, Matth. Clus. pan. Lugd.  
 Herba Origani vulgari simili, Cæs.

Duplex est: elatius majore foliis humilior  
 arvensem, minore flore communiter purpura-  
 scente, rarius albo.

II. Clinopodium arvense Ocimi facie.  
 Basilicum tertium, Trag.  
 Basilicum monanthum, Eid.  
 Pinastelinopodium & Clinopodium alterum, Matth.  
 Acinos, Dod. gal. Fuch. ico. Lac.  
 Ocymistrum, Fuch. I ugd.  
 Polegium petiæum, Gesl. hort.  
 Ocimum parvum, Lon.  
 Ocimum sylv. live Acinos, Dod. Ger.  
 Clinopodium, Ang. Tur. Cæs. majus, Thal.

Clinopodium albidum Matth. sol. Lugd. Tab.  
 Clinopodium albidum Ledtipes, A.  
 Clinopodium vulgare, Lon. Clus. hist.  
 Foliis est modo humilioribus, add angustioribus,  
 ratione loci modo crassius, add repens:  
 aliquando hirsutius, alioquando pene laeviss.  
 floribus cæruleis, rarius albis.

Hanc Matth. ut ex eius descriptione patet,  
 Manardum secutus, & post Lugd.

Acinos nomine exhibuere.

III. Clinopodium Ocimi facie alterum.

Acinos Anglicum, Clus. pan.

Acinos Dioscoridis forte, Eid. hist.

IV. Clinopodium montanum.

Clinopodium Austriacum, Clus. pan. & hist.

Flore est purpureo intenso seu violaceo: tar-  
 rius albo.

V. Clinopodium alpinum hirsutum.

Clinopodium alpinum, Ponæ.

VI. Acinos latifolia.

Acinos, Urticella olitoribus, Col.

Acinos Dioscor. nomine ab Imperato accepim.

## E R I N U S.

**E**rinus Dioscoridi l. 4. c. 29. foliis ex Ocimi minoribus, & lacteo succo surget, & c. Plinio l. 23. c. 7. Herba  
 Erini nomine quatuor a recentioribus plantæ proponuntur.

1. Erini seu Ocimi aquatici nomine à Matth.  
 quem sequuntur, Lac. Lon. & I ugd. hist.

Basilicum aquaticum, Cast. cujus folia incisuris  
 carent: pro hac

Hieracium Sabaudum latifolium, Guilandi-  
 nus nobis ostendit.

2. Erinus Dalechampi, in hist. I ugd. sed quid?

3. Erinus Cæs. & Columnæ: est Rapunculi  
 minimi species.

4. Erinus vel Caprificus, Nicandro & Pli-  
 nio, forte Efula dulcis, Tragi: vel altera Efula  
 sylv. eisdem, Adversar.

## O C I M U M.

**O**cimum Dioscoridi l. 2. c. 27. Theophr. l. 3. c. 13. cuius & Varro in Plinio l. 19. c. 7. à celeritate provenientis  
 dicitur. Recentior in Graeco Basilicum, id est regale. unde ab Actio dicitur Basilicium appellatur.

Genera plura recentioribus, quæ potius nomen dederunt magnitudine foliorum, quæ latiora, angustiora  
 plana vel crispâ: coloris eorundem quæ viridia, nigricantia, maculata: florum quæ candida vel purpurea: et  
 odore eorum in aliquibus Caryophyllos, in aliis cum eorum habent.

I. Ocimum latifol. maculatum vel crispum.

Ocimum latifolium, Cæs.

Basilicum Indicum, vel potius Hispanicum,  
 Cæs.

Ocimum aut Basilicum crispum exoticum aut  
 Hispanicum, Cam. ep. Matth.

Ocimum crispum Hispanicum, Tab.

Ocimum Indicum, Clus. hist.

Basilicum Indicum maculatum, Eyf.

Est majus & rarius.

II. Ocimum viride folijs callaris.

Ocimum Indicum viride nigrum, folijs protuber-  
 antibus, Eyf.

III. Ocimum folijs hibriceis viridem.

Ocimum crispum viride, Eyf.

Odore est inter Camphorati & Citrum con-  
 fusum.

IV. Ocimum caryophyllatum maximum.

ff Ocym.

Ocimum in virtutibus Alexandriæ, Alp.

Ocimum latifolium magnum, Eyst.

Folys est oblongis colore rubro suffusis eximie odoratis.

V. Ocimum caryophyllatum majus.

Basilica major, Trag. Lon.

Ocim. maj. Matth. Fuch. Dod. gal. Lac. magn. Tur.

Ocimum maximum, Dod. Lugd.

Ocimum nigrum, Cord. in Diosc. & hist.

Ocimum maximum caryophyllatum, Ad. Lob.

Ocimum caryophyllatum, Gef. hort.

Hoc cum magis minusve hirsutum sit, ab alijs hirsutum, ab alijs læve pingitur: color tam foliorum, quam florum, in alio alb. in alio niger est.

VI. Ocimum citri odore.

Ocimum citratum, Gef. hor. Cæf. Eyst.

Ocimum maximum citratum, Lob.

Ocimum medium sive citratum, Ad. Tab. Ger.

VII. Ocimum vulgaris.

Basilicum sive Ocimum, Brunf.

Ocimum medium vulgare, Ad. Eyst.

Basilica minor, & Baccharis Germanica, Trag.

Ocimum medium, Matth. Cast. Cam. Lugd. qui

Matth. & Fuch. figuram exhibet.

ai. Ocimum Nababianum, Cord. in hist.

Ocimum mediocre, Fuch. j. & medium, Cæf.

Ocim. sive Basilicum medium vulgare, Lob.

Ocimum magnum, Tab. Ger.

VIII. Ocimum minus angustifol. folys serratis.

Ocimum minus angustifolium flore albo, Eyst.

IX. Ocimum anisi odore.

Ocimum anisatum, Eyst.

Medio vulgari, figura respondet odore Al. j.

X. Ocimum minimum.

Ocimum crispum, Brunf. Lon.

Ocimum caryophyllatum, vel minus, Matth.

Ocimum exiguum Fuch. minus, Dod. gal. Tur.

Basilicum minus, Cast.

Ocimum minus caryophyllatum, Cord. in Diosc.

Tab. Ger.

Ocimum minimum Amaraci figura caryophyllatum, Lob. Eyst.

Ocimum parvum, & Ocimum caryophyllatum, Lugd. duæ figuræ.

Ocimum alterum tenuifolium, Cæf.

XI. Ocimum affinis.

Albahaca herba, quæ odoris gratia in nova Hispania excolitur, Joseph. Acosta l. 4. c. 27.

\*\*\*\*\*

## SECTIO QUINTA.

MENTHA MENTHA SYLVESTRIS SIVE MENTASTRUM;

MENTHA AQUATICA, SEU SISYMBRIUM; MENTHA CATARIA.

Calamintha; Melissa; Mentabium; Galeosifis sive Lamium; Urtica mortua; Ur-

tica; Aliflon; Idieritis; Euphrasia; Melampyron & Cratægonon;

Petonica; Serratula; Scrophularia & Ruta

canina; Stachys.

## M E N T H A.

**M**entha veteribus Græci, Plin. l. 19. c. 8. auctore, *mentha* dicebatur: at odoris suavitas nomen apud Græcos mutabitur, & *hinc* ab *hinc* & *de* *hinc*, i. e. suavitatis odor, vocatur, quæ voce Dioscor. l. 3. c. 4. usus est. Dioscoroph. 7. b. ubi Gal. 2. a Mentastrum convertit: at Mentha (forte Mentastrum intelligens) s. b. meminit. Genera Dioscoridi tria sunt, & sylvestris, quam Mentastrum dicit, volunt interpretes. I. Iulium Galenus s. simpl. Mentha est odorata, quæ Dioscoridi tria sunt, & altera in odore, quam Calamintham vocant. Et Plin. l. 6. c. 120. c. 14. Mentha genus ejus sylvestre Mentastrum est. Sic l. 20. c. 14. Nepeta mentionem facit, ex qua ut & Mentastro, Origano, Cunila, Serpillo, Marrubio vinum conficit, l. 14. c. 16. offendit.

*Mentha sativa.*

I. Mentha hortensis corymbifera.

Balsamita, Brunf. major, Dod. gal.

Alifma, Trag.

Mentha Sarracena, Nicolao in Martiat. Ang.

Cord. in Dioscor. qui Chrysoconie cognatam

vult) Lac. Lon. Cam. Eyst.

Mentha Græca, Matth. Gef. hort. Cast.

Mentha Romana, Lac.

Mentha corymbifera major, Cord. hist.

Costus hortorum, Gef. hor. Ad. Lob. Lugd.

Ovaria, Gef. hort.

Herba S. Mariae vulgo, Cæf.

Hæc quædam Lepidium Dioscoridis: at

Cæfal.



Balsamina agrestis & Nepeta 3. Trag.  
 Sifymbrium sylv. Matth. Lugd.  
 Sifymbrium, Fuch. Dod. primum, Thal.  
 Sifymbrij 1. species prima, Cord. in Diosc.  
 Calamentum 3. Ang.  
 Calamintha aquatica, Gesn. col. Tab.  
 Sifymbrium agreste aquaticum, Gesn. hort.  
 Menta sylv. altera, & Menta aquatica, Lon.  
 Menta sylv. 1. Cæf.  
 Aquatica, sive Sifymbria mentha, Ad. Lob.  
 Sifymbria mentha, Ger.  
 Balsamita officinarum, Eyst.

Hæc aliquando tota rubet: magis minusve hirsuta existit.

II. Menta rotundifolia palustris minor, sive flore globoso: pro 3. in Prodromo descripta.

III. Menta palustris folio oblongo.

Mentastrifolia aquatica hirsuta, Ad. Lob. Lug.

Calamintha 3. Dioscoridis, Lob. ico.

Mentastrum minus spicatum, Lugd.

Mentastrum aliud hirsuto folio, Cam.

*Menta cataria.*

I. Menta cataria vulgaris & major.

Menta non odorifera, B. unf.

Nepeta vulgaris, Trag.

Nepeta fruticosa, Cord. in Diosc.

Herba gattaria, Matth. Cast.

Calaminthæ 1. genus, Fuch. 3. genus, Dod. gal. Tur. Thal.

Calaminthæ species quibusdam, Gesn. hort.

Calamintha montana, Lon.

Balsamita major, Lac.

Cattaria herba, Dod.

Cattaria, sive Menta catti, Ad.

Menta cataria, Lob.

Gattaria vulgò, Calamintha 3. Diosc. Cæf.

Herba felis, Lugd.

Menta felina, Tab. Ger. Eyst.

Nepeta Germanica, Cam.

Alij Calaminthæ, alij Melissæ, alij Nepetæ, alij Urticæ, quæ Herculaneæ Plinio, species faciunt: alij inter Calamintham & Melissam mediam volunt.

II. Menta cataria minor.

Cararia minor, Clus. pan.

Cattaria tenuifolia Hispanica, Eid. hist.

Nepeta minor, Cam.

III. Menta cataria minor alpina: pro 4. in Prodromo descripta.

Nepetella, Eyst.

IV. Menta cataria latifolia.

Menta cataria peregrina latifolia, Lob. Lugd.

Menta felina sativa latifolia, Tab.

Mentacattaria altera, Ger.

Nepeta peregrina, Eyst.

V. Menta cararia angustifolia major.

Menta cataria peregrina angustifolia, Lob. Lugd.

Cattaria folio longiore, Dod.

Menta felina sativa angustifolia, Tab.

Salvia Romana, Ger. ico.

VI. Menta cataria angustifolia minor: sub 3. in Prodromo descripta.

## CALAMINTA.

**K**αλαμίνδα, quasi bona & utilis mentha, nidore enim suo, ut habet Aristophanes, serpentes, vel accensa, vel fulstrata, aut Dioscoridis, l. 3. c. 43. sugare solet.

Genera tria Dioscoridis: 4. folijs Ocimi, montibus familiaris: 2. pulegij simili, sed major, quam Syriacum, 3. pulegij sylv. Romani ninnivæ vocant (& Plinius, l. 20. c. 14. Nepeta obiter meminit) 3. Mentha, vel vestri cognata est folijs oblongis, caule & ramis, quam superiora majoribus, sed viribus ineffica, tor.

I. Calamintha incana ocimi folijs.

Calamintha 2. incana, Lob. Lugd.

Calamintha Cretica, Cam.

Calamintha montana incana minor, Tab.

Calamintha montana vulgaris, Ger.

II. Calamintha pulegij odore, sive Nepeta.

Calamintha altera, Matth. Lugd. (fortè pulegijum Diosc.) Lac. ico. 1. ug. (duplici figura) Cam.

Nepeta agrestis, Cord. in Diosc.

Calamintha Italica pulegij odore, Gesn. hort.

Calamintha altera odore gravi Pulegij, folijs

maculatis, Ad. Lob.

Pulegium sylv. sive Calamintha altera, Dod.

Calaminthum, quod vulgo Nepesa, Cæf.

Calamintha arvensis 2. Tab.

Calamintha montana præstantior, Ger. ico.

Calamintha angustis folijs, Eyst.

III. Calamintha vulgaris, vel officinarum Germaniæ.

Calamintha, Matth. 2. Thal. vulgaris, Cam.

Calamintha montana, Gesn. hort. Lac. Dod.

Cæf. Lugd.

Calamintha montana vulgaris, Lobel. Tab.

Eyst.

Nepeta

*Nepeta montana*, Cerd. in Diosc.

*Calamintha*, *Thymus*, *Dalechampia*, Lugd.

*Melissa*, *Thymus*, *Ger. ico.*

IV. *Calamintha magna* flore.

*Calamintha montana* præstantior, Adv. Lob.

Lugd. Cam. Tab. Eyst.

*Calamintha*, *Alig.*

*Calamintha montana*, Cæf.

*Scopolia*, *Salvia* agrestis, Ger. ico.

V. *Calamintha vulgaris* exiguo flore, quæ in *Pyrolis* describitur.

VI. *Calamintha arvensis* verticillata.

*Nepeta*, *Thymus*, *Opus.*

*Nepeta*, *ag. ico.*, *vel 4.* Trag. Lugd.

*Morcha*, *Thymus*, *ex ico.*, & *Pulegium* sylv. Eidem, & *Horis* colore sylv. differt.

*Calamintha aquatica*, Matth. Lugd.

*Calamintha aquatica* *Bel. alium*, an *Polycnemum*, quasi multis ribis, Ad. Lob.

*Calamintha altera*, Dod. gal. Fuch. Tur.

*Calamintha arvensis*, Cefn. hort. Tab.

*Nepeta*, Lon.

*Polycnemum Lobelij*, Lugd.

VII. *Polycnemum Dalechampi*, Lug. quid.

## MELISSA.

**M**ELISSA, *Thymus*, *Ger. ico.*, id est, *Apiastrum*, quod hac *απιαστρου* apes delectentur, *Dioscoridis*, *lib. 1. cap. 17.* *Thymus*, *lib. 21. cap. 20.* *Melissophyllum* sive *Melittus*: & prius, *lib. 21. cap. 9.* *Melissophyllum* quod *Ap. ico.* *Thymus*, *Melissa* ab *apibus*, quæ etiam *vidiosæ* dicuntur.

I. *Melissa hortensis*: & Lon.

*Melissa*, Brunf. Ang. Dod. Cæf. Ger. officin. Eyst.

*Melissa domestica*, vel I. Trag. descript. nostras, Cam.

*Melissoph.* Matth. Gcf. hort. Cast. Lugd. Tab.

*Melissoph.* vulgare vel adulterinum, Fuch.

*Apiastrum*, Matth. Cerd. in *Dioscor.* Lac. Tur. Ad. Lob.

*Croceus*, Gcf. hort.

Hanc in montibus sponte nasci Matth. asserit, quam

*Melissophylli* sylv. genus *Matthioli*, Gcf. hort. nominat.

II. *Melissa peregrina* folio oblongo.

*Melissa*, *Moldavica*, Matth. Cast. Lugd.

*Melissa*, *vel Cedronella*, id est, *Citrigo Turcica*, Gcf. hort.

*Melissophyllum Turcicum*, Ad. Lob.

*Melissa* genus ex Oriente, Cæf.

*Melissa Turcica* *Dalechampi*, Lugd. Camer. Tab. Ger.

Variæ magnitudinis: hinc duæ figuræ in *Lugd. hist.* colore quoque flores, qui cæruleus, purpureus, & albus.

*Melissa Moldavica* flore cæruleo, & flore albo, Lugd.

III. *Melissa Moluccana* odorata.

*Melissa Constantinopolitana*, Matth.]

*Cardiaca Melica*, sive

*Molucca Syriaca*, Ad.

*Molucca lævis*, Dod. Ger.

*Cardiaca melica*, sive *Molucca minus aspera*, Lobel.

*Molucca* sive *Melissa Constantinopolitana*, Cam. i. Cast.

*Molucca* i. Cæf.

(Iugd.)

*Molucca* sive *Melissa Turcica* *Dalechampi*, *Melissophyllum Constantinopolitanum*, Eid.

*Cardiaca Syriaca*, Tab.

*Molucca odorata spinosa*, Cast. Eyst.

Alteram lævem, alteram aculeatam Matth. dicit: aculeis carentem nullam vidimus.

IV. *Melissa Moluccana* tærida.

*Melica*, vel *Molucca asperior*, Ad. Cam.

*Molucca asperior Syriaca*, & *Mafuc* *Turcorum*, Lob.

*Molucca spinosa*, Dod. Lugd. Ger.

*Molucca altera*, Cæf.

*Molucca*, vel *Melissa Constantinopolitana* & *Cardiaca Syriaca aspera*, Tab.

*Molucca lævis* in odor, Eyst.

Utramque *Moluccam* A. yfio Galeni congenerem, ut & *Dioscoridis* & *Plinii* *Casalspius* voluit.

## MARRUBIUM.

**M**ARRUBIUM, *Dioscoridis*, *lib. 3. c. 119.* id quod *Marrubium album* dicitur, nominat: at quod nigrum, *lib. 3. cap. 17.* vocat. *Plinius*, *lib. 20. cap. 22.* *Marrubium*, quod *Græci* *μαρρυβιον* vocant.

*Græci* *μαρρυβιον*, *lib. 6. hist. 1.* & *2.* proposuit: aliud folio herbido, incisum profundioribus

utuntur: alterum rotundius squallens, incisuræ habens obscuriores (Prasium innuere videtur.) Et in l. 27. c. 22. duo genera, ex Castorū sententia, nigrum, & quod magis probat candidum.

*Marrubium nigrum.*

I. Marrubium Cardiaca dictum, fortè primum Theophrasti.

Marrubium mas, Brunf.

Melissa sylv. Trag.

Cardiaca, Matth. Dod. gal. (& Sideritis.) Gef.

hort. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæl. Thal. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Lycopsis, branca lupina, Ang.

Cardiaca, vel Lycopos. Fuch.

Alysson Galeni & Aëtijesse, Cæsalp. cenfer.

II. Marrubium palustre glabrum.

Marrubium aquat. Trag. Ad. Lob. Dod. Thal.

Marrubium palustre, Dod. gal. Lon. (Lugd.

Sideritis.) Matth. Ang. Gefn. hort. Lac. Lugd.

Cast. Cam. 2. Lon.

Lancea Christi, Gefn. hort.

Verbenæ alterum genus, Cæf.

III. Marrubium palustre hirsutum: quod 1. in Prodomo.

IV. Marrubium nigrum fœtidum, Balloce Diofcoridis. (Lon.

Marrubium majus, vel 1. Trag. nigrum, Gef. h.

Balloce, Matth. Fuch. Tur. Cord. in Diosc. Lac.

Dod. Lob. Cæf. Cast. Lugd.

Marrubium nigrum fœtidum, Ad.

Marrubialtrum, Tab.

Marrubium aquaticum, Ger.

Variat folijs majoribus & minoribus.

V. Marrubium nigrum rotundifolium.

Ocimum Valentinum, Clus. hisp. & histor. Lugd.

Marrubium Hispanicū odore Stœchados, Lob.

Marrubium Hispanicum, Tab. Ger.

VI. Marrubium nigrum longifolium.

Herba venti Monspel. Gefn. hort. Lob. Lugd.

Sideritis Monspelensium, Lugd.

Parietariam Monspelensium à Cordo vocari,

Lob. & Lugd. asserunt.

*Marrubium album.*

I. Marrubium album vulgare.

Marrubium fœmina, Brunf. candidum, T. 22.

Marrubium, Matth. Cord. in Diosc. Fuch. Dod.

Tur. Lac. Cæf. Cast. vulgare, Clus. hisp. Eyll.

Marrubium album odorum, Ad.

Marrubium, Gefn. hort. Lob. Lugd. Tab. Ger.

Praium, Ang.

II. Marrubium album villosum. an Praium

Diofcoridis: quod 2. in Prodomo.

III. Marrubium album crispum: quod 3.

in Prodr.

IV. Marrubium album latifolium peregrinum

Marrubium candidum, Dod. Ger. Hispanicum, Tab.

Marrubium candidum alterum Hispanicum,

Lob.

Marrubium alterum pannonicum, Clus. pan. &

Marrubium Creticum, Cam. (grinum.)

V. Marrubium album angustifolium peregrinum

Marrubium Creticum angustiore folio, Adv.

Lob. Eystett.

Marrubium Creticum, Dod. Ger. Tab. Lugd.

qui à priore non distinguitur.

Marrubium Creticum aliud, Cam.

VI. Marrubium album peregrinum brevibus, & obtusis folijs.

Marrubium Creticum angustis folijs inodorum, Eystett.

GALEOPSIS SIVE LAMIUM VEL URTICA MORTUA.

*Γαλεόψις* = γαλεόψιδος tota frutice, cum caule & folijs Urticam refert at folia leviora & tria aut quatuor flores tenues sunt ac purpureascentes Diofcoridi, l. 4. c. 91. Et Plinio, l. 27. c. 9. Galeopsis aut Galeobolon, &c. Urtica mortua & iners, quod folijs innoxia sit, quam Plinius, l. 21. c. 15. inter Urticas recenset. Lamium vocavit eam quæ innoxia sit & morsu caret: & l. 22. c. 14. addit album habere in medio folio.

I. Lamium purpureum fœtidum, folio sub-

rotundo, sive Galeopsis Diofcoridis.

Urtica labeomas, Brunf.

Lamium, Trag. (vel Urtica 8. 9. 10.) Fuch. Dod.

gal. Lugd.

Galeopsis Ericio Cord. Cord. in Diosc. Lon.

Cast. 2. Tab.

Galeopsis vulgaris fœdens purpurea, Adv. sive

Urtica non mordax, Lob.

Galeopsis purpurea, Lugd. Cast.

Urtica mortua, Gefn. hoir.

Urtica iners altera, Dod.

Urtica non mordax vulgaris fœdens purpurea,

Lob. ico.

Lamium, sive Urtica non mordax vulg. & fœ-

tida, Clus. pan.

Habe-





*Genera duo Dioscoridi: una agrestior, altera non aque aspera, &c. at Plinio l. 21. c. 15. plures sunt differtentia: sylvestri, quam scirpinam vocant, mitior: & in sylvestri qua dicitur Cania, acrior: qua vero odorem fundit, Herulanea: qua innoxia morfu carens, Lamium vocatur Vide etiam l. 22. c. 13. & 14. Distinguiimus in pungentes & non pungentes: pungentes in majorem & minorem: non pungentes, in fuscis & non fuscis: & haec in maculatis, & non maculatis: qua florū colore purpureo albo, luteo variant.*

#### Urtica urens.

I. Urtica urens maxima.  
Urtica major, Brunf. Fuch. Dod. gal. Lon. Thal. Taber.

Urtica vulgaris urens r. Trag.  
Urtica secunda, Matth. Lac. Cæf. Lugd. Cast.  
Urtica, Cord. in Diosc. urens, Ger. urens altera, Dodon.

Urtica sylv. major, Gefhor. sylv. asperior, Lob.  
Urtica communis. five major & foemina, Ad.

Hujus & caulis & radix aliquando parum rubent, & dicitur

Urtica rubra, Tab. Ger.

#### II. Urtica urens altera.

Urtica vulgaris urens altera, Trag.  
Urtica oligophyllos (a folior. paucitate) Lug.

#### III. Urtica urens minor.

Urtica minor, Brunf. Fuch. Dod. gal. Cord. hist. Lon. Thal. Tab. Ger. syiv. minor. Gefhor.  
Urtica tertia, Trag. Matth. Lac. Lugd. Cast.  
Urtica exigua. Cæf. urens minima, Dod.  
Urtica minor five Cania Plinij acrior, Ad.  
Urtica minor acrior, Lob.

IV. Urtica urens pillulas ferens: 1. Dioscoridis semine lini.

Urtica, Alb. legitima, Clus. hist.  
Urtica Romana, Trag. Fuch. (& vera) Tur. Gef. hort. Eyl.

Urtica syl. five Rom. na offic. semine Lini, Ad.

Urtica Rom. vel mascula, Lob. Can. Tab. Ger.

Urtica prima, Matth. Lac. Cæf. Cast. Lugd.

Urtica quæ in Alexandria Angiar dicitur, Alp.

Urtica sylvestris, Dod. gal.

Urtica urens prior Dod.

#### Urtica sativa aculeata.

I. Urtica aculeata folijs serratis.

Cannabis sylv. Trag. Lugd. spuria, Ger.

Cannabis sylv. spuria altera, Lob. ico.

Cannabina alba, Tab.

Floribus communiter purpureis: rarius candidis.

II. Urtica aculeata folijs serratis altera.

Cannabis sylv. spuria tertia, Lob. ico.

an Sideritis Cordi, Thal.

Alyssum arvense album, Tab.

Urtica mortua quarta, Dod. post.

III. Urtica aculeata folijs non serratis.

Sideritis altera Matthioli, ipsi Lugd.

Cannabis spuria facie Urticæ, Lob. ico.

Urtica fatua sylv. aculeata, Thal.

### A L Y S S O N.

**A**lysson Galeni. 2. de Antidoriū herba est Marrubio similis, orbes habens in surculorum summitatibus, asperiores & magis spinosos: flores ad caculeum vergentes: sic dicta eidem, 6. simpl. quod demorsos a cæcabo mirificè juvet. Sed hac a Diosc. l. 3. c. 105. qua folijs est rotundi, & fructu duplicium sentulorum effigie. plures diversæ sunt & Pl. l. 2. c. 11. dicit eandem nomine ratione assignet, cui & alia est, & ad Rubiam lavem referenda.

I. Alysson verticillatum folijs profundè incisis gere suspicatur, Lugdun.

Alysson Galeni, Clus. hisp. & hist. Dod. Lobel. Planta Hispanica Marrubio similis, Col. Cast. Ger.

Alysson Galeni aliud, Cam.

Alyssum Galeni Hispanicum, Tab.

Moluccam spinosam Clusium pro Alyssopin-

Ex horto clarissimi Contareni.

II. Alysson verticillatum folijs creuati

Sideritis Alysson, & Sideritis Heracleæ Diosc.

(Scoridis, Alysson Antonij) Cui ex Galeno, Col.

### S I D E R I T I S.

**S**ideritis (ἀνὸς ἰδιόγητο ἔρρο. ob vim vulnera glutinantem) Dioscoridi l. 4. c. 33.

Genera: Dioscoridi triplex est: 1. aliquibus Heraclea folijs Marrubij 2. folia longius pediculi harentia, seu filicis, utring, numerosa: qua Heraclea Cratæa folijs Coriandro similibus. Plin. l. 25. c. 3. sub Achillæa differentias recensuit: prima Achillæa, qua & Dioscor. altera est Myriophylon Diosc. tertia est Sideritis Hippocreatæ l. 1. Diosc. quarta & quinta Sideritis Heraclea Cratæa & sexta est Sideritis secunda Diosc.

*Sideritis hirsuta.*

I. *Sideritis folijs hirsutis profundè crenatis.*  
*Sideritis herbariorum* 1. Tab.

*Sideritis Monspeliaca Scordioides, Ad. floribus*  
*luteis, Lob. Lugd.*

*Tragoriganum Prassoides, Peninij.*

II. *Sideritis hirsuta procumbens.*  
*Sideritis Heraclea, Clus. hisp. at 3. in hist.*  
*Tetrahit herbariorum, Lob. Lugd.*

*Herba Judaica, Dod.*  
*Sideritis Herculea Dioscoridis, Cæs.*

*Sideritis prima Herculea, Cam.*  
*Sideritis herbariorum 4. Tab.*

III. *Sideritis hirsuta procumbens altera mi-*  
*nimum crenata.*  
*Sideritis quarta & quinta, Clus. hist.*

IV. *Sideritis vulgaris hirsuta erecta.*  
*Sideritis prima, Fuch. Tur. Cord. in Diosc. Gesn.*  
*hort. Thal.*  
*Sideritis vulgaris, Cam. in Matt. vel 2. Clus. hist.*  
*Sideritis quarta, Lon.*

*Sideritis Heraclea, Cord. hist. Tab.*  
*Sideritis sive ferruginatrix, Ad. Lob. ico.*

*Sideritis Herculea altera in vineis, Cæs.*  
*Herba Judaica, Gesl. col.*

*Tetrahit, Lugdun.*  
 V. *Sideritis hirsuta vulgaris humilior*  
*Sideritis secunda, Clus. pan. & hist.*

Illius flos candidus, rictu sanguineis notis as-  
 persus: hujus flos amplior, albus luteo palles-  
 cens paucis rubris punctis aspersis.

VI. *Sideritis hirsuta pallido flore.*  
*Sideritis pannonica 3. Clus. pan. at 6. in hist.*

VII. *Sideritis montana parvo varioq; flore.*  
*Siderit. mont. parvo flore nigro purpureo, Col.*

Caput purpureo nigrescit, umbilico luteo &

collo candicante, à D. Columna accepimus.

VIII. *Sideritis alpina Hyslopifolia.*

*Sideritis montana, Ad. Lob. ico. Lugd.*

*Sideritis herbariorum 6. Tab.*

*Sideritis septima, Clus. hist.*

Variat folijs quandoq; angustioribus, quan-  
 doq; latioribus & in summitate crenatis, qua-  
 lem ex Pyrenæis habemus.

I X. *Sideritis querno folio, Dalech. Lugd.*

Huic similem Britannicæ nomine, ann. 1578.  
 in horto Pasavio legimus.

X. *Sideritis alsine Trixaginis folio: quæ 2.*  
*in Prodomo.*

*Sideritis glabra.*

I. *Sideritis arvensis latifolia glabra.*

*Sideritis 2. Matth. quamvis hist. Lugd. vel it esse*  
*Cannabinam spuriam Lobelij: alij Matrubium*  
*pannonicum Clusij.*

*Sideritis Heraclea altera, Cæs.*

*Sideritis arvensis flore pallido, Cam.*

*Sideritis prima arvensis species akera, Thal.*

*Alyssum majus, Tab.*

*Alyssum Germanicum, Ger.*

II. *Sideritis glabra oblongo splendente fo-*  
*lio: quæ 1. in Prod.*

III. *Sideritis arvensis angustifolia rubra.*

*Sideritis alia in vineis flore purpureo, Cæs.*

*Sideritis arvensis flore rubro, Cam.*

*Sideritici 1. congener secunda, Thal.*

*Ladanum segetum Plinij, & Tetrahit angustifolium alijs, Lugd.*

*Alyssum Galeni flore purpureo, Tab.*

Plinius lib. 26. cap. 8. inquit, Ladano sistitur  
 alvus utroque quod in segetibus nascitur con-  
 tuso & cribrato: hæc ille. Flore est purpureo,  
 rarius albo.

## E U P H R A S I A.

**E**uphrasiam olim *Euphorasium* dictam aliqui volunt, ed quod oculos, eorum caliginem discutiendo, dele-  
 tæet: hinc nonnulli *Ophthalmica* & *Ocularia*: quæ cum paulò supra ducentos annos inventa fuerit,  
 veteribus indicta videtur. Forè hæc vox à Buglossa mutata, quæ et *em Euphorasium* dicitur: quod eo modo  
 quo Buglossa in vinum coniecta, animi lætitiæ faciat: sic & Euphrasia, quam primo loco proponimus, oculos  
 juvat: hinc Germani, oculorum solatium.

I. *Euphrasia officinarum.*

*Eufragia alba, Brunf. vulgaris, Col.*

*Eufragia, Matth. Ang. Cæs. Cast. desc. altera ma-*  
*ior, Thal.*

*Euphrasia & Eufrafia, Fuch. Dod. Lac. Gesl. Ad.*  
*Lob. Lugd. Tab. Ger. vulgaris, Lon.*

*Euphrasia Argentinensium, vel 2. & 6. Trag.*

*Ophthalmica sive Ocularia, Eric. Cord.*

Altera major est & ramifolia, folijs minori-  
 bus: altera minor folijs latioribus, & in mon-  
 tibz ferè semper uniuersis, quandoq; in alpi-  
 bus Helveticorum parva, luteis floribus: floribus

Gg

colore

colore variat, communiter ex luteo albicat, aliquando eleganter ex cæruleo purpurascit: hinc Euphrasia ramosa pratensis flore albo, & Euphrasia minus ramosa, flore ex cæruleo purpurascente, Eyst.

II. Euphrasia folijs lini angustioribus.

Eufragia linifolia, Col. par. 2.

Hæc flore, fructus, semine ac sapore congener & dodrantem non excedit.

III. Euphrasia pratensis rubra.

Eufragia altera, Dod. Lob. Lugd. Col.

Sideritis pratensis rubra, Lugd.

Ericoides rubrum, Thal.

Cristæ alterius generis prima, Cæf.

Odontites, Tab.

Cratæogonon Euphrosyne, Ger.

Habetur brevis & palmatis.

IV. Euphrasia pratensis Italica latifolia.

Eufragia 3. non scripta, sive media, Col.

Brunellæ Italicæ nomine in Phytopinace: ac in Prod. sub Euphrasia purpurea minore descripta: quæ floris colore purpureo, vel candido variat.

V. Euphrasia Italica latifolia altera.

Eufragia major sylv. purpurea latifolia, Col.

VI. Euphrasia pratensis lutea.

Sideritis pratensis lutea, Lugd.

Ericoides luteum, Thal.

Cristæ alterius generis altera, Cæf.

Odontites secunda flore luteo, Tab.

Eufragia sylv. major lutea angustifolia, Col.

VII. Euphrasia lutea alinesolia, radice

squammarum: pro 1. in Prod. descripta.

Anonyma radice dentariæ, Col. par. 2.

## M E L A M P Y R U M

**M**ELAMPYRUS, id est, Triticum nigrum, Galeni 1. aliment. ult. quod ex tritici mutatione generari censetur: & Theophrasto 8. bist. 5. de nostros. & 2. intelligere oportet: quod quibusdam Plinij l. 21. cap. 17. Stelephuros, alij ejusdem Alopecuros, cui nomen à spica molli & lamugine densa, vulpini candui non dissimili, cui proxima Stelephuros, nisi quod illa particulatim floreat: hæc Plinius. Anfertè Aera Plinij l. 18. c. 17. Triticum simili modo enecat aera: quamvis hoc nomen & jam Lolio tribuatur.

I. Melampyrum purpurascens coma.

Trifolium majus, Brunf. ico.

Triticum vaccinum, Trag. Dod. Lon. Lugd.

Melampyr. Dod. gal. Ad Lob. Cam. Tab. 5. Thal.

Parietaria sylv. tercia, Clus. pan. & hist.

Variat floris colore: flore est infernè supernèq; puniceo, medio candido, folijs laciniat: sic infernè puniceo, supernè luteo, folijs minoribus flore luteo in summo albicante: infernè candido supernè luteo: sic ex albo virididq; mixto.

II. Melampyrum cærulea coma.

Parietaria Lipsensium, Trag.

Parietaria sylv. Cam. sylv. 1. Clus. pan. & hist.

Coma, coloris est, modo violacei, modo purpurei, nunc dilutioris, nunc saturatioris: modo candidi.

III. Melampyrum lanuginosum Boeticum.

Parietaria montana Boe. ica, Clus. cur. post.

IV. Melampyrum luteum latifolium.

Parietaria sylv. 2. Clus. pan. & hist. sylv. Eyst.

Cratæogonon, Ad. Lob. Lugd. rubrum & album, Ger.

Satureia lutea Dalechampij, Lugd.

Hyssopus nemorensis & lutea, Lugd.

Melampyrum primum, Thal.

Crista prima, Cæf.

Milium sylvaricum primum & secundum (solum colore floris differunt) Tab.

Κρυανόχρονος Dioscorides l. 3. c. 139. folijs Melampyro similibus describit, & quæ notæ huic conveniunt. At Plinio l. 7. cap. 8. Cratæogonon duplex, alterum Dioscoridis respondens, alterum fortè Persicaria erit.

V. Melampyrum luteum angustifolium: quod sub Melampyro 4. in Phytopinace, & pro Melampyro luteo linariæ folio, in Prod. descr. an Melampyrum sextum, Thal.

VI Melampyrum luteum minimum.

Melampyr. perpusillū luteum, Ad. Lob. ica. Lug.

Melampyrum luteum, Tab.

## B E T O N I C A

**K**ερον άμεδιον copia & varietate: άχρηστον, quod frigidū locū inveniat: Romanū βίτωνος Dioscoridi l. 4. cap. 1. Vetonica qua dicitur in Gallia, in Italia Serratula, à Græcū Cestron, aut Psycrophon, Plinjo lib. 25. cap. 2.

I Beton-

I. *Betonica purpurea.*

*Betonica*, Brunf. Trag. Matth. Ang. Fuch. (purpurea, Eid. ico.) Dod. Gesn. hort. Tur. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæf. Thal. Lugd. Cast. Tab. Ger.

*Betonica vulgaris*, Clut. hist.

*Veronica*, Cord. in Diosc. & hist.

Duplex est: altera spica brevior, altera longior, molliore, serius florente, & alius excrescente.

II. *Betonica alba.*

*Betonica alba*, Brunf. Tab.

*Betonica albo flore*, Dod. Clus. pan. & hist. Cam.

*Betonica candida*, Trag. Lob.

*Veronica alba*, Cord. hist.

III. *Betonica folia capitulo Alopecuri.*

*Alopecuri genus*, sive *Alopecurus montana*, Lugd.

## SERRATULA.

*Serratula à folijs minutim serratis nomen accepit.*

*Serratula*, Matth. Dod. Adv. Lobel. Clus. histon. Lugd. Cast. Cam. Ger.

*Serratula tinctoria*, Tab. tinctoris, Eyst.

*Cerretta* sive *Serretta*, Cæf.

*Centaurioides*, vel *Centaurium majus* syl. German. Th. qui vult *Schartam* seu *Tinctoriū* florem à Trago nominari: quod ego, sed male, a *Solidago Serracenica* 4. Lon. ico. (liās credidi.)

Differentia in folijs ratione incisuræ quadruplex est, ut rectè *Thalius*:

1. *Folij omnibus serratis*, sed incisura carentibus, etiam flore candido, quæ

*Serratula tinctoria* 1. Tab.

*Serratula purpurea*, Ger.

2. *Folij ad radicem integris*, reliquis profundè incisis, quæ

*Serratula* 2. Tab.

*Serratula flore albo*, Ger.

3. *Primum folium ad radicem integrum habet*, reliqua omnia dissecta, quemadmodum *Lobelius* 1. figurâ pinxit.

4. *Folia utroque latere omnia similibus divisionibus divulsa sunt*, quæ

*Serratula* 3. Tab. Ger. & 2. apud Lob.

*Serratula tinctoris*, Eyst.

Majorem & minorem *Cæsalpinus* agnoscit.

## BEHEN ALBUM ET RUBRUM.

*Serratulæ* affinis capitulo squammoso luteo, ut & flore.

*Behen* ab *ad Arabum*: id est *Behen album*, nam rubrum *Behen* *Ackmar* incolæ appellant, *Rauvvolf*. & Lugd. ap.

*Behen Arabibus*, ut *Serapioni* sunt radices *pastinacæ* radicibus similes: quare *Haliabbas* scribit *Behen* & *Pastinacæ* sylv. radices, nulum inter se discrimen habere. Equidem in officinis radices duæ nomine albi & rubri ostenduntur, sed quid sint controversitur: Ali-

qui *Polemonia* sive *Lychnidis*, quæ *Papaver spumeum* & *Behen album* *Montpelienſibus* dicitur speciem esse existimant: *Ben* verò rubrum, alij *Limonij maritimi*, alij *Valerianæ rubræ*, alij *Bistortæ* esse autumant: aliqui verò, *Garzia* & monente & reprehendente, *Zerumbeth* esse statuunt. Quare aliqui in descriptionibus *Arabum*, substituunt *Eryngium*, alij *Tormentillam*, alij *Angelicam*, alij denique *Caryophyllatam*. Licet *Aquarius* & *Myrepsius* *Behen Hermodactylos* esse velint.

## SCROPHULARIA.

*Scrophularia* & à radice nodosa & ab effectu, quod ad *Scrophulas* prodesse credatur, nomen accepit. Alia tamen radice est nodosa, alia fibrosa nodu carens.

I. *Scrophularia nodosa foetida.*

*Scrophularia major*, Brunf. Gesn. hort. Tur. Lon. Adv. Lobel. Cæf. Thal. Lugd. Camer. Tab. Ger.

*Scrophularia*, Match. Lac. Dod. Cast.

*Ocimum alterum*, Trag.

*Galeopsis*, Dod. gal. Fuch. cui minor, in ico.

*Clymenum mas*, Gesn. hort.

Sunt qui *Galeopsis*: alij *Clymenum* *Plinij* 1. 5. c. 7. cui *hederæ folia* tribuit: alij *Chrysip-*

*peame* ejusdem 1. 26. c. 9. (cujus tamen notas nullas addidit) velint. Alij *Millemboria*, *Ficaria*, *Ferraria*, sive *Castrangula*.

II. *Scrophularia palustris non foetida*, seu *aquatica minor*.

*Scrophularia foemina*, Cam. ep. Matth.

*Betonicæ aquaticæ* septentrionalium species minor, Lob. obs.

III. *Scrophularia aquatica major.*

*Ocimum majus*, Trag.

Galeopsis 2. Dod. gal.  
 Scrophulariæ majoris altera species, Gef. hor.  
 Clymenon fœmina, Eid.  
 Clymenon, live Betonica aquatica, Tur.  
 Betonica aquatica, Dod. Ad. Lob. Lugd. Taber.  
 Ger.

Scrophularia major aquatica, Thal.

IV. Scrophularia folio Urticæ.

Galeopsis, Ang.

Scrophularia peregrina, Cam.

an Scrophularia Cretica 2. Clus. hist.

V. Scrophularia flore luteo.

Lamium pannonicum, 2. Clus. pan. alterum five exoticum, Eid. hist.

Scrophularia montana maxima, Col.

In Phytopinace, Matthiolo & Prodromo descripta.

VI. Scrophularia folijs lacinatis: quæ 2. in Prod.

VII. Scrophularia folijs filicis modo lacinatis, vel Ruta Canina latifolia.

Scrophularia Cretica 1. Clus. hist.

VIII. Scrophularia, Ruta canina dicta vulgaris, Sideritis 3. Matth. Cam. qui addit forte à pictore non rectè expressam.

Sideritis altera Diosc. Lac. Cast. Tab. prima, Lon.

Galeopsis 3. Dod. gal.

Ruta canina, Ad. Lob. Lugd. Tab. Clus. hist.

Scrophulariæ similis planta major: Sideritis 2. Dioscoridis, Cæs.

In Matthioli figura folia inferiora cum Tanacetum referant, aliqui Tanacetum inodorum esse suspicantur: at Rutam caninam ipsum exprimere voluisse non dubitamus, cum à Nobilibus. Cortuso Sideritis 3. nomine, Rutam hanc acceperimus, qui eam Matthiolo communicaverat.

## S T A C H Y S.

Σ *Taxos frutex est Marrubio similis, sed longior, folijs subhirsutis, duris, odoratis, candidis, Dioscoridi lib. 3. cap. 120. At Plinio lib. 24. cap. 15. Stachys porri similitudinem habet, longioribus & pluribus folijs, odoris jucundi, coloris in luteum inclinati. Stachys id est spica.*

I. Stachys major Germanica.

Marrubium agreste, vel 3. Trag.

Stachys, Matth. ed. prim. Fuch. Dod. gal. Cord.

in Diosc. & hist. Tur. Lac. Lon. Ad. Cast. Lugd.

Tab. Ger. Dioscoridis, Lob.

Sphacelus alijs Stachys, Guil.

Stachys Germanica, Gesn. ap. minor, Cam.

Pseudostachys, Matth. Lugd.

Salvia sylvestris, Cæs.

Marrubium montanum alterum, Thal.

Sideritis, Heraclea, Col.

Floribus est purpurascens, rarius albis.

II. Stachys Cretica: pro Pseudostachyde 1. in Prodromo describitur.

III. Pseudostachys alpina.

Marrubium montanum 1. Thal.

Alpenkraut: fortè Sphacelus Theophrasti, Lon.

Salvia sylv. nigrior, Cæs.

Salvia alpina, Tab. Ger.

Hujus altera species gravi odore carens: utraque sub Pseudostachyde 2. in Prodromo descripta.

IV. Stachys minor Italica.

Stachys, Matth. Dod. Lugd. Taber. Ger. minor, Cam.

Stachys floribus gratioris odoris, Gesn. ap.

Stachys spuria Flandrorum, Ad. Lob. ob.

Stachys lychnitis, Eid. icô.

Salvia sylvestris 3. Cæs.

V. Stachys Lusitana, Lob. Lugd.

VI. Stachys spinosa Cretica.

Stachys spinosa & Gaiderthymo, id est, Asinum Thymum, Clus. ap. 1.

Gaiderothymum Creticum, Hon. Belli ep. 3. ad Clus. Ponæ Ital.

VII. Stachys palustris fœtida.

Stachys palustris Gesneri, Cam.

Betonica fœtida, Gesn. col.

an Herba Judaica cognata, Eid.

Sideritis 1. gravis odoris, Thal.

Clymenon minus Lugd.

Tertiola, quod tertianas sanet, Cæs.

Marrubium aquaticum acutum, Ger.

Lysimachia galericulata adulterina, Eyf.



## S E C T I O S E X T A.

SALVIA; HORMINUM; VERBASCUM; BLATTARIA;  
ÆTHIOPIS; VERBASCULUM SIVE PRIMULA VERIS;

Sanicula Alpina vel Auricula Urſi; Pinguicula; Digitalis;  
Ephemerum.

## S A L V I A.

**S**alvia, quod ad multa, præſertim ad ſecunditatem, ſalutariuſit: cum ſteriles, huius uſu frequenti gravida reddantur: quare Agrippa ſacram herbam vocavit, *Ætæro* auſtore. *Ἐλκιστικὴ* Dioſcoridi l. 3. c. 40. (quaſi in tabernum redacta, cum herba ipſa ſemper retorrida & exurea videatur: id enim *ἐπίκαιρος* & *ἐπιδυμῶς* ſignificat: folia enim attritus veſtibus comparantur) & *ἰθαγίſκος* & *ἐπὶ γυνὴν* dicitur. Plinius l. 22. c. 25. Lenti ſylveſtri annumerat, putans *Eleliſthæcon* à Lente dictum, ab alijs *Phæcon*. Eſt inquit, & ſylveſtris *Eleliſthæcos* à *Græciſſis*, ab alijs *Phæcos*: Eſt etia ſariva lente levior & folio minore atque ſiccior & odoratore (quibus *Sphacelum* Theophraſti innuit.) Eſt & alterum genus ejus ſylveſtris, odore gravi: hæc mixturæ ſolia habet *Cotonæi* mali effigie, ſed minor & candida hæc eſt apud Dioſcoridem hiſtoria *Salvia*, quam cum *Phæco* & *Aphæca* confundit ſubjungit: noſtri, qui nunc ſunt herbarij, *Eleliſthæcon* Græcè, Latine *Salviam* vocant, mentaſimilem, canam, odoratam (majorem haud dubie intelligit.) At l. 26. c. 6. *Salvia* meminit: an verò de hac, vel *Stachy*, vel *Sphacelo* Theophraſti, vel *Hormino* vulgari, vel *Æthiopide* loquatur, ambigunt.

Genera: Dioſcorides unum meminit: quæ major vulgaris eſt: at Theoph. ſ. hiſt. 1. *Salvia* a plura ſunt genera: ſubjungens *Sphacelum* & *Salviam* inter ſe diſtare, quaſi alterum urbanum alterum ſylveſtre genus diſceris.

I. *Salvia* major, an *Sphacelus* Theophraſti?

*Salvia* latifolia, Brunſ. deſc. Trag. Geſ. hor. Lon. Cluſ. hiſt. Cam.

*Salvia* major, Matth. Fuch. Dod. Tur. Lac. Lugd. Caſt. Tab. Ger.

*Salvia* hortulana, Eric. Cord.

*Salvia*, Ang. Cord. in Dioſc. domeſtica, Cæſ.

*Salvia* major ſcabrior Dioſcoridis, Ad. Lob.

*Salvia* major latifolia flore cæruleo, Eyſt.

Varietas in folijs & floribus: folijs eſt viridibus, ijsque criſpis & non criſpis, purpureſcentibus, verſicoloribus: ſic vel totis, vel partim albidis: floribus communiter cæruleis, rarius candidis.

II. *Salvia* nigra.

*Salvia* major alba, Dod.

Foliorum pediculi, ac nervi, & recens enata ſolia atrorubent.

III. *Salvia* minor aurita & non aurita.

*Salvia* nobilis, Brunſ. Geſ. hort.

*Salvia* anguſtifolia & minor, Trag.

*Salvia* minor, Matth. Fuch. Dod. gal. Cord. in Dioſc. Lac. Tur. Lob. Cæſ. Tab. Ger. pinnata, Ad.

*Salvia* acuta, Lon.

(Eyſt.

*Salvia* anguſtifolia, Cluſ. hiſt.

*Salvia* tenuifolia auriculata, Cam.

*Sphacelus* verus Theophraſti, Lugd.

Variat folijs auritis, vel pinnatis, & non auritis: folijs aliquando Lavandulæ concoloribus, ſed latioribus, & gravioris odoris: rarius luteolis: flore cæruleo, rarius albo.

IV. *Salvia* minor altera: hæc odore & ſapore eſt Abſinthij, floreque rubente: quam primum Baſileæ in horto Pharmacopæi Johannis Heitzmanni: dein in horto Montebelgardiaco, legitimus.

V. *Salvia* folio tenuiore.

*Salvia* Hiſpanica odoratiſſima, Cam.

*Salvia* Indica, Tab. Ger.

*Salvia* Hiſpanica flore albo, Eyſt.

VI. *Salvia* latifolia ſerrata: quæ 1. eſt in Prodomo.

VII. *Salvia* anguſtifolia ſerrata.

*Salvia* Cretica anguſtifolia, Cluſ. hiſt.

VIII. *Salvia* anguſtifolia lanuginofa: quæ 3. in Prodomo.

IX. *Salvia* baccifera.

*Salvia* fruſtum inſtar gallæ ſerens, Matth.

*Salvia* Græca, quæ hodie *ϑαſανθῆλλα*, Ang.

*Salvia* Cretica, Dod. Tab.

*Salvia* coccifera ſive baccata Cretenſis, Ad.

*Salvia* Cretica baccifera, Lob. ico. Lugd. Cam. ep. Matth.

Hujus folia aliquando aurita, nonnunquam

appendicibus carentia: subinde quædam cauliculorum pars intergenicula in crassitudinem extuberant ut gallarum ( sunt excrescentiæ quædam ) magnitudinem & similitudinem, seu baccarum & pomorum orbiculatorem, in

Creta assequantur. At in regionibus frigidis nulla profert: hinc duæ figuræ apud Clus. hist. Salvia Cretica pomifera, & non pomifera. X. Salvia folio subrotundo: quæ 2. in Proedromo.

## H O R M I N U M.

**O**pus herba est folijs Marrubio similis, caule quadrangulo, &c. Dioscoridi l. 3. c. 145. dictum videtur ànò rō ignatū, quod nō ē rōi ouuōiōu napopuōi, ad Venerem stimulet, ut Dioscorides loquitur. Theophrastus Hermini (Gaza Geminalem vertit) inter fruges meminit 8. hist. 1. & 7. Galeno 8. simpl. p. 9. c. 1. Aegina igitur & piperis dicitur. Plinius l. 8. c. 7. Horminum à Græco dictum, Cumino simile scribit.

Genera duo Dioscoridi: sativum & sylvestre: in sylvestri semen rotundum ac fuscum, in altero nigrum & oblongum reperitur. Et Plinio l. 22. c. 25. Horminum Cumino simile, &c. duorum generum, alteri semen nigrum & oblongum, alteri candidum & rotundum: qui vires à Dioscoride primum propositas subiungit.

## I. Horminum sativum.

Horminum, Matth. Ang. Lac. Dod. Adv. Lob. Cæsalp. Lugd. Taber. Cast. sativum, Dod. gal. Cæsalp. Cam.

Orminum verum, Gefn. hort. minus, Lon.

Horminum sylv. folijs purpureis, Ger.

## II. Horminum Syriacum: &amp; Eyst. in Phytopinace, Matthiolo &amp; Proedromo descriptum. Bifermas, Cam. Aman qui busdam.

## III. Horminum Sclarea dictum.

Gallitricum sativum, Trag.

Gallitricum, Dod. gal. Lugd. Cam. Ger.

Sclarea, Matth. Cast. Cam. Tab. vulgo & Centrum galli, Guil. pap.

Sclarea hortensis, Gefn. ap.

Sclarea Æthiopis, Ang.

Orminum sativum, Fuch. Tur. Cord. in Diosc.

Horminum & Orminum minus, Gefn. hort.

Scarlea, Ad. Lob.

Sideritis Heraclea, Frac. cui & Alysson Galeni.

Scordium alterum Plinij, Dalech. in Plin.

Orvala, Dod. Cast.

Horminum sylv. 1. Clus. hist.

Horminum hortense, Eyst.

Matrifalvia major, Col.

Quibusdam scopa regia Plinij, inter Sideritides lib. 25. cap. 5. & Tussilago altera, quæ quibusdam Salvia, Plinij lib. 26. cap. 6. cum qua in multis convenit: alijs Phorbion Galeni: alijs Baccharis Dioscoridis l. 3. cap. 51. alijs Scordium alterum Plinij l. 25. cap. 6. quibusdam Aleatorophos Plinij lib. 27. cap. 5. in cujus descriptione feminis forma & usus, cum Sclarea femine convenit: alijs Horminum sativum Dioscoridis.

## IV. Horminum luteum glutinosum.

Orvala 3. Dod.

Colus Jovis, Ad. Lob. Clus. pan. Lug. Cam. Eyst.

Melinum, Cæf.

Galeopsis lutea Dalechampi, Lugd.

Horminum sylv. 2. Clus. hist.

Camphorata quibusdam, quia summitas Camphoram redoleat: Sphacelus alijs, quod ejus succus in ulceribus malignis valeat. Stachys Plin. quibusdam.

## V. Horminum syl. latifolium verticillatum.

Horminum sylv. 1. vel sylv. latifolium alterum,

Clus. pan.

Horminum sylv. 3. Eid. hist.

## VI. Horminum pratense folijs serratis.

Salvia agrestis, Brunf. flore purpureo, Eyst.

Salvia sylv. vera, Trag. sylv. Gefn. hort.

Horminum sylv. Fuch. Dod. gal. Tur. Cord. in Diosc.

Gefn. hort. Lon. Ad. Lob. Lugd. Camer. majus, Thal.

Horminum sylv. 2. vel sylv. 4. flore violaceo,

Clus. pan.

Hormini quarti species 1. Eid. hist.

Orvalæ sylv. species 4. Dod.

Sideritidis Heracleæ species, Fracast.

Gallitricum vulgo, Cæf.

Sclarea sylv. Tab.

Colus Jovis, Gerico. Eyst.

Quibusdam Verbenacæ rectæ genus: alijs Aleatorophos Plinij.

Hujus differentiæ plures, florum colore non nihil differentes: ut flore cæruleo, violaceo, rubicundo: Sic Camerarius absque ullo flore per æstatem, sed hyeme cæruleo, lupuli odore, observavit.

## VII. Horminum pratense hiveum folijs incanis.

Horminum syl. quartum niveo flore, Clus. pan.  
 Hormini syl. quarti altera species, Clus. hist.  
 Horminum syl. Ger.  
 Selarea syl. flore albo, Tab.  
 Salvia agrestis flore albo, Eysl.

VIII. Horminum syl. majus folijs profundius incis.

Hormini syl. 4. altera species, vel dilutior flore, Clus. pan. syl. 4. species 3. Eid. hist.

Pars externa non purpurascit, sed virefcit: folia inferiora quasi laciniata: flos dilutioris coloris, aliquando quasincereus. Hocetiam flore est minore & rubro, quod Hormini syl. quarti species 4. Clus. hist.

IX. Horminum syl. Lavandulae flore.

Hormini syl. secundi species 5. Clus. pan. 4. species 5. Eid. hist.

Sclarea Hispanica, Tab.

Gillitricum alterum, Ger.

X. Horminum syl. salvisolium majus, vel maculatum.

Horminum syl. Matth. Cæs. Cast. Lugd.

Verbascum salvisolium, Lob. ico.

Verbascum nigrum salvisolium, Ad. Lob. ob. Lugd. Orvala altera, Dod.

Hormini syl. tertii altera species, Clus. pan.

Hormini syl. quinti altera species, Eid. hist.

XI. Horminum syl. salvisolium minus.

Horminum syl. 3. vel Horminum syl. 5. salvisolio, Clus. pan.

Hormini syl. quinti species prior, Eid. hist.

Flos ex cæruleo purpurascens & quasi violaceus, interdum colore dilutior, nonnunquam quasi cineraceo.

XII. Horminum minus supinum.

Horminum syl. sextum five minus supinum Creticum, Clus. hist.

XIII. Horminum angustifolium laciniatum: quod 2. est in Prodomo.

Folia inferiora aliquando in profundas lacinas dividuntur: aliquando Scolopendriae folia referunt.

XIV. Horminum minus album Betonicae facie: quod 3. in Prodomo.

XV. Horminum tenuifolium angustis folijs Erythrodani sylvestris longioribus, Thal. quid?

## V E R B A S C U M.

**V**erbascum φλόκω Diofcoridi lib. 4. cap. 10. 4. φλόκω υρο, quasi φλόκω flamma, quia hujus prolechnijs usus est.

Genera summa duo Diofcoridi: album & nigrum: in albi genere mas & femina: mas folijs albis, oblongis, angustis: femina folia brasiæ latiora, candida, flores candidi aut ex luteo pallentes. Nigrum folijs est albo latioribus & nigrioribus. Est sylvestre folijs Salviae, flore verticillato luteo. Sunt & Phlomidæ duo bifurca, humiles, rotundius folijs. Tertia præter hæc est qua Lychnitis & Thryallis, folijs crassis ad lucernarum elychnia aptis. Et Plinio lib. 25. cap. 10. Verbascum Græci Phlomon, genera habet prima duo: album in quo mas: alterum nigrum, in quo femina. tertium, non nisi in sylvis reperitur, sunt folia brasiæ latiora pilosa, &c. Sylvestra folia Eletsphaci alba ramu lignosa. Sunt & Phlomidæ duo bifurca, rotundius folijs humiles. Tertia Lychnitis vocatur, ab alijs Thryallis folijs ad lucernarum lumina aptis.

I. Verbascum mas latifolium luteum.

Verbascum 1. Matth. Cord. in Diof. Lugd. Cæs.

Verbascum mas, Ang. Ad. Cast. Tab. (Thal.

Verbascum candid. mas, Lac. Lon. album mas,

Verbascum latius, Dod. latifolium mas, Eysl.

Verbascum mas & Candela regia, Lob.

Verbascum aut Phlomon vulgaris mas, Lob.

Thapsus barbatus, Ger.

II. Verbascum mas angustioribus folijs floribus pallidis.

Verbascum secundum, Matth. Lac. Cast. Lugd.

Verbascum syl. majus, Lon.

III. Verbascum femina flore luteo magno.

Verbascum five candela regia, Trag.

Verbascum nigrum, Fuch. Lon.

Verbascum album femina luteo flore, Dod. gal. Lugdun.

Verbascum album mas, Ang.

Verbascum maximum albu femina flore subpallido, Lob. ico.

Verbascum alterum flore aureo, Cæs.

Verbascum luteum, Tab.

Verbascum lychnite minus, Ger.

IV. Verbascum femina flore albo.

Verbascum sylvestre, Trag.

Verbascum candidum mas, Fuch. Dod. gal. Tur.

Gef. hort.

Verbascum tertium flore candido, Cæs.

Verba-

Verbasum album fœmina, Ang. Lon.

Verbasum angustius, Dod.

Verbasum flore albo, Tab.

Thapsus barbatus maximus odoratus Septentrionalium, Ad. fœmina flore albo, Lob. ico.

Thapsus barbatus flore albo, Ger.

Varietas in folijs observatur, quam notant nomine

Verbasci albi secundi, Tab.

Verbasci albi, Ger.

V. Verbasum Lychniris flore albo parvo.

Verbasum primum, Brunf.

Verbasum lychnite, Matth. Lac. Tab. Ger.

Verbasum candidum fœmina, Fuch. Ges. hor.

Verbas. album fœmina, albo flor. Dod. gal. Lug.

Verbasum fœmina, Ad. Lob. obs. Lugd.

Verbasum quartum, Cæs. Eyst.

Phlomos mas alter, Lob. ico.

Phlomos lychnitis, Lugd.

Verbasci tertia altera species, Cast.

V I. Verbasum nigrum folio papaveris corniculati & Cam.

Verbasum aliud, Matth.

Verbasum laciniatum, Lugd.

Verbasum sylv. tertium, Dod.

Verbasum syl. Salvifolium, fruticosum, lignosum, Ad. ubi legendum Verbasum purpureum

Erucæfolium.

Verbasu syl. Salviflorum laciniatum, Lob. ob.

Verbasum Intubaceum, Tab.

V II. Verbasum nigrum flore ex luteo purpurascens.

Verbas. nigrum, Trag. Dod. Lob. ico. Tab. Ger.

Verbasum tertium, Matth. Lac. Cast. Lugd.

Verbas. syl. Fuch. Tur. Ges. hor. syl. minus, Lon.

Verbasum nigrum Salvifolium purpureo flore, Ad. Lob.

Verbasum nigrum latifolium, Thal.

Blattaria Plinij, seu Verbasum nigrum, Eyst.

Flore variat: alterius ex citrino purpurascit: alteri ex flavo candido: alibi flore prorsus cado.

V III. Verbasum folijs subrotundis flore Blattariæ: in Phytopinace & Prodrômo describitur.

IX. Verbasum humile Creticum laciniatum.

Arcturus Creticus, Belli ep. & ad Clus. Ponæ.

Verbasum Brasicæ folio, Col.

Verbasum fruticosum auriculatum, Ponæ Ital.

Variat: nam illud folijs est latiorib. capitulis rotundis: est & alterum, longiorib. & angustioribus folijs, capitulis oblongiusculis, & hoc est Arcturi secunda species, Ponæ Ital.

Verbasum Salvifolium.

I. Verbasum latis Salviæ folijs.

Verbasum syl. Matth. Ang. Lac. Cæs. hor. Lugd.

Clus. hisp. & hist. Cast.

Verbasum sylv. alterum, Dod.

Verbasum syl. Salvifolium fruticosum lignosum, Ad.

Verbasum salvifol. fruticosum, luteo flor. Lob.

Verbasum sylv. folijs Salviæ, Cam.

Verbasum quartum, Lob. ico. 7. Cæs.

II. Verbasum angustis Salviæ folijs.

Verbasum sylv. Dod. Ges. hor. Lugd. Cæs.

Verbasum sylv. Salvitenuifolium Narbonensium, Ad.

Verbasum sylv. folijs Salviæ tenuifoliæ, Lob.

Phlomis lychnitis, Clus. hisp. & hist. Lugd. duplici figurâ.

Salvia sylv. Monspeliensium, Ges. hor.

Hæc Angarathi aliquibus dicitur.

III. Verbasum acuto salviæ folio.

Phlomis lychnitis altera Syriaca, Lob.

Verbasum syl. folio Salviæ tenuifoliæ, Lugd.

IV. Verbasum subrotundo Salviæ folio.

Verbasum syl. Salvifoliu exotikum, Lob. Lug.

Hoc Verbasci cistioidis nomine ex horto clausissimi Contareni habemus.

## B L A T T A R I A.

**B**lattariam Plinius l. 25. c. 9. sic expressit: Est similis Verbasco herba, quæ sæpe fallit pro ea capta, folijs minimis candidis, cauliculis pluribus, flore luteo. Hæc abjecta Blattariæ se contrahit, ideò, Romæ Blattariam vocant, hæc ille. Hoc Dioscorides l. 4. c. 104. Verbasco sylvestri cui flos est aureum tribuit.

I. Blattaria lutea folio longo laciniato.

Blattaria, Trag. Matth. Ang. Fuch. Dod. Ges. h. (& Verbasci nigri species) Lon. Lug. Cast. Tab. Ger.

Chrysogonum, an potius Blattaria Plinij, Ad.

Blattaria, Lob. Plinij, Eid. ico.

Blattaria flore luteo, Eyst.

Verbasum leptophyllum, Cord. hist.

Verbasum nonum, Cæs.

Duplex est: altera quatuor cubitorum, tria, quatuor, quinque & plura vascula conjuncta habens: altera humilior, singula vascula profertens, folijs multo viridioribus.

II. Blar-

II. Blattaria alba.

Blattaria flore albo, Lob. i. o. Cam. Eyst.  
an Verbascum quintum, Cæf.  
Ad Verbascum lychnitis referri potest. Variat  
flore parvo, eoq; albo vel viridi, vel viridi pur-  
purafcente & magno flore, quare hæc  
Blattaria altera: illa verò  
Blattaria flore viridi.  
Blattaria flore ex viridi purpurafcente dicitur,  
Lobel. icon.

III. Blattaria magno flore: & Lob. i. o.

IV. Blattaria purpurea.

Blattaria flore purpureo, Gef. hor. Lob. i. o. Lug.  
Cam. Ger.  
Blattaria phœnicea, Tab.  
an Verbascum octavum, Cæf.  
Folijs est nigrioribus non laciniatis, parum-  
que ferratis: flos modo dilute rubet, obsoleto  
colore purpurafcit: quandoq; nigræ violæ co-  
lore eleganti nitet.

Æ T H I O P I S.

**A**ethiops Dioscoridi lib. 4. cap. 105. folia Verbasci similia, per quam hirsuta habet, &c. Et Plinio lib. 27.  
cap. 4. Aethiops folia habet Phlomo similia, magna, multa & hirsuta, &c. a loco natali forte nomen  
habet, quæ Plinio l. c. ex Aethiopia extima venit: hæc, inquit lib. 26. cap. 4. clausa omnia tactu aperiri. At  
lib. 24. cap. 17. Aethiopida in Meræ nascitur, ob id Meroidum appellarunt folio Lactuæ, &c. his sanè aliam  
quàm Dioscorides intelligit.

I. Aethiopsis folijs sinuosis.

Aethiopsis, Matth. Ang. Lac. Dod. Gef. hor. Lon.  
Cæf. Lugd. Cast. Tab. Ger. Eyst.  
Aethiopsis sive Phlomitis, Ad. Lob.  
An potius Verbascum lychnitis Dioscoridis:  
eum hujus Aethiopidis vascula, non solum bina

semina nec ervi magnitudine continens, nec  
radicem viscidam habeat, neque in exsiccata  
cornu durities sentiat, quæ à Dioscoride fuisse  
tribuuntur.

II. Aethiopsis folijs in profundas lacinias di-  
visis: quæ in Prodomo describitur.

VERBASCULUM SEU PRIMULA VERIS.

**P**rimula veris, quod primo Veræ floreant, Dioscoridi lib. 4. cap. 104. φλῶνδρι & Plinij lib. 25. cap. 10. Phlo-  
midæ censentur. Alijs verò Plinij lib. 25. cap. 4. & lib. 26. cap. 11. Dodecantheon, cui sunt folia septem,  
Lactuæ similima, à lutea radice exeuria. Verum apud Plinium lib. 25. cap. 10. alterum genus Alisma in  
sylvu, nigri, majoribus folijs, videtur.

Verbasculum flore simplici.

I. Verbasculum pratense odoratum.

Herba Paralysis, Brunf. Cast. desc.  
Herba Paralysis vulgaris, Trag. altera, Cæf.  
Dodecantheon, Ang.  
Primula veris, Matth. Lugd. Taber. hortensis,  
Thalio.  
Primula veris major fl. luteis odoratis, Dod.  
Primula pratensis, odora lutea, Ad. Ger.  
Primula veris flore luteo, Eyst.  
Primula pratensis, Lob.  
Primula veris flavo flore elatior, Clusf. hist.  
Verbasculum odoratum, Fuch. Dod. gal.  
Arthritica, Gef. hor. simplex luteo flore, Cam.  
Alisma pratense, Col.

II. Verbasculum pratense vel sylvaticum in-  
odorum.

Herba Paralysis alba, Brunf. sylv. Trag.  
Primula veris altera, Matth. Lugd.  
Verbasculum non odoratum, Fuch.  
Verbasculum album, Dod. gal.

Primula veris maj. (fl. albidis inodor.) Dod. Ger.  
Primula pratensis pallida, Ad.  
Primula pratensis inodora luteo pallida, Lob.  
Primula veris, Paralysis sylv. Thal.  
Primula sylv. tertia, Tab.

Primula veris pallido flore elatior, Clusf. hist.  
III. Verbasculum sylv. majus singulari flore.  
Verbasculum minus, Dod. gal.  
Primula veris minor, Eid. Lugd. Ger.  
Primula sylvarum, Ad. Lob. Lugd.  
Arthritica species flore singulari, Gef. hor.  
Herba Paralysis, Cæf.  
Primula veris pallido flore humilis, Clusf. hist.  
Alisma sylvarum, Col.  
Primula sylv. secunda, Tab.  
Primula veris sylv. flore pallido, Eyst.  
Arthritica caule exiguo vel nullo, Cam.

Flore est pallido, reperitur etiam niveo, quæ  
Sylvarum primula alba, Ad.

IV. Primula veris montana incana lutea.  
Paralytica rotundifolia montana, Col.



*Verbasculum flore multiplici.***I. Verbasculum hortenfe multiplex.**

Arthriticæ genus dasypodium, five densifolium, Gesn. hort.

Arthritica pleno flore, Cam.

Primula hortenfis Anglica flore pleno, Ad. Lob. Lugd. Ger.

Primulæ veris flos multiplex, Dod. multiflora, Tab.

Primula veris Anglicana flore pleno, Eyst.

**II. Verbasculum sylv. magno plenoq; flore.**

Primula veris sylvarum flore pleno specioso, Ad. Lob. ico. Eyst.

Primula veris sylvarum flore multiplici, Lugd.

Primula veris multiflora sylv. Tab. veris flore pleno, Ger.

**III. Verbasculum syl. minus singulari flore.**

Primula sylvarum flore obscure virentibus imbricatis, Ad. Lob. Lugd.

Primulæ veris minoris altera species, Dod.

Primula sylv. flore viridi, Tab. Ger.

**IV. Verbasculum proliferum.**

Primula veris flore gemino altero alteri innato, Lob. Lugd.

Primula veris prolifera, Tab.

Primula veris flore geminato, Ger. Eyst.

*Verbasculum alpinum.***I. Verbasculum umbellatum alpinum minus.**

Majele, Cord. obf.

Erchemblumlein/ Gesnero, monente, Cam.

Verbasculus alpinus five cæruleus, Lugd.

Sanicula alpina minor five media, Lob. Lugd.

Primula veris flore rubro, Clus. pan. & hist. Ger.

Arthritica flore purpureo, Cam.

Primula alpina media, Tab.

Primula veris angustifolia rubra & alba, Eyst.

Flore est subcæruleo, aut carnei coloris, aut dilutioris purpuræ nitente, interdum saturatius rubente: raro candido & exalbido, omnes tamen circa umbelicum luteoli sunt.

**II. Verbasculum alpinum umbellatum majus.**

Ädysterlin/ Simlero de alpinis.

Paralitica alpina, Sanicula angustifolia major, Lub. Lugd.

Primula veris albo flore, Clus. pan. & hist. Ger.

Primula alpina angustifolia, Tab.

Variat floris colore: est albo: rubro: rubore & candore confuso.

**SANICULA ALPINA VEL AURICULA URSI.**

**S**anicula a sanando vulneribus: Auricula Urfi a forma foliorum dicitur: an a *Urepa* five *Damasonio* folijs Plantaginifed angustioribus. & interram convexis, &c. Dioscorid. l. 2. c. 169. Et Pliny l. 21. c. 10. Alisma five Damason folijs Plantaginifed angustioribus, maguq; laciniosis, convexisq; in terram, &c.

*Sanicula alpina folijs serratis.***I. Sanicula alpina lutea.**

Sanicula five Auricula Urfi, Matth.

Arthriticæ genus alpinum, & Sanicula alpina, Gesn. hort.

Lunonia arthritica, Eid. de lun. & fracto.

Auricula urfi, Dod. Cast.

Auricula-urfi prima vel luteo flore, Clus. pan. & hist. Ger.

Paralytica alpina, Sanicula five auricula urfi, Lob. flore luteo, Ad.

Auricula urfi seu lupi, Cæf.

Primula veris pachyphyllus, Lugd.

Auricula urfi floribus luteis, Cam. Tab. Eyst.

Alisma five Damasonium Dioscoridis, Col.

Variat folijs & floribus: folijs lævibus & viridibus, interdum incanis vel canescentibus densioribus, tenuioribus: majorib. & minoribus: floribus pallidis, luteis, aureis, rarissimè candidis vel cæruleis, ijsq; modò majorib. modò minoribus, modò denis, vicanis, tricenis, hinc

Auricula urfi floribus pallidis & candidis.

Auricula urfi floribus luteis.

Auricula urfi floribus aureis & cæruleis, Tab.

**II. Sanicula alpina purpurea.**

Britannica, Ang.

Arthriticæ species flore purpureo, Gesn. hort.

Paralytica alpina, Sanicula flore purpureo, Ad.

Auricula urfi, Cæf. flor. icon. flore purpureo, Lobel. icon:

Auricula urfi suaverubens, Ger.

Auricula urfi 2. Clus. pan. & hist.

Primula alpina latifolia, Tab.

Sanicula alpina rubra, Eid.

Flore est purpurascente, rubefcente sanguinis modo, & atro colore.

**III. Sanicula alpina folijs rotundis.**

Auricula urfi quinta, Clus. hist.

Hæc etiam minoribus folijs reperitur, quæ

Auriculæ urfi quintæ similis, Clus. pan. alt. auct.

**IV. Sanicula alpina flore variegato.**

Auricula urfi sexta, Clus. pan. & hist.

Auri-



*Auricula usi floribus guttatis, Tab.*

Floribus est rubris, albis maculis aspersis.

V. *Sanicula alpina angustifolia.*

*Auricula urfi* 5. Clus. pan. 7. in histor. at 8. in cur. post.

*Auricula urfi* 8. Tab. flore purpureo, Ger. Eyst.

Flores dilute rubent: huic similis brevioribus tamen folijs, cujus Clus. in cur. post. meminit.

VI. *Sanicula alpina folijs quasi farinâ aspersis* (fis).

*Auricula urfi* 7. Clus. cur. post.

Flores ex albidis carneo colore perfusi.

VII. *Sanicula alpina minima carnea.*

*Arthritica cæruleis flosculis, Gesn. hort.*

*Sanicula alpina minima, Lob. Lugd. Tab.*

*Auricula urfi* 6. Clus. pan. 8. Eid. hist. 10. cur. post.

*Auricula minima, Ger.*

VIII. *Sanicula alpina minima nivea.*

*Auricula urfi minima flore niveo, Clus. pan. & hist. Tab. Ger.*

an *Auricula urfi* flore albo, Eyst.

Folia pallefcunt & flos omnino niveus, cum illius viridia folia & flos dilute rubens five carneus.

IX. *Sanicula alpina folijs borraginis villosa.*

*Auricula urfi Myconi, Lugd.*

*Auricula urfi* ex Pyrenæis, Clus. hist. ap. alt. auct.

*Auricula urfi* 9. Eid. cur. post.

*Sanicula folijs non serrata.*

I. *Sanicula alpina rubescens, folio non serrata.*

*Auricula urfi* 4. Clus. pan. & hist. 7. Tab. (to.

*Auricula urfi rubescens, Ger.*

II. *Sanicula alpina alba folijs non crenatis.*

*Auricula urfi* 6. Clus. hist.

Similis flore pallido, quæ

*Auricula urfi pallido flore, Clus. cur. post.*

III. *Sanicula alpina minima pilosa: quæ pro 2. in Prodro mo descripta.*

*Sanicula rotundifolia.*

I. *Sanicula montana latifolia laciniata.*

*Cortusa, Matth. Cast. Lugd. Cam.*

*Caryophyllata Veronenfium fl. Saniculæ urfinæ, Ad. Lob.*

*Sanicula montana, Clus. hist. altera, Eid. pan.*

*Sanicula alpina, Tab. Ger.*

Duplex figura apud Clusium, Tab. & Ger.

1. *Sanicula montana, Clus. hist.*

*Sanicula alpina Clusij, Tab. Ger.*

2. *Cortusa Matthioli, Clus. hist. & cur. post.*

*Saniculæ alpinæ icon verior, Tab.*

*Cortusæ rarior icon, Ger.*

In figura *Saniculæ Clusij* malè averfa parte puncta aspersa sunt.

Flore est eleganter rubro, & ad purpureum tendente: habetur & violaceis, rariùs albis floribus.

II. *Sanicula montana rotundifolia major.*

*Sanicula alpina alia, Gesn. hort.*

*Caryophyllata, five Geum alpinum recentiorum folio hederaceo, Ad. Lob. ico. J. ugd.*

*Sanicula montana: Clus. pan. altera, Eid. hist. Eystett.*

*Sanicula alpina, Cam. ep. guttata, Eid. hort.*

*Cotyledony Dalechampij, Lugd.*

III. *Sanicula montana rotundifolia minor.*

*Sanicula montana minor, Clus. pan.*

*Saniculæ montanæ alterius species 2. Eid. hist.*

IV. *Sanicula montana longifolia serrata.*

V. *Sanicula montana flore calcari donato.*

*Pinguicula (vel Liparis) Gesn. Cl. pan. & hist. Cucullata, quibusdam Critis Apuleij, Lugd.*

*Pinguicula vel Juncus, Viola humida aut palustris: Dodecatheon Plinij, Gesnero, Cam.*

Variat floribus colore, qui albus, purpureus & cæruleus.

## D I G I T A L I S.

**D**igitalis, quod flores digitale referant, nomen habet. Sunt qui ad *Verbascum*, alij ad *Alismati* genus alterum Plinij referant. At *Deffig. Fabius Columna, Ephemerum Discretidum lib. 4. cap. 15. censet.*

*Digitalis folio Verbasci.*

I. *Digitalis purpurea folio aspero.*

*Campanula sylv. Trag.*

*Digitalis rubra, Dod. gal. purpurea, Fuch. Ang. Gesn. hort. & ap. Lon. Dod. Ad. Lob. Lugd. Cam. Tab. Ger.*

*Aralda Bononienfibus, Gesn. hort.*

*Verbascum digitale, Costæo.*

*Virga regia major flore purpureo, Cæf.*

*Ephemeris alia species major, Col.*

Flos purpureus, nigris punctulis insignitus, ruber, incarnatus, five ex purpureo candidus, intus punctatus: aliquando flores in rotundam spicam in gyrum coli effigie in summo dispositi rufescunt ex luteo, intus guttis purpureis asperis, hinc

Hh 2

Digitalis

Digitalis flore rubro, & flore incarnato, Eyst.

II. Digitalis alba folio aspero.

Digitalis 2. Dod. alba, Lob. Lugd. Eyst.

Virga regia major flore pallido, Cæf.

Ephemer altera species major candida, Col.

Flos nivei candoris, intus nigris punctis intercurfantibus.

*Digitalis folio vrescente.*

I. Digitalis lutea magno flore.

Campanula sylv. flore luteo, Trag.

Digitalis lutea, Fuch. Anguil. Lon. Thal. Lugd.

Cam Tab. Ger. flore luteo, Eyst.

Digitalis minor, Gef. hor. flore minore, Eid. col.

Digitalis lutea flore amplo, Ponæ.

Digitalis 3. Dod.

Calachiana viola Plinij, Dalech. in Plin.

Ephemeron Dioscoridis, Col.

Flore est luteo pallido, rarissime albo : & intus vario.

II. Digitalis major lutea vel pallida, parvo

Digitalis major, Gef. hor. 4. Dod. (flore.

Digitalis flore minore albidior, Gef. col.

Digitalis lutea, Ad. parva, Lob. ico. sub ramo

minore exprimitur.

Virga regia: Alisma & Damafonium Dioscoridis, & Fistula pastoris Avicennæ, Cæf.

III. Digitalis minor luteo parvo flore: in Prodromo descripta.

IV. Digitalis angustifolia lutea.

Digitalis lutea parva, Lob. ico.

V. Digitalis angustifolia flore ferrugineo.

Digitalis gilvo flore, alias ferrugineo, Lob.

## E P H E M E R O N.

Cum doctissimus Fabius Columna, Digitalium censeat esse Ephemeron Dioscoridis, pauca assergamus. Ephemerum sive *ἡ ἀργία* caulium & folia liliij habet sed haec tenuiora: flores candidos, amarios, semen molle, radicem unam digitali crassitudine, longam astringentem, odoratam, &c. Diosc. l. 4. c. 35. Ephemerum folia habet liliij, sed minora, caulium parem, florem caruleum, semen super vacuum, radicem unam digitali crassitudine, Plinio l. 25. c. 13. Subjiciamus & Matthioli & Lobelij Ephemerum utrumque nobis incognitum.

I. Ephemerum quod aliqui sylvestrem Irin appellant, Matth. Lacunæ, Cast. desc.


Ephemerum non lethale Matthioli, Lug. Tab.

Ephemerum Matthioli, ex spurjis appositis plantis esse videtur, Colum.

II. Ephemerum Matthioli, vel potius

Ephemerum spurium, Lob. Dod.

Has duas easdem esse vix credimus: cum illi folia liliij & radix unica digitali crassitudine tribuatur: huic verò folia & radix Isatidis ascribatur: imò figurarum nulla est similitudo. & Lobelij potius Lysimachiam aliquam referat.



# CASPARI BAVHNI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER SEPTIMVS.

## SECTIO PRIMA.

LYSIMACHIA; VERONICA; TEUCRIUM; SCORDIUM;  
CHAMÆDRYS; CHAMÆPYTIS; ALSINE; SPERGULA;

ANAGALLIS; ELATINE.

## LYSIMACHIA.

Λυσιμαχίω ἢ λόδον Dioscoridi l. 4. c. 3. caules emittit cubitales fruticosos, folia salignis similia, flos flavus aureusve, &c. Sic dicta à Rege Lysimacho Agathocli filio ejus inventore: folia habet Salicis viridia, florem purpureum (aureum habet vetus) fruticosa, &c. Plinius l. 25. c. 7. addit tantum ei vim esse, ut jumentum discordanibus jugo imposta, asperitatem cohibeat. Unde videtur innuere, *ωρα* τὸ ἴδιον μίχαι λέγει δὲ τὴν esse. Salicaria etiam, à soliorum cum salicis folijs similitudine vocatur. Hujus species est filiquosa, quæ à filiquato satu præconi qui auctus & incrementum florum eruptioni anteverit, quasi proles parente prior, Filium ante patrem vocatur.

Lysima-

*Lyfimachia lutea.*

I. *Lyfimachia lutea* major: quæ Dioscoridis. Centaureum majus quibusdam, Hermol. Mar-  
nard. Ruel.

*Lyfimachia lutea*, Trag. Fuch. Tur. Ang. Adv.  
Lob. Cæf. Tab. Cam. Ger. Eyst. lutea communis,  
Cluf. hist.

*Lyfimachia*, Matth. Lac. Lugd. & Lon.

*Lyfimachia vera*, Cord. in Diosc. falsa, Cast.

*Lyfimachium verum*, Dod. gal. legitimum, Eid.

*Lyfimachium luteum*, Gefn. hort. Thal.

*Salicaria*, Gefn. hort.

Folij nunc ternis, nunc quaternis, nunc bi-  
nis reperitur.

II. *Lyfimachia lutea minor*, folijs nigris  
punctis notatis.

*Lyfimachia lutea* in alis foliorum florens, Cæf.

*Lyfimachia lutea altera*, Cluf. pan. & hist.

*Lyfimachia flore luteo* major, Cam.

*Lyfimachia lutea Pannonica* major, Eyst.

Folij est quaternis, etiam ternis.

III. *Lyfimachia trifolia lutea* spicata.

*Lyfimachia lutea altera* ~~ifag6~~, Col.

IV. *Lyfimachia bifolia flore globofo luteo*.

*Lyfimachia lutea altera*, Lob. Cluf. hist.

*Lyfimachium aquaticum*, Dod. belg.

Addit Clusius *Lyfimachiam luteam* 3. five  
minorem, quæ à priore solum radice & caule,  
quæ melius exprimuntur, differt.

V. *Lyfimachia lutea corniculata*.

*Lyfimachia Virginica* nomine ipsum semen  
Paravio nifiium quod anno 1619. in horto ele-  
ganter crevit & ex semine deciduo se facile ha-  
bitenus propagavit.

*Lyfimachia filiquosa.*

I. *Lyfimachia filiquosa hirsuta* magno flore.

*Lyfimachia* seu *Salicaria altera*, Trag.

*Lyfimachia purpurea*, Fuch. (Tur.

*Lyfimachia purpurea* primum genus. Eid. ico.

*Lyfimachium purpureum* 1. Dod. gal. Lugd.

*Antoniana* major hirsuta, Gefn. hort.

*Epilobij* 4. species. Gefn. ad Cord.

*Lyfimachia filiquosa*, Ger. 1. Tab.

*Lyfimachia* 2. & 3. fl. purpureo vel rubro. Lon.

*Lyfimachij majoris purpurei* 1. species, Thal.

*Onagra campestris hirsuta*, Cæf.

Flore est majore violaceo, purpureo.

II. *Lyfimachia filiquosa hirsuta* parvo flore.

*Lyfimachia filiquosa* 2. Tab.

Major est & minor, utraq; in Prod. descripta.

III. *Lyfimachia filiquosa glabra* major.

S. Antonij herba 3. Gefn. ad Cord. cui & filius an-  
te patrem. (hist.

*Lyfimachia filiquosa*, Ad. Lob. Cast. major, Cl.

*Pseudolyfimachium purpureum* 1. Dod.

*Onagra* genus alterum, Cæf.

*Lyfimachia filiquosa flore albo*, Tab.

*Lyfimachia campestris*, Ger.

*Lyfimachij majoris purpurei* 2. species, Thal.

Flore est parvo pallide rubente, rarius albo:  
quibusdam Delphinium Dioscoridis censetur.

IV. *Lyfimachia filiquosa glabra* minor.

Filius ante patrem minor, Gefn. col.

*Lyfimachia filiquosa* varietas, Ad.

*Lyfimachia* medium genus, Thal.

*Lyfimachia minor*, & 3. Tab.

Flosculi rubicundiores: alij ex rubicundo  
pallidiores: alij prorsus candidi.

V. *Lyfimachia filiquosa glabra angustifolia*.

*Lyfimachia media altera* species, Thal.

*Lyfimachia filiquosa* minor, & 7. Tab.

*Chamænerion*, Ger. ico.

VI. *Lyfimachia Chamænerion dicta latifolia*.

*Antoniana*, five S. Antonij herba maxima, Gefn.  
hort. ap.

*Chamænerion* & *Epilobion*, Gefn. ad Cord.  
Eyst. Thal. cui &

*Lyfimachia omnium maxima*.

Filius ante patrem maximus, Gefn. col.

*Onagra*, Lugd. Cæf.

*Lyfimachia vulgo altera*, Cam.

Sub Chamænerion male in Matth. meo Ty-  
pographi errore posita, cum ad *Onagra* caput  
p. 816. reponi debuisset, ut ex synonymijs, quili-  
bertantillius in plantis versatus colligere potest.

*Onagra Dioscoridis* 1 & c. 118. & *Oenothera* Plinij  
1. 26. c. 11. & 14. censetur: flore est caeruleo, ra-  
tius albo, ut & subsequens. (stifolia.

VII. *Lyfimachia Chamænerion dicta angu-*  
*Epilobium* (id est *Lyfimachia* ~~Lyfimachia~~ *viola* super filiqua)  
sextum, Gefn. ad Cord.

*Pseudolyfimachium purpureum minus*, Dod.

*Lyfimachia filiquosa* varietas altera, Ad.

*Chamænerion* Gesneri, seu *Delphinium buc-*  
*cinum*, Diosc. Lob.

*Lyfimachia filiquosa alia*, Lugd. 3. Cluf. hist.

*Lyfimachia* species in uliginosis, Thal.

*Linaria rubra*, Lugd.

VIII. *Lyfimachia Chamænerion dicta al-*  
*pina*: quæ in Prodomo describitur.

*Lyfimachia spicata.*

I. *Lyfimachia spicata* purpurea, fortè Plinij. Solidaginis Sarraconicæ alia species, Trag. *Lyfimachia altera*, Matth. Lac. Lugd. Cast. Eyst. *Lyfimachium purpureum*, Gefn. hort. Thal. *Lyfimachium purpureum alterum*, Dod. gal. *Lyfimachia* 3. Tur. *Lyfimachia* fortè Plinianæ, Ad. *Lyfimachia purpurea*, Lob. Cæs. Cam. Tab. *Lyfimachia flore purpurascens*, Ang. *Pseudolyfimachium purpureum alterum*, Dod. *Lyfimachia purpurea communis major*, Clus. hist.

*Lyfimachia purpurea spicata*, Ger.

Folia bina communiter, aliquando ternaria; quaternaria, simul caulem ambiunt.

II. *Lyfimachia spicata cærulea*. *Lyfimachium cæruleum*, Dod. gal. *Lyfimachia* 3. genus, Dod. Gefn. hort. *Pseudolyfimachium cæruleum*, Dod. *Lyfimachia cærulea hortenſis*, Ad. Lob. Lugd. *Lyfimachia cæruleo flore*, Clus. hist. *Veronica recta cærulea*, Eyst.

*Lyfimachia non spicata.*

I. *Lyfimachia rubra non filiquosa*. *Lyfimachia* 2. vel minor rubro flore, Clus. pan. *Lyfimachia purpurea* 2. five minor, Eid. hist. II. *Lyfimachia linifolia purpureo cærulea*. *Lyfimachia rubra minima*, Clus. hist. III. *Lyfimachia cærulea galericulata*, vel *Gratiola cærulea*. *Lyfimachia galericulata*, Lob. Lugd. Clus. hist. *Lyfimachia flore cæruleo galericulato*, Cam. *Sideritis cærulea*, Thal. *Gratia Dei*, Cæs. *Tertianaria*, Tab. *Herba Judaica altera*, Dod. belg.

Hæc in Anglia flore albo quoque teperritur.

## EXOTICA.

I. *Poutiou ex Malacca ad febres abigendas*: par. 4. Ind. Orient. 8. II. *Sary flos seu pollen*, quo corpus inungentes contra ventorum vim se tutos afferunt, l.c. III. *Sodouvaya in Java oblinendo corpori idonea*, l.c. IV. *Surahan*, vili pretio venditur, l.c.

## VERONICA.

**V**eronica, apud recentiores herba est celebratissima, Græci & Latini scriptoribus fortè incognita, quamvis Dodonæus velis esse *Betonica* Pauli lib. 7. *Casalpinus* verò ad *Myosotidem* Dioscoridi lib. 2. cap. 214. at *Columna* ad *Alyſſon* Dioscoridi lib. 3. cap. 105. referendam censet. Germani *Ehrenpreiſ* & *Grundheil* ob mirificam facultatem ulcera ac vulnera sanandi.

I. *Veronica mas erecta.*

*Veronica mas*, Matth. Ang. Lugd. Cast. *Veronica assurgens*, Dod. *Veronica recta mas*, Lob. vulgaris recta, Clus. hist.

Duplex est: major & minor: illa latiore folio & longiore spica: hæc angustiore folio & breviori spica.

II. *Veronica mas supina & vulgatissima.*

*Teucrium*, Trag. *Veronica mas*, Fuch. Lon. Lugd. Thal. *Veronica mas serpens*, Dod. *Betonica Pauli*, Dod. gal. *Veronica vulgo dicta*, Gefn. hort. *Veronica vera & major*, Ad. *Veronica major septentrionalium*, Lob. *Veronica*, Tab. vera & major, Lob. ico, Cam. Ger. *Veronica vulgaris supina*, Clus. hist.

*Veronica humicaulis & supina*, Col. *Auricula muris* 3. Cæs.

Floribus est subcæruleis, rarius candidis, reperitur nonnunquam folijs vulgatæ forma quidem similibus, sed triplo minoribus.

III. *Veronica spicata latifolia.*

*Veronica prima*, vel major latifolia, Clus. pan. *Veronica erectior latifolia*, Eid. hist. Alia est folijs atrovirentibus & splendentibus: in altera nec splendent, nec adeo atra sunt: spica etiam in alia oblongior.

IV. *Veronica spicata angustifolia.*

*Veronica recta herbariorum*, Lob. Lugd. *Veronica recta vulgaris major*, Clus. hist. *Auricula muris* 4. Cæs. *Veronica recta* 1. & 2. Tab. assurgens, Ger. *Veronica spicata cærulea*, Cam. Variat folijs latioribus & paulo angustioribus: spica flosculorum cæruleorum, & spica dilutior. Addit

Addit Clusius in hist. alterius figuram, quam à priore non distinguo, nomine

Veronica secundæ erectioris angustifoliæ.

V. Veronica spicata minor.

Veronica recta minima, Lobel. Lugdun. Ger. Clus. hist.

Veronica recta minor, Clus. pan. Tab. Flore est cæruleo, rarius albo.

VI. Veronica pratensis sepillifolia.

Eufragia, & Eufragia nobilis, Brunf.

Teucrium alterum, Trag.

Veronica fœmina, Dod. gal. Lugd. Thal.

Betonica Pauli, Turn. Gesn. hort. quorundam, Camer.

Veronica pratensis, Dod.

Veronica minor serpillifolia, Ad. Lob.

Auricula muris prima in pratis, Cæf.

Folijs est communiter integris, rarissime crenatis: floribus cæruleis, frequentius pallidis & dilutis: hinc

Veronica minor, Tab. Ger.

Veronica minor fœmina flore candido, Tabernæmont. sub

Veronica mare, apud Ger.

VII. Veronica alpina frutescens.

Veronica tertia fruticans, Clus. pan. & hist.

Veronica alpina serpillifolia, Ponæ.

VIII. Veronica alpina bellidis folio hirsuta, in Prodr. descripta: quæ duplex est major & minor.

## TEUCRIUM.

**T** *Teucrium* Dioscoridi l. 3. c. 111. (eò quod *Teucrejus* inventor existimetur, Plinio l. 25. c. 3. auctore) & *Cha-mædrys* ex aliorum sententia. Plinio l. 6. & l. 26. c. 3. *Teucrium*.

I. *Teucrium*.

*Teucrium* secundum, Matth. Lugd. 1. Tab.

*Teucrium*, Fuch. Ang. Dod. gal. Cord. in Diosc.

Lac. Lon. Ad. Lob. Cæf. Cast. verum, Gesner.

hort. Eyst.

*Chamædris* altera seu assurgens, Dod.

*Teucrium* vulgare fruticans, live 1. Clus. hist.

*Teucrium* latifolium, Ger.

II. *Teucrium* folijs *Scorodoniz*.

*Teucrium* verum, Cam.

III. *Teucrium* *Creticum* incanum.

*Teucrium* *Creticum*, Clus. hist.

IV. *Teucrium* peregrinum folio sinuoso.

an *Pæderota*, Pausaniæ?

*Teucrium* Boeticum, Clus. hisp. Lugd. Tab. Ger.

*Teucrium* fruticans Boeticum, Clus. hist.

Camerarius, *Teucrij* Boetici, quod à Clusij diversum sit & *Teucrij* Belgici, solon nomine meminuit: sed quid utrumq;?

V. *Teucrium* alpinum inodorum magno flore: in Prodomo descriptum.

VI. *Teucrium* alpinum coma purpureo cærulea.

*Clinopodium* alpinum, Pomæ.

VII. *Teucrio* affinis, *Chamærops*.

*Chamærops*, Plinij l. 26. c. 7. Lugd.

## SCORDIUM.

**S** *Scordium* Dioscoridi l. 3. c. 125. quod *Altium* aliquantum redeat: at *Galenus* 3. simpl. propter acrimoniam *Scorodo*, id est. Alio ad similem, nomen sortitum putat: quibusdam, *Cratæva* auctore, videtur, ab inventore dicitur: Plinio l. 25. c. 6. *Scorodori* sive *Scordion*.

Genera: Græci unus meminere: at *Plinius* l. 6. duplex habet: alterum folijs lanuginosis, quæna similitudine. Est & alterius generis latioribus folijs menta astro similibus, &c.

I. *Scordium*.

*Scordium*, Trag. Matth. Dodon. Lac. Tur. Lon.

Ad. (cui & *Trixagopalufris*) Lob. Cast. Lugd.

Cam. Eyst.

*Scordium* verum, Gesn. hort.

*Scordium* commune, Ang.

*Scordium*, Tab. minus, Ger.

Magnitudine variat: hinc figuræ tres apud *Tabernæmontanum*.

*Scordij* majoris & medij nomine.

*Scordium* majus & minus, Ger.

II. *Scordium* lanuginosum.

*Scordium* *Creticum* lanuginosum, Cam.

III. *Scordium* alterum, live *Salvia* sylvestris.

*Salvia* sylv. Trag. (& *Nepeta* altera) Lon. Tab.

*Sphacelus* sylv. Dod. gal.

*Scorodonia*, Cord. in hist. Thal. Ger.

*Salvia*

Salvia montana & Ambrosia quibusdam, Gesner. hort.

Scordium majus Plinij, Eid.

Scordium alterum Plinij, Ad Lob. Cam.

Salvia agrestis sive Sphacelus, Dod. Lugd.

Melinum alterum brevius, Cæf.

Scordium 2. folijs amplis instar Melissæ, vel Calaminthæ primæ, in Samnitibus ad ripas Piscaræ nasci, Anguillara scribit: idemq; in Græ-

cia reperiri, quod odore & qualitate à primo dissimile non sit.

IV. Scordium alterum lanuginosius verticillatum.

Scordotis Plinij, Hon. Belli, epistola quinta ad Cluf.

Scordotis legitimum Plinij, Ponæ.

V. Scordio affinis, Elephas ob florem, Elephas Campoclarensum, Col.

## CHAMÆDRYS.

**X** *Apud Dioscorid. l. 3. c. 112. quasi humilium quercus, quod folia Quercus habeat, & hujus respectu quasi humi repat: cui & χαμαίδρη: & quibusdam roboret, propter similitudinem cum Teucrio. Triffaginem Gaza vexit apud Theoph. 9. hist. 10. Sic Plinio l. 24. cap. 15. Chamædrys quæ latine Triffago, quam aliqui Chamædromem alij Teucrion appellaverunt. Sic alij Serratæ, à folijs serratis, à qua ferram inventam dicere, & Quercula minor.*

Unius solum apud Dioscoridem & veteres mentio fit.

I. Chamædrys arborea Ægyptiaca.

Chamædrys arborea in Insula Cocyrae, Alp.

Ad cubitos duos exurgit. folijs duplo aut triplo, quàm in Italica majoribus.

II. Chamædrys major repens.

Triffago, seu Chamædrys, Matth. Lugd.

Triffago, Lac. Trixago, Cast.

Chamædrys, Ang. Ad. Lob. Cæf. major primus, Cluf. pan.

Chamædrys major repens, Dod.

Chamædrys mas, Cam.

Chamædrys major 1. & 2. Tab.

Chamædrys major, & Chamædr. latifolia, Ger.

Folio majore & minore variat: floribus item albis ac rubellis in eadem planta.

III. Chamædrys minor repens.

Chamæpitys, Brunf.

Chamædrys, Dod. gal. Cord. hist. Gesn. hor. Tabern. Eyst.

Chamædrys vera, Trag. Tur. Cord. in Diosc.

Chamædrys vera mas, Fuch.

Chamædrys vulgaris mas, Lon.

Chamædrys major, Lob. ico. Lugd. minor, Ger.

Chamædrys repens minor, Dod.

Chamædrys major, vel 2. Cluf. pan.

Chamædrys vulgaris, vel 2. Eid. hist.

Flore est purpureascentis, rarius niveo.

IV. Chamædrys spinosa: in Phycop. Matthiolo & Prodomo descripta.

V. Chamædrys alpina Cisti flore.

Cervaria, Gesn. hort.

Herba cervi quibusdam, Eid. fracto.

Chamædrys montana frutescens durior, Ad. Lobel.

Chamædrys 3. sive montana, Cluf. pan. & hist.

Chamædrys montana, Lugd. Tab.

Chamædrys alpina Simleri, Cam.

Argentina Mompeliaca, Tab.

Teucrium alpinum Cisti flore, Ger.

VI. Chamædrys alpina saxatilis.

Teucrium 3. Cluf. pan. 6. pumilum, Eid. hist.

Veronica petraea sempervirens, Ponæ.

VII. Chamædrys Hispanica minima hirsuta, quarto loco in Prodomo descripta.

an Teucrium minimum, Cluf. hist.

VIII. Chamædrys unicaulis spicata.

Trixago Apula unicaulis, Col. cui fortè

Verbena recta Dioscoridis.

IX. Chamædrys Austriaca folijs tenuissimè laciniatis: quæ 2. in Prodomo.

X. Chamædrys Hispanica folijs tenuissimè divisis: 3. in Prodomo.

XI. Chamædrys spuria major latifolia.

Veronica maxima, Lugd.

an Chamædrys mas altera, Cam.

XII. Chamædrys spuria major altera, sive frutescens.

Teucrium 1. vel Teucrium majus pannonicum latifolium, Cluf. pan. at in hist.

Teucrium quartum.

Hujus duæ species: altera virgis erectis caulibus quadrangulis, nonnunquam rotundis, magis minusq; hirsutis lignescens, & ex una ala communiter cauliculis 4. prodeuntibus folijs latiori-



coloribus: altera virgis humi diffusis, frequentibus, ut interdum magnos cespites late tegant, folijs minoribus & flore dilutior: & hæc est Teucrij quarti species secunda, Clus. hist.

XIII. Chamædrys spuria hederacea repens, sive Scutellata repens.

Chamædrys hederacea, in Cat. Altorff.

XIV. Chamædrys spuria major angustifolia.

Chamædrys altera, Trag.

Teucrium primum, Matth. Lugd. 2, Tab.

Chamædrys vulgaris mas, Fuch. Tur. Lugd.

Hierobotane fœmina, Dod. gal. Lugd.

Pseudochamædrys, Gesf. hort.

Chamædrys sylv. Dod.

Veronica lupina facie Teucrij pratensis, Lob. ic.

Auricula muris quinta, Cæf.

Teucrij quarti species tertia, Clus. hist.

XV. Chamædrys spuria minor rotundifolia.

Chamædrys, Brunf. falsa, aliquibus Teucrium, Gesf. hort.

Chamædrys vulgaris fœmina, Fuch. Tur. Lon. Lugdun.

Hierobotane mas, vel Verbenaca supina mas, Dodon. gal. Lugd.

Teucrij species quam Chamædryn vocant, Cord. in Diosc.

Teucrium pratense, Ad. Lob. & Teucrium spurium Chamædryoides, Lob. ico.

Pseudochamædrys, Thal.

Auricula muris sexta, Cæf.

Teucrium tertium minus, Tab.

Chamædrys sylv. Ger. Clus. hist.

Alia caulibus altioribus, folijs rotundioribus, amplioribus, flore cæruleo: alia folio rotundiore, sed minore, hispidiore, dentato.

XVI. Chamædrys spuria minor latifolia.

Teucrium secundum, vel Teucrium pannonicum minus, Clus. pan. at. s. Eid. hist.

Teucrium pannonicum, Tab. Ger.

Flos aut cærulei saturati coloris aut dilutioris & quasi cinerei: sic ex carne candicans.

XVII. Chamædrys spuria latifolia minima.

Veronica tetragona mont. recta minima, Col.

XVIII. Chamædrys spuria minor angustifolia: pro quinta in Prodrom. descripta: quam Teucrij quarti speciem j. Clus. hist. secundum descriptionem diceremus, nisi figura ejus aliam ostenderet.

XIX. Chamædry spuria affinis rotundifolia scutellata.

Alyssum Dioscoridis montanum, Col.

## CHAMÆPITYS.

**X** *Amumivus* Dioscoridi lib. 3. c. 175. & 176. quasi humilis picea, quod folia Piceam oleant. Plinio l. 24. c. 6. Chamæpitys, Latini *Ajuga* appellatur, diciturq; propter abortus, ab alijs *Thum terra*.

Genera tria Dioscor. 1. herba est que humi serpit incurva similis, folijs sempervivi minoru: at multo tenuioribus pinguioribusq; & hirsutis: floribus luteis, vel candidis: 2. cubit alibi ramu in anchora speciem incurvat flore candido: 3. maiori herbula laviu folioli tenuibus, albiu pilosis: caule scabro, candido: pusillum floribus luteis, &c. Plin. l. c. cubit alibi ramu flore pinus & odore: altera brevior & incurva similis: tertia eodem odore, & ideo nomine quing; parvulo cauleculo, crassiusculine digitali, folijs scabru, exilib. albu, in petru nascena.

I. Chamæpitys incana exiguu folio.

Chamæpitys prima, Fuch. Ang. Lon. (qui flores purpureos tribuit.)

Chamæpitys tertia, Dod. Matth. Ital. Lac.

Ajuga 1. Tur. sive Chamæpitys altera, Matth.

Chamæpitys 1. Dioscoridis odoratio, Ad. Lob.

Chamæpitys tertia, sive altera, Matth. Lugd.

Folij est incanis, hirsutis flosculis luteis distincta ab Echio scorpioide, Chamæpityde vermiculata, & Anthylloide, Thalij.

II. Chamæpitys moschata, folijs serratis: an prima Dioscoridis?

Chamæpitys species Monspelij, Gesf. hor.

Iva moschata Monspeliensium, Ad. Tab. Ger.

Anthyllis altera, Clus. hist. & hist. Cast. Lugd.

Anthyllis Chamæpitydes minor, Lob.

Chamæpitys spuria prior, sive Anthyllis altera, Dodon.

Chamæpitys altera & major, Cæf.

III. Chamæpitys lutea vulgaris, sive folio trifido.

Chamæpitys tertia, Trag. Fuch. Ang.

Chamæpitys secunda, Tur. Lon.

Chamæpitys 1. Matth. Dod. Lac. Cord. hist. Lugd.

Chamæpitys, Gesf. hor. Cæf. vera, Cord. in Diosc.

Chamæpitys major, Tab. mas, Ger. Eyst.

Ajuga sive Chamæpitys mas Dioscoridis, Ad. Lobel.

Ajuga, Cast. tertia, Tur.

Ajuga luteo flore, Clus. pan. & hist.

Peristerona Cratevæ, Ang.

Flore est luteo: at Clusius in hist. meminit

Ajugæ multifidis folijs floribus rubescente, quod Fuchsius & Dod. tertium sit.

IV. Chamæpitys cærulea Austriaca.

Chamæpitys Austriaca, Clusius pan. & histor.

Eysett.

Chamæpitys cærulea, Cam.

Flore est communiter cæruleo: rarius purpureo.

V. Chamæpitys spuria multifido folio, Lamij flore.

Ajuga adulterina, Clus. hisp. Lugd.

Chamæpitys spuria altera, Dod. qui duplicem figuram habet, quem Lugd. historia imitatur.

Chamæpitys adulterina, Lob.

Chamæpitys alia, Com. ep.

Pseudochamæpitys, Clus. hist.

## A L S I N E

**A**lsine Dioscoridi l. 4. c. 87. quod lucos, quos ἄλσιν nominant & umbrosa loca amet: & Μυρ ἄρ, id est, muris auricula, quod musculorum auribus folia similia habet. Sic Plinio l. 27. c. 4. Alsine quam quidam Myosoton appellant, nascitur in lucis, unde & Alsine dicta. Unius uterq. meminit.

I. Alsine hederulæ folio.

Alsine quartum genus, Fuch. ico.

Elatine, Dod. gal. Lac. Thal. prior, Lugd.

Lappago Plinij, Ang.

Alsine mas, Gef. hor. Species in vinetis, Eid. col.

Alsine spuria prior, Dod.

Morsus gallinæ folio hederulæ, Ad. Lob.

Centunculus hirsutior, Cæs.

Alsine hirsuta, Cam.

Alsine hederacea, Tab. Ger.

Variat foliorum magnitudine: flore purpurascens, aut dilute purpurascens: rarius lacteo.

II. Alsine Veronicæ folijs flosculis cauliculis adhærentibus.

Elatine polyschides, Lugd.

Alsine folio Veronicæ, Tab. Ger.

Alysson, Col. in phytobas.

III. Alsine Chamædrifolia flosculis pediculis oblongis insidentibus.

Morsus gallinæ tertia, Trag.

Alsine media, Fuch. Lugd. Cam.

Alsine, Tur. alterum genus, Fuch. ico.

Elatine altera, Dod. gal. Lugd.

Alsine altera folijs fereatis, Gef. col.

Alsine folijs Triflaginis, Lob. ico, Tab. Ger.

Alsine spuria altera, Dod.

Antirrhinon Dioscoridis, Cæs.

IV. Alsine triphyllus cærulea.

Hyndelstrout, cæruleis flosculis, Trag.

Alsine parva recta, Lob. ico. Cam.

Elatine triphyllus, Lugd.

Dasilicobotan cæruleo flore, Thal.

Alsine recta, Tab. Ger.

Altera majoribus & crassioribus folijs: altera minoribus.

V. Alsine Symphyci petræi capitulis.

Alsine alia, Clus. hisp. Boëtica, Eid. hist.

VI. Alsine scandens baccifera.

Cyclaminus altera Dioscoridis, Ghini.

Recentiorum planta, Alsine majoris facie baccis Solani, an Cacubalum Plinij, Ad.

Alsine repens, Clus. hisp. & hist. ap. alt. Lob. Dodon. Cast. Cam.

Alsine major, Clus. hist. maxima, Thal.

Cucubalum Plinij, Lugd.

VII. Alsine baccifera similis suis acinis. Herba adversus hæmorrhoides admirabilis acini, Clus. hist. app. alt. ad lib. 6.

VIII. Alsine altissima nemorum.

Morsus gallinæ majus, Brunf.

Morsus gallinæ 2. genus, Trag.

Alsine major, Dod. Cam. Tab. Ger.

Alsine major, & Alsine genuina Diosc. Lugd.

Alsine maxima, Lob. ico. media, Thal.

Centunculus viticulis cubitalibus, Cæs.

IX. Alsine angustifolia.

Alsine maxima, Lugd.

X. Alsine major.

Alsine marina, Dod. Tab. Ger.

Alsine sive Hippia major, Lob. ico.

Centunculus, Cæs.

XI. Alsine media.

Morsus gallinæ primum genus, Trag.

Alsine, Math. Ang. Lac. Lon. Lob. Lugd. Cast.

Alsine major, Fuch. 1. genus, Eid. ico.

Alsine media, Dod. gal. Tab. cui & Alsine, Ger.

Hippia minor, Cord. hist.

Alsine minor, Dod. Ad. Lob. ico. Thal.

Alsine morsus gallinæ femina, Gef. hor.

XII. Alsine minor multicaulis.

Morsus

Morfus gallinæ minor, Brunf.

Morfus gallinæ species 4. Trag.

Alfine, Turn. minor, Fuch. Dod. gal. Lon. Thal. Lugd. Tab.

Alfines 3. genus, Fuch. ico.

Alfine minima, Dod Ad. Lob. Cam. Ger.

Centunculus minutissimis cauliculis, Cæs.

XIII. Alfine minor lini capitulis.

Alfine minima suffruticis instar, Thal.

Alfine petraea minima, Tab. petraea, Ger.

Variat : alia suffruticis similis, rigidis cauliculis : alia cauliculis tenerioribus : tertia medio modo se habet cauliculis non adeo implexis : & hujus, ut & prioris, plures differentiae notantur, foliorum longitudine, tenuitate, hirsutiae differentes.

XIV. Alfine minor folijs rotundis.

Alfines minoris alia species, Thal.

Variat : alteri enim folia sunt latiora, rotundiora : alteri subrotundiufcula & mucronata : alterius, medio modo se habent.

XV. Alfine verna Androsaces capitulis : sub 6. in Prodomo descripta.

XVI. Alfine affinis Androsace dicta major. Androsace altera, Matth. Lugdun. Clus. pan. & hist. Cam. Tab.

Androsace annua spuria, Ger.

Morfus gallinæ, vel Alfines species non ex Syria, sed ex quadam antiqua macerie, Ad.

XVII. Alfine affinis Androsace dicta minor : sub 5. in Prodomo descripta.

XVIII. Alfine nodosa gallica.

Alfine nodosa, Lugd.

*Alfine Spergula dicta.*

I. Alfine Spergula dicta major.

Spergula, Dod. Lugd.

Sagina Spergula, Ad. Lob.

Alfine tenuifolia altera, vel terrestris altera *verisimilis*, Col.

II. Alfine Spergulae facie media.

Spergula marina, Lugd.

Anthylloides, Thal.

III. Alfine Spergulae facie minor : sive Spergula minor stocculo subcaeruleo : quæ sub

Alfine 9. in Prodomo describitur.

an Asterias sive Stellaria, Lugd.

*Alfine palustris.*

I. Alfine aquatica major.

Alfine palustris, Tab. Ger.

II. Alfine aquatica media.

Alfine fontana, Tab. Ger.

III. Alfine aquatica minor & fluitans.

Alfine fluviatilis, Tab. Ger.

IV. Alfine palustris minor, folio oblongo :

quæ 2. in Prodomo, &

Portulacæ aquaticæ nomine missa.

V. Alfine palustris minor serpillifolia : quæ 1. in Prodomo.

VI. Alfine littoralis folijs Portulacæ.

Alfines genus pelagicum, Clus. hist.

VII. Alfine maritima flore rubente.

Alfine maritima Neapolitana, Col.

VIII. Alfine minor Androsaces alterius

Matthioli facie : quæ 5. in Prodomo.

IV. Alfine nodosa Germanica : quæ 8. in Prodomo.

X. Alfine tenuifolia muscosa.

Alfine muscosa, Lugd.

*Alfine alpina.*

I. Alfine alpina glabra : in Phytopinace sub 21. at in Prodomo sub 3. descripta.

II. Alfine alpina juncea folio : sub 22. in Phytop. at sub 4. in Prodomo proposita.

III. Alfine montana capillacea folio.

Alfine faxifraga angustifolia minima montana, Col.

IV. Alfine alpina cauliculis nudis prolifera. an Saxifraga 3. Col.

V. Alfine alpina minima glabra : quæ 7. in Prodomo.

VI. Alfine montana latifolia flore laciniato  
Alfine montana hederacea maxima, Col.

*Alfine hirsuta arvensis.*

I. Alfine hirsuta magno flore.

Auricula muris quibusdam, Dod. gal.

Alfine spuria 3. Eid. lat.

Alfine myosotis, Ad.

Alfine hispida 1. Thal.

Hæc duplex est : alterius folia minore hirsutie donantur : alterius pilosiora sunt.

II. Alfine hirsuta altera viscosa.

Auricula muris 3. Dod. gal.

Alfine species glutinosa, Ges. col.

Alfine spuria 4. Dod.

Alfine viscaria, Cam.

III. Alfine hirsuta minor.

Alfine hispida minuta, Thal.

## ANAGALLIS.

**A** *Nagall* Dioscoridi lib. 2. cap. 209. *Anagallida*, aliqui *Corchorum* vocant. Plinio lib. 23. cap. 13. Genera duo Dioscoridi & Plinio florentium distantia: quæ cæruleo est flore, semina: quæ purpureo mas iisdem dicitur.

*Anagallu terrestru.*

I. *Anagallis phœniceo flore.*

*Anagallis*, Cord. in Diosc. Gesf. hor. mas, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. Tur. Lac. Lon. Lugd. Cast. Ger.

*Anagallis rubro flore vel purpureo*, Gesf. col.

*Anagallis phœnicea mas*, Ad. Lob.

*Anagallis phœnicea*, Tab. punicea, Cæf.

*Anagallis phœniceo flore*, Cam. mas, Cluf. hist.

*Anagallis terrestris mas*, Thal.

*Corchorus Cratevæ*, Theoph. & Nicandri, Ang.

Hæc Dioscoridis mas est: aliquibus *Corallina* Æginetæ: alijs *Corchorus* Plinij: alijs *Molochia Serapionis*. Variat floris colore: phœniceo est communiter: est & purpurascens sive obsoletè purpureo, cui phœniceum quidpiam permixtum conspicitur, monente Cluf. hisp. & hist.

II. *Anagallis cæruleo flore.*

*Anagallis femina*, Brunf. Trag. Matth. Fuch.

Dod. Tur. Lac. Lon. Cast. Lugd. Ger.

*Anagallis cærulea femina*, Ad. Lob. Cluf. hist.

*Anagallis cærulea*, Cæf. Tab. cæruleo flore, Cam.

*Anagallis terrestris femina*, Thal.

Flore est cæruleo, rarius albo.

III. *Anagallis cærulea, folijs binis ternisve ex adverso nascentibus.*

*Anagallis tenuifolia* Monnelli, Cluf. hist. ap. alt.

IV. *Anagallis lutea nemorum.*

*Numularia sylvatica vel mas*, Gesf. hort.

*Anagallis lutea*, Ad. Lob. Lugd. Thal. Tab. Ger.

*Anagallis luteo flavo flore*, Cam. Cluf. pan. & hist.

*Alfina lutea*, Lugd.

Folio aliquando ampliore reperiri, auctor est Cluf. hist. ap. alt.

*Anagallu aquatica.*

I. *Anagallis aquatica major folio subrotundo.*

*Anagallis aquatica*, folio maximo, Thal.

*Berula sive Anagallis aquatica*, Tab.

*Anagallis sive Beccabunga*, Ger.

II. *Anagallis aquatica minor folio subrotundo.*

*Sion*, Brunf. non odoratum 1. Trag.

*Sium*, Ang. Eric. Cord. Fuch. Lon. non odoratum quibusdam, Gesf. hort.

Sij alterum genus, Fuch. ico.

*Cepæa*, Tur. Dod. gal.

*Anagallis aquatica*, (sive *Becabunga Germanorum*) Ad. Lob. Dod. Lugd. Thal. Cæf.

*Anagallis aquatica minor* 1. Tab.

*Anagallis aquatica minor flore pallido*, Ger.

Quibusdam *Sium* Dioscoridis lib. 2. cap. 154. sed folia olusatri desunt & inodora sunt: alijs *Cepæa* Dioscoridis lib. 3. cap. 168. sed folia *Portulacæ* hæc non habet.

III. *Anagallis aquatica major folio oblongo.*

*Berula major*, Tab.

*Anagallis aquatica*, Ger. major, Gesf. col.

IV. *Anagallis aquatica minor folio oblongo.*

*Anagallis aquatica minor* 2. Tab.

*Anagallis aquatica minor*, Ger.

V. *Anagallis aquatica folijs pulegij serpiflve.*

*Sium alterum* & *Anagallis aquatica*, Trag.

VI. *Anagallis aquatica folio rotundo non crenato.*

*Anagallis aquatica altera*, Lob. Lugd.

*Anagallis aquatica* 3. Lob. ico.

Guilandinus modò *Alisma*, modò *Cochleariam* nobis nominavit: & alij *Samolum* Plinij lib. 25. cap. 11. faciunt.

VII. *Anagallis aquatica angustifolia.*

*Anagallis aquatica* 4. Lob. ico.

VIII. *Anagallis aquatica angustifolia scutellata*: hæc in *Prodromo*, & pro 9. in *Phytopynace* descripta.

ELATINE.

**E** *laffu folia habet* Helxine, at minora & rotundiora pilosa, &c. in segetibus, Dioscoridi lib. 4. cap. 40. Idem Plinius lib. 27. cap. 9. *Elatine* nomine.

I. *Elatine folio subrotundo.*

*Veronica formosa*, Matth. Fuch. Gesf. hort. Tur. [Dod. Lon. Cæf. Cast. Lugd. (qui Matthioli & Fuchij figuram exhibet) Cam. Ger.

*Elatine*

Elatine Dioscoridis, Ad. Lob.

Verbasculum quorundam, Lugd.

Elatine, Tab. altera folio rotundo, Thal.

Reperitur folijs latioribus oblongis : dein folijs decuplo minoribus, rotundis Numulariæ forma, quam

Elatines alteram speciem Thalius facit.

II. Elatine folio acuminato in basi auriculato, flore luteo.

Elatine, Matth. Cast. Lugd. recta, Lob.

Elatine altera, Dod. Lob. ico. Tab. Ger.

Elatine folio acuminato, Thal.

Linaria hederulæ folio, Col.

In agris hirsutior & minor : in hortis glabrior & lætius virens.

III. Elatine folio acuminato flore cæruleo.

Differt à priore folijs rotundioribus, ad basin minus auriculatis : ac floribus, qui subcærulei, vel cærulei sunt : & Monspefuli in loco Gramuntio, & hinc inde circa vias reperitur.

\*\*\*\*\*

## SECTIO SECUNDA.

HELIOTROPIUM; AURICULA MURIS; ECHIUM; ONOSMA; ANCHUSA; LYCOPSIS; BUGLOSSA ET BORRAGO;

Cynoglossum; Cerinthe; Lithospermum; Symphytum; Pulmonaria; Consolida media; Brunella; Bellis.

### HELIOTROPIUM.

**H** *ἡλιοτρόπιον* Dioscoridi lib. 4. cap. 193. quod τὰ φύλλα τῆ τοῦ ἡλίου συνωριζομένηται, quod folia cum Sole circumagat : & *ονοπρία* & quod ramuli cum floribus, Scorpionum cauda modo inflectantur. Theophrasto 7. hist. 3. & 9. Solaris herba Gazæ vertente. Plinio lib. 22. cap. 21. Heliotropium quod cum Sole se circumagat, etiam nubo die, tantum sideris amor est, noctu velut desiderio contrahitur cæruleus flos.

Genera duo Dioscoridi : majus flore candido, aut fulsulvo : minus, semine verrucarum (hinc Verrucaria) pensili. Plinio, tricoccum & Heliotrophium : parvum & magnum intelligens.

I. Heliotropium majus Dioscoridi.

Heliotropium majus, Matth. Ang. Dod. Gefn.

hort. (& Scorpioides album) Lac. Adv. Lobel.

Cæs. Lugd. (& Verrucaria) Cast. Taber. Camer.

Ger. Clus. hist.

Herba cancri majus, Lon.

II. Heliotropium minus supinum.

Heliotropium supinum, Dod. Clus. hisp. & hist.

Ger. desc.

Heliotropium humi sparsum, Lugd.

Heliotropium minus. Tab.

III. Heliotropium supinum alterum.

Heliotropium minus folio ocimi, Gefn. col.

Heliotropium minus, Lob. ico. Ger. repens, Ad.

Heliotropium minus 2 Tab.

Verrucaria altera minor, Lugd.

IV. Heliotropium tricoccum.

Heliotropium minus, Matth. Lac. Cast. Lugd.

Dod. Cam. ep. & hort. cui & herba Clytiæ.

Heliotropium minus tricoccum, Gefn. hort.

Clus. hisp. & hist.

Heliotropium vulgare Tornefol Gallorum, si-

ve Plinij tricoccon, Ad.

Heliotropium parvum Dioscoridis, Lob.

Heliotropium tricoccum, Cæs. Lugd. Tab. Ger.

V. Heliotropium alterum, Matth. Lug. quid?

### AURICULA MURIS SIVE ECHIUM SCORPIOIDES.

**M** *ὄρε ἄρα* sive *μυρία ὀρίδα*, id est, muris auricula, quam *Myosotida* vocant, Dioscoridi lib. 2. cap. 214. *Myosota* sive *Myosotis*, Plinio lib. 27. cap. 12.

*Echium scorpioides* : Echium, propter foliorum formam : Scorpioides, eò quod ramulos floribus onustos caudarum Scorpionum instar contorqueant, vocamus : & cum alij *Myosotida*, alij *Heliotropium facians*, *Heliotropium* sequi, & *Echium* precedere volumus.

I. *Echium Scorpioides arvense*.  
*Auricula muris minor* 3. Trag.  
*Euphrasia* 4. & *Pilosella sylvestris*, Eid.  
*Scorpioides mas*, Dod. in ico.  
*Scorpioides aquaticum*, Gefn. hort.  
*Scorpioides* 3. Dod.  
*Myosotis hirsuta repens*, Adv. Lob.  
*Alline myosotis*, sive *Auricula muris*, Lobel. icon.  
*Heliotropium minus alterum*, Cæs. tertium, Taber.  
*Echij palustris altera species*, Thal.  
*Auricula muris cærulea*, Tab.  
*Pilosella flore cæruleo*, Ger.  
*Heliotropium erectum*, Eid.  
*Echium minimum vel Buglossum*, Col.  
*Scorpioides tertium minus Dodonæi*, Eyst.  
 Variat magnitudine, aliquando vulgata quadruplo major est & hispidior.

II. *Echium Scorpioides minus flosculis luteis*: in Prodromo descriptum.  
 III. *Echium Scorpioides palustre*.  
*Cynoglossa minor*, Brunf.  
*Euphrasia cærulea*, Trag. Tab. Ger.  
*Scorpioides fœmina*, Dod. in ico.  
*Scorpioides aquaticum*, vel *palustre*, vel *cæruleum*, Gefn. hort.  
*Heliotropij species altera*, Eid.  
*Leontopodium*, Lon. Lugd.  
*Myosotis Scorpioides partim repens, partim erecta*, Lob. ico.  
*Heliotropium minus in palustribus*, Cæs.  
*Echium palustre*, Cordo, Thal.  
*Scorpioides tertium majus Dodonæi*, Eyst.  
 an *Auricula muris*, Matth. Dod. gal. Lac. Cast. Lugd.  
 Est glabrum, aliquando leviter hirsutum: flore est cæruleo, rarius niveo.

## E C H I U M

**E**χium, ἡ ἀλυσίδου *Dioscoridi lib. 4. cap. 27.* *Echium dictum voluit quoddam contra viperarum idus valeat: aliquod florescat capitula vipera similibus: sed Dioscoridi, quoddam semina nigra & ex ipso, capiti viperino similia habeat.*

*Genera: Plinio lib. 25. cap. 9.* *Echyos utriusque generis, pulegio simili folijs coronata: Item altera, quæ lanugine distinguitur spinosa, cui & capitula vipera similia sunt. Verum Dioscoridū Echium, à Plinio lib. 22. cap. 20. Pseudoanchusam dici putant, quam à quibusdam Enchusam, aut Derion, & multis alijs nominibus appellatum scribit.*

I. *Echium majus & asperius flore albo*.  
*Echium flore albo*, Cam. ep. Matth. & hort.  
 II. *Echium vulgare*.  
*Echium*, Matth. Ang. Lac. Gefn. hort. Dod. Lob. ico. Cast. Lugd. vulgare, Clus. pan. & hist.  
*Echium, sive Alcibiaticum*, Dod. gal.  
*Lycopsis*, Cord. in Diosc.  
*Buglossum sylv. Lon.*  
*Echium, Buglossum agreste*, Ad.  
*Echium floribus purpurantibus rubellis*, Lob.  
*Anchusa major*, Cæs.  
*Anchusa sylv. Thal.*

Flos communiter cæruleus est: aliquando ex purpura rubet, vel subcinereus est. Caulis aliquando duorum tritumve digitorum latus, quemadmodum in Beta, Digitali purpurea, Cucurbita, Tithymalo cyparissia & alijs observavimus.

III. *Echium Creticum latifolium rubrum*.  
*Echium* 3. vel *Echium Creticum* 1. Clus. hist.

IV. *Echium Creticum angustifol. rubrum*.  
*Echium* 4. vel *Echium Creticum* 2. Clus. hist.  
 V. *Echium sylv. lanuginosum*.  
*Echium* 1. & *Echium pullo flore*, Clus. pan. & hist.  
 VI. *Echium sylv. hirsutum maculatum*.  
*Echium* 2. vel rubro flore, Clus. pan. & hist.  
 Flos nunc saturatè rubente, modo dilutiore colore præditus est.  
 VII. *Echium alpinum luteum*.  
*Echium montanum Dalechampi*, Lugd.  
*Trachelium hypoleucis*, Clus. pan.  
 VIII. *Echium pumilum flore luteo*.  
*Echium flavo flore*, Clus. cur. post.  
 IX. *Echium luteum minimum*.  
*Echioides lutea minima Apula campestris*, Col.  
 X. *Echium pumilum album*.  
*Echioides parva alba Amphibia*, Col.  
 XI. *Echium Hispanicum flore calcari donato*: quod 1. est in Prodromo.



## O N O S M A.

**O**nosma Dioscoridi l. 3. c. 147. folijs Anchusa sine caule, semine & flore: & Plinio l. 27. c. 12. cui Onosma. Onosma, Matth. Lac. Lon. Cast. Lugd. Tab. Ger. Haënnu plantam non vidimus: esse autem Lycopsidis cognatam & in Anchusis habendam, figura ostendit: & Adversariorum authores, id velle videntur.

## A N C H U S A.

**A**γχυσαν Dioscoridi l. 4. c. 23. παρὰ τὸ ἄγχαν quod vim suffocatoriam habeat, dicta videtur: alij verò à florido radice colore, siquidem ἄγχιστον erat suco illius: hinc Galennus in Oratione sua ser. ad artes 6. Anchusa πικρὰ dicit. Anchusa etenim ab Echio, Lycopsides & Buglossa, radicis sanguineo succe, quo manus inficiuntur, Dioscoride monente, differt.

Genera tria Dioscoridi: 1. qua ὀνόμα, folijs Lactuca bifutis: 2. qua Ἀλκιβιάδων ἢ ὀνυχίδες, quæ priore minor: 3. secunda non dissimilis, semine puniceo. Plinius lib. 22. c. 20. primam Dioscoridi nomine Anchusa, & l. 27. c. 5. secundam sub Alcbio proposuit: & l. 22. c. 21. Onochiles habetur.

I. Anchusa Echij folijs & floribus.

Anchusa, Ad.

II. Anchusa lutea major.

Anchusa tertia, Matth. Ang. Lac. Cam.

Anchusæ prima species fortè, Cord. in Diose.

Buglossa rubra, vel Anchusa tertia, Lon.

Anchusa lutea, Ad. Lob. ico.

Anchusa quarta seu Pseudoanchusa, Dod.

Anchusa flore exalbido, Clus. pan & hist.

Flos luteus, rarius albus: aliquando ex albo pallescens.

III. Anchusa lutea minor.

Anchusa Echioides lutea, Col.

IV. Anchusa puniceis floribus.

Anchusa, Gesl. hor. secunda, Matt. Ang. Lac. Lug.

Buglossa rubra, vel Anchusa 2 Lon.

Anchusa minor seu Alcbiadiadon, vel Onochiles, Ad.

Anchusa parva, Lob. ico.

Anchusæ alterum genus Onochiles dictum, Clus. hist.

V. Anchusa minor Patavina.

Anchusa tertia, Cam. ep.

VI. Anchusa angustifolia.

Anchusa lignosior angustifolia, Ad. Lob. icon.

Lugd. Clus. hist.

Tragoriganum nothum Dalechampi, Lugd.

Lithospermum minus repens in Phytopynace, at in Matthiolo

Lithospermum fruticosum angustifolium,

## L Y C O P S I S.

**A**νψισ, quibusdam ἄγχυσαν, quia radice etiam rubra est Dioscoridi l. 4. c. 6. Lycopsis, Plinio l. 27. c. 11. Sic dicta fortè à cauli, foliorum & florum impexa bifutis pedem lupinum imitante.

I. Lycopsis.

Cynoglossum, Matth. Lac. Lugd.

Cynoglossa vera, Cast.

Buglossum vulgare, Lon. ico.

Echij altera species, Dod.

Lycopsis, vel Lycapsis degener Anchusa, Æginetæ, Ad.

Lycopsis altera Anglica, Lob. Lugd.

Echion, Cast.

Aliquando caule caret: Monspelica flore est dilutè purpureo: Anglica saturationis est purpureæ.

II. Lycopsis Ægyptiaca.

Lycopsis Dioscoridis, Cynoglossi genus, Ravvolff. Lugd. ap.

## B U G L O S S A E T B O R R A G O.

**B**οβλάμων, Dioscoridi libr. 4. cap. 28. quod linguae bubulae imitetur. Dicitur & Εὐβοιων, quod in vinum coniecta animi voluprates augeat, Dioscoridi & Plinio libr. 25. cap. 8. cui Buglossos, boum lingua similis.

Borrago

*Borrage* verò officinæ, ad imitationem *Marcelli dicta*, *Buglossa vera veterum censetur*. & ab officinarum *Buglossa* diversa est, quam aliqui *Buglossam veterum*, alij eorundem *Lycopsin*, alij *Cirsium*, nescio quàm rectè, dicunt. Utrumq; pro *Buglossa* agnoscimus, ipsam *Borraginem officinarum*, *Buglossam lazisoliæ*: & *Buglossam officinarum*, *Buglossam angustifoliam* nominantes. At *Guilandinus*, *Buglossum officinarum*, *Buglossum antiquorum esse* asserit: *Borraginem* verò à *Dioscoride Echion* vocari sufficitur.

*Buglossum sativum.*

I. *Buglossum latifolium*, *Borrage*.

*Borrage*, Brunf. Trag. Fuch. ico. Ang. Gc. hort. Dod. Lon. Lugd. Cæs. Cam.

*Buglossum*, Matth. Fuch. Tur. Lac. Ad. Cast.

*Buglossum* verum, Dod. gal. Cord. in Diof.

*Borrage* flore cæruleo: & albo, Eyst.

*Buglossum latifolium*, Lob. vulgare, Clus. hisp.

*Buglossa* urbana, Clus. hist.

*Borrage* floribus albis, Tab. hortensis, Ger.

Flore est communiter cæruleo: aliquando

candido, vel ex pallescente roseo: interdum Au-

tumno suaverubente, Et Taber. proponit

*Borraginem* sylv. floribus albis, quæ

*Borrage* flore albo, Ger. &

*Borraginem* tenuifoliam, quæ

*Lycopsis* Anglica, Ger.

II. *Buglossum latifolium semper virens.*

*Buglossum semper virens*, Ad. Lob. ico. Lugd.

Camer.

*Buglossum Hispanicum*, Cæs. Tab.

*Borrage* semper virens, Ger. Hispan. latifoli-

um, Eystett.

III. *Buglossum angustifolium majus.*

*Buglossa*, Brunf. Cæs. Italica, Trag. Lon.

*Buglossa* longifolia, Cord. hist.

*Buglossum* vulgare, Matth. Lac. Cast. Lugd. Ta-

ber. Ger.

*Cirsium Italicum*, Fuch.

*Lycopsis*, Ang. *Lycopsis*, Dod. gal.

*Cirsium*, Cord. in Diof.

*Echium Italicum spinosum*, Fuch. ico.

*Anchusa*, Tur. *Anchusa Alcibiadion*, Dod.

*Buglossus Italica*, vel *Gallica major*, vel vera,

Gc. hort.

*Buglossum angustifolium*, Ad. Lob.

*Buglossum Italicum*, vel *Hispanicum grande*,

Camer.

*Buglossum Italicum* flore cæruleo: flore albo,

Eystett.

Floris color cæruleus, albus, rubeus, interdum

variegatus: folia modo latiora, modo angustio-

ra sunt hinc figuræ tres apud Tab. & Ger. apud

Ullum *Buglossa vulgaris Italica mas*, & *Italica*

femina: apud hunc, *Buglossa vulgaris*, *Anchusa Alcibiadion* & *Anchusa lutea*, ico.

Aliquando folijs est latioribus, sinuosis, flore albo, qui cum ramo instar *Scorpioidis* incurva-

tur, eod; à priore differt, quod

*Buglossum* folijs sinuosis nominavimus.

IV. *Buglossum vulgare*, asperitate & proce-

ritate discrepans.

*Buglossum vulgare violaceo & albo colore*,

Eystett.

V. *Buglossum angustifolium minus.*

*Buglossa minor*, Trag.

*Cirsium Germanicum*, Fuch. *Loniceri*, Lugd.

*Echium lanuginosum primum*, Fuch. ico.

*Anchusa* genus, Dod. gal. 3. Eid. lat.

*Buglossus minor*, Gc. hor.

*Cirsium minus*, Lon.

*Echij* facie *Buglossum minimum*, Lob.

*Buglossum minus sativum*, Lugd.

*Buglossum sylvestre.*

I. *Buglossum sylvestre majus nigrum.*

*Buglossum alterum* flore nigro, Matth.

*Buglossum sylv. Matthioli*, Lugd.

*Buglossum sylv. majus*, Cast.

*Buglossa sylv. nigra*, Thal.

Flore nigro, rarissimè albo.

II. *Buglossum sylv. minus.*

*Buglossum sylv. Brunf. Dod.*

*Borrage sylv. Trago.*

*Echium*, Fuch. *Germanicum spinosum*, Eid. ico.

*Echium alterum*, Cord. in Diof.

*Lycopsis sylv. Dod. gal.*

*Buglossa sylv. Dod. sylv. altera*: Lon.

*Buglossum erraticum asperum echinoides*, Ad.

*Echium Fuchij*, Lugd. Cam.

III. *Buglossum sylvestre minus alterum &*

*asperius.*

*Buglossa sylv. Trag.*

*Anchusa minor*, Cord. hist.

*Lycopsis*, Lon. Lugd.

*Buglossum sylv. minus*, Cast. Lugd.

Flos ex cæruleo purpurascit, rarius candi-

dus est.

IV. *Buglossum sylv. tertium.*

Cyno-

Cynoglossum, Trag. Tur. officin. Fuch. falsum, Lon.

Lycopsis, Fuch. icon.

Cynoglossos altera Plinij, Dod. gal.

Anchusa aspera, Cord. in Diosc.

Hoc prædicto simile, sed non idem.

V. Buglossum syl. caulibus procumbentibus.

Alyssum Germanicum Echioides, Lobel. Lugdunen.

Buglossæ sylv. species, Thal.

Aparine major Plinij, Tab. Ger.

Crucialis quædam, Cæf.

Asperugo spuria, Dod. belg.

Borrage minor sylv. Col.

## CYNOGLOSSUM

**K** *Ὠχλῶσος* Dioscoridi lib. 4. cap. 129. id est, Lingua canina, à foliorum forma quæ Plantagini latissimæ similia, at angustiora, minora & lanuginosa Dioscoridi. Plinio lib. 25. cap. 8. Cynoglossos caninas imitans linguas, topiarijs operibus gratissima: eil & alia similij ei, & quæ ferat lappas minutas. Neutrū Dioscoridū esse censuimus.

I. Cynoglossum maximum Belgicum.

Cynoglossum maximum, Lob. obl.

Hoc folijs, floribus & seminibus vulgato duplo majus est.

II. Cynoglossum majus vulgare.

Cynoglossa major, Brunf.

Cynoglossum vulgare, Matth. Lob. Thal. Cast.

Lugd. Clus. hist. Eyst.

Cynoglossum, Dod. Ad. Tab. Ger. officinarum, Lon.

Cynoglossus vulgaris, Ges. hor.

Cynoglossa, Cæf. major, Cord. in Diosc.

Cynoglossa vulgaris major, Col.

Lycopsis, Lac.

Hoc sæpe sine caule reperitur, quod tamen à caulifero diversum non est: hinc duæ figuræ apud Matthiolum, Lob. Dod. Rarius flore albo occurrit.

III. Cynoglossum sylvaticum rubente caule.

Cynoglossum sylvaticum Hæcynicum, Thal.

an Cynoglossum montanum, Cæf.

an Cynoglossa montana maxima frigidarum regionum, Col.

IV. Cynoglossum sempervirens: in Phytopynce & Prodomo descriptum.

an Cynoglossa media altera virente folio, Col.

V. Cynoglossum globoso flore.

Cynoglossa media montana incana angustifolia altera, Col.

VI. Cynoglossum fructu umbilicato.

Cynoglossa altera media fructu *νοῦλαῖδας* sive *αυχρινάδες*, Col.

VII. Cynoglossum medium.

Cynoglossa similis planta Plinij.

Cynoglossa minor, Cord. in Diosc.

Cynoglossum pusillum Narbonense, Ad. Lob. ico. Lugd.

Cynoglossum parvum, Cæf. Italicum. Cam.

Cynoglossum pumilum, Clus. pan. sive Austria-cum alterum, Eid.

Cynoglossum Narbonense, Eyst.

Cynoglossa minor montana serotina altera Plinij, Col.

VIII. Cynoglossum Creticum argenteo angusto folio.

Cynoglossum parvum cinereum Creticum, Camerar.

Cynoglossum Creticum primum, Clus. hist.

an Cynoglossa media argentea Apula campestris, Colum.

IX. Cynoglossum Creticum latifolium frigidum.

Cynoglossum Creticum secundum, Clus. hist.

X. Cynoglossum minus.

Elatine, Trag. Lon.

Lappula rusticorum, Lugd.

Cynoglossa minor montana serotina altera Plinij, Col.

Hæc magnitudine variat, cum vix semipalmaris in Anglia reperiat.

## CERINTHE SIVE CYNOGLOSSUM MONTANUM.

**C** *Erinthe* Plinio lib. 21. cap. 12. est folio candido incano, cubitalis, capite concavo, mellis succum habente: florū avidissima sunt apes.

I. Cerinthe seu Cynoglossum montanum majus.  
Cerinthe, Gesn. hort. Cast. quorundam, Clus. hisp.  
Cynoglossa montana, Gesn. hort.  
Cerinthe major, Lob. Lugd. Cam. Clus. hist. Tabern. Ger.  
Telephium Dioscoridis quibusdam, Eid.  
Telephium maculosum, Cam.  
Maru herba, Dod.  
Pulmonaria Romana, Cæs.  
Variat flore luteo, purpureo luteo, purpureo & versicolore.

II. Cerinthe flore ex rubro purpurascente.  
Cerinthe tertia, Clus. hist.  
III. Cerinthe flore flavo asperior.  
Cerinthe quorundam major flavo flore, Clus. hist.  
IV. Cerinthe minor.  
Cerinthe Plinij, Ad Lob. ico. Lugd.  
Cerinthe minor, Lob. Cam. Tab. Ger.  
Cerinthe secunda, Clus. hisp. minor seu quarta, Eid. hist.  
Maru herba minor, Dod.  
V. Cerinthe folio non maculato viridi.  
Cerinthes quintum genus, Clus. hist. ap. al.

## LITHOSPERMUM.

**A**ldemque recensuit Dioscorides lib. 3. cap. 158. quod à seminu duritie nomen accepit: solijs olea longioribus, latioribus & mollioribus, &c. Semen lapidea duritie, rotundum candicans, ervi parvi magnitudine. Plinius lib. 27. cap. 11. Lithospermum inter omnes herbas nihil est mirabilius, &c. lapillos gerit candore & rotunditate margaritarum, magnitudine ciceru, duritia vero lapidea: & qua pediculu adhaerent caverculas habent & intus semen, &c.

I. Lithospermum arundinaceum, fortè Dioscor. & Plinij.  
an Coix Theophrasti, 1. hist. 16.  
Lachryma Christi, Trag. Gesner. hort. cui & Jodoci.  
Lithospermum majus, Trag. Gesner. hor. cui & fruticosum.  
Aundo lithospermum, Gesner. hor.  
Lithospermum primum, Lacun. arundinaceum, Lugd.  
Lachryma Jobi, Ad. Clus. hisp. & hist. Dod. Lob.  
Cam. Cast. Eyst.  
Lachryma vulgo, Cæs.

II. Lithospermum majus, Matth. Lac. Cast. Lugd. quid?

III. Lithospermum majus erectum.  
Saxifraga tertia, Brunf.  
Lithospermum, Brunf. Fuch. Cord. in Dioscor. & hist. Tur. Lon. Ad. primum, Anguil. commune, Gesner. hort.  
Milius Solis sativum, Trag.  
Lithospermum minus, Matthiol. Dod. Gesner. hor. Lac. Lob. Cast. Lug. Ger. vulgare minus, Cam.  
Lithospermum sativum, Fuch. ico.  
Lithospermum legitimum, Clus. hist.  
Lithospermum alterum fruticosum, Thal.  
Lithospermum arvense, Tab.  
Anchusæ tertiæ similis altera, Cæs.  
Milius Soler Mauritanis, quod in montibus

Soler frequenter nascitur: hinc vulgo milius Solis ineptè dicitur.

Hujus species minima palmum alta, Lini foliis angustis, granulis pusillis, rotundis, cujus Adversaria meminere.

IV. Lithospermum minus erectum.

Lithospermum Anchusæ facie, Lob. Lugd.

V. Lithospermum minus repens latifolium.

Lithospermum alterum, Ang.

Lithospermum majus, Dod. Ad. Lob. Lugd.

Lithospermum vulgare majus, Cam.

Lithospermum repens majus, Clus. pan. & hist.

Lithospermum, Cæs. virgatum, Thal.

Pulmonaria minor Dalechampi, Lugd.

Hoc ad Echium, vel Anclufas referri potest, quod aliqui Lithospermum Dioscor. & Plinij censent.

VI. Lithospermum angustifolium umbellatum: in Prodomo descriptum.

VII. Lithospermum arvense radice rubra, Lithospermum sylv. Trag. Fuch. Dod. gal. Camer. epist.

Echium minus herba Lithospermo congener, Gesner. ap.

Anchusa degener facie Milij Solis, Lob. ico.

Anchusa tertia Lithospermo similis, Cæs.

Anchusa arvensis alba, Thal.

Anchusa arvensis minor facie Milij Solis, Tab.

Lithospermum tertium Dod. nigrum, Lugd.

Ad Anchusam, vel Echium, aliqui referunt.  
VIII. Lithospermum Linariæ folio Ger-  
manicum.  
Passerina, Trag. Cam.  
Lithospermum sylv. minus, Dod. gal.  
Lithospermum quartum exiguum, Dod. lat.  
Lithospermum minus, Lon.

Passerina herbariorum unicaulis, Ad.  
Lingua passerina, Tab.  
Passerina linaria, Ger.  
Linaria altera botryodes montana, Col.  
IX. Lithospermum linariæ folio Monspe-  
liacum.  
Passerina linariæ folio, Lob. Lugd.

## S Y M P H Y T U M.

Συμψύτον Dioscorides lib. 4. cap. 9. & 10. proposuit: sic dictum à facultate conglutinandi, quâ posset: nam & carnes dum coquantur conglutinat additum, eodem auctore. Et Plinio lib. 27. cap. 6. unde & Græci (ait) nomen imposuere: hinc Latinus Consolida dicitur.

Genera: Dioscoridi duplex est, πέρυσιον petraum, quod in petris nascatur, ramulis origano similibus, folijs tenuibus, & capitula thymi: Alterum, quod aliqui πέρυσιον πεδον vocant: caule cubitali, folijs hirsutis ad Buglosi foliorum similitudinem: floribus luteis, &c. Plinius lib. 27. cap. 6. Alum nos vocamus, Græci Symphytum petraum, similis cunila bubule, folijs parvis cacuminibus thymi, &c.

I. Symphytum Consolida major.  
Symphytum quidam Inulam rusticam, qui-  
dam Alum Gallicum vocant, Scribon. c. 21.  
Consolida major, Brunf. Trag. Cam. Thal. Ger.  
Symphytum, Tur. Lon. majus, Matth. Cord.  
hist. Cam. Cast. Tab.  
Symphytum magnum, Fuch. Dod. ut: Lugd.  
Symphytum alterum, Ang. Cord. in Dioscorid.  
Lac.  
Symphytum Alum, seu Alus, Ad Lob.  
Consolida vulgo, Cæf.

Marem faciunt & scæminam, floris colore  
porcisimum differentes: mas, flore est purpu-  
reo, vel purpurocæruleo: scæmina, flore albo,  
vel pallide luteo: rarius luteo: hinc duæ fi-  
guræ apud Tabernæmontanum & Gerardum:  
tres apud Eyslett.  
Symphytum majus flore albo, & flore purpu-  
reo, Tab.  
Consolida major flore albo & flore purpureo,  
Ger.  
Symphytum majus flore purpureo: flore ru-  
bro: flore pallido, Eysf.

II. Symphytum majus tuberosa radice.  
Symphytum tuberosum, Lob. Dod. Lugd.  
Symphytum tuberosum majus, Cluf. hist.  
Symphytum majus flore subluteo, tuberosa ra-  
dice, Cam.  
Symphytum radice tuberosa, Cam. ep.  
Symphytum alterum folio Borriginis, Ang.  
Consolida altera minor, Cæf.  
Consolida tuberosa vel nodosa, Cam.  
III. Symphytum minus tuberosa radice.  
Symphytum tuberosum, Cluf. pan. tuberosum  
minus, Eid. hist.

Floribus est pallidis, vel subluteis.  
IV. Consolida major amplexicaulis flore  
purpureo, Thal. quid?  
V. Symphytum minus Borriginis facie.  
Symphytum pumilum repens Borriginis fa-  
cie, Lob.  
Borrago minima herbariorum, Lugd.  
an Asarum muri, Eid.  
VI. Symphyto viribus affinis,  
Bisa radix quæ ex Bengala & Patane monti-  
bus adfertur, Acofta cap. de Datura: sed quid?

S Y M P H Y T U M M A C U L O S U M, S I V E  
P U L M O N A R I A.

Pulmonaria dicta, quod hujus folijs ut plurimum macula alba lata aspersa sint, & quod Pulmonum  
affectibus medeatur: quibusdam Callæ alterum genus apud Plinium lib. 27. cap. 8. cui Calla duorum  
generum est: una, similis Aro, &c. Alterum genus ejus, quidam Anchusam vocant. folia Lactuca longiora,  
plumosa, radice rubra, &c. Illam Arisarum, hanc Pulmonariam volunt. At Fracasortus Pulmonariam  
ex genere Buglosse esse censet.

I. Symphytum maculosum, sive Pulmona-  
ria latifolia,

Pulmonaria altera, Matth. Cast.  
Pulmonaria & Pulmonalis, Dod. gal.

Pulmonaria Plinij, Gessn. hort.

Pulmonaria, Cæs. maculosa, Ad. Lob. Clus. pan.

Cam. Tab. Ger. Eysl.

Symphytum maculosum, Dod.

Pulmonaria major, Lugd.

Pulmonaria vulgaris maculoso folio, Clus. hist.

Folijis variat, quæ aliquando albis punctis notantur, aliquando ijs carent: & hæc

Pulmonaria folio non maculoso, sive 2. Clus. hist.

Floribus est communiter cæruleo rubentibus: rarius albis. Matrem & sceminam, nomine Pulmonariæ Plinij Taber. exhibuit, quem Gerardus imitatur.

II. Pulmonaria angustifolia rubentecæruleo flore.

Consolida major sylv. Trag.

Symphytum sylv. Cord. histor. & Pulmonaria Plinij, Schol.

Pulmonaria folijs Echij, Lob. ico Ger.

Pulmonariæ tertiæ species altera, Clus. pan. 5. Pannonica, Eid. hist.

Pulmonaria quarta Plinij angustifolia, Tab.

Variat floribus, alteri flores initio rubent, dein cæruleum colorem saturationem contrahunt: alteri flores pulcherrimè rubentes: illa Pulmonaria 5. hæc verò 4. Clus. in hist.

III. Symphytum maculosum, sive Pulmonaria angustifolia cærulea.

Pulmonaria 2. vel angustifolia cæruleo flore, Clus. pan. tertia Austriaca, Eid. hist.

Pulmonaria prima angustifolia, Taber. 2. angustifolia, Ger.

Pulmonaria Austriaca secunda, Cam.

## CONSOLIDA MEDIA.

**C**onsolida media, quibusdam Chamæcissos spicata Plinij lib. 24. cap. 15. Alijs Anonymos Plinij lib. 27. cap. 4. (Anonymos inquit, non inveniendū nomen invenit) fortè quia vulneribus sanandū efficacissima sit.

I. Consolida media pratensis cærulea.

Consolida media, Brunf. Matth. Fuch. Taber. Eyslett.

Consolida media, & Herba Laurentiana, Cast.

Prunella cærulea, Trag.

Bugula, Dod. ut: Clus. pan. & hist. Lugd. Ger.

Bugula, & Prunella quibusdam, Ad. Lob.

Arthetica Pandestarij, Ang.

Symphytum medium, Lon.

Consolida media major, Thal.

Consolida media prima, Tab.

Chamæcissus quorundam, Lugd.

Chamæcissi alterum genus, Cæs.

Flore est cæruleo: rarius cinereo vel albo: folijs latioribus & angustioribus, leviter incis vel sinuatis.

II. Consolida media pratensis purpurea.

Prunella purpurea vel quarta, Trag.

Consolida media purpurea, Fuch. secunda, Taber.

Consolida media minor, Thal.

Bugula carnei coloris flore, Clus. pan. & hist.

Bugula flore albo, Ger.

Hæc tepit & folijs ptiore est rotundioribus, non laciniatis, aliquando etiam non crenatis: flores, rubicundioris diluti coloris sunt.

III. Consolida media flore luteo: hæc cæteris multò minor est, folijs rotundis, crenatis, flore luteo: quam ex Anglia habemus.

IV. Consolida media cærulea alpina, in Prodr. descripta.

## BRUNELLA.

**B**runella, quæ ex Consolida speciebus est, ab effectu nomen accepit, ed quod saucium & lingua affectibus, seu potius malo Castrensi, Germanu die Brüne dicto, medeatur: quod malum ab Aegneta lib. 3. Erysipelas Cerebri dictum videtur. Quibusdam Symphytum petraeum: alijs Polycnemum Dioscoridu lib. 3. cap. 108.

I. Brunella major folio non dissecto.

Brunella, Brunf. Dod. ut: Lob.

Prunella vulgaris, & 6. Trag.

Consolida minor, Matth. minima, Cam.

Prunella, Fuch. Ang. Adv. Cæs. Lugd. Camer. Taber. Ger.

Symphytum petraeum, Lobel. ico. an & Cord. in Diosc.

Prun-



Prunella, aut potius Brunella officinarum, Eyst.

Flore est purpureo, vel cæruleo punicante: aliquando ex diluto cæruleo albicante, rarius albo: folijs integris nonnunquam leviter crenatis.

II. Brunella folio laciniato. (ris.

Symphycum petraeum, Lob.

Brunella altera, Dod.

Prunella secunda, Clus. pan. & hist. tertia, Tab.

Prunella altera hirsutior, Cæs.

Prunella Lobelij, Ger.

Flore est purpurei vel carnei coloris, vel cinerei, vel nivei: folijs aliquando solum superioribus, aliquando simul etiam inferioribus laciniatis.

III. Brunella Hystopifolia: in Phytop. sub 2. descripta.

an Prunella secunda, Tab.

an Prunella flore albo, Ger.

IV. Brunella cæruleo magno flore.

Prunella cærulea altera, vel 3. Trag.

Prunella prima & major, Clus. pan. & hist.

Prunella grandiflora, Cam.

Brunella cærulea magno flore, Eyst.

Folij est integris: reperitur & laciniatis: flore saturatius purpurascens, nonnunquam & dilutioris & exalbidi, rarius albi coloris.

V. Brunella minor alba laciniata.

Prunella candida altera, vel septima, vel sexmina, Trag.

Hæc semipalmaris est, aliquando trium quatuorve unciarum.

## B E L L I S.

**B**ellidem etiam ad Consolidam mediam, vel minorem, referunt, quam licet aliqui apud Theophrastum 7. hist. 9. Anthemidu foliacei speciem (Nigellam foliosam Gaza vertit) velint: Græci tamen indistincte dicitur. Plinio lib. 26. cap. 5. Bellus in pratis nascitur. flore albo aliquatenus rubente. Et lib. 21. c. 8. luteum & Bellio pallidicantibus quinquagenu quinu barbulo coronatur.

I. Bellis sylv. caule folioso major.

Oculus bovis, Brunf.

Bupthalmum, Eid. majus, Lon.

Bellis major, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Lac.

Cæs. Cast. Cam. Ger. Lugd. (cum figura Matth. & Fuchij) Adv. Lob. (cui & Consolida media vulnerariorum) Eyst.

Bellis (ylv. Tur. major sylv. Fuch. ico. Gesn. hor.

Bellum majus, Tab.

Folio acutius est, vel rotundius: caule & hirsuto & glabro: flore nonnunquam gemino, etiam pleno, sed rarissimè reperitur.

II. Bellis alpina major rigido folio: quæ 1. in Prodomo.

an Bellis alpina, Cam.

III. Bellis alpina alba minor: quæ 2. in Prodomo.

IV. Bellis montana major folio acuto: quæ 3. in Prodomo.

V. Bellis montana folio obruso crenato: quæ 4. in Prodomo.

VI. Bellis sylv. media caule carens.

Bellis media, Matth. Ad. Lugd. Tab. Clus. hist.

Bellis minor, Cast.

Bellis sylv. media, Gesn. hort. Ger.

Bellis sylv. Dod. major sylv. Lob.

VII. Bellis sylv. minor.

Solidago Consolida species, Brunf.

Primula veris, Eid. Cæs.

Bellis minor, Matth.

Bellis minor sylv. Fuch. Dod. gal. Tur. Gesn. hor. Lugd. Tab. Ger.

Bellis pratensis minor, Ad.

Flos colore variat: discum enim luteum ambiunt foliola, vel alba, vel ex candido rubra: alia ex albo & rubro mixta: alia intus rubra, in ambitu alba: aliquando in viridem colorem degenerant: reperitur vix uncias duas alta.

Bellis sylv. minor flore mixto, &

Bellis sylv. minor flore pleno rubro, Eyst.

VIII. Bellis maritima folijs Agerati: quæ 5. in Prodomo.

*Bellu hortensis.*

I. Bellis hortensis flore pleno, eoque magno, vel parvo.

Primula veris. Trag. Gesn. hort.

Bellis, Lon. minor, Matth. Lugd. minima, Cast.

Bellis minor hortensis, Fuch. Dod. gal. Gesn. hor. Lac. Tab.

Consolida minor officinarum, an Bellis Pliniana, Ad.

Bellis hortensis multiplici flore, Lob. Tab. Ger.

Bellis minor fl. multiplici albo & rubro, Eyst.

Primula veris multiplici foliorum ordine, Cæs.

Floris colore variat, albo, incarnato, rubro, vario, scilicet candido & rubro: est & fusco: hinc duæ figuræ, apud Lob. & Ger. tres apud Tabernæmontanum.

II. *Bellis hortensis* prolifera.

*Primula veris*, cujus flores si non citius carpantur, ex se alios generant, ac sæpe ex uno quatuor aut quinque erumpunt, Trag.

*Bellis hortensis* sua verubens, vitidisque prolifera, Lob. ico.

*Bellis* prolifera, Cam. variegata, Eyst.

III. *Bellis hortensis* pediculofoliofo: quæ 7. in Prodomo.

*Bellis cærulea.*

I. *Bellis cærulea* caule nudo.

*Aphyllantes* 3. Lugd.

II. *Bellis cærulea* caule foliofo.

*Aphyllanthes*, id est frondiflora, Ang. Cam.

*Bellis cærulea*, *Globularia* *Monspeliensis*, Ad. Lob. Tab. Ger.

*Bellis montana*, Cæf.

*Scabiosæ pumilum* genus, Clus. hist.

*Bellis minor* flore cæruleo, Eyst.

*Globularia cærulea*, Col.

Variat magnitudine, foliorum latitudine, & caulium altitudine: hinc tres apud Tab. Ger. icones: *Bellidis cæruleæ*, *Apulæ*, & *Monspeliacæ* nomine.

III. *Bellis cærulea* spinosa: quæ pro 6. in Prodomo describitur.IV. *Bellis cærulea* montana frutescens.

*Bellis montana* fruticosa in Ilva, Cæf.

*Scabiosa* quinta, vel *Scabiosa montana* repens, Clus. pan.

*Scabiosa repens montana*, Cam.

*Scabiosa odorata*, Tab.

*Scabiosa montana minor* repens, sive 10. Clus. hist.

*Bellis lutea.*

I. *Bellis lutea* folijs profunde incisissimis major.

*Bellis major lutea*, Trag.

*Chrysanthemum*, Dod. Cam. ep. Cast.

*Chrysanthemum* folio virentiore, Cam.

*Chrysanth.* segetum folio multifidissimis, Adv.

*Chrysanthemum* segetum, Lob.

*Chrysanthemum arvense*, Tab.

*Chrysanthemi* species 4. Cæf.

II. *Bellis lutea* folijs profunde incisissimis minor.

*Chrysanthemum minus*, Cam. ep.

III. *Bellis lutea* folijs subrotundis.

*Chrysanthemum* 3. Cæf.

*Chrysanthemum Myconi*, Lugd.

an *Chrysanthemum* folio minus dissecto, Cam. merar.

IV. *Bellis spinosa* folijs Agetati.

*Bellis spinosa* elatior, Lob. ad par. alr.

V. *Bellis montana* globosa luteo flore.

*Globularia lutea montana*, Col.

\*\*\*\*\*

## S E C T I O T E R T I A.

PILOSELLA; GNAPHALIUM; LEONTOPODIUM; HELI-  
CHRYSUM; STOECHAS CITRINA; CONYZA; ASTER;  
TRIPOLIUM; ALISMA; ET VIRGA AUREA.

## P I L O S E L L A.

**P**ilosella à copiosis pilis quibus vestitur, nomen sortita est, quam aliqui ad *Myosotidem*, alij ad *Holostium* referunt: sunt qui Intybi minimam speciem faciant.

I. *Pilosella* major repens hirsuta.

*Auricula muris*, Brunf. Eticio Cord. alia, Cord. in Diosc.

*Auricula muris minor*, Trag. Lon.

*Pilosella*, Matth. Ang. Ad. Lob. Cast. Tab.

*Pilosella* major, Fuch. Dod. ut: Lug. media, Th.

*Pilosella* quibusdam *Holostium*, Lac.

*Pilosella repens*, Ger.

II. *Pilosella* major repens minus hirsuta.

*Auricula muris minor* secunda, Trag.

*Pilosella vulgo*, Cæf.

*Pilosella* major, Cam. ep.

*Lactucella* sylv. repens, Cam. hort.

III. *Pilosella* major erecta.

*Pilosella* major, Ger. altera, Tab.

IV. *Pilosella* major erecta altera.

*Pilosella* major prima, Tab.

*Pilosella* major latifolia, Ger. ico.

V. *Pilosella montana* hispida parvo flore.

*Pilosella* major umbellifera *montana* & *pratensis*, Col.

VI. *Pilosella* Syriaca.

*Pilo-*

Pilosella maxima Syriaca, Lob. Lugd. Tab.

VII. Pilosella incana saxatilis lutea.

Auricula muris altera incana saxatilis frigidarum regionum, Col.

## G N A P H A L I U M.

**G**ναφαλίον Dioscoridi lib. 3. c. 132. quod folijs αἰτί γναφάλη pro tomento, utantur: Et Plinio lib. 27. c. 10. cui Gnaphalium, quod alij χαμαίελον vocant. Verum apud Plinium L. 24. c. 19. habetur herba, Impia, incana, vocata tosmarini aspectu, chrysos modo vestita atq; capitata, unde alij ramuli assurgunt sua capitella gerentes, ob id Impiam appellatam, quoniam liberi supra parentem excellent, alij porius ita appellatam, quod nullum animal eam attingat, existimavere: hac Plinius. Sunt qui Gnaphalium vulgare esse velint, & esse quog; Centunculum ejusdem: Sic autem Plinius L. 24. c. 15. Itali Centunculum vocant, rostratis folijs ad similitudinem capiti penularum, jacentem in arvu, Græci autem Clematidem.

I. Gnaphalium maritimum.

Gnaphalium, Matth. Lobel. Lugd. legitimum, Clus. histor.

Gnaphal. maritimum, Gef. hor. Ad Lob. ico. (Cotonaria vulgi sive Bombax humilij) Tab. Ger.

Gnaphalium maritimum tomentosum, Lugd.

II. Gnaphalium latifolium Americanum.

Gnaphalium Americanum αἰτί γναφάλη, Clus. pan. & hist.

Gnaphalium latifolium peregrinum, Eyst.

Centunculi Americani nomine ex America accepimus, apud quos uti & in Brasilia, apud

Toupinambaultis frequens est.

III. Gnaphalium vulgare majus.

Heliochrysol sylv. Trag.

Gnaphalium, Fuch. Gef. hor. Tur. Lac. Cast.

Gnaphalium vulgare, Matt. Ad Lob. Lug. Tab. Filago, Dod. ut: Ger.

Centunculus, Tur.

Tomentum, Cord. hist. Lon.

Impia Plinij, Ang. (& Cartafilago) Gef. hor.

Herba Impia, Cæf.

Gnaphalium vulgare minus, Thal.

IV. Gnaphalium medium.

Filago 4. Dod. gal. minor, Dod. lat. Lob. ico.

Gnaphalium medium, Tab. vulgare, Ger.

V. Gnaphalium minus latioribus folijs.

Gnaphalium Plateau tertium, Clus. hist.

VI. Gnaphalium minus repens.

Gnaphalium miuimum, Lob. ico. minus, Tab.

Filago minor. Ger.

Hoc etiam duarum solùm unciarum reperitur.

VII. Gnaphalium um roseum sylvestre.

VIII. Gnaphalium roseum hortense: utrumque in Prodomo descriptum.

IX. Gnaphalium majus lato oblongo folio.

Gnaphalium secundum Plateau, Clus. hist.

X. Gnaphal. majus angusto oblongo folio.

Heliochrysol sylvestris, Trag. ico. alt.

Filaginis altera species, Dod. ut:

Filago Germanica altera secundum folia florida, Ad. Lob. ico.

Gnaphalium vulgare majus, Thal.

XI. Gnaphalium majus angusto oblongo folio alterum.

Pseudoleontopodium Matthioli, Lugd.

Gnaphalium Anglicum, vel Belgicum folio longiore, Ad Lob. ico.

Chrysocome Germanica, Lob. obs.

Chrysocome lanuginosa, an Impiæ species, Lug.

Gnaphalium majus, Tab. Anglicum, Ger.

Gnaphalij genus, Clus. hist.

Leontopodium alterum vulgare, Matth. Cam.

an Herba Impia in montibus, Cæf.

an Chrysocome & Chrysis, Cast.

Hoc cum à priori parum differat, qui voluerit, idem dicat.

Gnaphalium montanum.

I. Gnaphalium montanum flore rotundiore.

Lagopus secundus, Trag.

Auricula muris, Lon. quarta, Trag.

Pilosella minor, Fuch. Dod. gal. Lugd. Thal.

Lagopiron Hippocratis, Gef. animal.

Gnaphalij genus, Gef. col.

Gnaphalium montanum purpureum & album, Ad Lob. Tab. Ger.

Gnaphalium montanum suaverubens, &

Gnaphalium montanum variegatum, Eyst.

Variat floribus candidis, subpurpureis, roseis, ex candido & rubro mixtis.

II. Gnaphalium montanum longiore & folio & flore.

Gnaphalium montanum purpureum, & suaverubens, Lob. ico. Tab. Ger.

Gnaphalium montanum Dalechampi, Lugd.

Pilosella minor, Dod. Clus. hist.

Variat ut prior floris colore; hinc duæ icones apud Lob. Tab. Gerard.

III. Gna-

III. Gnaphalio montano affinis Ægyptiaca.  
Baccharis Rauvvolfij, Lugd. ap. Clus. hist.

IV. Gnaphalium alpinum magno flore, folio oblongo.

an Leontopodium Dioscoridis?

Leontopodium verum, Matth.

Leontopodium Matthioli, Lugd. Tab.

Leontopodium, Dod. Cast.

Leontopodium sive pes leoninus, Ad.

Gnaphalium alpinū, Oer. def. Clus. pan. & hist.

V. Gnaphalium alpinum magno flore folio brevi.

Leontopodium sive pes leonin<sup>9</sup>, Lob. Tab. Ger.

Idem cum priore censet Lug. at cum illud radicem habeat magnam, quasi squammofam, folia oblonga: hoc verò radicem tenuem, foliaque brevia, differre statuimus.

VI. Gnaphalium alpinum minus.

Leontopodium parvū, Lob. Lugd. Tab. Ger. def. Pilosella minor altera.

## LEONTOPIDIUM.

**Λ**εοντόδιον Dioscorides l. 4. c. 131. duorum dicit generum & ad amatoria valere, &c. Plinius lib. 26. c. 8. Leontopodij quidem meminit, sed à Dioscorido diversum censum: Dioscorides foris de Gnaphalio alpino intelligendus: quod Gnaphalium à Plinio l. 27. c. 8. Cemos appellari nonnulli existimant.

## HELICHRYSUM.

**Ε**λίσχυρον aut χρυσάλευρον ή Αμαξάνθη Dioscor. l. 4. c. 57. ubi folia Abrotano similia & umbellam auream tribuit. At Theophr. l. 9. c. 21. Ελίσχυρον, id est, aureum colorem habens, (Aureliam Gaza vertit) alijs Coma aurea, Plin. l. 21. c. 25. Heliochrysum, quod alijs Chrysanthemum, & quæ Dioscorides habet.

I. Elichryson folijs Abrotani.

Helichrysum, Matth. def. Cast.

Helichrysum Creticum, Matth. ep. ico.

an Helichryson quod vulgo in Creta, Lagochimithia, quod leporibus cubilia grata præbeat, appellare solent, Bellon.

Elischryson, Ang. Lac. Dod. Lob. Clus. hisp. & hist. Lugd. Cam.

Heliochryson, Ad.

Helichrysum i. & Helich. i. altera icon. Tab.

Coma aurea & Helichryson, Ger.

Varietas in folijs advertitur: hinc duæ figuræ apud Taber. & Gerardum.

II. Elischrysum folijs oblongis Stœchadi citrinæ similis, Dod.

Helichrysum, Cam. ep. ico.

Chrysocome peregrina, Eyst.

III. Elischrysum folijs oblongis paucis Stœchadi citrinæ angustioribus.

Helychrysum Cretic. Matth. def. Lug. Cam. ep.

IV. Elischrysum seu Stœchas citrina angustif.

Amaranth. luteus, Fuch. Lac. Lon. citrinus, Tur.

Stœchas citrina, Matth. Lac. Gef. hor. Dod. Cast.

Lugd. officinarum, Tab. defc.

Ageratum Aurelia, Dod. gal.

Heliochrysum, Cord. in Diosc.

Helichrysum, & Amaranthus Galeni, Cæs.

Chrysocome aurea coma, Ad. Lob.

Chrysocome prima vulgaris, Clus. hist.

Coma aurea, Lob. ico.

V. Elischrysum Orientale.

an Chrysocome Diotcorides l. 4. c. 55. & Plinij, cui & Chrysitis l. 21. c. 5. in Phytopynace, Matthiolo & Prodomo descriptum.

Stœchas citrina comis grandioribus, Cam. ep.

Eliochrysum, Belli ep. 1. ad Clusium.

Helichrysum Creticum, Eyst.

VI. Elischrysum Creticum.

Chrysocome s. vel Cretica, Clus. hist.

VII. Elischrysum sive Stœchas citrina latifolia.

Amaranthus & Heliochrysum primus, Trag.

Amaranthus luteus primus, Tab.

Chrysocome sive Amaranthus luteus, Ger.

Variat latioribus & oblongioribus folijs: hinc tres icones.

Amarant. lutei l. 2. & 3. apud Tab. & apud Ger. sub

Chrysocome, Amaranthus Galeni & Heliochryso sylvestri.

VIII. Elischrysum sylv. latifolium capitulis conglobatis.

Chrysocome & Helichrysum sylv. Lob. ico.

Chrysocome montana, Cæs.

Chrysocome altera, Clus. hisp. tertia, peregrina secunda, Eid. hist.

Chrysocome, Tabern. Ger.

IX. Elischrysum sylv. angustifolium capitulis conglobatis.

Stœchas citrina altera, Ad. Lob. ico. Lugd.

Ageratum aliud quorundam, Lugd.

Chrysocome, Cæs. altera, peregrina i. Clus. hist. Elichry-

Elichrysum Creticum, Cam.

Stœchas citrina, five Chryfocome Monspeliaca, Taber.

X. Elichrysum sylv. flore oblongo.

Stœchas citrina altera inodora, Ad. Lob. ic. Lugd.  
Gnaphalium marinum Dalechampiij, Lugd.

Chryfocome latioribus folijs, Cæf.

Chryfocome quarta, peregrina ꝑ. Cluf. hist.

XI. Elichryso sylv. flore oblongo similis: in Phytopynacæ & Prodromo describitur.

XII. Stœchas viridis capitulo oblongo.  
Stœchas viridis Dalechampiij, Lugd.

## C O N Y Z A.

**K**onisa Dioscoridi l. 3. c. 136. sic forte dicta, quod *κύννη*, seu culices, suo lentore capiat: apud Theophrastum 6. hist. 1. & 2. Pulicariam Gaza vertit, Plinio l. 21. c. 10. Conyza.

Genera tria Dioscoridi: parva, quæ odore præstantior: major, gravi odore: tertium genus medium inter illas, in jucundioris odoris, &c. Theophrasto plura genera, mas & sæmina: hac minor, illa major, Plinio genera duos mas & sæmina, in folio differentia, &c.

I. Conyza mas Theophrasti major Dioscoridis.

Conisa magna, Tur.

Conyza major, Cluf. hisp. Dod. Cæsalp. Cast. Camer.

Conyza magna, Lugd.

Conyza major vera, Ad. Lob. ic.

II. Conyza major altera.

Conyza major Dioscoridis Rauwolfij, Cluf. hist.

Conyza Syriæ, Lugd. append.

III. Conyza sæmina Theoph. minor Dioscoridis.

Conyza minor vera, Gesap. Ad. Lob. ic. Lugd.

Conyza minor, Cluf. hisp. & hist. Cæf. Cast.

Conyza minor, & Eupatorium Mesues, Col.

Conyza minor altera, Dod.

IV. Conyza minor exotica.

Conyza minor Boërica, Cluf. cur. post.

V. Conyza Salviæ odorem spirans.

Planta Banranica, Cluf. exot. l. 4. c. 23.

VI. Conyza major vulgaris.

Conyza major, Trag. Math. Dod. gal. Ges. hor. Lac. Lon. Cast. Lugd.

Conyza major altera, Dod.

Conyza Heleniris, Cord. hist. Thal.

Baccharis, Math. Lac. Lon. Tab.

Baccharis Monspeliensium, Ges. hort. Ad. Lob. Lugd. Cam. Ger.

VII. Conyza pannonica lanuginosa.

Conyza tertia Pannonica, Cluf. pan.

Conyza tertia Austriaca, legitima sortè Dioscoridis.

VIII. Conyza cærulea actis.

Tinctorius flos alrer, Trag.

Erigeron tertium, Dod. gal. quartum, Eid. lat.

Dentelaria, Ges. hort.

Conyza muralis, f. id. col.

Conyzoides cærulea, Ges. corol. Cord.

Conyza odorata, Lugd.

Conyzæ genus tenuifolium, Thal.

Conyza cærulea, Tab.

Amellus montanus, Col.

Variat folijs, in altera brevioribus & latioribus: in altera longioribus & angustioribus: est & altera erecta, altera repens: flore cæruleo, qui in pappum vel album, vel rufescenrem abit.

## Conyza montana.

I. Conyza cærulea alpina major: quæ 1. in Prodromo.

II. Conyza cærulea alpina minor: quæ 2. in Prodromo.

III. Conyza alpina pilosissima.

Conyza Helenitis pilosa, Lob. ic.

IV. Conyza incana.

Conyza Helenitis mellita incana, Lob. ic.

V. Conyza montana folijs glurinosos pilosis.

Conyza montana Myconi, Lugd.

VI. Conyza montana lutea, folijs oblongis.

Hæc duplex à Thalyo proponitur, nomine

Conyzæ majoris montanæ, &

Conyzæ majoris alterius: hujus posterioris figura à Camerario in suo horto exhibetur.

VII. Conyzis affinis.

Britannica Gesneri & Lugd. Ad. Lob. ic.

Britannica vera Dalechampiij, Lugd.

Bellis lutea Dalech. Lugd.

## Conyza palustris.

I. Conyza media Asteris flore luteo, vel tertia Dioscoridis.

Calaminthæ tertium genus, Fuch.

Conyza, Cord. in Diosc. Tab. altæ, Tur.

Conyza media, Matth. Dod. ut: Lac. Ad. Lon. Lob. Lugd. Eyft.

Conyza 3. Mart. ep. Ang. Cast. 3. aquatica, Gef. h.

Conyza 3. vulgaris, Cluf. pan. media vulgaris, Eid. hist.

Conyza aquatica, Thal.

Conyza major, Ger.

Mentha lutea, Lon.

Asteri Attico similis altera quæ Cunilago, Cæf.

Cunilæ 3. genus, quæ Cunilago Plin. l. 20. c. 16.

II. Conyza major flore globofo.

Conyza minor, Trag. Matth. Dod. gal. Lac. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Conyza prima, Ang. minor seu femina, Lon.

Conyza minima, Ad. (five Pulicaria) Lob. Dod. Lugd. Thal.

Psyllium, Cord. hist. ico. Conyza, Eid.

Major est & minor.

III. Conyza aquatica laciniata.

Conyza Helenitis folijs laciniatis, Lob. ico.

Conyza Helenitis, Dod. belg.

IV. Conyza palustris ferratifolia.

Conyza aquatica, & aquatica folijs serratis, Gef. hort. & col.

Conyza maxima ferratifolia, Thal.

Lingua major Dalechampi, Lugd.

Conyza quarta, Cam. ep.

Consolida palustris, Tab.

Solidago Sarracenica, Ger.

V. Conyza aquatica, Asteris flore aureo: quæ 3. in Prodomo.

VI Conyza affinis Germanica.

Solidago Sarracenica tertia, Trag. Lon.

Herba vulneraria ad fluvium Pfirum, Trag.

Consolida Sarracenica tertia, Tragi, Lugd.

Conyza nomine posita in Cotidi hirsuta.

## ASTER ATTICUS.

**A** *ἄστρον ἄττικον* Dioscoridi l. 4. c. 120. *florem habet in cacumine purpureum, am luteum, per ambitum anthemidi capituli modo divifum, foliis stellæ modo radiatu.* Plinio l. 27. c. 5. *Aster, ab aliquibus Bubonium appellatur, quoniam Inguinum (sc. inflammationi) præsentaneum remedium est: in cacumine capitula stellæ modo (hinc Asterii nomen) radiata, &c.*

*Aster Atticus luteus.*

I. Aster luteus foliolis ad florem rigidis.

Aster Atticus alter, Matth. Lugd.

Aster Atticus verus, Ang. Gef. hor.

Aster, five Stella Attica Monspelienfium aureo flore, Ad.

Aster Atticus, Lob. (cui & Inguinaria) Ger. luteus, Cam.

Aster Atticus primus flore luteo, Cluf. hisp. vel

Aster atticus legimus, Cluf. hist.

Aster atticus, Cæf.

Aster luteus alter, oculus Christi minor, Lugd.

Oculus Christi, Eid.

Aster atticus Mafilioticus, Tab.

Est latifolius: est & angustifolius.

II. Aster atticus folijs circa florem mollibus.

Aster cetrinus, Col.

Baccharis vel Carpesium Alpini, quo nomine accepimus.

III. Aster luteus radice odora.

Incensaria, Cæf.

Asteris altera species Apula, an Baccharis, Col.

Baccharis vera Dioscoridis, Malocho, hoc nomine accepimus.

an Aster luteo flore, Cam. ep.

IV. Aster luteus major folijs succisæ.

Aster primus, vel pannonicus major, Clusius pannon.

Aster tertius five Austriacus t. Eid. hist.

V. Aster luteus hirsuto Salicis folio.

Aster pannonicus tertius, Cluf. pan. at quintus, in histot.

Aster flore luteo, Tab.

Aster hirsutus, Ger. ico.

VI. Aster montanus luteus Salicis glabro folio.

Aster atticus secundus, Cluf. pan. at quartus five Austriacus secundus, Eid. hist.

Bellis lutea, Lugd.

Bubonium luteum, Tab.

Aster Italicum, Ger.

VII. Aster luteus foliis glabro & crenato.

Aster Italicum, Ad. Lob.

Aster atticus, Dod. atticus Italicum, Cluf. pan.

Aster octavus Italicum, Eid. hist. ico.

VIII. Aster luteus angustifolius.

Aster conyzoides Gesneri, Lob. Lugd.

Aster atticus tertius, Cæf.

IX. Aster



IX. Alter luteus linariæ rigido glabro folio.

Alter articus quartus, Clus. pan. desc.

Alter sexrus, Austriacus 4. Eid. desc.

X. Alter montanus luteo magno flore.

Alter monranus, Ad. Lob. ico. Ger.

Alter montanus luteus mas, Tab.

Alter atticus alpinus foliolis luteis, Cæs.

XI. Alter atticus luteus montanus villosus magno flore.

Alter montanus hirsutus, Ad. Lob. ico. Lugd.

Alter luteus sive oculus Christi minor, Eid.

Alter montanus luteus fœmina, Tab.

XII. Alter luteus supinus.

Alter atticus supinus, Clus. hisp. (at in hist. secundus) Dod. Lob. Lugd.

Alter atticus repens, Cam.

Alter Atticus cæruleus.

I. Alter atticus cæruleus vulgaris.

Tinctorius flos primus, Trag.

Alter atticus, Matth. (cui & Amellus,) Fuch.

Dod. gal. Cord. in Diof. & hist. desc. Gefn. hort.

Lac. Lon. Clus. pan. Cast. Lugd.

Alter Atricus, Amellus non est, Guil.

Alter atticus purpureus, Fuch. ico.

Alter atticus 1. Dod. cæruleus, Thal. Cam.

Alter Italorum purpurascens, Lob.

Alter cæruleus Italicus, sive 8 Clus. hist.

Alter atticus minor flore cæruleo, Eyst.

Hujus differentia duæ: est latifolius & angustifolius, & hujus pumilum genus: Sic qui

maturius floret, minus altè assurgit, quàm qui seriùs: communiter cæruleis, aliquando purpureis foliolis orbis luteus cingitur: rarissimè totus albus reperitur. Aliquando caulibus est altioribus & folijs latioribus, qui dicitur Alter atticus major flore cæruleo, Eyst.

II. Alter hirsutus Austriacus cæruleus magno flore, folijs subrotundis: in Prodomo descriptus.

III. Alter montanus cæruleus magno flore, folijs oblongis.

Alter atricus quintus, sive Amellus alpinus, qui Virgiliano respondere videtur, Clus. pan.

Alter septimus sive Austriacus 5. vel Alter alpinus cæruleo flore, vel 7. Eid. hist.

Alter purpureus montanus, Lugd.

an Anthyllidi secundæ similis, Cæs.

Magnitudine variat: nam in monte Jura, duarum triumve unciarum reperitur, cum alias palmam superet.

IV. Alter atticus alpinus alter.

Alter atticus cæruleus alpinus, Cam. ep.

Est omnino minor vulgari, & interdum globulitumens villosi foliolis ad radicem adnascuntur.

V. Alter Tripolij flore.

Alter minor Narbonensium Tripolij flore, Linariæ folio medio purpureus, Ad. Lob. ico.

Alter Linariæ folijs Narbonensis, Lob.

an Anthyllis altera, Cæs.

## TRIPOLIUM.

**T**ριπόλιον (quasi dicas ter canum seu canescens) Dioscoridi 1. 4. c. 135. cuius flores (ut tradunt, inquit) colorem ter die mutant, manè candidi, meridie purpurei, serò puniceo conspiciuntur.

I. Tripolium majus cæruleum.

Tripolium, Dod. ur: Lugd. Cam.

Tripolium littorum, Ad.

Tripolium vulgare, Lob. Lugd. Eyst.

Amelli species palustris, Col.

Flos purpureus, medio luteus aut croceus: aliquando in eodem medio & luteus & puniceus, ambitu purpureo, qui colores in omni flore se-

nescere conspiciuntur. Lureis etiam floribus Lobel. observavit: Folijs quoque in summitate profunde in aliquot feras divisus notavimus.

II. Tripolium minus: & Lob. & Lugd.

Magnitudine solum à priore differre videtur.

III. Tripolium minus alterum.

Anthyllis minor, Cord. obs.

Tripolium minus, Cam.

## ALISMA SIVE DAMASSONIUM.

**A**uricula sive Damascina Dioscorides 1. 3. c. 169. folijs dicit plantaginibus sed angustioribus, &c. quem Plinius imitatus 1. 25. c. 10. cui duplex, alterum laciniosis angustius, alterum majoribus folijs in sylvis, &c. Quid verò sit, magna inter auctores controversia, alijs Plantaginem, alijs Calceolum Maris, alijs Dignalem, alijs Menham græcam, alijs aliam statuentibus. Verùm cogitandum, an non Dioscoridi & Plinii primum Alisma, sit Sauscula alpina, que Auricula Urſi dicitur: quemadmodum Plinius secundum, ipsum verbasculum. In Phytopynce duplex Alisma proposuimus: primum sub Alismare folio glabro, quod nunc ad Gentianam retulimus: alterum folio hirsuto, de quo inter Dronici species egimus.

## VIRGA AUREA.

**V**irga aurea, quæ à forma & floris colore luteo nomen habet, ab alijs propter vires & Solidago & Consolida vocatur. Quibusdam Panax Chironium Theophrasti 9. Hist. 10. & Plinij l. 25. c. 4. Panax Pharnacium & Phanax Chironium folio Lapathij, ceteretur: alijs Cunilago Plinij, Panacer dictum: & quia folia aliquando maculata observantur, sunt qui Leucographi Plinij l. 27. c. 11. aut unent.

I. Virga aurea major, vel Doria.  
Doria, fortè Panaces Chironium, Gesn. hort.  
Dorea Narbonensis, quasi Aurea, Ad. Eyst.  
Herba Doria, Lob. Cæs.  
Dorea sive herba aurea, Lugd.  
Limonium aliud, Lugd.  
Panax Chironium Theophrasti, Tab.  
Herba aurea Penæ & Lobelij, Lugd.

Variat folijs, iisque integris non serratis, qualia sunt cum primum erumpunt, & cum in hortis colitur: vel serratis, aculeo folij summi-  
rati insidente, quemadmodum Monspessuli observavimus: hinc duæ figuræ in Lobelij iconibus & in Lugdunensi historia.

II. Virga aurea latifolia serrata.  
Virga aurea, Cam. ep. Thal. Villanovani, Ger.  
Virga aurea vulgo dicta, Cæs. serratis fol. Tab.  
Virga aurea altera serrato folio, Lob.  
Virga aurea margine crenato, Dod.  
Virga aurea altera, Lugd.  
Virga aurea minor laciniatis folijs, Cam.  
an Consolida Sarracenica major, Lugd.

Variat folijs longioribus, latioribus, brevioribus, serratis tamen: & quandoque folia lineis albis notantur.

III. Virga aurea angustifolia serrata.  
Solidago, Ang.  
Solidago Sarracenica, Trag. Fuch. Dodon. ut:  
Lon. Ad. Lob. Lugd.

Virga aurea, Gesn. hort.  
Consolida Sarracenica, Thal. Eyst.  
Consolida aurea, Tab.  
Herba Doria, Ger. ico.

Est latioribus & angustioribus folijs: ex Anglia habemus folio niven & bicolore.

IV. Virga aurea angustifolia minus serrata.  
Virga aurea, Matth. Dod. ut: Lon. Lugd. (qui & Matth. & Codonæ figuram exhibet) Cæs. Ger. Eyst.

Virga aurea Villanovani, Ad. Lob.  
Virga aurea folijs non serratis, Cam. ep.  
Virga aurea Brockenbergenis, Thal.  
Virga aurea major angustifolia, Cam.  
Virgæ aureæ alterum genus, Cæs.  
Leucographis Plinij, Ang.

Symphytum petraeum 3. Tab.  
Variat folijs, quæ sæpe sine crenis, aliquando saltem minus conspicuis serrata sunt: sic folijs oblongis, aliq. ando subrotundis & flore luteo, rarius albo: hinc tres figuræ apud Tabernam.  
Symphyti petraei 1. 2. & 3. nomine.

V. Virga aurea magno flore.  
Consolida aurea nemorum, Limonij folio, Ad. Lob. ico.

VI. Virga aurea montana serrata magno flore, quam Plantaginis alpinæ nomine in summitate montis Calcaris circa ruguripola collectam, habemus.

\*\*\*\*\*

## SECTIO QUARTA.

VERBENA; SUCCISA; SCABIOSA; JACEA; STOEBE;  
CYANUS; TRAGOPOGON; SCORZONERA; CALTHA;  
HELENIUM; FLOS SOLIS.

## VERBENA.

**I**taque *Aster sive metystira* (apud Pausaniam *metystira*) folia habet querni similia, sed angustiora minoraq; colore aliquatenus glauco, &c. Sacra herba dicta, quod in expiationibus ad amuletum sit perutilis, Dioscoridi lib. 4. cap. 61. Sic vero Plinius lib. 25. cap. 9. Nulla Romana nobilitati plu habet, quam Hierobotane: aliqui perispheron, nostri Verbenacum vocant: hac est, quam legatos ferre ad hostes indicavimus: hac Jovis mensa vertitur, deum purgans, lustransq;.

Genera ejus duo sunt Plinio l. c. foliosa, quam seminam putant: mas rarioribus folijs, & c. folia minora quam quercum colos glaucus, & c. quidam unum omnino genus faciunt, quoniam utraq; eisdem effectum habeat, & c.

### I. Verbena communis cæruleo flore.

Herba sacra, Ang. Tur.  
Floribus est cæruleis, quandoque albidis.  
II. Verbena tenuifolia.  
Verbenaca supina, Clus. hisp. Dod. Lugd. Tab.  
Sacra Verbena Hispanica minor, Lob.  
Verbena supina, Clus. hist.  
III. Verbena Peruana, quæ Hispanicæ similis, ex Monardi, Lugdunensis refert.  
IV. Verbena nodiflora, in Phytopinace, Matthiolo & Prodomo descripta.  
erbenaca nodiflora, Imperato.

Herba sacra, Ang. Tur.

Floribus est cæruleis, quandoque albidis.

### II. Verbena tenuifolia.

Verbenaca supina, Clus. hisp. Dod. Lugd. Tab.

Sacra Verbena Hispanica minor, Lob.

Verbena supina, Clus. hist.

III. Verbena Peruana, quæ Hispanicæ similis, ex Monardi, Lugdunensis refert.

IV. Verbena nodiflora, in Phytopinace, Matthiolo & Prodomo descripta.

erbenaca nodiflora, Imperato.

## SUCCISA SEU MORSUS DIABOLI.

**S**uccisa dicitur, quod ejus radices circumtosa sint: vulgus enim credit, Dæmonem cum tanta efficacia radicem hominibus invideat: eam statim ubi succreverit, undique circumrodere: quare Morsus diaboli dicitur. Sunt qui Genii veterum consent: at Columna videtur Pycnocomon Dioscoridis lib. 4. cap. 176. alijs Nigana Plinii lib. 27. cap. 12. Herba, inquit, quæ vocatur nigina, tribus est folijs longius intrabatur: Alij ad Scabiosus: alijs ad Jaceas referunt.

### I. Succisa glabra.

Jacea nigra, Brunn.  
Morsus diaboli, Eid. Trag. Dod. gal. Gesn. hort.  
Lac. Ad. Lob. Lon. Lugd. Cam. Tab. Ger.  
Succisa, Marrh Fuch. Dod. Cast.  
Scabiosa folio integro, Cæs.  
Pycnocomon, Col.

Folij est glabris & integris, rarius lacinjatis: floribus cæruleis, rarius purpureis, vel incarnatis, rarissimè albis: est etiam major & minor.

II. Succisa hirsuta, quæ à priore sola hirsutia differt.

Morsus diaboli hirsuta rarior, Gesn. hort.

## S C A B I O S A.

**S**cabiosa, alijs à scabro herba habitus (quod vulgate convenit): alijs quod scabiei medeatur, quod vox Pfora pratenāre videtur: quare vox per Acti) aliqui censent: Sunt qui ad Scaben Dioscoridis l. 4. c. 12. referant.

Scabiosa pratenfis & arvensis.

### I. Scabiosa pratenfis hirsuta, quæ officinarum.

Scabiosæ primum genus, Trag.  
Scabiosa, Læ. desc. Lon. vulgaris, Fuch. communis, Dod. gal.  
Scabiosa altera campestris seu segetum, Lob. ico. Ger.

Scabiosa major, Cast. arvensis, Tab. vulgaris, Scabiosa folio scisso, Cæs.

Scabiosa major flore ex cæruleo purpureo, Tab.

Huc referenda est

Scabiosa major satorum vulgarior, Ad. Lob.

Scabiosa vulgaris major, Dod. Lugd.

Scabiosa dissectifolia major, Thal.

Variat folijs modo crassius, modo tenuius utrinque divisis: flore ex cæruleo, purpureo, vel brevilico colore tincto: hinc duæ apud Tab. & Gerardum figura.

Scabiosa major, flore ex cæruleo purpureo, Tab.

II. Scabiosa major squammatis capitulis.

Scabiosa, Brunn. quinta, Trag.

Scabiosa major, Matth. Lugd. Cam. Clus. hist.

Jacea nigra major laciniosa, Ad.

Scabiosa major flore purpureo, Tab Ger.

Cyanus sylv. major arvensis, Thal.

Floribus est ex purpura subrubentibus: reperitur floribus paucioribus, minoribus, si candido: folijs altera latoribus, altera angustioribus.

III. Scabiosa major altera, squammatis capitulis, sive Jacea rubra latifolia lacinjata.

Jacea tertia, Tab.

Jacea major, Ger.

IV. Scabiosa fruticans latifolia alba.

Scabiosa nona sive æstivalis, Clus. hist.

Flos vel candidus, vel cæruleis staminibus ornat, vel livet, vel ad cæruleum inclinat.

V. Scabiosa fruticans angustifolia alba.  
 Scabiosa montana calidarum regionum, Adv.  
 Lob. Lugd.  
 Scabiosa quarta & major Pannonica, Clus. pan.  
 Scabiosa major Pannonica albo flore, vel 8. Eidem hist.  
 Scabiosa maxima leucanthemos, Cam.  
 Scabiosa montana, Tab.  
 VI. Scabiosa angustifolia alba altera.  
 Scabiosa major alba, Tab.  
 Scabiosa montana, Ger. ico.

VII. Scabiosa multifida folio flore flavescente.  
 Scabiosa tertia, Clus. pan.  
 Scabiosa septima vel *Scabiosa* flore, Eid. hist.  
 Scabiosa tenuifolia, sive major, sive 7. Thal.  
 Scabiosa lutea & Thuringia, Cam.  
 Scabiosa Pannonica flore albo, Eyst.  
 VIII. Scabiosa flore globoso niveo.  
 Scabiosa alba in hortis Belgij, Clus. hist.  
 Scabiosa Belgica flore albo, Eyst.  
 IX. Scabiosa alba gemino capite.  
 Scabiosa alba gemino tergemino capite, Clus. hist.

Flore purpurascens, vel incarnato, huic non absimilem, in Bavaria Camerarius observavit.

X. Scabiosa prolifera folio latiore.  
 Scabiosa prolifera, Lob. ico. Tab. prolifero flore, Clus. hist.

XI. Scabiosa prolifera folijs Gingidij: quæ 3. in Prodomo.

XII. Scabiosa tenuifolia prolifera minor.  
 Scabiosa tenuifolia minima prior, Eyst.

XIII. Scabiosa folio Sinapi sylv. quæ 2. in Prodomo.

*Scabiosa montana.*

I. Scabiosa alpina folijs Centaurij majoris.  
 Scabiosa alpina maxima, Ad. Lob. ico. Tab.  
 Centaurium nothum Dalechampij, Lugd.  
 Scabiosa alpina Centauroides, Cam. Eyst.

II. Scabiosa montana glabra, folijs Scabiosæ vulgaris.  
 Scabiosa secunda vel alpina, Clus. pan.  
 Scabiosa quinta sive montana, Eid. hist. desc.

III. Scabiosa montana Dentis leonis folio: quæ 4. in Prodomo.

IV. Scabiosa montana latifolia non laciniata rubra & prima.  
 Scabiosa latifolia purpurascens flore, Clus. pan. sive 4. Eid. hist.

V. Scabiosa latifolia rubra non laciniata secunda.

Scabiosa prima, vel latifolia rubro flore, Clus. pan.

Scabiosa rubra Austriaca, Lob. ico.  
 Scabiosa integrifolia prima, Thal.  
 Scabiosa tertia vel latifolia Pannonica rubro flore, Clus. hist.

Scabiosa Succisæ similis, Cæf.  
 Scabiosa latifolia septima, Tab.

VI. Scabiosa Virgæ pastoris folio.  
 Scabiosa latifolia peregrina, Tab.

VII. Scabiosa argentea angustifolia: quæ 6. in Prodomo.

an Scabiosa graminea folio argenteo flore purpureo, Cam.

VIII. Scabiosa montana minor capitulo squammoso.

Scabiosa montana omnium minima, Adv. Lob. ico. Lugd.

Scabiosa æstiva minor, Lob.  
 Scabiosa montana minor septima, Tab.

*Scabiosa capitulo globoso.*

I. Scabiosa peregrina rubra capitulo oblongo: quæ 1. in Prodomo.

Scabiosa Indica sive sexta, Clus. hist.  
 Scabiosa Indica flore saturatè rubro, &  
 Scabiosa Indica flore dilutè rubro, Eyst.

Hanc folijs in tenuiores lacinas divisis, floresque minore & rubro, nomine Scabiosæ nigre odore Zibethi, ex horto Patavino habemus.

II. Scabiosa capitulo globoso major.  
 Scabiosa quinta & sexta, Trag.

Scabiosa minor, Matth. Lob. (cui & Columbaria) Lugd. Cast.

Scabiosa minor lævis, Gesn. hort.  
 Scabiosa media, Dod.

Scabiosa media ferrato angustifolio, flore globulariæ, Ad.

Scabiosa 20. femina herbariorum, Tab.  
 Scabiosa folijs bellidis sylvestris majoris, major, Thal.

Scabiosa quinta sive montana, Clus. hist. ico.  
 Phyteuma Dioscoridis, Col.

III. Scabiosa capitulo globoso minor.  
 Scabiosæ folijs bellidis species minor, Thal.

Scabiosa minor, 1. 2. 3. 5. Tab.  
 Scabiosa media, minima, minor & major, Ger. ico.

Scabiosa angustifolia flore subcæruleo, Eyst. Folio-

Foliorum dissectionibus variant, cum alteri ad medium nervum tenuissimè dissecta sint, alteri non item: tertia folia inferiora penitus dissecta non habet.

IV. Scabiosa capitulo globoso folijs in tenuissimas lacinias divisiss.

Scabiosa tenuifoliae species altera, Thal.  
an Scabiosa tenuifolia flore caeruleo, Eyst.

V. Scabiosa minor capitulo globoso odore, Phyteuma minus, Col.

*Scabiosa stellata.*

I. Scabiosa stellata folio laciniato major.

Scabiosa Hispanica major, Clus. hisp. & histor.

Lob. Lugd. Tab. Ger.

Scabiosa peregrina, Dod. Cæf.

Scabiosa Hispanica, Cam. Eyst.

II. Scabiosa stellata folio laciniato minor, sive maritima.

Scabiosa Hispanica minor, Clus. hisp. & hist.

Scabiosa Hispanica minor, vel altera, Lugd.

Scabiosa peregrinae alterae species, Dod.

Hæc si in hortis colatur pedalem altitudinem excedit.

III. Scabiosa stellata minima: quæ s. in Prod.

IV. Scabiosa stellata folio non dissecto.

Scabiosa peregrina, Lob. Lugd. Ger.

Scabiosa arborescens, Cæf.

Scabiosa peregrina folijs non dissectis, Tab.

Scabiosa arborea Cretica, Ponæ.

Habet Camerarius Scabiosam Gallicam folio oblongo, tenui, nigricante, nitido: sed nostræ folia incana sunt.

## J A C E A.

Jacea adeo Scabiosa similis est, ut eam Scabiosam nominare soleant: sunt tamen qui velint Hyosiridem esse Plinij. 27. c. 11. quam Intubo similem sed minorem, & caeli asperiores, scribit.

*Jacea non laciniata.*

I. Jacea nigra pratenfis latifolia.

Scabiosa vulgaris pratenfis, vel 4. Trag.

Centaurij pratenfis species Ges. hort.

Gethia nigra Scaligeri, Eid.

Jacea nigra, Eid. Tab. Ger. flore purpureo, Eyst.

Cyanus sylv. angustifolius, Thal.

Jacea alia nigra, Lugd.

an Solid. go. Syrracenicæ altera, Lon.

Hujus folia inferiora quâdoq; laciniata sunt: quæ & floribus albis pingitur in hort. Eyst.

II. Jacea nigra angustifolia, vel Lithospermæ arvensis folijs: quæ 2. in Prodromo.

Varia: alia caule lævi, eod; cum folijs virente: alia caule aspero rufescente, vel molli tomento vestito, folijsq; incanis.

III. Jacea fruticans pini folio.

Scorbe capitata rosmarini folio, Ponæ.

Chamæpitys fruticosa Cretica Belli, Eid.

Chamæpitys Berthioli.

IV. Jacea integrifolia humilis: quæ 2. in Prodromo.

V. Jacea nigra squammoso capite major.

Jacea Austriaca prima, Clus. pan.

Jacea squammato capite montana prima, Eid. hist.

VI. Jacea nigra squammoso capite minor.

Jacea Austriacæ primæ aliud genus, vel Jacea montana squammoso capite minor, Clus. pan.

Jacea squammato capite montana 2. Eid. hist.

VII. Jacea latifolia capite hirsuto.

Jacea Austriaca secunda, vel Jacea montana villoso capite elatior, Clus. pan.

Jacea Austriaca villoso capite, sive 4. elatior, Eid. hist.

Jacea pannonica capitulo crispo, Camerar. in Thal.

Cyanus sylv. montanus integrifolius, &

Cyanus sylv. *purpurea*, Thal.

VIII. Jacea angustifolia capite hirsuto.

Jacea montana villoso capite humilior, Clus. pan. vel quinta, Eid. hist.

IX. Jacea alba hirsuto capite.

Jacea Austriacæ majoris villoso capite flore albo, nomine, D. Fürer; Northusa misit.

*Jacea laciniata.*

I. Jacea nigra laciniata.

Jacea nigra, Dod. ut: Lugdunen. vulgaris, Ad. Lobel.

Hyosiris Plinij, Ang.

Jacea Austriaca tertia, Clus. pan. at sexta in hist.

Jacea pannonica Clusij hirsuto capite, Cam.

II. Jacea humilis alba Hieracij folio.

Jacea pumila, Ad. Lob. ico.

Jacea humilis Hieracij folio, Lugd.

Flore est albo: aliquando ex caeruleo obsoleto purpurascit: Est major & minor.

III. Jacea laciniata squammata.

Jacea

Jacea squammato capite tercia Cretica, Clusij histor.

IV. Jacea laciniata lutea.

Jacea montana minima tenuifolia, Col.

V. Jacea latissimo laciniato folio: sub Jacea Babylonica in Prodomo descripta.

*Jacea laciniata capite spinoso.*

I. Jacea capite longis aculeis spinoso: quæ 3. in Prodomo.

II. Jacea lutea spinosa Centaurioides.

Jacea laevis maxima centaurioides Apula, Col.

III. Jacea lutea capite spinoso.

Jacea major lutea, Ad. Lob. ico. Lugdun. Tab. Ger. Eyst.

Jacea lutea, Clus. hisp. & hist. Lugd. desc.

Spina solstitialis altera, Dod.

Carduus stellatus capitulis spinosis, Lob.

Carduus eriocephalus Dodonæi, Lugd. ico.

IV. Jacea Cyanoides echinato capite.

Jacea major folio multum laciniato, Ad.

Jacea major, Lob. Lugd.

Cyanoides flos, Dod.

Cyanoides major, Tab.

Jacea montana echinato capite, Clus. pan. & hist. five 7.

Stœbe Salmantica secunda, Clus. hist. ico.

Flos purpurascens, rarius albus: rarissimè luteus.

V. Jacea folijs Seridis candicantibus, purpurea.

Jacea altera, Clus. hisp.

Jacea purpurea Valentina muricato capite, Clus. hist.

VI. Jacea laciniato Sonchi folio, sive Jacea latifolia purpurea capitulo spinoso: quæ 4. in Prodomo.

VII. Jacea minor folijs aculeatis: Cyani majoris nomine missa.

*Jacea laciniata incana.*

I. Jacea tomentosa capitulo spinoso: quæ 8. in Prodomo.

II. Jacea montana incana mollis capitulis hispidis: quæ 6. in Prodomo.

III. Jacea montana incana aspera capitulis hispidis: quæ 5. in Prodomo, qui volet has duas conjungat.

IV. Jacea montana candidissima Stœbes folijs, quæ in Phytopinace & Matthiolo sub Jacea incana laciniata: at in Prodomo sub 7. describitur.

V. Jacea montana incana capite pini. Chamæleon non aculeatus, Advers. Lobel. icon.

Jacea montana, acanophora, Lugd.

Jacea alia pumila sive varia, Cam.

VI. Jacea montana incana odora.

Jacea montana Narbonensis, Lob.

Jacea muscata & quinta, Tab.

Jacea montana, Ger.

*Jacea olea folio.*

I. Jacea incana Cyani capitulis.

Jacea incana altera Cyani aut Jacæ capitulis, Advers.

Stœbe incana altera, Lob. ico.

Jacea incana, Lugd.

Cyano similis quædam, Cæs.

II. Jacea oleæ folio capitulis simplicibus.

Parmica altera, Matth. Lugd.

Parmica, Lac. Cyano similis, Cæs.

Parmica Austriaca, Lob. Clus. pan. & hist. Dod. Cam. Ger.

III. Jacea oleæ folio minore flore.

Parmicæ Austriacæ species, Clus. cur. post.

IV. Jacea oleæ folio capitulis compactis,

Jacea pusilla incana altera folio oleæ, Lob.

Jacea incana folio oleæ, Lugd.

V. Jacea oleæ folio affinis.

Dorichyum Dioscoridis fortè, Ponnæ Ital.

Lagochimicæ nomine, semine ab Honorio Belli ex Creta misso, in horto Anno 1600. crevit.

## S T O E B E

**Σ** Totū vulgari est notitia, Dioscoridi lib. 4. cap. 12. Plinio lib. 22. cap. 11. Stœbe quam aliqui Phleon. At lib. 21. cap. 15. quadam spinam in folio habet & in caule, ut Phleos quod aliqui Stœben appellaverunt: ob quam utriusque brevitatem quid statuendum sit, dubium sanè: nihilominus tamen recentiorum aliqui, subsequentibus plantis id nomen tribuunt, quod extrema folia utcumque aculeata sint, quas tamen alij ad Cyanos, alij ad Centaurias propter amorem referunt, ad confusionem vitandam, Stœbes nomen servabimus.



*Stæbe folijs laciniat.*

I. *Stæbe major folijs Cichoraceis, mollibus, lanuginosis.*

*Stæbe Salmantica prima, Clus. hisp. & hist.*

*Stæbe Salmantica major, Lob.*

*Aphyllanthes prima, Dod.*

*Scabiosa, seu Stæbe Salmantica prior, Lugd.*

*Stæbe major, Tab.*

*Stæbe argentea minor, Ger.*

*Stæbe Hispanica, Cam.*

II. *Stæbe major folijs Erucae mollibus lanuginosis.*

*Stæbe Salmantica primæ altera species, Clus. hisp. Lugd.*

*Stæbe Salmantica secunda, Clus. hist.*

*an Stæbe argentea incana Aldroandi, Lob.*

*Aphyllanthes tertia, Dod.*

III. *Stæbe major calyculis non splendentibus.*

*Centaurium majus in muris, Gesl. hor.*

*Stæbe Salmantica alterius altera species, Clus. hisp. Lugd.*

*Jacea, sive Stæbe gallica, Clus. pan.*

*Stæbe Gallica & Austriaca elatior, Eid. hist.*

*Cyanus sylv. tenuifolius, Thal.*

*Jacea alba, Lugd.*

IV. *Stæbe viridis calyculis argenteis: in Prodomo.*

V. *Stæbe calyculis argenteis.*

*Stæbe Salmantica altera, Clus. hisp. Lugd.*

*Stæbe Salmantica tertia, Clus. hist.*

*Stæbe argentea Salmantica minor, Lob.*

*Aphyllanthes quarta, Dod.*

*Stæbe minor, Tab.*

*Stæbe argentea major, Tab.*

*an Stæbe, Ang.*

*an Papaver spumeum, Cæs.*

VI. *Stæbe calyculis argenteis minor.*

*Jacea alba, Tab.*

*Jacea flore albo, Ger.*

VII. *Stæbe incana Cyano similis tenuifolia.*

*Centaurij majoris species minor, Gesl. col.*

*Cyano minori similis, Clus. pan.*

*Stæbe Austriaca humilis, Eid. hist.*

*an Papaver spumeum aliud in saxosis, Cæs.*

VIII. *Stæbe rubra Monspeliaca parvis Cyani capitulis: vel Jacea rubra angustifolia laciniata.*

*Jacea rubra major laciniosa, Lugd.*

IX. *Stæbe squammis asperis.*

*Aphyllanthes secunda, Dod.*

*Stæbe non laciniata.*

I. *Stæbe spinosa maritima.*

*Stæbe ex Cod. Cæsareo, Dod.*

*Stæbe peregrina, Clus. hist. ap. alt. auct.*

*Cyanus spinosus Creticus, Ponæ Ital.*

II. *Sphæritis ex Codice Cæsareo, Dodon. quid?*

## C Y A N U S.

**C**YANUS, à floribus cyaneo seu cæruleo colore, nomen accepit. Plinius libr. 21. cap. 8. de vestium amulatione cum floribus agens, ait, in nomine eil & Cyani color: & cap. 11. Rosam Cyanus excipit. Cyanum Amaranthum. At Hermolaium, Leucoum Dioscoridi censuit: & Casalpino, Serrubium apud Theophrastum ex hoc genere videtur: verum Columna, Papaver Heracleum Theophrasti & Dioscoridi statuit: Lobelius num Chondrilla species sit dubitat.

I. *Cyanus montanus latifolius: vel Verba- sculum Cyanoides.*

*Verbasculum, Trag.*

*Cyanus major, Matth. Dod. ut: Lob. Lugd. Cam. Ger. Eyll.*

*Cyanus major hortensis, Ad.*

*Cyanus montanus, Gesl. hor. Tab.*

*Cyanus sylv. Lon. flore grandi, Cæs.*

*Flore est magno cæruleo, aliquando umbilico purpureo: rarius flore albo est.*

II. *Cyanus segetum.*

*Lychnis agria, & Flos frumenti, Brunf.*

*Baptisecula, Trag.*

*Cyanus, Dod. gal. Turn. Gesl. hort. Lon. Cæs. flos, Dod.*

*Cyanus major, Matth. Lugd. Cast. Cam.*

*Cyanus sylv. Fuch.*

*Cyanus vulgaris, Ad. Lob. Oer.*

*Cyanus cæruleus, Tab. arvensis cæruleus, Thal. Eyll. et.*

*Papaver Heracleum, Col.*

*Flos communiter cæruleus, rarius albus.*

III. *Cyanus hortensis flore simplici.*

*Floris colore variat, cæruleo, purpureo, hicq; aliàs dilutè rubro & incatnato, aliàs ad puniceum inclinante, aliàs vario, violaceo, albo, & ex*

his coloribus mixto: hinc figuræ quatuor apud Tabernæ montanum & Gerardum.

1. Cyanus cæruleus, sativus, Tab. sub Cyano variegato apud Ger.

2. Cyanus purpureus, Tab. Ger.

3. Cyanus albus, Tab. Ger.

4. Cyanus ex albo violaceus, Tabern. Cyanus violaceus, Ger.

Sic apud Eyst. flore purpureo, incarnato, rubro, albo, albo fundo purpureo, variegato.

IV. Cyanus hortenſis flore pleno.

Cyanus flore multiplici, Lob. ico.

Cyanus multiflorus, Tab. Ger.

Variat floribus colore purpureo, albo, medio purpureo: hinc duæ figuræ apud Lob. & Ger. tres apud Tabern.

1. Cyanus fl. purpureo multiplici, Lob. ico.

Cyanus purpureus multiflorus, Tab. Ger.

2. Cyanus flore albo multiplici medio purpureus, Lob. ico.

Cyanus albus multiflorus medio purpureus, Tabern.

3. Cyanus cæruleus multiflorus, Tab.

V. Cyanus repens latifolius.

Cyanus peramarus supinus capitulis squarosis Sefamoidis parvi, Ad. Lob.

Cyanus repens, Lob. ico. supinus, Lugd.

Cyanoides minor altera, Tab.

VI. Cyanus repens angustifolius.

Cyanus repens alter, Lob. repens, Lugd.

Cyanus minimus, Ad. repens, Lob. ico.

Cyanoides minor, Tab.

## TRAGOPOGON.

**T**ραγοποιον ἢ τριφυγιον, ἡδὲ κίονα, à proluxa lanugine, quæ à summo erumpit, sibi nomen ascribit. Dioscorides libr. 2. cap. 173. Tragopogon Theophrasto 7. hist. 7. At Plinio lib. 21. cap. 13. Come, ab alijs Tragopogon, folijs Croci similis. Et lib. 28. cap. 13. Eit & Tragopogon quem alij Comen vocant, & r. Latine nū Barbula hirci.

Tragopogon luteo flore.

I. Tragopogon pratenſe luteum majus.

Barbula hirci, Trag. Matth. Lac. Caſt.

Tragopogon, Matth. Fuch. Ang. Gefn. hor. Tur.

Dod. Lon. Cæſ. flore luteo, Eyst.

Tragopogon luteum, Lob. Tab. Ger.

Tragopogon luteus communis, Thal.

Barba hirci, Cord. in Dioſ. & hiſt. Dod. gal. Gef.

hort. Lugd. flore luteo, Cam.

Gerontopogon flore luteo, Gefn. col. & Barbula ſeniſ.

II. Tragopogon folio oblongo ſinuato: primo loco in Prodomo deſcriptum.

III. Tragopogon ſpicatum luteum.

Tragopogon ſpicatus, Lugd.

IV. Tragopogon laciniatum luteum.

Acorus Theophrasti, Ang.

Tragopogon laciniatis folijs, Col.

Folia prima graminea ſunt, integra nec laciniata.

V. Tragopogon tenuiſſimè laciniatum: quod 2. in Prodomo.

an Chondrillæ τριφυγιον αὐτῆς alia ſpecies, Thali.

VI. Tragopogon Coronopi folio.

Chondrilla τριφυγιον αὐτῆς & major, Thal.

Duplex eſt: major, minor quæ ſola magnitudine à prioribus diſt.

VII. Tragopogon hirsutum.

Tragopogon Apulum hirsutum humile, Col.

VIII. Tragopogon hirsutum venenatum.

Tragopogon ex Sicilia venenatum, Cæſ. quid?

IX. Tragopogon gramineo folio radice villoſa.

Barbula hirci minor, Tab.

Tragopogon minus, Ger.

X. Tragopogon parvum ex luteo purpurascens.

Tragopogon parvum flore Chondrillæ purpureo: ruleæ, Lob. ob.

an Barbula hirci minor ex Ilva, Cam.

Tragopogon purpureo flore.

I. Tragopogon purpureo: cæruleum porri folio, quod Artin vulgo.

Tragopogon alterum, Matth. Lugd.

Tragopogon, Dod. Lob. puniceum, Gefn. hort. purpureum, Ger. Eyst.

Tragopogon ſylv. flore purpureo, Cæſ.

Barbula hirci altera, Matth. Caſt. purpureo: rulea, Tabern.

Barba hirci flore purpureo, Cam.

Gerontopogon flore puniceo, Gefn. col.

Gerontopogon ſive Saſſifica Italorum, Lugd.

Flore eſt purpureo cæruleo, nigro purpureo, cæruleo: albo in Apennino Cameracius notavit.

II. Tra.

II. *Tragopogon purpureo-cæruleum* crocifolium.

*Tragopogon crocifolium montanum*, flore nigro purpureo, Col.

III. *Tragopogon gramineis folijs* hirsutis.

*Tragopogon alter gramineo folio* suaverubente flore, Col.

## S C O R Z O N E R A.

*Scorzonera* nomen est Hispanicum, à scorzo vipera, vel à serpente scorzone: quare idem est ac *Viperina* sive *Serpentaria*, quod contra viperarum & serpentum venena efficax sit. Sunt qui ad *Chondrillam* *Dioscoridi* referant, sed magis ad *Tragopogon* genus reducenda.

*Scorzonera latifolia.*

I. *Scorzonera latifolia* sinuata.

*Scorzonera Hispanica*, Matth. Lugd. Cast. Tab.  
*Scorzonera*, Dod. Lob. Lon. Cæs. Cam. latifolia, Thal.

*Scorzonera major Hispanica prima*, Clus. hist.  
*Scorzonera Germanica*, Tab.

*Tragopogon peregrinus* vel *Hispanicus*, Gesn. hort.

*Viperaria Hispanica humilis*, Ger. ico.

Ratione saporis radice duplex: communiter est subdulcis, ita ut à *Tragopogone* nihil ferè distet: altera radice est amara *Gentianæ* instar, & hoc *Hypericij* una veterum, Thalius censet. Floribus simplicibus & plenis *Camerariis* notavit.

II. *Scorzonera latifolia altera.*

*Scorzonera Boëmica*, Matth. Lob. Lugd.  
*Scorzonera major*, vel *pannonica prima*, Clus. pan. & hist.

*Scorzonera Germanica*, Tab. latifolia German. Eystett.

III. *Scorzonera folijs nervosis.*

*Scorfonera altera*, Lob. ico.  
*Scorfonera Germanica angustifolia*, Tab.  
*Viperaria humilis*, Ger. ico.

I V. *Scorzonera latifolia humilis nervosa.*  
*Scorfonera humilis latifolia* sive secunda, Clus. pan. Pannonica 2. Eid. hist.

*Scorzonera Pannonica*, Tab.  
*Viperaria Hispanica*, Ger. ico.

*Scorzonera angustifolia.*

I. *Scorzonera angustifolia prima.*  
*Scorfonera humilis angustifolia* & *Pannonica* tertia, Clus. pan. & hist.

*Scorzonera Pannonica angustifolia*, Tab.  
*Viperaria Pannonica angustifolia*, Ger.

II. *Scorzonera angustifolia altera.*  
*Scorfonera Pannonica* 4. vel *Scorfonera humilis fibrosa radice*, Clus. pan.

*Scorzonera tenuifolia prima*, Thal.  
*Hieracium septimum* Clus. hist.

Hæc radice est dulciuscula, aut amara.

III. *Scorzonera angustifolia subcærulea.*  
*Scorfonera Pannonica* 5. vel *major angustifolia*, Clus. pan.

*Scorzonera tenuifolia altera*, Thal.  
*Scorfonera angustifolia elatior Pannonica* 4. Clus. hist.

Variat folijs angustioribus, calyculis brevioribus, semine crassiore & brevior.

## C A L T H A.

*Caltham* Poëtarum hanc esse volunt, quam aliqui ab aureo colore floris, *Chrysanthemum* nominant, & quidem *Dioscoridi* lib. 4. cap. 58. At *Columna* in *Phytobas*. *Clymenum* *Dioscoridi* lib. 4. cap. 13. censet. Alij ad *Caltham* *Plinii* lib. 21. cap. 6. alij ad *Gromphnam* ejusdem, lib. 26. cap. 7. referunt. *Dalechampi* à cereo ipsius flore *Cerinthen* putat.

I. *Caltha vulgaris.*

*Calendula*, Brunt. Trag. Dod. ut: Ang. Gesn. hort. Cæs. Cam. fativa, Tab.

*Caltha*, Matth. Fuch. Tur. Lon. Lugd. Cast.

*Caltha* Poëtarum & *Chrysanthemon ocularum* verius *Dioscoridis*, Ad.

*Chrysanthemum*, Lob.

*Calendula simplici flore*, Ger. Eyst.

*Clymenon* *Dioscoridis*, Col.

Flore est pallido, citrino, rufso: quæ *Calendula* lutea medioruffa, Eyst. aliquando reflorescit & fructuosa evadit.

II. *Caltha polyanthos maxima.*  
*Calendula multiflora maxima*, Tab. Ger.

III. *Caltha polyanthos major.*  
*Calendula lutea, flore pleno*, Eyst.

Mm 2

Variat

Variae flore majore, minore, ejusque colore aureo, vel melino: hinc tres figurae apud Tab. & Ger.

Calendula major polyanthos flore aureo.

Calendula polyanthos flore aureo.

Calendula sativa polyanthos melina.

IV. Caltha floribus reflexis.

Chrysanthemum sive Caltha reflexis floribus, Lob. ico.

Calendula multiflora orbiculata, Tab. Ger.

V. Caltha prolifera majoribus floribus.

Chrysanthemum proliferum, Lob. ico.

Calendula prolifera, Cam. Tab. Ger. Eysl.

VI. Caltha prolifera minoribus floribus.

Chrysanthemum proliferum a lreum, Lob. ico  
Calendula prolifera a. Taber. major prolifera, Ger.

VII. Caltha arvensis.

Calendula circa Monspelium sponte, Ges. hor.

Calendula sylv. minor, Cæf.

Calendula arvensis, Tab. Ger.

Folij crenatis circa Monspelium reperimus.

VIII. Caltha humilis & minima: in Phytopineae descripta.

IX. Caltha palustris flore simplici.

Caltha Virgilij, Trag.

Tussilago altera, Matth.

Dotterblumen/ Dod. gal.

Chamaeleute, Ang. Tur.

Chelidonia palustris, Cord. hist.

Caltha palustris, Gesn. hort. (Ferraris quibusdam, forte à forma folij ferream solem referentis,) Dod. Adv. Lob. Lugd. (& Malacocissus major) Cam. Ger.

Caltha palustris vulgaris, Clus. hist.

Chrysanthemum Lon.

Epimedium Dodonæi, Thail.

Amellus Virgilij putatus, Eid.

Farfugium, Cast.

Populago, Tab.

Est flore majore & minore: hinc apud Tab. & Ger. nomine

Populaginis majoris & minoris, Tab.

Calthæ palustris majoris & minoris, Ger.

Marem & sceminam facit Ges. l. de col. Scirp. illam ramulis rubentioribus, flore magis rufo: hanc minorem, albiorebus ramulis, & florem minus rufum scribit.

X. Caltha palustris flore pleno: & Cam. & Clus. hist.

Caltha palustris floribus densis, Gesn. hort.

Populago multiflora, Tab.

Caltha palust. multiplex, Ger. fl. multip. Eysl.

In Anglia sponte & plenis & odoratis floribus reperitur, Camerario auctore: nobis hortensis est.

## HELENIIUM ET FLOS SOLIS.

**E**tenim Dioscoridi lib. 1. cap. 27. Helenium Plinio lib. 21. cap. 10. quod è Lætymià Helena natum dicatur, & ideo in Insula Helena laudatissimum esse: quo loci Plinius Aegyptiacum Dioscoridæ proponit, Panax Chironium Theophrasti 9. hist. 10. quibusdam censetur.

Genera duo Dioscoridi: alterum solis Verbasca, quod nostrum vulgatum est, ac à Plinio lib. 19. cap. 5. & lib. 20. c. 5. Inula dicitur: Alterum Aegyptiacum, quod Helianthe est flore albo, de quo inter Cisti genera.

I. Helenium vulgare.

Enula campana, Brunf. Cam.

Helion, Trag.

Enula, Tur. Lon. Cæf.

Helenium, Brunf. Matth. Dod. ut: Cord. in Diof. Lac. Gesn. hort. Ad. Lob. Cast. Cam. Tab. Ger. Eysl.

Helenium 1. Dioscoridi, Ang.

Inula, vulgo Enula campana, quod, quæ in campis provenit, hortensi præferatur, Gesn. hort.

Panax Chironium Theophrasti, Ang. Cord.

II. Helenio similis peregrina.

Faalum, Theveti: hujus iconem ex Theveti

Cosmag. Lugd. habet: quid est?

III. Helenium Indicum maximum.

Planta maxima, Cortuso in epist. ad Matt. edit. Ital. præfixa, Cast. cui & Bellis Pliniana.

Solis flos Peruvianus, Lob.

Chrysanthemum Peruvianum, Dod. Lugd.

Helianthemum Peruvianum, Cam. ep.

Herba Solis, Monardi.

Sol Indianus, Lon.

Helenium Indicum, Cæf.

Corona Solis, Tab.

Flos Solis gigantea, corona regia, crater Jovis, amoris tuba, rosa Hiericonis, Frag.

Flos

Flos Solis major, Ger. Eyft.

Flos à Soledictus: Joseph. Acostæ l. 4. c. 27.  
an Planta prægrandis flore Calendulæ forma,  
ex cujus femine panem & pultes in Virginia  
conficiunt: in desc. Virginie.

Variat magnitudine foliorum & florum,  
caulis altitudine: adolescit enim in Hispa-  
nia ad 24. pedes. Flos (cujus folia in aliquibus  
longiora) aliquando tantæ magnitudinis, ut  
2362. femina inventa fuerint: quem aliqui al-  
bum viderunt.

IV. Helenium Indicum ramosum.  
Chrysanthemum Peruvianum alterum, Dod.  
Helianthemum Peruvianum proliferum, Cam.  
Flos Solis ramosus, Cam. (ep.  
Corona Solis 2. Tab.  
Flos Solis minor, Ger.  
Flos Solis prolifer, Eyft.

In Italia viginti quatuor flores in una planta,  
plures in Hispania, sæpi' conspiciuntur: in Ger-  
mania etiam decem & plures observavimus.

V. Helenium Indicum medium laciniato  
folio.

Solis flos minor, Lob. Lugd. Cam.

VI. Helenium Indicum minus.

Corona Solis minor femina, Tab.

Flos Solis minor femina, Ger.

Ambo enim marem & feminam exhibent.

VII. Helianthemum Indicum tuberosum.

Flos Solis Farnesianus, sive Aster Peruvianus  
tuberosus, Col.

Chrysanthemum latifolium Brasilianum, in  
Prodomo.

Chrysanthemum è Canada quibusdam.

Canada & Artischoki sub terra, alijs:

Gigantea, Burgundis.

\*\*\*\*\*

## SECTIO QUINTA.

PERFOLIATA; BUPLEURUM; CENTAURIUM MINUS;  
GRATIOLA; HYPERICUM; CORIS; SYMPHYTUM PETRÆUM;  
POLYGONUM; ANTHYLLIS; SEDUM; COTYLEDON; ALOE.

### P E R F O L I A L A.

**P**erfoliata dicta, quod singula folia caulis penetret: quam alij Cacaliam Dioscoridis lib. 4. cap. 123.  
suspiciuntur: alij Cotyledonem ejusdem lib. 4. cap. 92. pronunciant, ni radix obfaret. Alij  
Seseli Aethiopicum ejusdem lib. 4. cap. 61. censent.

I. Perfoliata vulgatissima, sive arvensis.  
Perfoliata, Brunf. Matth. Fuch. Eric. Cord. Dod.  
ut: Ang. Gesn. hort. Lon. Cord. hist. Lugdun.  
Tab. Eyft.

Perfoliata vera, Thal. vulgaris, Ger.

Perfoliata major, Trag.

Cacalia, Lac.

Perfoliatum vulgatus flore luteo folio umbi-  
licato, Ad. Lob.

Seseli Aethiopicum Dioscoridis, Cæs.

II. Perfoliata flore multiplici.

Perfoliata crispa ceu muscosa, Cam.

III. Perfoliata montana latifolia.

Perfoliata montana, Gesn. Lugd. Cam.

IV. Perfoliata montana flosculis parvis.

V. Perfoliata alpina latifolia minor: hæc  
1. in Prodomo.

VI. Perfoliata alpina angustifolia major,  
sive folio anguloso: hæc 2. in Prodomo.

VII. Perfoliata alpina angustifolia media:  
quæ 3. in Prodomo.

an Perfoliata largifolia Dalechampij, Lugd.

VIII. Perfoliata alpina angustifolia mi-  
nor: quæ 4. in Prodomo.

IX. Perfoliata alpina gramineo folio, sive  
Bupleuron angustifolium alpinum.

Sedum petræum Bupleuri folio, vel Bupleuron  
petræum gramineo folio, Ponæ.

X. Perfoliata minor angustif. bupleuri folio.  
Odontitis lutea, Lugd.

Perfoliatum angustifolium montanum, Col.

XI. Perfoliata alpina angustifolia minima:  
vel Bupleuron angustifolium Pyrenaicum: 5.  
loco in Prodr. describitur.

an Seseli Aethiopicum parvum folijs grami-  
neis, Cæs.

XII. Perfoliata minor ramis inflexis: quæ  
6. in Prodomo.

## B U P L E U R O N.

**B**ōn sup̄ Hippocrati & Nicandro in Theriacu. Plinius lib. 6. cap. 22. Bupleuriz meminit, ubi aliqui Ammi vulgaritius intelligendum censent : licet Bupleuron Plinij, rectius Valeriana campestris, quæ etiam Lælica agnina dicitur, tribus videatur. Quare alijs hoc nōstrum Bupleuron, βοῦλευρον dicitur, cuius Theophrastus 7. hist. 8. inter olera mentionem facit : Et Buprestis Plinio lib. 6. cap. 22. Sunt qui ad Panaces Chironium Dioscoridu, alijs ad Elaphoboscum referunt.

## I. Bupleuron folio rigido.

Bupleurum, Ang. majus, Gefn. hort.

Elaphoboscum & Gratia Dei Gallis, Eid.

Bupleurum alterum latifolium, Ad. Lob. Dod.

Lugd.

Bupleurum latifolium, Tab. Monspeliensium,

Ger.

Panaces Chironium quorundam, Lugd.

## II. Bupleuron folio subrotundo, sive vulgarissimum.

Herba vulneraria, Trag.

Isophyllon, Cord. hist.

Bupleurum, Dod. gal. Gefn. hort. Ad. Lugd.

Auricula leporis Monspeliensium, Gefn. histor. anim.

Panax Chironium Dioscoridis, Lon.

Bupleurum angustifolium, Dod. Tab.

Bupleurum angustifol. Monspeliensium, Gef.

Bupleurum angustifolium herbariorum, Lob.

Sanamunda quibusdam.

Folia inferiora subrotunda, quæ in caule longa & angusta sunt.

## III. Bupleuron angustissimo folio.

Bupleuron minimum, Col.

## C E N T A U R I U M M I N U S.

**C**entaurium duplex est : majus de quo supra capite de Lapatbo : minus aliud, quod ποταύριον τὸ μικρόν ἢ λιγυρίον, quoniam loca vixit amet Dioscoridi lib. 3. cap. 9. At Theophrasto 9. hist. 4. πῖναξ λευκοφύλλον Panax tenuifolium dicunt. Plinio lib. 25. cap. 6. Centaurium alterum cognomine lepton, quod aliqui Libadion vocant, quoniam secundum fontes nascitur : Fel terra propter amaritudinem summam dictum. Galienus Exacon (ἀνὸ τῷ ἀντιδῶν ἀνὰ μετῶν) quoniam omnia mala medicamenta potum ē corpore exigit per alvum : Tertia est Centauri cognomine triorchis, &c. hac Plinius.

## I. Centaurium minus.

Centaurea, Brunf. Cæs. minor, Brunf.

Centaureum minus, Trag. Matth. Fuch. Ang.

Dod. ut : Tur. Cord. in Diosc. Gefn. Lac. Lon.

Cam. Thal. Lugd. Cast. Tab.

Centaureum minus flore rubro, Eysl. quod & flore albo pingit.

Centaureum parvum, Ad. Lob. Ger.

Flos communiter ē puniceo colore in purpuræ rubet : aliquando albus est : rarius ferruginei coloris. Variat etiam ratione folij, Theophrasto 4. hist. 5. monente ; in humidis enim, altius excrevit : in aridis, vix duas aut tres uncias æquat.

## II. Centaurium minus spicatum album : in Phytop. Matth. &amp; Prodiomo descriptum.

## III. Centaurium luteum perfoliatum.

Perfoliata Achillæa, Gefn. hort.

Centaureum luteum, Adv. Clus. hispan. prius, Lugd. Eysl.

Centaurium floribus luteis sive citreis pallidis Mesuæi, Lob.

Centaurium luteum perfoliatum, Cam. ep.

Achilleos, Cæs.

Centaurium parvum flavo flore, Clus. histor. luteum, Ger.

Centaurium minus luteo fl. perfoliatum, Tab.

Hoc videtur Achilleon vera Plinij l. 25. c. 5. quam scribit esse scapo cæruleo pedali, sine ramis, ex omni parte singulis folijs rotundis elegantè vestitam : vlncribusque mederi. Et Mesuæo, lib. 2. purg. 10. Centaurium floribus citreis pallidis.

Duplex est : alterum folijs angustioribus & non perfoliatis : alterum latioribus & caulem ambientibus : caule ramoso & non ramoso, & hoc est

Centaurium luteum alterum, Lugd.

## IV. Centaurium luteum pusillum.

Centaurium luteum novum, Col.

## G R A T I O L A.

**G**ratiola sive Gratia Dei nomen, recenter atque tribuit, propter singulares vires, tam per superiora, quam per inferiora humores expurgandi, & recentia vulnera consolidandi : Has veteribus indistinctè viderunt.



quāvis aliqui Papaver spumeum Dioscoridu l. 4. c. 67. alij Eupatorium Mefues esse velint. Centaurida alij faciunt, nec male cum Centaurij minoris species esse videatur: & inter spurias Centaurij minoris appellationes, Hellebomies & Multiradicis appellationes exstant, quæ Gratiola competere videntur, cum Hellebomii modo purget, & radicibus completius firmetur. Sunt qui Persicariam minorem apud Sylvaticum credant.

Gratiola centauroides.

Gratiola, Matth. Dod. ut: Gefn. hort. Ad. Lob.

Lugd. Cast. Cam. Tab. Ger.

Gratia Dei, Lac. altera, Cæf.

Gratia Dei, cujus semen Gelbenech, papaver spumeum fortè, Ang.

Limnæsum sive Centauroides, Cord. hist.

Eupatorium Mefue, Cord. fchol.

Gratiola sive Centaurium aquaticum, fortè Polemonium palustre amarum Hippocrati veterinario, Gef. col.

Gratiola vulgo dicta, quæ quibusdam verius Hyloppum vulgare cenfetur, Col.

Gratiola flore albo & Gratia Dei, Eyst.

Flos communiter purpurascens, aliquando albus, rarius luteus: folia minus magisve crenata.

## HYPERICUM.

**Y**negundis ei Ali' Apocynum, ei di niger, ei di xanthum, quoniam senem odore pineam refinam imicetur, Dioscoridi l. 3. c. 171. Et Plinio l. 26. c. 3. Hypericon quod alij Chamapityn, alij Corion appellant. Personat a vulgo, quod folia Soli objecta innumeris foraminibus scateere videatur: hinc & porosa quibusdam.

Genera: Dioscorides, præter vulgatum Hypericum & alterum sequenti capite exhibet, quod Kouper, ei d'antropodier, ei di Apocynum dicatur. hyperici genus esse magnitudine distans, cum nixum & fruticosum sit: & Androsamon dici, quod fructus, qui resinosi odoris est, atritu digiti veluti cruentantur. Et sequenti capite Ali' Apocynum, ei d'antropodier, ei di Kouper, ab Hyperico & Ascyro differt, &c. Plinio l. 6. & l. 26. c. 15. duplex est Hypericum: aliud oleraceo frutice tenus, cubiti alt., rubente, &c. Aliud quod Corion appellant folio Tamarici. &c. Eid. l. 27. c. 5. Ascyron sive Ascyroides Hyperici genus est, cuius comæ trita veluti cruentant: qua de causa quidam hanc Androsamon vocare, idem c. 4.

### I. Hypericum vulgare.

Hypericum. Brunf. Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac.

Lon. Dod. Ad. Lob. Cæf. Lugd. Cast. Cam. Tab.

Ger. Eyst.

Herba perforata, & Hypericum vulgare. Trag.

Ascyron, Dod. gal. Cord. in Diosc.

Androsæmon minus, Gef. col.

Apud Dioscoridem inter Rutas sylvestres (cum ipsius species credatur) hujus descriptio etiam legitur.

Foliis modo latioribus, modo angustis variat, quod Tragus duabus figuris expressit: caules quoque ejus, quod in humentibus provenit, quadrati sunt, alibi verò rotundi. Hujus etiam minor species caule quadrangulo, folijs non perforatis.

II. Hypericum numulariæ folio: quod in Prodromo describitur.

III. Hypericum folio brevior.

Hypericum Syriacum & Alexandrinum, Lob.

Hypericum Syriacum, Lugd. Ger.

Hypericum Alexandrinum, Tab.

IV. Hypericum minus erectum.

Hypericum pulchrum vel quartum, Trag.

Androsæmon, Lon.

an Hyperici minor species, Thal.

Hoc cum utriculis circa caulem reperitur.

V. Hypericum minus supinum, vel supinum glabrum.

Hypericum exiguum & primum, Trag.

Hypericum minus, Gef. col. Dod.

Hypericum minimum supinum Septentrionale, Lob.

Hypericum supinum 3. minimum, Clus. hist.

Alcyro adpinxit, Cam. ep.

Hoc interdum exiguum est, aliquando magno cespice serpit: hoc Lobelius in obser. illud in iconibus expressit.

VI. Hypericum supinum tomentosum majus, vel Hispanicum.

Hypericum supinum, Clus. hisp. tomentosum Hispanicum, Eid. hist.

Hypericum minimum supinum Septentrionale, Lob. ob. lico.

Hypericum humi stratum, Lugd.

Ruta sylvestris Dioscoridis, Johanni Placæ, quæ à Ruellio inter notha rejecta.

VII. Hypericum supinum tomentosum minus, vel Monspelicum.

Hypericum supinum, Dod.

Hyperici

Hypericum alterum tomentosum, Ad.  
Hypericum tomentosum, Lob. Lugd. Tab. Ger.  
Hypericum tomentosum secundum, Clus. hist.  
Androsæmon album Dalechampij, Lugd.  
Lobelius cum priore idem dicit: at Clusius  
negat idem esse.

*Hypericum Ascyron dictum.*

I. Ascyrum supinum villosum palustre.  
Ascyrum supinum *Androtus*, Clus. histor. ap. alt.  
austario.

II. Ascyrum, sive Hypericum bifolium gla-  
brum non perforatum.  
Hypericum in dumetis nascens primum, Trag.  
Ascyrum, Matth. ep.  
Androsæmon, Matth. fol. Fuch. Tur. Lac. Cord.  
in Diosc. Cast. Ges. col. (& Ascyroides) Cast.  
Hypericum aliud, Dod. gal.  
Androsæmon Campoclaresense, Col.

III. Ascyrum magno flore: in Prod. descri-  
bitur.

IV. Androsæmon hirsutum.  
Hypericum in dumetis nascens 2. Trag.  
Androsæmon, Matth. ep.  
Ascyrum, Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac. Ges. col.  
Dod. Ad. Lob. Lugd. Cast. Thal. Cam. Cæf.  
Hypericum, Dod. gal.  
Androsæmon alterum hirsutum, Col.

V. Androsæmon alterum folijs Hyperich,  
quod aliquibus Hypericoides.  
Androsæmon magnum, Ad.  
Androsæmon, Lob.  
Ruta sylv. Hypericoides, Dod.

VI. Androsæmon perforiatum & perforatum,  
Androsæmon alterum Apulum, Col.

VII. Androsæmon maximum frutescens.  
Androsæmon, Dod. ur: Ges. hort. Lugd. Cæf.  
majus, Cam.

Androsæmon aliud, Lugd.  
Clymenum, Ang. Ges. hort. Cast. ico.  
Clymenum Italorum, Ad. Lob. Ger.  
Siciliana, Ges. hort. Col. Eysf.

Herba Siciliana, Tab.  
Androsæmon Diosc. Galeni & Plin. & Cente-  
ria Theophrasti, Cæsalpino.  
Clymenon Plinij l. 25. c. 7. Anguillare, quod po-  
tius Periclymenum Dioscoridis est.

VIII. Androsæmon foetidum, capitulis lon-  
gissimis filamentis donatis.  
Tragium Creticum, Bellon.  
Tragium, Belli ep. 3. ad Clus. legitimum, Ponæ.  
Androsæmon minus, Cam.  
Ascyrum legitimum, vulgo *ayidaga*, Belli ep. 1.  
ad Clusium.

Androsæmon foetidum seu tragodes, Eysf.

## C O R I S.

**K**oræ quod aliqui Hypericum vocant, Dioscoridi l. 3. c. 174. frutex est folio Erica. Et Plinius l. 26. c. 3. et  
aliud Hypericum, quod alij Corin appellant, folio caryophylli.

I. Coris lutea.  
Coris, Matth. Ges. hort. Lac. Lob. Lon. Cæf.  
Lugd. Cast. Cam. Tab.  
Coris Matthioli, Ad.  
Coris legitima Erica similis, Belli ep. 1. ad Clus.

Coris legitima Dioscoridis, Ponæ.  
II. Coris cærulea maritima.  
Coris Monspelica, Ad. Lob. Cam. Tab.  
Coris quorundam, Clus. hisp. & hist.  
Flore est cæruleo, rarissime rubro.

## S Y M P H Y T U M P E T R Æ U M.

**Σ**υμφύτον πετράων in petris nascitur, ramulis Origano similibus, folijs Thymi, &c. Dioscoridi lib. 4. c. 1.  
Alum nos vocamus, Græci Symphytum petræum: nascitur in petru, ideo petræum cognominatum, &c.  
Plinius lib. 27. cap. 6.

Symphytum petræum folijs Thymi.  
Symphytum petræum, Mac. Lac. Lon. Lug. Tab.  
Symphytum petræum Matthiolo creditur, Ad.  
Symphytum petræum Matthioli, ad Coridem.

Gallicam plurimum accedere videtur, Cl. hist.  
Hoc ex agro Goritensi, ubi & Matthiolus no-  
tavit, à Doct. Agerio accepimus: quod a Coride  
Monspelica diversum est.

## P O L Y G O N U M.

**Π**όλγωνος Dioscoridi l. 4. c. 4. a copioso geniculu, quibus caules cinguntur, dictum. Plinius l. 27. c. 12. Poly-  
gonon Græci vocant, quod nos sanguinariam.

Genera duo Dioscoridi, mas & femina, de qua inter Equiseti species: mas, à seminibus sub singulis folijs erigescitibus, flos ei candidus, aut puniceus. Plinium l.c. qui plura genera Polygoni faciunt, hanc marem intelligi volunt, appellariq, à multitudine seminis, aut densitate fruticu Calligonon. Alij Polygonaton, à frequentia geniculorum, &c. ubi quatuor genera recensentur: primum est Polygonum vulgare: alterum Herniaria: tertium Polygonum femina Dioscoridi: quartum quibusdam Casia lignea Monspeliensium videtur: sed rectius tribuitur ei planta, quam Polygoni nomine Clusius proposuit.

*Polygonum majus.*

**I. Polygonum latifolium.**

Herba proserpinaca (à serpendo) Apulejo.

Centumnodia, Brunf.

Polygonon, sive Polygonaton & Corrigiola, Eric. Cord.

Polygonum masculum, Trag. Lac.

Polygonum mas, Matt. Fuch. Dod. ut: Ang Cor.

in Diof. & Sanguinalis mascula à cohibendo

sanguine) Ges. hor. Cæs. Thal. Lugd. Cast.

Polygonum primum, Tur. vulgare, Cam.

Polygonum mas vulgare (Sanguinaria, Centumnodia) Ad. Lob. Ger.

Polygonum majus, Lon. Tab.

Aliud flore est candido, aliud ex purpura candicante, vel rubente.

**II. Polygonum oblongo angusto folio.**

Polygonum tertium, Tab.

**III. Polygonum brevi angustoque folio.**

Polygonum secundum, Tab.

Polygonum mas minus, Ger.

an Polygonum masculum fruticosum, Thal.

**IV. Polygonum saxatile: quod primum in Prodomo.**

**V. Polygonum maritimum latifolium.**

Polygonum marinum maximum, Ad. Lob. ico.

Polygonum marinum, Lob. ob. Cam. ep. & hor.

Polygonum marinum prius Dalechampi, Lugd.

Polygonum tertium in matitibus, Cæs.

Floresculis est purpurascens, est & albis.

**VI. Polygonum maritimum angustifolium.**

Polygonum marinum alterum Dalech. Lugd.

*Polygonum minus.*

**I. Polygonum cocciferum: & Cam. ep.**

Radices coccum adnascitur elegantissimo colore commendatum.

**II. Polygonum angustissimo & acuto vel gramineo folio minus repens.**

Polygonum, Germanis Knavel/ Trag.

Polygonon 3. Dod. gal. exiguum, Eid. fol.

Saxifraga Anglica, Ad. Lob. ico. Lugd.

Polygonum minus seu femina, Lon.

Polycarpon à seminis copia, Lugd.

Polygonum minus polycarpon, Tab.

Polygonum selinoides sive Knavvel, Ger.

Varietas magna in hac planta observatur.

**III. Polygonum gramineo folio majus erectum.**

Polygonum minus alterum, Tab.

Anthyllis Valentina Clusij, Ger. ico.

**IV. Polygonum angustissimo folio affinis.**

Hemorrhoidalis, quæ ad Caryophylleorum syl.

classe referri debet, Clus. hist. ap. alt. ad l. 6.

Hemorrhoidalis Aldroandi nomine, quæ à san-

guine siltendo nomen habeat, ex Italia, circa Ra-

vennam natam (etiam ex Valesia) accepimus.

**V. Polygonum minus candicans.**

Polygonum montanum minimum niveum & sericeum, Ad. Lugd.

Polygonum montan. niveum minimum, Lob.,

Paronychia Hispanica, Clus. hisp. & hist.

Polygoni Hispanici genus, Lugd.

Polygonum montanum, Tab. Ger.

an Herba Turca montana, Cæs.

Variat ratione ætatis, nam adulta paleaceas membranas nivas habet, quemadmodum

Adv. & Lugdun. pingunt: planta novella non

item, sicut Clus. & Lob. proposuere: Sic in Bel-

gio nata multum de candore suo remittit.

**VI. Polygonum montanum vermiculatæ folijs.**

Vermiculata montana nova, Col.

**VII. Polygonum Creticum Thymi folio: quod 2. in Prodomo.**

**VIII. Polygonum littoreum minus floresculis spadiceo albicantibus: quod 3. in Prodomo.**

**IX. Polygonum minus tenuifolium: quod 4. in Prodomo.**

**X. Polygonum maritimum minus foliolis Serpilli.**

Polygonum alterum pusillo vermiculato Serpilli folio, Ad. Lob. ico.

Polygonum alterum Serpilli folio, Lugd.

**XI. Polygonum minus, seu Millegrana major.**

Empetrum, Trag. Lon.

Polygonum minus, Matth. Cast.



II. Sempervivum arborefcens alterum, Matth. Caft. Lugd. An diverfum à priore?

III. Sedum majus vulgare.

Aizoon magnum Diofcoridis, quoad poftrema Diofcoridis verba.

Sempervivum majus, Brunf Matth. Ger.

Umbilici Veneris fpecies altera, Ang.

Sedum majus, Fuch. Cord. in Diofc. (& Vitalis major) Lac. Tab. magnum, Tur.

Sedum feu Sempervivum vulgare majus, Gef. h.

Sempervivum primum, Lon. majus primum, Cæfalp.

Sempervivum majus, Dod. gal. Lob. Caft.

Sempervivum majus alterum five Jovis barba, Dodon.

Sempervivum, five Sedum majus crenatum Myrthifolium, Adv.

Aizoon majus, Lugd. Cam.

Cotyledon altera prima, five Sedum majus vulgare, Cluf. hift.

Sedum vulgare, Eyft.

IV. Sedum majus montanum dentatis folijs.

Cotyledon altera montana, Cluf. pan.

Cotyledon altera fecunda, Eid. hift.

Aizoon five Sempervivum majus, Thal.

V. Sedum majus montanum dentatis folijs alterum.

Cotyledon altera montana minor, Cluf. pan.

Cotyledonis alterius altera fpecies, Eid. hift.

VI. Sedum majus montanum folijs non dentatis, floribus rubentibus.

Cotyledon altera Taurica, Cluf. pan.

Cotyledon altera tertia, Eid. hift.

Sedum minus flore rubente, Eyft.

VII. Sedum Nicotianæ flore.

Sedum Malagafcaricum, Cluf. exot. quid?

*Sedum minus.*

I. Sedum minus teretifolium album.

Sempervivum minus album, Brunf.

Sempervivum fœmina, Eid.

Sedum minus primum, Trag. Cluf. hift. alterum, Gef. hort.

Sempervivum minus, Matth. Ang. Caft. Cæf.

Sedum minus, Lac. offic. Ger. minus fœmina, Fuch.

Sedum fœmina, Tur.

Crassula minor, Dod. gal.

Sempervivum quartum, Lon.

Tragus herba, Cord. in Diofc.

Vermicularis & Illecebra major, Ad. Lob. Lug.

Vermicularis flore albo, Cam.

Aizoon minus fœmina, Lugd.

Aizoi minoris fpecies, Thal.

Sedum minus hæmatodes fecundum, Tab.

II. Sedum minus teretifolium alterum.

Sempervivum tertium, Lon.

Aizoon minus Matthioli, Lugd.

Sedum medium teretifolium, Ad. Lob. ico.

Sempervivum parvum, Lob.

Sedum minus alterum, Cluf. hift.

III. Sedum minus teretifolium luteum

Sedi minoris 2. fpecies, Trag.

Sempervivum minus æstivum, Lob. Lugd.

Aizoon medium, Thal.

IV. Sedum minus folio circinato.

Aizoon dasyphyllum, id est denfifolium, Lugd.

Sedum minimum frigidum, Cluf. hift.

Sedum minus septimum, Cluf. hift.

V. Sedum minus luteum folio acuto.

Sedum minus, Turn. mas, Fuch. hæmatodes,

Tab. Ger.

Sempervivum minus, Dod. gal. primū, Eid. fol.

Aizoon hæmatoides, Lob. ico.

Aizoon minus, Lugd.

Sedum minus quintum, Cluf. hift.

VI. Sedum minus luteum ramulis reflexis.

Aizoon Scorpioides, Lob. ico.

Aizoon minus flore luteo inflexo, Cam.

Sedum minus quartum, vel Sedum minus Dio-

fcoridis primum, Cluf. hift.

VII. Sedum arvenfe flore rubente: quod 9.

in Prodomo.

VIII. Sempervivum minus vermiculatum

acre.

Aizoon tertium, Diofcoridis.

Portulaca tertia, Brunf.

Sedum minus tertium & Vermicularis, Trag.

Sempervivum minimum five 3. Matth. Caft.

Gramen 3. Plinij & Sempervivum 3. Ang.

Illecebra five Sempervivum 3. Dod. ut:

Sedi tertium genus, Fuch. Lac. Tur.

Aizoon minus, quod malè pro Vermiculari ac-

cipitur, Cord. in Diofc.

Aizoon acre, Cord. hift.

Sedum tertium Diofcoridis, Gef. hort.

Sempervivum tertium, defc. at 2. ico, Lon.

Sedum minimum, Illecebra, Sedi tertium ge-

nus non sempervirens, Adv.

Sempervivum minimum five Illecebra, Lob.

Sempervivum tertium minimum alterum, Cef.

Aizoon minus fervidi gustus, Thal.

Aizoon minimum repens, tertium Diosc. Lugd.

Sedum minimum, Tab.

Vermicularis sive Illecebra, Ger.

Sedum minus octavum causticum, Clus. hist.

Sedum minus seu minimum causticum, Eyst.

Aizoi facie planta quæ Daçtylon 2. vel 3. Col.

IX. Sempervivum minus vermiculatum insipidum.

Aizoon minimum, Cord. hist.

Sempervivum tertium minimum, Cæf.

Aizoon minus & Vermicularis insipida, Thal.

Sedum minus, seu Vermicularis insipida, Eyst.

A priori non solum gustu differt, sed etiam foliis magis teretibus & tenuibus: floribus est utraque luteis, rarius albis.

X. Sedum minus fruticosum.

Sedum minimum arborefcens vermiculatum, Lob. Lugd.

an Polygonum masculum fruticosum, Thal.

XI. Sedum minus fruticosum alterum.

Vermiculatæ fruticis varietas major, Lob.

Vermiculatus frutex major, Lugd.

Cassia lignea similis frutex tertius, Cæf.

An fir Chamæpitys altera Diosc. dubitant, Lob. & Lugd. hist. Selaginem Plinij Cæsalp. suspicatur, & quibusdam Sempervivum maritimum, aut Vermiculariam arborefcentem dici.

XII. Sedum Portlandicum, Ad. Lob. ico. quid?

*Sedum saxatile & alpinum.*

I. Sedum alpinum Saxifragæ albæ flore, vel grandiflorum.

Sedum minimum tertium, Lob. Lugd.

Sedum ferratum, Dod. quoad ico.

an Sedum alpinum quartum, Col. part. 2.

II. Sedum alpinum album foliolis compactis.

Sedi aut Phylli genus flosculis albis, Gesn. fra.

Sedum alpinum tertium, Clus. pan.

Sedum minus nonum, sive alpinum tertium, Eid. hist.

III. Sedum alpinum hirsutum lacteo flore.

Sedum alpinum quartum, Clus. pan.

Sedum minus decimum, sive alpinum quartum, Eid. hist.

J. sine montana, Lugd.

IV. Sedum alpinum gramineo folio lacteo fl.

Sedum alpinum quintum, Clus. pan.

Sedum minus undecimum, alpinum 5. Eid. hist.

V. Sedum alpinum flore pallido.

Sedum alpinum primum, Clus. pan.

Sedum minus sextum, sive alpinum primum, Eid. hist.

VI. Sedum alpinum augustissimo folio, flore carneo.

Sedum alpinum secundum, Col. part. 2.

VII. Sedum alpinum exiguis folijs.

Sedum alpinum primum, Col. part. 2.

VIII. Sedum saxatile hirsutum purpureum: quod 5. in Prodomo.

IX. Sedum saxatile atrorubentibus floribus: quod 6. in Prodomo.

X. Sedum saxatile variegato flore: quod 7. in Prodomo.

XI. Sedum alpinum hirsutum luteum.

Sedum saxatile folijs margine piloso, Gesn. hor.

Phyllon thelygonon, Dalech. in Diosc.

Phyllon arrhenogonon Dalechampi, Lugd.

Sedum petraeum montanum, Ad. Lob. ico.

Sedum alpinum sextum, Clus. pan.

Sedum minus duodecimum, alpinum 6. Cl. hist.

Leucoion luteum aizoides montanum, Col. p. 2.

XII. Sedum alpinum folijs crenatis asperis: quod 8. in Prodomo.

an Sedum cujus folia marginibus asperis brachiis piscium referunt, Gesn. hort. (lofis.

XIII. Sedum alpinum floribus luteis maculis minoris genus flosculis luteis vel croceis maculosis, Gesn. fra.

XIV. Sedum alpinum rubro magno flore.

Aizoon montanum, Lugd.

XV. Sedum montanum tomentosum.

Sempervivum rubrum montanum *γυμναλίδες*, Colum.

XVI. Sedum alpinum ericoides purpurefcens: quod 3. in Prodomo.

XVII. Sedum alpinum ericoides caeruleum: quod 4. in Prodomo.

*Sedum folijs laciniatis.*

I. Sedum alpinum trifido folio.

Sedum septimum, vel alpinum Ajugæ folio, Clus. pan.

Sedum minus decimum tertium, Eid. hist.

II. Sedum tridactylites alpinum majus album.

Alfine tridactylites alpina, in Phytop.

Saxifraga alba petraea, Ponæ. (teum.

III. Sedum tridactylites alpinum pallidè luteum.

IV. Sedum tridactylites alpinum caule foliofo: hæc tria in Prodomo sub Sedo 1. describuntur.

V. Sedum tridactylites alpinum minus: quod 2. in Prodomo.



Sedo alpino tertio similis altera, Colum. part. 2.

VI. Sedum tridactylites testorum.

Händeltraut/ Trag.

Paronychia altera, Dod. rutaceo folio, Adv.

Lob. Lugd. Ger.

Umbilici species quibusdam. Cæf.

Dactyliobotanion alterum, Thal.

Alpine petra rubra, & Paronychia tertia, Tabern.

Paronychia laciniata, Ger.

*Sedum palustre.*

I. Sedum palustre subhirsutum purpureum.

Sedi minoris quarta species, Trag.

Sedum palustre secundum, Clus. pan.

Sedum minus tertium, sive palustre, Eid. hist.

Aizoon palustre, Cam.

Sedum palustre flore incarnato, Eyf.

Hujus species est altera major & candidior:

altera minor & rubicundior, seu mas & foemina: flos purpurascens aut carnei coloris.

## COTYLEDON SEU UMBILICUS VENERIS.

**K** *Κοτυλίδιον* Dioscorides lib. 4. cap. 92. Sedo subjungit, quod ipsi & σκντάλιον & νυμβάλιον dicitur: quod a figura folij Acerabulo simili nomen accepit: hinc Latini, *Acerabulum* & *Umbilicus Veneris*. Plinio lib. 25. cap. 13. *Cotyledon*.

Genera duo sunt *Dioscoridi*: alterum folio acerabuli instar orbiculato & concavo, ita tamen ut cavum id aciem prope fugiat: alterum latioribus folijs, issijs, pinguibus, ac cen lingulis referentibus, densis & confertis circa radicem, & velut oculum in medio constituentibus, &c. Et Plinio, alterum folio est pingui & concavo, ut coxendices: aliud sordidum folijs, latioribus, densioribusq; circa radicem, velut oculum cingentibus, &c.

I. *Cotyledon major.*

Umbilicus Veneris, Matth. Lac. Tur. Lob. ico.

Cæf. Cast. Lugd. Tab. Ger. major, Lon.

Umbilici Veneris species prima, Ang.

*Cotyledon*, Dod. ur: Ad. Lob.

*Cotyledon* sive *Umbilicus Veneris*, Clus. hisp. & hist.

II. *Cotyledon media folijs subrotundis.*

Umbilicus Veneris alter, Matth. Lac.

*Cotyledon* altera, Dod. ur: Clus. pan. Lugd.

*Cotyledon* altera quarta, Clus. hist.

*Phylum thelegonum* Dalechampij, Lugd. sive

*Lichen primum* Plinij & *sempervivum montanum*.

III. *Cotyledon media folijs oblongis serratis.*

*Ochletum* Hippocratis, Ang.

*Aizoon* serratum, Cord. hist. Thal. cui &

*Crassula serrata*.

*Cotyledon* minus sedi folio, Ad. Lob.

Umbilicus Veneris, Lob. ico. minor, Lon. Tab. Ger.

*Phyllon primum*, Cæf.

*Palmaria*, Tabern. talis antequam caulem producat.

*Cotyledon* minus, Eyf.

IV. *Cotyledon media subhirsuta floribus punctatis.*

*Sedum* folijs minoribus albicantibus serratis, Gesn. hort.

*Cotyledon* minus montanum alterum, Lob. ico.

*Cotyledon* altera Etscheriana, Clus. pan.

*Cotyledon* altera quinta, Clus. hist.

V. *Cotyledon minor folijs subrotundis serratis: in Prodromo describitur.*

VI. *Cotyledon stellata.*

*Aizoon peregrinum*, Cam.

*Sempervivum* tertium, Col.

## A L O E

**A** *Ἄλν* Græci, Latini & officina pariter, *Aloë* tum herbam ipsam, tum & ejus succum densatum appellant, dicitur & *στῆρς Ἀλφιδιον* quod non modo in terra, sed & extra eam vivat. *Aloë* autem dicta videtur, quia maritimu gaudet. A recentioribus *Sempervivum* & *Sempervivum marinum*, quod *Sempervivi* modo diu duret, appellatur: *Sedum* amarum Columella: & quia ejus succus amarus est, idcirco & *Genetianam*, que amarissima est, *Aloë* Gallicam *Apulejus* nominavit. De *Aloë* Dioscorides lib. 3. cap. 25. quod folium habeat Scilla similitudine, crassum, pingue, in turgentia modice latum, retrorsum pandum: utrinque spinulos rati & brevibus, &c. & Plinius lib. 27. cap. 4.

Nn 3

I. Aloë

## I. Aloë vulgaris.

Aloë, Trag. Matth. Fuch. Ang. Dod. ut: Cord.  
Lac. Tur. Gefn. hort. Lon. Rannvolff. (quæ in  
Rama Judeæ copiosa) Ad. Lob. Cæf. Caft. Garz.  
Cluf. hift. Eyst.

Aloë communis, Cam.

Aloë Dioscoridis, Col.

Aloë in infula Socotra, part. 2. Ind. Or. c. 6.

Aloë five Sempervivum, Arab. Sebar, Area, Catecomor, Linc. part. 4. Ind. Or. c. 38. & fig. 19.

Azauar five Sempervivum, quo campi pleni,  
part. 4. Ind. Or.

II. Aloë folio in oblongum aculeum abeunte.

Aloë Americana, Dod. Cluf. hisp. & hift. Caft. Cam. Lugd. Tab. Eyst.

Aloë in Pisano vireto, Ad.

Aloë folio mucronato, Lob. Ger.

Aloë, Acoftæ.

Aloë alterum genus, Cæf.

Allagacy Indis, Fil y agulla, id est filum & acus  
Hispanis, cujus spinæ venenatæ, Frag.

Aloë spinosa five Americana, Cam.

America planta Aloës facie, Col.

Manguey Mexiocanum, alio nomine Metf, Linc. part. 4. Ind. Or. fig. 19.

Manguey arbor, ex qua parantur aquæ, vina, oleum, acetum, mel, fyrupi, fila, acus, & res aliæ infinitæ, in nova Hispania, quarum plerumque unam domibus suis, ad vitæ sustentationem confitam, colunt, &c. part. 9. Ind. Or. lib. 4. cap. 23.

Ex folijs succus dulcis elicitor: & iisdem contufis & maceratis linum extrahitur, ex quo Indi lintea candidissima texunt.

III. Aloë monstrofa Avinonia nata: de qua in Prodomo, & ad Cluf. cur. post.

IV. Aloë palustris.

Stratiotes potamios, Dod. gal.

Planta folijs Aloës, quæ Stratiotes non est, Anguil.

Sedum aquatile, Dod. fol.

Stratiotes five Militaris aizoides, Ad. Lob.

Stratiotes aquatica, Lugd.



## S E C T I O S E X T A.

RADIX RHODIA; TELEPHIUM; SCORPIOIDES;

PORTULACA; CEPÆA; CRITHMUM; KALI; TRA-

gum; Tithymalus; Pityusa five Efula; Apios five Tithyma-

lus tuberosus; Peplus five Efula rotunda; Pe-

plis; Chamæsyce; Lathyrus;

Hipophæa.

## R A D I X R H O D I A.

**P** *rhodia* g<sup>ra</sup>ta Dioscoridi libr. 4. caput. 45. sic dicta, quod contrita rosas redeat: hinc quibusdam *Rosea radix*.

Rhodia radix, Trag. Matth. Ang. Dod. ut: Rhodia five rosea radix, Fuch Adv. Lob.

Cord. hift. Gefn. hort. Lac. Cluf. pan. & hiftor. Rosea radix, Lon. Tab.

Lugd. Caft. Cam. Ger.

(est.

Flos nūc pallefcētis, nunc rubescētis coloris

## T E L E P H I U M.

**T** *elephium* Dioscoridi lib. 2. cap. 217. *Portulaca* simile, alas binas in singulis foliorum geniculū habens, folijs caruleis crassis, lenius atque carnosius refertum, flore luteo aut candido, &c. Et Plinio lib. 27. cap. 13. *Telephion* & caule & folijs *Portulaca* simile. Sic dictum volunt, quod ulceribus malignis ac deploratis, quibus *Telephus* Mysia rex ab Achille vulneratus consensit, (qua eam ob rem etiam *Telephia* vocantur) auxilietur. Vulgo *Pabaria*, à foliorum cum *fabâ* similitudine: officinū *Crassula* major. Verum *Coryledon* alterius descriptio *Fabaria* potius quàm *Telephia* convenire, *Casalpino* videtur: & sanè *Telephium* Dioscoridū non esse, cum ad folia alæ non sint, censemus.

I. Tele-



folijs oleæ, sed minoribus multò, verum pluribus & teneris: canaliculis rubicundis, frequentibus, in terram inclinatis, &c. At Theophrastus ἡ ἀράχου herbam 1. caus. plant. 10. & 4. ejusdem 3. exhibet: dein ἡ ἀράχου arborem 1. hist. 8. & 15. 4. hist. 4. Portulacam Galæ reddidit. Verum Plinius lib. 6. cap. 20. scribit, Portulacam quam Peplion vocant, non multum sativæ efficaciorē esse: ubi Portulacamque Peplion herbam diversissimam confundit: causa erroris quod aliqui Peplion, portulacam agrestem vocarint: confundit quin etiam vires sylvestris cum sativæ Portulacæ viribus.

### I. Portulaca latifolia, seu sativa.

Portulaca hortenſis, Brunf. def. Trag. Fuch. Dodon. gal.

Portulaca domestica, Matth. Ad. Lob. Cast. Taber. Ger.

Portulaca, Tur. Cord. in Diosc. Lon. sativa, Ang. (γλυφίδα in Græcia) Cord. hist. Dod. gal. Lugd. Eyftert.

Portulaca major, Cam. hortenſis, Gef. hort.

Portulaca latioribus folijs, Cæf.

### II. Portulaca angustifolia sive sylvestris.

Portulaca sylvestris, Trag. Matth. Ang. Fuch.

Dod. ut: Ad. Lob. Lugd. Cast. Ger.

Portulaca, Lac. arvenſis, Tab.

Portulaca sponte nascens, Cord. hist.

Portulaca minor, Gef. hort. Cam.

Portulaca angustioribus folijs, Cæf.

Cepæa, Cord. in Diosc. Lon. defc.

### III. Portulaca arvenſis.

Portulaca exigua, Cam.

### IV. Portulaca aquatica, Thalij, quid?

### V. Portulaca marina, Tab. Ger. quid?

## C E P Æ A.

Κηπόα Dioscoridi lib. 3. cap. 168. Portulaca similis est.

Cepæa, Matth. Ang. Lac. Lon. ico. Ad. Lob. Matthiol. Cast. Cæf. Tab. Clus. hist.

Floſculis est albis, ex purpureo candicantibus, vel luteis.

## C R I T H M U M.

**K**ridum sive κριθάρον Dioscoridi lib. 2. cap. 157. folijs pinguibus, albicantibus, portulacam referentibus, sed crassioribus, longioribus, salsoꝝ gustu, floribus candidis, &c. in muria servatur, cruda & cocta eduntur. Plinius lib. 21. cap. 15. Batia appellasse videtur, Batia marinam, & Batia bortenſianam, quam aliqui asparagum Gallicum vocant, sine ulla notis proponens: Batia etiam lib. 21. cap. 27. meminit, quæ alium moliat, nec plura habet.

I. Crithmum, sive Fœniculum maritimum majus, odore Apij.

Baticulæ alterum genus ex Sicilia, Cæf.

II. Crithmum, sive Fœniculum maritimum minus.

Crithmum primum, Matth.

Crithmum, Ang. (& herba S. Petri) Dodon. gal. Cord. in Diosc. Lac. Tur. Lugd. Cast. Tab.

Crithmus, vulgo Creta seu Salsa marina, Gef. ap.

Crethamum marinum, Cord. hist.

Crithmum marinum, Gef. hor. Dod. Ger.

Fœniculum marinum, videtur verum Empe- tron, Rond. cap. de mem. læsa.

Fœniculum marinum, sive Empetrum, Ad. aut Calcifraga, Lob.

Batis, Gef. hort.

Baticula quasi parva Batis, Cæf.

Creta marina, Lon.

III. Crithmum maritim. flore Asteris Attici.

Crithmum tertium, Matth. Lugd. Cam.

an Anthillis major, Cord. ob. sylv.

Anthillis prima, Dioscoridis, Cæf.

Crithmum Chrysanthemum, Dod. (Aster Atticus marinus quibusdam) Lugd. Tab. Ger.

Chrysanthemum littoreum, Ad. Lob.

### IV. Crithmum maritimum spinosum.

Crithmum secundum, Matth. Cast.

Secacul, Ang.

Crithmum spinosum, Dod. Tab. Ger.

Crithmum (syl. Eryngium folijs Apij Plinij, Cæf.

Pastinaca marina, Ad. Lob. Lugd.

Tribulus marinus quorundam, Lugd.

Cachry marinum, Cam.

Corymbi alij colore candido, alij subrubente, aut violaceo: in hortis cultum, lætius ac minus spinosum redditur.

## K A L I.

**K**ali Mauritanorum. aliqui ad Anthillidem alterum Dioscoridis: alij ad ejusdem Tragon (cum tamen sapore non sit acerbo, nec acinis coustes) referunt. Plinius lib. 8. cap. 22. ad Halymum retulisse videtur, dum inquit, alij olum maritimum falsum, & inde nomen, &c.

I. Kali majus cochleato semine.

Kali, Matth. (qui & hoc & Salicorniam unâ figurâ expressit) Dod. Cast.

Kali magnum, Sedi medijs folijs semine cochleato, Ad.

Kali magnum, Lob. Lugd. & Kali Dalechamp. Soda, Lob. ico.

Kali cocheatum majus, Cam.

Anthillis altera falsa, Cam.

Salsolæ genus in hortis, Isgarum vulgo, Cæs.

II. Kali minus album semine splendente.

Anthillis altera, Borda quibusdam, Dod. gal. Lugdun.

Alkali minus, Ges. hort.

Kali album, Dod.

Kali minus, Ad. Lob. ico. Lugd. Eyst.

Kali alterum seu minus, Cam.

Salsola quædam in maritimis, Cæs.

III. Kali minus alterum.

Kali parvum folijs oblongis, Cam.

Anthilloides, Thal.

Est majus & minus.

Huc referri debent,

Anthillis minor tertia, quinta & sexta, apud Cord. in obs. sylv.

IV. Kali minus villosum: quod primum in Prodromo.

V. Kali gramineo folio: quod 2. in Prod.

Salsolæ congener semine Polygoni, Cæs.

VI. Kali Arabum primum genus, Rauvolf. Lugd. ap.

VII. Kali Crassulæ minoris folijs.

Kalli 2. species, Anthillis quibusdam, Alp.

Kali floridum repens, Aizoides Neapolitanum, Col. part. 2.

VIII. Kali Ægyptiacum folijs valde longis hirsutis.

Kalli tertia species, Alp.

IX. Kali geniculatum majus.

Kali, Matthiol. Ang. geniculatum, Lugd. Cam. Tabern.

Salicornia, Dod. ut: Lugd.

Anthillis constans veluti tritici granis, Cord. ob. sylv.

Alkali, Gesn. hort. Lon.

Kali geniculatum vermiculatum, Ad.

Kali live Sedum marinum, Lemnio.

Kali tertium, Cam. ep.

Kalli primum, Kellu Ægyptijs, Alp.

Salsolæ genus aliud, Cæs.

Differentiæ duæ, unum simplicius & brevius, dodrantali altitudine, rectum & annuum: alterum multis ramulis fruticis, lignosum & grandius, perpetuum. Habetur & rubrum & viride.

X. Kali geniculatum alterum, vel minus.

Kali Arabum 2. genus, Rauvolf. Lugd. ap.

## T R A G U M.

**T**ragi & sine Theophr. aut Τράγαν & à Dioscoride l. 4. c. 51. & à Plinio l. 28. c. 13. Tragi & Scorpij nomine proponitur. folijs careere scribunt: & l. 22. c. 15. Scorpij alter.

I. Kali spinosum cochleatum.

Drypis Theophr. Tab.

Kali live Alkali, Dod. belg.

an Hippophæston Dalechampij, Lugd.

Sunt qui Tragos esse velint.

II. Kali spinoso affinis.

Tragum, Matth. Lac. Cast. def. Lon. Tab.

Tragus & Kali secundum genus, Dod. gal.

Tragon non est sed Drypis, Guil.

Tragon improbus, Matth. Ad.

Tragon Matthioli, Lob. Lugd. Ger.

an Tragos, Cæs.

Cum Dioscorides Trago folia non tribuat, idcirco videntur Matthiolus & Tabernæmontanus sine folijs pinxisse: at Lobelius & ex eo Lugdunenſis historia, folia adpinxere, & quidem recte, ut in Lio Venetorum observavimus. Non defunt qui utramq; hic propositam plantam eandem faciant, & forſan non ita male: quàmvis posterior longioribus & latioribus sit folijs.





V. *Tithymalus myrsinites* fructu verrucosus.  
 Efula multicaulis & quarta, Trag.  
*Tithymalus helioscopius*, Dodonæi in ico. & Lugd.  
*Tithymalus verrucosus* Dalechampi Lugd.  
 Alypum Guilandinus vocare solebat.

*Tithymalus maritimus.*

I. *Tithymalus maritimus*.  
*Tithymalus paralius*, Matth. Ang. Dod. ut: Lac. Geln. hort. Ad. Clus. hisp. Lob. Lon. Cast. Lugd. quatuor figuras habet, Cam. Tab.  
*Tithymalus maritimus*, Cæf.  
 Variat, is qui in maritimis natus, ab horten-  
 sis, hinc duæ figuræ apud Dodonæum, ejus qui in maritimis & ejus qui in hortis crescit.

II. *Tithymalus maritimo affinis linearis* folio.  
 Efula altera in humidis, Cæf.  
*Tithymalus linifolius*, Cam.  
*Tithymalus amygdaloides angustifolius*, Tab.  
 Hic antequam floreat, à *Linaria* solo lacteo succo distinguitur.

III. *Tithymalus maritimus spinosus*.  
 Glastivida altera, Belli ep. 4. ad Clus.  
 Glastivida 1. Cretica, Ponæ Bald. Ital.

IV. *Tithymalus maritimus purpurascens* floribus.  
 Efula rara è Lio Venetorum infula, Adv. Lob. Lugd.

an Alypum, Ang.  
 Cum Esulis nihil præter lac commune habet;  
 Pityusæ species Venetis, alijs Turbith nigrum.

*Tithymalus latifolius.*

I. *Tithymalus latifolius Hispanicus*.  
*Tithymalus platyphyllos*, Clus. hisp. & hist. Dod. Lugd.  
*Platyphyllum Hispanicum*, Lob.  
*Tithymalus latifolius*, Cæsalp. Hispanicus, Tabern.

II. *Tithymalus arvensis latifolius Germanicus*.  
*Tithymalus platyphyllos*, Fuch. Tur. Lon.  
 Pityusa major, Dod. Gal. ico. Thal.

Pityusa sive Esula minor, Dodonæi, Lugd.

Major est, & minor, & hæc folijs leviter hirsutis.

*Tithymalus helioscopius.*

*Tithymalus helioscopius*.  
 Efula, Brunf. vulgaris & tertia, Trag.  
*Tithymalus helioscopius*, Matth. Ang. Fuch. Dod. ut: Cord. in Diof. Tur. Geln. hort. Lac. Lon. Adv. Lob. Cæf. Lugd. cum icon. Matth. & Dod. Thal. Cam. Tab.

*Tithymalus dendroides*, Dod. in ico. Thal.

Alia est folijs crenatis, sed non usque ad caulem: alia non crenatis & rotundioribus: caule leviter hirsuto.

*Tithymalus cyparissias.*

I. *Tithymalus cyparissias* folijs punctis croceis notatis.

Efula scabiosa, Geln. col.

*Tithymalus cyparissias*, Thal.

*Tithymalus arvensis*, Cam.

Duplex est, major & minor.

II. *Tithymalus cyparissias*.

*Tithymalus cyparissias*, Matthioli. Fuch. Ang. Dod. ut: (& Pityusa minor) Tur. Lac. Geln. hort. Lon. Ad. Lob. ob. Cast. Thal. Lugd. (qui Matthioli & Dodonæi figuram habet) Tabern. Cam.

*Tithymalus cupressinus*, sive humi pinus, Lobel. icon.

Efula officinarum, Cæf.

Variat: 1. folijs lini virentibus, comâ flavâ, aliquando subrubente: 2. in montibus candidior, foliolis angustis, Efula candidior, Cæsalpino: 3. vix palmam altus, capitulo rubente.

III. *Tithymalus sive Esula exigua*.

Efula exigua, Trag. Lob. minima, Lugd.

*Tithymalus leptophyllos*, Matthioli. Lugdun. Cam. Thal.

*Tithymalus minimus*, Tab.

*Papaver spumecum*, Geln. hort.

*Peplis minor* Dalechampi, Lugd.

I V. *Tithymalus sive Esula exigua* folijs obtusis: 2 loco in Prodomo describitur.

V. *Tithymalus exiguus saxatilis*: 3 in Prod

PITYUSA SIVE ESULA.

**I**n *Pityusa*, & *Cyparissia* *Tithymalus* specie differre existimatur, ideoque etiam in *Tithymali* genere commemoratur: caule est cubito altiore, geniculato, foliis acutis & tenuibus: pini folia imitantibus: flori

[illegible]

I. *Tithymalus folijs pini*, (forte *Dioscoridis*)  
Pityusa.

*Efula vulgaris* major & quinta, Trag.

Piryufa Etula vulgo dicta, Gesn. hort.

Pityusa five pinea, Esula minus offic.

*Tithymalus pinea*, Eld.ico. (ob.)

Elula minor, Dod. Lugd.

*Elula major*, Cæl.  
*Takumelua*, Cæl. (Fruse 7th)

11. *Tichomyia palustris* fruticosa

*Efula major* & *secunda* Trag.

*Pityusa major*. Dod. gal. de f. Cord. in

*Pityusa grandis*, Thal.

*Efula major*, Dod. Lugd.

*Esula major Germanica, Ad. Lob. Lug*

ADIOS SIVE TIT

APPROXIMATELY

*Tithymalus palustris*. Cæf

*Tithymalus fruticosus* Germano ex. p. affinis

an *Tithymalus maximus*, Fab.

111. *Tithymalus montanus* (Hoy) and

*Efula dulcis* (vel 7) Frag Geln.hort. Lou 2001

ob. Lund.

Erinocognata herba, Geln.lio. 2. A.

*Pityula* li e *Etula minor* al cial 10% d'ell'otto  
Feb. 1904

Flores colore variat est viridis est

IV. *Tithymalus ucaeus bifurcus*

Prodromo.

an Pityufa Anglicana, Cam.

V. *Tithymalus folijs brevibus aculeatis*

APIOS SIVE TITHYMALUS TUBEROSUS.

**A** <sup>7</sup> <sup>8</sup> <sup>9</sup> <sup>10</sup> <sup>11</sup> <sup>12</sup> <sup>13</sup> <sup>14</sup> <sup>15</sup> <sup>16</sup> <sup>17</sup> <sup>18</sup> <sup>19</sup> <sup>20</sup> <sup>21</sup> <sup>22</sup> <sup>23</sup> <sup>24</sup> <sup>25</sup> <sup>26</sup> <sup>27</sup> <sup>28</sup> <sup>29</sup> <sup>30</sup> <sup>31</sup> <sup>32</sup> <sup>33</sup> <sup>34</sup> <sup>35</sup> <sup>36</sup> <sup>37</sup> <sup>38</sup> <sup>39</sup> <sup>40</sup> <sup>41</sup> <sup>42</sup> <sup>43</sup> <sup>44</sup> <sup>45</sup> <sup>46</sup> <sup>47</sup> <sup>48</sup> <sup>49</sup> <sup>50</sup> <sup>51</sup> <sup>52</sup> <sup>53</sup> <sup>54</sup> <sup>55</sup> <sup>56</sup> <sup>57</sup> <sup>58</sup> <sup>59</sup> <sup>60</sup> <sup>61</sup> <sup>62</sup> <sup>63</sup> <sup>64</sup> <sup>65</sup> <sup>66</sup> <sup>67</sup> <sup>68</sup> <sup>69</sup> <sup>70</sup> <sup>71</sup> <sup>72</sup> <sup>73</sup> <sup>74</sup> <sup>75</sup> <sup>76</sup> <sup>77</sup> <sup>78</sup> <sup>79</sup> <sup>80</sup> <sup>81</sup> <sup>82</sup> <sup>83</sup> <sup>84</sup> <sup>85</sup> <sup>86</sup> <sup>87</sup> <sup>88</sup> <sup>89</sup> <sup>90</sup> <sup>91</sup> <sup>92</sup> <sup>93</sup> <sup>94</sup> <sup>95</sup> <sup>96</sup> <sup>97</sup> <sup>98</sup> <sup>99</sup> <sup>100</sup> <sup>101</sup> <sup>102</sup> <sup>103</sup> <sup>104</sup> <sup>105</sup> <sup>106</sup> <sup>107</sup> <sup>108</sup> <sup>109</sup> <sup>110</sup> <sup>111</sup> <sup>112</sup> <sup>113</sup> <sup>114</sup> <sup>115</sup> <sup>116</sup> <sup>117</sup> <sup>118</sup> <sup>119</sup> <sup>120</sup> <sup>121</sup> <sup>122</sup> <sup>123</sup> <sup>124</sup> <sup>125</sup> <sup>126</sup> <sup>127</sup> <sup>128</sup> <sup>129</sup> <sup>130</sup> <sup>131</sup> <sup>132</sup> <sup>133</sup> <sup>134</sup> <sup>135</sup> <sup>136</sup> <sup>137</sup> <sup>138</sup> <sup>139</sup> <sup>140</sup> <sup>141</sup> <sup>142</sup> <sup>143</sup> <sup>144</sup> <sup>145</sup> <sup>146</sup> <sup>147</sup> <sup>148</sup> <sup>149</sup> <sup>150</sup> <sup>151</sup> <sup>152</sup> <sup>153</sup> <sup>154</sup> <sup>155</sup> <sup>156</sup> <sup>157</sup> <sup>158</sup> <sup>159</sup> <sup>160</sup> <sup>161</sup> <sup>162</sup> <sup>163</sup> <sup>164</sup> <sup>165</sup> <sup>166</sup> <sup>167</sup> <sup>168</sup> <sup>169</sup> <sup>170</sup> <sup>171</sup> <sup>172</sup> <sup>173</sup> <sup>174</sup> <sup>175</sup> <sup>176</sup> <sup>177</sup> <sup>178</sup> <sup>179</sup> <sup>180</sup> <sup>181</sup> <sup>182</sup> <sup>183</sup> <sup>184</sup> <sup>185</sup> <sup>186</sup> <sup>187</sup> <sup>188</sup> <sup>189</sup> <sup>190</sup> <sup>191</sup> <sup>192</sup> <sup>193</sup> <sup>194</sup> <sup>195</sup> <sup>196</sup> <sup>197</sup> <sup>198</sup> <sup>199</sup> <sup>200</sup> <sup>201</sup> <sup>202</sup> <sup>203</sup> <sup>204</sup> <sup>205</sup> <sup>206</sup> <sup>207</sup> <sup>208</sup> <sup>209</sup> <sup>210</sup> <sup>211</sup> <sup>212</sup> <sup>213</sup> <sup>214</sup> <sup>215</sup> <sup>216</sup> <sup>217</sup> <sup>218</sup> <sup>219</sup> <sup>220</sup> <sup>221</sup> <sup>222</sup> <sup>223</sup> <sup>224</sup> <sup>225</sup> <sup>226</sup> <sup>227</sup> <sup>228</sup> <sup>229</sup> <sup>230</sup> <sup>231</sup> <sup>232</sup> <sup>233</sup> <sup>234</sup> <sup>235</sup> <sup>236</sup> <sup>237</sup> <sup>238</sup> <sup>239</sup> <sup>240</sup> <sup>241</sup> <sup>242</sup> <sup>243</sup> <sup>244</sup> <sup>245</sup> <sup>246</sup> <sup>247</sup> <sup>248</sup> <sup>249</sup> <sup>250</sup> <sup>251</sup> <sup>252</sup> <sup>253</sup> <sup>254</sup> <sup>255</sup> <sup>256</sup> <sup>257</sup> <sup>258</sup> <sup>259</sup> <sup>260</sup> <sup>261</sup> <sup>262</sup> <sup>263</sup> <sup>264</sup> <sup>265</sup> <sup>266</sup> <sup>267</sup> <sup>268</sup> <sup>269</sup> <sup>270</sup> <sup>271</sup> <sup>272</sup> <sup>273</sup> <sup>274</sup> <sup>275</sup> <sup>276</sup> <sup>277</sup> <sup>278</sup> <sup>279</sup> <sup>280</sup> <sup>281</sup> <sup>282</sup> <sup>283</sup> <sup>284</sup> <sup>285</sup> <sup>286</sup> <sup>287</sup> <sup>288</sup> <sup>289</sup> <sup>290</sup> <sup>291</sup> <sup>292</sup> <sup>293</sup> <sup>294</sup> <sup>295</sup> <sup>296</sup> <sup>297</sup> <sup>298</sup> <sup>299</sup> <sup>300</sup> <sup>301</sup> <sup>302</sup> <sup>303</sup> <sup>304</sup> <sup>305</sup> <sup>306</sup> <sup>307</sup> <sup>308</sup> <sup>309</sup> <sup>310</sup> <sup>311</sup> <sup>312</sup> <sup>313</sup> <sup>314</sup> <sup>315</sup> <sup>316</sup> <sup>317</sup> <sup>318</sup> <sup>319</sup> <sup>320</sup> <sup>321</sup> <sup>322</sup> <sup>323</sup> <sup>324</sup> <sup>325</sup> <sup>326</sup> <sup>327</sup> <sup>328</sup> <sup>329</sup> <sup>330</sup> <sup>331</sup> <sup>332</sup> <sup>333</sup> <sup>334</sup> <sup>335</sup> <sup>336</sup> <sup>337</sup> <sup>338</sup> <sup>339</sup> <sup>340</sup> <sup>341</sup> <sup>342</sup> <sup>343</sup> <sup>344</sup> <sup>345</sup> <sup>346</sup> <sup>347</sup> <sup>348</sup> <sup>349</sup> <sup>350</sup> <sup>351</sup> <sup>352</sup> <sup>353</sup> <sup>354</sup> <sup>355</sup> <sup>356</sup> <sup>357</sup> <sup>358</sup> <sup>359</sup> <sup>360</sup> <sup>361</sup> <sup>362</sup> <sup>363</sup> <sup>364</sup> <sup>365</sup> <sup>366</sup> <sup>367</sup> <sup>368</sup> <sup>369</sup> <sup>370</sup> <sup>371</sup> <sup>372</sup> <sup>373</sup> <sup>374</sup> <sup>375</sup> <sup>376</sup> <sup>377</sup> <sup>378</sup> <sup>379</sup> <sup>380</sup> <sup>381</sup> <sup>382</sup> <sup>383</sup> <sup>384</sup> <sup>385</sup> <sup>386</sup> <sup>387</sup> <sup>388</sup> <sup>389</sup> <sup>390</sup> <sup>391</sup> <sup>392</sup> <sup>393</sup> <sup>394</sup> <sup>395</sup> <sup>396</sup> <sup>397</sup> <sup>398</sup> <sup>399</sup> <sup>400</sup> <sup>401</sup> <sup>402</sup> <sup>403</sup> <sup>404</sup> <sup>405</sup> <sup>406</sup> <sup>407</sup> <sup>408</sup> <sup>409</sup> <sup>410</sup> <sup>411</sup> <sup>412</sup> <sup>413</sup> <sup>414</sup> <sup>415</sup> <sup>416</sup> <sup>417</sup> <sup>418</sup> <sup>419</sup> <sup>420</sup> <sup>421</sup> <sup>422</sup> <sup>423</sup> <sup>424</sup> <sup>425</sup> <sup>426</sup> <sup>427</sup> <sup>428</sup> <sup>429</sup> <sup>430</sup> <sup>431</sup> <sup>432</sup> <sup>433</sup> <sup>434</sup> <sup>435</sup> <sup>436</sup> <sup>437</sup> <sup>438</sup> <sup>439</sup> <sup>440</sup> <sup>441</sup> <sup>442</sup> <sup>443</sup> <sup>444</sup> <sup>445</sup> <sup>446</sup> <sup>447</sup> <sup>448</sup> <sup>449</sup> <sup>450</sup> <sup>451</sup> <sup>452</sup> <sup>453</sup> <sup>454</sup> <sup>455</sup> <sup>456</sup> <sup>457</sup> <sup>458</sup> <sup>459</sup> <sup>460</sup> <sup>461</sup> <sup>462</sup> <sup>463</sup> <sup>464</sup> <sup>465</sup> <sup>466</sup> <sup>467</sup> <sup>468</sup> <sup>469</sup> <sup>470</sup> <sup>471</sup>

1. *Tirhymalus tuberosa* pyriformi radice: 1 foliis & ramulis minoribus: 2 radice m...

Apios. Mart. Ang. Dod. gal. Lac. Lug. Cast. Tab. ramulis longioribus & foliis majoribus.

II. *Tithymalus tuberosa oblonga radice.*

*Tithymalus tuberosus* Diosc. Lugd. *tuberosa* Ischas alrer, Clus. hist.

radice, Clus. hist. III. Tithymalus tuberosus Germanicus.

Duplex est: 1, est radice crassiore & majore, | *Tithymalus tuberosus* alter, Cam.

PERIUS SIVE ESILLA ROTUNDA

## PEPLUS, SIVE ESULA ROTUNDA.

**P**E *πλ. 9. si j. sumo, si j. μόνον ἀπὸ τῆς ἀλ. exiguus frutex lactei succi pleno folio parvo cecurata, at latic  
universa coma ferè dodrantali, torunda, humi sparsa: semine sub 60:13 parvo, torunda, minime  
sandidi papaveri, radicem habet unicam, &c. Dioscoridi lib. 4. cap. 168. Pepsos, quem alii qui vocant  
me, onio i aphroditi vocant, Plinio lib. 27. cap. 12*

I. Peplus five Efula rotunda. | Peplis, Cast. ico.

*Peplus*, Matth. Fuch. Ang. Dod. ut : Cord. in *Esula rotunda*, Gefn. collect.

Dullc. &amp; hift. Turn. Lac. Lon. Adv. Lob. Lugd. II. Peplios altera species.

Cast desc. Thal. Tab. Ger. Tithymalus Epithymi fructu, Col.

## P E P L I S.

**P**ortulaca, si *ἀνδράκων ἀγρία*, Hippocrati *νήπιον*, frutex est ramulos quoquo versum expandens: semine suo, sicut horrensis portulaca rotundo, infernibentibus semine suo, sicut rotundo, ferente gustu: radice tenui singulari ac superracua: in maritimu maxime nascitur &c. *lib. 4. ap. 169. At Plinius lib. 22. Peplis meminit, ubi Portulacam sylvestrem eum in generis*

cum *Peribola* *Peribola*, cum *Peplio* herba diversissima confundit, ideo quod nonnulli *Peplion*, & *Agrestem* *Portulacum* vocant.

I. *Peplis* maritima folio obtuso.  
*Peplis*, *Marthiol.* *Turn.* *Advers.* *Clus.* *hispan.* &  
*h. flor.* *Lobel.* *Lugdun.* *Cast. descr.* *Camer.*  
*Tab. 101.* *Ger.*  
*Peplus*, *Cast. ico. minor*, *Tab.*

*Peplium*, *Cæs.*  
*Peplion* *Dalechampi*, *Lugd.*  
*Variat caule rubro, albo.*  
 II. *Peplis montana* folio *Numulariæ*.  
*Peplis altera*, *Ang.*

## CHAMÆSYCE.

*Χαμαίσυς* n. *sum*; tamos emittit quaternum digitorum, per terram stratos, teretes, lactei succi plenos: folia lentis figura *peplo* similia, parva, tenuia ac terram inarentia. semen sub folijs rotundum ceu *peplis*, radice tenui ac supervacua: sed neque florem neque caulem promit, *Dioscoridi lib. 4. cap. 170.* *Chamaesy*, e lentis folia habet, in arido petrosissq. nascens, *Plinio lib. 24. cap. 15.*

*Chamaesyce*, *Matth. Ang.* *Gesf. hort. Dod.* duplicem figuram habet) *Camerar.* *Tabernæ-*  
*Adv. Lob. Clus. hisp. & hist. Cæsalp. Lugd.* (qui) *mont. Ger.*

## LATHYRIS.

*Λαύρις* quam aliqui *Τρίδακτος* vocant, & *Tithymalorum* numero ascribunt, caule est cubitali digiti crassitudine, inani: in cacumine sunt ale & folia, in caule oblonga amygdalinis proxima, & c. fructum gerit triplici loculamento distinctum, rotundum ceu *capparum*, in quod tria sunt minuta semina, ineurstantibus tuniculis inter se discretis, ervu majora, qua decorticata candida sunt, & c. totus fructus lacteo succo turgens, *Dioscorides lib. 4. cap. 167.* *Lathyrus* folia habet multa, lactuca similia, tenuiora, germina multa, in quibus semen tuniculis conjunctum ut *capparum*: quæ cum inaruerit, eximuntur grana piperi magnitudine, candida, dulcia, facilia purgatu, *Plinio lib. 27. cap. 11.* *Graman* regium minus, *Mesueo.*

I. *Lathyris* major.  
*Catapucia*, *Brunf. Cæs. minor*, *Lob. Tab.*  
*Lathyrus*, *Brunf. Matth. Fuch. Dod. ut:* *Cord. in*  
*Diosc. Gesf. h. Tur. Lac. Ad. Lon. Lug. Cam. Cast.*  
*Lathyrus* sive *Catapucia minor* a. *Trag.*  
*Catapucia vulgaris*, *Tarrago Hispanorū*, *Eyft.*  
*Ratione ætatis, latiora vel angustiora folia*  
*habet: hinc apud Tab.*  
*Lathyridis latif. & angustifoliæ*, apud *Gerardū.*

*Lathyridis* sive *Cataputiæ* majoris & minoris nomine, figuræ exhibentur.  
 II. *Lathyris minor conglomerato flore.*  
*Lathyrus minor* *Dalechampi*, *Lugd.*  
 III. *Lathyrus minima.*  
*Catapucia pusilla*, *Cæs.*  
 IV. *Lathyridi affinis.*  
*Semen Vise dicta ex Bengala, Lathyridis grano*  
*simile, Acoftæ Clusij cap. de Manna, quid?*

## HIPPOPHÆS.

*Ἱπποφάης* cum sit ex ijs, quæ lactem succum fundunt, de eo, licet nobis incognitum in præsens. *Ἰνδοποις* frutex est densus, succulosus, folijs longis oleagineis proximis, angustioribus, mollioribus, inter quæ spina candidantes, sicca angulosa, floribus hedera corymbos referentibus, racematis coherentibus, sed minoribus mollibusq. & ex albido partim rubentibus: radice crassa, molli, lactei succi plena, amara, ex qua velute *Tbapsia* liquor excipitur, ad biliosa, aquosa & pituitosa detrahenda & c. *Dioscorides lib. 4. cap. 162.* *Hippophyes* in sabulosis maritimisq. nascitur, spinis albis, hedera modoracemosa est, candida & ex parte rubentibus acinum, radice succo inader, qui aut per se conditur aut pastillus farina, *Plinio lib. 22. cap. 12.*

I. *Hippophæis* quibusdam *ἀνδροκάρπης*, id est, *Spina purgatrix*, *Ang.*  
*Hippophæis* ex Codice *Cæsareo*, *Dodon.*  
*Lugdun.*

II. *Planta lactaria*, *Xabra* & *Camarronum* *Rhais*, *Rauvvol.* & *Lugd.* quid?  
 III. *Dante* radix quædam candida lacticina, *Acoftæ Clusij cap. de Manna, quid?*

# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER OCTAVVS.

## SECTIO PRIMA.

### DE CONVOLVULIS.

SCAMMONEA; CONVOLVULUS SEU SMILAX LAEVIS SOL-  
DANELLA, SMILAX ASPERA ET SALSAPARILLA; CHINA,  
BRYONIA, MECOACHA, LUPULUS, VITIS VINIFERA.

### SCAMMONEA.

**Σ**καμνών Dioscoridi lib. 4. cap. 171. & Theophrasto 4. hist. 6 & 9. hist. 1. & 10. Latine SCAMMONEA, ex  
radice succus elicuitur, ut lib. 12. sc. 3. 6. ostendimus. Dioscoridi descriptio nostra plantae  
sua ramos quadantenu hirsutos folia item hirsuta tribueret: quam hirsutiem (nescio an Dioscorides) ha-  
nus non observavimus: & Matthiolus in Dioscorideae descriptione omisit.

#### I. Scammonia Syriaca.

Scammonia, Matt. Gef. hor. Lon. Lug. Cast. Cæs.  
Scammonia, Dod. gal. Cord. in Diosc. Antio-  
chena, Cam.  
Scammoniū, Cord. hist. Dod. Syriacū, Ad. Lob.

Scammonia Valentina, Clus. hisp. Tab. Ger.  
Scammonia maritima Monspeliana, Lug. Cam.  
Apocynum 4. latifolium, Clus. hisp.

#### III. Scammonij Monspel. affinis, folijs acutiori-

Periplocia prior, Dod.

#### II. Scammonia Monspeliana folijs rotun-

Scammonij Monspeliaci varietas, Lob.

dioribus.

Apocynum 3. Clus. hisp. 3. latifolium, Clus. Alp.

Scammonia Monspel. Gefn. hort. Eyft.

Scammonij quoddam genus, Cæs.

Scammonium Monspeliense, Ad. Lob. ico.

Volubilis marina, Tab.

### CONVOLVULUS SEU SMILAX.

**S**milacem duplicem Dioscorides habet. alteram lib. 2. cap. 176. ubi Phaseolum inebriare oportet. Alteram  
lib. 4. cap. 144. & 145 quam in asperam & laevem distinguit: illa, quia aspera, hic casta  
dicitur. Utriusque & Plinius lib. 24. cap. 10. meminit. At Theophrastus 3. hist. 16. Smilacem artem  
huc sit similem describit, quam Plinius lib. 16. cap. 6. Illic genus facit: qui lib. 16. cap. 1. & 2. una quibus-  
dam Smilacem vocari scribit. Smilax laevis, Convolvulus à Plinio lib. 21. cap. 5. dictus videtur quod arbori-  
scandat & se se convolvat: quibusdam fassione ejusdem lib. & cap. 22. censetur.

#### Smilax laevis.

#### I. Convolvulus major albus.

Volubilis, Brunf. latifolia, Fallop. de decor.  
Volubilis major, Trag. Lon. Thal. Tab.  
Smilax laevis, Matt. Fuch. Gef. h. Lac. Cast. Lug.  
Smilax laevis major, Dod. ut: vel lenis major,  
Helxine cissampelos, Cord. in Diosc. (Lob. Ger.)  
Malacocissus Democratis, Ang.  
Convolvulus major, Gefn. hort. Ad. Cæs.  
Companula lba sylv. Svvert.  
Convolvulus major flore albo. Eyft.

Semen nigrum est, aliquando rufescens.

#### II. Convolvulus ramosus incan' folijs piloselle

Helxine cissampelos ramosa Cretica, Ponç Ital.

#### III. Convolvulus minor arvensis.

Volubilis minor, Trag. Lon. Thal.

Helxine cissampelos, Matth. Fuch. Ang. Ge-  
hort. Lugd. Cast.

Helxine hederacea, Lac.

Helxine in segetibus nascens, Cord. in Diosc.

Smilax laevis minor, Dod. ut: Ger.

Scammonia parva, Ang. Cam.

Orobanche Theophrasti, Ang.

Convolvulus, Tur. minor, Gef. hor. Cæs. Cl. hisp.

Convolvulus minor purpureus, Ad. Lob.

Volubilis arvensis, Tab.

Dioscoridi l. 4. c. 39. illa dicitur, quod flos  
est hederæ, sed minoribus, & c. inter pres Hel-  
nen cissampelon reddidit: quibusdam Orobanch-  
che Theophrasti (Ervanga Gaza, 8. hist. 8. c. 10.)  
Scammonia tenuis Plinii l. 24. c. 15.

Variat flos colore, qui vel candidus, vel

*seu vel pallidum purpureo umbilico, vel pulcherrimum, vel alperius, vel purpureus radijs albis.*

IV. *Convolvulus minor semine triangulo. Oibanchi seu Cuslus altera Serapionis, Trag. Oibanchi Ruelij. Gef. hort. Helixine cissampelos, Dod. gal. Lugd. Helixine cissampelos altera atriplicis effigie, Akl. Lobel.*

*Centunculus Plinij, Anguil. Elatine, Cord. in Diosc. Convolvulo similis herba, Gef. hort. Convolvulus niger, Dod. Volubilis media sive nigra, Thal. Volubilis nigra, Tab. Ger. Fromentone alterum genus, Cæsalp. Polygonum hederaceum, Colum.*

*Alijs Malacocissos Constantini Imperatoris: alijs Oibanchi: alijs Helixine cissampelos: alijs Elatine: alijs Centunculus Plinij l. 24 c. 15. qui Græcis Clematis dicatur.*

V. *Convolvulus cæruleus hederaceo anguloso folio.*

*Smilax cærulea, Dod. gal. Scammonia similis flore cæruleo, Anguil. Convolvulus peregrinus vel flos noctis, Gef. hort. Nil Arabum, Gef. hort. Eyt. Convolvulus asureus sive cæruleus hederaceus, Ad. Lob.*

*Campana cærulea, Dod. Bry. Volutulus cæruleus, sive campana azura, Lugd. Convolvulus cæruleus, Cam. Cast. Tab. Ger. Convolvuli alterum genus, quod pro Scammonio ostenditur, Cæf.*

*Campanula cærulea hederaceo folio, Svvert.*

*Quibusdam Granum nil Serapionis & Arabum. Ligustrum nigrum Columellæ alijs: alijs*

*Porthos cæruleus Theophrasti: quibusdam Volubilis lanuginosa, Mesuæ.*

VI. *Convolvulus purpureus folio subrotundo: qui 1. in Prod.*

*Convolvuli species altera, quæ ad Nil Avicennæ referri potest, Dod.*

*Campanula azura, Svvert.*

*Campanula Indica purpureo violacea, Bry.*

*Convolvulus Indicus flore violaceo, Eysl.*

VII. *Convolvulus peregrinus cæruleus, folio oblongo: qui 2. in Prod.*

*Convolvulus cæruleus minor Bauhini, Bry.*

*Campanula incognita cærulea alba, Eid.*

VIII. *Convolvulus folijs laciniatis, vel quinquefolius: qui 3. in Prodr.*

*Convolvulus Ægyptiacus Bauhini, Bry.*

IX. *Convolvulus argenteus Althææ folio. Convolvulus folio Althææ, Clus. hisp. & hist. Lugdun.*

*Convolvulus peregrinus, Lob. Cast. Scammonium minus Plinij 2. Tab.*

*sub Papavere cornuto luteo minore, apud Ger.*

*Alijs Helixine cissampelos Dioscoridis: quibusdam Scammonium minus Plin. Flos ex purpura candicat: interdum omnino purpureus.*

X. *Convolvulus Linariæ folio.*

*Canabrica quorundam, Clus. hisp. & hist.*

*Canabrica Plinij, Cast.*

*Convolvulus minimus spicæfolius, Ad. Lob. Lugd. Ger.*

*Volubilis terrestris Dalechampij, Lugd.*

*Scammonium minus Plinij, Taber.*

*Helixine stans Guilandino, Scammonia Patavina Cortuso dicebatur.*

*Variat magnitudine, reperitur enim vix duas tréve uncias altus: flore est communiter putpureo, rarius albo.*

## SOLDANELLA.

*Silvestris levigata generibus Soldanella ascribenda venit, quare & Belgis Convolvulus maritimus dicitur: quæ duplex est, maritima & alpina. alpina, hinc ob foliorum similitudinem junctus. Soldanella maritima, quæ in officinis habetur. Dioscorido l. 2 c. 148. est ἐπὶ τῇ θαλάσσιᾳ, Brasica marina: si textus corrigatur.*

I. *Soldanella vel Brasica maritima major. Brasica maritima genus, Rausvolff. Lugd. ap. Convolvulus maritimus noster, Imperato.*

*Hæc solida quædam sunt laciniata, quædam nonnulla tamen parte superiore sinuata.*

II. *Soldanella maritima minor. Brasica marin. Maur. Dod. gal. Ang. Cor. in Diosc.*

*& hist. Gef. hor. Lac. Tur. Lou. Lugd. Cast. Cam. Soldanella, Gef. h. Dod. Lon. Ad. Lob. Cæf. Tab. Soldanella marina, Ger. Eysl.*

III. *Soldanella alpina rotundifolia.*

*Soldanella montana, Ad. Lob. ic.*

*Soldanella alpina, Cam. ep. Clus. pan.*

*Soldanella alpina minor, Eid. hist.*

Variat

Variat folijs: & floribus: folijs alijs superne viridibus, inferne diluore virore splendentibus: alijs folijs inferne ut Cyclamini rubentibus, quæ tertia species est Clusio. Flore est purpureo, nunc

saturatione, nunc diluore: repertis & in hoc IV. Soldanella alpina folijs minime rubentibus Soldanellæ alpinæ aliud genus Cæsalp. pro Soldanella alpina major, L. d. h. l.

### SMILAX ASPERA.

**Σ**μιλαξ τρυχίχη, Smilax aspera Dioscoridi l. 4. c. 144. propter sarmentum rubimodo aculeatum simpliciter Theophrasto 3. hist. 18. ubi Gaz. Hederam Ciliciam interpretatur, quia Plinius l. 16. c. 53. Smilacem hederam similem, primum e Cilicia profectam, sed in Græcia frequentiore, &c. Et l. 24. ubi hederam qui nicophoros cognominatur, similitudinem hederæ habet.

I. Smilax aspera fructu rubente.

Smilax aspera vera, Trag.

Smilax aspera. Matth. Fuch. Dod. ut: Tur. Lac. Cord. in Diosc. Gefn. hort. Ad. Lob. Lugd. Cast. Cæsalp. Cam.

Smilax aspera fructu rutilo, Clus. hisp. & hist.

Smilax aspera prima & tertia, Tab. Ger.

Volubilis aspera, Lonc.

Folia maculis candidis quandoque notantur.

II. Smilax aspera minus spinosa, fructu nigro.

Smilax aspera fructu nigro, Clus. hisp. & hist.

Smilax aspera altera facie Salsæparillæ, aut congener, Lob. ico.

Smilax aspera Lusitanica, Tab. Ger.

A priore differt & fructus colore, & folijs, in hac mollioribus minusque spinosis, quandoque etiam spinis carentibus. folijs quoque angustifolimis in Galloprovincia observatur.

III. Smilax aspera Indiæ Occidentalis.

Buenas noches, fructus exoticius tertius, Clus. exot. l. 2. c. 12.

### Salsæparilla.

IV. Smilax aspera Peruvian. sive Salsæparilla.

Zarzaparilla, Matth. Lac. Monar. Garz. Lugd.

Zarzaparilla Peruviana, Dod.

Zarza seu Salsæparilla, Castor.

Salsæparilla, Lon. Frag. Cæsalp.

Salsæparilla, Ad. Lob. & par. 6. Ind. Or. cap. 41.

Smilax aspera in Zaynitho, Alpino.

Smilax Peruviana, Tab. Gerard.

### C H I N A.

**C**um China suum sarmentum Smilacis asperæ absimile non sit, Acosta monente, & suis candidis tenebris, hederæ modo arborescendere, in historia Lugdunensi referatur, idcirco in hanc classem retulimus. Dicitur China & Chinæ radix, a China India regione, in qua copiose nascitur. Et autem duplex, una ex India occidentali, Hispania nimirum nova & Peru. quæ colore magis rufa est: alia ex India orientali, regione Sinarum (ubi ab indigenis Lampatam vocatur) adfertur. Verum Græci & Acosta qui integram plantam depingit, & ex eo Lugd. hist.) Chinam orientalem aliter describunt, quam Monardes suam occid. &c. At radix hac India primum Anno Christi 1535. innotuit.

I. China radix: & Lugd. Fragosô.

Cina, alias China, Matthiol.

Zarzaparilla in Puna & ejus usus: Bætzon 1. 6. Amer. l. 3. c. 119.

Zarzaparilla à similitudine, quam cum Salsæparilla aspera habet, nomen accepit, quæ Hispanice Zarzaparilla, qui Rubus viticula dicitur. Zarzaparilla siquidem Hispanis, Lacunâ teste, rubum, & viticula autem, Matthiolo interprete, vitem, & viticula parvam vitem sive viticulam significare videtur. Aliqui Salsam parillam, Smilacis asperæ Hispanicæ radicem censuerunt: cum tamen Petrus China, cœli temperati occasione & ipsius folijs, nino, longè efficacior sit, quam vel in Hispania, aut etiam Africa nata. Cujus usum primi in Peruvia ex Peru & novi orbis sive Americæ provinciis ante 50. annos in Europam invehere.

Triplex est, Nicolao Monardo monente. 1. ex Hispania nova, quæ candidior. ad pallorem tendens, & gracilior: 2. quæ multò melior, ex provincia Honduras, cinerea, nigrior & crassior: 3. ex provincia Quitto, locis urbi Guayaquil vicinis (unde Zarzaparilla Guayaquiliana dicitur) adfertur, quæ colore est ex cinereo nigricante, majoribus crassioribus radicibus constans, quàm quæ ex Honduras adfertur, ijsque interdum tam longis, ut altitudine humana inferendum sit, antequam erui possit. Hujus terræ ad fluvium Guayaquil & in Puna Insula n. S. Petrus Cieca parte prima Chronici Peruviani c. 54. meminit, alterique in plerisque Indiarum regionibus nascenti præfert. At Cæsalpinus duas primas differentias agnoscit.

China, Lac. Lob. ico. Cast. Taber.

Chinna sive China, Cæsalp.





tenuiore utriusque filiqua parte interiore lanu-  
ginosa: ex utr. usque semine plantulæ Scam-  
monij aut Convolvuli modo prodire, &c. De  
hac quemadinodum & de Nicoriana, Jaco-  
bus Gortæus I. uterianus, & Ægidius Everhat-  
tus Belgæ, libellum, ille Gallicè, hic Latinè,  
scripsit.

VII. Bryonia Mechiocana nigricans, quæ  
ex India Chelapæ live Celapæ nomine ante an-

nos duodecim allata: & à Mafsiensisibus Jala-  
pium, vel Gelapo vocatur: quæ sub Bryonia  
3. in Proditione exhibetur.

VIII. Bryonia Mechiocana sylvestris.  
Mechoacæ ex promontorio D. Helenæ. Monard.  
Mechoacæ sylv. genus, Lugd. hist.

Hæc prior minor est per omnia, cujus radix  
gravia symptomata excitat, quare Scammonea,  
Monarde auctore, nuncupatur.

## RADIX QUIMBAYA.

**R**adix Quimbaya: in provincia Quimbaya, cujus metropoli Caribago. radices tenues, digiti crassitudine,  
inter arbores nascuntur, quarum fragementum per noctem in aqua maceratum, aqua partem maiorem  
absurmit ex residua unica tres sumpta benignè instar Rhabbari purgant. Monardes ex Terri Cicca Peruvia-  
na historia refert, & ex eo Lugdunensis historia: meminit etiam Fragosus, sed succulenti.

## LUPULUS.

**L**upulus à Plinio l. 21. c. 15. Lupum salictarium nominatum voluit: qui Mesuae 2. purg. 24. Volubilis so-  
lvis asserit dicitur: hodie in Grecia Epuvia nominatur.

Sativum est & sylvestrium magnitudine differens: sic sylv. florum cono minores, rariore, pauciores habet:  
alijs Lupulus florens. fructu caret: & contra, fructum ferens, non floret.

I. Lupulus mas.

Lupulus, Brunf. Matth. Tur. Dodon. Clus. hist.  
Tabern.

Lupulus sativus, & sylv. Trag. Lon. Cast. Lugd.

Lupus salictarius, Fuch. Dodon. gal. Gesn. hort.

Lacun. Lobel. (cui & Vitis septentrionalium)

Cæsalp.

Lupulus salictarius spontanea, Ad.

II. Lupulus scemina: & Cam. ep. & hor.

Folij est rotundioribus, circa radicem sine  
incisuris tantum serratis: flosculis subpalli-  
dis, qui sine fructu pereuntes, in pollinem lu-

teum abeunt.

III. Lupulus Mechiocanus.

Radix Carlo sancto, Monard. Lugd. Fragoso.

Indica radix, Monardi, part. alt.

Carolus Sandus, Castori.

Radix huius plantæ, quæ Lupulo similis est,  
ex provincia Mechiocan adfertur, cujus deco-  
ctum & pulvis in Catharro, Epilepsia & lue Ve-  
nerea commendatur.

IV. Sippo, sarmenta longa, Lupuli sarmenta  
non absimilia, quibus ad religandum Brasili-  
ani utuntur: par. 3. Americ.

## VITIS VINIFERA.

**D**e vitis historia Dioscorides l. 5. sedecim capitibus egit, Vitein, Labruscam, Uvam, Oenan-  
then, Omphacium. Vini naturam, differentias & facultates, ex sapore, mixtione, loco natali desumptas,  
exponens: quæmadmodum de Lora, Mulso & similibus. Et Theophrastus sparsim in suis libris de Vite copiose  
egit: ut de Vite 9. hist. 20. & 6. caus. pluribus capitibus. Et Plinius l. 14. capitibus novendecim.

Vitem dividimus in sativam & sylvestrem: sativa major est, cujus plurima species, alia minor. Majora  
uva & colore & magnitudine differunt: alterum namq. acini aut virides albicantesve, aut sulvi, aut saturato  
rubore nigricantes, aut carules aut subrubenti coloris: alia acinu oblongu magnitudine & forma prunorum,  
qua Pergula dici potest: alia rotundius, vel magni vel parvi: alia acini sunt frequentioribus, alia ra-  
rioribus. Sunt quæ granum aut vinaceu carent interdum unicum vel alterum granum habent: Rariora bar-  
bata reperitur. Minor verò est acinu nigri, rarisimè albidu, aut sylvu, nucleo minuso ac molli. Sapore etiam  
differunt: ut dulces, acerbo, muscato, quæ Vitis Apiana Plinio.

In folijs quoq. differentia, alia majora profundius incisa, ut Italica folijs ad pediculum usq. in laciniis  
acutis divisjs: alia minora sunt: Sic alia remulora, alia crassiora: alia viridia, alia rubentia, alia maculata:  
alia ad lorum duriora, molliora, alia levia: alia densa, subhirsuta.

Ratione loci, Vitis plurimum variat: apud nos commendantur, ex Germanicis quidem Br. oica,  
Alsatica, Ripensis, quæ ex ducono Botnatum habemus, Rhevana, & Necarina, quæ duo postremo a raris  
habe-

habemus : ex Gallicâ, Burgundiâ, & inter ea potissimum Arbustosa, Muscatellina, Frontiniana, qua Lugduno advehuntur : ex Italicâ, Rhetica, quæ ex Valletelina asportantur : ex Hispanica, Cimeni : ex Græcâ, Malvaticâ.

Sic in Aegypto, vinum tenue atque aquosum existit, licet calidissima regio sit : cujus rei causam Apudissem lib. 2. prob. inquit. Et hoc vinum videtur Hesiodus circa Bithuræ vinum Biblinum vocasse : foris quia in eadem cum biblo, id est papyro, regione proveniat : licet ipsius interpretes Tærenum velut à Biblo civitate Libano civitati proxima, nomen accepisse, siquidem constat ejus loci incolæ ferè hydroporæ esse. Suidas verò tum à Byblos civitate, tum à Bibla vitis genere, dictum putat. Monet Guil. Hippium Reginum vitem quæ ille vocatur Biblam vocare. Sed hæc alterius sunt loci.

In India insula Baly, Vites bi in anno uvæ promunt : Linsc. part. 3. Ind. Orient. cap. 40. & in insula Azores, super moræ rupes crescunt, quæ radices in medios hiatus seu saxorum rimas immittunt, quibus succum sibi necessarium proliciunt : & in ista petraâ recessibus, Vites multo lætius se proferunt, quam quæ in planitie sunt, quæ ad frugem pervenire nequeunt : Idem cap. 6. Sed in Hispaniola plantata exiguae uvæ fundunt, nec admodum jucundi saporis & ferè Febuario & Martio vinum fieri solent, auctor Benzene five America lib. 4. cap. ult. & ut Josephus Acosta lib. 3. cap. 22. & lib. 4. cap. 32. nec in insula, nec in firma terra Uva aut vinum nascitur : in nova Hispania, vineæ uvæ proferunt, sed nunquam probè maturescunt, ut vinum confici possit : nisi in Peru & Chile approbium vinum nascitur : nam jam vitæ colere dicitur : & vineæ plerumque in convallibus Petuanis nascuntur, juxta quas fossæ ad aquam colligendam excavant, quæ vitæ subinde irrigant.

I. Vitis vinifera, ex cujus Uvis acerbis immaturis succus exprimitur, quem o'μῆρυν Omphacium Dioscorides lib. 3. cap. 6. vocat : ex quo Syrupus de Agresta in officinis paratur.

II. Uva passa major ῥόμβος Græcis.  
Uvæ passæ majores, Trag. Gesn. hort. Cast.  
Uva passa, Tur. Lon.  
Zibebas ferens, Cam.  
Uvæ Zibebæ. Tab. Ger.

Non solum Uvæ, sed etiam acini præter modum ampli, crassi & oblongi sunt, ut non nili passæ ad nos deferantur : Arabibus, uva Zibibi, Latinis passa, Germanis, Zibebeln/Meertrubeln/ id est, uva marina.

III. Uvæ passæ Indicæ gigantiscarentes.  
Uvæ sine vinaceis seu apyrenos, ad Clus. cur. post.

IV. Uvæ passæ minores, vel Passulæ Corinthiæ.

Passulæ, Trag.

Uvæ passæ minores, Gesn. hort. vel Corinthiæ, Cast.

Folij est rotundis, crassis, subtus incanis, in pauciores lacinias obusis divisis : Uvis partim fulvis, partim subnigris, dulcibus & vinosis.

V. Vitis sylvestris, Labrusca.

Labrusca, Trag. Lugd. & alijs.

Labrusca dicta, quod in marginibus terræ, seu labris quibusdam oriatur. Dioicoridi lib. 3.

cap. 2. ἀμπελὶς ἄγρια, quæ genera duo fecit : alterius enim Uva non maturefcit, sed florem tantum profert ἰναιβέλις nominatum : altera fructum perficit, ex parvis acinis nigris substringentibus. Plinius Labruscam vocat & Oenanthen, ex alba Labrusca præstantiorem, quam è nigra scribit. Et Gesnerus libr. de hort. racemiferam tum albis, tum nigris acinis refert. Vocatur autem propriè Oenanthe, fructus Vitis sylvestris cum floret, Dioscoridi lib. & cap. 5. seu ut Plinius loquitur, Vitis labruscæ uva, quæ cum floret colligitur, quando optimè olet.

Apud Florindenses Labrusca in magna copia crescere, author part. 6. Ind. Occid. scribit.

VI. Vitis sylvestris Americana.

Vitis sylvestres vicinas arbores scandentes & uvæ edules proferentes in nova Francia habentur : part. 1. Amer.

VII. Vitis sylvestris Virginea.

Viris duum generum sponte nascuntur : alterum uvis tenuibus acerbis : alterum majoribus & dulcibus : Hariot. desc. Virgin.

VIII. Vitis sylvestris Indica acinis pruni sylvestris.

Arbores multæ in India, quæ uvæ quasdam agrestes ferunt, quarum Acini prunorum sylv. speciem referunt, & nigro folliculo vestiuntur, sed quia illis multum ligni, parum pulpæ, ex his vinum non faciunt : Benzo l. c. c. 8.



## S E C T I O   S E C U N D A.

CLEMATITIS; LIGNUM COLUBRINUM; CLEMATIS; PERICLYMENUM; APOCYNUM; ASCLEPIAS; POLYGONATUM;

Lilium Convallium; Monophyllum; Laurus Alexandrina,  
quibusdam Hippoglossum.

### C L E M A T I T I S.

**K** *Aquaticæ Dioscoridi lib. 4. cap. 182. idem est ac Sarmentaria: sic dicta, quoniam adjuvata flagella, vitigeniu flagellu similia emittat, ac ut illa arbores scandat. Plinio lib. 24. cap. 10. Clematida Smilacis similem, per arbores repentem geniculatam & ipsam appellaverunt. A Theophrasto 5. hist. 12. Ἀνταρὰ ὀνόματι, & esse arborem quæ Vitis & Labrusca modo surgat.*

#### I. Clematidis sylv. latifolia.

Vitis sylv. estris, Trag. Lugd.

Vitis nigra, Fuch. Tur. Lon. 2. Tab.

Vitalba, Dod. ut: Guiland. the. (& Vitis sylv.

Dioscoridis) Cæs.

Viburnum Gallorum, Bellon.

Atragene Theophrasti, Ang. Clus. hist.

Vitis sylv. caustica, Gesn. hort.

Clematis 1. Matth. Cast. Thal. 2. Lac.

Clematis altera prima, Cord. in Diosc.

Viorna vulgi, Ad. Lob. Ger.

Clematis five Viorna vulgi, Lobelij, Eysl.

Clematidis est Dioscoridis, Atragene Theophrasti: quibusdam Vitis sylv. Plinij.

In foliorum divisuris mirè ludit & sarmenta aliquando brachiorum crassitudinis sunt.

#### II. Clematidis Peruviana.

Bexugo del Peru, ad Atragene sarmenta proximè accedentia, cortice cinereo obducta, gustus lenti, dein acris, denique fauces urentis: drachma purgat & Mechoacæ præfertur, Clusius in notis ad Monardem.

#### III. Clematidis peregrina folijs pyri incisfis.

Clematis altera Boetica, Clus. hisp. & hist.

Clematis Boetica, Clusij, Lob. Lugd. Tab. Ger.

#### IV. Clematis five Flammula repens.

Clematis altera, Dod. gal. flore albo, Cast. Cam.

Clematis flammula quibusdam, Gesn. hort.

Clematis altera urens, Ad. Lob.

Flammula, Dod. Lugd. hist.

Viticella, Cæs.

Clematis urens, Tab. Ger.

Flammula dicitur, quod confusa applicata, vesicas flammæ instar exciter, cujus folia aliquando Apij modo dividuntur: est etiam simplex vulgaris, alia multiflora, quæ

Clematis urens 2. Tab.

Clematis urens multiflora, Ger.

V. Clematidis maritima repens: quæ 1. in Pr.

Clematites, Ang.

VI. Flammula recta.

Flammula, Matth. Lugd. Clus. pan. & hist. Tab.

Flammula frutex, Cord. in Diosc.

Clematis altera, Turn.

Flammula altera, Dod. altera surrecta, Lob.

Flammula recta, Cam. Eysl.

Flammula Jovis surrecta, Ger.

Duplex est: alterius sarmenta & foliorum pediculi virescunt & ferius floret: alterius rubent & maturius floret.

Centella herba, quæ trita tumoribus imposita pustulas excitat, in epist. ad Monardem huc referri potest.

VII. Clematidis alpina Geranifolia: quæ 2. in Prodromo.

Clematis cruciata alpina, Ponæ.

VIII. Clematidis cærulea erecta.

Clematis altera minor longifolia, Clymenum quorundam, Lob. Lugd.

Clematis cærulea Pannonica 2. Clus. pan.

Clematis cærulea 2. Tab.

Clematis major Pannonica, Ger.

Magnitudine variat: hinc duæ figuræ apud Clusium hist. pan. & Tab. sub

Clematide cærulea pan. 1. quæ Clematis cærulea pannonica, Eysl.) & 2. Et Ger. sub

Clematis pan. & Clemat. majore pannonica.

Flore est cæruleo, rarius albo.

IX. Clematidis cærulea vel purpurea repens.

Clematis altera, Matth. Dod. Cast. ap. Clus. hist. flore purpureo, Cam.

Clematidis alterius altera species, Dod. gal.

Clema-

Clematis peregrina cærulea & purpurea, Lob. Tab. qui duas figuras habet, & Ger. sub cærulea & rubra.

Clematis 3. quæ Flammula, Cæf.

Pothos cæruleus, Lugd.

Clematis peregr. incarnato simpl. flore, &

Clematis peregr. purpurea simpl. flore, Eyst.

Alijs Clematidis Dioscoridis: quidam *nido* (Desiderium Gaza vertit) Theophrasti 6. hist. ult. faciunt.

X. Clematidis cærulea flore pleno.

Clematis altera fl. pleno, Cam. ep. Clus. cur. post.

Clematis peregr. purpur. flore pleno, &

Clematis peregr. incarnata plena, Eyst.

Flore est cæruleo, purpureo cæruleo, incarna-

to, ad purpureum colorem sed admodum dilutum accedente.

XI. Clematidis trifolia flore roseo clavato. Granadilla, Monardi, Petro de Cieca in hist. Peruana, Lugd. Vide in Americæ pat. 9. l. 4. c. 17. at c. 30: Granadilla inter ligna recensetur.

Flos pafsionalis sive Granadille ex India, du Bry.

Granadilla dicitur propter semen, quod ut in malis granatis inclusum continetur: Flos pafsionalis, quod in flore aliquæ veluti pafsionis Christi figuræ delineatæ conspiciantur, Monardes.

Hujus folia & flores à Doctis. Simplicista Joh. Pona Veronâ anno 1621. accepi.

## CLEMATITIS INDICA, QUÆ LIGNUM.

Colubrinum.

**C**lematitidem vocamus, quia pleraque fermentitia sunt & per arbores repunt: Pao da Cobra, id est Lignum Colubrinum, Lusitani nominant, quia adversus animalium virus ejaculantium morsus & illius efficax sit.

I. Clematidis Indica folijs Lentiscinis candidis maculis aspersis.

Ligni colubrini tertium genus, Garz. Frag.

II. Clematidis Indica spinosa folijs luteis.

Ligni colubrini alterum genus, Garz. x, Frag. & Clusio, qui ligni frustum pingit, & Lugd. cui male titulus Ligni colubrini Acoftæ inscriptus Lignum colubrinum, Tab. (est.)

III. Clematidis Indica folijs persicæ, fructu Periclymeni.

Ligni Colubrini primum genus, Garz. x, Frag. Palo del Cebra, id est, Lignum serpentinum seu Colubrinum, Linscot. 4. par Ind. Or. c. 31.

Pao de Cebra lignum seu radix Lusitanis dicta, omnium venenorum antidotus, in Insula S. Laurentij, Ind. Or. part. 4. c. 7.

Et hæc tria ligni genera in insula Zeilan reperiuntur.

IV. Clematidis Malabarenis folijs Vitis, colore dracunculi.

Lignū colubrinum primum, Acoftæ, Cast. Lugd.

V. Clematidis Malabarenis altera radice serpente.

Lignum colubrinum alterum, Acoftæ, Lugd.

Palo della Culebra, Cast. ap.

VI. Colubrini ligni tertium genus in eadem provincia, vastæ arboris magnitudine, Acoftæ. an Lignum colubrinum quod pingitur à Clusio notis ad Acoftam.

VII. Radix quædam in Malaca, quæ adversus vulnera sagittis toxico illitis facta, præsentaneum remedium est, Garzias.

## CLEMATIS DAPHNOIDES.

**Q**uæ Dioscoridis l. 4. c. 7. *Κλαμαρίς*, aut *Αυρακνίδης*, aut *ουρακνίδης*, aut *νεδυπορενδής* dicitur, ipsi Plinio l. 24. c. 15. *Clematu Aegyptia*, quæ ab alijs *Daphnoides*, ab alijs *Polygonoides* vocatur. Alijs *satureia* ejusdem l. 21. c. 11. *Vinca pervinca* censetur: alijs, aut ejusdem l. 24. c. 15. *Centunculus* sit, dubitans ibi.

I. Clematis daphnoides minor.

Vinca pervinca, Brunf. Gesn. hort. Lon. Adv. Lugd.

Chamædaphne altera Dioscoridis, Brunf. 4.

Pervinca (quod semper vireat) Trag.

Clematis, Matth. Lac. Cord. in Diosc. Tur.

Clematis prima Dioscoridis, Ang.

Clematis daphnoides, Dodon. ut: Fuch. Lob.

Thal. Cam. Tab. Clus. hist.

Clematis Aegyptia sylv. Gesn. hort.

Provincia vulgo. Cæf.

Clematis daphnoides minor flore cæruleo: flore albo: flore purpureo: tres fig. Eyst.

Flores cærulei sunt: quandoque candidi: rarius rubentes, vel subpurpureascentes: interdum flos alium florem medium continet.

## II. Clematis daphnoides major.

Clematis Ægyptia hortenſis flore purpureo, Raſatut.

Gefn. hort.

Pervinca major, Adv. Eyſt.

Clematis ſive Pervinca major, Lob.

Clematis daphnoides major, Dod. Cam.

Provincia altera major, Cæſ.

Clematis major, Lugd. prima major, Caſt.

Clematis daphnoides latifolia, Cluſ. hiſt.

Hanc Clematidem Ægyptiam Plinij : il-

lam ejuſdem Vincam pervincam, Cæſalpius ſtatuit.

III. Clematis flore pleno.

Daphnoides polyſtora, Lob.

Clematis flore multiplici, Cam. epic.

Clematis purpurea Auſtriaca, flore pleno, Cam. mer. hort.

Clematis major flore duplicato, Lugd.

Clematis altera flore pleno, Cluſ. hiſt. ap. alt.

Clematis daphnoides fl. purpureo pleno, Eyſt.

## P E R I C L Y M E N U M.

**P**ερικλυσμος à Dioſcoride lib. 4. cap. 14. deſcribitur, quod ſit frutex ſimplex, habens ex intervallis foliola caulem amplectentia, ſubcandida, hederacea, & inter folia germina naſcentia, ſuper qua fructus hederæ ſimilis : ſtorem candidum ſaba ſimilem ſubrotundum & quaſi in ſolum procumbentem : ſemen durum & avulſa difficilem : radicem craſſam acrotundam : Niſi Dioſc. radicem rotundam diſceret. cum noſtra conveniret : at Plinius lib. 27. cap. 12. radicem præteriit. Quare an noſtrum Periclymenum, potius ſit *μαλάνθη* & *τριγυ*, quam *μαλάνθη* aut *μαλάνθη* vocitens, Dioſcoridu lib. 2. cap. 195. & *Cyclamenos* Plinij lib. 25. cap. 1. ambigitur, quod Dioſc. ſcribente. folia ſert hederæ, ſed minora : caules craſſos, geniculatos, qui, circa vicinas arbores capreolorum modo ſe volvunt : flores candidi odorati : fructus vero inſtar acinorum uva ſimilis hederæ. mollis, aliquantulum acriſaporis & lentus : radix inutilis. Eſi ſint qui velint, *Cyclaminum* alteram, *Vitem ſylveſtrem* & *Periclymenum* tribus diſtinctis locis à Dioſcoride deſcriptum, unum plantæ nomine eſſe. *Periclymenum* dictum voluit, quod ſe adminiculū convolvat.

## I. Periclymenum non perfoliatum Germanicum.

Capriſolium, Brunf. Gefn. hort. Lon. Germanicum, Dod.

Periclymenum, Trag. Fuch. Dodon. gal. Turn.

Cord. in Dioſc. Gefn. hort. Cam. Thal. Tab. Ger.

Germanicum, Eyſt.

Periclymenum non perfoliatum Septentrionalium, Ad. Lob.

Periclymenum vulgare Septentrionalium, Cluſ. hiſt.

Flos candidus, ſubluteus.

## II. Periclymenum perfoliatum.

Periclymenum, Matth. Ang. Lac. Adv. Caſt.

Periclymenum alterum, Dod. gal.

Periclymeni ſpecies cujus folia unita, Gefn. hort.

Periclymenum perfoliatum, Lobel. Lugd. (&amp; grandius) Tab. Ger. Eyſt.

Periclymenum vulgare alterum, Cluſ. hiſt.

Vinciboſcum vulgo, Cæſ.

Flores ex purpura niveo candore nitent, alibi luteo aſperſi : aut albi, aut ſubruffi.

## III. Periclymenum humile.

Periclymenum 2. &amp; Chamæpericlymenum Prutenicum, Cluſ. pan.

Periclymenum minus, Tab.

Chamæpericlymenum, Ger. Cluſ. hiſt.

## IV. Periclymenum humile Norvegicum.

Chamæpericlymenum tenerius aliud, Cl. hiſt.

## A P O C Y N U M.

**A**πόκυνον à νύκταρος, παράληξις, νύκταρος Dioſcoridi lib. 4. cap. 81. Apocynum, Plinio lib. 25. cap. 15. quod canes, lupos, vulpes & pantheras, Dioſcoride auctore, vel ut Plinius, canes & omnes quadrupedes, necet. Dicitur aliam νύκταρα quaſi circumplectens, eò quòd proxima amplexetur.

## I. Apocynum folio ſubrotundo.

Apocynum, Matth. Ang. Gefn. hort. Lac. Adv.

Lob. (cui &amp; Periploca Græca ſolijs latioribus hederaceis) Lugd. Caſt.

Apocynum primum latifolium, Cluſ. hiſt.

Cynocrambe, Lon.

Apocyni alterum genus, Cam.

Periploca repens, Cæſ.

II. Apo-



## II. Apocynum folio oblongo.

Apocynum repens, Matth. Lugd. Camer.

Apocynum folijs Oleandri, Anguil.

Apocynum angustifolium, Clus. hist. &amp; hist.

Periploca, Cæ. Altera, Dod.

Periploca serpens angustiore folio, Ad Lob.

## III. Apocynum angusto foliis.

Secamone, Scammonij species Ægyptijs. Alpin.

Apocini secundi species altera, Clus. hist. &amp; hist.

IV. Apocynum Ægyptiacum laetescens siliqua Asclepiadis. Beidel-sar Alpin.

Ossar vulgo in Ægypto: fructus vero Beid el ossar, hoc est, ovum ex Ossar: Arabibus Saccharum Alhufar: forte Arbor lanigera, Bellonij l. 2. obs. Hon. Belli ep. 4. &amp; 5. ad Clus.

Apocynum Syriacum, seu Palæstinum, sive Ægyptiacum, Clus. hist.

Esula Indica, quibudam,

## A S C L E P I A S.

**E**ψις ἁσκληπιάς Dioscorid. lib. 3. cap. 106. & Plinij lib. 27. cap. 6. Asclepias, à quibusdam nostrum censetur (dubitat Anguillara, negat Matthiolum) at Apocyno cognata herba videtur.

## I. Asclepias albo flore: &amp; Gerat.

Hirundinaria, Brunf. Trag. Gef. hor. Lonic.

Hederalis, Ruellio.

Vincetoxicum, Matth. Dod. Thal. Cast. Lugd.

qui Fuchij &amp; Matthioli figuram exhibet.

Asclepias, Fuch. Dod. gal. Cord. hist. Turn. Lac.

Cef. hor. Ad Lob. Cæf. Tab. duplici figura, Cam.

Asclepias vulgæ, Apocynum Dioscoridis, Col.

## II. Asclepias nigro flore.

Vincetoxici altera species, Dod.

Asclep. altera fl. nigro, Lob. sive Periploca min.

Asclepias nigra, Lugd. flore nigro, Cam. Taber. Clus. hist.

Vincetoxicum flore nigro, Cam. epir.

Apocynum, Colum.

## III. Asclepias siliqua bifido mucrone.

Asclepias Cretica, Clus. hist. append. 1.

IV. Asclepias ex Virginea.

Wisauck sive Vincetoxicum Indicum, Gerard.

V. Fructus Asclepiadis siliquæ similis, seminibus planis nigris.

Fructus 3. è navigatione, Barau. Clus. ex l. 2. c. 15.

## P O L Y G O N A T U M.

**Π**ολύγωνον Dioscorid. lib. 4. cap. 6. quod radix crebro geniculata sit: vulgo Sigillum Salomonis, haud dubie à vestigijs pluribus, radicis sigilli instar impressu.

## I. Polygonatum latifolium vulgare.

Sigillum Salomonis, Brunf. Gef. hor. latifolium, Trag.

Polygonatum, Matth. Lac. Cast. vulgare, Cam.

vulgatius, Eyst.

Polygonatum latifolium, Fuch. Dod. ut: Cord.

in Dioscor. &amp; hist. Gef. hor. Lob. Tab. primum, Gerard.

Polygonatum majus, Lon. Ad Thal.

Polygonatum latifolium vulgare, Clus. hist.

Frasiuella, Ang Cef.

Vulgares herbarij Germ. cum Diſtamno albo &amp; Elleboro albo confundunt: alij malè Secacul Arabum faciunt. Variat baccis rubetibus purpureis, quandoque nigris, ut Cam. in epit. monet.

## II. Polygonatum latifolium maximum.

Polygonatum majus, Clus. pan. Eyst.

Polygonatum latifolium primum, Eid. hist.

Polygonatum Pannonicum, Cam.

## III. Polygonatum latifol. &amp; lebori albi folijs.

Polygonatum latifol. &amp; lebori albi folijs, vel 2. Clus. pan.

Polygonatum 3. latiore folio, Eid. hist.

Polygonatum latifolium, Dod. post.

IV. Polygonatum latifol. flore majore odore.

Polygonatum flore odore, vel 1. Clus. pan.

Polygonatum secundum latiore folio, Eid. hist.

Polygonatum, Ger. latifolium minus, Tab.

an Polygonatum angulosum, Cord. hist.

V. Polygonatum latifolium minus flore majore: 1. in Prodromo.

VI. Polygonatum latifolium perfoliatum

Brasilianum: 2. in Prodromo.

VII. Polygonatum latifolium ramosum.

Laurus Alexandrina, Matth. Dod. gal. Cam.

Hippoglossum, I. uget.

Rusco affinis terra, Cæf.

Polygonat. 3. Clus. pan. latif. 4. ramosum, Eid. hist.

Polygonato affinis planta, Lob. ob.

Polygonatum latifolium 3. &amp; 4. Tab.

Polygonatum ramosum &amp; acutum, Ger.

VIII. Polygonatum angustif. non ramosum.

Sigillum Salomonis angustifolium, Trag.

Polygonatum angustifol. Fuch. Dod. gal. Tur.

Eyst. Lugd. Clus. pan. vel 5. hist. primum, Tab.

Poly-

Polygonatum tenuifolium, Cord. in hist. Cam.  
 Polygonatum tenuifolium majus, Thal.  
 Polygonatum erectum, Gef. hort.  
 Polygonatum minus, Lon. Ger. folijs rubiæ,  
 Ad. Lob.  
 Polygonatum alterum, Dod.  
 Polygonato similis in alpinis, Cæf.  
 Quibusdam Chamædaphne Dioscoridis l. 4.

c. 149. alijs Ephemerum ejusdem l. 4. c. 85. & Plinij lib. 25. c. 13. qui florem cæruleum tribuit  
 IX. Polygonatum angustifolium ramosum,  
 Polygon. 4. angustifolium ramosum, Clus. pa.  
 Polygonatum angustifolium secundum, Tab.  
 angustifolium. Ger.  
 Polygonatum 6. live angustifolium 2. Clus. b.  
 Polygonatum tenuifolium minus, Thal.

## LILIUM CONVALLIUM.

**L**ilium, quod à loco natali convallium appellatur, à quibusdam Lilium vernum Theophrasti 6. bift. 7. censetur: alij Oenanthem ejusdem l. 6. c. 7. & Oenanthem Athenas volunt.

I. Lilium convallium latifolium: in Prodromo describitur.

II. Lilium convallium album.  
 Lilium convallis, vel sylv. Brunf.  
 Lilium convallium, Trag. Matth. Gef. hor. Dod.  
 Cæf. Cast. Lugd. Cam. Tab. Ger. Clus. hist.  
 Lilium Theophrasti, Dod. gal.  
 Ephemerum non lethale, Fuch.  
 Callyonimus vel Chamæcitus, Gef. hor.  
 Cacalia, Lonic.  
 Lilium convall. vel vernum Theophr. Ad. Lob.

III. Lilium convallium alpinum.  
 Lilium convallium alterum alpinum flore majore, & odoratiore, Cam.  
 Lilium convallium flore albo, Eyst.  
 IV. Lilium convallium flore rubente.  
 Lilium convallium floribus suaverubentibus, Lob. icon.  
 Lilium convall. rubrum, Tab. fl. subrubro, Cam.  
 Lilium convallium flore incarnato, Eyst.  
 Flore est minore, candore & rubore confusè mixto, & odore minus valet.

## MONOPHYLLUM.

**M**ονόφυλλον, unifolium dictum, quod cum prodit unico se folio, nam cum cauliculum acquirit, folia habet, rarius tria, & quidem in alpinis: propter similitudinem cum Lilio contrarium, minus appellare lubet: sunt qui Cyclaminum tertium Plinij l. 25. c. 9. velint.

Lilium convallium minus.  
 Unifolium, Brunf. Dod. ut: Lug Cam. Tab. Eyst.  
 Cotyledon syl. & Unifolium, Trag.  
 Gram. Parnassi, Mat. Lug Cast. Tab. majus, Ger.

Henophyllum vel Monophyllum, Gef. hor.  
 Cyclaminum unico folio, Dalech. in Diosc.  
 Monophyllum, Ad. Lob. Thal. Gerard.  
 Bifolium primum, Lonic.

## LAURUS ALEXANDRINA QUIBUS- dam Hippoglossum.

**Λ**ύρα, Dioscoridis l. 4. c. 12. & Hippocottion Plinij l. 15. c. 30. ubi Laurum Alexandrinam vocat, ab alijs Idæam dictam, sunt qui idem sentiant cum Lauro Alexandrina Theophrasti 3. bift. 17. Αἰθιακή, Idæa radix Dioscoridis l. 4. c. 4. Alijs Λάρα ἀριστάριον, aut ἰδαία, aut ἐνὶ ἰωλίων, Laurus Alexandrina Dioscoridis l. 4. c. 147. Alijs χαμαῖς ἀρόρον, quæ & ἀλεξάνδριον Dioscoridis l. 4. c. 149. & Laurus taxa Plinij l. 16. cap. ult. & Chamædaphne ejusdem l. 24. c. 15. Deniq; sunt qui radicem Idæam, Hippoglossum, Laurum Alexandrinam & Chamædaphnem apud Dioscoridem idem esse velint.

I. Laurus Alexandrina fructu pediculo infidente.  
 Uvularia, Brunf. (qui marem & feminam pingit, sicut & Tabernæmontanus & Gerard.) Lon.  
 Laurus Alexandrina, Brunf. Trag. Fuch. Ang.  
 Gef. hort. Eyst.  
 Hippoglossum, Matth. Dod. ut: Turn, Lac. Ad.  
 Lob. Cast.

Hippoglossum mas & femina, Ger.  
 Uvularia mas, live Laurus Alexandrina, Tab.  
 icon.  
 Uvularia femina, live Hippoglossum, Tab. 100.  
 Hippoglossum, quod à Lauro Alexandrina differt, Guil.  
 Hippoglossus, Gefn. hort.  
 Daphne Alexandrina, Fuch.

Bonifacia & Bislingua, Anguil.  
 Laurus taxa Plinij, Lugd.  
 Rusco affinis prima, Cæs.  
 Bislingua, Clus. panon.  
 Radix Idæa Dioscoridis, Colum.  
 Laurus Alexandrina Theophrasti, 2. Clus. hist.  
 II. Laurus Alexandr. fructu folio insidente.  
 Laurus Alexandrina altera, Matth. Taber.  
 Laurus Alexandrina & Chamædaphne, Guil.

Laurus Alexandrina, Lac. Lob. ad part. alt. Col.  
 cui & Chamædaphne.  
 Laurus Alexandrina vera, Lugd. Clus. hist.  
 Rusco affinis altera, Cæs.  
 Hippoglossum Matthioli, Ger.  
 Hæc folio est rotundiore, baccis in medio fo-  
 liorum impressis, nec ulla epiglottide testis:  
 illa folio est longiore, glossarijs sive ligulis do-  
 nata, baccis ex oblongis petioliis dependentib.

\*\*\*\*\*

## SECTIO TERTIA.

HEDERA; HEDERA TERRESTRIS; CYMBALAKIA; NASTUR-  
 TIUM INDICUM; BALSAMINA; NOLI ME TANGERE; ARI-  
 stolochia; Cyclamen; Gramen Parnassij; Saxifraga; Chelido-  
 nia minor; Numularia.

### H E D E R A.

**H**edera Kiosis Dioscoridi lib. 2. cap. 210. ut Theophrasto 3. hist. 18.  
 Differentias multas in specie sortitur, summas autem genere tres: nam quedam candida est, altera  
 nigra, tertia helix: candida fructum fert candidum: nigra nigrum, aut croci emulum, quam vulgus Diony-  
 sium vocat: Helix fructum non gignit, &c. Dioscorides. Sic Theophr. l. c. multigena hedera est, quædam enim  
 humi repens: quadam in excelsum se attollens: & excelsarum genera plura, sed tria summa patefunt, can-  
 dida, nigra, tertiaq; clavícula, &c. Plinius l. 16. c. 34. Hedera duo prima genera fecit, marem & saminam (per  
 marem Cistum intelligere oportet, confundit enim Cistum cum Cisso, id est Hedera) subjungit: species tres esse,  
 candidam, nigram, helicem: quæ species in alias etiam dividuntur, &c. quæ ex Theophrasto jumptis.

#### I. Hedera arborea.

Hedera, Brunf. Trag. Ang. Cord. in Diosc. Dod.  
 Cæsalp.  
 Hedera arborea, Matth. Ges. hort. Lugd.  
 Hedera nigra, Fuch. Dod. gal. Lac. Lonie.  
 Hedera corymbosa communis, Ad. Lob. Taber.  
 Gerard.  
 Hedera major, Castor.

Variat: cultu enim arborefcit, & cum ad eam  
 ætatem pervenit, in qua fructum ferre potest,  
 totam faciem mutat, nam per se erigitur, nul-  
 lum administriculum querens, & hanc Orthocis-  
 tum antiqui dicunt, quæ  
 Hedera arborea recta, Ad.

Folia mutat, ut quæ prius in plures angulos  
 desinebant, angulis oblitteratis, excepto eo qui  
 in summo est, rotundantur, maculis albis, ali-  
 quando sub rubentibus, inferne distinguuntur.  
 Baccæ maturitate nigre, raro flavæ.

#### II. Hedera poetica.

Hedera Dionysias, & Chrysocarpus, Dalech.  
 Lugd.

Dionysias aut Bacchica, quod ex ea poetarum  
 coronæ confuerentur: Chrysocarpus, à fructus  
 colore aureo: hinc folium minimè angulo-  
 sum est.

#### III. Hedera major sterilis.

Hedera Helix, Brunf. Matth. (& minor) Fuch.  
 Dod. ut: Lac. Lon. Lugd. Cæs. Cam. Tab. Ger.  
 Hedera sterilis, Anguil.  
 Hederae arboreæ sylvestre genus, Ges. hort.  
 Helix sive provolva sterilis hedera, Ad. Lob.  
 Hedera minor, quæ Helix, Castor.  
 Hederae species tertia helix vocata, Thal.

Hæc diversa ne sit ab arborea, Theophrastus  
 ambigit: Plinius concedit: at recentiorum ali-  
 qui negant, seri enim utalibet non arborefcit,  
 ob imperfectionem quandam Individui nou  
 speciei.

#### IV. Hedera humi repens.

Hederula, Trag.  
 Hedera minor in *lyce* *nos*, Dodon.

#### V. Hederaceis folijs planta.

Cyclaminos altera hederaceis folijs, Lob. Lug.

## HEDERA TERRESTRIS.

**H**edera terrestris, *ἡρμινια* & Dioscoridis lib. 4. cap. 126. si in descriptione pro *ἡρμινια*, *ἡρμινια* a Plinio videtur intelligi, sub Hedera a terra se non attollente: quibusdam Malacocissos, quod molle hedera, in Geoponicis: alij Chamaelea, quasi Clemenat humilium repens.

## I. Hedera terrestris vulgaris.

Hedera terrestris, Brunf. Matth. Dod. Lug. Cæs. Thal. Tab. Gerard.

Elatine, Brunf. 4.

Chamaecissos, Trag. Fuch. Dod. gal. Lac. Cam.

Chamaelea, Cord. hist.

Humilis hedera, Ad. corona terræ, Lob.

Malacocissos, Lugd.

Duplex est: major, quæ vulgata: minor elegantior, cauliculis erectioribus, brevioribus ut

& folijs: floribus magis cæruleis, quæ locis

midioribus circa arbores antea repens reperitur.

## II. Hedera terrestris montana.

Hedera terrestris species montana, Cam. cæs.

Priore hirsutior est, folijs majoribus & cæ-

ruleis, qui purpurascunt.

## III. Hedera saxatilis magno flore.

Afarina sterilis, Lob. ob.

Afarina sive saxatilis hederula, Ad. Lob. con.

Afarina Lobelij, Lugd.

## CYMBALARIA.

**C**ymbalaria à cymbalo nomen duxisse videtur: quibusdam Umbilicus Veneris alter censetur: at Herodotus, Barbarus, Capnon primam Plinij lib. 25. cap. 13. esse credidit.

Cymbalaria, Matth. Lugd. Cæs. Cast. vulgata, ris, Lac.

Umbilicus Veneris officinarum, Lonic.

Linaria hederæ folio, Col.

Cymbalaria Italica hederaceo folio, Ad. Lob.

Cymbalaria folijs hederaceis fl. cæruleo, Eyss.

## NASTURTIIUM INDICUM.

*Nasturtium dictum ob saporem, Indicum à loco natali.*

## I. Nasturtium Indicum majus.

Nasturtium Indicum, Dodon. Lob. Lugd. Cam.

Cast. Eyss.

Nasturtium peregrinum, quod Peruvian. Lugd.

Flos sanguineus Monardi, Lugd.

## II. Nasturtium Indicum minus.

Nasturtium Peruvianum, Monardi.

Folia habet rotunda. Lenticulæ paulo maiora.

## BALSAMINA.

**B**alsamina dicitur, quod ex pomis ipsius maris in uncturæ oleo in seculo, in solatione oleum seu Balsamum, Chirurghi vocant, ad vulnera consolidanda præstantissimum conficiatur.

## I. Balsamina rotundifolia repens, sive mas.

Balsamina, sive pomum mirabile, Trag.

Balsamina, Matth. Lac. Lugd. Cæs. alba, Gesn.

hort.

Balsamine prima, Fuch. Anguil.

Balsamina pomifera, Gesn. collect.

Charancia, Dod. ut: Lonic.

Cucumis puniceus, Cord. hist.

Balsamina cucumerina punicea, Ad. Lob. Tab.

Balsamina mas, Cam. Gerard.

Momordica, Castor.

Quibusdam Plinij l. 20. c. Cucurbita Somphos

a Cræcis appellata.

Fructus maturus colore variat, modo puniceo modo luteo rubefcente.

Balsamina mas fructu puniceo, &

Momordica fructu luteo rubefcente, Eyss.

## II. Balsamina femina.

Balsamine altera, Trag. Matth. Fuch. Ang. Cord.

hort. Cast.

Balsaminum, Dod. gal. Lon. & Charancia femina.

mina.

Balsamina, Dod. Lugdun. cum Matth. & Fuch. figura.

Balsamella, Cord. hist.

Balsamina amygdaloides, Gesn. ad Cordam.

Balsamina femina, Cam. Tab. Ger. Eyss.

Balsamina femina perficifolia, Ad. Lob.

Canance, Cæs. alp.

## III. Balsamina lutea, sive Noli me tangere.

Mercurialis sylv. altera, Trag.

Efula, Eiid. & Lugd.  
 Tirhymalus sylv. Lon.  
 Noli me tangere, Gefn. hort. & frac. (cui & Milium capreum) Cam. Tab. Eyst.  
 Perfutaria liquofa, Ad. Lob. Lugd. Cam. Thal.  
 Impariens herba, Dod.  
 Catanance altera, Cæf.

Chrysea, Lugd.

Balsamita altera, Col.

Noli me tangere & Impatiens herba dicta, propter siliquas, quæ ubi maturæ levissimo contactu dissiliunt: aliqui Æschinomenè Plinii suspicantur: quibusdam Pseudoapocynon. Flore est luteo, est & pallido.

## ARISTOLOCHIA.

**A**ristolochia Dioscoridi l. 3. c. 4. quod existimetur optimè puerperis, seu partui doloribus opitulari: hinc forte Nicandri scholiastes refert, Aristoleum herba huius inventionem mulieri tribuere. Et Plinio l. 25. c. 8. Aristolochia nomen græva dedisse videntur, quoniam esse ἀργύρεον λέγουσι: nostri Malum terra vocant.

Genera tria Dioscorides agnovit, ἀργύρεον, μακράν, κληματίδα. Plinio genera quatuor: unum tubervis radicibus rotundis: alterum radice longa: tertium longissima tenuitatis, quæ Clematidis, ab alijs Cretica vocata: quarta quæ Pistolochia, tenuiori proxima, quam quidam Polyrhizon cognominant, &c.

I. Aristolochia rotunda, flore ex purpureo nigro.

Aristolochia rotunda vera, Trag. Lon. Cam.

Aristolochia rotunda, Matth. Dod. ut: Anguil.

Cord. in Diof. Gefn. hort. Tur. Lac. Adv. Lob.

Cast. Lugd. Eyst.

Aristolochia rotunda: Clus. hisp. & hist.

Aristolochia fœmina, Lugd.

Aristolochia prima, Cæf.

II. Aristolochia rotunda flore ex albo purpureascente.

Aristolochia rotunda altera, Clus. hisp. & hist.

Anguillaria plures species inveniri scribit: verum hæc non solum colore floris, sed & folijs & fructu à priore differt.

III. Aristolochia longa vera: & Ang. Cam. Aristolochia longa, Dod. ut: Cord. in Diofcor. Gefn. hort. Ad. Lob. ico. Clus. hisp. & hist. Lugd. cum Clusij & Fuchij figura.

Aristolochia altera radice pollicis crassitudine, Cæf.

IV. Aristolochia longa Hispanica.

Aristolochia longa altera, Clus. hisp. & hist.

V. Aristolochia Clematidis recta.

Aristolochia, Brunf. longa, Trag. Matth. Fuch. Tur. Lac. Lon. Cast. Lugd.

Aristolochia longa altera, quæ Clematidis veteribus, Cord. in Diof.

Aristolochia longa vulgaris, Ang. Cam. epit. & hort. Eyst.

Aristolochia Clematidis, Dod. gal. Ang. Gefn. hort. Adv. Lob. Tab. Ger.

Aristolochia Sarracenica, Dod. Lugd.

Aristolochia Clematidis: Clus. hisp. clematidis vulgarior, Eid. hist.

Aristolochia altera radice tenui, Cæf.

VI. Aristolochia Clematidis serpens.

Aristolochia clematidis, Dod. Lugd. Cast. desc.

Belli epist. ad Clus. vel

Aristolochia Cretica.

Aristolochia clematidis altera, Clus. hisp. vel

Beotica, Eid. hist.

Aristolochia Clematidis altera Hispanica, Lob.

Flos luteus, aut ex purpurea nigricans.

VII. Aristolochia Pistolochia dicta.

Pistolochia, Dod. ut: Gefn. hort. Clus. hisp. & hist. Cam. epit. Cast. Lugd. cum Clus. & Dodon. figura.

Aristolochia polyrhizon, sive Pistolochia Plinii, Ad. Lob.

Aristolochia altera plures radices spargens, Cæf. alp.

Flos aliquando niger, aliquando ex herbido luteus.

VIII. Pistolochia Cretica.

Pistolochia altera sempervirens, Clus. hist. ap. 1.

IX. Aristolochia Maurorum.

Rhasur & Rumigi à Mauris nominata, Ravvolff. Lugd. append.

Aristolochia peregrina Ravvolffij, Clus. hist.

## CYCLAMEN.

**K**υκλάμεν Dioscoridi lib. 2. cap. 194. folijs est hedera purpureis, varijs, supra infraq; albicantibus maculis, &c. Theophrasto 9. hist. 10. Gaza suber terra reddidit, imitatum Plinium, cui lib. 25. cap. 9. Cyclaminus, nostri Tuber terra dicitur.

*Differentia: alius vere, alius autumnio floret: quibus etiam folij odoratum, alij inodora. Cyclaminum albo, luteo, tum qui autumnio floret & odoratum est. Petitionum in Junij 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.*

I. Cyclamen orbiculato folio inferne purpurascente.

Cyclaminus minor & Umbilicus terræ, Trag.

Cyclaminus, Matthiol. Dodon. gal. Cord. in

Dioscor. & histor. Gesn. hort. Lac. Turn. Lon.

Tabern.

Cyclaminus major, Cast.

Cyclaminus rotunda, Fuch.

Cyclaminus orbicularis rotundifolius, Dod.

Cyclamen vulgare, Eyslett. officinarum orbiculato folio, Panis porcinus, & Arthanita, Lobelico.

Cyclaminus flore odorato, Clus.pan. & hist.

Cyclaminus vulgaris, & Cyclam. prior, cum

icone Matth. & Lobelij, Lugd.

Cyclaminus æstivus vulgaris, Cam.

Cyclamen orbiculato folio, Ger.

Flos nunc dilutius, nunc saturatius purpurascit: albo flore rarius reperitur. Radice est aliquando maxima, & ejus species quædam, radice instar capitis arictis, Gesn. hort.

II. Cyclamen orbiculato folio inferne ex viridi pallente.

Cyclamini odorati altera species, Clus.pan.

Cyclamen odorato flore a. Eid. hist.

III. Cyclamen radice maxima folijs inferne rubentibus.

Cyclamen Romanum, Eysl.

an Cyclamen à Mutono, Clus. hist.

IV. Cyclamen folio anguloso.

Cyclamen folijs angulosis, Gesn. hort.

Cyclamen vernum, Lob. ico. Cam.

Cyclamini orbiculati tertia species, Dod.

Cyclaminus verno tempore florens, Clus. pan. & histor.

Cyclamen vernum, Eysl.

Folio est rotundiore rarius oblongiore, floribus inrensus quam in vulgari rubentibus, vel omnino albescentibus.

V. Cyclamen odoratum æstivo solstitio florens folio maculato.

Cyclamini odorati duplex varietas, Clus. hist.

Prima folijs aliquantum angulosis, albis maculis obscure averfa parte notatis: flos saturatè purpurascens. Alterius folia averfa parte viridia, averfa maculis albis manifestis, flos dilutius purpurascit, vel omnino albescit.

VI. Cyclamen hederæ folio! & Alii L. Clus. pan.

Cyclamini alia species, Dod. gal.

Cyclaminus orbicularis, Dod. alter orbiculatus, Lugd.

Cyclaminus inodoro purpurascente, Clus. hist.

Cyclaminus æstivus folio hederaceo, Cam.

Cyclamen ferotinum folijs hederaceis, Lugd.

VII. Cyclamen folio hederaceo, Cam.

Cyclaminus Byzantinus alter, tuberosus, latitudinis, tulit flores, Clus. hist.

VIII. Cyclamen radice castaneæ, Clus. hist.

Cyclaminum Constantinopolitanum, Clus. pan. & hist.

Folia prona purpurascuntibus suprà candidantibus maculis notantur.

IX. Cyclamen radice exigua.

Hermodytylus quorundam, Trag.

Cyclaminus exigua, Eyslett.

Cyclaminus montis Juliani, cujus Masera minuit, Aug.

Cyclamini exiguæ veræ species, Lugd.

Cyclaminus radice avellanæ, Clus. pan.

Cyclaminus æstivus, Eid. hist.

Cyclaminus minor, Cast.

X. Cyclamen oblonga radice.

Cyclaminus radice oblonga malo in fine a. x. o, Gesn. hort.

Cyclaminus oblongum, Eid. appe. ad.

Cyclaminus, Cam. epit. longius radice, Eysl.

Cyclaminus cujus radix digitalem crassitudinem non superat, & cubitalis est longitudo, Clus. pan.

Cyclamen odoratum, Clus. hist.

XI. Cyclamen vernum luteum.

Cyclamen luteo flore, Ang. Ad. Lugd.

XII. Cyclamen vernum album.

Cyclamen vernum flore albo, Lob. adv. part. 2.

Clus. hist. ap. alt. auct. quod folijs circumscribitur, Eid. cur. post.

XIII. Cyclamen folijs Vialaræ radice cordis effigie.

Cyclamen vernum spurium, Clus. hist.



## GRAMEN PARNASSI.

**G**RAMEN quod in Parnasso monte provenit, solum hederaceum, florem candidum, &c. Dioscorides lib. 4. cap. 2. tribuit: ubi & alterius in Cilicia nati meminit, quod incolæ *Korwar* appellant, cujus virentium ejus boves inflammentur: quid velit non assequimur.

I. Gramen Parnassi albo simplici flore.  
Gramen Parnassi, Dod. ut: Gesn. hort. Lobel.  
icon. Eylltett.  
Hepatica alba, Cord. hist.  
Enneadynamis Polonorum, Gesn. hort.  
Unifolium palustre, Gesn. collect.

Gramen Parnassi hederaceum recentiorum,  
Adv. Lob. ob.  
Gramen hederaceum, flos hepaticus, Tab.  
Gramen Parnassi minus, Ger.  
II. Gramen Parnassi albo pleno flore.  
Gramen Parnassi duplicato flore, Lob. Lugd.

## SAXIFRAGA.

**S**AXIFRAGA ab effectu dicta, cum ejus stillantia, ut & decoctum, lapides renales & frangere & pellere dicatur: ut & farina granorum ad radicem, ex decocto sumpta.

I. Saxifraga rotundifolia alba.  
Saxifraga, Brunf. major, Eid. 4. Fuch. Lac.  
Saxifraga alba, Trag. Dod. ut: Fuch. icon. Gesn.  
hort. Lugd. Thal. Cam. Tab.  
Saxifraga quatta, Matth. Cast.  
Saxifraga, Lon. alba chelidonides, Ad. Lob.  
Theligono affinis herba, Casf.  
Saxifraga alba tuberosa radice, Clus. hist.

Saxifraga bulbosa altera bulbifera montana,  
Colum.

Hæc nonnullis locis folijs est majoribus, al-  
tiusque exurgit: frequentius tamen minoribus  
est & humilior.

III. Saxifraga rotundifolia aurea.  
Saxifraga aurea, Dod. ut: Gesn. hor. Thal. Cam.  
Ger. Lugd. cum. Dod. & Lobelij figura.  
Saxifraga aurea lichenis facie, & natalitjs, Ad.  
Lobel.  
Chrysosplenium, Tab.  
Hepatica palustris, Eyllt.

II. Saxifraga ad folia bulbos gerens.

Eyysimi species Aldroando dicebatur: in hi-  
storia Lugd. Saxifragæ alpinæ figura jungitur,  
quam cum priore eandem suspicor.

## CHELIDONIA MINOR.

**C**HELIDONIA duplex habetur, major de qua supra: minor, de qua nunc. quam Dioscorides lib. 2. cap. 212. *χελιδωνία το μικρήν*, aut *πυρρον κελιδων* nominat. cujus descriptio, præter vires, nostra convenit: an forsitan ratione soli diversitas obvenit? Plin. lib. 25. cap. 13. *Struinea* censetur, quo loci de Ranunculo tragit.

I. Chelidonia rotundifolia major: in Pro-  
dromo descripta.

Lac. Lon. Guil. (an Amellus sit dubitat) Adv.  
Lob. Lugd. Cast. Thal. Tab. Ger. Eyllt.  
Malacocissus minor, Fuch. icon.  
an Ranunculus latifolius, Lugd.  
Favagello, Casf.

II. Chelidonia rotundifolia minor.  
Testiculus sacerdotis, Sylvatico.  
Ficaria & scrophularia minor, vel 2. Brunf.  
Hæmorrhoidum herba, Hier. Brunf. vic.  
Chelidonium minus, Trag. Matth. Fuch. Dod.  
ut: Ang. Cord. in Diosc. & hist. Gesn. hort. Tur.

Hujus folia aliquando macula purpurea no-  
tantur: flore est luteo simplici: rarius pleno,  
Camerario monente.

## NUMMULARIA.

**N**UMMULARIA à folijs nummi speciem referentibus dicta: alijs Centummorbia, à misifica in vulne-  
ribus medendu facultate: alijs Hirudinaria, quod hirudinis instar passim terra affixa hæreat.  
Sunt qui Nummulum Plinij lib. 28. cap. 28. censent. ubi falsò Mimulus legatur: an forisè apud Theophras-  
tum lib. 9. cap. 14. *εραυδία* vocat, Rubiam Gazæ vertit.

I. Nummularia major lutea.  
Serpentaria 3. & Centummorbiu, Brunf.  
Nummularia, Trag. Matth. (& Lunaria minor)  
Fuch. Dod. ut: Gesn. hort. Lon. Adv. Lob. Lugd.  
Cast. Casf. Cam. Tab. Ger. Eyllt.

Centimorbia, Gesn. Turn.  
Hirudinaria minor, Tab.  
Ratione soli variat: hortensis per omnia ma-  
jor, sylvestris contra: hinc duæ icones a pud Tab.  
Hirudinariæ majoris & minoris: & apud Ger.

Numulariæ, & Numulariæ minoris, nomine.

II. Numularia minor purpurascens colore, quæ in Prodro-mo describitur.

\*\*\*\*\*

## SECTIO QUARTA

CUCUMIS; MELO; PEPO; MELOPEPO; ANGU-  
RIA; CUCURBITA; COLOCYNTHIS;

CUCUMIS ASININUS.

### CUCUMIS.

**E**t si *Σκιν* nomen apud Græcos (quemadmodum Cucumeris apud Latinos) generale sit omnium priorum fructuum videlicet Peponum, Melonum, Cucumerum, Anguriarum & cæterorum eumque præterea, ut Guilandinus quoque notavit, attramen *Σκιν* habet Dioscoridi l. 2. c. 163. Theophrasto l. 9. c. 2. 3. *ακιν*, & *κιν*ov, Cucumer Plinio l. 19. c. 5. Cucumem Varro a curvare, quasi Curvimer dictum.

Genera duo Dioscoridi & Theophrasto, sativa & sylvestris: sativa, inquit Theophrastus, partim fructu esse existimant, ut & Cucurbita, partim negant: sed in uno eodemque genere, alias meliores, alias deteriores, existimant. Cucumerum tria genera notant, Laconicum, Scythicum, Boeoticum. Plinius l. c. de Cucumeris affert Melones, Cucumeres & Angurias complectitur: admonens, ea forma qua cogantur crescere, si flores, subito demisso, nira longitudine nasci: subjungens, Græcos Cucumerum tria genera fecisse Laconicum, Scythicum & Boeoticum: sic de sylvestri l. 20. c. 1. & de angurino sive erratico l. 20. c. 2. egit.

#### I. Cucumis sativus vulgaris.

Cucumis sativus, Brunf. Matth. Fuch. Dod. gal. Lon. Cast.

Cucumis, Trag. Ang. Tur. Lac. Fracast. Tab.

Cucumis vulgaris, Dod. Ger.

Cucumer sativum, Cord. in Diof.

Cucumis sativus & efculentus, Ad. Lob. Lugd.

Citreolus vulgo, Cæs.

Cucumeres virides, albi, longi, recurvi: læves, asperi: Alijs Sycios Galeni, alijs ejusdem Melo-pepon. Fructus maturus subluteus est: habet & torus albus.

#### V. Cucumis sativus major.

Cucumis Turcicus, Fuch. Tab. Ger.

Cucumis ex Hispanico semine natus, Tab. Ger.

#### III. Cucumis flexuosus.

Cucumis longus, Matth. Lugd. oblongus, Dod.

Cucumis anguinus & tortilis, Lac.

Cucumis anguinus, Ang. Gefn. col. Lugd. anguina, Tab. Ger.

Cucumis flexuosus, sive anguinus, Adv. Lob.

Cucumis sativus 2. Cast.

Citreolus alter forma anguis, Cæs.

Hujus species habetur fructu curvato.

Sic in regno Congiano insignis magnitudo, & suavitatis habentur: part. 1. Ind. Or. l. 2. c. 1.

#### IV. Cucumis pyramidalis.

Cucumer minor pyramidalis, Tab. Ger.

#### V. Cucumis Aegyptius rotundifolius.

Chate Aegyptiis, cucumerum genus, Alpin.

### M E L O.

**C**ucumerum genera censentur Pepones & Melo-pepones, potissimum figura & quantitate distincta. majores enim & oblongi, Pepones: mali effigiem referentes, Melo-pepones nomine ex Melone & Pepono composito dicuntur. Hoc genus Palladius Melones, quasi *μῆλον*, id est pomum, à malorum figura appellavit, quod nomen adhuc in usu est. Sicq; tria Cucumerum genera statui possunt, Cucumer, Melo & Pepo. At Melonem Theophrasto Sycion: Plinio, Cucumem mali cotoneis effigie, Melo-pepo Galeni: forte Cucumis antiquiorum.

#### I. Melo vulgaris.

Melo, Brunf. Trag. (& Melo-pepo) Lac. Tab. Gerard.

Pepo, Matth. ico. Fuch. Lugd. Cast.

Pepo, grandis Melo, Cord. hist.

Cucumis Galeni & antiquorum, Dod. gal.

Melo vulgaris, Melo-pepo in Græcia, Guil.

Melo sive Melo-pepo vulgi, Cucumis Gal. Dod.

Melo vulgi, sive Cucumis antiquorum, Melo-pepo Dioscoridis, Ad. Lob.

Melon vulgo & Pepon, Sycion Theophrasti,

Melo-pepon Galeni, Cæs.

Melo-pepo, Gefn. hort. Lon. Lugd.

Variat fructu, nunc oblongo, aliis com-  
tore rotundioris figuræ, alias modice de-  
& sessili. Subinde majore, scilicet

Melobolus, Tab. & Ger. quandoq; minore.  
Cort. alijs, asper, rugosus & tuberosus: & hic est  
Pepo iltrumofus, Ad.

Alijs lævis: nunc viridis, nunc cinereus, nunc  
pallidus, nunc varius. Pulpa, alijs rufa, alijs can-  
dida & vires: eaque quibufdam fuavior, qui-  
busdam moschi odore, quibul Cordus & Do-  
dona moschi odore, tum Neapolitani, quorum se-  
mina adeo tenui crustula teguntur, ut excorti-  
cata videantur, Gymnospermi appellati: deni-  
que pili.

II. Melo rotundus parvus.  
Melo rotundus caratus, Lob. ac. saccharinus, Tab. Ger.  
Datur aurei, parvi, in niodium pomorum A-  
ntiorum, Cam. vel ut Cæs. mali rosei magni-  
tudine. Meminit & Garzias Melonis genus in  
Hispania, quod Budiecas vocent.

III. Melo pyriformis noster hatus.  
Melo Saccharinus variegatus, Eyst  
IV. Melo pyriformis.

## P E P O.

**P**epo Dioscoridi l. 2. c. 164. Theophrastus l. hist. 22. & Plinius l. 2. c. 2. de Peponibus, quia Dioscorides re-  
fert: qui l. 19. c. 5. scribit, Cucumeres cum magnitudine excesserunt, Pepones vocari. Viduum volunt à no-  
tâ non à xîndu maturefcere, eò quod maturitate flavescent.

I. Pepo oblongus.  
Pepo, Brunf. Lon. c. alt. Camer.  
Pepo magnus, Dod. gal. Ges. hort.  
Pepo major oblon. Dod. max. oblong. Tab. Ger.  
Cucumis Pepove oblongus, sive ovalis vulga-  
tissimus, Ad.  
Pepo oblongus, Lob.  
Melo seu Pepo oblongus, Cæs.

Variat magnitudine: hinc acud Tab. duæ fi-  
gurae, Peponis maximi oblongi, & Peponis In-  
dici minoris oblongi: & apud Ger. qui poste-  
riorem Peponem minorem sylv. vocat.

II. Pepo compressus major.  
Pepo maximus Indicus compressus, Lob.  
Pepo rotundus major, Dodon.  
Melo sive Pep. modicè depressa & sessilis, Cæs.  
Corticis colore & substantia variat: qui e-  
nim albedo est colore, substantia est molliore:  
qui obscure virescente duriore.

III. Pepo compressus minor.  
Cucumis seu Zucco marinus, Trag.  
Cucumer marinus, Fuch. Tur. Lonic.  
Pepo rotund. Dod. gal. Ges. h. rotund. min. Dod.

Pepo melo, Tab. Gerard.

V. Melo Ægyptius.

Abdellavi Ægyptiorum, Melones à nostratibus  
diversi, Alpin.

VI. Melonis Ægyptij alterum genus.  
Chajar, Melonum genus apud Ægyptios, Alp.  
VII. Melo Indicus fructu oblongo.

Batie Indi, sive Indicus Melo, Garzias.  
Parecas, Anguria, sive Melo Indicus, Linsc. par.  
4. Ind. Or. c. 10.  
Melones aquatici in Java, Batiec in universa  
India: par. 4. Ind. Or. c. 6. & fig. 20.  
an Comolanga, Lud. Romani, Clus. in Garz.  
Scalig. Lugd.

VIII. Melones Peruani.  
Melones in valle Peruana tanta felicitate pro-  
veniunt, ut radix caudicis cassitudinem asse-  
quatur & viva aliquot annis in solo vigeat, non  
quotannis Melones profert, cujus luxuries non  
fecus ac cæterarum arborum amputatur: Jo-  
seph. Acosta l. 4. c. 19.

IX. Fructus Melonum similis, cortice duro  
vestitus, in Java, Linsc. par. 3. Ind. Or. c. 10.

an Cucurbita rotunda Italica, Lugd.  
Corticis colore variat, qui est croceus, luteus,  
citrinus, niger.

IV. Pepo rotundus Melonis effigie.  
Pepo oblongus, rotundus, luteus, viridis, Trag.  
Pepo sylv. Dodon.  
Pepo rotundus compressus Melonis effigie, Ad.  
Lob. Lugd.

Pepo Indicus minor rotundus, Tab. Gerard.  
V. Pepo rotundus Arantij forma.  
Cucurbita Arantij forma, Eyst.

VI. Pepo minor clypeatus.  
Pepo Indicus minor clypeatus, Taber.  
Pepo Indicus fungiformis, Ger.

VII. Pepo minor angulosus.  
Pepo Indicus minor angulosus, Tab. Ger.  
Huc & Pepo minor Indicus 4. Tab. referendus.

VIII. Pepo Virginianus.  
Macocqver, peponib. melonibus & cucurbitis  
valde similis: cujus unum genus menitru: a lte-  
rum bimestri spatio maturefcit: descr. Virgini.  
Macaqver Virginensium, Clus. ex. l. 2. c. 2. &  
part. 1. Ind. Occid.

## M E L O P E P O .

## I. Melopepo clypeiformis.

Pepo latus, Dod. gal. latioris fructus, Eid. Gef. h.  
 Cucumis Pepove latior clypeiformis, Ad.  
 Melopepo latior clypeiformis, Lob. icon.  
 Cucurbita laciniata Dalech. Lugd.  
 Cucurbita fessilis, Gef. append.  
 Melopepo clypeatus, Taber.

Pepo maximus clypeatus, Gerard.

## II. Melopepo compressus.

Melopepo, Anguil.  
 Melopepo compressus alter, Lob. icon. com.  
 sus, Tabern.  
 Pepo maximus compressus, Gerard.  
 III. Melopepotes: & Lob. & Tab.  
 Pepo maximus rotundus, Gerard.

## A N G U R I A .

**A**nguria voce, primum Actium usum esse volunt: aliàs Citrullus, à citreo colore dicitur. *Exponitur Dalech. scoridus, Galeni & Pliny, & Arabum Bastecha esse volunt.*

## I. Anguria Citrullus dicta.

Citrullus, Trag. Gef. hor. Lon. Tab. officinarum, Ad. Lob. Ger.  
 Anguria, Matth. Ang. Lac. Gef. col. Dod. Lugd.  
 Cast. Camer.  
 Cucumer vel Cucumis citrullus, Fuch. Dod. ut:  
 Gef. hor. Turn.  
 Cucumer vulgò, Cæs.  
 Corticis colore variat, qui alijs viret, alijs sub-  
 candidis maculis aspersus: caro alijs, rubens &  
 dulcior, alijs candida. Semina colore nigro, ru-  
 bro, fulvo: rarius semine caret, ut Cæs. notavit.

## II. Anguria carne lignosa.

Cucumeris vulgo dicti genus quoddam (sive) a-  
 stre, carne intus lignosa, atq; aden dorsum pili-  
 modo resiliat, nec frangatur projectum, Cæs.

## III. Anguria Ægyptiaca.

Anguriæ nostratibus majores, cortice, carne,  
 quæ intus semina tantum & aquam dediti-  
 mam continent, Alpin.  
 an Dullaha Arabum, Cæs.

## IV. Anguria Brasiliiana.

Citrullæ rotundæ, Maurongaus nomine: Le-  
 rio cap. 12.

## C U C U R B I T A .

**K**olínov & Αλίδιμ & Dioscoridi l. 2. c. 162. dicitur, ad differentiam πολύνου θήκη, de qua l. 4. c. 1. me-  
 minit: & Theophrastus l. hist. 8. Latine, Cucurbita à concurratu, quod facile siquid ob-  
 extendatur, incurvescat.

Genera duo prima Cucurbita Plinio l. 19. c. 5. Camerarium & Eleleum quod hunc reperit: refert quæ o-  
 gitur forma, libertate vero pensili concessa, jam visa est novem pedum longitudo. Ser-  
 fuerint, proceras pariunt: quæ in medio, rotundas: quæ in lateribus, crassas brevioresq;

Calabasis seu Cucurbita in India ad miraculum usq; augefcunt, quæ in hac sola provincia Cbile nasci un-  
 tur & Capallos nuncupantur: Cucurbitarum species prope infinita sunt, quadam immensa mole monstra-  
 sunt, quæ dissecta & resiccata excavantur & ex ijs varia vasa effinguntur: ex minoribus pocula, aut paten-  
 ingeniose calatas concinnant: Joseph. Acosta l. 4. c. 9.

Sic Brasiliiani ex Cucurbita liquidam pulcem, Mingau vocatum sorbent: St ad. def. Brasil. l. 2. c. 12.

## I. Cucurbica major fessilis, flore albo.

Cucurbica cujus fructus in orbem collectus in-  
 tumescit, Trag.  
 Cucurbita fessilis, Matth. epit.  
 Cucurbica major, Fuch. Tur. latior, Dod.  
 Zucca rotunda, Anguil.  
 Cucurbita Cameraria major, Dod. gal. Lugd.  
 Cucurbita fessili fructu, Cord. in Diof.

Variat magnitudine, colore corticis, viridi,  
 flavo, candido, maculoso: aliquando sulcis di-  
 stinguitur: quædam tuberosa est.

## II. Cucur. major rotunda fl. luteo folio aspero.

Cucurbita Indica, Matth. Cast.

## Zucca major rotunda, Cord. hist.

Cucurb quam Zucca marin. Itali vocant; Gef. h.  
 Cucurbita rotunda, Cæs. alp.  
 Cucurbita Indica rotunda, Lugd.  
 Cucurbita Indica major & minor, Tab.  
 Citrullus major, & Pepo major fyl Ger. icon.

Varia hujus genera, magnitudine, facie, & co-  
 lore differentia: earum namq; quoddam genus  
 est, quod utrisq; ulnis vix amplecti potest, & in  
 insula S. Laurentii, ejusmodi colore rubro fla-  
 vo, albo & saporis longè gratioris atq; nobil-  
 res, ubertim proveniunt. Palud. in novis a. d.  
 Scot. lib. c. par. 2. Ind. Or. c. 5.

III. Cucurbita lagenaria fl. albo, folio molli.  
Cucurbita, Brunf. prior, Dodon.  
Cucurbita minor, Fuch. Dod. gal. Turn.  
Cucurbita plebeja, Gef. hort.  
Cucurbita lagenaria, L. ob. Cast. Gerard.  
Cucurbita lagenaria major & minor, Ad. Tab.  
Cucurbita Cameraria minor, Lugd.

Variat fructus, quandoq; lagenarum forma,  
aliquando ventricosa absque collo pyriturbi-  
nari figura.

IV. Cucurbita lagenaria Americana.

Cucurbitularum ex quibus Americani lague-  
nulas conficiunt, Americus Vesputius navig. 2.  
meminit, quas viri de collo suspendunt, qua-  
rum una herbâ plena est quam mandunt: al-  
tera farinâ, quam bacillo madefacto, herbæ as-  
pergunt.

an Lagenulæ Americanæ è fructu è mari Au-  
strali, Cluf. ex. l. 2. c. 8.

Sic in regno Congo, in Cucurbitis aquam ad-  
ferunt: par. l. Ind. Or. l. 2. c. 1.

V. Cucurbita oblonga flore albo, folio molli.  
Cucurbita fructu oblongo, Trag. Cord. in Diosc.  
Cucurbita oblonga, Fuch. longa, Tur. Lon. Cast.  
Tab. Cam. longior, Dodon.  
Cucurbita anguina, Dod. gal. Gerard.  
Zuccha longa, Anguil.

Cucurbita, Gef. hort. sativa longa, Cæf.

Cucurbita sive Zuccha, Ad. omnium max. na  
anguina, Lob.

Cucurbita Cameraria longa, Lugd.

Falcata figura sæpe crescit, quædam cervi-  
cem tantum recurvam habent: quædam recti-  
tudine servata bicubitalem, etiam tricubitalem  
longitudinem acquirunt.

VI. Cucurbita capitata.

Cucurbita quædam sessilis alba lata, ab altera  
parte compressa, Gef. hort.

Cucurbita capitata, Taber.

Cucurbita fungiformis, Gerard.

Cucurbita stellata sive sessilis, Camer.

VII. Cucurbita verrucosa: & Lugd.

VIII. Cucurbitæ parvum genus, fructu pu-  
gni magnitudine, cortice rubro, maculis asper-  
so, & semine rubro, Joh. Bauhino.

IX. Cucurbitacei generis semen spadiceum.  
Fructus alicujus sem. 19. Gareti, Cluf. ex. l. 2. c. 16.

X. Cucurbitis non absimilis fructus, Brasili-  
anus.

Fructus in sylvis cucurbitæ forma non absimi-  
lis, sed longè amplior, quos frustatim concid-  
unt, in aquam conjiciunt, baculo spumam ex-  
citant, qua pro sapone utuntur, Lærio desc. Bra-  
silix sive par. j. Ind. Occid. c. 17.

## COLOCYNTHIS.

**K**ολοκύνθισ αὐτὸ καλῶντο οἱ γῆς, αὐτὸ οἰκία πικρά, αὐτὸ καλῶντο οἱ Ἀλφειοὶ δῆλον, Dioscoridi l. 4. c. 178. Cu-  
cubita sylvestris, Colocynthis dicta, qua minor sativa. Plinio l. 20. c. 3.

Genera varia habentur: alia minor fungosa & levis, quæ officinarum est: alia major, oblonga ac flava;  
alia candida: alia rotunda varia: alia sessilis, nigra, maculata, magna instar Cucurbitæ: & alia ab hac dis-  
ferens etiam sessilis, sed minor, alia denig, turbinata.

I. Colocynthis fructu rotundo major.

Cucurbita agrestis, Brunf.

Colocynthis vera, Trag.

Colocynthis, Matth. Ang. Cord. in Diosc. (& Cu-  
cubita deserti) Gef. hort. (& Cucurbita sylv.)  
Lac Lon. Ad. Lob. (& Cucurbitula amara) Lug.  
Cast. Gam. Gerard.

Colocynthis prima, Dod. gal. mas, Taber.

Colore est viridi, magnitudine utramq; ma-  
num replente.

II. Colocynthis fructu rotundo minor.

Colocynthis fungosa & levis, Cord. hist.

Colocynthis minor, Gef. append.

Cucurbita sylv. fructu rotundo minor, Cæf.

Colore est flavo, hujusq; medullâ aridâ offi-  
cinæ utuntur.

III. Colocynthis oblonga.

Colocynthis grandis oblonga, Cord. hist.

Colocynthis grandis candida solo colore ab  
oblonga differens, Eid.

Variat colore: alia enim primùm viridem  
colorem in cortice ostendit postea maculis can-  
dicantibus conspergitur, postremo totus in lu-  
teo pallet, sitque durus & lignosus: alia princi-  
pio virescit quidem, sed mox albicantibus macu-  
lis aspergitur, at in maturitate totus albicat.  
Cordus in sua historia differentias sex propo-  
suit, & ex eo Lugd. histor.

IV. Colocynthis pyriformis, seu Pepo amarus.

Colocynthis Germanica, Trag.

Colocynthis 2. Dod. gal. femina, Taber.

Colocynthis turbinata, Cord. hist.





IV. Malva hederaceo folio.

Malva quarta, Matth.

Malva hederacea sive montana, Eid. ep. Cast.

Malva major tertia, Lugd.

V. Malva folijs crispis.

Malva species sinuosa, Cord. in Diosc.

Malva sativa laciniosa, Eid. hist.

Althæa crispa & major, Gesn. hort.

Malva crispa, Gesn. hort. Dodon. Camer. Taber.

Ger. Eyst.

Malva crispatis oris, Lob.

Flos est albicans, modò roseus.

VI. Malva folio vario.

Malva trimestris vel pumila, Clus. hist.

VII. Malva rosea folio subrotundo.

Malva sativa antiquorum: quæ cultu arbore-

scit, Theoph. Malope, Plinij.

an Anadendromalache, Galeni.

Malva hortulana, Brunf.

Malva sativa major, Eid. 4.

Malva hortensis, Trag. Fuch. Tur. Dodon. Lon.

Gerard.

Malva sativa, Dod. gal. Ang.

Malva major Matth. arborea, Eid. 4. sive hor-

tensis, Tab.

Malva Romana, Gesn. hort.

Hastula regia, Eid.

Malva major unicaulis, Matth. Cast.

Malva rosea fruticosa, Adv. Lob. rosea simplici

flore, Lugd.

Malvæ alterum genus, Cæs.

Flores candidi, rubentes, modò saturatiùs,

modò dilutiùs, aliàs purpuræ modo relucen-

tes: & ex rubronigricantes: quare

Malvæ hortensis flore simplici albo: flore

simplici incarnato: flore simplici rubro, ping-

tur ab Eyst.

VIII. Malva rosea folio subrotundo, flore pleno.

Malva Romana multiplex, Trag. Gesn. hort.

Malva rosea multiplex, Lob. Lugd. Tab.

Malva hortensis multiplici flore, Dod.

Malva major unicaulis multiplex, Cast.

Flos colore variat, albo, incarnato, rubro,

punico, nigricante, hinc tres figuræ apud Tab.

& Gerardum, & in horto Eyst. quatuor.

Malva arborea multiflora, Tab.

Malva hortensis multiplici flore, Gerard.

Malva arborea flore nigro multiplici, Tab. &

Gerard.

Malva rosea multiplex, Tab.

Malva purpurea multiplex, Ger.

Malva rosea multiplex flore albo: flore incar-

nato: flore pleno atrogubente: flore pleno

rubro, Eyst.

IX. Malva rosea folio ficus.

Malva rosea simplex peregrina, Tab. Ger.

X. Malva folio ficus altera: quæ prima in

Prodromo.

XI. Malva arborea Veneta dicta parvo flore.

Malva major altera, Matth. Lugd.

Malva arborea, Matth. epit. icon. Cast. & major

unicaulis, Matth. epit. desc.

Malva arborefcens, Gesn. hort. Dodon. Camer.

Cæs. Eyst.

an Malva arborea sylv. Adv.

Flos est cæruleus, nec multo major quàm

Malvæ equinæ flos sit: Malva arbor Plinio.

XII. Malva Syriaca.

Cobes Malvæ species, Cam.

## A L T H Œ A.

**A**λθία, αλθία, quæ in sylvestrium malvarum genere est: Dioscoridi lib. 3. cap. 163. sic dicta ab αλθία quod remedium, vel αλθαίνω medendo, quod hujus multiplex usus sit: hinc Dioscoridi, quod inter primas utilis sit. & πάλιστος, pluribus remedijs polleat: & Plinio lib. 20. cap. 21. ab effectu excellentia nominata, quæ à quibusdam Aristalthea dicatur.

Genera: unum solum meminere, ut & Theophrastus 9. hist. 15. ubi Gaza Hibiscum reddidit: at 9. hist. 19. florem melinum tribuit.

I. Althæa Dioscoridis & Plinij.

Althæa, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dodon. ut:

Turn. Lac. Cord. in Diosc. & hist. (& Malva pa-

lustris) Gesn. hort. Lon. Adv. Lob. (& Hibiscus)

Lugd. Cast. Tab. (& Bismalva) Ger.

Althæa sive Malvaviscus, Ang.

Malvæ agrestis genus, Gesn. hort.

Malva sylv. prima, Cæs.

Althea vulgaris, Camerar. Thal. Clus. hist. or.

Eystett.

Flores candidi, aut ex albedo dilute purpurascetes.

II. *Althæa flore majore.*

*Althæa pannonica secunda, Clus.pan.& tertia, in hist.*

*Althæa Thuringiaca Cam.Eyft.*

III. *Althæa laciniato folio.*

*Althæa tertia, Clus.pan.Pannonica quarta, Eadem hist.*

IV. *Althæa frutescens folio rotundiore incano.*

*Althæa frutex, Clus.hisp.Lob.Gerard.prima, Clus.hist.*

*Althæa arborefcens Clusij, Tab.*

*Althæa lignosa Dalechampi, Lugd.*

*Althæa altera ad Malopen accedens, Cæf.*

*Althæa fruticans Hispanica, Eyft.*

*Gallica majore est quàm Hispanica flore.*

V. *Althæa frutescens folio acuto parvo flore. Althæa arborea Olbiæ in Galloprovincia, Ad. Lob.ico.*

*Althæa arborefcens, Cam.Tab.Ger.*

*Hæc cum quarta eadem non est, licet Lobelius*

*vera, sed distinguenda, ut recte Confias scrip.*

VI. *Althæa frutescens Bryoniae folio, et Prodromo describitur.*

VII. *Althæa palustis: & Lugd.Tab.Ges.*

*Althæa palustis cythini flore, Ad.Lob.*

*Althæa hortensis sive peregrina, Dod.*

*Sida vulgo, Camer. & Theophrasti 4. Hist. u. censetur.*

*Flore est albo & subrubeo.*

VIII. *Althæa Theophrasti flore luteo.*

*Althæa altera, sive Abutilon Avicennæ, Ad.*

*Ibiscus Theophrasti, Dod.gal.*

*Althæa Theophrasti, Gesn.hort.Cæf.Lugd.&*

*Althæa altera, Eid.*

*Althæa peregrina, Gesn.hort.*

*Althæa luteis floribus, Ad.Lob.Ger.*

*Abutilon, Ang.Dod.Castor.Camer.Avicennæ, Eyflett.*

*Malva Theophrasti, Tab.*

IX. *Althæa Theophrasti similis.*

*Abutilon Indicum, Cam.*

*Flos magnitudinis rosæ sylv. albicans, interius luteus.*

## A L C E A.

**A** *Alcea* Dioscoridis lib. 3. cap. 164. forte sic dicta ab ἀλνῶ, auxilio vel remedio, cum enim radices Dyfentericæ & ruptæ auxilio sint. Plinio lib. 27. cap. 4. *Alcea*. Genet. sylvestris sive *Malvarum* Dioscorides, qui unus meminit, adscripsit.

I. *Alcea vulgaris major.*

*Alcea & herba Simeonis, Brunf.*

*Alcea, malvæ rosæ sylv. genus, Trag.*

*Alcea, Matth. Fuch. Dod.gal.Cord.in Dioscor.*

*Gesn.hort. Lac.Lon.Lugd. qui duas figuras habet, Cæf. Tab.*

*Cannabis sylv. & Herba Ungarica, Ang.*

*Alcea vulgaris, Dod. Adv. Lob. Lugdun. Cam. Clus.hist. Eyft.*

*Malvæ agrestis genus, Gesn.hort.*

*Malva verbenaca, Ger.*

*Alcea est Dioscoridis & Plinij: quibusdam*

*Cannabis sylv. Dioscoridis lib. 3. cap. 166. alijs Malva Theophrasti.*

*Folij variat, acutioribus, rotundioribus, hirsutioribus, lævioribus: flore est ex rubro roseo, vel candidiore.*

II. *Alcea vulgaris minor.*

*Dens leonis & Malva querna, Lon.*

*Alcea minor Dalechampi.*

*Folij est in longas lacinias divisus.*

III. *Alcea folio rotundo laciniato.*

*Alcea peregrina, Clus.hist.*

*Malva montana, sive Alcea rotund folia laciniata, Col.*

*an Alcea tenuifolia Cordi, Thal.*

IV. *Alcea Pannonica & Alcea tenuifolia, Cam. quid?*

V. *Alcea cannabina.*

*Alcea, Ang.*

*Alcea fruticosior, Adv. Lob. pentaphylla sive cannabis sylv. Dioscoridis, Eid. ico.*

*Alcea fruticosa cannabino folio, Clus.hist.*

*Alcea altera, Cæf.*

*Alcea cannabina, Cam.*

*Alcea fruticans, Eyft.*

*Hæc nomenclaturæ ægyptiæ, Cannabis sylv. Dioscoridis lib. 3. cap. 166. videtur.*

VI. *Alcea arborefcens Syriaca.*

*Alcea arborefcens, Rauv. Cam.*

*Althæa frutex 2. Clus.hist.*

*Ketmia Syrorum quibusdam.*

Alcea Syriaca, Eyft.

Hujus flores è rubro purpurascunt, at vetustate ad cæruleum colorem vergunt: habetur etiam flore candido, quæ

Alcea Syriaca flore candido, Eyft.

Hujus & altera species minore flore, quæ

Althæa frutex tertia, Clus. hist.

VII. Alcea vesicaria.

Alcea Veneta, Trag. Dod. gal. Lugd. Eyft.

Alcea Bononiensis, Gesn. hort.

Hypecicum, Matth. (malè sic dicitur Guil. monente) Lac. Lugd. Cæs. Cast.

Hypecicum alterum spurium, Gesn. hort.

Alcea peregrina, Gesn. hort. Tab. Ger. lolisæqua, Adv. Lob.

Alcea vesicaria, Dod.

Malva Venera, Gesn. hort. Lon.

Herba Ungarica, Lon.

VIII. Alcea hirsuta.

Alcea villosa Dalechamp. Lugd.

an Alcea minor in sylvis folijs Geranij, Cæs.

IX. Alcea Indica magno flore.

Sabdariffa, Lob. Dod. Lugd. Camer. Tab. Ger. Eyflett.

Alcea Americana, Clus. hist.

Folij s. ludit, prima aliquando integra, communiter in tres lacinias divisa: aliquando instar foliorum Elleborastri in septenas profundas lacinias secta observavimus.

X. Alcea Indica parvo flore.

Exotica malvacea, Bamia Eben quibusdam, Advers.

Trionum Theophrasti, Rauvv. Lugd. ap.

Sabdariffa alia, Lugd.

Bamia, Alp. Cam. Belli ep. s. ad Clus.

Bamia Alexandrina, Cæs. Cast. ap.

Alcea Ægyptia, Clus. hist.

XI. Alcea Ægyptiacæ affinis.

Fructus is. e. navigat. Batau. Clus. ex l. z. c. 15.

XII. Alcea Indica parvo flore altera.

Bamia Ægyptiaca siliqua decagona, cum in alijs pentagona duntaxat, Clus. hist. ap. alt. ad lib. 4.

XIII. Alcea Ægyptiaca villosa.

Abelmosch Ægyptiorum, sive Abutilon Avicennæ, Ponæ ital.

Belmosch Ægyptiorum nomine ex Creta ab Honorio Belli acceptimus.

## C O R C H O R U S.

**C**orchori duplici Plinius meminit: alterius lib. 25. cap. 13. Anagallidem intelligens: alterius lib. 21. cap. 15. inter herbas sponte nascentes & in cibo usitatas: & lib. 21. cap. 32. Alexandrinorum cibum, convolutum folijs ad similitudinem mori, &c. Et Alpino, faculrate similis est Althæa & Ægyptijs in cibo nil similitudinis, aut gratius. Et Judæi colla folia cum carne edunt, quæ sapore acetosa prædite sunt, annotante Rauvvolfio in suo Hodeporico.

Corcoros Plinij, Lob. Lugd.

Olius Judæicum Aricennæ, quibusdam & Mo-  
lusci Arabum, Rauvvolfio.

Corcorus sive Melochia, Cam.

Melochia, Alpini.

## G E R A N I U M.

**I** Epithymum Dioscoridi lib. 3. cap. 131. à gruini capitis imagine, in summo ejus cacumine visenda, nomen habet: at recentiores, à ciconia rostri effigie, Rostrum ciconia nominant. Geranium, & aliquibus Myrrhis, alijs Mercurijda (rectius Myrrhida) Plinio lib. 26. cap. 11.

Genera duo Dioscoridi: alterum folijs Anemones, alterum folijs Malva. Plinio tria sunt: primum simile cicuta, folijs minoribus, saporis & odoris jucundi: subiungit ex Græcorum sententia, alterum folijs Malva, & tertium Anemones.

Geranium Anemones folio rotundo.

I. Geranium batrachoides folio Aconiti.

Geranij species tertia, Gesn. hort.

Geranij majoris species prima, Eid. ap.

Geranium 2. vel batrachoides alterum, Clus. pan. & hist.

Geranium sive batrachium cæruleum, Tab.

Geranium batrachoides, Ger.

Variat flore cæruleo, albo, albo lineis cæruleis variegato: est & flore cæruleo duplici, sed duplo majore, & dicitur

Geranium batrachoides cæruleum, &c.

Geranium batrachoides flore albo, Eyft.

Rr 3 II. Ger-

II. *Geranium batrachioides hirsutum*, flore atrorubente.

an *Gerani* majoris species 2. Gesn. ap.

*Geranium primum pullo flore*, Clus. pan. & histor.

III. *Geranium batrachioides odoratum*.

*Geranium montanum*, Gesn. col.

*Geranium batrachioides alterum*, Dod.

*Geranium batrachioides longius radicum*, Lob. Lugd.

*Geranium macrorhizon*, Cam. Eyf.

*Pes columbinus in sylvis nascens alter*, Cæf.

IV. *Geranium sanguineum maximo flore*.

*Sanguinaria radix*, & *Geranium* 3. Trag.

*Geranium alterum majus*, Gesn. hort.

*Geranium hæmatodes*, Dod. gal. Lugd. Clus. pan. Thal. Cam.

*Geranium sextum*, Fuch. Tur. Lac. Lon.

*Geranium gruinum sanguinale hæmatodes* supinum radice reptice, Lob. ico.

*Geranium 7. hæmatodes*, Clus. hist.

*Geranium sanguinarium*, Eyf.

V. *Geranium batrachioides*, Gratia Dei Germanorum, Lob.

*Geranium quartum (sanguinariæ radices species)* Matth. Lugd. Cast.

*Geranium 5. Fuch. Lac. Lon. sextum*, Tur.

*Geranium batrachioides*, Dodon. Camer. Thal. Lugdun.

*Geranium batrachioides sive magnum cæruleum*, Adv.

*Geranium batrachioides primum*, Clus. pan.

*Geranium sanguinarium*, Tab. majus, Eyf.

*Geranium tertium batrachioides majus*, Clus. histor.

Duplex est: grandius floribus cæruleis aut albis, & quidem eodem loco: minus, rubris.

VI. *Geranium batrachioides flore variegato*.

*Geranium Anglicum variegatum*, Eyf.

XII. *Geranium batrachioides*, Collum gruis Germanorum.

*Geranium quartum*, Fuch.

*Gruinalis*, Dod. Lugd.

VIII. *Geranium montanum fuscum*.

*Geranium montanum*, Dod.

*Geranium fuscum*, Lob. Lugd. Eyf.

*Geranium maculatum*, Tab. sive fuscum, Ger.

IX. *Geranium tuberosum majus*.

*Geranium primum*, Matth. Ang. Lugd. Cast.

*Geranium bulbosum Matthioli*, Tab.

*Geranium tuberosum da radice Dioscoridis*, Clus. hort.

*Geranium tuberosum*, Dod. Lugd. vel 10 Tab.

*Geranium tuberosum minus*, C. m.

*Geranium bulbosum*, Dioscoridis, Cam. Adv. Lob.

X. *Geranium tuberosum minus*.

*Geranium tuberosum minimum*, Cam.

XI. *Geranium radice grumosa*.

*Geranium tertium*, vel bulbosum Pet. & Clus. pan.

*Geranium 4. vel bulbosum*, Eid. hist.

XII. *Geranium nodosum*.

*Geranium quintum nodosum Plateau*, Clus. hist.

*Geranium sextum tuberosum Plateau*, Lob.

an *Geranium sive batrachium cæruleum*, Tab. an *Geranium batrachioides*, Ger.

XIII. *Geranium parvum folis ratis*, Clus. hist.

*Geranium 8. vel Salmaticense folstratum*, Clus. hist.

XIV. *Geranium argenteum alpinum*.

*Geranium alpinum longius radicum*, Ponæ.

XV. *Geranium lucidum saxatile*.

*Geranium saxatile*, Gesn. hort. Thal.

*Geranium saxatile*, Cam. Eyf.

*Geranium alterum montanum saxatile rotundifolium*, Colum.

*Geranium Malvæ folio*.

I. *Geranium folio Malvæ rotundo*.

*Geranium alterum*, Hermodas, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dodon. gal. Turn. Lac. Lon. Cast. Thal.

*Gerani* vulgaris species, Gesn. hort.

*Pes columbinus*, Dodon. Adv. (seu *Geranium alterum Dioscoridis*) Lob. Cæf.

*Geranium aliud*, Lugd.

*Geranium columbinum*, Tab. Ger.

*Geranium malvaceum sive Balsaminum*, Cam.

Duplex est majus & minus: majori caulibus majores & folia paulo molliora: minori omnia minora & folia asperiora. Sic folia modo in profundiores, modo breviores & latus lacinas divisa sunt: floris magnitudine etiam differunt: flore triplo majore & cærulei elegantioris coloris ex horto Dei habemus.

II. *Geranium columbinum tenuis lacinae* 2. rum: quod 2. in Prodomo.

III. *Geranium folio Altheæ*.

*Geranium sextum*, Matth. Lugd. Cast.

*Geranium a calceolaris*, Clus. hist.

Geranium malacoides, Ad. Lob. Ger.

Geranium altheodes, Cam.

Geranium Monspeliacum, Tab.

Pes columbinus tertius, Cæf.

Sub Geranio 2. etiam hoc intelligit Dioscorides, dum gruum rostra tribuit. Geranium folijs candidioribus malvæ, Plinio.

IV. Geranium malacoides minus: quod 1. in Prodomo.

Geranium folio Cicutæ vel Myrrhidæ.

I. Geranium Cicutæ folio ac longissima: quod 3. in Prodomo.

II. Geranium Cicutæ folio moschatum: & inodorum.

Acus moschata, Eric. Cord. Cæf. Col.

Herba moschata, Ang.

Geranium, Trag.

Geranium 1. Matth. edit. 1. Fuch. Dod. gal. Tur. Iac. I. on. Cast.

Geranium tertium, Matth. edit. post. Lugd.

Geranium supinum, Dod. majus, Cord. hist.

Geranium *mau dinipæ*, Nor. Thal.

Myrrhida Plinij, rostrum Ciconiæ, Ad. Lob.

Geranium moschatum, Cam. Ger. Eyst.

Geranium myrrhinum, Tab.

Hoc vel odoratum moschum redolens, vel inodorum est.

III. Geranium Coriandri folio odorum.

Geranium Apulum Coriandri folio alterum odorum, Colum.

IV. Geranium cicutæ folio minus, & supinum.

Herba Roperti & Geranium quartum, Brunf.

Geranium minus & primum, Trag.

Myrrhida Plinij & Rostrum ciconiæ inodorum vulgatum, Lob. ico.

Geranium 7. five Geranium gruinum, Dod.

Geranium minus vel arvense, Tab.

Geranium moschatum inodorum, Ger. Eyst.

Flos communiter bresilici coloris: aliquando albus est: hinc duæ figuræ,

1. Geranium minus, Tab.

Geranium moschatum inodorum, Ger.

2. Geranium arvense album, Tab.

Geranium inodorum album, Ger.

V. Geranium Robertianum primum.

Geranium tertium, Brunf. Matth. Fuch. Tur. Lac. Lon. Thal.

Gratia Dei, vel Geranium quibusdam, Trag.

Sideritis tertia, Dod. gal. Ang. Gese. col. Lac. Lonic.

Panax Herculeum, Ang.

Geranium Robertianum, Ad. (Sideritis Achilleadon, aut congener) Lob. Dod. Cam. Tab.

Rupertiana vulgo, Cæf.

Herba Ruperti & Geranium secundum Dioscoridis, Lugd.

Duplex est: alia omnino viridis, quam feminam faciunt: alia rubens, quæ præfertur: triplex differentia in Advers.

VI. Geranium Robertianum alterum.

Geranium quartum, Fuch. Tur. Lac. Lon. quintum, Matth.

Geranium gruinale, Dod. gal. Lugd.

Geranei Robertiani altera species, Ad.

Geranium violaceum (vel 12.) Tab. Ger.

VII. Geranium latifolium longissima acu.

Geranium Creticum annum hæmatodes, Lobelio.

Geranium Creticum, Camer. Tabern. Gerard. Clus. hist.

## S A N I C U L A.

**S**anicula à sanandū vulnerib. nomen traxisse videtur: Dositheus Columina sub Sideritis tertia Dioscoridu pingu & describit.

Sanicula officinarum.

Diapensia Brunf. Matth. Cast. cui & Pentaphylli quatuor species.

Sanicula, Brunf. Trag. Dodon. ut: Anguil. Gese.

hort. Lac. Lon. Cæf. Camer. Thal. Tabern. (cui

& Consolida quinquefolia) Eystlett.

Sanicula mas, Fuch. Lugd.

Sanicula & Diapensia, Ad. Lob. Ger.

Sideritis tertia Dioscoridis, Col.

## P E S L E O N I S.

*Pes Leonis a forma foliorum. Vulgo Alchimilla, quod alch misarum præconij celebrata sit.*

I. Alchimilla vulgaris.

Pes leonis Brunf. Brunf. Fuch. Lon.

Leontopodium, Brunf.

Alchimilla, Trag. Dodon. ut: Iac. Anguil. Adv.

Lob. Cæf. Thal. Tabern. Gerard. Eystlett. vulgari-

ris, Clus. hist. Cam.

Stella-

Stellaria, Matth. Cast. Lugd.  
 Drosera & Drosum, sive *Yndur*, à rose folijs  
 insidente, Cord. in hist.  
 Stella herba Italica, Gesn. hort.

Flosculi communiter colore pallidi & liliacei: rarius albi.  
 II. Alchimilla alpina quinquifolia, *Ped.*  
 Idromo descripta.

## CANNABIS.

**K** *Arvastr* Dioscoridi lib. 3. cap. 165. & Plinio lib. 20. cap. 23. Cannabū quæ in sylvis primum nascitur  
 Est autem sativa & sylvestris: Sativa, mas & samina. Sic quæ floret fructum non fert, quæ uero non  
 fert, non floret.

## I. Cannabis sativa.

Cannabis, Brunf. Matth. Ang. Lac. Tur. Lon. Ad.  
 Lob. Cæs. Cast. Tab. Ger.  
 Cannabis major, Trag.  
 Cannabis sativa, Fuch. Cord. in Diosc. fœcunda, Dodon.

Cannabis mas, Dod. gal.

## II. Cannabis Virginiana.

Cannabis in Virginea sponte prodit à nostra  
 caule & folijs diversa, materia tamen perinde  
 bona: in def. Virgin.

## III. Cannabis erratica.

Cannabis fœmina, Trag. Dod. gal. Lugd.  
 Cannabis erratica paludosa sylvestris, Ad. Lob.  
 Cannabis sterilis, Dod. Cam. sylv. Cast.

## IV. Cannabi similis exotica.

Bangue, Garziæ, Acoftæ, Monard. Frag. Cast.  
 Lugdun.

Bangue cum Maslac Turcorum affinitatem habet,  
 Clus. in Acoft.

Bangue arbor cannabi similis ad omnia ferè utilis  
 ceu Amfion (sive Opium) Linscot. part. 4.  
 Ind. Or. c. 35.

Bangue crebri apud Ægyptios & Fircas usus,  
 quod triplici modo parant, & primum Alsia:  
 alterum, Bofa: tertium, Bernavi, quod verum  
 & genuinum Bangue est, Palud. notis in Linsc.

Cum folia cum cannabi similitudinem habeant,  
 & cortex infila diduci possit, huc recognoscimus.

*Herba exotica quæ in fila instat Cannabi diducuntur.*

## I. Herba de Bengala.

In Bengala ex herba quam ad colum instat  
 lini nent, telam texunt, quæ subtilitate ferocior  
 antecellit: ex folijs linteamina elaborantur, & tã  
 pingentes nunc flosculos, nunchistorias vario  
 colore, quæ lætulis insternuntur: Linsc. part. 2.  
 Ind. Oriental. 18. & in Madagascariæ & in Batavia  
 part. 3. c. 11.

II. Tokaun folia oblonga & acuta ex quibus  
 fila detrahunt, & reticula piscatoria inde continentur:  
 Stad. in Brasil. l. 2. c. 8.

III. Herba in cuius folijs sericum instat, tenuis  
 pellicula nascitur, cuius folia duos pedes  
 longa, unum lata, & ad binos pedes cum semise  
 in Virginia & Persia adolescit: def. Virgin.

## IV. Radix filamentosæ sericeæ.

Tit planta in sylvis nascens sine fructu: radice  
 geminorum compressorum pugnorum dignitate  
 gmitudine, coma flavescente mollissimum sericum  
 referente, quo pro plumis utuntur ad læsternia:  
 Linscot. part. 3. Ind. Or. 6.

## EUPATORIUM.

**E** *Ynastigior* Dioscoridi lib. 4. cap. 41. & *Ynastigior* Oribasio in collect. & *Ynastigior*, id est, Hepatica, quod hepaticum edeatur. Plinio lib. 25. c. 6. Eupatoria regiam auctoritatem habet. Sunt qui velint nomen a Mithridate cognomento Eupatore habere.

## I. Eupatorium cannabinum.

Salvia, Brunf. ico.  
 Herba S. Kunigundis, Trag. prima, Tab.  
 Eupatorium vulgare, Matth. Tur. Dodon. Lugdun.  
 Cast.  
 Eupatorium adulterinum, Fuch.  
 Pseudohepatorium mas, Dod. gal. Thal.

Eupatorium Avicennæ creditum, Ang. Gesn. Lac. Lon. Cam.  
 Eupatorium aquaticum, Gesn. col.  
 Trifolium cervinum aquaticum, Gesn. hort.  
 Cannabina aquatica mas, Ad. Lob. (sive Eupatorium mas) Colum.  
 Eupatorium, Cæs.



II. Cannabina aquatica folio tripartito diviso.

Verbena supina vel tertia, Trag.

Verbena recta, Cord. in Diosc.

Verbesina, Gesl. ap.

Forbesina Bononienfium, Gesl. hor.

Pfeffhepatorium fœmina, Dod. gal. Thal.

Hepatorium aquaticum, Dod.

Hydropiper, Lugd.

Bidens folio tripartito diviso, Cæs.

Folia communiter in tres partes, aliquando quinque & sex digitorum instar divisa sunt.

III. Cannabina aquatica folio non diviso.

Eupatorium cannabinum fœmina Septentrionalium, Ad. Lob. ico.

Hydropiper aliud Dalechampi, Lugd.

Bidens folio non dissecto, Cæs.

Eupatorium cannabinum chrysanthemum, Tab. Ger.

Conyza palustris, Eysl.

Cannabinæ aquaticæ similis capitulis nutantibus: in Prodromo.

IV. Eupatorium veterum sive Agrimonia.

Agrimonia, Brunf. Dod. Lon. Cæs.

Eupatorium vulgare, Trag.

Eupatorium, Matth. Fuch. Dod. gal. Cord. in

Diosc. & hist. Lac. Tur. Cast. Tab. verum, Lugd.

Eupatorium Græcorum, Ad.

Eupatorium Dioscoridis & aliorum Græcorum, Gesl. hort. Lob. Thal.

Eupatorium Dioscoridis & Avicennæ, Anguil. Colum.

Hoc Eupatorium est Græcorum & Avicennæ, & Eupatoria Plinij: quibusdam ejusdem Plinij Agrimonia in arvis nascens.

V. Eupatorium odoratum.

Agrimonia odorata, Cam.

Eupatorium Dioscoridis odoratum, Cast.

Eupatorium alterum odoratum & aromaticum, Colum.

VI. Agrimonie similis.

Agrimonoides, Colum. à quo accepimus: & postmodum etiam ex Italia semē, nomine Pimpinellæ folio Agrimonie missum fuit.

## POTENTILLA.

**P**otentilla ab eximjis viribus nomen obtinuit: alijs Argentina, à foliorum argenteo splendore. Sunt qui Stephanomelidem Plinij l. 26. c. 13. censent: alijs ad Argemonem referunt.

Potentilla, Brunf. Matt. Fuch. Lon. Cæs. Lugd. ( & Argentina sylvestris ) Cast. Thal.

Tanacetum agrile, Brunf. 4.

Anserina, Trag. Tab.

Argentina, Dod. ut: Ad. Lob. Ger.

Argemone altera, Fuch. ico. Gesl. hort.

## HERBA MOLUCANA.

**H**erba Molucana, Acofca, & ex eo Lugd. vulgo remedium pauperum & destructio Chirurgorum, quia insignis vulneraria est: in Maluco abunde nascitur.

## CARYOPHYLLATA.

**C**aryophyllata, ab odore radicis sic dicta, quod vernali tempore eruat, Caryophyllum aromaticum odore referat: vulgus ab insigni ejus efficacia Herbam Benedictam & Sanamundam appellat. Sunt qui ad Isagopium Dioscoridis lib. 4. cap. 17. referant: alij rectius ad Geum Plinij lib. 26. cap. 7. alij ad ejusdem lib. 25. c. 9. Argemoniam cujus radix tibi redoleat.

I. Caryophyllata vulgaris.

Garyophyllata, Brunf. Trag. Dod. gal. Gesl. hor.

Lonic.

Garyophyllata altera, Ang.

Herba benedicta, Brunf. 4.

Benedicta, Gesl. hort.

Caryophyllata, Matth. Lac. Lugd. Thal. Cast.

Tab. Ger. vulgaris, Ad. Lob. Cam. Clusl. hist.

Caryophyllata hortensis, Fuch,

Geum, Tur. urbanum, Gesl. hort.

Gariofilata vulgo, Cæs.

II. Caryophyllata vulgaris majore flore.

Caryophyllata sylvestris, Fuch.

Caryophyllata montana vulgari similis, Cam.

III. Caryophyllata folijs hederæ terrestris.

Caryophyllata sylv. vel quarta, Tab.

IV. Caryophyllata aquaticæ nutante flore.

Benedicta sylv. Trag.



## E P I M E D I U M.

**E**pinemum Dodon. *Ida lib. 4. cap. 19. caulis est non magnus, hederae sibi, dens aut duodenu, neque semen, neque flores proferens: radicibus tenuibus, nigris, gravi odore, gustu insipido. Idem habet Plinius lib. 27. cap. 9. ubi alij Epimedium, alij Epimeidum legunt. Quibusdam Epipetron ejusdem lib. 21. cap. 5. de qua nomen. Dodonum quam floreat, imitatus Theophr. 7. hist. 8. cum Epimeidum penitus flore caret.*

Epimedium Anguil. (cui & Lunaria quorundam) Adv. Dodon. Lobel. Lugdun. Tabern. | Planta altera in montibus Liguriæ, Cæf.

## P Æ O N I A

**P**æonia ὀνισσίδα, quibusdam πεντέβορον ejus radicem aliqui ὀνισσίδα vocant, Dioscoridi lib. 3. cap. 1. 7. πῶνια ὀνισσίδα (cassa; aliis dulcisida Gaza reddente) Theophrasto 9. hist. 9. Et Plinio lib. 27. cap. 1. Glyciside, quam aliqui Pæoniam aut Pentorobon appellant. Eidein lib. 25. cap. 1. Pæonia vetus, quia in venco est, nomenq. aut hori retinet, quam quidam Pentorobon appellant, alij Glycisiden. Diosc. Pæonia, a Medico Peone, qui ea Plutonium ab Heracle vulneratum, Homero Odys. 5. figente, curasse perhibetur. Genera duo Dioscoridi: mas, folia juglandi habet, in femina Smyrni modo dividuntur: mari radix digitali crassitudine, alba: femine radicibus ceu glandes circiter septem aut octo adherent, ut in Asphodelo. Plinio lib. est. duo genera: femina, cujus radicibus balani longiores circiter octo aut sex adherent: in utriusque plures habet, quoniam non una radice nixus est, palmi altitudine & candida: addit semen in siliquis, aliud grano rubente, aliud nigro.

I. Pæonia folio nigricante splendido, quæ mas.

Pæonia nobilior, vel 2. Trag.

Pæonia mas, Matth. Ang. Cord. in Diosc. Adv. Lob. Dod. Cæf. Lugd. cum duplici figura, Tabern. Ger. Eysf.

Pæonia mas folijs nucis, Gefn. hort.

Variat floribus colore purpureo, incarnato: & hujus herbarum folia laticora segmenta habet, quæ subtrus exalbida; hinc Eysf.

Pæonia mas flore purpureo.

Pæonia mas flore incarnato.

Pæonia mas major.

Pæonia mas major flore incarnato, Eysf.

Floris amplitudine reliquis superat: & herbarum folia in laticores & pauciores virentes particulas dividuntur.

II. Pæonia communis vel femina.

Pæonia, Trag. Turn. Lon.

Pæonia femina, Brunf. Fuch. Anguil. Dodon. gal. Cord. in Diosc. & histor. Gefn. hort. Adv. Lob. Cam.

Pæonia femina altera, Dod. Lugd.

Pæonia vulgaris femina, Clus. hist.

Pæonia rubra flore simplici, Eysf.

Agriophotis Eliani censetur.

III. Pæonia femina altera.

Pæonia femina, Matth. Lac. Cast. Cam.

Pæonia femina prior, Dod.

Pæonia promiscua seu neutra, Adv. Lob.

Pæonia altera vel femina Dioscoridi, Cæf.

IV. Pæonia tenuis laciniata subtrus pubescens flore purpureo.

Pæonia Hispanico semine nata, sive secunda, Clus. hist.

Pæonia Hispanica sive pumila, Cam.

Pæonia pumila femina, Lob. ico.

Pæonia pumilis, Eysf.

an Pæonia minor, Gefn. hort.

V. Pæonia folio subtrus incano, flore albo vel pallido.

Pæonia albo flore, Lob.

Pæonia leucanthemos, Plisphedila Bellonij, Camer.

Pæonia Cretica, Clus. hist.

Pæonia alba quæ promiscua est, & Pæonia vocatur, Hon. Belli epist. 1.

Huc referri potest ea, quæ flore est pallescente.

Pæonia ochranthemus Chamberarij. quamvis & illa, flore non solum sit albo, &

Pæonia simplex niveo flore, Cl. hist. sed etiam flore candicante aliquid rubri dilutioris aspersum habente.

Pæonia mas flore albo, Eysf.

VI. Pæonia aquilinae folijs.

Pæonia quarta folijs supernè virentibus, infernè pubescentibus Clus. hist.

VII. Pæonia pomiaranti colore.

Pæonia tertia folijs per omnes crissus inferne cineris coloris, flore carnis dilutioris, Cl. hist.



## SECTIO SEXTA.

QUINQUEFOLIUM; HEPTAPHYLLON SIVE  
TORMENTILLA; FRAGARIA; TRIFOLIUM;  
MEXICA; LOTUS; MELILOTUS.

## QUINQUEFOLIUM.

**P**ενταφυλλον (quod nomen à numero foliorum habet) Dioscorides lib. 4. cap. 42. proposuit, cui folia sunt Menthae, quibus singulis pediculus, raro plura, in ambitu serrata, flores ex candido pallescentes, auriculatos: radice subnuda, oblonga, &c. Sic & Theophrasto 9. hist. 14. πενταφυλλον, ubi Gaza Quinquefolium & Quinquesperam vertit. Et Plinius lib. 25. cap. 9. Quinquefolium nulli ignotum est, Græci vocant Pentapetes sive Chamaezelon, sive Pentaphyllum.

Quinquefolium flore albo.

I. Quinquefolium album majus caulescens: quod 1. in Prodomo.

II. Quinquefolium album majus alterum.

Pentaphyllum verum ac nobile, Trag.

Quinquefolium majus candidum, Fuch.

Pentaphyllum albi, Mart. Ad. majus fl. albo, Eysl.

Quinquefolium 1. Tur. album, Dod. gal. Gesn.

ap. Lugd.

Quinquefol. sive Pentaphyllum 1. Clus. pan. & hist.

Quinquefolium sylvaticum, Tab. Ger.

III. Quinquefolium album minus: quod 2. in Prodomo.

IV. Quinquefolium album minus alterum.

Quinquefolij albi species quædam, Gesn. ap.

Quinquefolium 2. minus albo flore, Clus. pan.

& histor.

Quinquefolium flore luteo.

I. Quinquefolium majus repens.

Pentaphyllum minus, Brunf. vulgare, Trag.

Pentaphyllum, Gesn. her. Cast. Dioscoridis, Tab.

Pentaphyllum majus, Thal. luteum majus, Dodon. gal. Lugd.

Pentaphyllum 1. & 2. Lon. repens, Cam.

Quinquefolium, Matth. Ang. Cord. in Diosc.

Lac. Aiv. Lob. (sive Pentaphyllum vulgare)

Carl. secundum, Tuin. (jus, Fuch.

Quinquefolium majus, Dod. Ger. luteum majus, Tab.

II. Quinquefolium minus repens aureum.

Quinquefolij quarti secunda species, Clus. pan.

& histor.

III. Quinquefolium minus repens luteum.

Quinquefolij minimum genus, vel 1. Trag.

Pentaphyllum minus luteum, Adv.

IV. Quinquefolium minus repens lanuginosum luteum.

(hist.

Quinquefolij quarti prima species, Clus. pan. &

Pentaphyllum sive Quinquefolium minus, Tab.

Incana pentaphyllæa, Ger.

an Pentaphyllum Bavaricum, Cam.

V. Quinquefolium minus repens alpinum

aureum.

Quinquefolium tertium, Clus. pan. & hist.

VI. Quinquefolio similis Enneaphyllum:

4. in Prodomo.

Quinquefolium erectum.

I. Quinquefolium folio argenteo.

Pentaphyllum exiguum alterum, Trag.

Pentaphyllum album, Matth. canum, Thal.

Pentaphyllum luteum minus, Dod. gal. rectum

minus, Cam.

Pentaphyllum tertium, Lon.

Quinquefolium luteum minus, Fuch. Tur. Lug.

Quinquefolium petræum majus, Tab.

Quinquefolium Tormentillæ facie, Ger.

II. Quinquefolium rectum luteum.

Pentaphyllum majus, Brunf. Lob. obs. Eyslert.

rectum majus, Cam.

Pentaphyllum aliud album, Adv.

Quinquefolium luteum rectum, Gesn. ap.

Quinquefolium vulgare, Lob. ico. Ger. alterum

vulgare, Dod.

Quinquefolium Theophrasti majus, Tab.

Heptaphyllum Hermolai, Cæf.

Pentaphyllum flore albo, Lugd.

Folia terna, quina, sena, ut plurimum septena,

in eadem planta observantur: flores sublatei,

albi, rubri. Hinc figuræ duæ

Quinquefolij & Pentaphylli albi & rubri, Lob.

Quinquefolij Theophrasti majoris & albi, vel

majoris 1. & 2. Tab. (rei, Ger.

Quinquefolij vulgaris & Pentaphylli purpurei,

III. Quinquefolium montanum erectum

hirsutum, luteum: quod 3. in Prodomo.

IV. Quinquefolium fragiferum  
Fragaria quarta, Trag.  
Quinquefolium f. Clus. pan. quintum fragiferum, Eid. hist.  
Quinquefolium fragiferum sextum, Tab.  
V. Quinquefolium fragiferum ardens.  
Pentaphyllum supinum Potentillæ facie, Lob. Lugd.  
Pentaphyllum supinum Potentillæ facie, Clus. pan. & hist.  
Quinquefolium tertium serpens, Lob.  
Quinquefolium fragiferum repens, Tab.  
Fragaria velca, Ger.

VI. Quinquefolium palustre  
Pentaphyllum palustre, Dod. p. 16. Tab.  
palustre, Lob. ico. Thal. Ger.  
Pentaphyllum palustre Cor. hist. Ger.  
Quinquefolium quartum, Dod.  
Quinquefolium palustre, Gesn. h. 1. 1. 1. 1.  
Quinquefolium rubrum, Lugd.  
Folys quinq. & sex variat, unde quinq. f. heptaphyllum dicitur.  
VII. Quinquefolium tomentosum  
Pentaphyllum tomentosum, Thal.  
VIII. Quinquefolium vberum  
Pentaphyllum Indicum, Clus. exo. 1. 1. 1.

## HEPTAPHYLLON SIVE TORMENTILLA

Tormentilla, quod rad. in pulv. cum alumnus & pyrethri momento, cavu dentium sedem doli tormentum sive cruciatum sedet. quam alij Pentaphyllum, alij Bistorta alnumnerant. Tormentum nunc Dioscoridis suspiciantur. Heptaphyllum, id est, Septisolum a quibusdam, aliorum ratione Tormentum.

I. Tormentilla sylvestris.  
Tormentilla, Brunf. Trag. Matt. Dod. ut : Cord. in Diosf. & hist. Ang. l. ac. Lon. Ad. Lob. Cef. Lug. Thal. Cast. Tab. (& Consolida rubra) Ger. Eysl. Heptaphyllum, Fuch. Turn. Gesn. hort.  
Hujus folia aliquando averfa parte candida sunt : aliquando quina, sæpissime septena.  
II. Tormentilla alpina vulgaris major.  
Tormentilla alpina, Cam.  
Radix odoratior, rubicundior ac major vulgari.  
III. Tormentilla alpina folio sericeo.  
Argentaria petræa, Gesn. hort. alpina, Eid. col.  
Pentaphyllum argenteum, Aug.

Pentaphyllum alpinum petreum & montanum, Adv. Lob. ico Ger.  
Heptaphyllum, Clus. hisp. & hist.  
Stellaria argentea, Cam. ep.  
Alchimilla alterum genus, Cef.  
Tormentilla candida Dalechampi, Lugd.  
Argentea heptaphyllos montana, Cam.  
Quinquefolium alpinum, Tab.  
Pentaphyllum petræum minus, Eid. quod supinum, Ger.  
IV. Herba Wispassa in Gazaria absterge radicem habet Gingiberi, quoniam si per se ore dissimilem, & ad diarrhæam sedandam utilis, part. 8. Ind. Occid.

## F R A G A R I A.

Fragaria à fragro, id est odorem reddo, dicta videtur : Κίναρος Apulici censetur inter Tentaculosa inter alio, Dioscoridem intellexisse volunt : & quia Mora terrestria Serrio dicta suere, sunt quædam Sabaudum referant. Plinio lib. 25. cap. 9. Fraga. Rubus Idæus non spinosus quibusdam.  
Genera. alia montana & sylvestria, in montibus & sylvis nata : alia sativa, que in hortis. Quibus magnitudine, figura oblonga, rotunda, & colore variat.

I. Fragaria vulgaris.  
Fragaria, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. ut : Gesn. hort. Lon. Adv. Lob. Lugd. Cast. Ger. Trifolium aliis Fragaria, Brunf.  
Fragula Cord. hist.  
Rufus dæa minor, l. ac.  
Fragum & Trifolium fragiferum, Tab.  
Fragaria major, Thal.  
Fraga fructu rubro, Eysl.  
Fructus magnitudine & colore variat : quædam

rubra, quædam inter album & cinereum inter albidum, quædam sanguinei coloris : hæc præterea duplo majore vulgaris, herbaceæ, lenes, rubrae & candore confusæ : imo & fusæ, hæc præterea Fraga major subalba, Lob. fructu albo, Eysl. Fraga alba, Dod.  
Fraga æque magna ac in Anglia id vulgare crescunt.  
II. Fragaria fructu albo.  
Fraga candida, Trig.



*Fragaria minor* fr. nigra, Thal.

*Fragaria* alba, Tab.

*Fragaria*, Ger.

Fructus est aliquando toto candido, minus grumoso, dulciore: aliquando parte superiore rubicundiore et inferiore can didiore.

III. *Fragaria* fruct. parvi Pruni magnitudinis. *Fragaria* estu magno, Eysl.

IV. *Fragaria* folijs hispida.

*Fragariae* tertium genus, Trag.

*Fragariae* species minor, Haartbeer/ Gesl. hort.

*Fragum* tertium, Tab.

Partim rubra, partim candida sunt, vel subpurpurea.

V. *Fragaria* b. fructum ferens.

*Fragariae* genus in albis, Cæf.

Fructus forma compressa striata, Rubiidae sapore: vere & autumno maturat.

VI. *Fragaria* flore luteo.

*Fragaria* parva luteo flore, Gesl. hort.

VII. *Fragaria* sterilis.

*Fragaria* sterilis, Gesl. hort. marem dixeris, Eid. col.

*Fragaria* syl. minimè vesca sive sterilis, Lob. ico.

VIII. *Fragariae* affinis sericea incana, in Prodomo descripta.

Incana Pentaphylli effigie, an *Leucas* Dioscoridis, Ad.

## TRIFOLIUM.

**T**ri folium Dioscoridi l. 3. c. 123. sic dictum. quod singulis germinationibus, terna exeant folia.

Genera: Dioscorides solum bituminosum proposuit, quod esse putat, in leucaebus vero de quaestione: quod bitumen oleat, dicitur. At Plinius l. 21. c. 9. Tri folia tria genera enumerat: Minus ait, vocant Græci, alij asphalium maiore folio: alterum acuto, oxytriphylum tertium ex omnibus odoratisimum.

I. *Trifolium* bitumen redolens.

*Trifolium* asphaltæum, Matth. Gesl. hort. Eracast. Ad. Lob. Lugd.

*Trifolium*, Dod. gal. Cord. in Diosc. Gesl. h. Lon.

*Trifolium* bituminosum, Ang. Dod. Cæf. Cast. Cam. Tab. Ger.

*Oxytriphylum*, Gesl. hort.

Folia inferiora, antequam caulem proferat, rotunda sunt, cum vero caule se sit, acuta: hinc duæ figuræ in hist. Lugd. altera rotundis, altera longioribus folijs. Semen Italicum in Germania terræ mandat, proferit plantam odore bituminoso: at semen plantæ in Germania educatæ, rursus satum, plantam sapore & odore deficientem producit: hinc duæ figuræ in horto Eysl.

*Trifolium* bituminosum odoratum, &

*Trifolium* bituminosum inodorum, Eysl.

II. *Trifolium* palustre.

*Lotium*, Cord. in Diosc. pratense, Trag.

*Isopyrum*, Dod. gal. Gesl. hort.

*Trifolium* palustre, Cord. hist. Dod. Thal. Eysl.

*Lotium* palustre, Gesl. hort.

*Trifolium* palustre, Ad. Lob. majus & min. Ger.

*Menthes* palustre, Lugd. duplici figura.

*Trifolium* majus & fibrinum, Tab.

Variatione loci, majus datur & minus. rotundius & acutiore folio: quare Taber. & Ger. figuras exhibent.

III. *Trifolium* Americum,

*Trifolium* Americ. Lob. Dod. Lugd. Tab. Cam.

Loti syl. genus hoc folium ex Armenua, Cæf.

*Trifolium* pratense.

I. *Trifolium* pratense purpureum.

*Trifolium* majus, Brunf. def.

*Trifolium* pratense purpureum, Trag. Fuch. Ad.

*Trifolium* pratense rubrum, Cam. Thal.

*Trifolium* pratense, Matth. Dod. ut: Tur. Lac.

Lob. Lugd. Cæf. Tab. Ger. alterum, Cæf.

Hujus differentia: multæ sunt ratione magnitudinis, tam foliorum, quam caulium & fructus: folia communissimè rotunda, quibusdam oblonga, rarius in extremo sinuata: nonnunquam unum alterumve folium in binas, ternas, etiam quaternas lacinias dividitur: rarius cauliculo, foliorum minimorum velut fasciculus in umbellæ modum insidet: quibusdam in folio macula est, vel nigra, vel alba, lunæ falcatæ figurâ: floris color alijs purpureus, & modò saturatior, modo pallidior.

III. *Trifolium* pratense album.

*Trifolium* pratense alterum, Trag. Matth. Lac.

*Trifolium* pratense primum, Cæf.

*Trifolium* pratense album, Fuch. Dod. gal. Tur.

Ad. Cam.

*Trifolium* acutum, Lon.

*Trifolium* majus primum, Clus. pan. & hist.

*Trifolium* pratense vulgare fl. candido, Thal.

III. *Quadrifolium* hortense album.

*Quadrifolium* phæum fuscum, Ad. Lob. Lugd.

*Lotus* quadrifolia, Tab.

Folij quaternis, quinis, aliquando septenis donatur.

IV. Tri-



angustifolius. Cretia Lagopi nomine habemus folijs latioribus & brevioribus, spicaque brevitate & laevitate.

Trifolium capitulo stellato, foliis foliis, globoso.

I. Trifolium stellatum: quod 16. in Prodomo.

II. Trifolium pratense foliolulatum.

Trifolium pratense Salmanticum, Clus. hisp. & h. Lob. Lugd.

Trifolium Hispanicum, Tab. Salmanticum, Ger.

III. Trifolium globosum, sive capitulo Lagopi rotundiore: quod 17. in Prodomo.

IV. Trifolium globosum repens: quod 18. in Prodr.

V. Trifolium capitulo spumoso laevi: quod 4. in Prodr.

VI. Trifolium capitulo spumoso asperomajus: quod 5. in Prodr.

VII. Trifolium capitulo spumoso asperominus: quod 6. in Prodomo.

VIII. Trifolium nagiferum Friscum, Clus. cur. post.

Aliud floribus dilute rubentibus in globulū, rubi idaei fructum forma & colore æmulantibus collectis: alia species capitulo saturati violacei coloris, ad Rubi vulgaris fructum accedente.

IX. Trifolium capitulis Thymi: quod 7. in Prodomo.

X. Trifolium album angustifolium, floribus velut in capitulum congestis.

Dorycnium falso dictum, Gef. hor.

Dorycnium Monspeliensium, Ad. Lugd. Cam.

Dorycnium Lob. Hispanicum, Clus. hisp. & h. Lob. Tab. Ger.

Folia terna, quaterna, aliquando quina junguntur: quæ modò latiora, modò angustiora.

XI. Trifolium capitulo oblongo aspero: quod 8. in Prodomo.

Trifolium peltatum, scutellatum, cochleatum & turbinatum.

I. Trifolium peltatum Creticum: quod 11. in Prodomo.

II. Trifol. cochleatum vel scutellatum fructu latiore, folio minuto obtuso: quod 9. in Prod.

III. Trifolium cochleatum fructu latiore.

Medica minor, Trifolium tortuosum, Gef. hor.

Trifolium cochleatum primum, Dod. Ger.

Medicæ species 3. filiqua glomerata, Ad. species 3. Lobel.

Medica, Tur. Anglica, Tab.

Trifolium filiquam habens cochleæ modo implexam, Cæs.

Medica platycarpus, Cam.

Medica sylv. prior, Lugd.

IV. Trifolium cochleatum fructu magis tortili: quod *maxima* Cydoniæ, *negunda* Retimi nomine, ex Creta Honor. Belli misit.

V. Trifolium cochleatum turbinatum, sive fructu compresso oblongo.

Medicæ species secunda, Ad.

Medica sylv. altera, Lugd.

Medica rotundo semine, Cam.

Hoc, sed fructu minore, Loti aut Trifolij nomine, ex Creta ab Honorio Belli accepimus.

VI. Trifolium cochleatum polycarpon: quod 10. in Prodomo.

Duplex est: aliud folio obruso non crenato: aliud folio acuto crenato: illud Italicum, hoc Gallicum est.

VII. Trifolium cochleatum maritimum tomentosum.

Trifolium maritimum, Gef. hort.

Medica marina, Ad. Lob. Ico. Clus. hisp. & h. Lob. Tab. Cam.

Trifolij quoddam genus in maritinis, Cæ. Anthyllis altera, Lugd. Ico.

Trifolium cochleatum marinum, Ger.

Trifolium cochleatum hispidum, echinatum & spinosum.

I. Trifolium cochleatum fructu nigro hispido. Trifolium cochleatum alterum, Dod.

Medica folliculo spinoso, Lob. Lugd.

Medica semine minuto hirsuto, Cam.

Medica, Cast. Ico.

II. Trifol. cochleatum folio cordato maculato. an Trifolij species nigris maculis, quod hemoroidum cognominant, Gef. hort.

Medica Arabica, Cam.

III. Trifolium folio obtuso folliculis cordatis: quod 13. in Prodomo.

IV. Trifol. fructu compresso spinis horrido. Medica filiqua spinosa, Ad.

Medicæ species, Lob. Ico.

V. Trifolium cochleatum echinatum minus: quod 12. in Prodomo.

VI. Trifolium echinatum arvense.

Tribulus terrestris minor repens, Lugd.

Medica pusilla, Cam.

Pilulas habet quaternas, quinas simul junctas: subsequens verò binas, ad summum ternas.

VII. *Trifolium echinatum* arvense fructu minore.

*Trifolium minor* rectus. Dalech. Lugd.

VIII. *Trifolium spinosum* Creticum: in Phytopinace Marthiolo, & Prodomo sub 5, descriptum.

*Trifolium spinosum* Creticum, *σπινώδες* Belli, Clus. hist.

*Trifolium filiqua cornuta & falcata.*

Dioscorides *μυρτίνον*, lib. 2. cap. 177. folijs & caule *Trifolij* pratensis, filiquis corniculorum modo intortis describit: *Μυρτίνον*, Theophrasto 8. hist. 8 & 2. cauf. 20. Et Plinio lib. 18 cap. 16. Medica a Medis adveſta per bella Perſarum, &c.

I. *Trifolium filiqua cornuta*, ſive Medica. Medica, Dod. ut: Cord. in Dioſc. Lac. Cæſ. Cam. Caſt. deſcr.

Medica vera, Gef. hor. ſativa, Lugd.

Medica flore purpureo, Ang. herba, Lon. deſ.

Medica legitima, Clus. hiſt.

Fœnum Burgundiacum, Ad. Lob.

Medicam veterum & Alfaſat Avicennæ volunt: quæ floris colore variat, communiter cæreuleo, violaceo, luteo: ex utriſq; mixto.

II. *Trifolium ſyl. luteum* filiqua cornuto, vel Medica fruteſcens.

Meliloti majoris ſpecies tertia, Trag.

*Trifolij* genus Medicæ ſimilis, Gef.

Medica flavo flore, Clus. pan. & hiſt.

Leis major repens, Tab.

Apud nos flore eſt luteo: at circa Nemaufum in Gallia Narbonenſi, in arvis reperitur flore luteo albo, viridi, cæreuleo, purpureo, nigro, vario, ex cæreuleo viridi compoſito.

III. *Trifolium filiqua falcata.*

I unaria radiata Italorum, Lob.

Medica ſylv. altera lunata, Lugd. cum duplici figura.

*Trifolij* genus filiqua lata & falcata, Cæſ.

Medica lunata, Caſt. ap.

IV. *Trifolium filiqua falcata* alterum.

*Trifolium falcatum*, Clus. hiſt. or. append. alt. & cur. poſt.

*Trifolium acetosum.*

Oxytriphyllo quibuſdam ab acido ſapore, & forma triſolij: Oxyſ Plinio 1. 27. cap. 12. folia tenera habet.

I. *Trifolium acetosum* vulgare.

*Trifolium acetosum*, Brunſ. Matth. Dod. Lugd.

Th. J. Ger. acetosum, Eyſ.

*Panicum*, Brunſ. 4.

Oxytriphyllo, Trag. Lac.

Oxyſ, Fuch. Dod. gal. Tur. Cord. *Trifolium* Ger. Tab.

Oxyſ quorundam, Ang. Plinio, Gef. hor. Ad. Lob.

Alleluja Lac. Lon.

Lujula, Fracaſt.

*Trifolium acetosum*, Calabris Juliol. *Trifolium* arbari corrupere in Alleluja, Scal. g. in Theophr. de cauſ.

Floris colore variat. communiter laſca, & rarius purpuraceus, vel ſubcæreuleo, *Trifolium*.

II. *Trifolium acetosum* corniculatum.

Oxyſ flore luteo vel flavo, Clus. hiſt. pan. & hiſt. Dod. Tab.

Oxyſ, Cæſ. Ger. lutea corniculata repens, Lob. Lugdun.

Lotus urbana, Tur. ico.

*Trifolium acetosum* flore luteo, Caſt. Eyſ.

*Trifolium hepaticum.*

I. *Trifolium hepaticum* flore ſimili.

Hepatica, Brunſ. Dod. gal. aurea, Brunſ. Gef. hor. Tab. Thal. quibuſdam Anthera.

*Trifolium magnum* ſeu aureum, Trag.

Triada & Taura, Hermolan.

Trinitas, Matth. Ang. Cord. hiſt. *Trifolium* (ſive Epithymum) Gef. ap. Cæſ. Caſt.

Herba Trinitatis, Gef. hort. Lugd.

*Trifolium aureum*, Dodon. *Trifolium aureum* magnum, Caſt.

Hepaticum trifolium Ad. Lob. Cam. Ger.

Hepatica terreſtris, Gef. col. Hepatica trifolij, Clus. hiſt.

Folijſ ludit, aliquando majoribus & minoribus variegatis: floribus communiter cæreuleis vel violaceis, ſed purpureis, ſubris albis, & maculis purpureis alperis. hinc *Trifolium* apud Lobel. & Gerard.

Hepatici trifolij & rubri:

Hepaticæ aureæ flore cæreuleo & rubro, Tab.

Hepatici trifolij cæreulei & rubri, apud Clus. *Trifolium* apud Eyſ. fl. albo, rubro, & cæreuleo.

II. *Trifolium hepaticum* flore pleno.

Hepatica trifolia polyanthos, Lob. Lugd.

Hepatica trifolia cæreuleo pleno flore, Clus. hiſt. pan. & hiſt. ap. alt.

Hepatica multiſtora, Gerard. aurea multiſtora, Tabern.

Hepatica aurea flava pleno & cæreuleo, Eyſ.

LOTUS

## LOTUS ET MELILOTUS.

**L**otus herba, de arbore enim hic sermo non est) Dioscoridis. 4. 1. triplex est: sativa, quam aliqui *επιγονορ* vocant, quæ in hortu nascitur sylvestris, quam aliqui *κισσος*, *Libyuni* a loco natali appellent, caule bicusculati, aut etiam majore, alio multius; folijs Loti trifolij pratensis, semine sennigraci, at multo minore, gustu medicato: tertia est Lotus Aegyptia, de qua supra. Theophrasto 7. hyst. 9. Lotus herba in caule tantum foliata est. & c. 1. 2. licet, inquit, nomen unum habeat, tamen plura ejus genera sunt, ut ferme aquivocata sunt: in caule, flore, fructuq; discreta: Sic de Loto Aegyptia egit & hyst. 10. Plin. l. 13. c. 17. de Loto arbore differens, solum est autem eodem nomine & herba (Lotum urbanam Dioscoridis intelligens) & in Aegypto caulu in palustris: in genere de hac posteriori egit l. 22. c. 21. Lotometram vocans. Idem l. 22. c. 21. ait, Homerum inter herbas subnascentes Deorum volupcrati Loton primum nominasse: baud dubie Lotum sativam Dioscoridis intellexit.

De Meliloto autem Plinius lib. 21. cap. 9. inquit, in coronamentis venit Melilotum, quod Sertulam Campanam vocamus: est enim in Campania Italia laudatissima: coronas ex hac antiquitus facit atq; inde etiam nomen Sertulae, quod occupavit: odor ejus croco vicinus est, & flos, ipsa cana: placet maxime folijs brevissimis atque pinguisimis. Et c. 11. Melilotos ubique nascitur, laudatissima tamen in Attica: ubicunque verò recens nec canduans & croco quam similima: quanquam in Italia odorator & candida.

## I. Melilotus officinarum Germaniæ.

Melilotum majus, Brunf. Melilotus, Lac. Lon.

Melilotus vera, Gesn. hort.

Melilotus major vulgaris, Trag.

Melilotus vulgaris, Lugd. (Lugd.)

Lotus urbana, Matth. sativa, Cast. sativa altera,

Saxifraga lutea, Fuch. Sax. altera, Lac.

Lotus sylvestris, Fuch. ico. Cæf. Tab.

Loti sive Trifolij species, Cord. in Diof.

Melilotus Germanica, Dod. gal. Ad. Lob. Cam.

Gerard. flore luteo, Eysf.

Trifolium odoratum 1. & 2. Dod. Tab.

Flore est communiter luteo, aliquando albo, quæ Melilotus major candida, Trag. hinc duæ apud Tab. figuræ:

Loti sylvestris: & fl. albo. Et apud Gerardum:

Meliloti Germanicæ, & Meliloti coronatæ nomine.

Dodonæus hujus differentias quinque recensuit: 1. flore luteo: 2. flore candido: 3. peregrina flore purpureo cæruleo inodoro: 4. flore luteo longioribus siliquis: 5. flore luteo folijs per circumferentiam non crenatis.

## II. Melilotus corniculis reflexis major.

Melilotus major, vel 3. species, Trag.

Melilotus Italica, Fuch. Dod. gal. Gesn. h. Ad. Lob.

Meliloti quartum genus, Fuch. ico.

Melilotus sive Sertula campana, Matt. Cord. in

Lotus sylvestris, Gesn. hort. (Diof.)

Trifolium corniculatum 2 Dod. Thal.

Melilotus alia, Cæf.

Sertula campana, Cast.

Aliam figuram habet Lobelius, nomine

Meliloti Syriacæ odoræ & Sertulæ campanæ.

Melilotus Syriaca, Adv.

Hæc Patavij sata, corniculis exit minus sal-

catis & ignaviore odore. Huc referatur

Melilotus altera pusilla Londinensis, Adv.

III. Melilotus corniculis reflexis minor, vel repens.

Melilotus Aegyptia, Alchimelech, Alpino.

IV. Melilotus Italica folliculis rotundis.

Melilotus, Ang. Italica, Cam.

In quibusdam folliculis duo, in reliquis unum granum continetur.

V. Melilotus angustifolia repens, folliculis rotundis: quod sub Trifolio 13. in Pr. describ.

VI. Lotus hortensis odora.

Trifolium Dioscoridis, Trag.

Lotus sylvestris, Matth. Ang. Cast. altera, Lugd.

Lotus sativa, Fuch. ico. Dod. gal. Cord. in Diof. & hyst. Gesn. hort. Cam.

Lotus urbana, Lac. Tur. desc. Eysf.

Trifolium odoratum, Fuch. Tur. Lon.

Trifolium odoratum alterum, Dod. Lugd.

Trifolium caballinum, Gesn. hort.

Lotus hortorum odora, Ad. Lob.

Melilotus vera, Tab. singularis Alpin, Ponæ.

Quibusdam *μυρτὸν* Theophrasti 7. hyst. 14.

Mel frugum Gaza vertit: Lotus urbana sive

sativa Dioscoridis: Septies in die odorem emittare fertur, unde nomen Germanicum *Schabziger* legit: nostris *Schabzigerkraut*: quia Helvetij suis peculiaribus caseis, quos *Schabziger* vocant, miscere solent.

VII. Lotus sativa Græca maculato folio.

Lotus sativa, & cum folium modo macula rufa modo nigra notatum sit, & caligini oculorum medeatur, à quibusdam *τριφύλλον*, id est,

Trifolium oculatum vocatur, Ang.

*Lotus pentaphyllos folijs rectis.*

I. Lotus sive Melilotus pentaphyllos minor  
Lagopus primus, Trag. (glabra.)

Meliloti exigui species altera, vel 7 & nobilis,  
Melilotus Germanica, Fuch. Lon. (Eid.)

Meliloti tertium genus, Fuch. ico.  
Lotus sylvestris, Dod. gal.

Trifolij species, Cord. in Diosc.  
Lotus pentaphyllos, Gesf. hort.

Trifolium corniculatum primum, Dod. Thal.  
Melilotus coronata, Ad Lob.

Lotus sativa Matthioli edit. prima, Lugd.  
Melilotum vulgo, Cæs.

Picus melilotus, Cam.  
Trifolium filiquosum minus, Tab. Ger.

Flos lutei coloris, aliquando ad aureum ver-  
gens, nonnunquam subviridis.

II. Lotus pentaphyllos minor hirsutus, fil-  
qua ang. *stissima*. sub Trifolio 21. sive cornicu-  
latum n. ore piloso, in Prodromo descriptus.

III. Lotus pentaphyllos flore majore luteo  
splendente.

Meliloti majoris quarta species, Trag.  
Trifolium corniculatum tertium, Dod.

IV. Lotus pentaphyllos major hirsutus  
indicans.

Melilotus vulgaris alter sylv. Cæs.  
V. Lotus pentaphyllos major alter.

Lotus pentaphyllos major & erectus, Gesf. hor.  
Hic & glaber & leviter hirsutus apud nos  
reperitur.

VI. Lotus pentaphyllos frutescens tenuif-  
limis, glabris folijs: sub Trifolio 22. vel Corni-  
cularo frutescente in Prodromo descriptus.

VII. Lotus Hispanica folijs maculatis: sub  
Trifolio 24. vel Meliloti Hispanico maculato  
describitur.

VIII. Lotus pentaphyllos incanus.

Glaux, Ang. quo nomine & Alpinus donabat.  
Cyrillus Colum. lx, Cam. Eyst.

Dorycnium 2. & non descriptum, alijs.  
an laem cum

Dorycnio congenera planta, Cl. hisp. & hist. &  
Dorycnij species, Tab. (Lugd.)

Dorycnium Monspeliense, Ger.

Clavus e similibus colore viridi: Anguil. &  
Camer. per. pureos, vel ex albo purpurascens  
adscibit.

IX. Lotus pentaphyllos filiquosus villosus.  
Oxytrichum alterum Scribonij, Ad Lob. ico.

Oxytrichum alterum Scribonij, Ad Lob. ico.  
an Trifolium alterum folio 22. vel 23. vel 24.

an Lotus sylvestris ex Cod. Cæsareo, Dod. L.

Flos est albo, est & purpureus.

X. Lotus filiquosus glaber & hirsutus.

Lotus Iyrica Dioscoridis, Lag.

an Oxytrichum 1. genus, Clut. hisp.

Hoc duplex: Clut. 1. unum caule  
ramis & albo radice: alterum caule & ramis  
ex albo purpurascens, in quibusdam mu-  
tatis.

XI. Lotus fruticosus incanus filiquosus.

Lotus a prior fruticosus, vel Narcom. in  
na, Lob. Lugd.

XII. Lotus pratensis filiquosus luteus.

Lotus trifolius pratensis filiquosus Montpelien-  
sium, Adv. Lob. ico.

Lotus filiquosus luteo flore, C. in  
Lotus pratensis filiquosus, Eid. ico.

Lotus trifolius filiquosus, Tab.

Lotus trifolius corniculata, Ger.

Duplex est: major & durior: minor & mollior.

XIII. Lotus ruber filiquosus.

Lotus filiquosus rubro flore, Clut. hisp.

Lotus pulcherrimus: etragolobus, Cam. Eyst.

Scandalida Cretica italorum.

*Lotus pentaphyllos filiquosus convexus.*

I. Lotus pentaphyllos filiquosus convexus.

Lotopifos sive Hieracium Can. in P. ico.

Lotus hieracium, quo nomine & Can. ex C. in P. ico.

nos misit: & in P. ico. Clut.

II. Lotus filiquosus convexus.

Lotus peculiaris in P. ico, Cam.

Lotus sylvestris Dioscoridis, Ponæ.

III. Lotus pentaphyllos filiquis re-  
pedes corvinos resistentibus.

Coronopus ex Cod. Cæsareo, Dod. quod 2.

IV. Lotus pentaphyllos velicaria.

Dorycnio similis, Ang.

Trifolium velicarium, Clut. pan.

Trifolium Halicacabum sive velicarium, Cam.

*Lotus affinis.*

I. Loto affinis Egyptiaca.

Abus, Alpini.

II. Loto affinis Vulneraria pratensis.

Anthyllis prior, Dod. gal. Lac Lugd.

Anthyllis leguminosa, Lob. Cl. pan. & ico, Cam.

Anthyllis lenti similis, Dod.

Vulneraria rustica, Gesf. hort.



## Lagopodium Tab.

Antholica Sixtum, Thal.

Flore communiter est luteo, rarius albo:  
hinc duæ figuræ apud Tab. & Ger.

1. Lagopodium flore albo, Tab.

Lagopum maximum, Ger.

2. Lagopodium flore luteo, Tab.

Anthyllis leguminosa, Ger.

III. Loto affinis: tota flore subrubente;

Anthyllis leguminosa purpurascens flore,  
Cluspan. & hist.

Lotus latifolia Dalechampi, Lugd.

Aliquando tota incana est, qualem ex Hi-  
spania habemus.IV. Loto affinis filiquis hirsutis circinatis:  
Auricula muris, Cam.CASPARI BAVHINI  
PINACIS THEATRI BOTANICI  
LIBER NONVS.

## SECTIO PRIMÆ.

RUBIA; APARINE; ASPERGULA; MOLLUGO;

GALLION; CRUCIATA.

RUBIA.

**E**rythrodanum (ab erythro, id est ruber) à γένος ἄκρον, aliquibus rubrorum, radix est rubra tingendo idem est.  
Dioscoridi l. 3. c. 160. *erythrodanum*, Theophr. 6. hist. 1. Rubia (a radice colore) Plin. l. 19. c. 3. ac l. 24. c. 11.  
Erythrodanum, aliqui Erythrodanum vocant; nos Rubiam, quæ lana tinguntur.

Genera: duplex est, una sylvestris sativa altera, cui caules quadranguli longi, asperi, quales Aparinae folijs in orbem per intervalla, circa singula gemula stela modo decussatim radiatis, &c. Dioscorides l. c. At Theophr. l. c. plura sunt genera (Dodoneo Rubia proprie species nullæ sunt) & 7. hist. 9. radices rubicunda: verum 9. hist. 1. g. folia habere sed rotundiora tribuit. Plin. l. 19. c. 3. Rubia spinosus caule gemulatus, quinque circa arculos in orbem folijs. Hic Plin. licenter asperum caulem spinosum vocat, cum Theophr. 6. hist. 1. spinu Erythrodanum cetera aperte scribat. Laudatissimum, ait Plinius, Italica & maxime suburbana & omnes penè provincie secant, &c.

I. Rubia tinctorum sativa.

Rubia sativa, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. Gesn. hort. Lac. Tur. Lon. Frac. Lugd. Cast.

Rubia 2, Cord. in Diosc. Ang. Dod. Cæs. major, Adv. Lob. Clus. hist.

Thapsia Asclepiadis, Ang.

Seritur non paucis Germaniæ, præsertim apud Silesios, Belgii, Galliæ, Italiæ & Hispaniæ locis, in usum enim tinctorum agri conferuntur: quemadmodum apud Dioscoridem, in Thebana Galliæ, & Ravenna Italiæ, nec non in Arabia inter oleas ferebatur.

II Rubia sylvestris, quæ sylvestris Dioscoridi.

Rubia erratica, Trag.

Rubia sylv. vera, Cord. ob.

Rubia maxima, Lob. ob.

Rubia sylvestris, Cæs.

Quibusdam locis sponte in sepibus provenit, sativæ per omnia similis, radice tamen multo major, & folijs atrovirentibus.

III. Rubia sylvestris lævis.

Rubia sylvestris. Brunf. Matth. Fuch. Dod. gal. Cæs. hort. Lac. Tur. Lon. Lob. Lugd. Cam. Cast. Thal. Tab. Ger.

Rubia sylv. minor. Adv. Lob. ob.

Lappago Plinij, Cæs.

Alyssum Plinij l. 24. c. 11. (quod folijs tantum &amp; ramis minoribus, ab Erythrodano distare scribit) quibusdam alijs Lappago ejusdem l. 26. c. 10.

IV. Rubia pratensis lævis acuto folio: quæ Rubia 2. in Prodomo. (Prod.

V. Rubia montana angustifolia: quæ 1. in Rubia sylvatica longioribus &amp; angustioribus folijs, Gesn. hort.

VI. Rubia cynanchica.

Aspergula herba repens, Gesn. col.

Synanchica, quod ad anginas sumpta &amp; admodum valet, Lugd.

Saxifraga altera, Cæs.

Galiu tetraphyllum montanum cruciatum, Col.

VII. Rubia cynanchica laxatilis: quæ 8. in

VIII. Rubia limifolia aspera. (Prod.

Tt 3

Jun-

Juncaria Salomatica, Clus. hisp. & hist. Lob.  
Juncaria, Tab.

Synanchicæ species, Lugd.

IX. Rubia maritima.

Rubia marina Norboneusium, Adv. Lob. Dod.

Clus. hisp. & hist. Tab.

Erythrodanum marinum, Lugd.

Crucialis maritima, Cæs.

X. Rubia quadrifolia vel latifolia lævis.

Rubia lævis Taurineusium, Lob. Lugd.

XI. Rubia quadrifolia, vel rotundifolia lævis: sub Rubia 3. in Prodomo.

XII. Rubia latifolia spicata.

Rubia spicata, Imperato: Cretica, Clus. hist.

XIII. Rubia angustifolia spicata: quæ 4. in Prodomo.

XIV. Rubia Virginea.

Chappavv, radices tenues quibus ad radicem utuntur: in desc. Virgin.

Rubeola.

I. Rubeola arvensis repens cærulea: quæ 7. in Prodomo.

Rubeola arvensis, Cam.

II. Rubeola repens lutea folijs spinosis.

Rubia minima, Lob. Lugd.

III. Rubeola laxatilis: quæ 6. in Prodomo an Rubia saxatilis, Cam.

IV. Rubeola echinata saxatilis.

Crucialis muralis, Col.

an Crucialis minima in maritimis, Cæs.

V. Rubeola maritima aspera: quæ 8. in Prodomo.

## APARINE SIVE ASPERUGO.

**A**πarine, ἀμπελόκαρπον, σφαλόνκαρπον, φιλαύθρων ramis quadrangulis, asperis, folia, ceu & ramuli in orbem per intervalla cingunt, &c. Dioscoridi lib. 3. cap. 104. Lappam & απarine theophrastum 7. hist. 8. & 14. vertit. Aparinem (scribit Plinius lib. 27. cap. 5.) aliqui Omphalocarpon, alij Anthropon vocant, ab asperitate vestium tenaci, &c. Eisdem lib. 26. cap. 10. Asperugo inter lappas dicitur ab asperioribus folijs, ad quod nomen vulgare alludit.

I. Aparine vulgaris.

Aparine, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Ang. Dod.

ut: Cord. in Dioscor. Lac. Turn. Lon. Adv. Lob.

Lugd. Cæs. alp. Castor.

Aparine aspera, Thal.

II. Aparine purpureis floribus.

## A S P E R U L A.

I. Asperula, sive Rubeola montana odora.

Caprifolium vel Stellaria, Brunf.

Hepatica tertia, Eid. 4.

Matrifylva, Trag. Cord. in Dioscor. Lon. Thal.

Asperula, Dod. gal. Frac. Lob. Lugd. Ger.

Asperula odorata, Dod. Cast. Clus. hist.

Aspergula odora nostras, Adv.

Aparine sylvestris quædam, Cord. in Dioscor.

Alyssos, Gefn. hort. Lac.

Alyssum Plinij minus, Gefn. collect.

Rubia sylv. alia minor, Gefn. append.

Hepatica stellata, Tab.

II. Asperula cærulea arvensis.

Alifson, Turn.

Asperula cærulea, Dod. Lob. Cam. Lugd.

Alyssum Galeni quibusdam, sed perperam.

III. Asperula hexaphyllos purpurea.

Myagrum alterum minus Dalechampi, Lugd.

IV. Asperula verticillata luteola.

Asperula verticillata muralis minima, Col.

## M O L L U G O.

**M**ollugini Plinius lib. 26. cap. 10. hu. verbum meminim: Et Lappago similis anagallidis (forte lappas dicitur Gahs) nisi effe ramosior, ac pluribus folijs aspera, rugosa, asperioru succi, gravi odoris: quæ tamen (forte mollu legendum) est, Mollugo vocatur: similis sed asperioribus folijs, Asperugo.

I. Mollugo montana latifolia ramosa.

Matrifylva secunda, Trago.

Rubia sylvatica altera, Gefn. hor. major, Eid. ap.

Alyssum Plinij majus, Gefn. col.

Mollugo montana, Dod. Lugd. Thal. Tab.

Mollugo, Clus. pan. & hist. Belgarum, Lob.

Gallium sive Mollugo montana, Ger.

II. Mollugo montana angustifolia, &c.

Gallium album latifolium.

Gallion tertium, Trag. album, Adv. Cam. Thal.

Gallion candido flore, Cord. in Dioscorid. Cæs.

salpin.

Mollugo prima, Dod. Lugd. Tab.

Mollugo vulgatiores herbariorum, Lob.

GAL.

## G A L L I U M.

**Γ**αλλίον, γαλλίον, γαλλίον, nomen ex eo traxit, quod coaguli vice γάλα lac cogat & coagulet: ramulum foliumq; habet Aparinae similitudinem, rectum: florem in cacumine luteum, &c. sic Dioscorid. l. 4. c. 96.

## I. Gallium luteum.

Gallij primum genus, Trago.

Gallium, Matth. Lac. Cast. luteum, Cord. in Diosc.

Lob. Lugd. Cam. Ger.

Gallium, Fuch. Dod. ut: Ang. Lon.

Gallium luteum, Ad. Thal. primum, Tab.

## II. Gallium rubrum.

Gallium rubro flore, Clus. hist.

III. Gallium nigropurpureum montanum tenuifolium, Colum.

## IV. Gallium palustre album.

Gallion palustre, Dodon.

Gallion flore candido in palustribus, Cæsalp. Castor.

Aparine lævis palustris, Thalio.

Gallium album, Lon. Tab. Ger.

## V. Gallium album minus.

Gallium album minus, Tab. rubrum, Ger. icō.

Folia bina plerunque, nonnunquam terna habet.

## C R U C I A T A.

**C**ruciatæ ac Cruciatæ, à foliorum in crucis formam situ nominatur, licet ad Rubiæ & Aparines similitudinem aliquomodo accedat.

## I. Cruciatæ hirsuta.

Gallij secundum genus, Trago.

Gallion, Turner.

Crucialis, Hermol. Cæf.

Cruciatæ, Dod. ut: Gef. hor. quæ Gallio cognata, Cam. Cast. icō.

Cruciatæ minor, Ad. Lobel. (& Asperula aurea) Lugdun.

Cruciatæ herniaria, Thalio.

Alysson Plinij, Cæsalp. Inguinaria Plinij lib. 26. cap. 9. quibusdam (Inguinaria passim in vepribus nascens, ut prolix in inguinibus in manu tantum habenda est: plura non habet) fortè quia in herniosis, rupturis solidandis, admodum præstans habetur.

Eadem in montibus longè exilior.

II. Cruciatæ glabra: hæc sub Gallio latifolij glabro in Prodomo describitur.

\*\*\*\*\*

## S E C T I O S E C U N D A.

## R U T A : T H A L I C T R V M.

## R U T A.

**Ρ**ύτταν Dioscoridi lib. 3. cap. 52. Theophrasto 1. hist. 10. ita dicitur quòd caliditate sua ρύτταν τὸ γαλόν (semen coagmentes) ut Nicandri schol. tradit. Ruta Plinio lib. 19. cap. 8. ubi ferendi modum recenset. Ruta fortè dicta à Græco ρύτταν: Scribit enim Jolanus in rebus Peloponnesiacis, ρύτταν in Peloponneso puto vocari.

Genera: Dioscoridi l. c. alia sativa & hortensis: alia montana & sylvestris: & hæc eidem duplex: sic ait. Ruta montana & sylvestris, sativâ & hortensî acrior est, & in cibû dammata: est autem in hortensî genere ejus aprior quæ juxta sicus provenit: sylvestris sativæ quodammodo similis est & c. 33. Vocant etiamnum sylvestrem rutam, quod in Cappadocia & Galatia Asiatica, Moly dicitur. Frutex folijs longioribus flore candido, &c. Sunt qui rutam hanc Hermala vocent, Syri Besafa, Cappadoces Moly, &c. Theophrasto, Ruta candice uno constat & arboru quasi naturam adipiscitur: & 2. hist. 1. ex palmite exit & avulsione: & 7. hist. 4. plura sunt ejus genera: & 7. hist. 6. sylvestris aspectu vicina urbana est, præterquam folijs minoribus, &c. & 1. hist. 16. Rutula folia carnosa habet, sed caro in latitudinem distenditur, non in rotunditatem crassatur. Plin. l. 20. c. 13. Sativæ folia latiora, rami fruticofiores: sylvestris borrida ad effectum est & ad omnia acrior, &c. addit Pythagoram, in hac marem, minoribus herbaceis, coloru folijs, à semina discrevisse: eam latioribus folijs & colore.

I. Ruta



Ruta pratensis major quarta, Tab.

Thaliectrum sive Thaliætrum majus, Ger.

IV. Thaliætrum majus florum staminibus purpurascens.

Thaliectrum majus quartum, Dod.

Thaliectrum quartum vel montanum tertium, Clus. pan. & hist.

Thaliætrum quintum flore purpureo, Cam.

Ruta pratensis major tertia, Tab.

Florum stamina dilutam violæ nigræ purpuram referunt.

V. Thaliætrum montanum album.

Thaliectrum 2. & 3. vel montanum 1. & 2. Clus. pan. & hist.

Thaliætrum sextum flore albo, Camer.

Duplex est, unum altius excrevit, flore candido admodum gravis odoris: alterum flore albo etiam, sed paulo humilior, minus ingrati odoris.

VI. Thaliætrum pratense angustifolium.

Thaliectrum pratense 2. vel 6. Clus. pan. & hist.

Thaliætrum tertium angustifolium, Cam.

Ruta pratensis major quinta, Tab.

VII. Thaliætrum pratense angustissimo folio: quod 1. in Prodomo.

VIII. Thaliætrum minus.

Hypecoum forte, Dod. gal. Lugd.

Ruta pratensis tenuifolia, Ad.

Thaliætrum tenuifolium, Cord. hist. Lob.

Thaliectrum minus, Dodon. Gerard. parvum, Camer.

Thaliectrum septimum, Clus. pan. & hist.

Ruta sylvestris altera, Cæs.

Ruta pratensis minor, Tab.

Stamina florum quandoque pallidi coloris sunt, quandoque ex luteo languescunt, & à violaceo purpurascunt.

IX. Thaliætrum minimum foetidissimum: quod 2. in Prodomo.

Simile, sed caule ex puniceo colore purpurascens Thaliætri maritimi nomine, D. Gillenius misit.

\*\*\*\*\*

## SECTIO TERTIA.

### DE LEGUMINIBUS CAPREOLIS Donatis.

**L**egumina dicta putat Varro à legendo, quoniam ea non secantur, sed vellendo leguntur. Græci *εμπελα* vocant, at Theophrastus *χιδρανα*.

FABA; SMILAX HORTENSIS, SIVE DOLICHUS, SIVE PHASEOLUS; PISUM; OCHRUS, SIVE ERVILIA; LATHYRUS sive Cicercula; Vicia & Aphaca; Arachus sive Cracca; Arachidna, & Lentesc.

### F A B A.

**A**cturi de Leguminibus, primo de Faba sermo erit, quia inter legumina maximus honos fabæ: quippe ex qua tentatus etiam sit panis, cuius farina Limentum appellatur, ut Plinius l. 18. c. 12. loquitur: ita hodie ejus farinam quidam Secale miscunt, & panem conficiunt solidum ac multi nutrimentis: Sic & Pbrifis etiam hodie magna ex parte fabarum farinâ, borderi farinâ aut avena admixta, panes faciunt.

Græci *νίαν* à seracitate dicta: vel *καλα τὸν νίον* *νίαν*, ut Eustachius vult: quemadmodum *νίαν* locum fabis confitus seu sebetum apud Theophrastum 4. hist. 10. Fabulum Gellio & Festo.

Duplex Dioscoridi lib. 2. cap. 127. & 128. altera *νίαν* & *ινδωνίαν*, altera *νίαν* & *ινδωνίαν*: illa Græca, quæ eadem cum vulgari videtur & ad differentiam Aegyptiacæ Græca dicta: hæc Aegyptia nominata. At Theophrastus 7. hist. 3. de communibus faba egit, quemadmodum de Græca 4. hist. 2. & de Aegyptia. 4. ejusdem 10. Plinius Fabam communem descriptionem statim, lib. 18. cap. 7. exhibuit, eam feri, aut folia habere multiplicia rotunda, ut & magna leguminum pars, solam ex leguminibus unicaulem esse (inter legumina sola potissimum erecto caule constat Theophr. 8. hist. 3.) quadraginta diebus florere & alterius lateribus sitigari: at lib. 18. cap. 12. nasci eam & sua sponte plerumque in locis sicut Septentrionali Oceani Insula, quas ob id Fabarias (idem Plin. 4. hist. 13.) appel-

V u

appel-

appellari: nam in Mauritania passim sylvestres esse: nemini & Aegyptia spinosa caula: Vitis nigræ, quæ papaveri simile, colore rufco, &c.

I. Faba, Brunf. Matth. Ang. Fuch. Tur. Cord. in Dioscor. Gesf. Hort. Lac. Lon. Cast. Cam. f. tiva, Lugd.  
Faba vulgaris, Trag. Fuch. Cord. hist.  
Phaselus sativus, Dod. gal. qui secutus Ericium Cordum, Fabam esse negat.  
Bona sive Phaselus major, Dod.  
Faba major vulgaris, Ad.  
Faba major recentiorum, Lob. hortensis, Ger.

Variat flore & fructu: floris colore, qui vel ex purpura nigrescit: vel candidus, lituris nigris conspicuus, quas literas lugubres dicunt, idè aliqui ijs non vescuntur: & harum esus à Pythagora prohibitus, vel quia animæ mortuorum in ea sint: vel quia existimant sensus habere & infomnia facere. Fructus magnitudinis, figura & colore differunt: sunt magnæ & inter legumina maximæ censetur, & quo majores eo magis in longitudinem depressæ: sunt minores quæ rotundiores: in qualibet siliqua ut plurimum ternæ, ad summum quinquæ. Colore plurimum candidæ, vel in candido pallentes, ex rubicundo colore purpurascens, nigræ aut in nigro purpurascens: & has Fabas nigras vocat, majores & minores facit, Cord. hist.

Fabæ duorum aut trium generum in Insula Madagascar repertiuntur: part. 4. Ind. Orient. cap. 1. Sic in Guinea varii generis, in primis alitæ delicatulæ & molles: part. 6. Ind. Orient. cap. 12. varia quoque genera in Anabonæ: part. 8. Ind. Orient.

II. Faba minor sive equina.  
Bona sive Phaselus minor, Dod.  
Faba minor Ad. Lugd.

Fructus alteretis quodammodo figuræ, ac in emenditate oblongo, colore subalbicans aut sublavus, alias nigro, umbilicum supernè parvum ac nigrum habens: medium quoddam genus inrer majorem ac sylvestrem fabam: majores enim minor & rotundior, sylvestribus minoribus ac longior. Ex hac apud zelandos & triticos panes fabaceos veterinis dant, & hæc minorum (hinc Bonam equinam vocant) iumentorum pabulum feritur, Dodon. At Sebusiani rustici non alio pane vescuntur, quam confecto ex paululo tritici, secale & rotunda minuta, faba, Lugdun.

III. Faba sylvestris fructu teretibus  
Faba sylvestris, Matth. Ad. Cast. Lugd. Tab. Cimer.  
Phaselus sylv. & niger, Dod. gal. (quæ forte Faba est) Gesf. hort. (cui Phaselus forte videretur) Lugdun.  
Bona sylvestris, Dod.  
Faba Græcorum sylvestris, Lob.  
Pisa nigra, Cimer.

Aracus, Fuch. s. j. vulgo Vitia Romani, Cimer.  
Cucophicos Cretensium nomine, ex Creta, ab Honorio Belli accepimus, quod ex illis duo semine faciliè regerminat.

IV. Faba Indica purgatrix.  
Faba purgatrix, Mouard, Fr. g. Lugd. 2. quæ ad descriptionem.

Phaselus Peruanus, Petri de Oñate ad Mouard.  
Fructus peregrinus undecimus, sive Phaselus colore Macconæ similis, Clus. exor. l. 2. c. 30.

V. Faba purgatrix latissima, ex Insula D. Thomæ.

Phaseolus major Clus. ad Monard.  
Cor Divi Thomæ, a forma & quædam Insula D. Thomæ nascitur, Et. 4.

Lobus crassus ex Insula S. Thom. Clus. ex. l. 3. c. 2.  
Phaseolus noviorbis, Ioh.

Phaseolus Americenus, part. 4. Tab. G. Ger.  
Faba purgatrix Lugd. 100.

VI. Faba Indica prælonga.  
Fructus 11. peregrinus, vel Phaseolus ex spadiceo nigricans, Clus. exor. l. 2. c. 30.

Fructus peregrinus 11. tab. 3. Lugd. Tab. Ger.

VII. Faba arborescens: hinc dicitur in 6 in Prodromo proposuit, quas Fabe arborecentes Anglicæ nomen. Amyl. & Lemp. 11. Jacobo Guillemi Hoof accepimus.

1. Faba arborescens rufa, sinu arborescente, circulari uncias quatuor longi, tria lata.

2. Faba arborescens media, umbilico circulari, cortice nigro striato.

3. Faba arborescens minor, umbilico circulari, cortice nigro.

an Phaseolus arborescens Tilemaris, Clus. exor. lib. 3. cap. 6.

4. Faba arborescens umbilico circulari, cortice nigro.

an Phaseolus peregrinus primus, Clus. exor. lib. 3.



lib. 3. cap. 7. qui & secundum priore minorem exhibet.

5. Faba arborefcens fcapulae os referens, fpadiceo cortice.

6. Faba arborefcens unguis magnitudine nigro cortice.

an Phafeolus peregrinus quintus, Cluf.

VIII. Fabae Brasilianae.

Fabae genus pollicis crafcitudine à Barbaris Commanda-ouafou appellata: Lerio defcripta. Brasil. c. 12. Habent & alias fabas craffas & minutas: par. 3. Amer. ep. alt. de Brasil.

## SMILAX HORTENSIS SIVE DOLICHUS, five Phafiolus.

**S**milax *ῥαφισ* folijs est hedera sed mollioribus, cauliculu claviculatum inflat propinquè fruticibus sese implians: ut operi copiaris inferviat, cuius fructus *ἀκτὴ* (quasi filiquula dicas) femina continet renibus finitima, non aquali colore, sed ex parte rufefcentia, &c. Dioscoridi lib. 2. cap. 176. Hæc ab Hippocrate, Diole, Theoph. & plerisque alijs *ἀκτὴ* vocatur: à nonnullis à filiquarum magnitudine *ἀκτὴ* & *ἀκτὴ*: ab alijs *φασίλα* (& *φασίλα* ut aliqui volunt differens) Galeno 1. aliment. fcribente. Dolichus Theoph. 8. hist. 3. Et Actius Smilacem hortensem Dolichos esse & Phafeoli genus. & ab omnibus Lobos nominari, aperit docet. *φασίλα* apud Dioscoridem lib. 2. cap. 130. sed sine ullo potu habetur. Sunt tamen qui Smilacem hortensem à Phafiolu, solum filiqui & semine differre censeant, quæ in Smilace majora sint, ut Matthiolus voluit, qui pro Phafio & pro Smilace hortensem eandem pingere videtur, nisi quod pictura una recta, altera inflexa est: At Angustura, phafiolum & phafelum non distinguit: auctor hist. Lugd. assertit Galeno vocem Phafiolum quatuor syllabu prolata, à Phafelo tribus syllabu pronunciato, diversam esse, & de hoc cum Erylijs simul tractasse. Plinius lib. 18. cap. 7. Phafeolu folia venosa tribuit.

Duplicem facimus, vulgarem alium, alium peregrinum: vulgarem, fructu longiore & venis formam melius referente, qui communiter candidus: alium minorem filiqua angustiore: distanti etiam crassitie & tenuitate. Hic variat floris & seminis colore: flores plerunque candidi, pallidi, flavescentes, purpurascens five amethysti. ni, & ut Cordus in sua historia censuit. floris colore fructum sequuntur. Verum in semine fructu major est colorum varietas, sunt nivei, flavi, ex flavo obsoleti, purpurei, rubri, laterices fere coloru, amethystini, violacei, atroviolacei, nigri, initio purpurei deinde atrii: vel albi nigri venis & laciis distincti: Item carnei & cinerei similibus venis insignes: Item albi purpurascens, orbibus albis variegati, vel spadiceo nigro maculis aspersis: nonnulli incani, atro colore, vel ab una parte, vel utrinque notati.

*Smilax hortensis five Phafeolus  
vulgaris.*

### I. Smilax hortensis five Phafiolus major.

Phafelus, Brunf.

Phafeolus, Dod. gal. Camer. vulgaris (vel Faba Turcica multicolor) Adv. Lob. Cluf. pan. & hist. albus, Ger.

Smilax hortensis, Brunf. quoad descript. Trag. (cui & Siliqua Theoph.) Matth. (& Phafeolus hortensis) Fuch. Tur. Lac. Cord. in Diosc. Gesn. hort. Lugd. Tab. (qui, ut & Gerardus, fructus duodecim generum pingit) Cam.

Smilax sativa five lenis, vel Dolichus, Cord. histor.

Dolichos Theophrasti, Ang.

Dolichus (five Phafeolus) Dod. Lon.

Phafeoli genus peregrinum, quos Phafeolos Turcos vocant, Cæf.

### II. Smilax hortensis minor.

Dolichus alter, an Phafeolus minor five Alexandrinus Tralliani, Dod.

an Phafeolus, Tur.

Sola magnitudine à priori differt.

### III. Smilax filiqua sursum rigente: vel

Phafeolus parvus Italicus.

Phafeolus, Matth. albus, Lugd.

Phafeolus, Phafelus, Ang. Cord. in Dioscorid. & histor.

Phafilus, Cæf.

Flore est majore candido papilioni simili, foris in viridi colore pallefcens: folijs nullam asperitatem habentibus: sunt majores & minores: sunt albi, subnigri, illi macula nigra, hi alba notati est: & minor albidus, cum orbita rubente aut nigritante.

*Phafeolus peregrinus.*

Non minor sanè varietas est in Phafiolis ex America, Africa atque alijs regionibus, pro-

Vu a cul

cul ab orbe nostro remotis, quàm in his quæ in Europa nascuntur: Sunt enim majores, minores, mira colorum varietate inter se differenti. Illorum nonnulli, aut prorsus candidi, aut flavi, aut cinericei, aut fuscii, aut atrii, aut rubri, aut amethystini, aut varijs coloribus non uno modo distincti: interdum albo & nigro, rubro & nigro flavo & nigro: sic alius ex flavo & spadiceo simul mixti coloris, at circa hilum candidus: alius roseus, in quo rubri non nihil elucet, &c.

I. Phaseolus peregrinus hortensia affinis, semine lato albo, multis nigris venis striato. Phaseolus 1. sive Africanus, Clus. pan. Phaseoli peregrini primi genus alterum, Clus. hist.

Phaseoli magni lati albi, Lob. ico.

Phaseolus Africanus, Cam.

an Okindiger in Virginea, fabis Anglicanis similes, planiores tamen & diversorum colorum, nitidæ & maculosæ: in desc. Virgin.

Okindiger in Virginea, par. 1. Ind. Occid.

Ex Africa primum allatus.

Variat: ex nigro varius, prorsus niger, coloris regularum, strijs per longitudinem nigris.

II. Phaseolus peregrinus primo similis, fructu lato, albo striato.

Phaseolus peregrinus 9. Clus. hist.

III. Phaseolus peregrinus hortensia affinis, fructu tumidiore minore niveo.

Phaseolus peregrinus 2. sive Phaseolus de Guatimela, Clus. pan. (at icon habetur sub Phaseolo Purkircheriano 2.) & hist.

an Phaseoli parvi pallido albi ex America delati, Lob. ico.

IV. Phaseolus peregrinus Anagyridis fructu similis, ex nigro subvirescens.

Phaseolus Ægyptiacus 5. Clus. pan. desc. at figura habetur sub 3.

Phaseolus peregrinus 5. Clus. hist.

Phaseolus Ægyptiacus, Tab. Ger. desc.

an Dolichus, Bellonio.

V. Phaseolus peregrinus Anagyridis fructu similis colore rubescente.

Phaseolus peregrinus 3. qui cum sequenti Lobi Indici nomine ex Hispania missus, Clus. pan. quoad descriptionem: & hist.

VI. Phaseolus peregrinus minore fructu, albo nigra macula insignito.

Phaseolus peregrinus 4. Alubias de Indias, Clus. pan. quoad descriptionem: & hist.

Phaseolus albus, Lugd.

Phaseoli pumiliones, albi & nigræ, Cam.

Variat colore: est alius niveus nigra macula notatus: alius in lateribus nigris maculis signatus.

VII. Phaseolus peregrinus angustifolius, eodem cum Smilace hortensi minore.

Phaseolus peregrinus, Dod. sextus, Clus. hist.

Fructu est vulgari minore & planiore, velis subrubri: ex Hispania Frizole, Guadalupe mine missus.

VIII. Phaseolus peregrinus angustifolius alter, fructu ex albo & nigro variis.

Phaseolus peregrinus septimus, Clus. hist.

Variat: nam in fructu istria: nunc multitudine extenduntur: nunc in alio minus majores vel minores, confuso ordine, albae vel exiguae albæ maculæ in lobo. Vix minus in parte media conspiciuntur.

IX. Phaseolus peregrinus foliis trilobis, fructu ex albedo, nonnunquam variegato.

Phaseolus peregrinus octavus, Clus. hist.

Fructus, colore est ex albedo: aliquando nigricantibus virgulis secundum longitudinem, vel confusè notatur: interdum totus nigricat.

X. Phaseolus peregrinus lobo & fructu nigro.

Phaseolus peregrinus 10. Clus. hist.

XI. Phaseolus peregrinus fructu variegato.

Phaseolus peregrinus 11. Clus. hist.

Fructus planus dilatatissimus, nigris virgulis per longitudinem excurrentibus: aliquando maculæ magnæ vel exiguæ confusè asperguntur: interdum altera solum parte nigricat, & vis rubris maculis variegatus.

XII. Phaseolus peregrinus fructu subtendente nigris strijs variegato alter.

Phaseolus peregrinus 12. Clus. hist.

Aliquando plurimæ istria: totum semina reddunt.

XIII. Phaseolus peregrinus ex albidis columbina ferè figura, fuliginosa macula insignitus.

Phaseolus tertius peregrinus, Clus. ex hist. 1. c.

XIV. Phaseolus peregrinus nigri macula subalba notatus.

Phaseolus quartus peregrinus, Clus. ex hist. 1. c.

Phaseolus Æthiopicus vel niger.

I. Phaseolus Æthiopicus lobia nigris semina aspersa, fructu latiore splendens.

Phaeol. peregrinus 13. vel Æthiopius, Cl. hist.

II. Phaeolus Æthiopicus lobis flavescens fructu nigro.

Phaeolus peregrinus 14. Cl. hist.

III. Phaeolus Æthiopicus lobo saturo purpureo, fructu arbo.

Phaeolus peregrinus 15. Cl. hist.

*Phaeolus Guinenfis.*

I. Phaeolus Guinenfis fructu fusco spadiceo.

Phaeolus peregrinus 16. Cl. hist.

Sunt majores, sunt & minores.

II. Phaeolus Guinenfis lobo cortice nigro testis & in cuspidem longam & acuminatam desinente.

Phaeolus peregrinus Nigritarum, Cl. exot. lib. 2. cap. 11.

III. Phaeolus Guinenfis lobo ex fusco cineraceo fructu nigro.

Phaeolus Nigritarum 2. Cl. lib. cit.

IV. Phaeolus Guinenfis lobo ex fusco cineraceo, fructu spadiceo superiore majore.

Phaeolus Nigritarum 3. Cl. exot. lib. cit.

V. Phaeol. Guinenfis siliqua ulnæ longitudine. Fabæ magnæ in siliquis, quarum aliæ ex arboribus pendunt ad ulnæ unius longitudinem & palmi latitudinem, partim versicolores ex rubro & nigro, quales Turcicæ vocantur, sed majores: partim albæ & rotundæ, quarum singulæ suis siliquis insunt, veluti Ciceres: par. 2. Ind. or. c. 4.

*Phaeolus Aegyptiacus sive Lablab.*

I. Phaeolus Aegyptiacus nigro semine.

Phaeoli genus Leplap sive Lablab, Cl. pan.

Phaeolus peregrinus Leblab, Cl. hist.

Phaeolus niger Lablab vocatus, Alpin.

Est & niger & spadiceus, hilo albo.

II. Phaeolus Aegyptiacus semine rufo.

Lablab alterum rufum Alpini, Cl. hist.

*Phaeolus Indicus.*

I. Phaeolus Indicus major bicolor.

Phaeolus peregrinus Indicus, Cl. pan. & hist.

Phaeolus 5. sive Aegyptiacus, Cl. pan. ico.

Phaeolus Aegyptiacus, Tab. Ger. ico.

Fructus est nucis pontica paulo minor, parte superiore niger, inferiore aureus.

II. Phaeolus Indicus minor: est rubens, variegatus, fuscus, maculatus.

III. Phaeolus Indicus minor alter.

Mates, Cl. in Garz. & pan.

Phaeolus Indicus alter, Mates, Cl. hist.

Fructus peregrinus 10. Cl. exot. lib. 2. cap. 30.

Fructus est purpureo, aut albis purpureisque maculis distincto.

IV. Phaeolus Indicus ruber.

Phaeoli rubri Indiani durissimi, Lob. ico.

Est ruber, ex phœniceo croceus, ex rubro spadiceus splendens.

V. Phaeolus Peruvianus ruber subrotundus.

Phaeoli peregrini variorum generum, Cl. exot. lib. 2. cap. 13.

Hujus differentię aliquot: alius major, coloris ex atro rubentis, quia parte lobo adhæserat longiore vestigio nigro præditus: alter minor, satis crassus, coloris rubri corallij æmuli: vel alter forma similis, coloris magis saturo & ad puniceum quodammodo vergente: tertius elegantissimus magis orbicularis, qui major & minor, color in utroque bifariam divisus, media ex parte corallij instar rubet, altera ater, lævis & splendens est: & hic Anacok dicitur.

VI Phaeol. pereg. ex rubro & nigro distinctus. Anacok, Cl. exot. lib. 2. cap. 11. & lib. 3. cap. 13.

VII. Phaeolus peregrinus bifidus duplex: aliter orbicularis cineracei coloris, tenui atramembrana alba testus.

Phaeoli alij peregrini, Cl. exot. l. 3. c. 14. qui & tertium addit, lævem, spadiceum, durum & solidum, Capotillo del Aldana nomine misum.

VIII. Phaeolus Indicus ovatus: hic varius est colore: est niger, spadiceus umbilico albo eoque majore vel brevior: sanguineus, hilo nigro.

IX. Phaeolus orbicularis niger Americanus. Parapar, Cl. exot. lib. 2. cap. 21.

*Phaeolus Americanus, vel Brasiliensis.*

I. Phaeolus Brasiliensis folijs molli lanugine obsitis, fructu magno.

Phaeolus Brasiliensis Macouna dictus, Cl. ad Monard.

Phaeol. Brasiliensis. Lob. Cam. Ger. tertius, Tab. Phaeolo Nigritarum similis ex Pernambuco Americæ, spadiceus coloris Macouna appellatione insignitus, Cl. exot. lib. 2. cap. 6.

Et hic variat colore fructus: alius rufescit, alius dilutioris coloris, alius totus niger, alius punctatus.

Similes ex cinereo candicantes ex Africæ Mauritaniam adferunt: quo solo a Brasiliensi differunt, Cl. Lugd. (magnitudine).

II. Phaeolus Brasiliensis alter fructu nigro pisi Phaeol. Brasiliensis aliter, Cl. ad Monard. Lob. Tab.

Phaseolus alter Indicus, Lugd.

III. Phaseolus Brasiliensis vulgaris similis, sed major & latior.

Phaseoli genus & Brasilia, novi orbis provincia, Clus. ad Monardem.

Hic modo flavus, modo omnino niveus, modo dilutior colore, modo ater, aut purpureus, aut albus purpureisque maculis distinctus.

IV. Phaseolus Brasiliensis spadiceus coloris & circa hilum fusci candicantis.

Phaseolus Brasiliensis, Clus. exot. l. 3. c. 12.

V. Phaseolus Brasiliensis minor.

## P I S U M.

**P**isum, Græci πῖνον & πῖνον vocatur, quod a πῖλον derivatum videtur, quod decorticare perierique etiam πίνωτες dici putant, sed improprie: nam ex farina leguminum pulmentum dicitur a Græcis, Galenus in lib. de cibi boni & mali succi testatur. Pisum verò, a Pisa, loco in quo olus nascitur, nominatum dicunt. Hujus Dioscorides non meminit, nisi forte cum Phaseolo comprehendit. Hippocrates, Theophrastus, Galenus, Aegineta. Nam Theophr. 8. hist. 3. leguminum alia solum habent, ut Fabam, alia oblongam ut Pisum. & hoc caulem humi procumbentem habet: & 8. hist. 5. Phaseolum clausa, non intersepta, sed quasi invicem contingentia, consilium: & 3. caus. 27. vermes in Pisum, alimenter caligine, intemperiem, cum plus minusve alimenti præbetur, aut aer immo dicitur humidus per se, etiam cum non tempestive humefcit. Plinius lib. 18. cap. 7. & 12. Pisum obiter meminit.

Genera duo sunt: est majus & minus: majoris seminat efficata angulosa sunt, inaequales angulos habent colore alias candido, alias sordido: Minus similiter duplex, aliud quod in hortis feritur, quod sepe suffertur, majus est, aliis exiguum fructum cumq; serius reddit: & illud est quod in agris feritur, minus habet ut plurimum candido, aliquando tamen ex purpura obscurus fructus colore ut plurimum luteo, unde & Græci, a luteo ochrea colore, quem ipsum fructus medulla interior refert, dicitur subinde viret.

I. Pisum majus quadratum.

Phaseoli primum genus, Trago.

Pisum prima species, Dod. gal.

Pisum majus, Dod. Gerard.

Pisum angulosum hortorum quadratum Plinij, Ad.

Pisum quadratum Plinij, Lob. ico. Tab.

Pisa Italica grandia, Cam.

Pisum magnum peregrinum, Eyst.

Fructus dum virent, rotundi sunt: exsiccati angulosi & cinerei sunt: imò & candida & subflava, Lugd.

II. Pisum umbellatum: & Ger.

Pisum primum genus, Trag.

Pisum proliferum, Tab.

III. Pisum hortense majus.

Cicer arietinum & Pisum alterum genus, Trag. Dod. gal.

Pisum majus, Matth. Fuch. Ang. Lon. Cast.

Pisum minus, Dod.

Pisum vulgarius majus, Ad. Lob. ico.

Pisum ramulare, Lugd.

Pisum vulgo, qui & Piseoli viridis meminit, Cæli.

Phaseoli parvi ex America, Lob. Lugd.

Phaseolus Brasiliensis primus, Tab.

Hujus magna varietas, quare fructus cum genera, Tab. & Gerardus pingunt.

VI. Siliquulam angustam, vix utramque cui grana aliquot exigua, subviridia, coloris albo in medio, ut in Phaseolis, ex luteo cum quibusdam alis, Reverendus D. T. tuius cum sequenti inscriptione mittit. Siliquula, ut & semen huic chartula inest, est herbæ Anil, nec est species Glastii, sed gumen.

Flore est purpureo, aliquando albo & variis, partim albo & partim ex purpura fusco, Fructus est rotundo albo est & rubro, aliquando rubro variegato.

Pisa quoque alba in Brasilia habetur, quæ Commanda-miri nuncupant: Ler. descript. Brasil. cap. 12.

IV. Pisa Virginiana.

Wikonzóvv, nos Pisa appellamus, se potestate Anglicana superant: desc. Virgin.

V. Pisa Virginiana sylvestris.

Pisa syl. Anglicanis minora, esui apta, de Virg. VI. Pisum arvense.

Pisum, Brunf. Dod. gal. Tur.

Pisum agreste, seu 3. genus, Trago.

Pisum 3. species & minor quæ & Ervilia, Dod. gal.

Pisum minus, Matth. Lon. Dod. Cast.

Pisum minus ex luteo virens, Ad. Lob.

Pisum in arvis humi serpens, Lugd.

Ervilia sive Ochrus, Eid.

Pisa vulgaris, Cam.

Pisum minus 1. & 2. Tab.

Flore est candido, vel diluti rosei coloris: fructu rotundo, albo, viridi, ex luteo virente, cinereo, cæruleo: nigra habet Gesnerus, quæ sapore, odore à communibus nil differunt, quæ Pisum nigra Tabern. nominat.

VII. Pisum sine cortice duriore.

Pisum leptolaba, quæ simul cum folliculis comeduntur, Camer.

VIII. Pisum exoticum ochræ colore.

Pisum ochræ colore, Clus. exot. l.3. c.15.

IX. Pisum sylvestre perenne.

Pisum sylvestre, Adv. Cl. pan. & hist. Thal. Tab. (qui majus & minus pingit.) Ger.

Pisum sylvestre Pannonicum, Cam.

Phaeolus sylvestris, Lugd.

X. Pisum vesicarium fructu nigro, alba macula notato.

Vesicaria nigra sive peregrina, Trag. Dod. gal.

Vesicaria sive Halicacabum repens, Matth.

Halicacabum peregrinum, Fuch. Dod. Ges. hor.

Lugd. qui & Fuchij & Matthioli figuram exhibet, Tab. (& Cardispermum) Cam. Ger.

Dorycnium & granum cordis, Cord. in Diofco. & h. flor.

Solanum peregrinum, Lac.

Caput monachi, Ges. hor. & colleo.

Pisum cordatum, Ad. & cor Indum, Lob. Eyf.

Faba inversa recentiorum, Cæs.

Vesicaria altera, Cast.

*Pisum Indicum.*

I. Pisum Indicum majus.

Variat fructus colore nigro, subfusco, variegato, umbilico eminente.

II. Pisum Indicum minus coccineum.

Pisum rubra ex novo orbe, Ges. hor.

Pisum coccineum Americum, Lob.

Pisum Americanum, Lugd.

Phaeolus ruber Abrus vocatus, Alpin.

Phaeolus ex Ieme, Hon. Belli epist. 5. ad Clus.

Phaeolus Indicus, vulgò falsò Pœonia Indica: nomine Ginge & Abrus mittitur, Cam.

an Sandali rubri semina, Cæs.

Vicia Africana, Clus. exot. l.4. c.15.

Fabarum genus quod Ægyptijs Abrus, part. 2.

Ind. Or. cap. 4.

Et hic major coccineus compressus: & minor coccineus nigra macula notatus reperitur.

III. Pisum virulentum Chiuense.

Fabarum genus quod Abrus Latinis, Conduri Malays, Saga Javanis, quibus pro solis ponderibus utuntur, Linseot. par. 4. Ind. Or. cap. 8. & par. 3. cap. 29.

Sic Fabis rubris & nigris pro ponderibus in Guinea utuntur: par. 2. Ind. Or. c. 18.

## OCHRUS SIVE ERVILIA.

**Q**uia Theophrasto 4. caus. plant. 2. 25. a luteo Ochra colore quem medulla referat nominatur, & Gaza Cicera reddit, Plinio l. 18. c. 7. & alij Latini Ervilia dicunt.

Duplex est. Sativa, quæ Pisum est minus, & Sylvestris, de qua nunc.

Ochrus folio integro capreolos emittente.

Aracus, Matth. (cui & Aracus nigræ) Cast. (ad dir. A. hac figura) Cam.

Ervilia, Ang. sylvestris, Dod. ut:

Ochrus syl. sive Ervilia, Ad. Lob.

Cicer ervinum quorundam, Lugd.

Isopyron, Cæs. alp.

Papulles Creticæ nomine, semen ab Honorio

Belli missum: facillè germinat. Semina colore sunt subluteo alij pullo, etiam atro observarunt.

## LATHYRUS SIVE CICERCULA.

**L**eyceum quod Græci Λάθρον appellant, a Columella & Palladio Cicercula dicitur, de quo Theophr. 8. hist. Plutarch. in probi. Rom. scribit Pythagoricos averfatos esse fabas quæ Λάθρον, & non ἐρίβιον, ut παρὰ τὸ ἐρίβιον & τὸ Λάθρον, ad etymon alludens. Verum Λάθρον herba ab hac diversa est, de qua inter Tichymalos.

Duplex est: nam vel fertur vel sponte provenit. Et in sylvestri differentia magna est, in foliorum latitudine & angustia: florum colore rubro, purpurascente, albo, flavescente: siliquarum longitudine, brevitate, busiute, & levitate.

I. Lathyrus sativus flore fructuq; albo.

Pisum Græcorum sativum, Trago.

Ervum album Sativum, Fuch.

Lathyrus, Cicercula, Dod. gal.

Phaeolus minor, aliquibus Ervum angulosum, Cord. in Diofco.

Ervum, Lacun.

Cicercula, Ang. Lon. Cæs. Castor.

Aracus

Aracus alter five Lathyrus minor, Dod.  
Lathyrus angustiore gramineo folio, Ad. Lob.  
Lathyrus leguminosa angustifolia, Tab.  
Lathyrus sativus angustifolius, Lugd.  
Lathyrus alter flore albo, Camer.

II. Lathyrus sativus flore purpureo.

Aracus five Cicera, Dodon.

Lathyrus flore purpureo, Cam.

Flores habet ex rubra purpura in puniceum inclinantes: grana angulosa, alia obsoleta, nigroque proxima.

III. Lathyrus sylvestris major.

Pisum Græcorum sylv. Trag.

Ervum sylvestre, Fuch.

Cicerula, Turner.

Lathyrus sylvestris, Dod. ut: Clus. hist. Lug. ico.  
Mochi in Hetruria, Cæs.

Lathyrus sylvestris, Eysf.

Variat flore albo: nonnihil ex luteo pallente: est & rubente.

IV. Lathyrus major sylvestris alter.

V. Lathyrus sylvestris minor.

Catanance, Dod. gal. Ges. hort. Lugd.

Ervum sylvestre, Dod. herbariorum, Ad. Lob.

VI. Lathyrus latifolius.

Clymenum, Matth. Cast. defer. Clus. pan.

Ervum sativum, Cord.

Lathyrus sylvestris latifolius, Cam.

Lathyrus Narbonensis latiore folio, Ad. Lobel.  
Eysfett.

Lathyrus sylv. major, five purpureus, Thal.

Ervilium, Cæs.

Cicerula sylvestris, Taber.

VII. Lathyrus angustifolius siliqua hirsuta.

Flore est cæruleo penè violaceo.

VIII. Lathyrus angustifolius, Gerarde, maritimus.  
Aracus Hispanicus five Lathyrus Ægypticus, Camer.

Cicerula Ægyptiaca, Clus. hist.

an Aracus, Ad. Lob. & Cicera, Lugd.

IX. Lathyrus angustissimus folio, Aracus, Camer.  
nus variegatus.

Orobi Americani nomine in horto mædici, Lugd.  
Lathyrus peregrinus è cæruleo purpurascens  
flore: & suaviter rubescens, Eysf.

X. Lathyrus angustifolius humilis, Ervum Monspeliensium.

XI. Lathyrus sylvestris major angustifolius folio: in Prodromo descriptus.

XII. Lathyrus peregrinus foliis vicinis, sed re subcæruleo, pallidè purpurascens: in horto meo crevit.

XIII. Lathyrus sylvestris luteus foliis, Aracus an Aracus flore luteo, Adver.

Legumen terræ glandibus simile, Dod.

Glandibus terrestribus congener flore albo, Clus. pan.

Eachyrus sylvestris floribus luteis, Thal.

Vicia, Taber.

XIV. Lathyrus arvensis repens tuberosus.

Apios, Trag. Fuch. Lugd.

Pseudoapios, Matthiol.

Chamæbalanus, Dod. gal. Taber.

Ornithogalum purpureum, Cord. in Diosc.

Astragalus, Tur. Penæ, Lugd.

Panis porcinus, Lonic.

Astragalus arvensis, Thal.

Terræ glandes, Dod. Ad. Lob. Gerard.

Glandes terrestres, Clus. pan. & hist.

Arachidna, Theophrasti, Colum.

## VICIA ET APHACA.

**G**alenus 2. aliment. scribit ab Asiaticis minor dici legamen, eoque solo nomine id vocari: Atti uero vocantur aut nigræ. Latine Vicia nominatur à vinciendo, ut Varroni placet, quod stemi capreo dicitur ut vitis, quibus sursum versus serpit ad scapum Lupini, aliūve calamum, ad quem ut adhæreat, eum sibi inleat. Et hæc duplex est. Sativa & sylvestris.

Aphacæ legumen Dioscorides l. 2. c. 178. aphacæ nominat, quæ in arvum nascitur, lente altior, siliqua longiorum majoribus, in quibus semina terna, quaternæve, nigra lente minoræ. Theophrasto Aphaca duplex, altera sola est, de qua inter Intubaceæ: altera legumen, quod cum Lente & Piso in leguminum genere s. hist. 3. v. 1. & Plinius l. 27. c. 5. Theophrastum secutus est: Galenus cum Vicia conjunxit.

I. Vicia sativa vulgaris semine nigro.

Ervum, Brunfels.

Orobis sativus & Vicia major & r. Trag.

Vicia, Anguil. Lonic.

Vicia, Græcorum Aphacæ, Cord. in Diosc.

Semina alia nigricant, alia cinereum colorem obtinent.

II. Vicia sativa alba.

Ervum candidum, vel Faba veterum, Trag.

Vicia alba, Anguil.



Vulgaris pilis compressum & coloris pallid.

III. Vicia maxima dumetorum.

Vicia sylvestris altera, vel 1. Aphace Dioscorid.

Osmunda Latino um, Trag.

Cracca major, Taber.

IV. Vicia sepium folio rotundiore acuto.

Oreus sylvestris, live Vicia major syl. & 2. Trag.

Aphace Matth. Ang. Gef. hort. Cast.

Aphace, Luchf.

Vicia, Dod. ur: Ad. Lob. Clus. hist. Cæs.

Vicia sylvestris, Lonic.

Semen nigrum aut macularum, crassitie, rotunditate & amaritudine differt.

V. Vicia vulgaris acutior folio, semine parvo nigro.

Vicia, Marthioli, Lac. Cast.

Aphaca vera, Lugd.

VI. Vicia multiflora.

Galega altera, vel sylvestris, aut German. Dod.

Galega sylvestris Dodonæi, Thal.

Aracus, Taber.

VII. Vicia Onobrychidis flore in Prodromo descripta.

VIII. Vicia sylvestris spicata.

Vicia sylvestris spicato flore, Clus. pan.

Vicia sylvestris secunda, Clus. hist.

IX. Vicia sylvestris hirsuta incana.

Vicia sylvestris flore albo, Clus. pan. & hist.

X. Vicia sylvestris lutea siliqua hirsuta nondum descripta Monspelij collecta, & Norimberga à Doct. Doldio Ciceris aut Pisi nomine missa.

XI. Vicia lutea folijs convolvuli minoris.

Aphace Dioscoridis, Gal. Plinij, non Theophr. Dod. ur:

Pirine Theophrasti, Ang. Cam.

Aphaca, Ad. Lob. Cæs. Camer.

Orobanche leguminum, Lugd.

Elatine tertia, Taber.

## ARACHUS SIVE CRACCA.

**F**ruentorum unum quod, est, quod Græci *Ἀραχὺς* Theophr. 8. hist. 10. (*rem scabram & duram dicit, quæ in lente nascatur*) nominant. Ruellius Craccam appellari refert. Differt ab Aphaca & Vicia potissimum semine: nam Cracca semina exquiret rotunda, nigra: & ut Galenus inquit, 1. alim. facult. c. xxvj. Erro minor. Aphaces verò & Vicia semina, non rotunda, sed aliquanto latiora, veluti Lentium, teste Galeno 1. alim. facult. c. xxxvj.

I. Vicia semine rotundo nigro.

Vicia minor vel 1. Trag.

Arachus, Dod. gal. Gef. hort.

Cracca primum genus, Dodon.

Aracus, Araca & Cracca major, Ad. Lob.

Arachi primum genus Dodonæi, Thal.

Flores parvi & purpurei.

II. Vicia segetum cum siliquis plurimis hirsutis.

Vicia minima vel quarta, Trago.

Arachus altera, Dod. gal. Thal.

Aracus sive Cracca minima, Ad. Lob.

Cracca alterum genus, Arachis potius, quàm

Arachus, Dodon.

Arachus, Lugdun.

Cracca minor, Taber.

Flosculi in parvis speciebus candiduli, semina incana ac subalbida.

III. Vicia segetum singularibus siliquis glabris.

Flosculi parvi candiduli, singuli singulis pedicillis insidentes.

IV. Viciola flore luteo semine nigro.

Aracus, Cæsalp.

## ARACHYDNA.

**Q**uædam scribit Theophrastus 1. hist. 11. ex radicibus plures differentias præter prædictas sortiuntur (*ὅτι τὰ ἀραχιδναὶ τὸ ποιοτὶ τὸ ἀραχὺ*), h. e. seu Arachidna radix ejusq, quod simile est Araco: ambe namq, fructum non minorem superno afferunt. & neutrum aut solum, aut folio simile quicquam gerunt, utrumq, potius velut *ἀμπίναξ* non est, h. e. infra suprag, terram fructum edit. Plin. 1. 21. c. 11. Arachidna & Aracoides (potius Arachoides) &c. Vox hæc *Ἀραχιδνα* composita videtur *ἀραχὺ* & enim Cicercula species est, quam hæc folijs & fructu refert: *ἀραχὺ* verò tubus significat, cujusmodi similitudinem quandam radices habent.

I. Viciæ similis supra infraque terram fructum edens.

Arachidna Cretica, Belli: quo nomine tota

plantam transmisit.

Arachidna Cretica an potius Aracoides Theophrasti, Ponæ.

Araco *lunari* Theophrasti an? Clus. ex. l. 4. c. 16.  
Variat semen in siliquis ad radicem, in alijs nigerrimum, in alijs Orobo simile, in alijs variegatum.

II. Junfa, planta quæ in Angra iussit tromenti scitur, ad cujus radices grana rorantur pili magnitudine, pistaciotum sapore. Linn. part. 3. Ind. Orient. c. 6.

L E N S.

**L**ens & Lenticula, paxus Dioscor. l. 2. c. 129. Theoph. & paxus dicitur, et si aliqui paxum dixerint, paxus verò & lentem, & lentem coctam, & ipsam ex lute pulmentum dixerint. Dicitur autem paxus, quia quasi paxum, ut sit in paxum, ut sit in oculorum enim aciem bebet are Dioscor. l. 2. c. 129. ut qui sunt & non, metat hest & mutatione unius elementi. Latine lens quod lens dicta, dicitur, quia lens c. 12. ea vescentibus, equa uimitatem fieri apud auctores seculum seculum.

Genera: duplex est, arvensis & palustris. hic de arvensi tantum paxus plura genera Theoph. l. 2. c. 129. duo sunt lentis genera in Aegyptio alterum rotundius nigriusq., alterum sua figura, nude varium, ut nunc sit in lenticula nomen. Recentioribus colore & magnitudine differunt: sunt enim alba marocæ & ex luteo pallida, cinerea, ruffa, minores & deteriores: sic flores albi, candidi: cinereus, purpureus.

I. Lens vulgaris.  
Lens, Brunf. Fuch. Dod. gal. Cord. in Diosc. Lon. Ad. Taber.  
Lens vulgaris sive agrestis, & Lenticulæ primum genus, Trago.  
Lens minor, Lob. Dod. Lugd. Cam. epit. Ger.  
Flos in candido purpurascit: grana alia sub-ruffa, alia ex luteo pallida, nonnulla ex cano albave fusca & nigricantia.  
II. Lens major.

Lens sativus & Lenticulæ alterum genus, Trago.  
Lens, Matth. Ang. l. ob. Cast. Cal.  
Lens major, Gef. hor. Tab. Ger.  
Lens Italica, Camer.  
Hoc candidius & majus priore: multum tamen album minus est, & quod candide re, orbe paulo majore est.  
III. Frisoles & Palaros peculandi herbarum genus nuncupant, quas eo fire loca dicitur, quod nos Pifa, Lentesc & Fabas: Josef. Ad. Gal. 4. c.

\*\*\*\*\*

SECTIO QUARTA.

DE LEGUMINIBUS CAPREOLIS CARENTIBUS.  
OROBUS SIVE ERVUM; CICER LUPINUS.  
Foenum grecum.

OROBUS SIVE ERVUM.

**O**rob. & Græcis, Ervum Latine: Græcorum vocem quidam deducunt a *εργον* id est *labor*, quod boves eo vescantur & saginentur. Dioscor. l. 2. c. 131. fructus est exiguus, semine angustissimo, parvareus femina: & ut Theophrastus 9. hist. 2. fructu rotundo modo pipere. Plinius l. 17. c. 11. Ervum & cum Fissa conjunxit.

Genera duo, sativum & sylvestre: illud duum generum, candidum & rufum: Galenus tertium addit, n. mpe pallidum, inter priora medium est & quartum Creticum, quod semine minore est.

I. Orobis siliquis articulatis femine majore.  
Orobis sive Ervum, Matth. Gef. hor. Ang. Cord. in Diosc. l.ugd.  
Cicer sativum, Dod. gal.  
Ervum, Gef. hor. Guil. (sive Mochus) Cast. Tab. verum, Camer.  
Mochus sive Cicer sativum, Dodon.  
Cicer usreceptus herbariorum, Advers. Lobel. Gerard.

Flores subpurpurascens, aliquando candidi.  
II. Orobis semine minore.  
Orobis Creticus, Matth. Lugd.  
III. Orobis semine brutissimi paulo.  
Cicer orobæum Theophrasti, Ad. Lob. Lugd.  
Semen est Orobo duplo majore albidius, lente aut fulvulo, & ab Orobo nigre lineatissimum & lano.

CICER

## C I C E R.

**C**icer, qui ἰσχυρὸς & Gracu, genera duo Dioscoridi lib. 2. cap. 126. sativum & sylvestre : sativi genus alterum arietinum reddunt, quia arietem significat appellatur Theophrasto 8. hist. 5. Cicer & magnitudine & sapore, & colore, & forma pleraque differentias ostendit, αὐτὸν ἰσχυρὸν ἐπὶ τοῖς αἰσθητοῖς ἐστὶν αἰσθητὸν ἀπὸ τῆς ἀσθενείας ὡς ἡ ἀσθενεία ἐστὶν ἀπὸ τῆς ἀσθενείας : h. e. veluti Arietinum, Orobauni sive ervinum, & inter hac medium : prater hac omnia sunt alba dulcissima. Galeno 6. simpl. duplex, Arietinum & Orobauni. Plinio lib. 18. cap. 12. e. 1 arietinum : quod album est & nigrum (in arietino candidum esse, Dalechampius in Plinio negat : Columbinum, quod & venereum dicitur, & est candidum : est & dulcissimum quod Ervo similitudinem est. At Matthiolo, est Columbinum, quod candidum : est Venereum, quod rubrum : est Arietinum, quod nigrum & ceteris majus est. Anguillara tres sunt species. albi, rufi, arietini : albi duplices sunt arietini & ervini arietini capiti arietino similes, ervini leves ervi semini similes : ex Galeno 9. de compos. medic. secundum loca. Rubri similiter duplices, arietini & ervini. Nigri simplices sunt solo colore ab alijs differentes.

## I. Cicer sativum.

Cicer, Brunf. Matth. (cui & domesticum) Tur. Cord. in Diosc. Lac. Cæs. Cast. Tab. Ciceris altera species, Trag. Cicer nigrum, Fuch. seu arietinum, Cord. hist. Cicer arietinum, Dod. ut : Cicer rubrum & album, Lon. Cicer sativum, Lugd. Ger. sive arietinum, Gefn. hort. Adv. Lob.

Flores candidi, aut ex purpura rubescentes : semina alba, vel ex candido pallescentia : purpurea vel rubra, rufasve : nigra vel ex saturo rubente purpura nigra.

## II. Cicer exoticum.

Cicer Nigitarum, Clus. exot. l. 3. c. 16.

Semen vel album, vel nigrum, vel rubens, vel ex albo & rubro variè distinctum.

## Cicer sylvestre.

## I. Cicer sylvestre, folijs oblongis hispidis majus.

Cicer sylvestre, Matth. Ang. Dod. gal. Lugdun. Cast. Cam. Ger. Cicer sylv. herbariorum, Adv. Lob.

Cicer sylv. primum, Dod. Lugd. Tab.

Cicer sylv. majus, Thal. qui & medium habet.

Semen parvum flavescens : at in hist. Lugd. parvum nigrum compressum.

## II. Cicer folijs oblongis hispidis minus.

Cicer sylv. minus, Thal.

## III. Ciceri sylv. minoris affinis si non idem

Glaux, Clus. hisp. Lob. Lugd. Tab. Dioscoridis, Gerard.

Glaux Hispanica, Clus. hist.

Anthyllis altera lutei similis, Dod.

Illius flores lutei, hujus purpurascens vel caerulei.

## IV. Cicer montanum lanuginosum erectum.

V. Cicer montanum ἀνθαλιν : utrumque in Prodromo describitur.

## VI. Cicer sylv. latifolium triphyllon.

Cicer sylvestre, Gefn. hort. Penæ, Lugd. latifolium, Ger.

Cicer sylv. alterum, Dod. Tab. Lugd.

Cicer sylv. verius, Adv. Lob.

Et Ciceris sylvestris tertij ramosi meminit Dodonæus, quod cum priore si non idem, certe ab eo parum differt.

## L U P I N U S.

**L**upinus dignus Dioscoridi lib. 2. cap. 132. Theophrasto pluribus in locis & Gracu ceteris. Lupinorum appellatio non aliunde ducta videtur, quàm quod sicut lupus terram appetit, & in same terra vestitur ita Lupinus tellurem, ut Plinius lib. 18. cap. 14. ait, adeo amat, ut quàmvis fructuoso solo conjectum, inter folia repressum, ad terram tamen radice perveniat. Vel ita dictus videri potest, velut lupus expositus & relictus, ex eo quod (ut idem Plinius) impune jaceat, vel derelictus, si non protinus imbres secuti obruant, ab omnibus animalibus amaritudine sua tutus.

Genera duo Dioscoridi, Galeno & Plinio : sativus & sylvestru.

## I. Lupinus sativus flore albo.

Lupinus, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Lac. Cord. in Diosc. I. on. Cæs. Tab. communis, Gefn. hort. Lupinus albus, Fuch. Turn. Camer. albo flore,

Clus. histor. vulgaris, Eysf.

Lupinus sativus, Ang. Dod. ut : Cord. hist. Adv.

Lob. (cui & Faba ficulnea Germanis à folio) Cast. Lugd. Ger.



*Peucedanum, Geln. hort.*

*Hedysarum*, Geln. hort. Lac. Lon. sive *Securidaca* major, Adv. Lob.

*Hedysarum* minus, Lugd. (qui sub 1. & 3. Dodon. quoque exhibet) Cam.

*Hedysarum* 1. Dod legitimum, Clus. pan.

Floribus est luteis: Marthiolo flores dilute purascent.

II. *Securidaca* lutea minor corniculis recurvis.

*Securidaca* minor, Matth. Adv. Lob. Cast. Cam.

*Hedysarum* alterum, Dod. Lugd.

*Hedysarum* minus, Lugd.

*Securidacæ* similis quædam, Cæf.

*Astragalus* Monspeliacus, Clus. hisp. & hist. ico.

III. *Securidaca* filiquis planis utrinque dentatis.

*Securidaca* peregrina, Clus. hist.

*Scobipendria* leguminosa, Cortuso.

IV. *Securidaca* dumetorum major flore

vario filiculis articulatis.

*Melilotus* quinta, Trag.

*Riegelwisch* / *Lonicer*.

*Ornithopodium* 2. vel quoddam majus, Dod.

*Securidaca* altera, vel alterius prima species, Clus. pan. & hist.

*Hedysarum* purpureum, Tab.

*Loto* enneaphyllo non dissimilis, Lugd.

*Hedysarum* scorpiuron, Cam.

*Securidacæ* alterum genus, Cæf.

*Hedysarum* majus, Ger.

Variat flore: aliquando floris folia superiora dilute rubent, laterum alæ nivæ sunt, rostrum purpureum: aliquando rotus candidus est, vel exalbescit, vel intensius purpureascit.

V. *Securidaca* dumetorum minor pallide cærulea.

*Securidacæ* secundæ altera species, Clus. pan. & histor.

*Securidaca* Dioscoridis Penæi, Eidem.

## FERRUM EQUINUM.

**A** *Siliquarum figura. Planta hæc Solea vel Ferrum equinum nominatur: aliquibus verò ab effectu, quod eam qui diu plantam hanc virentem calcaverint, ferreus soleus exuantur: Sunt qui ad Sc. uridacam, aliq. ad Lunariam, aliq. ad Medicam referant.*

I. *Ferrum equinum* siliqua singulari.

*Ferrum equinum*, Matth. (cui & *Securidaca* montana) Geln. hort. Lob. Ger.

*Medicæ* species, Geln. hort.

*Sierro* cavallo. Adv. Cæf. Cam.

*Lunaria* minor, Cast.

*Solea* equinea, Lugd. cum duplici figura.

*Hedysarum* sive *ferrum equinum*, Tab.

*Ferrum equinum* vulgare *αἰθουράτος*, Col.

II. *Ferrum equinum* siliqua multiplici.

*Ferrum equinum* alterum *παλαιοῦρατος*, Col.

III. *Ferrum equinum* Germanicum, siliquis in summitate.

*Sferra* cavallo sylv. Germanicum, Cam.

*Hedysarum* minus, Tab.

*Hedysarum* glycyrrhizata, Ger.

*Ferrum equinum* capiratum sive comosum, Col.

IV. *Ferrum equinum* Gallicum, siliquis in summitate.

*Loto* enneaphyllos, Lugd.

Hoc priore per omnia minus est, siliquis est paucioribus & minoribus.

V. *Ferro* equino Gallico affinis.

*Astragalus* persimilis palmaria pusilla planta, Adv. Lob.

Floribus est luteis, aliquando albis.

## POLYGALA.

**P** *Πολύγαλον* Dioscorides lib. 4. cap. 142. frutex brevis, palmum altus, folijs lenticula, gustu subacribus: potius lactis abundantiam facere creditur. Et Plinio lib. 27. cap. 12. *Polygala*, &c.

I. *Polygala* major Misiliotica.

*Polygala*, Matth. Lugd. Tab.

*Astragaloides* herbario: um Lob.

*Astragalus* forte Marthioli, vel jam demum

*Polygala* ejusdem, Eidem.

*Polygala* Valentina 2. Clus. hisp. & histor. qui an *Polygala*, Ang. & 3. alio.

II. *Polygala* altera.

*Polygala* Valentina prima, Clus. hisp. & hist. Lugd. Tabern.

*Coronilla* sive *Colutea* minima, Lob.

*Colutea* sive *Polygala* Valentina, Ger.

## ORNITHOPODIUM.

**O**rnithopodium id est avis pes a similitudine, quam siliqua adunca cum pedibus parvis avicula habent, dicitur: quod veteribus incognitum, nisi forte ad Polygalon Dioscoridi l. 4. c. 142. referatur.

I. Ornithopodium majus.

Ornithopodium, Dod. ut: Gesn hort. Adv. Lob.

Lugd. minus, Cam.

Polygala, Gesn. hort.

II. Ornithopodium minus.

Ornithopodium perpulillum, Adv. Lob. Lugd.

III. Ornithopodium radice tuberculis nodosa.

Ornithopodium tuberosum Dalechampi, Lugd.

IV. Ornithopodium affinis hirsuta Scor. & Dod.

Scorpioides leguminosa, Adv. Lob. Lugd.

V. Ornithopodium affinis hirsuta, & stellata.

Atturo, Cortuso.

Stella leguminosa, Lob. Lugd. Cast. Tab.

Vicia scesamea Apula, Col.

## TRIBULUS.

**T**ribulus Latinus dicitur, quod siliqua plantae, mucicata sit & ut Theophrastus 6. 4. 3. Tribulo peculiare est, quod integumentum fructus aculeatum gignit.

Genera duo sunt Dioscoridi l. 4. c. 15. alterum terrestre, alterum aquii familiare terrestri Tribulus aquii genera duo. unum solius cicera habet, nullius spinis aculeatum, alterum solius est spinosus. At Plinius l. 20. c. 12. Tribuli unum genui in hortu, alterum in fluminibus: & l. 21. c. 16. Tribulo uni cicercula folia. alteri aculeata.

Tribulus terrestris Ciceris folio fructu aculeato.

Tribulus terrestris, Matth. Cord. in Dioscorid.

Gesn. hort. Lac. Turn. Dod. Adv. Clus. & hist. Lob. Cæs. Lugd. Cast. Cam.

Tribulus Theophrasti, Ang.

## SECTIO SEXTA.

ONOBRYCHIS; ASTRAGALUS; OROBUS SYLVATICUS; GALEGA; GLYZYRRHIZA.

## ONOBRYCHIS.

**O**nobrychis ab asinirudine nomen obtinuit: Latinis similiter Onobrychi dicitur. Dioscoridi l. 3. c. 152. & Plinius l. 24. c. 16. folia lentu paulo longiora, caulem dodrantalem, florem puniceum, radice parvam tribuunt. Ad Onobrychidis classem subsequentes plantas, tanquam illi quodammodo affines auctores se esse vident.

I. Onobrychis folijs Viciæ fructu echinato major.

Viciæ sylv. alterius secunda species, Dod. gal.

Onobrychis, Lac. Dod. Clus. pan. & hist. Thal. Tab. Ger.

Glaux vel Onobrychis, Gesn. hort.

Polygalon Rhæticum, Gesn. hort. ap.

Caput gallinaceum Belgarum, Adv. Lob.

Lupinus sylv. rusticis, Cæs.

Polygala multorum, Lugd.

Onobrychis Dodonæi flore rubro, Eyst.

Flores communiter dilute rubent, aliquando eleganter rubent: reperiuntur & albi coloris.

II. Onobrychis fructu echinato minor: sub Capite gallinaceo minore in Prodomo describitur.

III. Onobrychis semine clypeato aspero major, nigris radijs notatis.

Onobrychis altera, Dod.

Hedysarum alterum clypeatum, Lob. Lugd.

Securidaca clypeata, Cam.

Hedysarum clypeatum flore suaviter rubent, Eystett.

IV. Onobrychis semine clypeato aspero minor: in Prodomo sub I. describitur.

V. Onobrychis semine clypeato lævi: sub 2. in Prodomo exhibetur.

VI. Onobrychis incana folijs longioribus: vel 3. in Prodomo.

VII. Onobrychis incana folijs rotundis, Onobrychis quorundam, Clus. hist.

VIII. Onobrychis spicata flore purpureo.

Onobrychis prima, Clus. pan. & hist. Tab.

IX. Onobrychis spicata floribus pallidis,



Onobrychis 3. Clus. pan. & hist. Tab. Ger.

X. Onobrychis floribus Viciæ dilutè cæruleis.

Onobrychis 2. Clus. pan. & hist. Tab. Ger.

Flores dilutè cærulei, vel ex cæruleo purpurascetes.

XI. Onobrychis floribus Viciæ majoribus cæruleo purpurascetibus: vel folijs Tragacanthæ.

Onobrychis quarta, Clus. pan. & hist. Tab.

Onobrychis montana 4. Ger.

XII. Onobrychis tragacanthæ folijs floribus in globum congestis.

Onobrychis quinta, Clus. pan. & hist.

XIII. Onobrychis montana filiquis oblongis nigris Viciæ similibus.

Onobrychis, Cæsalp.

Duplex est, altera angustioribus folijs flore rubente coralli modo: altera latioribus flore purpureo: utraq. filiquis nigris longis.

## A S T R A G A L I S.

**A**stragalus. *hyan* & Latine etiam Astragalus Dioscoridi l. 4. c. 57. frutex parvus est, & folijs & ramis Ciceri similibus, flores purpurei parvi: radix rotunda raphani modo grandis, &c. Plinio lib. 26. c. 8. Astragalus folia habet longa, incisura multis obliqua circa radicem: caules tres aut quatuor foliorum plenos: florem hyacinthis: radices villosas, implectas, rubras, praduræ.

I. Astragalus Syriacus hirsutus.

Astragalus Syriacus, Lob. Lugd. Tab. Ger.

an Astragalus, Ang. Cæsalp.

an Astragalus Dioscoridis, vulgo Christianæ radix, Rauvvol. & Lugd.

Flos cæruleo purpureus, Ang. flores magni & rubri, Lob. Hos sanguineus, huiusque corniculis similes rubentes, Cæs. flos purpureo, fusco & cæruleo distinguitur, folliculi colutæ modo flatu distenti semen continent, Rauvvol.

II. Astragalus Boeticus lanuginosus radice amplissima.

Astragalus forte primus, Clus. hisp. Lugd.

Astragalus Lusitanicus Clusij, Lob. Tab. Ger.

Astragalus Boeticus, Clus. hist. & cur. post.

Phaeolus peregrinus Belli, Clus. cur. post.

Phaeoli novum genus, Belli in epist. 5. ad Clus. an Apocynum Amari Lusitani.

III. Astragalus alpinus Helveticus.

Astragalus alpinus & 2. Clus. hisp. & hist.

Polygala, Camer. epit.

Cicer astragaloides Ponzæ.

IV. Astragalus alpinus magno flore.

Anthyllis claviculata, Lugd.

Flos in nostra est ex cæruleo purpurascens: at Lugd. hist. suæ flores luteos ascribit.

V. Astragalus villosus floribus globosis.

Astragalus purpureus, Lugd.

Astragalus tertius, Clus. hisp. & hist.

Huic affinis si non idem

Astragalus Monspelienis, Clus. hisp. & hist.

VI. Astragalus sylvaticus folijs oblongis glabris.

Astragalus, Cord. in Diosc. & hist.

Astragalus sylvaticus Thal.

Cicer montanum, Cordi schol. & Cam. ad Thal.

VII. Astragalum Matthiolus in editione secunda proposuit, in ultimis vero retractavit: eandem figuram Lacuna, Lonic. & Lugd. proposuere: an forte ejusdem Pseudoapios.

## O R O B U S S Y L V A T I C U S.

I. Orobolus alpinus latifolius in Prod. defect.

II. Orobolus sylvaticus purpureus vernus.

Phaeolus sylvarum, Lugd.

Orobolus pannonicus primus, Clus. pan. & hist.

pan. lonic. us, Fyit.

Orobolus sylvestris vernus, Thal.

Astragalus, Colum.

Arachis latifolius alter, Dod. helg.

Flos coloris purpurei elegantissimi: at ubi evanescere incipit, coloris cærulei est.

III. Orobolus sylvaticus pallido flore.

Arachis latifolius, Ddon.

Galega montana, Lugd.

Orobolus pannonicus 4. Clus. pan. & hist.

IV. Orobolus latifolius parvo flore purpureo.

Orobolus Venerus, Clus. pan. & hist.

Duplex est: alteri folia dilutè virentia, flores purpurei: alteri folia ex viridi pallescientia, flores prorsus albi, utriusque semen albicantis coloris oblongiusculum.

V. Orobolus sylvestris angustifolius asphodeli radice.

Orobolus pannonicus tertius, Clus. pan. & hist.

Semen nigrum interdum maculosum.

VL Oro-

V. *Orob. Sylvaticus* Vicæ folijs.  
*Aitrag.oides*, Dod. altera herbariorum, Lob.  
*Orob. paunonicus* 2. Clus. pan. & hist.

an *Livinus* Sylvestris, CæL.  
 Flos purpureascens, qui vocatur in versu  
 uni commutatur.

## G A L E G A.

**G**alega ab herbarijs cur didam ignoramus: a quibusdam tamen Ruta nomen inditum, ad  
 tribus non vero odore. Quidam *Onobrychin*, alij *Glaucem*, nonnulli *Polemonium*, alij *Lupul*, *Silvestris* *cam*  
 ege judicant, quibus *Dioscoridis* descriptio res contradicunt.

## I. Galega vulgaris.

Galega live Ruta capraria, Matth. Ges. hor. Lac.  
 Cast. Cam.  
 Ruta capraria, Ges. hor. Tab.  
 Galega quibusdam scœnum græcum sylv. Dod.  
 gallic.  
 Galega, Ad. Lob. Dod. Lon. Lugd. Ger. vulgaris,  
 Clus. pan.  
 Onobrychis & herba gallica, Fracastorio.  
 Caprago vulgò, Cæf.  
 Galega flore cinereo, flore albo, Eyst.

Floribus est cæreuleis, ex cæreuleo purpureis:  
 penitus candicantibus.

## II. Galega Ægyptiaca siliquis articulatis.

Seban live Sesban Indicum, Cam.  
 Seban, Alpin. & Clus. ad Garz. cujus semen A-  
 nij nomine ex Alexandria accepit.  
 Seysban, Honor. Belli epil. 4. ad Clus.

## III. Galegæ affinis Sophera dicta.

Hoxocoquomacit, Cam. Clus. cur. post.  
 Sophera Galegæ proxima, Alpin.

Sofera Lentisci folijs, Honor. Belli epil. 4. ad  
 Clusium.

Honorio Belli videtur, suam plurimum ab  
 ipsius Alpini differre, quod ex his, quæ in  
 iconè colligere sit: equidem Alpini hanc  
 sa, duplici potissimum nomine præstat, quod  
 in collæ extremitate mali præstat, hanc  
 imparitatem facit: dein quod siliquis diver-  
 dentes pinxerit, cum omne obducat, ut  
 cæ lursum spectent. Non tamen & *Cam*  
 cio, cum & ab Honorio Belli inter præstat  
 ex Creta, & à Prospero Alpino legitur, hanc  
 plantæ enatæ accepit, in utraq. solam  
 sentiam in folijs notavi, quæ in A. præstat  
 tiora & atrovirentia sunt. Sic & es *Cam*  
 rariorum habeo, in quo eos hanc  
 quod in illius alarum cavis, ut præstat  
 latior extremas cælem ampliatur, rari-  
 parvæ rubentes innatæ quæ lursum  
 liquorem candidum pelucidum exudat, ut  
 etiam Camerarius in hoc hort. hanc

## G L Y C Y R R H I Z A

**G**lycyrrhiza, id est, radix dulcis à Latino Glycyrrhiza & Dulcis radix, & a Sepia, ari. & ari. aro nomine  
 quiritia appellatur. *Dioscoridis* lib. 3. c. 7. frutex est exiguus, ramuli in cubitorum, circa quos folia  
 rsi, densa, pinguis, cælug, glutinosa: flos est hyacinthi: fructus pilularum Platan. magnitudine, a  
 quifilquis habet lentissimum modoruffas & parvas: radices longæ, buxæ coloris, subærba & dulces: r  
 succus l. vey modo elucitur. Plinio lib. 22. c. 11. Glycyrrhiza, qui eadem scribit quæ *Dioscorides*, eo ex  
 echinata tribuit pro xylor, id est, lentissio echinum legens. Theophrasto 9. hist. 13. γλυκύριον, quod  
 Scythica radix, quam aliqui σβδύλινον vocant.

## I. Glycyrrhiza capire echinato.

Glycyrrhiza, Matth. Dodon. gal. Lac. Cast. al-  
 tera, Anguil.  
 Glycyrrhiza Italica, Ges. hort. vera *Dioscorid*,  
 Dodon.  
 Glycyrrhiza echinata *Dioscoridis*, Ad. Lob.  
 Lugd. (qui & *Matthioli* & Dodon. figuram habet)  
 Tab. qui similiter duas figuras sub vulgari  
 & echinata proposuit, Ger.

## II. Glycyrrhiza siliquosa vel Germanica.

Liquiritia, Brunf.

Dulcis radix, Tr. g. Tur. Ges. hort.

Glycyrrhiza, Fuch. Cord. in *Diosc.* & h. G.  
 hort. Cam.

Glycyrrhiza Germanica, Dod. gal.

Glycyrrhiza *Dioscoridis*, Anguil.

Glycyrrhiza altera, Matth. vulgaris, Dod.  
 Camer. ep.

Glycyrrhiza lævis, Lac. non echinata, C.

Glycyrrhiza siliquosa, Ad. Lob.

III. Glycyrrhiza sylvestris  
 pallescentibus.

Fœnugræcum sylvestre, Trag. Clus. pan. 1. Dod.  
 Polygalon, Cord. in Diosc. & hist. Thal.  
 Glycyrrhiza sylvestris, Gefhor. Lugd. Cam.  
 Glauz, Tur. vulgaris, Ad. Lob. Clus. hist.

IV. Glycyrrhiza sylvestris altera floribus  
 puniceis, folijs Arachi.  
 Glauca, vel Glauz, quædam leguminosa her-

bariorum, Advers.

Flores communiter ex pallido flavent, rari-  
 us puniceant.

Glycyrrhiza sylvestris, Thal. alia, Cam.

V. Glycyrrhiza sylvestris primæ similis: hæc  
 sub Glauze leguminosa in Prodr. describitur,  
 cujus semen Araci Bœtici nomine accepimus.

# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER DECIMVS.

## SECTIO PRIMA.

### DE PLANTIS CAPILLARIBVS.

PHYLLITIS, HEMIONITIS; OPHIOGLOSSUM; ASPLENIUM  
 SIVE CETERACH; LUNARIA MINOR; ADIANTHUM SIVE  
 Capillus Veneris; Trichomanes sive Polytrichum; Ruta mu-  
 raria sive Salvia vitæ; Polytrichum aureum;  
 & Ros Solis.

## P H Y L L I T I S.

**Q**Uæ Græci φωνίτις, quasi soliosam dicas, cum nihil nisi soliosus cespes appareat. Latini quoque, Græcum  
 asseruaverunt nomen: ossi in Lingua cervina, Diosc. l. 3. c. 121. folia fert rumici similia, sed oblongio-  
 ra magis, virentia, sena septenive, recta, quæ parte anteriore levia, posteriore tenuis quasi vermiculos annexos  
 ostendunt, neq. caulem neq. semen, neq. florem profert. Theoph. fort. l. 9. c. 19. οὐκ ἔχει στέμνη, GAZA Linguam  
 cervinam vertit.

I. Lingua cervina officinarium,  
 Scolopendrium, Brunf.  
 Scolopendria vulgaris, Trag.  
 Phyllitis, Matth. Dod. ut: Ang. Lac. Tur. Cord.  
 ut: Gefhor. Ad. Lob. Thal.  
 Phyllitis vulgaris, Cam. Clus. hist.  
 Hemionitis, Leon. Manar. Ruel. Fuch.  
 Lingua cervina, Ericio Cord. Lon. Cæf.  
 Phyllitis sive lingua cervina, Tab. emacul.

Est & latifolia & angustifolia: sæpe etiam in

fontibus exigua reperitur.

II. Lingua cervina multifido folio,  
 Phyllitis laciniata, Dodon. Clus. hisp. & hist.  
 Lugdun.

Phyllitis folijs laciniatis, Tab.

Phyllitis multifido folio, Lob. multifida, Ger.

Phyllitis, Cast. ap. mucronata, Cam.

Duobus, tribus, etiam pluribus mucronibus  
 in summo folij donatur: aliquando folia ad u-

## H E M I O N I T I S.

**H**ÆMION seu αἰμόνιον Græci, Latini similiter, quasi Mularum in dicas & Splenium, nominatur, quod ejus  
 folia sicut & Phyllitidis, Medicorum splenia, nimirum oblongas plagulas forma inveniunt: quid si potius  
 ab eorum usu, quod spleni medeantur, siquidem ex aceto pota licentiam obsumant, Dioscorid. authore l. 3. c. 152. est,  
 folium emittit simile dracunculi curvata in cornua luna modo sinuatum. radices habet multas easq. tenues:  
 sed neq. caulem, neq. semen, neq. florem profert. Hæmion Theophrast. l. 9. c. 19. Mulam GAZA vertit, quam so-  
 lio Lingua cervina constare, & radice numerosa & tenui esse, asserit.

I. Hemionitis vulgaris.

Lac. Lon. Cæf. Lugdun.

Hemionitis, Matth. Dodon. ut: Ang. Gefhor. Hemionitis vera, Clus. hist.

Yy

Hemio

Hemionitis sive sterilis, Lob.

II. Hemionitis minus vulgaris.

Hemionitis peregrina, Dod. Clus. hisp. & hist. Lugdun.

Hemionitis, Cast. altera peregrina, Lob.

III. Hemionitis minor.

Hemionitis sive sterilis, Ad. Lob.

Hemionitis minor, Penz., Lugd.

IV. Hemionitis multiceps.

Hemionitis altera Dolechamn., Lugd.

Lingua cervina ramosa, Col. m.

Agleofotis seu Marmorice, seu Phyllanthi.

Scolopendriae nomine, à Cortuso acceptum.

Et hujus quemadmodum & præcædenti.

lia, parte averfa, sub flavo pulvilulo nati.

tegenum, qui in alijs id genus plantis co-

## O P H I O G L O S S U M.

**Q**uam recentiores *Ophioglosson* Græci vocant. Latine Lingua serpentis dicitur: quam alij *serpentaria* vocant. quidam *Ceratium* Pliny lib. 26. c. 8. esse volunt unicorantum folio affurgente in montibus magna: quidam linguam Pliny l. 24. c. 19. quam circa fontes nasci, solum sibi sive Linguam vocant, quæ circa fontes nascatur, esse sent: quidam inter *Dracunculi* species referunt.

I. Ophioglossum vulgatum.

Serpentaria secunda, Brunf.

Ophioglossum, Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. Gef. hor. Lon. Thal. Cast. Cam. Tz. Eyf.

Ophioglossum sive *Enaphyllum*, Ad. Lob.

Unifolium, Amato.

Lingula vulneraria, Cord. hist. Cam.

Lancea Christi, vel Luciola, Gef. hist.

Lingua serpentina, Cæs. Cast.

Variat: aliquando folio est sinuato.

communiter simplex est, aliquando triplex.

etiam triplex, quemadmodum *Camefrita* epit. Matth. ping. 1: est & abortivum.

pitium, quas differentias, una figura in nostro

Matthiolo emaculato exhibuimus.

II. Ophioglossum anguloso folio.

III. Ophioglossum minus & brevius, quod

utrumq; in Prodr. modo describitur.

## A S P L E N I U M S I V E S C O L O P E N D R I A.

**A**σπληνιον quod *Asplenium* juvet: alij *Asplenium* a solitorum forma: *Asplenium* Dioscorides lib. 3. cap. 51. folijs est *Scolopendria* animalis similibus. pluris ab una radice in unum parvis. nec caulem, nec florem, nec semen habet: folia polyphydo modo incisæ, subter flavescencia hirsuta, terne vero viridia. Plinio lib. 27. cap. 6. *Asplenium* sunt qui *Emmonion* vocant, &c. Alex. Traill. ann. *Asplenium* ab *Asplenio* in art. medicamentis separat.

Ceterach officinarum.

Scolopendria, Ang. vera, Trag. Tab. emac.

Ceterach, Eric. Cord. Cæs.

Scolopendrium, Cord. hist. verum, Lob.

*Asplenium*, Matth. Dod. gal. Gef. hor. Lac. Tur.

Ad. Cast. Lugd. Cam.

*Asplenium*, Cordo, in Dioscoride, Do. Donato,

Lobel.

## L U N A R I A.

**L**unaria recentioribus dicta à folijs lunæ crescentis modo falcatis. An veteribus cognita ambigitur. *Cerastion* Pliny censent: quidam *Tragium* secundum Dioscorid. l. 4. c. 50. quod in montibus folio *Scolopendria* radice tenui & candida nasci scribit: nonnullis nonnullis *Triglochin* dicitur, quia aliqui *Hemionitis* lunariam majorem, hanc vero minorem & botryticem à plurimâ racemulis utring, thyrsulo harentibus & foliorum numerum æquantibus. *Epipactis* quibusdam. An *Epipactis* quod Dioscor. l. 4. c. 19. caule ciliato nasci, hanc radice folijs, denu aut duodenu, neg, semen neg, flores proferens. radicibus. nubibus nigris. Idem Plin. l. 27. c. 9. sub *Epimedio* quod fortè Theophr. 7. hist. 8. *Epimeris* uni.

I. Lunaria racemosa minor vel vulgaris.

Lunaria minor, Matth. Fuch. Dod. gal. Gef. hor.

Lon. Lugd. Cæs. Ger.

Lunaria, Trag. Dod. racemosa, Ad. Lob.

Lunaria petraea, Taura pastoribus, quod vaccae

hac deglutata taurum requirant, Gef. de Lunar. Ruta lunaria vel jecoraria, Tab.

Lunaria botryticis, Thal. C. m. G. L. Eyf. hor.

Lunaria major, Cast.

Lunaria botrytis minor, Clus. hist.

Lunaria vulgaris minor, Clus. histor. ap. alij

ad libr. 5.

Epimeleum Dioecorisidis, Col.

Folij est denis, duodenis: novemdecim in Baldo notavimus: quare putant aliqui totidem folia habere, quod luna dies, unde nomē habeat.

II. Lunaria racemosa ramosa major.

Lunariæ rarior species, Cam. ep.

Lunaria minor ramosa Camerarij, Clus. hist. & in ap. alt. ad lib. f.

III. Lunaria racemosa multifido folio.

Lunaria ramosa Silefiaca, Cam.

Lunaria botryitis πολύπονη, Thal.

Lunaria minor ramosa, Clus. pan. & hist.

IV. Lunaria minor rutaceo folio.

Lunaria botryitis παναριον, Junger. in car.

Altorsf.

V. Lunaria Magorum Arabum, Lob. quid

## ADIANTUM SIVE CAPILLUS VENERIS

officinarum.

**A**δίαντον & πολύτριχον Dioscoridi l. 4. c. 136. Ἀδίαντον Theophrasto 7. hist. 13. dicitur, quod Ἰνδιαν, quod in aqua non madescat, nec quicquam humoris adhaesisse constet: velut Nicander in Theriaca, quod imbrui & celo descendenti silicidia, folijs ejus non insidant, πολύτριχον autem quasi multiconiam, quod capillos multos ac densos faciat, eorumq; de lluvia expleat. Callitrichon verbū Apulejo, quasi pulcherrimum, quod capillos tingat, pulchriorisq; reddat. Nec alia ratione Capillus Veneris hac herba dicta est, quam a speciosius reddendu capillu, nec alio nomine Veneris vox adjecta est, quam quod hac pulcherrima pingatur. Plinio l. 22 c. 21. Adiantum quidam Callitrichon, alij Polytrichon vocant, utrumq; ab effectu, tingit enim capillum & c. crispum densumq; facit & desuere prohibet. Latini Cincinalu, terra capillum, supercilium terra, crinita, Dioscoridi folia gerit pusilla coriandri similis, in extremo incisura divisa: virgulae quibus ea produnt, nigro colore nitentes, pratenues, palmum altæ, neq; cauleni, neq; florem, neq; semen profert: radix supervacua est.

Genera duo sunt, candidum atque nigrum, Theophrasto l. c. Plinio l. c. duo, candidum & nigrum bevisq;: id quod majus est Polytrichon: aliud Trichomanes vocant, utriusque ramuli nigro colore nitent, folijs filicu & c. ubi Plinius Trichomanes, alterum Adianti genus sc. candidum facit: cum Theophrasto Trichomanes Adianti genus non sit, sed sui generis planta. Verum Adiantum album & nigrum, nihil differunt, nisi quod Adiantum nigro, cauliculi polistore nigore nigricant, foliaq; saturatius virent: alba minus.

I. Adiantum folijs coriandri.

Adiantum magnum, Trag.

Adiantum, Matth. Fuch. Dod. ut: Ang. Lac. Ad.

(sive Capillus Veneris verus) Lob. Cast. Lugd.

Adiantum Lugdunense, Cam.

Adiantum nigrum, Cord. in Dioec. & histor.

Fracast. Tab.

Capillus veneris vulgo, Adiantum album Plinij, Cæsalp.

Capillus Veneris verus, Ger.

Hoc variat magnitudine & foliorum crassitie: quare majus & crassioribus folijs.

Adiantum Syriacum, Tab.

Capillum Veneris Syriacum, Ger. vocat.

II. Adiantum folijs longioribus pulverulentis pediculo nigro.

Adiantum pulchrum Lugdunense simile, Thal.

Onopteris nigra, Dod. ut: Lugd.

Adiantum nigrum Plinij. Adv. Lob.

Adianti nigri aliud genus, Cæf.

Onopteris major, Tab. mas, Ger.

III. Adiantum folijs minutum in oblongum scissis, pediculo viridi.

IV. Adiantum fruticosum Brasiliæ: quod in Prodromo descriptum est.

V. Adiantum mas, Tab.

Onopreris femina, Ger.

Quid sit nondum assequor.

## TRICHOMANES SIVE POLYTRICHUM

officinarum.

**T**ριχομανής, quod etiam nonnulli Ἀδίαντον vocant, Dioscoridi lib. 4. cap. 137. Latini etiam Trichomanes dicitur: officinu Polytrichum, quod nomen, secundum veteres, Adianti est. Dicitur Trichomanes a vi sua, quod rara cute fluentem capillum expleat & subitasti faciat: αὐτὸν enim illi rarin vocant & τριχὸν capillum. Hinc Latini capillatu dicitur. Hoc Dioscoridi l. c. folio est Filici simili at longè exilius: folijs tenuibus, ordine utrinque dispositis lentacula similibus, adversis inter se: in virgula itidem tenuibus, splendentibus nigricantibus, iisq; acerbis.

I. Trichomanes sive Polytrichum officinarum.

Saxifraga minor prima, Brunf.

Trichomanes, Trag. Matth. Fuch. Anguil. Dod.

ut: Cord. hist. Gein. hort. Turn. Lac. Adv. Lob. Cast. Cam.

Trichomanes nigrum, communiter Saxifraga rubra, Thal.

Trichomanes mas, Tab.

Adiantum rubrum, Lon.

Polytrichum vulgo, Cæs.

Magnitudine variat hinc & altera figura

Trichomanis maris majoris, Tab.

Trichomanis maris, Ger.

II. Trichomanes minus & tenerius.

Trichomanes candidum, Thal.

Trichomanes minor mas, Tab.

III. Trichomanes ramofum majus & minus.

Trichomanes femina, Tab. Ger.

Trichomanes minor femina, Tab.

## RUTA MURARIA SIVE SALVIA VITÆ

**R**uta dicitur, ob quandam soliorum cum Ruta similitudinem, qua, ubi Adiantum verum, uti dicitur, manes desunt, aut vetusta sunt, uti licet: aliqui ob natales Empeyron, ali ab effectu, uti dicitur, recentent: & hac sumenda quando Medici recentiores Adiantum recipiunt a Capillo veneri dixerunt.

Ruta muraria.

Capillus Veneris, Brunf. Trag.

Saxifraga major 2. Brunf.

Saxifraga seu Empeyron, Fuch.

Paronychia, Matth. Lac. Cast.

Ruta muraria, Dod. ut: Gein. hort. Ger.

Adiantum candidum, Cord. in Diosc. & h. Cast.

Adiantum album, Lou. Cam. Tab.

Adiantum nigrum, Gein. hort. Cæs.

Salvia vitæ, Adv. Lob. Lugd.

## POLYTRICHUM AUREUM.

*πολυτρίχον*, à tamulis qui capillorum instar tenues sunt, aureum vero à colore duntaxat.

I. Polytrichum aureum majus

Polytrichum majus, Trag.

Polytrichum Apulei; majus, Fuch.

Polytrichum aureum, Dod. gal. majus, Lugd.

Muscus saxatilis aut sylvestris, Trag.

Muscus terrestris Tragi, Lugd.

Adiantum apulei majus, Thal.

Adiantum aureum, Tab.

Muscus capillaris, Ger.

Hoc cubitalis sæpè longitudinis instar circuitum inflexum ex Moravia adfertur, & à citra montibus inter radices & Theriacas suas venale circumfertur, de hoc aureos montes pollicentibus.

II. Polytrichum aureum medium.

Polytrichum nobile vel primum, Trago.

Polytrichum Apulei aureum vel 2. Lon.

Muscus capillaris, Dod. minor, Ger.

Adiantum apulei medium, Thal.

Adiantum aureum minus, Tab.

Herbula granini similis in partibus major & minor, Cæs.

III. Polytrichum aureum minus.

Capillus Veneris, Brunf.

Polytrichum minus, Trag. Apulei minus, Fuch.

Polytrichum aureum minus, Dod. gal. Lugd.

Polytrichum aureum tertium, Lon.

Musci capillaris altera species, Dod.

Muscus quidam in partibus & regulis, Cæs.

Adiantum apulei minus, Thal.

Huius speciem Polytrichum nigri Brownii dicitur nonnisi à D. Fureto accepimus.

## R O S S O L I S.

**R**os solis & orella, que veluti stella alienius jubare sub Sole fuerit, à mirabili natura nonnisi à nobis, à nobis namque tunc sol fervidus æstate cam illustret, cum cam in solia semper tunc & tunc in solia, à nobis duntaxat, lanugo guttulus aspersa manet: & quod à mirabile dignum, quod huiusmodi solia, à nobis duntaxat, acerbulis contentum, ubi extremis digituleviter attingitur, dum adhuc natali suo solo & hermine, à nobis duntaxat, sim inde evallit. Solu radios elipentur, mox velut in exigua filamenta fructu a nobis duntaxat, nia duntaxat, à nobis duntaxat, confestim contrita, à nobis duntaxat, perperant. Hac ob magnam cum capillaribus affinitatem, sua nia duntaxat, sunt. Recentiores autem, qui nonnisi sed ab Arabum illa diversum nominant, à nobis duntaxat, enim rorem significat.

I. Ros.



I. Ros Solis folio rotundo.  
 Polyticho minori figuram sine descriptione  
 addit Tragus.  
 Ros Solis, Dod. ut: Lon. Cast. Camer. (cui &  
 Solaria) major, Ger.  
 Ros Solis vulgo, Cajo Britanno.  
 Rorida five Ros Solis major, Lob.  
 Sollura seu Sponsa Solis, Thal.  
 Rorella minor prima, Tab.  
 Rorella five Ros Solis, Eyst.

Mas & foemina, inter Musci albicantis &  
 subrubentis genera crescunt.  
 II. Ros Solis folio oblongo.  
 Rorella five Saffiora, Cord. hist.  
 Ros Solis, lunaria quibusdam & Artemilla,  
 Gesn. de lun.  
 Ros Solis alia, Dod. Lugd. minor, Ger.  
 Polytichum Apuleij album, Lon.  
 Rorida five Ros Solis, Adv. Lob.  
 Rorella minor 2. Tab.

\*\*\*\*\*

## SECTIO SECUNDA.

FILIX; DRYOPTERIS; LONCHITIS; POLYPODIUM;  
 HERBA VIVA; ET HERBA MIMOSA.

### FILIX ET DRYOPTERIS.

**F**elix, *ἡξίς* & *ἡξίος* Græci dicta, ab alio avium, quatum speciem ejus solia in ramulis disposita referunt,  
 cum folijs pennatus sit Filix: & ut Plinius, solia lateribus pennata, unde nomen Græci imponere.

Duplex est, Græci & Plinio mas & foemina. Mas *ἡξίς* simpliciter dicta Theoph. 9. hist. 20. at Diosc.  
 l. 4. c. 186. *ἡξίς* & *βῆλινος* & *πῶσιππος* dicitur, cui solia sine caule sine flore sine semine, ea, ex uno pediculo  
 cubitali ternis longitudine exeunt, incisa & pennatarum modo utrinque expansa, sub gravi odore radice[m] habet  
 per summam cespitum nigram, quadantenus longam, multas propagines fundentem & subastringentis gustus.  
 Vel ut Plinius l. 27. c. 9. Filix duo genera: pterin Græci vocant, aij bleibon quam marem existimant, ex una  
 radice quam plures exeunt filices bina etiam cubita excedentes longitudine, non graves odore. Theoph. 1.  
 hist. 16. Filicu figura multifida, & quasi ferrata sicut Abietu.

Foemina *ἡῶν ἡξίς* & *ῥοῦα* dicitur Diosc. l. 4. c. 187. *ἡῶν ἡξίς* Theoph. 9. hist. 20. Plinio l. c. alterum genus tely-  
 pterin Græci vocant, aij nympheam pterin: solijs est Dioscoridi filicu, quæ tamen non singulari, ut illa pediculo  
 hærent, sed e numerosis alioribusq[ue], propaginibus exeunt: radices longæ, oblique, numero, ex nigro flavescen-  
 tes, aliqua etiam rubra: vel ut Plinius, est singularis, atq[ue] non hirticosa, brevior, molliorq[ue], & densior, solijs ad ra-  
 dicem canaliculata: radices utriusq[ue] longæ, in obliquum nigra præcipue cum in aruere. Theoph. l. c. differt foemina  
 Filix a mascula, quod solum uno artu porrectum hæc habeat, & radicem crassam & longam & nigram.

*ἡῶν ἡξίς* seu Filix querna: hæc a soliorum figura & loco natali nomen obtinuit: quæ Dioscoridi l. 4.  
 c. 189. filici simili, at multo tenuiore foliorum incisura radicibus inter se implicitis, hirsuta, gustu astringenti-  
 bus & ad dulcedinem vergentibus: & Plinio l. 27. c. 9. Dryopteris filici simili in arboribus nascitur, tenui  
 foliorum subdulcium incisura, radice hirsuta.

Felix ramosa.

I. Filix ramosa major pinnulis obtusis non  
 dentatis,  
 Filix sylvestris, Brunf.  
 Filicis majoris primum genus, Trag.  
 Filix foemina, Matth. Fuch. Dod. Lac. Adv. Lob.  
 Cast. Lugd. Tab. Ger.  
 Thelypteris filix foemina, Cord. in Diosc.  
 Filix mas, Gesn. hort.  
 Filix foemina prima, Thal.  
 Filix Cast.  
 Filix mas major five foemina credita vulgo,  
 Clus. pan.

Hujus folia communiter per ambitum non  
 sunt dentata vel ferrata, aliquando tamen folia  
 inferiora, ad formam foliorum scabiosæ divisa  
 reperiuntur.

II. Filix ramosa major pinnulis acutissimis  
 non dentatis.

III. Filix ramosa non dentata florida.  
 Filicis majoris alterum genus, Trag. Lugd.  
 Filix aquatica, Dod. gal. Lugd.  
 Sideritis fortè Ruellio.  
 Filix mas, Ang.  
 Filix latifolia, Cord. hist.  
 Filix palustris, Gesn. ap. Dod.

Filicis genus rarius, Gesn. hort.

Lunaria major seu filix lunaria & Filicastrum, Gesn. de lunar.

Osmunda, Adv. Lob.

an Filix palustris, Cæs.

Hujus species tenuiter dentata reperitur.

IV. Filix ramosa minor pinnulis dentatis.

Pteridion masculum, Cord. hist.

Filix foemina altera tenuifolia, Thal.

Filicula petraea foemina 4. Tab. ico.

Filix querna seu Dryopteris, Ger.

*Filix non ramosa.*

I. Filix palustris maxima dentata: in Prodomo describitur.

II. Filix palustris altera subfusco pulvere hirsuta.

Struthiopteris, Cord. hist. Thal.

III. Filix non ramosa dentata.

Filix, Brunf. vulgaris, Trag.

Filix mas, Matth. Fuch. Dod. ut: Tur. Lac. Lon.

Adv. Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Filix foemina, Ang. Gesn. hort. Cæs.

Filix mascula, Cord. in Diosc. & hist.

Filix mas altera, Thal.

Dryopteris, Matth. in epit. & Lugd.

Duplex est: altera cui pinnulae in ambitu sunt dentatae, altera cui non sunt serratae: illa

Filix mas altera: haec

Filix mas prima, Thallio dicitur.

IV. Filix non ramosa petiolistenuissimis & tenuissimè dentatis.

Filicula petraea prima, Tab.

Filicula montana mas, Ger.

V. Filix querna.

Dryopteris, Brunf. Matth. fol. Cord. in Dioscor.

Gesn. hort. Adv. Lob. Cam. ep.

Filix arborea five Dryopteris, Trag. Lugd.

Dryopteris Tragi & Pteridion foemina Cordi, Thal.

Filix querna, Osmundula, Lon.

Filicis genus parvum alterum in montibus, Cæs.

Filicula petraea foemina 2. Tab.

VI. Dryopteris Dalechampij apud Lugd. quid?

*Filix saxatilis.*

I. Filix saxatilis folijs non serratis.

Filicula petraea foemina tercia, Tab.

Filicis genus parvum primum in montibus, Cæs.

II. Filix saxatilis ramosa nigra maxima punctata.

Filix pumila saxatilis prima vel mas, Cam. pan. & hist.

an Filicula candida & minor, Gesn. ap.

III. Filix saxatilis non ramosa nigra punctata.

Filix pumila saxatilis altera, vel foemina, Cam. pan. & hist.

an Filicula saxatilis, Cam.

Huic similis quam Gesn. in hortor. apud Chlarosticton vocat, ejus folia supina, pinnis ad luteum viridemque & album colorem mixtis tendentibus notantur.

IV. Filicula alpina crispa.

Filicula saxatilis crispa, Pon. an Pteridion, Cord. hist. & Thal.

V. Filix saxatilis corniculata.

Filix nuda five saxatilis, Trag. Lugd.

Filix petraea, Lon.

Holostium alterum, Adv. Lob.

Holostium petraeum, Tab. Ger.

Muscus corniculatus, Tab. Ger.

Adiantum *ἀνὰ γῆρας* seu furcatum, Thal.

*Filicula fontana.*

I. Filicula fontana major, five Adiantum album filicis folio.

Dryopteris candida, Dod. ut: Lugd.

Adiantum album Plinij, Adv. Lob.

II. Filicula fontana minor.

Filicula fontana, Tab.

Filicula fontana foemina, Ger.

III. Filicula maritima ex insulis Staechadibus.

Chamaefilix marina Anglica, Lob. Lugd.

*Filix aculeata.*

I. Filix aculeata major.

II. Filix aculeata minor: utraque in Prodomo descripta est.

## L O N C H I T I S.

**Δ** *ὄγχις* Dioscoridi 1.3.c.161. duplex est, altera folijs porri, quam & Plinius 1.25.c.11. *Ionchitidem* vocat. alia est quam *ὄγχις* *τρυφάν* dicunt: haec fortè a *λόγχη* lancea dicitur, eò quod folia *ἡστία* in

acutim desinunt. Hac secundum Dioscoridem folia profert Scolopendry, sed asperiora majoraq; , ac multo magis divisa, de qua in presens.

### I. Lonchitis aspera.

Lonchitis aspera major, Matth. Lugd. Cam.  
Lonchitis altera, Ang. Lac. Cast. Lon. cui &  
Spicaz Germanorum, forte à radice, Indicam  
spica referente.  
Lonchitis altera, quibusdam aspera, Cord. in  
Diosc. Gesl. hor. app.  
Lonchitis altera mas, Taber.  
Lonchitis Maranthæ, Ger. ico.

### II. Lonchitis minor.

Asplenium sylvestre, Trag. Lugd.  
Lonchitis aspera minor, Matth. Lugd. Cam.  
Lonchitis aspera, Dod. ut: Lugd. Thal. Ger.  
Struthiopteris, Cord. hist. icon. Thal.  
Lonchitis altera Dioscoridis, Gesl. frac. Ad. Lob.  
Scolopendrium majus, Lon.  
Lonchitis altera foemina, Tab.

I. Lonchitis altera Neotericorum, Clus. pa. & hist.

### III. Lonchitis folio Ceterach.

Pseudolonchitis aspera, Matth. Lugd. ubi titulus transpositus.  
Lonchitis secunda Dalmatica, Ang.  
Lonchitis Maranthæ, Lob. altera Maranthæ,  
Clus. hist. or.  
Lonchitis aspera Maranthæ, Cam. ep.  
Lonchitis aspera Ilvensis, Lugd.  
Ceterach genus in Ilva nascens, Cæs.  
Lonchitis adulterina, Tab.  
Filicis genus quæ Lonchitis altera, Clus. pan.  
Polypodium Ilvense, Lugd.  
Filicula petrae mas, Ger. ico.  
Magnitudine variat: hinc 2. figuræ apud Lug.  
Lonchitidis asperæ minoris:  
Lonchitidis asperæ Ilvensis.

## P O L Y P O D I U M.

**P**OLYPODIUM Dioscorid. l. 4. c. 188. Theophrasto 9. hist. 14. Filiculam GAZA vertit: officina Græcum nomen retinente ratio nominis ex Dioscoridi descriptione colligitur. nascitur palmo altitudine, filici simile, subtile, firmum & incisum, ac non perinde tenuis divisura: radix subiacet pilosa, cirros habens ceu polyporum, crassius hinc minimi digiti: basi deorsum coloris intus herbacei comperitur: & Plin. l. 26. c. 8. Polypodium quam nostri filiculam vocant, similis enim est filici: radix pilosa, coloris intus herbacei, crassitudine minimi digiti, acetabulis cavernosa ceu polyporum cirri, subdulcis: in petris nascens, aut sub arboribus vetustis.

### I. Polypodium vulgare.

Polypodium n. Brunf. Trag. Matth. Ang. Fuch.  
Diosc. Gal. C. in Diosc. & hist. Gesl. hor. Tur Lon.  
A. Lob. cui & herba radioli Apuleji, Cæs. Cast.  
Cam. Tab. Gerard.  
Polypodium majus, Dod.  
Polypodium primum, Lugd.

Laudatur quod in quercu nascitur: reperitur  
in fago, corylo: in antiquis & cædis salubus,  
guſſia amarior provenit, quæ sylvatica cense-

tur: in rudibus saxosis.

### II. Polypodium minus.

Polypodium alterum, Matth. Lac. Lugd. pri-  
mum, Tab.  
Polypodium minus, Dod.  
Polypodium quercinum, Ger.

### III. Polypodium exoricum folijs quercus.

Polypodium Indicum, Clus. exot. l. 4. c. 17.  
Hoc sub incognita Americana, Jo. Pona Ve-  
rona accepimus.

## HERBA VIVA FOLIIS POLYPODII.

**H**ERBA VIVA dicitur eo quod si eam quis apprehendere cupiat, folia illi contrahant & subtenuis ramulos recondit: si vero quis apprehendat subito licet, adeo marcidat conspuatur, ut exsiccat existimetur: ac tamen si quis manum retrahat, mox nitorem recuperat: & toties marcescit, aut revirescit, quoties comprehenditur, aut manus ab ea retrahitur.

Anonymos in Malavar, Garziæ, Cast.  
Planta in Peru nascens, Fran. Lopez de Gomar.  
Herba Santiola, id est, Sensitiva Lusitanis, Linf.  
par. 4. Ind. Or. c. 17.  
Herba viva, Guiland. pap. Acostæ, Clus. Lugd.

cui & herba amoris.

an Æschynomine Apollodori, Scalig. Lugd.  
an Planra per terram diffusa, quam si quis artin-  
gat statim contrahitur, ut Brasica Murciana,  
ex India Occid. missa Monardi, Lugd.

HERBA

## HERBA MIMOSA FOLIIS FOENU-

græci sylvestris.

**H**erba Mimosa nuncupatur, quoniam in manu adnotata senescit & marcescit, manu verò remota virorem recipit, sed non adeo celeriter ut prior: colore & sapore est Glycyrrhica & multa Fanugraci sylvestri Tragi, Clusio moneute, convenit.

Herba molle & herba delicata vulgo, Acoftæ. Clusius notis suis in Acoftam diversam. Herba mimosa, Lug. eadem figura quæ Acoftæ, figurâ propofuit, herbam mimosam non



## S E C T I O T E R T I A.

## MUSCUS; LICHEN; LENTICULA PALUSTRIS.

## M U S C U S.

**M**uscus æquorij & αλδερν Græci appellatur, ut Dioscor. l. i. c. 20. Atticus Sphagnum & Hymnæ lib. 12. c. 23. Bryon & Sphagnum: l. 24. c. 7. Sphagnos sive Sphacos sive Bryon vocat. Muscus omnis villosa substantia, caudicibus annosis, aut saxi in aditu, aut aquis palustribus, aut mari ad na-

Differentia: multiplex est: arboreus, de quo Dioscorides l. i. c. 20. Plinius l. 12. c. 23. teretis saxi aditu ritum, de quo Plinius lib. 4. cap. 99.

## MUSCUS TERRESTRIS.

Muscus terrestris repens.

## I. Muscus vulgarissimus.

Muscus hortensis, Trag.

Muscus terrestris vulgaris, Dod. Lob. ico.

## II. Muscus vulgaris pennatus major.

## III. Muscus vulgaris pennatus minor.

Hi duo sub I. Musco in Prodr. describuntur.

## IV. Muscus filicinus major.

Muscus filicinus, Tab. Ger.

In hoc triplex varietas observatur.

V. Muscus filicinus minor floridus: in Prodr. sub 2. descriptus.

VI. Muscus abietis facie: qui 3. in Prodr.

## VII. Muscus denticulatus major.

Muscus terrestris denticulatus, Lob. Lugd.

Muscus terrestris minor, Dod.

Muscus tertius, Tab.

Muscus minor denticulatus, Ger.

## VIII. Muscus denticulatus minor.

Muscus terrestris repens, Clus. hisp.

Muscus terrestris minor alter, Dod.

Muscus terrestris denticulatus alter, Lob. Lugd.

Muscus terrestris Lusitanicus, Clus. hist.

Muscus denticulatus, Ger.

Muscus secundus, Tab.

## IX. Musco denticulato similis.

Muscus montanus, Taber.

Muscus terrestris vulgaris, Ger. ico.

## X. Muscus terrestris clavatus.

Weintraut / Brunf. qui vinum pendebat constituit.

Muscus terrestris, Trag. Matth. Lac. Dred. Cast.

Muscus ursinus vel pes ursinus, Gef. Tragi.

Lycopodium, id est, pes lupi, Dod. gal. Tab.

Chamæpeuce, Cord. hist. ico. Gef. Tur.

Permonaria sive Pulmonaria, qua pro spica

Celtica usi sunt, Ang.

Muscus clavatus, &amp; Pes leonis, Lob. Ger.

Muscus terrestris 2. &amp; alius terrestris, Lugd.

Musci genus, quod pro spica vendebatur, Cæf.

Selaginis species altera, Thal.

## XI. Muscus clavatus folijs cupressi.

Savina sylvestris, Trag. Gef. hor. Lon.

Muscus terrestris tertius, Lugd.

Chamæcyparissus, Tur. Tab. Ger.

Savina Tragi sylvestris, seu Silaginis Plin.

prima species, Thal.

Plinius l. 25. c. 11. hæc habet: Similis herbæ Sa-

binæ est Selago appellata.

## XII. Herbæ Musco similes, quas Termit-

censes in fasciculum collectas &amp; funiculo satis

longo colligatas in mare abijciunt, ad piscem

piendas: par. 3. Ind. Or.

## XIII. Toucon herba apud Brasilienses qua

ad piscandum utuntur, spinas in hamo

componunt, lineamq; herba illa confici-

unt: Lerijs deser. Brasil. c. 11.

Muscus terrestris ramosus.

## I. Muscus erectus ramosus saturatus

Savina

Sclag. *terrestris*, L. L.

Hæc inter foliola aliquando granula habet.

II. *Muscus erectus ramosus pallidus*.

*Muscus scoparius*, Lob. Lugd.

*Muscus terrestris*, Tab.

*Muscus terrestris scoparius*, Ger.

Hic claviculo vulgaris modo non infigit.

III. *Muscus terrestris candidus ramosus*.

IV. *Muscus ramosus repens spicatus*.

V. *Muscus ramosus repens apicibus candidantibus*.

VI. *Muscus ramosus erectus major*.

VII. *Muscus ramosus erectus minor*.

VIII. *Muscus ceranoides major & minor*,

IX. *Muscus cupressiformis ramosus*.

Septem posteriores in Prodr. describuntur.

X. *Muscus polytrichoides triplex*: in Prodr. descriptus.

XI. *Muscus parvus stellaris*.

*Muscus in ericetis proveniens*, Lob. belg.

XII. *Muscus stellaris roseus*: in Prodr. describitur.

XIII. *Muscus pyxiodes terrestris*.

*Muscus terrestris pyxiditatus alabastricolos imitatus*, Lob. belg.

XIV. *Muscus pyxiodes saxatilis*, in Prodr. descriptus.

*Muscus terrestris coralloides*.

I. *Muscus terrestris coralloides erectus incanus*.

II. *Muscus terrestris coralloides erectus cornibus rufescentibus*: in Prodr. uterq; sub 11. & 12. descriptus.

III. *Muscus coralloides sive cornutus montanus*.

*Muscus corallinus sive Corallina montana*, Tab. Gerard.

IV. *Muscus coralloides saxatilis, cervi cornu referens*.

*Lychobryon coralloides*, Colum.

Variat: major colore virente: minor colore cinereo.

*Muscus arboreus*.

I. *Muscus arboreus*: Ulnæ officinarum.

*Muscus arboreus*, Trag. Matth. Ang. Dod. Lug. Cast. Thal.

*Muscus*, Dod. gal. Cord. in Diosc. arborum, Lon. Tabern.

*Muscus quernus*, Lob. Ger.

*Musci genus*, quod privatim *Splachnon* vocant, Cæf.

Unus tenuior, crassior alter, brevior, alius prolixior: omnes descendentes, pauci rutilantes, quandoq; nigri.

Reperitur potissimum in quercu, populo, ulmo, betula, pomo, pyro, pinu, picea, piceastræ, abiete, cedro, larice & alijs complurimis. Verum primæ nobilitatis & odorati sunt, Cedrinus, lariceus, piceus, pineus & abietinus: Secundum locum tenet populneus, sed candidus præstat, nigricans improbat: rutilans medium tenet: vilissimus quernus.

II. *Muscus capillaceus longissimus*.

*Muscus capillaceus cinerei coloris*, è ramis Ilicis dependens, Clus. hist.

an *Muscus* ex præaltis arboribus ad terram usq; demissus, coloris viridis in cæruleum tendens, qua Regina in Florida cingitur, tenuib. staminibus catenularum instar invicem coherentibus: par. 2. Amer. fig. 39. quemadmodum Rex sedem suam Musco lentiscino tegit: par. 2. Ame. narr. 4.

III. *Muscus arboreus cum orbiculis*.

*Muscus fœniculaceus*, Lugd.

*Muscus ramosus & muscus ramosus floridus*, Taber. Ger.

*Muscus quernus fruticosus* *τρυφύλλον*, Col.

Potissimum in Quercu & Fago varians umbellæ majorib. & minorib. planiorib. & radijs multo diametro longiorib. ramosis ac hirsutis.

IV. *Muscus arboreus capitulis cavis*.

*Muscus alter* *πυξιδιτὸν καὶ ἀλυστὸν*, Col.

V. *Muscus arboreus coralloides*.

*Muscus alter quernus coralloides* *ἀγύλλον*, Col.

VI. *Muscus arboreus nodosus*.

*Dendrobryon geniculatum*, Col.

VII. *Muscus pulmonarius*.

*Pulmonaria*, Trag. Matth. Fuch. Dod. ut: Gesn. hor. Lac. Lon. Tab.

*Pulmonaria prima*, Cast. tertia, Clus. pan.

*Pulmonaria fungosa*, Lugd. vulgaris, Thal.

*Muscus pulmonarius*, Lob.

*Pulmonaria*, Lichenis quoddam genus, Cæf.

*Hepatica terrestris*, Ger. ico.

Variat lacinijis latioribus & angustioribus & hæc Lichen arboreus, Tab. & Ger. dicitur. Arboribus præfertim Quercui, Sorbo aucupariæ & alijs adnascitur: petris quoque, sed hoc candidius est.

VIII. *Muscus crustæ modo arboribus adnascens*.

*Lichen Dioscoridis & Plinij alterum*, Col.





## SECTIO QUARTA.

MUSCUS MARITIMUS; FUCUS SIVE ALGA; CORALLINA.  
CORALLUM; PORUS; ANDROSACE; ALCYONIUM,  
SPONGIA; URTICA MARITIMA.

## MUSCUS ET FUCUS MARINUS.

**M**Uscus Marinus *βρύον θαλάσσιον* Dioscoridi lib. 4. cap. 99. in saxu resists, ad mare nascitur, capillaceum, gracile sine caule.

Fucus Marinus *φύκος θαλάσσιον* lib. 4. cap. 100. quoddam latum : alterum oblongum & quadratum pumileum. tertium candidum, quod in Creta nascitur juxta terram, pulchre floridum, neque corruptioni obnoxium. Et Theophrasto 4. hist. 7. *φύκα* & plura sunt genera: quoddam folio lato, colore herbido, quod Portum quidam appellant, alij cingulum radice bitta, extrinsecus squammata: intrinsecus longa admodum crassaq, &c. Aliud folio crinito terre ipsi adhaerens, sepeq, à mari tantum allusur. Alterum altius degit, in mari extero circa Herculi columina nascitur, mira magnitudine & latitudine, & n̄ ferunt, amplius quàm ut manu comprehendi possit, &c. Alga verò proveniens in alto, quam Spongarij pelagicum deserunt, in Creta insula juxta terram, super saxa plurima optimaq, provenit, qua non solum vitas, sed etiam lana vestesq, insciunt, &c. Sunt alia Graminibus proxima, quippe folio simili, radice geniculata, longa, oblique adhaerente modo graminis, & caule calamaceo ut gramen, magnitudine Alga minore. Et aliud *βρύον* dictum, folio coloru herbidi, amplo, nec Lactuca dissimili, rugosiore tamen & veluti contracto: caret caule: sed ab uno initio plura folia ejusmodi exeunt & rursus ab alio: nascitur super regulas p̄tiliaq, juxta terram. Hic verbum Theophrastus Fucus marini quinque genera proposuit: Zosteria sive Prason: capillaceum sive faniculaceum: rinfiorium spongiorum sive pelagicum: gramineum: lactuceum. Plinio qui *βρύον* & *φύκα* confusidit lib. 27. cap. 8. Bryon marina verba sine dubitatione est, Lactuca folijs similis, rugosa veluti contracta sine caule, ab una radice exeuntibus folijs: nascitur in scopulo maxime testisq, terra comprehensis. Idem lib. 13. cap. 23. (de Phucus sive Alga agens) Non habet lingua alia nomen, quod Greci Phycos vocant: quoniam Alga herbarum magis vocabulum intelligitur. Folia lata, colore viridi gignit, quod quidam prason vocant, alij Zosteria. Alterum genus ejusdem capillaceo folio simile & niculo in saxu nascitur, superius in vadibus procul littore. Verno utrunque & interit autumnno. Circa Cretam insulam nato in petru purpura quoque insciunt: laudatissimo à parte Aquilonis una cum spongijs. Tertium graminis simile, radice geniculata, & caule qualiter calami. Aliud genus Phycorum, Bryon vocatur folio Lactuca, rugosiore tantum, jam hoc interitum nascens.

Musci maritimus.

I. Muscus capillaceus multifido folio albidus.

Muscus marinus vulgatisimus, Lob. Lugd.

Muscus marinus 2. Dod. at primus, Eid. belg.

Muscus marinus 3. Tab. marinus, Ger.

Muscus marinus herbaceus mollior, Cæs.

Muscus albus marinus, Imper.

II. Muscus capillaceus multifidus niger.

Fuci marini nigri repentis nomine ex mare Balthico accepimus.

III. Muscus maritimus viridis multifido folio.

Palmula marina, Imper.

Muscus marinus, Clus. hist.

Hujus diversæ sunt species.

IV. Muscus maritimus tenuissimè dissectus ruber.

an Fucus sive Alga tinctoria, Lugd.

V. Muscus pennæ similis.

Penna marina, Imper.

VI. Muscus maritimus filicis folio.

Myrophillum pelagium Cortusi, Clus. hist.

VII. Muscus maritimus Adianto affinis.

Pennaria marina, Imper.

VIII. Muscus maritimus Adianto similis alter.

Polypodium marinum, Imper.

IX. Muscus maritimus Gossypio similis.

Gossypium muscus, Imper.

X. Alga bombycina, in Prodromo descripta.

Musci Coralloides.

I. Muscus maritimus sive Corallina officinarum.

Muscus marinus, Matth. Ang. Dod. ut: Cord. in Diosc. Lac. Tur. Cast. Lugd. Cæs. Tab. Corallina, Lob. Lon. Lem.

*Fucus capillaceus*, Lugd.

II. *Muscus coralloides squammulis lorica-*

*carus*, Bryon thalassion, Tur.

*Muscus marinus* 3. Dod. vel 1. Eid. belg.

*Muscus candidus coralloides squammatus*, Lobel.

*Muscus marinus candidus coralloides*, Lugd.

*Corallina altera*, Tab.

III. *Muscus coralloides latifolius*.

*Muscus coralliformis*, Lob. belg.

IV. *Musc. foliolis latiusculis ambitu dissectis*.

*Muscus marinus* 3. Dod. belg.

*Fuci subrotundi*.

I. *Fucus folio rotundo*.

*Sertolaria*, Imper.

*Corallina latifolia & Opuntia marina*, Cortuf.

*Lichen marinus*, Clus. hist.

II. *Lichen maritimus*, Lob. belg. Tab.

III. *Fucus umbilicus marinus dictus*.

*Umbilicus marinus*, Imper.

IV. *Fucus fungis affinis*.

*Fucus fungularis*, Imper.

Eit major & minor.

V. *Fucus cavi*.

*Heba cava*, Imper.

*Fucus sive Alga latifolia*.

I. *Muscus marinus Lactucæ folio*.

*Fucus marinus* 1. Dioscoridis, Theoph.

*Bryon Lactucæ folijs* Plin. & Lob.

*Muscus marinus alter*, Matth. Cæst.

*Muscus marinus Theophrasti*, Dod. gal. Lugd.

*Therapidion Cratevæ*, Ang.

*Bryon thalassion*, Tur.

*Fucus marinus prior*, Dod.

*Muscus marinus virens latifolius*, Dod. belg.

*Lactuca marina*, Tab.

II. *Muscus lactucæ marinæ similis*.

*Fucus linza dictus*, Imper.

III. *Alga intybacea diversa à Musco primo*.

*Fucus sive Alga intybacea*, Lugd.

IV. *Alga longissimo lato tenuique folio*.

Sub Fuce 4. in Prodomo describitur.

V. *Alga longissimo lato crassoque folio*.

*Fucus* 3. in Prodomo.

VI. *Alga latifolia chartæ similis costa-*

*carens*.

*Folium grande ex Algæ genere*, quod ex Ma-

*dæra advehitur cum Saccharo*, Cæsalp. cap. de

*Alga & de Musa*,

VII. *Alga latifolia coriacea*.

*Palmifolium giganteum sive uca gigantea*

*Imper.*

*an Urack Nortmanorum*, Lob.

VIII. *Alga membranacea ceranoides*.

*Fucus* 6. in Prodomo.

IX. *Alga maritima gallopavonis plumæ*

*referens*.

*Fucus sive Alga angustifolia*.

I. *Fucus arboreus polyichides egulis* 2. in

*Prodomo*.

II. *Fucus alatus sive phasganoides* 1. in

*Prodomo*.

III. *Fucus longo angusto crassoque folio*

5. in Prodomo.

*an Fucus Zooster*, Lugd.

*Fuci maritimi* 2. species, Dod. belg.

IV. *Fucus angustifolius ligulas referens*.

*Fucus marinus alter*, Dod. belg.

V. *Alga angustifolia vitrariorum*.

*Fucus marinus primus*, Ang.

*Fucus marinus*, Lac. alter, Dod.

*Alga*, Cæf. Imper. marina, Lob. ico.

*Fucus sive Alga marina graminea*, Lugd. cum

*duplici figura*.

Hæc duplex: folijs alia latioribus, alia an-

gustioribus, utriusque folia initio virent, dein

cum exiccantur albescunt: verum etiam angu-

stifolia candidissima reperitur.

VI. *Alga cornu cervi divisura*.

*Herba Cretica quæ tinctoribus Rubella*, hoc

nomine Imperatus misit.

VII. *Alga gramineo folio*.

*Algæ minimum genus*, Cæf.

*Fucus sive Alga capillaceo folio*.

I. *Alga viridis capillaceo folio*.

*an Conserva Plinij Ang.*

*Conserva Plinij*, Lob. Lugd. Imper.

*Linum marinum*, Imper. qui hoc nomine misit.

Duplex est: alia in maritimis quæ *Muscus to-*

*mentosus*, sive *Conserva*; alia in aquis stagnan-

tibus, quæ *Linum aquaticum* Imper. dicitur.

II. *Alga nigro capillaceo folio*.

*Filum maritimum Germanicum* in Prod.

III. *Alga fontalis trichodes*.

*Conserva trichodes*, vel *Trichomanes aquaticum*, Lugd.

IV. *Alga in tubulis aquam fontanam du-*

*centibus*.

## FUCI ARBORIBUS, FRUITICIBUS.

vel etiam herbis assimilati.

**N**ascentur etiam in mari Fuci qui fruticibus arboribusve assimilantur: quare Theophrastus 4. hist. 7. scribit, nasci Quercus & Abietes super lapides scitilaj, radicibus carentes, sed passellarum nudo adhaerentibus. Idem & Palma Pelagi a meminit. Et Plinius lib. 13. cap. 25. in alto vero Abies & Quercus cubitali altit. sine, ramus earum adhaerent concha: Quercus etiam tingi lanas tradunt. Glandem etiam quassam, et in alto, &c. Vitis passim nascitur, sed Ficus sine solis rubro cortice & palma fruticum generis: extra Herculi Columnas, porri fronde nascitur frutex & ams Lauri & thymi, &c.

Fucus folliculacei.

I. Fucus maritimus nodosus.

Fucus maritimus 3. Dod. belg.

II. Fucus maritimus alter tuberculis paucissimis.

Fucus marinus 4. Dod. belg.

III. Fucus maritimus, vel Quercus maritima vesiculosa habens.

Quercus marina, Lobel. Clus. hisp. Tabern. at 1. E. d. histor.

Fucus marinus primus, Dod. belg.

an Alga vulgaris ramosa, Lem. ocul.

IV. Fucus maritimus vel quercus maritima, foliorum extremis tumidis, quam aliqui glandiferam vocant.

Quercus marina altera, Clus. hist.

Hæc cum priore una figura à Lobelio, Tab. &amp; Clus. in hist. exprimitur.

V. Fucus maritimus folijs tumidis barbatis: in Prodr. sub Quercu maritima 3. describitur.

VI. Fucus folliculaceus fœniculi folio longiore.

Phucus marinus folio fœniculi, Ang.

Fucus ferulaceus, Lob. Lugd.

an Algæ species 2. Lem. ocul.

VII. Fucus folliculaceus folijs fœniculi brevioribus.

Muscus marinus virens tenuifolius, Dod. belg.

VIII. Fucus folliculaceus folijs Abrotani.

Fucus marinus folijs Abrotani maris, Lob.

Fucus marinus tenuifolius, Tab.

Muscus marinus folijs abrotani, Lugd.

Gongularis marina seu Abies marina, Theoph. Imper.

IX. Fucus racemosus vel racemus marinus. Acinaria marina prima, Imper.

X. Fucus folliculaceus ferrato folio.

Lenticula marina ferratis folijs, Lob. Lugdun. Tabern.

Surg. 20 Acostæ, Lugdun. Lin. sc. part. 3. Orient. cap. 4. §. 4. &amp; part. 4. fig. 10.

Vitis marina Theoph. Alga prima, Lem. ocul.

Acinariæ marinæ 3. species, Imper.

an Klaptmut seu herba magna copia fluctuans: part. 5. Ind. Orient.

XI. Fucus maritimus bacciferus.

Herba mari innatans folijs rutaceis, baccis Juniperinis similibus: mare ita herbidum efficiens ut pratum referret. Leriio desc. Brasil. c. 20.

XII. Fucus folliculaceus linariæ folio.

Lenticula marina Serapionis, &amp; Uva marina quorundam, Lob. Lugd.

Lenticula marina Serapionis, Tab.

Acinariæ marinæ altera species, Imper.

XIII. Abieti similis maritima.

Muscus coralloides alter, Lob. Lugd.

Abies marina belgica, Clus. hisp. &amp; hist.

XIV. Tamarisco similis maritima.

Myrica marina Batavica, Clus. hist.

an Tamariciola Fucus, Imper.

XV. Fucus cupressi similis.

Fucus cupressinus, Imper.

XVI. Salix maritima.

Salix marina testis ostrearum &amp; saxis innascens, Lugd.

XVII. Ericæ similis maritima.

Frutex marinus Ericæ facie, Clus. exot. l. 6. c. 5.

XVIII. Resedæ similis maritima.

Planta marina resedæ facie, Clus. exot. l. 6. c. 6.

XIX. Equiseto similis saxea.

Hippuris saxea, Clus. exot. l. 6. c. 8.

XX. Abrotano similis saxea.

Planta saxea Abrotano similis, Clus. exot. l. 6. c. 7.

Fuci diversi ex Imperato: qui cum nobis inogniti, in certas classes reponi non possunt.

I. Fucus marinus Roccella tinctorum.

II. Fucus capillaceus Roccella.

an Fucus 3. Ang.

III. Fucus verrucosus tinctorius Roccella.

IV. Fucus lumbicalis, aliquibus Corallina.

Z z 3

V. Fu-

- V. *Fucus macilinos lanuta.*  
 VI. *Fucus radicella sive Vermicularis.*  
 VII. *Fucus terzola, Vermicularis species.*  
 VIII. *Fucus forcellata lumbricalis species.*  
 IX. *Fucus tremula.*  
 X. *Fucus scoparia, Pennachio marinus.*  
 XI. *Fucus vermicularis laqueus dictus.*

- XII. *Fucus xanthus sive Quercus & l. marina.*  
 XIII. *Fucus vermicularis dardanus R. & Sempia.*  
 XIV. *Muscus marinus trifolius.*  
 XV. *Muscus marinus Alghetta.*  
 XVI. *Fucus axungia.*  
 XVII. *Fucus aliquibus palma marinus duplex vel cortice rugoso vel laevi.*

## C O R A L L I N A.

- I. *Corallina fruticosa recta alba.*  
*Juncus petrosus, Ang.*  
*Lithophyton marinum albicans, Gefn. foss.*  
*Quercus marina Theoph. Clus. hisp. & exot.*  
*Corallina alba, Lob. Tab.*  
*Corallium album, Lugd.*  
*Muscus marinus fruticosus, Cast.*  
*Corallij similes frutices, Cæf.*

Ligno intus durissimo & nigro cui crusta obducitur, alijs candida, alijs cinerea, alijs rubens, testacea substantia.

- II. *Corallina lutea punctata.*

- III. *Corallina fruticosa purpurea.*  
*Lithophyton marinum rubri seu purpurei coloris, Gefn.*  
*Corallina rubens Antiphatis facie, Lob.*  
*Corallina rubra, Tab.*  
*Quercus marina Theophr. Clus. exot. libr. 6. cap. 4.*  
*Quercus marina cum sua basi, Eid. curis post.*

- IV. *Corallina nigra veluti spinis exasperata.*  
 V. *Corallina nigra setacea hirsuta.*

- Antiphates 2. species, Ponæ.*  
 VI. *Corallina nigra setacea.*  
*Antiphates sive Corallina 3. Ponæ ital.*  
 VII. *Corallina nigra setacea circumvoluta.*  
*Antiphatis sive Corallina 3. altera species, Ponæ ital.*

- VIII. *Eschara coralloides, Clus. exot. libr. 9.*  
 IX. *Corallina affinis Nodularia.*  
*Nodularia, Imper.*

- Variat colore albo, pullo, puniceo.  
 X. *Corallina facie grumoso cortice.*  
*Arbuscula marina coralloides, Clus. exot. l. 6. c. 1.*  
 XI. *Corallina alba nodosa: quæ 1. in Prodr.*  
 XII. *Corallina cinerea rugosa, 2. in Prodr. quæ duplex est.*

- XIII. *Corallina cortice reticulato maculoso purpurascens.*

*Frutex marinus elegantissimus, ad Palmæ marinæ genus Theoph. accedens, Cl. exot. l. 6. c. 12.*

- XIV. *Corallina reticulato cortice altera.*  
*Planta marina retiformis, Clus. exot. l. 6. c. 3.*  
 XV. *Corallina pallide flavescens cortice laevi: quæ 3. in Prodr.*

## C O R A L L U M.

- I. *Corallum rubrum.*  
*Corallium, Gefn. Lob. Lugd. Cæf.*  
*Corallum rubrum, Imper.*

Variat: coloris vel intense, vel dilute rubri est, vel subflavescentis, vel fusci.

- II. *Corallum nigrum.*  
*Corallium nigrum, Gefn. Cæf.*  
*Antiphates sive Corallium nigrum, Lob. Lugd.*

- III. *Corallium extra rubens intus nigrum, Cæf.*

- IV. *Corallium album: & Lob.*  
*Corallium album, cujus nec apud Græcos, nec Latinos mentio fit, Cæf.*

- In hoc varietas est: asperum est & striatum.  
 V. *Corallum album ramosum.*  
*Corallum album fistulosum, Imper.*

- VI. *Corallum album ramosum alterum.*  
*Coralloides seu Coralli albi varietas, Lob. Lugd.*  
 VII. *Corallum album verrucosum punctatum.*

- Corallum album punctatum, Imper.*  
 VIII. *Corallum album stellatum.*  
*Corallum stellatum, Imper.*

- Est majus & minus.  
 IX. *Corallum album articulatam.*  
*Corallum articulatam ex Majorica, Imper.*

*Ad. Lobel. icon. Diofcorides l. 3. c. 139. aliqui Adobolus per a<sup>l</sup> petantur, marina planta est, quæ a<sup>l</sup> obari exempta duratur. Nam atq; emergit, quasi a circumfuso nobis aere lapidescat concrefcitve. Probatiſſimum rubens, colore Sandæ achæ, aut Sandeyi ſaturata. ut quod in lapide duritiem, & ſcabroſum, fiſtuloſum ſen non carum præterea itane ſpongiſſum, vitioſum exſpiratur. Quod ætina<sup>l</sup> vocatur corallium, quog; eiſ, ſed ſpætat. Nam ſolo Plinius eiſ colore nigro, arbore & ipſum ignita, at magis ramoſum. Plinio l. 32. c. 2 Corallio forma eiſ, Juteiſ coloris viridis. bacca ejus candida ſub aqua & molles, exempta confeſtim durantur & rubefcunt, quæ Coruſa ſiva ſpecie atq; magnitudine: ajunt ita?u proſimus lapideſcere, ſi vivat. itaq; opipali, evellit, rectibus, aut a viſſerramento præcidi. hac de cauſa Curialium vocatum interpretantur (iti ovæ dicitur, quoniam in mari tondetur.) Probatiſſimum quam maxime rubens & quam ramoſiſſimum, nec ſcabroſum aut lapideum, vel ruruſ inane aut concavum. autoritas baccarum ejus non minus in Indorum vitu quog; prætoſa eiſ, quam ſecunduſ noſtri uniſ nes Indici (ſed putavit Plinius baccarum formam artiſicio paratam, ſponte naſci.) Aut phatuſ verò l. 4. io. inter gemmas meminit, qua nigra ſit & non tranſlucens. Hujus volunt etiam nianuſ ſe lib. 3. cap. ult. huſ verbuſ: Iſidos plocanon, corallio ſimiliſ ſue ſolys: præſumimuratio colore in virgum deſicere. cum: Padat frangi: item alium qui vocetur charitoblepharon efficaciæ in amatorijs. hac Plinius. Hoc poſteius nigruſ eſſe corallium, hinc quidam arbitrantur, quod olim in ſupercilys ſeminarum, color uger pulcherrimuſ & veſuſiſſimuſ haberetur. Reſert Linſcoituſ par. 3. Ind. Orient. cap. 1. ad caput Bone ſui coſmoleſſe, qui magna ex parte Corallio, eoq; acutiſſimo, aſſerimeq; & emiſſary coloruſ, ut nigri, albi, augeſcoſ ſen viriduſ, conſtant.*

## P O R I C O R A L L O A F F I N E S.

**P**linius l. 36. c. 17. Poruſ lapiduſ ſervandis corporibuſ idonei meminit: Porio ſimiliſ candore & duritie, minimuſ tamen ponderoſuſ, qui Poruſ vocatur. Cum Plinius ita brevuſ ſit, an de huſ locutuſ ignoramus: Equidem lapideſ ſubſtantiæ ſunt Corallys proximi, & poſiſſimuſ poroſitate, unde nomen habet a Corallys diſſenti.

- I. Corallo affinis Poruſ magnuſ.
- Poruſ magnuſ, Imper.
- II. Corallo albo affinis Poruſ ramoſuſ.
- Poruſ ramoſuſ, Imper.
- III. Milepora, Imper.
- IV. Corallis affinis Madrepora ſtellata.
- Madrepora, Imper.
- V. Corallis affinis Madrepora ramoſa.
- Madrepora ramoſa, Imper.

In eadem planta varietas & in ſubſtantiæ &

colore pro partium diverſitate reperitur.

- VI. Poruſ facie Sabinæ, Imper.
- VII. Poruſ cervinuſ, Imper.
- VIII. Poruſ reticulatuſ & Eſchara marina, Imper.
- IX. Frondipora, Imper.
- X. Poruſ tabulariuſ, Imper.
- XI. Poruſ anguinuſ, Imper.
- XII. Coralliyſ affine Alcyonium rubruſ
- Tabularia purpurea, Imper.

## A N D R O S A C E.

**A**d. Lobel. icon. Dioſcoridiſ l. 3. c. 150. herba eiſ alba tenuibuſ ciruſ ſine ſolys, ſolliculuſ uniſ habens in cacumine, quo ſemen continetur: in maritimuſ Syria naſcitur. Idem Plinius l. 26. c. 4. Androſaces dicitur, quod ſi dropicorum aquaſ ducat, vel Hydroſaces, quia non niſi in aqua creſcat.

- I. Androſaces petreæ innaſcens vel major.
- Androſaces, Matth. Lon. Caſt. Lugd.
- Muſci marini genus, Guil.

Hanc ex Iſtria habemus, & à ſequenti cirriſ longioribuſ, ſolliculuſ ſive clypeoliſ (ſed ſemine carentibuſ) in cacumine minoribuſ, diſſert.

- II. Androſaces Chamæ conchæ innaſcens, vel minor.
- Androſaces, Coryledon folioſum marinuſ,

Ad. Lobel. icon.

Androſaces, Lobel. Lugd. (& Umbilicuſ marinuſ Monſpel.) Cam. ep. utramque una figura exhibet.

Funguſ marinuſ minimuſ, Cæſ.

Androſace Matthioliſ, Tab. Ger.

Hanc communiter conchæ, rariuſ petreæ innaſcentem in ſtagnis circa Magalonam & Frontignanum obſervavimus.

## A L C Y O N I U M.

**A** <sup>1</sup> *Alcyonius* Dioscoridi. l. 3. c. 126. cuius quing. genera sunt: unum spissum est, acerbis saporis, & pinguis, & insuper, virosum, grave ac piscem oleus: alterum oculorum pterygio aut spongia simile, leve, & carum, odore fere algæ: tertium vermiculis forma & colore pene purpureum est, quod Malesium quidam vocant: quartum succidui velleribus non admodum dissimile, multum in amaribus hians ac leve: quintum in odoratum, intus quidem asperum, quodammodo pumicosum, foris vero leve, acre. Plinius l. 32. §. fit in Hælyconeum appellatum, ex nido ut aliqui existimant, hælcyonum & cecycon: ut alij, e sordibus spumæ, rum se se eribus: alij e limo, vel quidam mari lanugine. Quatuor ejus genera: cinereum spissum, odoratum, & carum molle lenium odore fere algæ: tertium candidiorum vermiculis: quartum pumicosius spongiæ, pariter pene purpureum, quod optimum: hoc & Malesium vocatur: quo candidius autem hoc minus probabile.

I. Alcyonium durum sive 1. Diosc. Imper.

II. Favago Australis, Alcyonium 2. Diosc. quod duplex existit, Imper.

III. Alcyonium vermiculare, Imper.

Alcyonium 3. Diosc. Cæs.

Hoc non solum purpureum, sed & candidum ac flavescens reperitur.

IV. Alcyonium molle vel 4. Diosc. Imp.

V. Alcyonium stuppofum, vel 4. Diosc. Imp.

VI. Alcyonium foraminosum vel quintum Diosc. Imper.

VII. Alcyon. forma fructus alicujus ficus.

Alcyonium tuberosum vel 5. Diosc. Imp.

VIII. Alcyonium ingens & 3. quod ad 5. Diosc. referri potest, Clus. exot.

IX. Alcyonium cervi cornua cum cranij parte referens.

Alcyonium monstrosum sive 1. Clus. ex. l. 6. c. 12.

X. Alcyonium chirothecæ facie.

Alcyonium alterum, Clus. l. c.

Cum secundo Dioscoridis nonnullam aemulitatem habet.

XI. Fungus auricularis, Cæs.

Musculus faxatilis, aliquibus Alcyonium quatuor Diosc. Imp.

XII. Bursa marina & Alcyonij genus 4. Cæs.

XIII. Rosa marina ad quintum Alcyonij speciem referenda, Cæs.

XIV. Pila marina, Cæs.

XV. Pila marina velut ex ampullis constans ad spumæ similitudinem.

Spuma maris, Cæs.

Variat colore modò candido, modò rubro, aliquidando flavescente.

## Z O O P H Y T A.

**Z** <sup>1</sup> *ἡ ζωὴ* sunt quæ nec animalium, nec plantarum, sed tertiam ex utroq. naturam habent, & ut Aristoteles loquitur, τὰ ἀναμειβόμενα φύσιν καὶ οὐ φύσιν, quæ ambigunt inter plantam & animal, quæ Plantæ animalia dici possunt: talia sunt Spongia, Urtica marina.

## S P O N G I Æ.

**S** <sup>1</sup> *σπῆγξ* & Græci, Spongia: Et ymologicus sic dici scribit *σπῆγξ* τὸ ἀπὸ τῆς ἰσχύος, quod humorem attrahat & umibatur. Dioscoridi lib. 3. cap. 138. & Spongiæ alias nonnulli mares appellaverunt, quæ tenuibus sunt sive spissæ densæ, & quibus rursus duriores τῶν ἄλλων nominaverunt: alias vero semina, quæ contrario ac aliâ modo se habent. Et Plinio lib. 9. cap. 45. Spongiarum tria genera accepimus: spissum ac prædurum & aliud & aliud eragos id (ab odore gravi) vocatur: minus spissum & mollius, manon tenne densumq. ex quo penicilli turunda sinuosis & cavu ulceribus immittuntur) parantur. Ille sane *σπῆγξ* ἢ *σπιδόρσος* dicuntur habet Plinius l. c. neg. fruticum neg. animalium, sed tertiam quandam ex utroq. naturam habent esse: ut habet idem, sunt Urtica & Spongia.

I. Spongia globosa, Imper.

II. Spongia compressa, Imper.

III. Spongia compressa magna.

Spongia marina alba & flava, Tab. Ger.

Spongia compressa latissima, Imper.

IV Spongia hircina, Imper.

V. Spongia velaris, Imper.

VI. Spongia ramosa.

Conservæ marinæ genus, Lob. Lugd.

Corallina Britannica Penæ, Lugd.

an lidos plocamon corallio similis Pl. l. 1. c. 29.

VII. Spongia ramosa histulosa.

VIII. Spongia



VIII. Spongiosus fucus, Imper.  
Hujus diversæ species una barbæ similis: altera  
arbusculæ in ramos divisæ: alia instar manus

humanæ: aliæ figuræ turbinate instar pini.

IX. Spongia forma infundibuli.  
Spongia elegans, Clus. exot. l. 6. c. 11.

## URTICA MARINA, ET ALIA.

**U**rtica diſta, quòd admota contrèſtantiù manu pugnât. Sic Plinius lib. 9. cap. 45. Urtica noctu vagatur, noctuq; mutantur: carnosæ ſpondu huius uatura & carne veſcuntur: vû pruritum mordax eademq; quæ terreſtri urtica, &c. Verùm Bellonius, inter piſces molles: Rondeletium, inter animalia imperfecta & quidem genere mollia reſert.

Genus duplex Aſtroteli 5. hiſt. 16. At Rondeletio ſpecies ſex ſunt. Plinio lib. 9. c. 43. alterum earum quæ ſoluta ſunt, quæ vagari ſcribit Plinius: alterum earum genus ſaxi affixum ſemper hæret.

I. Urtica 5. & 6. Rond. (& ex eo Aldroan. Urtica ſoluta 1. & 2. Tab.

II. Urtica explicata & contræſta, Bello. Italis Cunnus marinus: & Tab. de his vide Geſn. Bellon. Rondelet. & Aldroandum, qui formas diverſas pingit.

III. Pulmo marinus, Matth. Tab. Aldroan.

IV. Holothuria, Aſtrot. Plin. Rondel. (qui duas ſpecies habet) & Aldroan.

V. Tethya, Aſtrot. Plin. Rond. Bellon. Geſn. Aldroando, cui ſex ſpecies.

VI. Mentula marina, Rond. cui duplex eſt. Genitale marinum, Bellon. Epipetron Geſneri, cum hac convenire vi-

detur, Aldroan.

VII. Penna marina, Rond. Geſn. quæ Mentula alata piſcatoribus, Aldro. cui duplex eſt.

VIII. Manus marina, Geſn. ex eo Aldroan.

IX. Arantia marina.

X. Malum granatum, Aldro.


XI. Malum inſanum marinum, Rond. ex eo Aldroan.

XII. Pyrum marinum, Aldr.

XIII. Cucumer marinus, Plin. Rond. ex eo Aldroan.

XIV. Uva marina, Plin. Rondelet. ex eo Aldroan.

XV. Fungus marinus, Aldroando.



## SECTIO QUINTA FUNGI ET TUBERA. F U N G I.

**F**ungi Græci minores dicuntur: de quibus Theophrastus 1. hiſt. 8. & 9. Fungus pediculus longè major æqualem quam Gladiolus habet & radice penitus caret: & 3. hiſt. 9. verum è radicibus arborum & juxta radices erumpit: & 4. hiſt. 8. cum autem aqua plures inceſſerint fungi juxta mare rubrum quodam in loco erumpunt, qui ſole taſti in lapidem mutantur. Horum origo Plin. l. 22. c. 23. ex pituita arborum. Nam Fungi ſicut & Tubera, neg. plantæ, neg. radices, neg. flores, neg. ſemina ſunt: ſed nihil aliud quam in terra, arborum, lignorum putridorum, aliarumq; putrilaginum humiditates ſuperflua: id quod inde colligi poteſt, quod omnes Fungi & Tubera, maxime ea quæ edendo ſunt, à tonitruibus & pluviis cæli ſtatim frequentius naſci ſoleant.

Differentia duplex Dioſcor. l. 4. c. 83. aut enim edules ſunt. aut exitioſi: hi multo de cauſis tales evadunt: aut qui juxta clavos rubiginofos, aut pannos putridos, aut ſerpentum latibula gignuntur, aut arboribus privatis fruſtus noxios ferentibus adnaſcuntur. Habent verò qui tales ſunt intra ſe lentorem quandam concretum & ſtringentem modo viſcoſum, & terra eruiſi reponantur, celeriter corrupti computreſcunt. At Plin. l. c. Fungorum numeroſa genera: tutiſſimi qui rubent callo (ſortè carne) minus diluſo rubore quàm boleti: mox candidi, velut apice ſtaminis inſignib. pediculi: tertium genus ſuilli, veneni accommod. iſſimi. Quidam diſcretè arborum generib. ſico, ſerula (potius betula) & quinnii ferentibus: nos item ſago, aut robore, aut cypreſſo: omnium color lividus.

Verum alij ex terra naſcuntur: alij veterum arborum caudicibus ſubinde & eorum ramis: vix enim ullæ arbor ſenſcens in qua non conſpiciatur) adnaſcuntur: alij ſaxi, rectius ſtramineis, putridis lignis inſident, & quandoq; ſupra ſumum reperiuntur. Guſtan. com. de pap. 4. & aliter genus ſive Ciema alterum dicit.

## I. Fungus porosus.

Fungorum primum genus, Trag. Lon.

Fungorum præcipuum genus, Gef. col.

Spongiola nonnullis, Dod. Imper. Neapolitanorum, Ponæ.

Fungi, faviginosi, sive Fungi rugosi favis melis similes, Lob. belg.

Fungus spongiosus Dalechampij, Lugd.

Fungi rugosi, Cast.

Fungi esculenti primum genus, Clus. hist.

Fungi præcoces, Dod. belg.

Hujus quatuor sunt species: nam primus fungus parvus est, rugosus albicans, quasi fuligine infestus: 2. radicem Aristolochiæ rotundæ exiccatam refert, coloris ex rubro fusci: 3. duplo amplior plerumque, orbicularis: 4. in longitudinem metam instar exerefcit.

## II. Fungus apice pyramidalis &amp; angusto.

Fungi esculenti alterum genus, Clus.

## III. Fungus in metam fastigiatus albus fuscus tinctus.

Fungi esculenti quartum genus, Clus.

Hic triplex est: primus & secundus parvus & mediocris, ambo coloris albicantis fusco tincti: tertius major magis fuscus, interdum notis distinctus.

## IV. Fungus orbicularis ex albidus pratensis.

Fungi esculenti tertium genus, vel S. Georgij, Clus.

## V. Fungus angulosus pediculo exiguo.

Fungi esculenti quintum genus, Clus.

Triplex est: 1. angulosus: 2. magis orbicularis: 3. major, in tres lacinias divisus: ad arborum radices.

## VI. Fungus radice carens dimidium fungum &amp; orbem referens.

Fungi pezizæ esculenti, Colum.

Ad Fagorum radices Agarici modo crescit.

## VII. Fungi umbilicum exprimentes plures simul alii.

Fungus in populo alba, Matth.

Populæ *myopiræ*, Dod.

Fungi esculenti sextum genus, Clus.

Ad arborum radices, sola magnitudine differens observatur, ex ætate proveniens.

Fungorum sub Populo nascentium, qui Turini vocantur, subrubentium, pediculo candido, qui in sub minimè præstantur, Cæs. auctore.

Hæc refectendi Calucci vulgo dicti apud Portam villolam.

lurgalli cristæ, acri odore, coma v. l. villolæ.

## VIII. Fungus umbilicum referens variegatus.

Fungi esculenti decimum tertium genus, Clus.

Variati nam in primo superne color ex castuleo, vitidi & fusco commixtus conspicitur: 1. supernè ex albo sublateis: 2. supernè color flavescens veluti fuligine infestus, inferne albus fuscis strijs distinctus: 3. supernè ex albo vitidis, inferne candicans & striatus: 4. supernè ex purpureo & saturatè rubro, raris albis maculis notatus: inferne candicans fuscis strijs aspersis, oris dilute purpurascens: 5. ætior rubicundus, supernè coloris ex albo fusci, inferne candicans, fuscis strijs discurventibus.

## IX. Fungus orbicularis tinctus albus fusco permixto.

Fungi esculenti septimum genus, Clus.

Duplex est: alter tumens, coloris vel albi fusco permixti, vel maculis quibusdam aspersis: alter orbicularis candicans.

## X. Fungus pileolo lato orbiculari candicans.

Fungi orbiculari, vel Fungorum tertium genus, Trag.

Fungi boleti, Cord. in Diof. Lon.

Fungi nemorum, Lob. Belg.

Fungi esculenti octavum genus, Clus.

Triplex est: 1. minor candicans: 2. major albicans maculis fuscis & flavescens aspersis: 3. amplior adhuc ex fusco subrubens.

## XI. Fungus pileolo lato orbiculari flavescens.

Fungi quartum genus, Trag.

Capreolini, Tabern.

Fungi esculenti duodecimum genus, Clus.

## XII. Fungi pileolo lato &amp; rotundo.

Fungi esculenti nonum genus, Clus.

Hujus quatuor sunt differentie: 1. supina parte candicans, inferne magis fuscus evidens strijs donatus: 2. supernè albicans crassus strijs insignitus: 3. supernè in albedine magis fuscus, pediculo crassiore nigricante: 4. rufescit & pediculo est albo.

## XIII. Fungus pileolo lato &amp; rotundo livido.

Fungi vulgares Amanitæ vel Boleti, Ttag.

Fungi, Matth. Lac. Lon. Dod. Cast. Lugd.

Fungi vulgarissimi esculenti, Lob. ico.

Hic ad præcedentem referri potest.

## XIV. Fungus pileolo in plano orbiculari.

Fungi esculenti decimum genus, Clus.

Diligenter

Duplex est: alter colore puniceo dilutiore: alter coloris ex rufo fuscis.

XV. Fungus pileolo magnopiano orbiculato venis exasperato.

Fungi esculenti vigesimum genus, Cluf.

Triplex est: 1. supernè dilutè rubens, aut laterice coloris venis exasperatus: infernè pallescens, strijs fuscis insignitus: 2. supernè extuberat, coloris ex albo pallido & fusco mixti: infernè candicans, strijs fuliginosis distinctus: 3. major supernè coloris ex albo, pallido, rufo & fuliginoso mixtis: infernè rubescens, strijs ex atro purpurascentibus notatus.

XVI. Fungus pileolo plano subfusco oris lateris.

Fungi esculenti undecimum genus, Cluf.

XVII. Fungus pileolo lato puniceo, lacteum & dulcem succum fundens.

Fung. sextus, què aliqui crudum devorat, Trag.

XVIII. Fungus candidus odoratissimus orbe magno.

Fungus Richione, quasi magnum fungorum regem dicas, Portæ.

Elui tam suavis ut crudus edatur & ægris innoxie præbeatur, Eid.

XIX. Fungus latus sanguinei coloris.

Linguae in caudicibus castaneorum, Cæf.

An ij quos Plinius scribit tutissimos, qui collo rubent, minus diluto rubore, quam Boleti.

XX. Fungus angulosus & velut in lacinias sectus.

Fungi genus magnum à figura auriculi leporinis, Gess. coll.

Arborum fungi auriculæ Judæ facie, Lob. belg. Gallinacei, Cæf.

Fungi esculenti decimum quartum genus, vel Fungus leporinus, Cluf.

Duplex est: 1. supernè pallidus, flavis maculis variegatus: infernè flavescent, fuscis strijs distinctus: 2. duplo major, supernè flavus: infernè strijs distinctus, croceoque colore infectus. an Fungus leporinus quem 7. facit Tragus, qui formam interaneorum vituli repræsentat, qui incanus & plumbei coloris.

XXI. Fungus orbicularis oris intrò reflexis. Fungi esculenti genus, sive fuilli, Cluf.

Duplex est: 1. utrinque subalbidus veluti fuliginè infectus: at supernè aliquot maculae albæ asperguntur: infernè strijs crassis nigricantibus notatur: 2. major cujus pars superior coloris est

purpurei rubro saturno commixti. secundum oras maculis albis aspersis: inferior ex albo fuscus, strijs tenuioribus excurrentibus.

Suillos vulgo porcinos dictos, Boletis crassiores, supernè subfulvos, infernè cinereos, internè candidos, habet Cæf.

XXII. Fungus Augusti mensis.

an Fungi octavum genus, Trag. 6. & 7. gen. Lon.

Fungi esculenti decimum sextum genus, Cluf.

Triplex est: 1. superior colore est candicante subfusco, inferior albus strijs carens: pediculus coloris ex cæruleo, viridi & fusco mixti: 2. utrinque ex flavo rubescit: 3. supernè ex fusco rufescit: infernè æqualis albus.

XXIII. Fungus planus orbicularis aureus.

Volva Plinij, Elvela, Ciceroni, Boleti, Ang.

Boleti Cæf.

Fungi esculenti decimum septimum genus, Cl.

Differentia notatur, quæ ratione ætatis contingit: nam cum primum erumpit, ovum candore & figura refert, at albæ cutem quam volvum vocant, lacerato, paulatim in planam orbicularem formam se explicat: supernè aureus est, infernè flavus, strijs distinctus: hic omnium præstantissimus censetur.

XXIV. Fungus pileolo lato, longissimo pediculo variegato.

Fungi esculenti decimum octavum genus, Cl.

an Fung. Neapolitanis Conocielle vocat, Portæ.

an Fungus pratensis, quem quidam Scarogias vocant, Cæf.

XXV. Fung. bulbosus fuscus duplici pileolo. Fungus quercinus diplocoides, Col.

XXVI. Fungus lariceus aurei coloris.

Fungus in larice præter Agaricum nascenti: ginta librarum, aureum per ambitum dissectus, in cibus gratissimus, Marth.

XXVII. Fungus albus acris.

an Fungus piperis sapore, Cord. in Diosc.

Fungus piperitis, quia instar piperis linguam vellicat, Portæ.

XXVIII. Fungus minimus odoratus capitulo donatus cinereus.

Prunuli vulgo, Cæf.

XXIX. Fungus ramosus: & Imper.

Fungi esculenti decimum nonum genus, Cluf.

Formæ est ab alijs diversæ, qui in tres species, colore inter se differentes, nonnihil etiâ forma, dividi potest: nam parte superna vel flavus, vel dilutè rubescens, vel pallidus albo admixto.

XXX. Fungus digitatus major.

Digitelli genus spectabili magnitudine, ut unus sufficiat, qui in castaneis reperitur, Cæs.

Plinius forte hunc intellexit, cum inquit, mox candidi veluti apice flaminis insignibus pediculis: quos Galenus Amanitas vocat, secundo loco inter innoxios. Lacinia Hermolao dicitur.

XXXI. Fungus candidus digitatus minor. Digitelli (vel Fungi g. genus) Trag. Lon.

Digitelli sive Manninæ vulgo, Cæs.

Hic veluti in parvos digitos filius est.

XXXII. Fungus maximus Ungaricus; multis lacinij squammatum incumbentibus.

Fungi esculenti genus 21. monstruosum, Cluf.

Tanta molis, ut ternos, aut quaternos paciscere possit: sunt qui dicant, nonnunquam tanta amplitudine excrecere, ut bigam facile impleat. Variat colore ex rufo nigricante, vel ex albo nigro, aut multis maculis nigris in albo conspersis notatur. an Gallinacea Neapolitanorum, Portæ: quæ mirabilis formæ & ad eam amplitudinem excrevit, ut brachijs diductis homo vix amplecti possit, pondere sexaginta librarum, ut integro universa familia vesci possit.

XXXIII. Fungus in faxis proveniens.

Fungi è lapidibus, Matth.

Fungorum postremum genus è faxis, Portæ.

Fungus in lapide fungoso Neapoli, Cam. in Matth. ger. Cæs.

Fungus petrosus, Imper.

Ex hoc fungi toto anno enascuntur, si aqua irrigetur etiam domi asservatus, crescit induratus, Cæs. Præciditur ad usum, alius subnascitur semper; novos producit, septem diebus perficitur: sexies anno demetitur: terra dodrante operitur. Asseruntur lapides ex Vesuvio, ex Fageto, ex Pattenio. ex Cargano & celsioribus montium partibus, Joh. Bapt. Porta.

XXXIV. Fungi circa Babyloniam.

Fungi boni saporis, quos etiam crudo Æthiop. comedunt, præter quos nihil aliud circa Babyloniam, quamvis bona & pinguis terra sit, crescit. part. 3. in Orient. c. 5. sed quales?

Fungi noxij.

I. Fungus membranaceus auriculam referens, sive Sambucinus.

Fungus a Sambucum, Trag.

Auriculae J. dæ vulgo.

an Fungus auricularis, Imper.

Fungorum perniciosorum 1. genus, Cluf.

II. Fungus putridus arborum ramis inbecrens, plurimis simul coherentibus.

Fungorum noxiorum genus 24. Cluf.

Triplex est: 1. & 2. interdum simplex, interdum plures: ille ruber, hic egregie rubet & floridus est: 3. corpore rugoso, bini, plerumque terni, elegantiore auri colore præstiti.

III. Fungus in caudicibus nascentis unguit equini figura.

Fungi ignarij, Trag.

Ignarij vulgo Elca, Cæs.

Hic attritu siliu ignem excipiunt.

IV. Fungus ad cutim extergens am aptos. Fungi ignarij species, qua in constrictis prostrigili untur, Cæs.

Fungus fursures capitis depellens, Imper.

V. Fungus acetabulorum modo cavus raliice carens.

Fungi Pezicæ Plinij, Col.

VI. Fungus Hepaticæ saxatilis forma.

Fungi Pezicæ altera species, Col.

An hi duo postetiores perniciosi sint, dubium.

VII. Fungus saliginus lichenis forma variegatus.

Fungorum noxiorum 4. genus, Cluf.

VIII. Fungus ceraforum imbricatim alter alteri innatus variegatus.

Fungorum noxiorum 5. genus, Cluf.

IX. Fungus pannis laceris similis igneus.

Fungus quem ignem sylvestrem vocant, Cæs.

X. Fungi ex eodem pede sed non conspicui numerosi.

an Prunuli, Trag.

Fungorum perniciosorum 2. genus, Cluf.

Varij sunt magnitudine & forma, omnes coloris ex albo pallido & fusco commixti: sub primo nascentes.

XI. Fungus simetarius in plano orbicularis candidus.

Fungorum noxiorum tertium genus, Cluf.

an Prateolis similis, Cæs.

XII. Fungus pileo infernè subrufo aut nigricante, quem aliqui, nec sine periculo edunt, Cæsalp.

XIII. Fungus coryleus orbicularis.

Fungorum noxiorum 6. genus, Cluf.

XIV. Fungus bullinus orbiculatus.

Fungorum noxiorum septimum genus, Cluf.

Triplex est: 1. in metam fucularis al-

terius

fuligine infectus, in summo flavescens: parte cava fuscus, nigris strijs distinctus: 2. nigris orbicularis, superne modo fuscus ex albo pallescens, modo flavus fuligine infectus, maculis albis & nigris asperis, rubetæ colorem refert: inferne albus, strijs subfuscis levibus distinctus: 3. major in plano orbicularis, superius albus, rubore admixto & maculis pallescens asperis: inferne pallidus, fuliginosis strijs distinctus.

XV. Fungus satius candidus pileolo in metam asurgente.

Fungorum noxiorum undecimum genus, Clus.

XVI. Fungus betulaceus orbicularis albus. Fungus ad betulam, Trag.

Fungorum noxiorum octavum genus, Clus.

XVII. Fungus orbicularis ex atro rufescens.

Fungorum noxiorum nonum genus, Clus.

XVIII. Fungus minimus flavescens infundibuli forma.

Fungorum noxiorum decimum genus, Clus.

XIX. Fungus muscas interficiens.

Fungi muscarij, Trag Cord. in Diof. Lon. Tab.

Fungorum noxiorum 12. genus, Clus.

Hujus quinque species: 1. orbicularis, cui supernè color vel pallescens, rubedine & fuligine admixtis: vel lividus & fuligine infectus, maculis albicantibus atro permixtis inspersis: infernè albus, fuscis strijs variegatus. 2. orbicularis, supernè coloribus ex purpura dilutiore & saturatiore, rufo, pallido & albo variè mixtis: infernè pallido, nigris strijs sulcato. 3. ætate variat: emergens Ari radicem imitatur, coloris laterij, maculis albicantibus asperis: adultior, orbicularem figuram acquirit, interdum per latera filis, coloris prona parte rubri, albis maculis infecti: supina albi, cum strijs levi fuligine infectis. 4. junior, minore est orbe, rubro colore saturo, instar concreti sanguinis tincto, maculis plurimis exalbidis asperis: adultior multo latior, rubro colore remissiore tinctus & præter exalbidas maculas veluti intercurrentibus undis, distinctus: 5. junior coloris ex rufo fusci & velut fuligine infecti: adultior, latior in maiore formam asurgens, oris valde laceris, coloris superne ex albo rufo, pallido, fusco mixti & id vel radiatim, vel maculis inspersis: inferne fuliginosis nigris strijs intersecantibus.

XX. Fungus latus orbicularis candidus.

Fungorum noxiorum 13. genus, Clus.

XXI. Fungus latus orbicularis oris intus conversis.

Fungorum noxiorum 14. genus, Clus.

Dux sunt species: magnitudine & supinæ partis colore inter se differentes.

XXII. Fungus pediculo in bulbi formam excrecente.

Fungorum noxiorum 15. genus, Clus.

Duplex est: supernè pallidus, maculis dilutè nigricantibus distinctus & oris deorsum reflexis: internè multis strijs expallido fuscis distinctus: 2. terri coloris est, radices potius fragementum, quam fungus videtur, quod utroque manu vix comprehendere potest.

XXIII. Fungus clypeiformis major.

Fungus alter venenatus clypeiformis olidus, Lobel. belg.

Fungus alius clypeiformis perniciosus, Clad.

XXIV. Fungus clypeiformis minor.

Fungorum alterius generis alter, Dod.

Fungus clypeiformis lethalis, Lob. belg.

Fungus perniciosus vulgaris, Clad.

Alij albi, aut cinereis fuscisve maculis notati, in cavitate nigri: nunc & plani ut acetabula: nonnulli etiam parvis similis.

XXV. Fungus latus oris laceris.

Fungorum noxiorum 17. genus, Clus.

Duplex est: colore superna parte rufo ad nigredinem tendente in medio flavescente: infernè pallido, strijs fuliginosis distincto: 2. colore supernè ex pallescente fuliginosus, venis ex albidis maculosis: pars infima ut & fungi substantia, omnia atra, crassis nigris strijs obscurè apparentibus.

XXVI. Fungus oris laceris & in lacinias divisus.

Fungorum noxiorum 16. genus, Clus.

In hoc triplex differentia occurrit.

XXVII. Fungus parvus, parvi galeri formam exprimens, rufus.

Fungorum noxiorum 18. genus, Clus.

XXVIII. Fungus parvus galericulatus alter flavus.

Fungorum alterius generis primus, Dod.

Fungus parvus lethalis galericulatus, Lob. belg.

Fungus exilis perniciosus vulgaris, Clad.

XXIX. Fungus orbicularis secundum vias & in querecis Autumnum nascens.

Fungorum noxiorum 19. genus, Clus.

Hujus sex species sunt.

1. Supernè coloris ex flavo, rufo, fuliginoso commixti: infernè ex pallido fusci, multis strijs

Aaa 3 exarato,

exarato. 2. amplior est, supernè coloris vel rufi, raris maculis conspersi, vel fusci & fuliginosi inferius pallidi, fuscis maculis aspersis, vel ex fusco omnino pallidi. 3. ex cineraceo fusci coloris, notis quibusdam distincto, lacer & lians. 4. supernè, ex atro rufescens: inferne flavus, maculis parvis aspersis: vel fusco supernè & scissuris quibusdam albis lacero: inferne ex flavo tantum pallescente. 5. supernè tumens & latericea, inferne cinericea coloris, & hic Fungi perniciosi generis 19. species dubia, Clus.

XXX. Fungus tuberis figura.

Fungorum noxiarum 19. species 5. Clus.

Hic ætate variat: junior supernè coloris fusci, inferne rubri futuri & nigricantis, oris flavis: dultior orbicularis, supernè fusci coloris, diluto rubore permixto: inferne ex rubro atro & obscuro: ipsum verò corpus contrafactum cærulei, virescente intercepti est coloris.

XXXI. Fungus cyclamini radicem colore & forma referens.

Fungorum noxiarum 19. generis species 7. Clus.

XXXII. Fung. omnium ampliss. purpureus.

Fungorum noxiarum 19 generis species 3. Clus.

XXXIII. Fung. crassus in metam surrectus.

Fungorum perniciosorum 20. genus, Clus.

Hic quadruplex est:

1. supernè cineraceus, inferne ex flavo pallens. 2. supernè, vel ex pallido fuscus, vel fuliginosus, inferne ochræ colore. 3. rufus: inferne ochræ colore fuligine perfusa. 4. ex rufo & fuliginoso commixti inferne subrufo colore multis strijs fuligin.olis intertecantibus.

XXXIV. Fungus abietinus oris reflexis substantia rubra.

Fungorum noxiarum 21. genus, Clus.

XXXV. Fungi dumetorum ex uno pede prodeuntium.

Fungorum noxiarum 22. genus, Clus.

Quadruplex est:

1. seni aut lepteni orbiculati sed fornicati flavi, macula nigra distincti. 2. octo aut novem coloris flavi, rufo suffusi: inferne flavi, macula nigra distincti. 3. majore est orbe, quindecim aut pluribus ex eodem pede nascentibus, supernè vel rufi, vel ex rufo dilute albescentes: inferne subalbidi, crassis fuscis strijs distincti: quinta species, Clus. 4. turbinato corpore seni aut plures, supernè cineracei ex rufo coloris aut fusci: inferne crassis nigris strijs distincti.

XXXVI. Fungus truncis humi, tanquam innatus, pluribus ex uno pede prodeuntibus. Fungorum noxiarum generis 22. species 3. & 4. Clus.

Hic præcedente multo minor & duplex: 1. viceni & plures ex eodem pede supernè rufi inferne fuscis strijs exarati. 2. triceni & plures colore inter fe varij, vel flavo rufo perfusi, vel omnino rufi & fusci, inferne nigricantes strijs notati.

XXXVII. Fungus orbicularis in palustribus. Fungorum noxiarum generis 23. species quatuor, Clus.

1. orbe tumido eleganter rubro inferne albicans fuscis strijs exaratus. 2. paulo amplior, supernè coloris rufi & ad lateritium tendentis: inferne dilutioris & strijs frequentioribus distinctus. 3. coloris ex albo, rufo & fusco variè commixti. 4. orbe est inæquali, supernè ex cineraceo candidans: inferne etiam, sed fuscis strijs ad extremas oras productis.

XXXVIII. Fungus fœtidus penis imaginem referens.

Phallus, Hadr. Junio.

Phallus Batavicus, Lugd.

Phallus Holandicus, Satoryon trifolium Matthiolo, Ponæ Ital.

Fungus virilis penis arrecti facie, Lob. belg.

Fungus marinus, Dod. belg.

Fungi perniciosi 23. generis species 5. Clus.

XXXIX. Fungus minimus ligneis tabellis areolarum hortorum adnascens.

Fungus minimus *arvorum*, Clus.

XL. Fungus ramosus candidus.

Fungorum noxiarum 25. genus, Clus. at figura habetur hist. ap. alt.

XLI. Fungus ramosus coriaceus.

Fungus borfaro, Imper.

Hujus ad ignem concipiendum apud Neapolitanos usus est.

XLII. Fungus rotundus orbicularis.

Fungorum noxiarum generis 26. species 3. Clus.

Fungus ovatus, crepitus lupi, Trag. Lon.

Fungus orbicularis, Dod.

Fungus glomerata rotunditatis, Lob. belg.

Lupi crepitus, Cast. Col.

Triplex est magnitudine, non nihil etiã forma differens. 1. initio eximij candoris, deinde pallescens tanquam fuligine suffunditur, materiam contrafactus pulverulentum fumum effundit.



Pezicæ Plinij in pratis quem esculentum dicunt, Cæs.

Fungus vesicarius, alijs ovum lupinum, Imper. Fungorum perniciosus generis 26. species 1. Clus.

2. Capitis pueri magnitudine, cute cineracei coloris testis, quæ lacerâ substantiam spongiosam fuliginosam ostendit, quæ compressa pulverem effundit.

an Fungus villosus, Imper.

3. Sola magnitudine à secunda differt.

an Pezicæ genus in sylvestris aliquando humani capitis, quod sine periculo esitatur. Cæs.

XLIII. Fungus rotundus cancellatus.

Fungus coralloides cancellatus, Clus. hist. ap. alt. auct.

Fungus lupi crepitus vulgi efflorescens, Col.

Hunc à priore distinguere non oportet: a quo tamen differt (quem & Clus. & Colum. peculiari figura expressere) quod huic sint radices in fibras divisæ, & quod per medium disrupto veluti florescens speciosum reticulum, vel marsupium reticulatum rubri coloris emittit.

XLIV. Fungus niger culicis figuram referens.

Fungus semiorbicularis niger, Dod. belg.

Fungi lapidei.

I. Fungus lapideus major in Nilo natus.

Fungus faxeus Nili major, Clus. exot.

II. Fungus lapideus minor.

Fungus faxeus minor, Clus. exot.

III. Fungus lapideus forma bubulæ linguæ, Clus. cur. post.

## AGARICUM FUNGUS.

**A**garicus, forte ab Agarra nomen sibi adscribit gentile; nam ut Dioscorides, in Sarmatiæ regione qua Agaria dicitur, gignitur. vel ab Agara, quem & urbem & amnem in Sarmatia vocari tradit Ptolemaeus: & ut Dioscorides l. 3. c. 1. radix fertur Silphij similis, non tamen densa summa facie velut i Silphium, sed tota rarior: sunt qui plantæ radicem esse affirmant: alij ut Fungus ex putredine nasci in arborum caudicibus. Plinio l. 16. c. 8. Gallicarum glandiferarum (iud Larices) maxime arbores Agaricum ferunt: est autem Fungus candidus, odoratus, in summis arboribus nascens, noctu lucens (sabulosum hoc) signum hoc ejus quo in tenebris decipitur. Et l. 25. c. 9. Agaricum ut Fungus nascitur in arboribus circa Bosporum colore candido.

Genera sunt duo Diof. i. e. mas & femina: mas rotundus est & undiq; sui similis: femina præfertur, quæ quidem rectius intus habet pectinum modo venæ & quasi divisuræ. At in præfatione l. 6. Agarici nigri lesbalem vim habent meminit. Sic Plin. l. 25. c. 9. mas crispior amariorq;: femina solutior, mitius dulcis, mox in amaritudinem transit. Mesnes feminam eligit, quia masculus malus sit, præcipue qui longus existit & niger & gravis: debet autem esse album, leve, velociter frabile, porosum & valde rarum: primum dulce, dein amarum & astringens.

I. Agaricus sive Fungus laricis.

Agaricus & Agaricum, Matth. Dod. ut: Cord. in

Diof. Ang. Tur. Lac Lob. Cast. Cæs. Lugd. Tab.

Agaricum larignum, Ad.

Fungus hic Abieri, Piceæ sylv. Tædæ & Larici adnascitur, sed solum Larignus intra corpus usurpatur.

II. Agarico similis fungus diversarum arbo-

rum caudicibus adhærens.

III. Agaricus qui in speluncis montium Helveticarum reperitur.

Agaricus saxatilis, vel Fungus, petræus Lac lunæ incolis à substantia alba & spumosa, Gessn. in fracto.

Lac lunare, Eid. lib. de fig. lapid. c. 2.

Margæ friabilis genus cuidam, ut idem.

## TUBER A.

**T**ubera, quæ radicibus, ut Galenus voluit, adnumeranda vocantur, ut ab imbribus, & olæ à tumore, ab alio tumore. Dioscoridi l. 3. c. 175. Tuber radix est orbiculata sine folijs sive caule, flavescentes, vere effoditur, ac seu crudâ seu coctâ esui apta est. Theophrasto l. hist. 9. Tuberâ radice penis carens. Plinio l. 19. c. 2. Tuberâ undiq; terra circumdata, nulliq; fibrâ mixta, aut saltem capillamentis, &c. cortice induntur, ut plane nec terram esse possimus dicere, nec aliud quam terræ calum.

Genera duo eorum (Plinio l. 2.) harenosa dentibus immixta & altera sicciora: distinguuntur & colore inso nigroq; & iure candido, &c. Sane Tuberum genera duo sunt, quæ magnitudine & colore differunt: majus & minus: majus cuse quidem nigra, sed alteri pulpa candida, alteri pulla (substantia alij notantur) subest: minus colore raso inspidum & gustu injucundum.

I. Tube-

I. Tuberæ Marti. Ang. Cord. in Diofco. Lac.  
I. on. Dod. Cast. Lugd. Tab. Cæf.  
Tuqera terræ; Tab. Ger.  
II. Tuberæ cervina: & I. Lob. belg.  
Fungus cervinus, five Cervi boletus. Matt. Lon.  
Fungi cervini Boleti officin. Cord. in Diofco.  
Boleti cervini orbiculati, Thal.  
Sic dicta quia repertiuntur ijs in locis ubi cer-

vi libidinem suam exercent: quamvis Cerevis  
invenit etiam in præruptissimis montibus  
sylvis, quo ne damæ & rupicapre quidem  
venire possunt, ne dum cervi.

III. Tuberibus similis fructus Indicus  
Fructus sub terra nascens, Monardi & Lugd.  
an Mamæ Brasiliæ norum, apud Lerium præ-  
Ind. Occid. c. 12.

## SECTIO SEXTA.

CARDUUS; CIRSIUM; CNICUS ET ATTRACTILIS; ACAN-  
THAMÆLEON SIVE CARLINA; ACANUS; CARDUUS LACTEUS

Carduus Sphærocephalus; Carduus totentofus; Acantha five Branca Urfina; Solymus  
five Cinara; Carduus Spinofissimus; Dypfacus; Eryngium; Carduus Stel-  
latus; Euphorbium & Anteuphorbium; Tragacantha; Poterium,  
Drypis; Amonis five Rista Bovis.

### C A R D U U S.

**P**lantarum spinosarum divisionem universæ à Theophrasto part. 1. hist. 16. part. 6. hist. 3. & 4. sic expressit.  
Ακανθώδης, id est spinosa, five aculeata alia in totum spinosa, alia non in totum: in totum spinosa, ut  
Cordia, Scorpius: non in totum spinosa φυλλοειδής, id est, quæ folia omni ex parte sic in spinas divisa habent,  
et angenti præter spinas undiq; nihil occurrat, ut acorna, drypis, acanacea. Alia eis ἐν τοῖς κλάδοις ἢ παρὰ κλάδους, id  
est, mucronantur & habent latera angulose dissecta, ut Smilax, Ilex. Alia eis ἐν τοῖς κλάδοις ἢ μὴ παρὰ κλάδους, ut  
Ruscus. Alia sunt ἀκανθώδης in τῶν ἄκρων, ἢ περὶ τὸν ἄκρον, mucronata & infesta pectinim modo, ut  
Cirsium, pinus, picea, cedrus, juniperus. Alia παρὰ κλάδους in τῶν ἄκρων ἢ παρὰ κλάδους, id est, quæ spinas folijs adnatas & mu-  
crone pungunt & lateribus, ut Ilex phellodrys. Alia παρὰ τῶν ἄκρων φύλλοις ἔχουσα, id est præter solum minime  
spinosum tortentia, ut rhamnus, tribulus, ononiu, stabe. Alia in τῶν κλάδων ἄκρων ἔχουσα ἢ φύλλοις ἔχουσα, id  
est, spinas caulibus enascentes habentia, solumq; insuper aculeatum, ut capparis Aegyptia: quadam ἰσχυ-  
ρά, id est, arteū spinu muricata, ut smilax quadam παμολογία, id est, uncinatu arcuatus, spinu ar-  
matu. At Plinius l. 21. c. 15. sic expressit. Spinosarum multa species: in totum spina est asparagus, si orpio. nul-  
lum enim solum habent. Quædam spinosa foliata sunt, ut carduus, eryngium, glycyrrhiza, on. urtica: q; enim  
omnibus folijs inest aculeata mordacitas: Aliqua & secundum spinam habent solum, ut tribulus, ononiu, pbleos  
quod aliqui Staben appellare: bipophas spinu angulosus. Quædam in folio habent & in caule, ut Capparis.  
Tribulus proprietas, quod & fructum spinosum habet. Hæc Plinius.

Verum hic non de omnibus spinosis agemus, sed potissimum de Carduo & Acanaceo: de cæteris inter tri-  
bores & frutes.

### C A R D U U S.

Quemadmodum ἀκανθώδης ἢ ἀκανθα generaliter omnem spinosam denotat: sic & Ἰσχυρά Græcorum, l. a-  
tini Cardium generatim interpretantur. Similiter ἀκανθώδης, etsi herba quædam sit spinosa Theophrasto 6. hist.  
tamen eadem l. 6. c. 4. sic etiam dicitur illud quod in Carduorum genere, velut malum extirbat. Unde quæ  
dicat Acanaceum, spinam Acani genere est. Sic etiam Theoph. 6. hist. 3. illorum quæ folio constant aculeato g. n.  
magna ex parte acanaceum est: acanaceum inquam, quoniam conceptum & id cuius flos inhaeret. aut etiam Ἰσχυ-  
ρά, spina vel spinaceum quidpiam sit.

Carduus in præti humidu vinei  
& avena.

I. Carduus pratensis latifolius.

Carduus pratensis, Trag. Gef. hor. Ad. Lob. ico.

Carduus, limonia forte Theophrasti (conjectu-  
ra ex natalibus sumpta) Gef. hor.

Brassica pratensis, Lon.

Acanthus sylv. Lugd.

Theophr. 6. hist. 3. λαμπρα (Gaza malè Boiss.  
sylvestrem vertit) in genere carduorum  
leatilis folijs constat.

H. Carduus pratensis folijs tenuib.

*Erilichales* Ang. Lugd.

Plin. l. 27. c. 13. *Erilichales* est flore luteo, folijs acanthi.

III. *Carduus pratensis* *Asphodeli radice latifolius*.

*Leucacantha*, Ang.

*Carduus bulbosus* *Montspeliensium*, Ad Lob. ic.

*Cirsio* quinto congener, Clus. hist.

Hujus alteram speciem multis spinis donatam Lobelius notavit.

IV. *Carduus pratensis* *Asphodeli radice*, folijs profundè & tenuiter laciniatis.

*Acanthus* sylv. alter *Dalechampi*, Lugd.

*Jacea aculeata* seu *tuberosa*, vel 4. Tab.

*Jacea tuberosa*, Ger.

V. *Carduus pratensis polycephalus*, sub *Carduo* 6. in *Prodr. descriptus*.

VI. *Carduus palustris*, in *Prodromo* sub 5. descriptus.

VII. *Carduus vinearum repens folio Sonchi*, *Ceanothus*, Theoph. Ang. Lugd. Col.

Theophrast. l. 4. histor. 11. Hujusmodi verbè est etiam *spina* *arundinis* verum non *arundinosa*, neq; *geuiculata* *radix liujus*.

VIII. *Carduus in avena proveniens*

*Carduus sylv. in avena*, Trag.

*Carduus avenarius*, Thal.

*Carduus arvensis*, Tab.

*Carduus muscatus*, Ger.

Alius procerior alius humilior: floribus usque roseis, candidis.

*Carduus mollis*.

I. *Carduus mollis folijs Helenij*.

*Carduus montanus folijs Helenij non spinosus*, Camer.

*Carduus mollis*, Camerarii, Clus. pan. & hist.

II. *Carduus mollis latifolius*, lappæ capitulis, qui 1. in *Prodromo*.

III. *Carduus mollis lapathi folijs*.

*Carduus mollis vel mollior* 2. Clus. pan. & hist.

IV. *Carduus mollis folio oblongo Cirsij capitulo*.

*Carduus mollis* 3. Clus. pan. & hist.

V. *Carduus mollis laciniato folio*.

*Carduus mollis primus*, Clus. pan. & hist.

*Carduus mollis tenuifolius*, Cam.

Flos cæruleus, quandoque albus, interdum purpureus.

## CARDUUS CIRSIIUM DICTUS.

**K** *verum*, quod dolores negat, id est, varicum sedet. *Dioscoridi* l. 4. c. 119. quod hu verbu descriptit: *cane* est tenero, duum servit cubitorum, tri angulari. ab uno folijs rose pusillu circumdato. quæ quidem angulos habent ex intervallu spinosus, sed molles: folijs buglosso similibus, modicè hirsuti, longioribus subcandidu & per extremitates aculeati: est autem pars summa canturo unda & hirsuta, illiq; insident capitula in summo purpurea, quæ in pappos seu lanugines solvuntur. *Cirsium* Plinio l. 27. c. 8. qui eodem serè modo descriptit.

I. *Cirsium maximum* *Asphodeli radice*.

*Cirsium maximum montanum incano folio*, vel 5. Clus. pan. & hist.

II. *Cirsium latissimum*.

*Cirsium*, Dod. gal. Lugd.

III. *Cirsium majus singulari capitulo magno*.

*Cirsium majus*, Lob.

*Cirsium tertium*, Dod. Clus. pan. & hist.

an *Cirsium tertium*, Cæf.

Varia flore, staminibus purpureis aliquando niveis: folijs quæ in eadem planta alia integra sunt, alia profundius dissecta.

IV. *Cirsium majus singulari capitulo magno: vel incanum variè dissectum*.

*Cirsium Anglicum*, Lob. Lugd.

V. *Cirsium singulari capitulo squammato: vel incanum alterum*.

*Cirsium secundum vel Britannicum*, Clus. pan. sub *Carduo* 2. descriptum.

*Anglicum secundum*, Eid. hist.

VI. *Cirsium singularibus capitulis parvis*.

*Cirsium*, Dod. alterum, Ad Lob. an. & Cæf.

*Cirsium tertium & montanum primum*, Clus. pan. & hist.

*Cirsium aliud Dodonæi*, Lugd.

VII. *Cirsium folijs non hirsutis floribus compactis*.

*Cirsium*, Matth. Gesn. hort. Lac. Ad Lob. Cast. Lugd. Eyf.

*Cirsium secundum*, Dod. quartum, vel *montanum secundum*, Clus. pan. & hist.

*Cirsium agri Pisani*, Cæf.

III. *Cirsium angustifolium non laciniatum*.

*Cirsium Pannonicum primum pratense*, Clus. pan. & hist.

IV. *Cirsium angustifolium*, in *Prodromo* sub *Carduo* 2. descriptum.



Atractylis five Cartamus sylv. Trag.  
 Carduus vulgaris, Matth. Lugd.  
 Atractylis vulgaris mitior, Fuch.  
 Carlina sylv. Dod. ut: vulgaris, Clus. hist.  
 Colus rustica, Cord. in Diosc. Gesn. hort.  
 Cnicus sylv. i. Theoph. Atractylis Diosc. Cord.  
 in Diosc.  
 Atractylis media, Gesn. hort.  
 Cirsium luteum Sequanorum, Lob.  
 Carduus vulgarissimus viarum, Eid.  
 Cartamus sylvestris, Lon. Cæs. cui & Cnicum  
 rufum Dioscoridis.  
 Cnicus sylv. prior, Lugd. Atractylis, Eidem.  
 Atractylis, five Cnicus sylv. procerior, Thal.  
 Carduus sylv. & Scolymus Plinij, Dodon. qui  
 flosculos purpureos tribuit.  
 Acarna, Lugd. quoad zico.  
 Carduus & Scolymus sylv. Cam. ep.  
 Heracantha, Tab. Eyst.  
 Carlina sylv. major, Ger.

an Acarna Theophrasti, Acorna Plinij, Col.  
 Vulgaris procerior est: altera quæ rarior &  
 pumila locis montanis reperitur.  
 VI. Cnicus sylv. spinosior polycephalus.  
 VII. Carduus monstrosus figura Cornu-  
 piæ, Imper.

## Atractylis.

I. Atractylis lutea.  
 Atractylis, Matth. Dod. ut: Lac. Adv. Lob. Cast.  
 Cam. Tab. Ger. vulgaris, Ang.  
 Atractylis quorundam, Lugd.  
 Atractylis Theophrasti & Dioscor. sanguineo  
 succo, Col.  
 II. Atractylis purpurea.  
 Atractylis cypria, Ang. Lugd.  
 Atractylis flore purpureo, Dod. Adv. Lugd.  
 Hæc aliquando non pubescit: at Cretica  
 valde lanuginosa est.  
 III. Atractylidi & Cnico sylvestri similis.  
 Calochierni, Belli ep. s. ad Clus.

## ACARNA SIVE ACORNA.

**A**κάρνα Theophrasti 6. hist. 4. aspectu Cnico urbano similis est, colore flavicans, succo pingui. Et Plinio  
 L. 21. c. 16. Acorna colore tantum rufo distinguitur (scilicet à Scolymo) & pinguiore succo.

I. Acarna flore luteo patulo.  
 Eryngium Archigenis, Ang.  
 Carlina sylv. minor, Dod. Ger.  
 Carlina sylv. minor Hispanica, Clus. hisp. & hist.  
 Acarnæ five Sequanorum Cirsij, Carlinæve  
 varietas, Lob.  
 Acarnæ similis Carlina sylv. minor, Lugd.  
 Acorna, Cæs.  
 Carlina sylvestris, Tab.  
 II. Acarna flore purpurorubente patulo.  
 Acanthioides parva Apula, Col.  
 III. Acarna capitulis parvis luteis in umbella.  
 Acarna five Acorna altera Apula, Col.  
 IV. Acarna capitulis globosis.  
 Carlinæ sylv. aliud genus, Clus. cur. post.  
 V. Acarna humilis caule folioso.

Picnoms Creticæ Salonenfis Galloprovinciæ,  
 Adv. Lob. Lugd.  
 Chamæleon niger, Tab. Ger.  
 Eandem suspicor cum sequente  
 Acarna Valerandi altera, Lob. Lugd. Tab. Ger.  
 VI. Acarna major caule folioso.  
 Chamæleon niger Salmaticensis, Clus. hisp. &  
 hist. Dod. Ger.  
 Chamæleon Salmaticensis, Lob. Lugd.  
 Chamæleon Hispanicus, Tab.  
 VII. Acarna major caule non folioso.  
 Acarna Theophrasti, Ang. Lob. Lugd. Tab. Ger.  
 VIII. Acarna minor caule non folioso.  
 Leo, Carduus ferox, Dod.  
 Phoenix, Leo, Carduus ferox, Lob.  
 Carduus ferox, Lugd. Tab. Ger.

## CHAMÆLEON SIVE CARLINA.

**X**αμῆλεον a foliorum varietate dicitur, Dioscoride & Plinio testibus: at ille de nigro, hic verò de utroque  
 testatur: eo quod cū terra colorē muret: hic enim viridia, illic albicantia, alicubi carnica, nonnusquam  
 rufa conveniunt, Dioscoridi: at Plinio hic niger, illic virida, alibi crassius, alibi croceus atq. alij coloribus.  
 duplex est Dioscoridi l. 3. c. 10. & 11. albus & niger, albus ideo isia dicitur, quod quibusdam locis  
 ipsius adies invenitur: At Plinio l. 22. c. 18. Chamæleonem isiam vocant (de utroque intelligens) & croceus  
 eius, candidior, &c. & sub ali foliorum signi asserit, quo mulieres etiam pro mastiche utuntur, utroq. memento.  
 At Guiland. Chamæleonem & isiam Dioscoridi lib. 6. qui inter venena recenset. plantas diversas facit.

Et Theophrasto 9. h. 13. una candida, altera nigra. Verum utem Gaza reddit. Dioscori non promittit, verum ex medio spinarum echino maritimo aut spinaria caulem erigit, floribus purpureis. Plinio serpit in terra, echini modo spinas erigens. Et Theophrasto capite est magno Acano simili. Nunc plures Acanum vocant. At niger caulem habet dodrantalem qui umbellam gerit, floribus albis. Belli emulsi & verticilloribus. Verum Plinio duplex est: ex nigra, ferit, a quo maxime Acanus purpureus esset. & seminam cui violaceus. Una nunc canent cistali, &c. Carlina vero quae in pascuis credatur hanc herbam Carolo magno ab Angelo demonstrata. Nunc, tanquam certum, non potest ab exercitu suo propulsandam.

I. Carlina acaulos magno flore.  
Eberwurts/ id est apriradix, Brunf.  
Carduus panis seu pacis. Ericio Cord.  
Chamaeleon albus, Matth. Cord. in Diosc. Lac.  
Cast. Lugd.  
Ixine Theophrasti, Ang.  
Helxine Pliniana, Eid.  
Spina arabica, Dod. gal.  
Cardopatium caule nullo, Gesf. hort.  
Carlina herbariorum, Adv. Lob. ob.  
Chamaeleon albus Dioscoridis, Guil. pap. Lob.  
ico. Clus. hist.  
Carlina humilis (vel altera) Dod. Col.  
Carlina vulgo, Cæf.  
Carlina festivi flore, Cam.

Flore est albo: est & purpureo.  
II. Carlina caulescens magno flore.  
Chamaeleon niger vulgaris, Trag. Eyf.  
Chamaeleon niger alter, Matth. Lugd.  
Chamaeleon, Lon. niger, Lac.  
Chamaeleon albus Fuch.  
Leucacantha, Dod. gal.  
Cardopatium flore albo caulem habens, Gesf. hort.  
Carlina sive Leucacantha, Dod.  
Chamaeleon albus caule donatus Lob.  
Crocodilium, Carlina caulem habens. Lugd.  
Carlina major, Clus. pan. elatior Eid. hist.  
Carlinae alterum genus, Cæf.  
Carlina caulescens, Cam. ep. & hort.

Carlina vulgaris caulem emittens, Cam.  
Flos albicans, rari. Inter rubellos.

Hanc aliqui a pascuis nihil distant certum  
nisi quod caulem proferat. alij negant. & in  
priori congener est.

III. Carlina acaulis gummifera.  
Chamaeleon albus gummi, ut in multis flos.  
Belli ep. 1. ad Clus.  
Chamaeleon albus Apulus purpureo flore gummifer, Col.

IV. Carlina acaulos minore purpureo flore.  
Chamaeleon albus seu exiguus, Trag.  
Chamaeleon parvus, Lon. exiguus, Lugd.  
Carduus acaulis septentrionalium & Chamaeleon albus Cordi, Lob.  
Carlina minor purpureo flore, Clus. hist.  
Chamaeleon septentrionalium exiguus & parvulatus, Col.

V. Carlina polycephalos albus & septentrionalium altitudinem excelsit, cuius filia superius candida sunt. apud Helveticos in pascuis provenit.

VI. Chamaeleon niger umbellatus flore caeruleo hyacinthino.  
Chamaeleon niger, Matth. Cast. Lugd.  
Chamaeleon niger Dioscoridis, Ang. Marathæ, Adv. Lob. Cam. Col.  
Chamaeleon niger Coitus, Dod. verus Dalgchamp. Lugd.  
Crocodilium, Tab.

## A C A N U S.

DE Acano apud antiquos pauca reperiuntur, fortasse quia vulgarissima planta, omnibus hominibus nota describere superfluum visum fuit: à qua reliqua spinarum genera Acanthea derivantur. Apud Theophrastum 1. h. 6. Acanthos inter quoddammodo recensetur: & 6. h. 1. alia spinarum genera constant, ut Anacardium, & spinosum, &c. Guiland. in pap. Ixina à Theophr. altera spinosa quam vocem & Carduium pineam Gaza exposuit Plinius lib. 22. cap. 9. Sunt qui Anacardium & Carduium ascribant, spinosam brevem, ac latam herbam spinosam, latioribus.

Carduus latifolius echinos obsoletæ purpureæ flos.  
Acanus, Anguil. Lugdun.

Agavanus Cretensium, fortè Acanus Theophrasti, Honor. Belli epistol. 1. ad Clus. & Ponæ Ital.



## SILYBUM SIVE CARDUUS LACTEUS.

*Summa Diofcoridi lib. 4. cap. 139. Spina est lata folijs Chamæleonis alio simili. Plinio lib. 22. cap. 22. Silybum Chamæleonis alio simile aque spinosum.*

I. Carduus albis maculis notatus vulgaris.  
Carduus albus & Chamæleon, Brunnf.  
Carduus Mariæ, Trag. Fuchico Gefn. hor. Lon.  
Caff. Ger. vulgaris, Cam.  
Carduus lacteus, Matth. Lugd.  
Spina alba, Dod. gal. Lac. hortensis, Fuch.  
Silybum Ang. A. & Lob.  
Carduus Martini, Cord. in Diofc. Tab.  
Leucacanthos, Lac. Cornaro.

Carduus leucographus, Dod.  
Leucographis Plinii, Lugd.  
Cardui sylv. aliud genus & Acanon Theophrasti, Cæfalp.  
II. Carduus albis maculis notatus exoricus.  
Carduus lacteus Syriacus, Cam.  
Carduus lacteus vel Bedeguar Arabum, Ravvolff.  
Aga Cretensium nomine, semen accepimus.

## CARDUUS SPHÆROCEPHALUS.

I. Carduus Sphærocephalus latifolius vulgaris.  
Chamæleon verus, Trag. niger, Fuch.  
Spina alba altera, Matth. (at in prima edit. & ep.  
Spina alba) Spina alba putata, Cam. ep.  
Spina incognita, Fuch. ico.  
Spina peregrina, Dod. gal.  
Carduus Sphærocephalus, Cord. hist. Dodon.  
Tab. Eyll.  
Echinopus, Gefn. hort.  
Crocodilium, Lac. Adv. Lob. ob.  
Ritro five Rutro Theoph. Lob. ico.  
Chalceos, Lugd.  
Terralix spinosa, Lugd.  
Silybum, f.ugd. desc.  
Spina alba: item Arabica, Lugd.  
Ruthrum alterum, Eid.  
Sphærocephalus annuus, Cam.  
Carduus globosus, Ger.

Fructus est pilæ modo rotundo, flore candido vel cæruleo, vel ita minoribus in medio cæruleis.  
*Καρδιον* Diofcoridi lib. 3. c. 12. Chamæleonis nigri figuram habet: nascitur in sylvis, radice longa, levi, aliquantulum lata, odore ut nasturtij acris. Idem Plinio l. 27. c. 8. qui radicem scribit longam, æqualiter crassam, odoris asperius.  
*Χαλκεος* (Æraria Gaza vertit) apud Theophrastum & Plinium esse volunt, cum tamen eius hist. 3. apud neutrum extet: Sic Theoph. 6. lib. 3. inter natura spinosus Chalceos, quæ cum non in aculeatis folijs constat: Et Plinius l. 2. c. 25. Item acarna, leucacanthos, chalceos, & in folijs non habent aculeos.  
*Τριανταφυλλον* cum reliquis aculeatis plantis

enumerat Theoph. 6. hist. 3.) inquit, à quibusdam vocata ætate florer: Et Plinius l. 21. c. 16. quædam ætate florent ut Terralix. Sed non est confundenda cum Erica, quam Athenienses Terralicen vocant, eodem l. 11. c. 16. auctore.  
*Ἀκανθιστός* five Spina alba, folia fert Chamæleonis albi, sed angustiora & candidiora, aliquantulum his fura & aculeata: caulis bicubitalis candicans, & in cacumine capitulum spinosum, echini marini æmulum, at minus & oblongum: flores purpurei, in quibus semen seu Cnici, sed rotundius. Diofcorides lib. 3. c. 14. & Plinius l. 25. c. 12. cui Spina alba dicitur.  
*Καρδιον ἀραβικόν*, Spina Arabica, natura spinæ albae similis esse creditur, Diof. l. 3. c. 15. & Plinius l. 25. c. 12. Spinæ Arabicæ vires recenset.  
*ῥιτρον*: Theophrastus 6. hist. 3. hæc solum habet alia superiùs cacumine tantum ramos spargunt, quædam modum Ruthrum. Sunt tamen qui velint mendosè pro *ῥιτρον* apud Theophrastum legi, quod ex Pliniana l. 21. c. 16. loci illius Theophrasti interpretatione colligitur, cum ibi non Ruthrum sed Eryngium legatur.

Hæc lubuit aspergere cum huic & sequentibus, hæc nomina à quibusdam tribuantur: at verborum brevitatis obstat quo minus certi quid statui possit.

II. Carduus Sphærocephalus cæruleus minor.  
an Ritrum five Rutrum Theoph. Ang.  
Ritro floribus cæruleis, Adv. Lob.  
Carduus sphærocephalus; Dod. Lugd.  
Crocodilium Monspeliensium Dalech. Lugd.  
Ruthrum Theophrasti, Eid.  
Spina alba putata flore cæruleo, Cam. ep.

III. *Carduus sphærocephalus capitulo longis spinis armato.*

*Spina alba*, Ang. Adv. Lob.

*Cardus sphærocephalus acutus*, Dod. Lugd.

an *Sphærocephalus maximus*, Cam.

Hujus major & minor species sive 2. & 3. Dodon. & Lugd.

IV. *Carduus sphærocephalus minimus acutissimis folijs.*

*Carduus Sphærocephalus* 4. Dod. Lugd.

V. *Carduus capite rotundo tomentoso.*

*Carduus eriophorus*, Dod. Clus. 216. & 217. Cam. Lugd. desc.

*Carduus tomentosus* & *corona fraccum*, Linn. *Acanthium montanum* Dalech. Lugd.

*Jacea lutea*, Clusij, Lugd. ico.

*Onopordon*, Lugd.

*Spina alba*, Cæf.

Flore est purpureo, interdum albo.

*Onopordon* Plinius lib. 27. cap. 12. si com-  
asini, crepitus reddere dicunt: de hoc idem

statut Dalechampius.

## CARDUUS TOMENTOSUS CAPITULO LATIORE.

I. *Carduus tomentosus capitulo majore.*

an *Spina Arabica*, Ang.

*Carduus tomentosus*, Adv. Lob. ico.

*Spina Arabica* Dioscoridis & Plinij, Matthiol. emend. & Cæf.

II. *Carduus tomentosus capitulo minore.*

*Spina alba*, Matth. Cast. altera, Matth. Lugd.

*Carduus sphærocephalus quintus*, Dod.

*Spina alba altera*, Cæf.

Hujus folia aliquando maculis albis notantur.

III. *Carduus tomentosus capitulis minoribus aculeatis.*

*Carduus aræophyllos* Dalechampij, Lugd.

IV. *Carduus tomentosus capitulis eodem modo aculeatis.*

*Leucacantha* Monspeliensium Dalech. Lugd.

## A C A N T H I O N.

**A** *Carduus* Dioscoridi l. 3. c. 18. folia gerit spina alba similia, in summo verò eminentias aculeatas aram-  
lanugine obductas, è qua collecta texta, vestes bombyciniù similes fieri ajunt. Plinius l. 25. c. 12. *Spina*  
alba similis est spina illa, quam Græci *Acantion* vocant, minoribus multo folijs, aculeatu per extremitates  
aratusa lanugine obductu, qua collecta etiam vestes bombyciniù similes sunt in Oriente.

*Carduus tomentosus latifolius.*

I. *Spina alba tomentosa latifolia sylvestris.*

*Spina alba* 3. Trag.

*Spina alba* sylv. Fuch. Lon.

*Acanthium*, Matth. Dod. ut; Ad. Lob. Cast. Cam.

Lugd. qui Matth. & Fuch. figuram exhibet.

*Onopordon Athenæi*, Ang. Gesn. hort.

*Onogyros Nicandri*, Eidem.

*Acanthium* vulgare, Tabern. flore albo & flore purpureo.

*Acanthium album*, Ger.

*Silybum* sive *Leucacantha Loniceri*, Lugd. ico.

*Carduus sylvestris*, Cæf.

Floribus communiter purpureis, aliquando albis: hinc duæ figuræ apud Tabernæmont. & Gerardum.

Hæc duplex: altera folijs latioribus densa lanugine: altera angustioribus, tenuiore lanugine obfita, & in hac capitula majora & innocentioribus spinis horrentia: hinc apud Dodonæum figuræ duæ, altera Lobelij, altera Fuchij.

II. *Spina tomentosa altera spinosior.*

*Acanos* forte Bellonij.

*Onopordon*, Dod. Cam. Tab. cui 1. & 2.

*Acanthium Illyricum*, Adv. Lob.

*Onopyxus* 3. Dalechampij, Lugd.

*Carduus viarum*, & *Card. viarum fl. albo*, Cam.

*Acanthium sylv. flore albo*, Eyf.

Floris color ut prior variat: hinc duæ figuræ apud Tabernæmontanum & Gerardum.

III. *Acanthium peregrinum*, Tab. quid? *Solstitialis lutea peregrina*, Ger.

## A C A N T H A SIVE BRANCA URSINA.

**A** *Καρδαία ἰσχυρά* (quasi serpens spina) Dioscoridi l. 3. c. 19. folia habet lætuceu latiora minus  
giora, eruca divijura, nigricantia, pinguis ac levia: caulem lævem, binum cubitorum, d. 2. 1. 1. 1. 1.  
Judith, prope verticem ex intervallu foliorum quibusdam ceu atreolus circumdatum oblongu hyacinthi

quæ in folijs prodest. Semen oblongum ac luteum: caput vero hirsutis speciei: radices subiacem viscosæ, mucosæ, & ac longæ. Plin. l. 22. c. 22. Acanthos est topiaria & urbana herba, elata longæ, folio crepidines marginibus, ensium, pulvinorum soros vestiens. An hoc sit Acantha apud Theophr. 4. h. 11. inter herbas, quam Galenus ait verum de qua nonquit: pari modo & spinosa qua Ceanothos (αἰνάνθος) appellatur, ut Cyperrum latere, quod ab his Paderora vocant, alij Melanphyllum.

Genera duo sunt, est sativa & sylvestris: de hac Dioscorides l. 3. c. 20. est & sylvestris Acantha, carduo firmius aculeata brevior sativa: & Pharus l. 6. duo genera ejus sunt, aculeatum & crispum, quod brevius: alterum latere, quod ab his Paderora vocant, alij Melanphyllum.

I. Acanthos sativus vel mollis Vergilij.  
Acanthus, Matth. Cord. in Diosc. Lac. Lou. Cast.  
Cæf. lævis, Eysf.

Acanthus verus, Trag. (cui & Branca ursina Italica vera) Fuch. Cam.  
Acanth. sativ. Dod. ut: Gef. h. Ad. Lob. Lug. Tab.  
Branca ursina Italorum, Guil. epist.

Et plantæ succo glutinoso & quasi mucoso quidam gummi Tragacanthæ æmulum faciunt.  
II. Acanthus aculeatus.

Acanthus sylvestris, Dodon. spinosus, Eysf.  
(Ger. Acanth. syl. Scolymo similis aculeat., Diosc. Lgb.  
Chamaeleonta Monspeliensis, Lob. ico.  
Branca ursina aculeata, Lugd.

### SCOLYMUS SIVE CINARA.

Σκολυμος Dioscoridis l. 3. c. 16. folia habes Chamaeleonis & Leucacantha, at nigriora & crassiora. caulem edidit longum, folijs obstrum, in quo capitulum est spinosum: radix crassa nigra. Plinio l. 19. c. 7. Carduus dicitur, ubi & maxime in questus esse testatur, & ferendi modum describit. N. gl'ius, Trallianus: Κινάρα, Galeno de alimentis. Cinara (a cinere quo stercoreari amat) Columella & Palladio.

Genera: sativus est qui folijs est spinosis & non spinosis: est & sylvestris, qui videtur esse apud Theophr. 8. h. 1. 4. Κέντριν nuncupatus. Castus, inquit, statim a radice caules repentes in terram mittit, folio lato arg. spinoso: caules hos Cassos appellant, de quibus cibis idonei: ut fructum in quo semen spinata specie est, &c. Es Plin. l. 21. c. 16. Cassos in Sicilia tantum crescit, sua proprietas & ipsa, cujus in terra serpens caules a radice emittit, la'o folio & spinoso. caules vocant cassos, &c.

I. Cinara hortensis folijs non aculeatis.  
Cardui alterum genus, Trag.  
Carduus non aculeatus, Matth.  
Cinara, Dod. gal. l. acun. Eysf.  
Scolymus non aculeatus, Aug. Tab.  
Carduus hortensis Gef. hort.  
Carduus aut Scolymus non aculeatus, Lon.  
Cinara non aculeata. Matthioli & Dod. Lugd.  
Carduus sativus, Gef.  
Cinara seu Artischochi vulgarior, Eysf.  
Carduus hortensis non spinosus, Cast.

laminis interdum sponte sese recludentibus, interdum atctius compactis: capitum squamæ nunc virides, nunc pallentes, nunc subrubentes in aculeum desinentes, nunc brevem nunc roburium, nunc infirmum, eumq; in alijs sursum erectum in alijs deorsum inclinatum, nunc propenullum. Est quædam capite maximo, quæ dicitur & pingitur sub

II. Cinara hortensis aculeata.  
Scolymus, Trag. Fuch. Cord. ut: Gef. hort. Ad. Lobel.  
Carduus hortensis folijs spinosis, Gef. hor. Cast.  
Cinara aliud genus, Dod. gal.  
Carduus, Lac. Tur. sive Scolymus, Lon.  
Carduus altiss., Lugd.  
Scolymus Dioscoridis, Clus. hist.

III. Cinara maxima Anglica, Lob. ico. Ger. Scolymo majore, Tabern.  
Scolymus seu Cinara maxima, Eysf.  
Additur in horto Eysf. tetenti

Cinara major Boloniensis quod è Polonia allatum, folijs est minus aculeatis. Item  
Cinara Genuensium, squamis circa latera inæqualibus & aculeo infirmo.

IV. Cinara spinosa cujus pediculi elisantur.  
Carduus aculeatus, Matth.  
Cinara spinosissima, Scolymus Dioscoridis, & Castus Theophrasti, Ang.  
Castus Matthioli, Lugd.  
Cardones, Cæsalp.

Scolymus aculeatus, Tabern.  
Carduus hortensis, quem Cardum vulgo, Cam.

Folio.

Utamq; qui eandem fecerit non repugnabimus: quia folijs est aliquando aculeatis, aliquando mitibus: Sic caput nonnunquam in gracilescem metam erigitur: nonnunquam in compresiore & rotundiorum globum extuberat,

Foliorum pediculi terra obruti candidi, a cute emundati, hyeme crudi cum sale & pipere in cibos veniunt: & licet capitulis sint spinosissimis, longissimis aculeis armatis & vix vescis, colitur tamen, ut Rolones teneri gulę arrideant.

V. *Cinara sylvestris latifolia*.  
*Scolymus sylvestris*, Ad. Lob.

*Scolymus Diolcoridis*, Lugd.

VI. *Cinara sylv. Cretica*.

*Agriocinari*, Belli ep. 2. ad Clus.

*Agriocinara Cretica*, Ponæ Ital.

an *Cynara sylv. Bœtica*, Clus. cur. 200.

*Echini* licet spinosissimi antequam maturi & crudi & elixi esitantur.

## CARDUI ALIQUOT EXOTICI.

I. *Melocactus Indicæ occidentalis*.

*Echinomelocactus*, Ad. Lob. icon. Clus. ex. lib. 4. cap. 24.

*Melocarduus echinatus* Penz., Lugd. Tab. Ger.  
*Melocactus*, Eysf.

Ex melone, pepone & carduo coaluisse videtur.

II. *Carduus Guyavenis*.

*Spina* ex Guyava ex cardui capite detracta,  
Clus. exot. l. 2. c. 6.

III. *Carduus spinosissimus brachiatis* ex Hispaniola.

*Pithaja*, Card. de variet. Gesf. hort.

*Carduus pithaya* Oviedii, Lugd.

Hujus fructus esitatus, urinas sanguini similes non secus quam *Ficus Indicæ* fructus causat.

IV. *Carduus Insulæ Madagascar.*

*Cardui* cuiusdam elegantissimi caput sub fructu 15. Clus. exot. l. 2. c. 15.

V. *Carduus Brasilianus folijs Aloës.*

*Nanas Theveti*, Lugd. Clus. Garz. & par. 3. Americ. epist. 1. de Brasili.

*Strobilus* sive *nux pinea*, Monard.

*Ananas Acoftæ*, Lugd. ap. Cast. & par. 4. l. 1. cap. 5. fig. 14.

*Ananas*, *Ananasa*: *Brasilianis*, *Nanas*: *Hispaniolæ*, *Jajama*: *Hispanis*, *Pinas*, cujus duo generas & fœmina, par. 6. Ind. Or. c. 38.

*Pineæ nucs* in America, Joseph. Acoftæ lib. 4. cap. 19.

*Pineæ* in arbusculis, Benzoni lib. l. c. 28. vel par. 4. Ind. Occid.

*Ananas optimus Americæ fructus*, qui *Pinnacous Brasilianis*, Lerio cap. 12.

*Aizoi* majoris ortu perlimilis exotica planta, Lob. icon.

*Aberas* nomine fructus *Francofurti* vena lis fuit.

*Species* hujus tres secundum Oviedum: prior *Jajama*: altera *Bonjama*: tertia *Jajagua* dicitur.

VI. *Carduus Brasilianus sylvestris*.

*Ananas sylvestris*, Acoftæ, Lugd. Cast.

VII. *Carduo Ananæ similis*.

*Hoyrii*, *Theveto*.

## SCOLYMUS THEOPHRASTI

Σκόλυμος Theophrasto 6. bistor. 4. (*Carduus à Gaz. a vertitur*) sive *Limonia* inter *Acanacea*, folijs confinis aculeatu: pulchre diu flores, &c. radix lacteum succum emittit: florū quoq; proventus peculiaris videtur: etenim circa solstitium incipit: carnosam ciboq; idoneam partem crassefcentem sortitur: ortus autem ejus non spinosus, sed oblongus fieri assolet, &c. Plinio lib. 21. cap. 16. *Scolymus* floret sero & diu, *Carduerum* generis, ab his distat, quod radix ejus vescendo est, decocta: mirumq; quod sine intervallo tota æstate aliud in eo genere, aliud concipit.

*Scolymus chrysanthemus*.

*Eryngium Vegetij*, Ang. Cam.

*Ascolimbros*, Bellonio.

*Scolymus Theophrasti*, Clus. hisp. Ad. (& *Eryngium luteum* Monsp.) Lob. Cæs. Lugd. Taber. Camer.

*Carduus chrysanthemus*, Dod. Ger.

*Atractylis marina*, Lugd.

Variat ratione loci: qui circa *Monspelim* provenit magis luxuriat, ramis latius sparsis &

longioribus: cujus folia lacteis maculis notata sunt: florib' est paucioribus, quam in ea planta quam Hispania profert: hinc duæ icones: *Deodonæo* & *Clusio* in sua historia proponuntur: illa quidem nomine

*Scolymi Theophrasti Narbonensis*, Clus.

*Cardui chrysanthemii* alterius figura, Dod. Ger.

*Scolymi Theophrasti Hispanici*, Clus.

*Cardui chrysanthemii*, Dod.

## CARDUUS SPINOSISSIMUS.

**O** *Ninivæ* à Theophrasto 6. hist. 3. & à Plinio l. 21. c. 16. inter spinosas stirpes numeratur (natura, inquit Theophrast. spinosus est) Buxum asininum Gaza vertit, quod sit carduus asinis in cibo gratissimus.

I. Carduus spinosissimus latifolius sphærocephalus vulgaris.

Scolymus, Dod. gal.

Carduus asininus, Gef. col.

Carduus sylvestris primus, Dod.

Onopyxus Dodonæi, Lugd.

II. Carduus spinosissimus sphærocephalus rigidus aculeis armatus.

Cujus semen Cardui Arabici nomine missum fuit: excrevit caule crispo cubitum superante, folijs latis, longitudine palmum excedentibus per caulem rarioribus: capite est rotundo superne æquali, spinis oblongis atrociter pungentibus armato: flore albo odorato: in cujus lanuginoso capitulo semen continetur striatū & transversim canaliculatum, caucalidis Hispanic. fere modo sed rudius & crassius. Hortis facile assuescit.

III. Card. spinosissimus angustif. vulgaris. Agriacantha, Ruellio.

Carduus sylv. tertius, Dod. ut:

Aculeosa Gazæ, Ad.

Carduus spinosissimus vulgaris, Lob.

Polyacanthos Theophrasti, Lugd. Tab.

Onopordon, Gerard.

IV. Carduus spinosissimus capitulis parvis aculeatus.

Onopyxus alter, Lugd.

V. Carduus spinosissimus segetibus frequens.

Carduus avenarius, Lonc.

Drypis, Lugdun.

Capitulis est ut in Scolymo echinatis. flore alias purpureo, alias candicante, alias puniceo.

VI. Carduus lanceatus latifolius.

Carduus lanceolatus, Tab. Ger.

II. Carduus lanceatus angustifolius: qui pro 4. in Prodomo describitur.

VIII. Carduus vertice corticofo.

Carduus chondrilloides Dalechamp. Lugd.

## DIPSACUS SIVE CARDUUS FULLONUM.

**Δ** *Idem*, id est, sitibundus, nomen à contrario invenit: quoniam ut Dioscorid. l. 3. c. 13. monet, alarum sinu concavo rorem vel imbrem recipiat, quo velut ad sitim injuriæ abigenda abutitur. Latini, Labrum Veneris, à foliorum carinato habitu, que se ambage anfractuosa sinuantia pelvis speciem constituunt, & intra se humorem continent. Caulem habet, inquit Dioscorides, altum, spinis horridum, & folia caulem amplectentia lala. fluca foliorum amula, bina in singulis geniculis aculeata, &c. in cacumine caulis, singulis surculis, singula capita in sunt echino similia, oblonga aculeata, que divisa in nedulla vermiculos ostendunt, &c. Plinius l. 26. c. ult. Labri Veneris meminit, at non descripsit: quare dubium an Dipsacum intellexerit. At l. 27. c. 11. Gale dragon Xenocrati vocasse videtur, sic describens: leucacantha similis, palustris & spinosa, caule serulaceo, alto, cui summo caput inhaeret simile ovo: in hoc crescente etate vermiculos nasci tradunt, &c.

Genera: duplex est, Sativum & sylvestre: hic major & minor:

I. Dipsacus sativus.

Carduus fullonum sativus, Trag.

Labrum Veneris, Matth. Cord. in Dioscor. flore candido, Cæf.

Dipsacus hortensis albus, Fuch.

Gale dragon Xenocratis, Anguil.

Dipsacus sativus, Dod. ut: Cord. hist. Gef. hort.

Gerard.

Dipsacus sativus fullonum, Ad.

Carduus fullonum, Lob. & an Spina Selenitis

Theophrasti, Guiland.

Dipsacus sive Labrum Veneris, Lugd.

II. Dipsacus folio laciniato.

Dipsacus secundus, Tab. syl. Ger.

III. Dipsacus syl. aut Virga pastoris major,

Carduus fullonum, Brunf.

Carduus fullonius erraticus, Trag.

Labrum Veneris alterum, Matth.

Dipsacus Lac. Lon. Tab. purpureus, Fuch.

Dipsacus sylv. Dod. ut: Tur. Cord. hist. Gef. hor.

Thal.

Labrum Veneris, Cord. in Dioscorid. Ad. Lob.

sylv. Cæf.

Labrum Veneris flore purpureo, Cæf.

Dipsacus sativ. alter. & Dipsacus syl. major, L. g.

IV. Dipsacus syl. capitulo minore, vel Virga pastoris minor.

Cardui fullonij tertium genus, Trag.

Ccc

Virga

Virga pastoris, Matth. Ad. Lob.

Dipfacus 3. & Galedragon Plinij, Dod. ut:

Dipfacus minor, Gef. hor. Thal. syl. minor, Lug.

Virga pastoris & Dipfacus fatuus, Cam.

Molybdena Plinij, vulgo Dipfacus secundus

capite rotundo, Dalech. in Plin.

## ERYNGIUM SIVE IRINGUS OFFICINAR.

**E**ρύγγιον ἢ ἰρύγγιον Græci Philosophi Eryngium, quasi ἰρύγλα, id est, ructum, dictum putant, quod capra quæ morsu surculum Eryngij præciderint, vel deglutiverint, cunctum gregem pone sequentem quasi stupore attonitum sistunt, donec Eryngium ructu rejecerint. Eryngio Diosc. l. 3. c. 24. folia lata sunt & extremo ambitu aspera, & ubi angescunt circa complures caulium eminentias in spinas aculeantur, in quorum summis atib. glabrosa sunt capitula, spinarum acutissimarum durarumq; ambitu stellatim circumvallata: radix oblonga, & c. Plin. l. 22. c. 7. Erynge & Eryngion, dura fruticosa, spinosis folijs, caule geniculato, cubitali & majore aliquando, alia albicans, alia nigra, radice odorata: & c. seq. ex his candidam nostricentum capita vocant. Sunt qui velint apud Theophrastum 6. hist. 3. φύβον mendose pro ἰρύγγιον exaratum esse, quod ex Plinio colligatur.

Genera: Dioscorides unius quidem meminit: sed capitulum colore alii viridem, nunc pallidum, alii albidum, interdum caeruleum inveniri scribit: & Plinio sativum est: est & sponte nascentem in aspera: & in litorebus maris durior nigriorq; folio apij.

### I. Eryngium maritimum: & Gef. hor.

Eryngium marinum, Matth. Dod. ut: Ang. Tur.

Ad. Lob. (cui & Acanos Plinij) Cast. Lugd. Cæs.

(cui & Crocodilium Dioscoridis & Plinij) Camæer. Clus. hist. Eyst.

Glyzyrrhiza spinosa, Lacun.

Eryngium rotundo folio, Colum.

### II. Eryngium vulgare: & Cam.

Eryngium primum, Trag. Lon.

Eryngium montanum live campestre, Matth.

Cast. Lugd.

Eryngium, Fuch. Ang. Lac. Cord. in Diosc. Cæs.

Tab. vulgare, Dod. gal.

Eryngium mediterraneum, Turn. Gef. hor.

Gerard.

Eryngium campestre, Dod. Cast. vulgare, Clus. hist.

Eryngium campestre mediterraneum, Ad. Lob.

### III. Eryngium montanum amethystinum.

Eryngium caule & flore caeruleo, Ang.

Eryngium aliud in montibus, Cæs.

Eryngium totum caeruleum, Cam. hort. Eyst.

Eryngium montanum caeruleum, Ad. Col.

Interdum tota planta est coloris saturate caerulei, aliquando solum pars superior: cujus etiam pumila species, Camerario monente.

### IV. Eryngium montanum pumilum.

Eryngium pumilum, Clus. hisp. & hist. Dodon. Lugd. Tab. Ger.

### V. Eryngium montanum minimum, capitulo magno.

Carduncellus montis Lupi, Ad. Lob. ico.

Carduncellus Penæ, sive Cardui minimi species, Lugdun.

VI. Eryngium alpinum caeruleum, capitulis dipfaci.

Eryngium alpinum, Gef. ho. caeruleum, Eid. col.

Eryngium magnis latifolij; capitulis, Gef. hor. ap.

Eryngium alpinum caeruleum, Ad. Lob. ico. Tab.

Eryngium montanum tenuifolium ambitu profundè sinuatum, Lob.

Eryngium planum Matthioli, Dod. ico.

Eryngium aliud montanum Dalechamp. Lug.

Spina alba Dalechampi, Eid.

Herba peregrina folijs acanthi, Cæs.

Eryngium capite dipfaci, nobile dictum Gef. nero, Cam.

Eryngium spurium primum, Ger. ico.

VII. Eryngium latifolium planum.

Eryngium planum, Matth. Cast. Lugd.

Eryngium spurium primum, Dod.

Eryngium pannonicum latifolium, Eyst. Clus.

pan. latifolium primum, Eid. hist.

Eryngium caeruleum, Ger. 1. & 2. Tab.

Flore est caeruleo: est & albo: caulis in illo purpurascens, in hoc ex viridi pallescens: à priore differt potissimum capitulis, quæ in illo oblonga lata: in hoc rotunda sunt.

VIII. Eryngium planum minus.

Eryngium pusillum planum Mutoni, Lob. Lugd. Clus. hist.

IX. Eryngium arvense folijs ferræ similibus.

Crythamus agrestis, Trag.

Crithmum quartum, Matth. Cast. Tab. Cam. an.

quartum Tralliano.

Eryngium quartum, Dod.

Eryng. mont. recentiorum, Ad. Lob. Lugd. Ger.

Ammi quorundam Dalechampi, Lugd.



## CARDUUS STELLATUS.

I. Carduus stellatus latifolius acaulos.

*ο φελμαρρυστα*, sive findens oculos, Cast. quid?

II. Carduus stellatus latifolius caulescens.

Carduus stellatus Dalech. Lugd.

III. Carduus stellatus folijs papaveris erratici.

Eryngium, Brunf. alterum, Trag. Lon.

Calcatreppola, Matthiol. cap. de Eryngio : & Cæsalpino, quasi caccotribulus, id est, infestus tribulus : qui Scæbe Theophrasti putat.

Carduus stellatus, Dod. ut : Adv. (sive Calci-  
trapa) Lob. Cam. Ger.

Carduus stellatorius sive stellario, Gefn. hort.

Polyacantha, Cord. hist.

Myacanthos Theophrasti Dalechampio, Lug.

Spinastella, & Spinastella alba, Tab.

Hippophæstum vel Hippophæis Dioscoridis, Colum.

Carduus muricatus, Clus. hist.

Variat florum colore, communiter subru-  
beus, aliquando albus : hinc duæ figuræ apud  
Tab. & Ger.

IV. Carduus stellatus luteus folijs cyani.

Spina citrina vel lutea, Gefn. hort.

Spina solstitialis, Eid. Dod. Ad. Lob. ico. Cam.

Leucacantha quorundam, Lugd.

Calcatreppola altera, Cæf.

Carduus solstitialis, Cam.

Spina solstitialis minor Apula, sive Carduus  
stellatus minor, Col.

V. Carduus caule stellato Peruvianus.

Carduus, Monardi.

Arundinacea pinnata & spinosa exotica plan-  
ta, Adv. Lob. ico.

Palmacea seu arundinacea pinnata spinosa t.  
Lugd. desc. at ipsa figura sub titulo Nerei facie  
habetur.

Calamus Peruvianus asteroides, Tab.

Calamus Peruvianus spinosus, Ger.

*Λουκάνου* Dioscoridi l. 3. c. 22. radice est cyperi

amara & calida : Idem Plinius l. 22. c. 16. Apud

Theophrastum 6. hist. 4. (spina candida Gazæ)

spinosa est, sed non aculeis folijs constat.

Alij *ἀκανθὺς βυσσινίου* spinam regiam Theophras-  
ti volunt, de qua 2. caus. 10. Spina regia aculeis

constat, & radix in caput excrescit, ceu nepa.

Utriusque descriptio brevior, quam ut quid  
statui possit.

## EUPHORBIIUM ET ANTEUPHORBIIUM.

**E** *ὀφίον* auctore Dioscoride l. 3. c. 96. Juba in Libya regnante primo inventum est : & ut Plinius l. 25. c. 7. Invenit rex Juba quam appellavit Euphorbiam, medicis sui nomine & fratris Muse, à quo Divus Augustus conservatus fuit. Dioscoridi Libyca arbor est ferula speciem habens, quæ in Atlante Mauritania monte nascitur, acerrimo liquore repleta, quem propter eximium fervorem non citra metum incola colligit : ventres ovillos lotos arbori circumligant & è longinquo caudicem contri vulnerant, unde statim copiosus liquor effluit, Plinius scribit folijs acanthini spectari, & colligendi & adulberandi modum ex Dioscoride subjungi, qui herbam Euphorbiam, succum vero Euphorbium vocavit. Leo Africanus inter Africa plantas describit : herba, inquit, est ex toto aculeata, quæ caput cardui sylv. emulatur : inter ejus ramos ab radice exeunt fructus cubitales & ampliores, crassitudine citruli, virides, granulosis quibusdam tuberculis distincti ut Citrulus, veluti candicea viginti & triginta ex eodem cespite. Rustici hos gladijs pungunt, cum ad maturitatem pervenerint : effluit autem humor lactis similis, qui paulo mox densatur & tandem siccatur utribus collectus. Vide infra l. 12. sect. 6.

Plantam ipsam primus Dodonæus expressit, quæ Bruxellæ Anno 1570. est nata : quam ex Anglia unâ cum Anteuphorbio, a Lobelio accepimus.

I. Euphorbium à Dodon. Lob. Lugd. Lon. Tabernæm. Gerard. pingitur : de ipsius succo plures egere, ut Matth. Cord. Lac. Cæsalp. Lugd. & alij.

Euphorbia, Cord. hist.

II. Anteuphorbium, Dodon. Lob. Lugdun :

Castor. Tabern. Gerard.

Sic dictum à contrarijs Euphorbio facultatibus, hoc enim adversus Euphorbij acrimoniam, indigenis remedio esse fertur. Dodonæus hanc herbam ad Telephium referri posse censet.

## T R A G A C A N T H A.

**T**ragacantha, quam Gazæ Hircissinam vertit, & de eju lachryma dicitur. Diosc. l. 3. c. 23. radice est lata & lignosa, ac supra terram eminente: a qua surculi humiles robusti latissime fusi. & in ipsi foliola numerosa, semina, inter quæ aculei sese proferunt, quos ipsa occulunt, candidi, firmi reliqui. Theoph. 9. hist. 2. lachrymam gignit: & 8. hist. 9. & succus sponte consistit spissaturq; lacrima modo: & 9. hist. 15. largè in Arcadia nascitur, nec deterior Cretica existimatur, sed etiâ visu pulchrior. Plin. l. 13. c. 21. Creta gignit & Tragacanthæ spinæ albæ radice multum prælatum apud Medos aut in Achaja nascuntur. Sed de lachryma vide infra l. 12. sect. 6.

## I. Tragacantha.

Tragacantha, Matth. Ang. Gesn. hort. Lac. l. on.

Adv. Lob. Lugd. Clus. cur. post.

Tragacantha prima, Tab.

Tragacantha sive Hircissina, Clus. in corol. ad

Dodon. gal. & Dodon. Gerard.

II. Tragacantha humilior luteis floribus.

Tragacanthæ alterum genus, Rauvvolf. & Lugd. ap.

Addit & tertium florib. purpureis & speciosis.

## P O T E R I U M.

**P**oterion secundum aliquos dictum, quia potrix herba paludosum riguumq; solum amat: & vespas, quod nervis amica sit. Dioscorides l. 3. c. 17. Poterium Jonæ Neurada vocant, frutex grandis est, ramulus longus, mollis, tori modo lentius ac flexilibus, tenuibus, tragacanthæ proximus: folijs vero parvis & rotundis totum autem frutem tenui lanosa lanugine obducitur, estq; spinis horridus: flores sunt parvi & candidi: radices binum ternumve cubitorum firmæ ac nervosæ, quæ proximè terri aut recisa lachrymam fundunt gummatissimæ. Plinio l. 27. c. 12. Poterion aut Phrynon aut neurada, qui eodem sepe modo descripsit, nisi quod florem dicas longum herbacei coloris: at l. 25. c. 10. flores parvos tribuit.

## I. Tragacanthæ affinis lanuginosa, sive

Poterium.

Poterium, Match. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Tragacantha altera forte Poterium, Clus. hisp.

& hist. Lob. Lugd. Tab. fortè & Bellonio.

Tragacanthæ primum genus, Rauvvolf. &

Lugdun. ap.

Spina hirci minor, Ger.

## II. Poterio affinis folijs Pimpinellæ spinosa.

Chalcion sive Eriera, Ang.

Chalcion Anguillare, Lugd. Clus. hist.

Poterion, Adv. Lob. Lugd. Cæs. Tab. Ger.

Pimpinella spinosa, Clus. hisp. Cam.

Bellan, Rauvvolf. & Lugd. ap.

Scæbe legitima Dioscoridis & ruscæ in Græcia, Honor. Belli ep. 2. ad Clus.

## D R Y P I S.

**Δ**rypis Theophrastus 1. hist. 16. semel tantum iuvenit scribens, coronam, Drypida, Acnium in genere spinoso esse, loco enim folij spina oritur. Sic dicitur ἀκὼ τὸ ἀκρίτης id est ἀκρότης, ῥίτης, ἴσως à lancinando, pungendo, vellicando, quod aculeus suus attrectantes & colligere volentes vulneret.

Spina umbella folijs vidua.

(Tab.) Drypis ab Anguillara descripta, fortè Cnodo-

D. ypis Theophrasti, Ang. & ex eo Lob. Lugd. thus, Col.

## A N O N I S S I V E R E S T A B O V I S.

**A**nonis Dioscoridi, & Theophrasto. Anoniu dicta videtur à non jurando quod nullam utilitatem præbeat, cum aratoribus (hinc Remora aratri dicitur) inimica sit: nisi quis ex adverso nomen impositum censuerit. Anoniu quidam deducunt ἀνὸ τὸ ἀνὸν, quasi dicas ἀνὸν oblationem: nam ex Græcu quidam affirmant, afinos in ea se volutare, & dorsum sub aculeis ejus herba libenter extere. Dioscorides l. 3. c. 21. Anoniu quam aliqui Ononidu vocant ramos habet dodrantales, etiam majores & fruticosos, frequentibus geniculis cinctos, multu alarum cavis præditos & capitulis rotundis: folioli pusilli, tenuibus ceulenticule, ad rutæ aut lini prætensis folia accedentibus, subhirsutis, odoratu: ramuli spinis acutioribus horrent radice candida est. Ac Theophrasto 6. hist. 4. Ononiu juxta folium aculeata est, altero quoque folio conditur: & c. 5. verum ramis aculeigerum est: folio rutæ similis, sed per totum appositò caulem, ut veluti coronam ex intervallu rotam speciem repræsentet: florem minutum & in siliqua non undique septam edit. Plinio l. 21. c. 15. Ononis secundum spinam habet folium: & c. 16. in ramo spinas habet appositò folio rutæ simili, toto caule foliatum in modum coronæ: & l. 27. c. 4. Anoniu quidam Ononida malunt vocare, ramosam, sinuatis fenu-graco, nisi frutescosior hirsutiorq; esset, odore jucundo: pot. Ver spinosa.

I. Ano-

I. Anonis spinosa flore purpureo.

Restia bovis, Trag. Lon.

Ægyptiron Cratevæ, Ang.

Anonis sive Ononis, Matth. Lac. Tab.

Anonis, Fuch. Dod. ut: Tur. Cast. spinosa, Eyst.

Ononis, Cord. in Diosc. (cui & Acutella,) Gesn.

hort. Adv. Lob. Lugd. Thal. Cæs.

Anonis sive restia bovis, Ger.

Flore est communiter coloris dilutioris purpureæ, raro albidæ, quæ

Anonis flore albo, Tab. Ger. rarissimè luteo.

II. Anonis spinosa lutea major.

Ononis montana lutea, Gesn. hort.

III. Anonis spinosa lutea minor.

Ononis lutea sylv. minima, Col.

IV. Anonis spinis carens purpurea.

Ononis perpetuo lævis, Gesn. hort.

Anonis non spinosa, Clus. pan. Eyst. purpurea, Tab. Ger.

Anonis sive Ononis sine spinis, Cam.

Anonis mitior prima, Clus. hist.

Hæc & candidis floribus reperitur, quæ

Ononis candidis floribus, Adv.

V. Anonis viscosa spinis carens lutea major.

Natrix Plinij herbariorum, Adv. Lob.

Anonis mitis flore luteo, Clus. pan.

Ononis lutea montana, Cam. ep.

Anonis flore luteo, Eid. hort.

Anonis non spinosa lutea, Cast. Tab. Ger.

Ononis mitis luteo flore, Eyst.

VI. Anonis non spinosa flore luteo variegato.

Ononis lutea non spinosa: alijs Melilotus major, vel sylv. pinguis, Lugd.

Ononis flore luteo variegato, mitis, Eyst.

A priori differt floris colore, qui luteus, sed pallidior, est & lineis subrubris variegatus.

VII. Anonis viscosa spinis carens lutea minor, vel Anonis viscosa minor flore pendulo: in Prodromo describitur.

VIII. Anonis non spinosa capreolis donata. Ononis Senensis, Spigelio. Sed quid?

# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER VNDECIMVS.

## SECTIO PRIMA.

CYTISUS; ANAGYRIS; LABURNUM; ACACIA;  
ASPALATHUS; SANTALUM; ARBOR BRASILIA; AGALLOCHUM;

sive Xyloaloes; Genista-Spartium; Genista spinosa sive Scorpius; Genista non spinosa; Chamægenista; Spartium; Colutea;

Senna & Jovis barba.

## CYTISUS.

**F**rutices & Arbores propæseuri, à Cyriso ordiri lubet, qui νότιος Græci dicitur, Latiniſ Cytisus, à Cythino insula. in qua, Plinio l. 13. c. 24. auctore, inveniens est, unde in omnes Cycladas, mox in urbes Græciæ magnæ casci præventu, translatus: Est autem Dioscoridi l. 4. c. 113. Cytisus frutex totus albus, uti Rhamnus, ramos spargens, cudit ales etiam majores, in quibus folia similia Fœnugraci aut Lotus trifolia, sed minora & dorsum prominentiorem habentia. Theophrasto r. hist. 9. & 3. caus. 6. Cytisus medullam duram, spissam & nigram habet: & 4. hist. 5. fruticosa est veluti Hebenus. Plinio l. 6. Cytisus frutex est canis aspectu, breviter, si qua exprimitur similitudinem velie, angustioris trifolij frutex. Columelle l. 9. c. 4. Sativum est & sue sponu.

Cytisus incanus vel hisfrutus.

I. Cytisus incanus, siliquis falcatis.

[Cytisus Maranthæ, Matth. Lob. Lugd.

[Cytisus ut existimatur, Dod.

Ccc 3

Cytisus,

Cytisus, Cæsalp. Galeni, Cam.

Cytisus tertius cornutus, Tabern. septimus cornutus, Ger.

Cytisus Galeni Maranthæ cornutus, Eyf.

Lignum Rhodium, sive Cytisus verus, Honor. Belli epist. 4. ad Clus. qui hujus ut & sequentis ramum ad nos misit.

II. Cytisus incanus Creticus.

Barba Jovis altera, Ang.

Cytisus Creticus ἀρχονδίσκος, id est, nobile lignum, Hon. Belli epist. ad Clus.

Ebenus Cretica, Eid. epist. 4. ad Clus. & Ponæ.

III. Cytisus incanus folio oblongo Austriacus.

Cytisus 2. Clus. pan. quintus, Eid. hist. Eyf.

Cytisus sextus, Tab. ico. alias undecimus.

Cytisus incanus, Ger.

Pseudocytisus 2. Dod. belg.

Hujus altera species angustis folijs, ijsque velut in aculeum desinentibus, quemadmodum in Italia reperitur, qui

Cytisus acuminatis folijs dici posset.

IV. Cytisus incanus siliqua longiore.

Cytisus, Adv. Lob. ico. Cast.

Cytisus prior Penæ, Lugd.

Cytisus quartus, Tab. octavus, Ger.

Cytisi sylv. species prima, Cæf.

In hortos translata canitiem amittit.

V. Cytisus albicans, folio trifolij vulgaris.

Cytisus albus sylvestris, Cord. in hist.

an Cytisus alpinus Dalech. Lugd.

VI. Cytisus folijs subrufa lanugine hirsutis.

an Cytisus, Tur.

Cytisus 4. Clus. hisp. tertius, Eid. hist.

Cytisus quartus Hispanicus Clusij, Lob. Lugd.

Cytisus 12. Hispanicus 4. Tabernæm. ico. alias decimus.

Pseudocytisus hirsutus, Ger.

an Cytisus sylv. alter, Cæf.

VII. Cytisus hirsutus major folijs pinnatis.

Cytisi secundi species altera, Clus. pan. 5. species altera, Eid. hist.

Cytisus septimus, Tab. ico. alias duodecimus.

Cytisus pinnatus, Ger.

VIII. Cytisus incanus folio medio longiore.

Cytisus 3. Clus. hisp. sextus, Eid. hist.

Cytisus tertius Hispanicus Clusij, Lob. Lugd.

Cytisus undecimus Hispanicus 3. Tabernæm. ico. alias nonus.

Cytisus sempervirens, Gerard. icon.

IX. Cytisus hirsutus flore luteo purpurascens.

Cytisus magnus flore luteo purpurascens, Ponæ Ital.

X. Cytisus supinus folijs incana lanugine infernè pubescentibus.

Cytisus tertius, Clus. pan. septimus, Eid. hist.

Cytisus 8. Tab. ico. alias sextus.

Cytisus hirsutus, Ger.

an Cytisus supinus, Cam.

XI. Cytisus supinus folijs infernè & siliquis molli hirsutis pubescentibus.

Cytisi septimi species altera, Clus. hist.

Cytisus septimus, Eyf.

XII. Cytisus minoribus folijs ramulis tenellis villosis.

Cytisus primus, Clus. hisp. & hist.

Cytisus Hispanicus primus, Lob. Lugd.

Pseudocytisus prior, Dod. Ger.

Cytisus nonus: Hispanicus 1. Tabern. ico. alias septimus.

XIII. Pseudocytisus flore Leucoij luteo.

Cytisi facie Alysson fruticans quorundam, Lobel. Lugd.

Cytisus adulterinus, Tab. Ger.

Cytisus glaber.

I. Cytisus glabris folijs subrotundis, pediculis brevissimis.

an Cytisus primus, Ang.

Cytisus alter minor, Adv. Lob. ico. Lugd.

Cytisus quintus rotundifolius, Tab.

Cytisus, Ger.

Trifolium arboreum, Eyf.

II. Cytisus glaber viridis.

Cytisus secundus, Tab.

Cytisus siliquosus, Ger.

Trifolium fruticans Guilandinus nominabat.

III. Cytisus glaber nigricans.

Pseudocytisus sive niger, Cord. hist.

Cytisus, Lac. Ger. & apud Cordum pingitur.

Cytisus Gesneri, Lugd.

Cytisus & Cytisus minor, Gesn. hort.

Cytisus primus, Clus. pan. Cord. hist.

Cytisus quartus, Clus. hist.

Cytisus niger sive major, Cam.

Pseudocytisus primus, Dod. Belg.

Cytisus 1. Tab. spicatus, Eyf.

IV. Cytisus folijs incanis angustis quasi complicatis.

Cytisus

Cytisus secundus, Clus. hisp. & hist.  
Cytisus secundus Hispanicus, Lob. Lugd.  
Pseudocytisus alter, Dod. Ger.  
Cytisus decimus: Hispanicus secundus, Tab.  
icon. alias octavus.

Hic circa Monspelium folijs est viridibus, in

Hispania prorsus incanis.

V. Cytisus foliolis glabris filiquis Ornithopodij hisluti, in Prodomo descriptus.

VI. Cytisi in Thraciæ & Macedoniæ pratis, quam neq; Gallia neq; Italia alati: his solum ver. bis meminit Bellon. l. i. obs. c. 56. 60. 63. Sed quid?

## ANAGYRISET LABURNUM.

**A** *Nagyris* sive *αγάριος*, *αλυσ άναγριος* Dioscoridi l. 3. c. 167. fructus est arboris instar, folijs & virgii Vitis affinis, perquam gravis odor: flore brassica simili: semen in longu corniculū reuini figura, versicolore ac solido: quod uia muturescente durecit: Et Plinio l. 27. c. 4. *Anagyros*, quam aliqui *Acopon* vocant, fruticosa est: gravis odor: flore oleris: semen in corniculū non brevibus gignit, simile renibus, quod durecit per nesses.

*Laburnum* Plinio lib. i. cap. 18. alpina arbor est, nec vulgo nota, dura ac candida materie, cuius flos cubitali longitudine: apes non attingunt.

### I. Anagyris foetida.

Anagyris, Dod. utr. Ang. Cord. in Diof. & hist.  
Tur. Lon. Ad. Cæs. Lug. qui & *Colyteum* Theophrast. suspicatur.

Anagyris prope Arelatum, Ges. hor. Lugd. Clus. histor.

Anagyris folio foetido, Ges. hor. foetida, Ger.

Anagyris foetida arborecens, Lob.

Anagyris vera, Clus. hisp. Lugd.

Anagyris prima, Cam. Tab.

Semina superficie glabra quidem sunt, sed colore inter se diversa: quædam enim purpureo, quædam livente, quædam in cinereo pallido.

### II. Anagyris foetida altera, rotundo folio.

Anagyris Cretica, à Clusij diversa, Hon. Bell. ep. 2. ad Clus.

Anagyris, *Anagyros* vulgo in Creta circa Idam montem, Bellon. obs.

### III. Anagyris non foetida major, vel Alpina.

Anagyris prima & major, Matth. Cast.

Egæo, forte Ebeni 2. species, Theophr. Ang.

Trifolia arbor, Cord. hist. Bellon. de cult.

Laburnum, Dod. gal. Bellon. de cult. Lugd. Camer. Cæs. alp.

Anagyris latifolia, Eystett.

Trifolia quidem communiter est, attamen sæpe quatuor, etiam quinque folia uni pediculo adhærent, ut ei qui antea non observari, diversa ab altera videatur.

In horto Lugduno Batavo habetur folio longiore angustiore, solidiore & atrovirente, quod Laburnum latifolium nominant.

### IV. Anagyris non foetens minor.

Faba inversa, Trag. Lon.

Anagyris altera, Matth. Lac. Cam. Tab. minor, Castor.

Anagyris alia species, Ges. hort.

Eghelo, Dodon.

Anagyris minus foetens, Ad. Lob.

Laburnum alterum, Lugd.

Anagyris foetens, Ger. ico.

Anagyris angustifolia, Eystett.

## A C A C I A.

**A** *Cacia*, *άνακιν* Dioscoridi & *Græcu*, ab *άνακιν*, id est, acuo, unde *Acacia* quasi *acuta*: quam Theophrast. l. 4. hist. 3. *άνακιν*, id est, spinam, sive *άνακιν* αἰγυπτίαν spinam Aegyptiam 9. hist. 1. esse volunt: & Dioscoridi l. 1. c. 133. spina est arborecens fruticosa in rectum non assurgens, florem habens album. fructum vero instar Lupini siliqui inclusum: ex hac succus exprimitur & gummi ex ea spina manat: de hoc succo Plin. l. 24. c. 12. Est, inquit, & *Acacia* spina succus: sit in Aegypto, alba nigraq; arbore, &c. Et Theophr. Spina ex eo nomen accepit, quod tota arbor aculeis horret excepto caudice: nam & super germina. foliaq; aculeos gerit, magnitudine excellit, materies quippe duodorum cubitorum, testis idonea caditur: ejus duo genera, quædam candida imbecillius facileq; putrescens: quædam nigra, quæ robustior & incorrupta, &c. fructus in siliqua modo leguminum, flos pulcher aspectu ut coronæ ex eo facerent, &c. Eadem ferè Plinius l. 23. c. 9. nomine Spina Aegyptiaca. Et Diof. duplex est: altera longè minor humilior ac tenerior, aculeis vallorum in modum obdita, solitaria similia habens. semen in folliculo connexu, ternum quaternumve capitibus, lenticula minus.

I. Aca-

I. *Acacia folijs Scorpioidis leguminosæ.*  
*Acantha & Acantha Ægyptiaca, Hippoc.*  
*Acacia Ægyptia, Dod. gal. Lugd. Cam. Alexandrina, Cam.*  
*Acacia prima, Ang. Lac.*  
*Acanthus Theophrasti, Ang.*  
*Acacia, Bellon. (quæ Akakia in offic. Constanti-*  
*nop.) Dod. Cam. ep. Alp. vera, Clus. ad Garz.*  
*Spina Acaciæ Dioscoridis, Ad. I. ob.*  
*Acacia, Arabibus Schamuth, Schack, Halepi,*  
*Rauvvolf.*  
*Acaciam z. à Matth. & Lugd. propositam quam*

*Acaciam majorem Durantes vocat, Arborem*  
*Judæ cui aculei adpicti sunt, multi existiman-*  
 II. *Acacia trifolia.*  
*Acacia altera, Matth. Dod. ut: Lac. Bellon. Rau-*  
*vvolf. Lugd.*  
*Acacia, Lon. altera Dioscoridis, Ad. Lob. Tab.*  
*Aspalathus, Cæs. sive Acacia z. Matthioli, Gesn.*  
*hort. Cam.*  
*Aspalathus z. Dioscoridis, Guil. epist. & Hon.*  
*Belli ep. 1. ad Clus. (quo nomine & Græcis in-*  
*digenis hodie donatur) Ponæ Ital.*  
*Acacia Dioscoridis, Ger.*

## A S P A L A T H U S.

**A**spalathus, Ἀσπλάθος alij; Erythraeum, frutex est lignosus, spinis crebris aculeatus: duplex est, alter detractis cortice rubens aut purpurascens, alterum genus candidum est Dioscoridis l. 1. c. 19. At Plinium non eadem omnino tradit l. 22. c. 24. in eodem tractu Aspalathus, inquit, nascitur spina candida, magnitudine arboris modica, flore rosea, radix unguentis expetitur: quidam Erythraeum, alij Sceptum vocant, &c. & l. 24. c. 13. Orientalem, alium à Rhodio facit.

I Aspalathus cortice cinereo, ligno purpureo.  
 Aspalathi prima species Dioscoridis, Ponæ Ital. à quo portionem accepimus.

II. Aspalathus colore buxi.  
 Aspalathi primum genus, Ad. & Lugd.  
 Lignum Americ. buxei coloris, Leri de Brasilia Lignum aureum & flavum in Terzera insula, Linscot. 3. part. Ind. Or. c. 6.

III. Aspalathus albicans torulo citreo.  
 Rhodium lignum, quibusdam Agallochum, Olea æthiopica videtur, Cord. in Diosc.  
 Agallochum fortè, id est, Xyloaloe solida, quibusdam lignum rhodium, rhodifium & aspalathum, aliis Oleastrum lignum, Cord. hist.  
 Aspalathi tertium genus, Ad. & Lugd.  
 Aspalathus Rhodius, Lob. ico.  
 Lignum rosei odoris in Brasilia, Leri de desc. Bras. vel par. 3. Ind. Occid. c. 12.

IV. Aspalathus rubeus.  
 Rhodium lignum rubescens & purpurascens Ruellij, Cord. in Diosc.  
 Aspalathi secundum genus, Penæ & Lugd.  
 Aspalathus roseus, Ad. Lob. ico.  
 Lignum Americanum rubrum diversi à Brasilia generis, è quibus claves suas barbari conficiunt, Leri l. c.  
 an Lignum Sanguinho dictum, totum rubrum & cruentulum in Terzera insula, Linscotto l. c.  
 V. Lignum Americanum album.  
 Lignum album ut charta, Leri l. c.  
 Lignum cretæ candore nivium, Linscot. l. c.  
 VI. Lignum Americanum violaceum, quæ ligna solius naturæ miraculo distincta, terra illa profert, Leri l. c.  
 VII. Lignum Feixo, & varij generis ligna præstantissima, insula Pico promittit, Linscot. l. c.

## S A N T A L U M.

**C**um multi Santalum pro Aspalatho vero sumperint: & aliqui Agallochum, lignum rhodium, crediderint, utrunque subiungemus.  
 Santalum veteribus Græci indictum videtur, & Sandal Avicenna, Serapioni & Mauritani: Indu verò Santanda, Garzia auctore, dicitur: quod folijs est Lentisci amulæ, flore ex ceruleo nigricante, fructu cerasi magnitudine nigro, insipido: trium generum, rubrum album pallidum, quæ uno in loco non proveniunt: eadem Acofia & Lugdunensis historia habent. Sani ali cinericei quos, in regni Congiani descriptione mentio fit.

I. Santalum album, Matth. Lac. Lon. Cord. hist. Cast. Garz. Lugd. Tab. Ger. Linscot. part. 4. Ind. Or. 30.  
 Lignum odoratum candidum, Cæs.  
 II. Santalum pallidum, Mart. Lac. Garz. Lugd.

Santalum citrinum, Cord. hist. Lon. Cast. Linscot. l. c.  
 Santalum flavum, Tab. Cæs. cui flavum quod hodie habetur, candidi medulla est & citrinum Serapioni dicitur.

III. San-



III. Santalum rubrum, Matt. Lac. Lon. Cast. Garz. Lugd. Tab. Ger. Linfco. l. c.

Lotus veterum, Sandalus rubea officinarum, Cord. in Diosc.

Santalum rubeum, Cord. hist.

Lignum odoratum rubrum, Cæf.

Santali rubri, quod in officinis Lignum aquilinum dicitur, & quo in regno Congiano febres curentur, Pigafetta in desc. regni Congiani c. 7. meminit.

IV. Santal. cinericeum, quo Scabiam Gallic. sanant, tanti apud eos precij, ut vel parva ejus particula servo robusto comutetur, id. proponit.

V. Pseudofantalum rubr. sive arbor Brasilia. Arbor Brasilia Theveti, Lugd.

Bersilicum, Lon.

Perfilium rubrum & citrinum, Cord. hist.

Bresiliensis arbor in Guajana: par. 8. Ind. Occid.

Brasilia arbor, barbaris Araboutau, quercum proceritate & iamorum copia adæquat, folijs buxeis persimilibus: fructum non ferens: harum quodam, quam vix trium; altera, quam vix octo; & altera quam vix sedecim hominum ulnæ impleterentur, Leri. in desc. Brasil.

VI. Arbori Brasiliæ affinis: in regno Guinææ, in Insula Carisco, arbores sunt, quæ vel Brasilienses rubedine superant, quarum lignum instar politissimi speculini teritur, tantæ duritiæ, ut vix ingenti labore inflecti possit, ut habetur in 6. parte Indiæ Orientalis cap. 5.

an Lignum Brasilianum quod flammei coloris est, & tincturis adhibetur, Joseph. Acoftæ l. 4. c. 29. meminit.

VII. Arbores pigmentiferæ.

Arborum peculiaria genera ex quibus rubrum, nigrum, flavum & purpureum colorem extrahunt, in Insula Madagascariæ Laur. p. 4. Ind. or.

VIII. Ligno Brasiliano simile.

Lignum Sapoulanis tingendis percommo- dum, Linfco. par. 2. Ind. Or. c. 24.

IV. Pseudofantalum Creticum.

A'fiamia, Abelicea folijs Alaterni, fructu piperis, ligno rubro, cujus pulvis Santalum imitatur, Hon. Belli epist. 2. ad Cluf. Ponæ Ital.

X. Pseudofantalum album.

Lign. Sambarane Santalo albo persimile, Garz. Sambarane, Acoftæ.

XI. Lignum ex freto Magellanico medulla flavescens.

Lignum exoticum alterum, Cluf. exot. l. 1. c. 7.

Fructum fert nigrum myrtillis similem.

XII. Lignum Moluccense folijs malvæ, fructu avellanâ minore, cortice molliore & nigricante, Pavana incolis, Lugd.

Lignum Moluccense, Acoftæ.

Lignum Pavanum, Tab.

XIII. Ligna preciosissima ex Havana & Insula Cuba in Hispaniam vehuntur, cujus generis sunt Ebanos, Caovana, Granadillos, Cedrus

& similia: Joseph. Acoftæ l. 4. c. 30.

## A G A L L O C H U M.

**A**gallouchum veteribus, at recentioribus etiam *Agallochum* & Lignum aloës. Dioscoridi l. 1. c. 21. Lignum est quod ex India & Arabia deportatur, Thyia ligno simile, maculatum, odoratum, gustu adstringens, cum quadam amaritudine, cute verius quam cortice vestitur, aliquantum versicolore. At Garzie arbor est olea instar, interdum minor, quæ non nisi in Indiâ nascitur. Tarum Plinij l. 12. c. 20. aliqui existimant, quod Agallochum syl. esse, Dalechampi, notum in Plinium, suspicatur: sed brevior est Plinius, quam ut quid pronunciare liceat. Agalagen & Xyloaloës, Avicenna.

Hujus plura genera Serapio l. simp. c. 197. enumerat, Indum Mondunum, Seiscum, Alcumericum, & Ruell. l. 1. c. 36. quatuor Agallochigenera recenset. Lud. Romano triplex genus ejus arborum: 1. quod Calampart vocatur: duo alia in Insula Taprobana, quorum 1. Lubam, alterum Bochor nominat, quæ duo genera ad nos convehantur.

I. Agallochum præstantissimum.

Agallochum primum quod Calampart vocatur, & solum inter Reges Indiæ distribuitur, Lud. Romano.

Lignum Calamba, quod syncerum cum auro argentove perseppe deponderatur, Linfco. par. 2. Ind. Or. c. 24.

Lign. Aloës Calamba dictum, Ei. p. 4. Ind. or. c. 32.

Lignum Calambes sive Aloës, par. 8. Ind. Or.

II. Agallochum officinarum.

Agalloch. esse Lignum aloës, multi credunt, Ang. Aloë & Aloa, Vartomano.

Agallochum, lignum aloë, vel paradyfi, vel S. Crucis, Cornaro.

Agallochus sive Xyloaloës, Cord. in Diosc. Ad. Lob. Cast. Garz. Lugd.

Tarum, id est, Xyloaloë fisisilis, levis & aromatica, Cord. hist. & Tarum crispum, Eidem.

Ddd

Lig um

Lignum aloës, Lon. Frag. Tabern. Cæſalp. qui Tarum Aëtij facit: at Cornarus Xyloaloën Aëtij dicit.

Lignum aloës quod Palo d'Agula dicitur, Linſcot. par. 2. Ind. Or. c. 24. ſive Palo d'Aguilla, Eid. par. 4. Ind. Or. c. 32.

III. Agallochum ſylveſtre.

Lignum aloës ſylv. Garziæ, Frag.

Xyloaloë ſylv. Lugd.

Aquilla brava ſive ſylveſtre, Malaice Garro, Linſc. l. c.

Ex illo, ſed ex hoc frequentius, ſphærulæ prætorizæ odoris jucunditate & præcij magnitudine commendabiles conſciuntur, ſunt etiam ex alio ligni genere, quod Agallochum æmulatur, ſed inodorum eſt.

## GENISTA SPARTIUM.

I. Geniſta ſpartium ſpiñoſum majus primum flore luteo.

Aſpalathus alter primus, Cluſ. hiſp. & hiſt.

Aſpalathus, Caſt. primus Monſpel. Lugd.

Acacia altera, Ang.

Aſpalathus ſecunda Monſpel. Lob.

Geniſta ſpartium ſpiñoſum majus, Ad. Lob. icon.

Scorpius primus, Tab.

Geniſta ſpiñoſa minor, Ger.

II. Geniſta ſpartium ſpiñoſum majus ſecundum flore pallido.

Aſpalathus alter ſecundus, Cluſ. hiſp. & hiſt.

III. Geniſta ſpartium ſpiñoſum majus tertium hiſſutum.

Aſpalathus alter tertius, Cluſ. hiſp. & hiſt.

IV. Geniſta ſpartium ſpiñoſum minus.

Scorpius ſecundus, Cluſ. hiſp. & hiſt. Caſt.

Geniſta ſpartium ſpiñoſum alterum, Lob.

Geniſtæ ſpiñoſæ altera icon. Dod.

Aſpalathus alter Hiſpanicus, Lugd.

Scorpius tertius, Tab.

Spina Chriſti, Cæſalp.

Geniſta ſpiñoſa major, Ger.

V. Geniſta ſpartium ſpiñoſum folijs polygoni.

Alhagi Maurorum in cujus fronde, præcipue apud Perſas, Manna colligitur. Rauvvolſ.

Planta ſpiñoſa Maurorum Alhagi, Lugduneniſi app.

VI. Geniſta ſpartium ſpiñoſum folijs lenticulæ, floribus ex cæruleo purpureſcentibus.

Spartum aphyllon fruticoſum juncis aculeis lanatis capitulis, Ad. Lob. Lugd.

Etinacea, Cluſ. hiſp. & hiſt. Lugd. Belli.

Geniſtæ rotundæ alterum genus, Caſt.

Scorpius quartus, Tabern.

Spartium aculeatum aphyllon, Eid.

Geniſta ſpiñoſa humilis, Ger.

VII. Geniſta ſpartium ſpiñoſum aphyllon alterum, tribus aculeis ſemper junctis, floribus luteis.

Achinopoda Cretenſium, Bellonio.

Echinopoda Cretica.

Chenopoda Plinii l. 11. c. 8.

Echinopoda Plutarchi & Athenæi,

an idem ſit cum quarta, dubitat Cluſius.

Hon. Belli,  
epiſt. 2. ad  
Cluſ.

## GENISTA SPINOSA

ſive Scorpius.

**S**corpius, Theophrasto 6. hiſt. 1. (Nepam Gaza vertit) ſpiñoſa planta, tota ſpinis conſtat ut Corruca. ſic hæc adulta nullo modo ſoliſa eſt. ſed ſpinas tantum pro ſolis habet: præterea radice ſingulari brevique conſtat, arte aſſatam non germinat. germinationem in autumnum protogat: ſiſcet etiam poſt æquiinoctium. Autumni ſorem incarne exuberante, ſub extrema aculei proſert.

I. Geniſta ſpiñoſa major brevibus aculeis. Scorpius ſive Nepa, Anguil.

Nepa Theophrasti, Ad. Lobel. Tabern. Camer. Rauvvolſ.

Scorpius Theophrasti, Lugdun.

Geniſta aculeata minor, ſive Nepa Theop. Ger.

II. Geniſta ſpiñoſa major longioribus aculeis.

Ulex Plinii quibuſdam l. 32. c. 4. qui nullas notas addidit.

Geniſta ſpiñoſa, Dod. ut.

Scorpius primus, Cluſ. hiſp. & hiſt.

Scorpius

Scorpius alter, five Genista spinosa, Lugd.

Scorpius secundus, Tab.

Genista spinosa flore albo, Ger.

Floribus est luteis, at in regionibus calidioribus ruffo colore, ut rubere videantur, nirent: & ratione loci variat magnitudine & aculeorum multitudine, paucitateve.

III. Genista spinosa minor Germanica.

Genistella, Trag. Fuch. Dod ut: Lugd. Tab.

Genista vel Genistella spinosa, Gefn. hort.

Genistella aculeata, Ad Lob. Tab. spinosa, Cam.

Genista minor vel aculeata, Lon.

Genista minor, vel Genistella, Cast.

Genistæ species spinis & aculeis horrens, Clus. hist.

Coroneolæ similis suffrutex, Cæf.

IV. Genista spinosa minor Hispanica villosissima.

Genistella Monspeliaca spinosa in Prodomo.

V. Genista minor aspalathioides, vel

Genista spinosa Anglica in Prodomo descripta.

## GENISTA NON SPINOSA.

I. Genista angulosa & scoparia.

Genista, Brunf. Trag. Fuch. Dodon. ut: Cort. in Dioscor. Cam. ep. Tabernæm. Ger. vulgaris, Bellon. Clus. hist.

Genista angulosa, Cord. hist. descr. (ubi male Chamæspartij icon additur) Lugd.

Genista minor seu non aculeata, Lon.

Genista scoparia vulgi, Lob. Eysf.

Genista quadrato junco i. Cæf.

Spartium, Turn. Adv.

Flos communiter luteus, rarius albus, hinc duæ figuræ apud Tab.

Genistæ & Genistæ albæ: & apud Gerardum

Genistæ & Genistæ tenuifoliæ nomine: hujus flores nondum apertos, vicini nostri in Brisgoja muria condiunt & Capparum loco utuntur.

Radici quinetiam sæpè Orobanche adnascitur, & Rapum Genistæ vocant.

Genistellam Taber. pingit, quam Chamægenistam Anglicam Ger. nominat, quæ sola magnitudine à priore differre videtur.

Hujus generis exiguum in alpibus lato cespice, palmaribus juncis, mollibus, sine folijs crescere, Cæsalpinus scribit.

II. Genista tinctoria frutescens folijs incanis.

Genista tinctoria Hispanica, Clus. hisp. & hist.

Genistæ tinctoriæ altera icon, Dod.

Genistella infectoria, Lob. Ger.

Genista tinctoria Clusij, Oricella Theveti. Lug.

Genista infectoria Hispanica, Tab.

Sub hac, quo tempore florere, Hæmodori quoddam genus elegans, brachialis interdum

longitudinis, floribus magnis & luteis crescit, Clusio monente.

Meminit Dodonæus Genistæ hirsutæ Hispanicæ, quam tertiam facit, cujus Calphurnius meminit: hanc non novi.

III. Genista tinctoria Germanica.

Luteam herbam Plinij l. 33. c. 5. aliqui volunt.

Flos tinctorum, Brunf. tinctorius, Fuch. Lon. Castor.

Ferula, Trag.

Lyfimachia, Leoniceno.

Coroneola, Ang. Cæf.

Genista humilis, Dod. gal. Gefn. hort. Lugdun. Thal.

Genista tinctoria, Dod. vulgaris, Clus. hist.

Genistella infectoria vulgi, Adv. Lob.

Genistella tinctoria, Tab. Ger. Eysf.

Chamæleuce, Cord. hist. quoad iconem, nam Hederam terrestrem describit.

Variat folijs latioribus angustioribus, ramulis modò erectis, modò procumbentibus:

quinetiam magnitudine, quare

Florem tinctorum minorem Lonicerus addit.

IV. Genista ramosa folijs hyperici.

Genista minima, Lugd.

Hæc variat: eam non longè Friburgo, & ad Petram pertusam frutescentem, & Monspelij humilem collegimus.

V. Genista Arabica quæ à nostra diversa, planities ad montem Sinai obfiti sunt: quæ etiam in Arabiæ solitudinibus nascitur, Bellon. ob. sed quid?

## CHAMÆGENISTA.

I. Chamægenista folijs Genistæ vulgaris.

Chamægenista prima, Clus. hist. seu Pannonica, Genistella pannonica, Tab.

(Ger.

II. Chamægenista sagittalis.

Chamæspartium, Trag. Lon. Lugd. Tab.

Genista angulosa, Cord. hist. quoad iconem.

Ddd 2

Genista

Genista minima, Gesn. hort.  
 Genistella graminea montana, Adv.  
 Genistella montana, Lob.  
 Chamægenista altera, Clus. pan. & hist.  
 Genista sagittalis pannonica, Cam.  
 Genistella lagopoides, Ger.  
 Variat magnitudine, hinc  
 Chamæspartium 1. & 2. Tab.  
 Genistella lagopoides major & minor, Ger.  
 III. Chamægenista caule foliato.  
 Genista humilis, Dod. pumila, Cam.

Chamægenista peregrina, Cl. hisp. & hist. Lug.  
 Genistella pinnata altera Hispanica, Lob.  
 Genistella pinnata, Ger.  
 Chamæspartium tertium, Tab.  
 IV. Chamægenista folio articulado.  
 Chamæspartium Narbonense, Tab.  
 Genistella globulata, Ger.  
 V. Chamægenista Cretica, in Prodromo  
 descripta.  
 VI. Chamægenista montana hispida.  
 Genistæ minoris species, Thallio.

## S P A R T I U M.

**S**partum frutex est proferens virgas longas, sine folijs, firmas, fractu contumaces, quibus vires alligantur  
 fert lobos cœu Phaeolus, in quibus semina parva lenticula similia, florem luteum instar Leucoj, Diosc.  
 lib. 4. cap. 18. quod nusquam in Europa gigni Guiland. scribit. Et Theophr. 1. hist. 2. λυγισσάκος. Linogenistans  
 GAZA vertit, cuius cortex multiplex tunicis cadit. At Plinio lib. 24. cap. 9. Genista est, cui easdem vires, quas  
 Dioscorides Spartio ascribit.

I. Spartium arboreescens seminibus lenti  
 similibus.  
 Genista, Matt. Tur. Italica, Dod. Hispanica, Ger.  
 Genista major, Cast.  
 Spartium, Matth. Lon. Lugd. alterum, Lac.  
 Spartum, Fuch. Dod. gal. Tur.  
 Genista *enaprie* Græcis, Ang. Guiland. pap.  
 Genista juncea, Cord. hist. Gesn. hort.  
 Spartus vel Spartium, Gesn. hort.  
 Spartium Dioscoridis, Genista Plinij sive Hi-  
 spanica, sive Africana, Clus. hist. Lugd.  
 Spartium Dioscorideum Narbonense & Hi-  
 spanicum, Adv. Lob.  
 Genista altera junco rotundo, Cæs.  
 Genista transalpina, Cam.  
 Spartium Hispanicum, Eyst. 1. 2. & 3. Tab.  
 Pseudospartum Hispanicum, Ger.

II. Spartium alterum monospermon semi-  
 nereni simili.  
 Spartum frutex majus, Dod.  
 Spartium primum, Clus. hisp. at in hist. Spar-  
 tium 2. Hisp.  
 Spartium Hispanicum alterum flore luteo, Lob.

Spartium Hispanicum alterum, Lugd.  
 Spartium Hispanicum 4. Tab.  
 Pseudospartum Hispanicum *απουλλος*, Ger.  
 III. Spartium tertium flore albo.  
 Spartium 2. Clus. hisp. at in hist. 3. Hispanicum.  
 Spartum frutex minus, Dod.  
 Spartium 2. flore albo, Lob.  
 Spartium aliud Hispanicum Clusij, Lugd.  
 Spartium Hispanicum quintum, Tab.  
 Pseudospartum album *απουλλος*, Ger.

IV. Sparto primo affinis.  
 Genistæ Hispanicæ affinis, in Prodromo.  
 V. Spartum triphyllon.  
 Genista Ilvensis, Lugd.  
 Genistæ rotundæ genus in Ilva, Cæs.  
 Cassia Latinorum, Guilandino.  
 an Spartum minimum montanum triphyllum,  
 Colum.

VI. Spartum sterile.  
 Sparti genus, in Hispania & Africa, juncus  
 propriè aridi soli, quod neque folium, neque  
 florem, neque semen fert, quo ad varia utuntur,  
 Guiland. pap.

## C O L U T E A.

**K**ολυτὴ Colutea, Liparia peculiari, inquit Theophrastus 3. hist. 17. arbor procera, fructum fert in siliqua,  
 magnitudine lentis, folium mittit sanograce non ab simile, &c.

I. Colutea vesicaria.  
 Colutea, Theophrasti, Trag. (cui vulgo Sena)  
 Dod. gal. (cui & Cyctisus Latinorum) Ges. hor.  
 Lob. Clus. hist. Tab. Ger.  
 Colutea F. ch. Matth. Lac. Lon. Dod. Ad. Cast.  
 Sena Mauritanorum, Ruellio.

Sena, Cord. hist.  
 Senna sylv. quibusdam malè, Gesn. hort.  
 Colutea, Senæ genus non est, cum nullas facul-  
 tates cum Sena communes habeat, Bellon.  
 Colutea vesicaria, Lugd. (cum duplici figura)  
 Cam. Eystert.

Emeri alterum genus, Cæfalp.

II. Colutea filiquosa sive scorpioides major. Colutea scorpioides, Ad. Lob. Lugd. Cæ. ep. Ger. Colutea scorpioides prima, Clus. pan. Tab. Colutea scorpioides prima elatior, Clus. hist. Emerus vulgo, Cæfalp.

III. Colutea filiquosa minor. Colutea scorpioides humilior, Clus. pan. Ger. Colutea scorpioides 1. humilior, Clus. hist. Colutea scorpioides 2. Tab.

IV. Colutea filiquosa minor coronata.

Colutea scorpioides altera, Clus. pan. & hist. Colutea scorpioides tertia, Tab. Colutea scorpioides montana, Ger.

V. Colutea scorpioides maritima glauco folio: in Prodomo descripta.

VI. Siliqua oblonga cinericea granis Coluteæ. Fructus minor 12. Paludani, Clus. exot. libr. 2. cap. 20.

## S E N N A.

**S**ennam, quidam Dioscoridis Delphinium, alij Pelecium, alij Peplium, alij Empetron, alij Alypon: alij Theophrasti Cercidem sive Coluteam tertiam, alij Colyteam primam esse putant: at rem novam veteribus Græci & Latini Scripserunt inditam, & à Mauritanis primò propositam à Serapione sub Sene, à Mesue, qui domesticam & sylvestrem facit, sub Senna, censemus: cujus, ex Græcis solum Actuarius meminit.

I. Senna Alexandrina, sive folijs acutis. Senna Alexandrina, Trag. Gesn. hort. Cam. epit. & hort.

Senna Orientalis, Ang. Bellon. Ad. Cæf. Tab. Ger. Senna Ægyptia sive Alexandrina & Syriaca, quæ præstantissima, Lugd.

II. Senna Italica sive folijs obtusis. Senna, Hermolao.

Senna Italica, Trag. Tabernæm. Adv. Gerard. Cam. ep. & hort.

Sena, Matth. Fuch. Dod. ut: Lac. Cord. histor. Lon. Lob. Cast. Lugd.

Senna altera, Aug. forte Androsace.

Senna altera media dicta, Bellon.

Senna communis & vilior, Gesn. hort.

Senna nostras, Cæfalp.

## B A R B A J O V I S.

**P**linius lib. 16. cap. 18. inter arbores, inquit, odit aquam & qua Jovis Barba appellatur, in opere topiario tonsilum: & in rotunditatem spissa, argenteo folio. Hujus Angustilla species duas facit, alteram de qua inter Cytiis egimus: alteram de qua in præsens.

Barbæ Jovis prima species, Ang.

Barba Jovis, Cæf. Cam.

Jovis barba, Lugd. Clus. hist.

\*\*\*\*\*

## S E C T I O S E C U N D A.

JASMINUM; SYRINGA; LENTISCUS; MOLLE; THURIFERA ARBOR; TEREBINTHUS; BALSAMUM; PISTACIA; STAPHYLODENDRON; Glans Unguentaria; Ceratia sive Siliqua; Cassia nigra sive Fistula; Tamarindus; Lobi & Fructus exotici.

## J A S M I N U M.

**J**asminum Arabes Zambach & Sambach Serapione auctore appellant, & Græcos imitari volentes, Jeseimin, à Jasmæ Græca voce. Jasmæ autem dicta fuit, quasi medicatus odor, aut immutata litera Jasmæ, quasi violæ odor.

Genera tria Serapio tradit: unum cui flos albus, alterum cui luteus, tertium cui caruleus: etiam rubro flore in Asiaticis hortis repertum, Clusium refert: Dalechampi punicum addit.

I. Jasminum vulgatius flore albo. Gelseminum vel Jasminum, Matth. Cast. Cam. Gesminum, Anguil.

Jasminum, Dod. ut: cui & Apiaria, Cord. in Dios. Jasmæ & Sambac, Gesn. hort.

Gelseminum vulgatius, Adv. Lob. Cæfalp. cui Smilax lævis Dioscoridis.

Jasminum album, Lugd. Tab. Ger. fl. albo, Eyf.

II. Jasminum humile luteum.

Gelseminum luteum, Adv.

Ddd 3

Jasmi-

Jasminum luteum, Lob. in ico. Tab. Ger. flore luteo, Eysl.

Gelseminum humilius alterum fl. luteo, Cæs.

III. Jasminum humilium magno flore.

Gesmini 3. species, Ang.

Chamægelseminum grandiflorum, Lob.

Gelseminum humilium primum, Clus.

Jasminum puniceum, Dalech. Lugd.

Gelseminum Catalonicum, Cam. ep. (sive Hispanicum) Eysl.

Jasminum candidum, Tab. majus, Ger.

Flos candidus est aversa parte rubens.

IV. Jasminum cæruleum, Serapioni.

Jasminum cæruleum, Tab. Ger.

In hoc genere cæruleum nondum vidimus: an Arabes Ligultrum Orientale, quod alias Syringa cærulea dicitur intellexerint, Cæs. alpinus dubitat: alij Clematidem cæruleam esse volunt.

V. Jasmin. luteum vulgo dictum, bacciferum.

Polemonium Monspeliensium, Gesfr. Ad. Leß, Lugd. Cam. Eysl.

Ruta capraria Gallorum Monspel. Gesfr.

Trifolium fruticosum, Dod. Tab.

Ruta baccifera sive trifolia, Tab.

Jasmini species trifolia non videtur a Polemonium accedere, Colum.

Folij ludit: nam licet communiter, præsertim si in hortis colatur, trifolium sit, attamen circa Monspeliolum aliquando unico folio reperitur.

VI. Jasminum millefolij folio.

Gelseminum alterum rubrum, Cæs.

Quamoclit, Cam.

Gelseminum Indianum pennatum flore sanguineo, Ponæ Ital.

Convulvulus pennatus exoticus, Col.

Quamoclit sive Jasminum Americanum, Clus. cur. post.

## S Y R I N G A.

Syringa licet Africum vocabulum videatur, aliquibus tamen à virgarum rectarum longitudine & inferiori medulla fungosa copia dicitur: vel potius quod ramuli exempta medulla fistulosi sint.

I. Syringa cærulea.

Lilac, Marthiol. (qui glandem unguentariam existimat) Adv.

Lillach, Dod.

Cauda vulpina Turcarum, Bellon.

Syringa cærulea Lusitanica, Lob. Eysl.

Syringa flore cæruleo, Clus. hisp. & hist. Lugd. Cam. Ger.

Syringa Lusitanica, Tab.

Ligultrum Orientale, forte Jasminum cæruleum Mauritanorum, Cæs.

Ostryam Theophr. 3. hist. 10. esse aliqui volunt, auctore Lugd. historiz monente: est Ostrya, inquit, quam nonnulli Ostryam vocant, unica species Oxyæ (Plin. l. 13. c. 21. *ὄξυς*, id est fraxino, legit) tum sativum, tum cortice similis: folio pyrorum, multo oblongiore, in acutum contractiore & majore, fibris multis & crassis, à medio dorsi in modum costarum recta secundum magnam fibram porrectis, in fibris ipsis rugato & in ambitu leviter serrato, materie dura, decolor albida: fructu parvo, oblongo, hordeo simili, flavo: radices sublimes habet. Idem ferè Plinius.

Variat floribus colore, qui communiter cæruleus: aliquando cinereus & quasi argenteus: hinc figuræ duæ apud Eysl. nomine Syringæ flore lacteo & flore cæruleo.

II. Syringa Arabica folijs mali arantij.

Sambac Arabum sive Gelseminum Arabicum, Alpini.

Jasminum Arabicum sive Syringa Arabica, Clus. cur. post.

III. Syringa alba sive Philadelphus Athenæi.

Syringa, Dod. Cæs. alba, Tab. Ger.

Syringa flore albo, Clus. hisp. Lugdun. (quam Ostrya Theophr. volunt, quod Clusius negat) odorato, Cam.

Syringa Italica, Lob. Eysl.

Frutex coronarius, Clus. hist.

Flore communiter est simplici, rarius pleno, quare Syringa Italica flore albo pleno, & Syringa flore albo simplici, apud Eysl.

IV. Syringæ albæ affinis.

Fructus miscellaneus undecimus, Clus. exot. lib. 2. cap. 21.

## LENTISCUS ET MOLLE

Lentiscus fortasse dictus, quod folia lentore quodam lentescant: *ῥιζο* Dioscoridi l. 1. c. 19. quasi *ῥιζο* sibi illi, quod facile & frequenter in lentiscis alpiis findatur: quod & Diosc. tempore seditatum, qui arborem ut notam non describit, sed ejus resinam quam *μαγνίν* nominari ait: de qua inser Resinas. Hujus baccas Hippoc. de nat. mulieb. *ῥιζίδας* (non *ῥιζοιδας*) appellat.

I. Len-



I. *Lentiscus vulgaris.*

*Lentiscus*, Matth. Ang. Dod. ut : Bell. Lac. Lon. Ad. Clus. Lob. Cxf. Lugd. Cast. Rauvolf. *Lentisci* in Chio similes sunt ijs qui in Gallia Narbonensi & Italia nascuntur: solæ tamen quæ in Chio Maltichen præbent, Bellon. obs.

II. *Lentiscus Peruviana.*

Molle, Clus. in Monardem, Lob. & lib. de Bals. Cam. Ger. Colum. addens, quod si in Creta nasceretur, pro Tragio supponi posset. Mollis, Cast. arbor, Tab. Molle arbor, Lugd. & hist. Ind. Occid. p. 9. lib. 4. c. 30. quæ in Moxu vocatur arborex Peru, quod hinc primum alio translata sit. Moly, molle & muelle, Frag.

Variat folijs, quæ in tenella dissecta: in adultâ nec incisa, nec crenata sunt, quemadmodum ramus adultioris arboris in Matthiolo nostro, & Clus. cur. post. exhibetur. Uvæ quoddam genus producit, unde Indi vinum premunt, Ind. Occid. l. c.

III. *Arborexotica folijs alatis.*

Juvv apud Amazones nascens, Clus. exot. l. 4. cap. 14.

IV. *Arborexotica I lentisci folijs.*

Moringa, Acoltæ, Cast. Lugd.

F. uctus raphani crassitie, radix unicorni vi-

ces supplet, & us in Theriaca usus est.

V. *Arborexotica spinosa folijs lentisci.*

Bonduch Indorum, Ponæ Ital.

Fructus peregrinus primus, Clus. l. 2. exot. c. 30.

Lobus *exotici*, Clus. exot. l. 3. c. 15.

Mates Indorum cineticei coloris, id est, Legumen Indicum, Eid. & Ponæ.

Eructus peregrinus prior, Clus. exot. l. 2. c. 30. & in tab. 2. Lugd. Tab. Ger.

Hujus fructum Milij Indici primum, dein Bonduch nomine à Ponæ, Veronâ accepimus, qui Avellanae magnitudine, durissimus, splendens & cineticei coloris.

Ex Brasilia, Java, & Virginea etiam Pisorum nudorum nomine multi adferuntur.

VI. Lobus orbicularis fuscus spinosis tuberculis oblitus, binos phaeolos nigros continens.

Fructus quartus qui Indis Samparantam, ex navigatione. Batau. Clus. exot. l. 2. c. 15.

Lobus echinatus Molucensis, Ponæ Ital.

an Samparanton radix valida & amara quæ in Sunda nascitur, in Ind. Or. par. 4. c. 8. hujus arboris radix est?

VII. *Arbor Malabarensum fructu Lentisci.* Pauate, Acoltæ, Lugd. Cast. ap.

Arbor erysipelas curans, Lusitanis.

## THURIFERA ARBOR.

**T**hurifera arbor, Græci *λίβανος* & *διονόρη λίβανος*: quemadmodum lachryma *λίβανος*, quæ Hippocrati *λίβανος* *καρπός* dicitur: *λίβανος* à *λίβω* stillo: licet Græci fabulentur à juvene Assyrio huius nominis, quod Deos studiosissime coleret, ab invideo occiso & in hunc fruticem converso dici. hinc Dysthure gratius nihil esse. Loran Arabibus: de qua sic Theophrast. l. 9. hist. 4. arborem nonnuquam qua quinsere cubitus attollatur & ramosani ferunt, folio pyri sed multo minore, coloris herbacei ut Rura, cortice levi Lauri modo: 4. hist. 6. in Arabia, Syria, India nascitur: 9. hist. 2. sub cano & ferventissimâ diebus incidi referunt: 9. hist. 3. & tam sponte quam incisa rhus prodire posse. Idem 9. hist. 4. alibi thuri arborem lentisco similem producere, & fructum quoque lentisci solum subtristulum: Idem folia Lauri & Lavæ tribuit. At Garzia, arbor est humilis, folia lentisco similis habent, & Arabia peculiari: Theveti pinu resuiferi similis. Non solum ipsius lachryma in usu fuit, sed & cortex arboris apud Diosc. l. 1. c. 82. & *μαύρα, manna thuri* c. 83. & *αίδια* suligo c. 84. Vide inter Resinas.

Duplex est: alia montana, alia in planis nascens Garzia, Fragofo.

Arbor thurifera Theveti, Lugd.

Thuris limpidi folium, Ad. Lob. ico. Lug. Tab.

pingunt: & Taber. arboris caudicem cum Stagonia thure adpingit.

## TEREBINTHUS.

**T**erebinthus, Græci *Τερβινθος* nominatur, quam Dioscorides l. 1. c. 9. velut arborem cognitam non descriptis. Theophrast. l. 3. hist. 15. alia mascula est, alia femina: & mascula quidem sine fructu: semmatum altera fructum statim rubentem edit, lentis magnitudine, qui coqui nequit: altera viridem *ῥεζακον* Plinius pallidum l. 13. c. 6. vocat) deinde rubentem & cum vite maturescens, tandem nigri saba magnitudine, resinosam, odore junundore, &c. st. olea similis, rubens: folia in uno pediculo multa, Laurum similia, bina velut

veluti Sorbo, in summis ramis colorum partibus imparia, nisi quod minus angulosa quam Sorbo, & ambigua laurini similia, pinguis cum toto fructu: fert & illa folliculos quosdam cavi ut Ulmus, in quibus animalcula culicibus similia nascuntur. Et 4. hist. 5. Terebinthi Indica meminit. Plinius l. c. sed brevius de ea egit. Resina terebinthina ex hac colligitur, de qua cap. de Resina.

### I. Terebinthus vulgaris.

Terebinthus foemina altera Theophrasti.

Terebinthus, Math. Dod. ut: Cord. in Diosc. & hist. Turn. Lac. Lon. Clus. hisp. & hist. Lob. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Terebinth. minor in Lombard. & Hetruria, Ang.

Terebinthus lentiscifolia minor, Ad.

Terebinthus vulgaris, Rauvolf.

II. Terebinthus peregrina fructu majore Pistacijs simili, eduli.

Terebinthus major cuius fructum Arabes Botn quibir appellant, Rauvolf.

Terebinth. nostras Juglandes æquans, Bell. cult.

Terebinthus major pistaciæ folio, Ad. Lob.

Terebinthus Indica major Theophr. ex Rauvolf. Lugd. ap.

Terebinthus latifolia, Tab. Ger.

Terebinthi majus genus ad Terebinth. Indicam Theophr. & Fael Serap. Avicen. & Rhasis referri potest, Clus. hist.

Folijs oblongiusculis à Pistacijs, quæ rotundiora habet, & fructu sive nuce breviora & rotundiora differt, quo inquilini, perinde ut nos Avellani vescuntur.

Gallarum genus quoddam nucis ponticæ magnitudine, Terebinthi arbores in Thracia & Macedonia producunt, quarum apud Turcas usus est, tenuissimis sericeis pannis inficiendis, Bellon. obs.

III. Terebinthus peregrina fructu minore & cæruleo, eduli.

Terebinthus Syriaca, Theophr.

Terebinthus in Cilicia & Syria Bellon. obs.

Terebinthi peregrini alterum genus, Clus. notis in Bellon.

Terebinthus minor, qui Arabibus Botn soughier dicitur, Rauvolf.

Terebinthus in Mesopotamia & Armenia, Eid.

Terebinthus minor, qui ad Bel Arabum referri potest, Clus. hist.

Et hujus fructus, qui cum suo cortice Piso majori æqualis est, perinde ut nos Pineos nucleos comedunt: quo & Persæ plus quam bis mille annis ante panis usum vitam sustentarunt, & etiamnum totius Syriæ incolæ ijs cum pane vescuntur: & propter colorem inter viridem & cæruleum medium, Arabes veteres, Granum viride, Bellonio attestante, appellantur.

## B A L S A M U M.

**B**alsamum, Βάλανος Dioscoridi l. c. 18. arbor Lycij seu Pyracanthe magnitudine conficitur: folia habet rufa proxima, sed candidiora multo & perpetuo magis virentia, & c. qui & ἰσχυρὸν, ὑποδακνόν, ἢ παρὴν, sive succum, lignum & fructum commendat: & vim efficacissimam balsami liquori tribuit: proximum fructui, minimum vero ligno. Et Theophrasto 9. hist. 6. arborum magnitudo qua malo punica magna, rami multi, folium ruta simili, candidum tamen, perpetuo virens, fructus similis terebintho tam magnitudine, quam colore, valde odoratus & Lacrymā ipsā odoratior, & c. Plinius lib. 12. cap. 25. quadam alia scribit, alia ex viroque mutuam videtur.

### I. Balsamum Syriacum rutæ folio.

Balsamum, Mat. Lac. Ad. Col. Cast. Cæs. Alpino, Hon. Belli ep. 7. ad Clus. Liqueur ejus Opobalsamum & Balsamælaon, de quo & Cord. hist.

Balsamum lentisci folio Ægyptiacum, Bello-nius obs.

Carpobalsamum veterum flavum.

Carpobalsamum & Cassamum verum, Cord. in Diosc. & hist. Cæs.

Lignum Xylobalsamum, Cæs. sunt aliquando festuæ tenues, quæ cum Carpopalsamo adferuntur,

At Terebinthus geminus, omnibus partibus, liquori, ligno & semini succedaneum esse potest.

Fontem esse in Sumatra Insula, qui Balsami pretiosissimi oleo scaturiat, Linscot. par. 2. Ind. Or. 21. scribit.

II. Carpopalsamum nigrum Alexandrinæ

Semen Hyperico simile, quod, à Petra Palæstinae

oppido etiam Dioscorid. tempore adferebatur.

Carpobalsamum non legitimum, Matth.

Carpobalsamum offic. Cord. in Diosc. (qui addit, aliquando inter ea reperiri adulterinis granis

majora, odoris & saporis suavisissimi) Tab.

Balsa-

Balsami veri fructus, Alpino.

III. Xylbalsamum officinarum.

Myrrum porius quam Balsamum refert, Matth.

Alterius fructus furculi, quamvis aliquando inter eos mirum in modum odoris & saporis gratia commendabiles reperiantur, Cord. in Diofco. & hist.

Xylbalsam. vulgo nuncupatum, quod ex felici Arabia deferretur cum Ægyptio convenit. Bel. ob. Lignum Balsami ex Arabia felici, Linfcor. par. 2. Ind. Orient. 7.

IV. Balsamum Indicum, ex arbore Punica malo majore Xylo dicta, folijs Urticæ.

Balsamum Indicum novum, Matth.

Balsamum ex nova Hispania Lacun.

Balsamum ex Occidentali India, Monard. Lug. & Ind. Occid. p. 9. l. 4. c. 28.

Balsami genus novum, Cæf. Frag.

Hujus genus limpidum, quod pura est ex stilans lacryma, opobalsamum vocant: aliud imperfectius, quod ex ligno, cortice & folijs expressum est, aut ignis vi prolicetur, quod Xylbalsamum appellatur, Ind. Occ. l. c.

V. Balsamum fructu racemoso ex Hispaniola. Balsamum novum ex Hispaniola, Auctori hist. gener. Indiæ, Lugd.

Ex planta sponte nascente arboris magnitudine folijs amplis (quale Lug. hist. exhibet) sex digitis longis, 4. cum dimidio latius, elicitur.

VI. Balsamum Americanum.

Balsamum aliud ex Americæ continente, Lug. Ex arbore vasta, ramosa fructu pisi magnitudine filiqua digitum longa inclusa, quæ pingitur nomine Fructus balsami Monardis, Lugd.

Lobus oblongus aromaticus, Clus. exot. l. 4. c. 18.

Balsami Peruanum fructus, Pona; Clus. cur. post.

Balsamum quod ex India occidentali adfertur primum in Hispaniola invenitur: arbor unde elicitur Goaconaz ab indigenis vocatur, Ovied. hist. Ind. l. 10. c. 17.

Balsamum ex Nicaragua, Benzoni, Ind. Occid. part. 5. cap. 15.

an Balsamum ex Gueana, Ind. Occid. p. 8.

VII. Balsamum Tolutanum folijs Ceratiæ similibus, quod candidum est.

Balsamum de Tolu, Monardi, ex Insulis Tolu, Ind. Occid. q. 9. l. 4. c. 28.

Balsamum Tolutanum ex arboribus pumilibus pinis similibus, Lugd. ap.

an Balsam. album Curcas vocatum, Ind. occ. p. 8.

VIII. Frutex Indiæ Orient. Lavendulæ folio, Arbor Lavendulæ folio, Clus. exot. l. 1. c. 5.

## P I S T A C I A.

**P**istacia Diofcor. l. 1. c. 177. in Syria gignuntur pincis nuncibus similia. Theoph. 4. hist. 5. ferunt & in India Terebinthum esse arborem alteri terebintho similem, cujus folia, rami & reliqua omnia, terebintho similia; fructus autē diversus, similis enim amygdali. non magnus sed aspectu similis & suavitare amygdali præstantior.

I. Pistacia peregrina fructu racemoso, si ve Terebinthus Indica, Theoph.

Pistacia, Matth. Ang. Tur. Lac. Cord. in Diofco. & hist. Lon. Dod. Lob. Cæfalp. Cast. Cam. Tab. Ger. Eyst.

Pistacium, Gef. hort.

Terebinthus Indica Theophrasti, Ad.

Pistachia, incolis Fisluc, Rauvvolf.

Pistaciarum arbor, Dod. gal. Lugd.

Fructus dicuntur *πιστακια*: Nicandro *πιστακια*: Popsidonio, monente Athenæo, *πιστακια*: Latinis Pistacia: officinis & barbaris Fisticia.

II. Arbor exotica fructu racemoso, Charamais dicta.

Charamais & Ambela, Acoftæ, Lugd. Cast.

Do genera, unum pyrifolio, alterum malo minore fructu avellanæ acido.

III. Pistacia sylvestris.

Staphylodendron Plinij, lib. 8. c. 16. est & trans Alpes arbor similima aceri, alba materia, quæ vocatur Staphylodendron: fert filiquas & in ijs nucleos sapore nucis avellanæ.

Nux vesicaria, Trag. Dod. Ger.

Staphylodendron, Matth. Bellon. Ad. Lob. Lug.

Cam. Tab. Plinij, Dod. gal. Gef. hort. Eyst.

Arbor vitis & Lacryma Joppi, Ang.

Pistaciorum species, Scaligero in Aristot.

Pistacia Germanica, Lon. sylvestris, Cast.

Coulcoul & Hebulben Turcarum, Matth. epist.

Ar Bellonio obf. Hebulben semina sunt in officinis Turcarum venalia, quæ nobis in usu non sunt: quemadmodum nec Nux quædam gemini punji magnitudine, parvis granis efusi apris, avellanæ instar dulcibus, plena, quam Coulcoul, hoc est, nucem de Coulcoul nominant.

Ex fructu sphærulæ precatoriarum sunt.

## GLANS UNGUENTARIA.

**G**lans unguentaria, Balano & μωρῶν Dioscoridi l. 4. c. 134. fructus est arboris Myri. a simili, magnitudine nucis Avellanae, cujus interior pars expressa, veluti amygdala amara humorem emittit, quo ad preciosa unguenta pro oleo utuntur: at Theophr. 4. hist. 1. 622 & simpliciter: Balano, inquit, a fructu nomen inditum: folium ejus Myri simile est, sed oblongius, fructus magnitudine & aspectu capparis fructus similitudo, cujus corticibus confectus unguentarij utuntur, &c. Hac unguentaria nomine a ceteris glandibus distinguitur, quod ea unguentarij plurimum utantur. Plinio libr. 12. cap. 21. Myrobalanus Troglodyten nascentis unguento, ut ipse nomine apparet, fructus magnitudine avellanae nucis, &c. Arabes Habel, Ben & Granum ben nominant: inter quos Mesjes qui duplex facit, aliud Ben magnum ut Avellana, quod Monardes Avellanae purgatrices esse vult aliud parvum Ciceri magnitudine: ex quo Monardes monente, Itali oleum de Ben conficiunt.

Glans unguentaria, Matt. Lac. Cord. in Dioscor. Clus. in corol. Dodonæi, Lugd. Cæs. Granum ben, Lon. Balanus myrepfica, Pharagon incolis ad montem Sinai, Bellon.

Maxalep album, Rauvvolf. Glans unguentaria cathartica siliquata, Adv. Lob. icon. Balanus myrepfica, Cord. hist. Tab. Ger. Pon. Ben parvum, Monardi.

## CERATIA SIVE SILIQUA.

**K**eratium, id est, siliqua, a corniculorum similitudine, à Dioscoride l. 1. c. 135. qui etiam non descripsit: a Galieno & Aegineta verò μωρῶν, quasi cornuta siliqua, hac arbor appellatur: a recentioribus Graecis λυγροcerata: Arabibus Charnub: à Plinio l. 15. c. 24. Siliqua (quia semen fert in siliqua leguminum modo) de qua hac: band procul abesse videntur & praduces Siliqua, nisi quod Cortex in ysmanditur: digitorum hominum longitudo illi, interim falcatis pollicari latitudine, &c.

## I. Siliqua edulis.

Siliqua, Matt. Ang. Tur. def. Cord. in Dioscor. Ges. hor. Lac Lon. Rauvv. Cast. Cam. arbor, Cæs. cui & Ceronia Theophr. Siliqua sive Ceratia, Bellon. Siliqua dulcis Alpino. Ceratonia, Dod. ut: Ges. hor. Lugd. Frag. Cerata vel siliqua, Ad Lob. Tab. Ger. Clus. hisp. siliqua μωρῶν, Eid. hist. Ceraunia siliqua Theophr. 4. hist. 2. & Plin. l. 13. c. 8. Dalech. in Plinium: at hist. Lugd. auctor diversam facit. Fructus μωρῶν, siliqua, vulgo Carobe nominatur: cujus semen sex grana pendens, ponderis illi auri quod Karat dicitur, nomen dedit.

## II. Siliqua purgatrix.

Caroba sive Sili. ex Guinea purgatrix, Pon. Ital.

## III. Siliqua sylvestris rotundifolia.

Arbor Judæ, Bellon. (quæ Græcis vulgo Couchias) Ges. hor. Dod. Ad. Lob. Rauvv. Lugd. Tab. Cam. Ger. Eyst. Fabago sive siliquastrum, Bellon. Ges. hor. Ceratia agrestis, Eid. Siliqua syl. Bellon. Clus. hisp. & hist. Cam. ep. & hor. Cæs. cui Cercis Theophr. Siliquastrum & Siliqua sylv. & satua, & arbor amoris, Cast.

Quibusdam Cercis siliquata Theophr. 1. hist.

18. alijs Colytea tertia Theophr. 3. hist. 14. quibusdam Laburnum vel ejus species.

Acacia vera Matth. quibusdam videtur, quam spinis horridam pingit, quas commentitias suspicantur.

Flores eleganter purpurei, quandoque albi & cortice candicante.

## IV. Siliqua sylv. rotundifolia Indica.

Semen nummi instar rotundum planum denarij magnitudine, crassiusculum, rufum, à Rev. D. Terentio ex India accepti, cum hac inscriptione: Semen numulariæ est arboris Judæ Indicæ, cujus flos magnus elegans & odoratus est.

## V. Siliqua sylv. spinosa arbor Indica.

Coral arbor, ob flores colore Corallij æmulos, Clus. append. 1. hist. plant. & append. altera ad appendicem primam.

an Acacia prima, Matthioli & Lugd.

an Acacia major, Cast.

## VI. Siliquæ sylv. similis.

Acacalis, vel Syriacæ Kismisen sive Sisme, Cam. Acacalis Kismesen, Bellon.

an Acacia Dioscoridis, Rauvvolf.

Semen hoc Cairine & Kismisen nomine à Doct. Paludano ex Syria reduce an. 1579. P. tavij accepimus: an Dioscoridis Acacalis? cum hæc nostra

nostra folijs rotundis enata sit. Dioscoridi verò quod antenus similis. Valer. Cordus in Diosc. non  
 l. i. c. 118. & ex eo Æginetæ ἀκινάδις, fructus sit cognosci scribit, nisi aliquis ex Myrobalanis  
 fruticis in Ægypto nascentis, myricæ fructui Emblicis sive Belliricis hunc esse exilimet.

## CASSIA NIGRA SEU FISTULOSA.

**C**assia Fistula ab Arabibus inventa est, & à recentioribus Græcis, ut Aduartus, κασσία μέλαινα κασιπαίνη.  
 Fabam Indicam veterum, ut Aristobolus, Valerius Cordus credidit. Siliquam Ægyptiæ Theophrasti i.  
 hist. 18. nonnullis censent.

## I. Cassia fistula Alexandrina.

Cassia solutiva sive Ægyptia siliqua, Matth.  
 Cassia fistula, Dod. gal. Lac. Cord. in Diosc. Gesn.  
 hort. Cast. Alpino, Frag. Tabern. Ger. Pigafette  
 desc. regni Congiani & Ind. or. p. 1. & 4.  
 Cassia fistula laxativa, Lon.  
 Cassia solutiva, Bellon. Monard. Garziæ, Lin-  
 scot. p. 4. Ind. or. fig. 17.  
 Cassia stercorearia, Guiland. pap.  
 Cassia nigra, Dod.

Siliqua Ind. veterum, Cord. hist. Ind. Gesn. hor.  
 Canna fistula seu fistularis, Linsf. p. 4. Ind. or. c. 57.  
 Cassiam quæ hujus arboris fructus est, Ægyptij  
 Chaja-ar-xambar vocitant, Paludanusi Linsf.  
 Siliqua aut Cassia purgatrix Arabum, Ad. Lob.  
 Siliqua sive Cassia cathartica, Lugd.  
 Cassia, siliqua Ægyptia Theoph. videtur, Cæs.  
 Cassia Ægyptia live purgans, Cam.  
 Canna fistula, Acoftæ.  
 Canna fistula sive Cassia: Joseph. Acoftæ, lib. 3.  
 cap. 22. quæ in Hispaniola copiosissima: Idem  
 lib. 4. cap. 29.

Eligenda fistula insignis, plena, gravis & re-  
 cens, & quæ concussa, inclusis seminibus mi-  
 nime contreat, splendens, foris ac etiam in  
 pulpa pinguis: florem (quæ non antequam  
 extrahi debet) florem Cassiæ & Cassiam ex-  
 tractam vocant.

## II. Cassia fistula Brasiliana.

Cassia siliqua Brasiliana purgatrix compressa,  
 Lob. in pharm. Rondel.

Hæc ex Brasilia advehi cepit, cujus pulpæ  
 uncia una, plus quam uncia duæ alterius Æ-  
 gyptiacæ, purgat.

## III. Cassia Arabica, quæ Tamarindus.

Arabicam vocamus, eò quod ex Arabia in  
 Indiam aliasque regiones deferatur: à quibus

Tamarindus nominata, quasi dicas Dactylos  
 Indos, sive Palmulas Indicas: Tamar enim  
 illis Dactylum significat: licet arbor Palmæ  
 similis non sit, nec ex Palmarum generibus,  
 nisi ad fructus effigiem, quæ dactylum sive di-  
 gitum influxum refert, respexerint. Sunt qui  
 velint Plinium lib. 12. cap. 6. de hac intelligen-  
 dum esse, cum inquit: est & alia similis huic  
 (Palmæ scilicet) dulcior pomò, sed interaneorum  
 valetudini infesta.

Tamarindi, dactyli Indici } Mesuæo, Lac. qui à  
 Palmæ syl. Indicæ fructus: }  
 Palmuli. Thebaicis non differe vult.

Tamarindus Serapionis, Cæs.  
 Tamarindus Matth. Bellon. Garz. Acoftæ, Frag.  
 Lob. qui ad arboris perperam Oxyphœnicum ap-  
 pellari, Lugdun. qui in ap. & alteram figuram  
 Acoftæ exhibet.

Tamarindus, id est, Acacia Indica, Cord. hist.  
 Palmæ syl. fructus Oxyphœnica, Lonic. Cast.  
 cum ficta figura.

Tamarindi, Cam. ep.

Tamarindus Derelside appellata, Alpin.

Tamarindus, Puly & Ambisy Indis, Linscott  
 Ind. or. p. 4. c. 37.

Alia sive Tamarindus: par. 4. Ind. or. fig. 15.

Folliculi recentes, cum melle aut Saccharo  
 in India condiuntur: ex substantia incinctum  
 (Caryl vocant) parant, cum cibis utendum.

IV. Tamarindis simile semen spadicum  
 dentatum.

Fructus alicujus semen num. 20. à Gareto, Clu-  
 sio exot. lib. 2. cap. 16.

V. Tamarindo similis frutex.

Que illos frutes folij Tamarindi, fructu ut fabæ  
 Romanæ subduplo longiore, quo in cibis u-  
 tuntur: par. 4. Ind. or. 8.

## DE LOBIS.

**E**t si Dioscorides Smilacii hortensis fructum λέβη, quasi siliquula dicat, vocari, eamque ob causam de Lobis  
 post Pbafeolos dicendum videretur, tamen cum alij sint Lobis, qui arborum fructus sunt, de alijs verò non  
 satis constet, placuit de omnibus hic agere, usque dum certum quid cognoverimus.

I. Arbor siliquosa Juglandis folio Brasili-  
ana, lobo longissimo Acaciæ siliquæ instar di-  
stincto.

Lobus Brasilianus ingens, Clus. exot. l. 3. c. 1.

Lobus cineraceus binos pedes Romanos  
cum triente longus, quatuor uncias latus: se-  
mina ex albo rufescentia pene orbicularia, nu-  
ci vomica non admodum dissimilia.

II. Arbor siliquosa Brasiliana lobo latissimo.  
Lobus Brasilianus alter, Clus. exot. l. 3. c. 2.

Hic Lobus, duplex est: major ex fuscocine-  
raceus, octo uncias longus, quatuor cum semis-  
se latus, semine quasi quadrangulo: alter mi-  
nor, ex fusco rubescens, semine citrij mali se-  
mini non valdè dissimili.

III. Arbor siliquosa ex Virginea lobo fusco  
scabro.

Lobus ex Wingandecaovv, Clus. exot. l. 3. c. 3.

In hoc osicula verius, quam Phaseoli, nigra,  
dura, Avellanæ magnitudine.

Hic duplex est: alius ex Virginea fuscus,  
quinque vel etiam sex uncias longus, duas vel  
duas cum semisse latus, unam crassius. Alius ex  
insula Hayti sive Isabellæ vicinia, spadicei colo-  
ris, septem uncias longus, tres cum semisse latus.

IV. Arbor siliquosa ex qua gummi Anime  
elicitur.

Lobo ex Wingandecaovv similis, Clus. l. c.

an Guama Oviedi horum duorum alteruter.

V. Arbor siliquosa lobo quadrangulo fusco.  
Lobus peregrinus quadrangularis, Clus. exot.  
lib. 3. cap. 5.

Lobus sulcis distinctus, septem uncias lon-  
gus, binas latus.

VI. Arbor siliquosa Africana, folijs fere pyri  
semine fabaceo.

Phaseolus quintus peregrinus, sive Phaseolus  
Coles, Clus. exot. l. 3. c. 7.

Siliquæ candidæ, phaseolis longiores &  
maiores: semina albo putamine ablato minij  
colorem habent & siccata in binas partes spon-  
tè finduntur.

VI. Fructus oblongus cineraceus rugosus  
& gibbosus.

Fructus ex Bengala ad Coles accedens, Clus.  
exot. l. 2. c. 4.

VIII. Fructus compressus quadrangulus  
venis candicantibus & nigricantibus, ut Coles  
fructus distinctus.

Fructus 6. Paiduyni, Clus. exot. l. 2. c. 12.

IX. Lobus orbicularis fuscus spinosis tu-  
berculis obfitus, binos phaseolos nigros con-  
tinens.

X. Arbor siliquosa Guinenis lobo spadiceo,  
fusco.

Lobus ex Guinea, Clus. exot. l. 3. c. 4.

Lobus decem uncias longus, tres latus, grana  
dura ex spadiceo fusca, medulla tetri odoris.

XI. Arbor siliquosa Guinenis, fructu faba-  
ceo, lobo longissimo.

Lobus fabæ arboreffcentis, Clus. exot. l. 3. c. 6.

Lobus nigricans & fuliginosus, uncias no-  
vendecim, vel viginti longus, tres latus, pha-  
seolos septem, binas uncias cum semisse lon-  
gos, semunciam latus, planos, ex spadiceo ni-  
gricantes & splendentes continens.

an Arbor fabas majores proferens, par. 6. Ind.  
Orient. tab. 14. lit. H.

XII. Lobus cortice cartilagineo, rugoso,  
fusco, duplici crista sinuosa donatus.

Lobus primus cartilagineus ex insula Mauritij  
3. Clus. exot. l. 3. c. 9. & 10.

Hic vel uncias quatuor cum semisse, vel tres  
longus, binas latus; ille tres, hic duos phaseo-  
los orbiculates ex puniceo nigros, veluti annu-  
lo cinctos, eosque duos continet.

XIII. Fructus subrotundus durus elegan-  
ter rubens.

Fructus peregrinus 10. Mates nomine acceptus,  
Clus. exot. l. 2. c. 30. & tab. 3. Lugd.

XIV. Lobus cortice membranaceo, atro  
tumido.

Lobus niger primus turgidus, Clus. exot. lib. 3.  
cap. 18.

Hic uncias binas longus, unam latus, semina  
nigra, plana, Acaciæ fructu similia continet.

XV. Lobus membranaceus atropadiceus,  
planus Guinenis.

Lobus niger 2. planus, Clus. l. c.

XVI. Lobus quadrangularis, Clus. exot.  
lib. 3. cap. 17.

Hic ex fusco fuliginosus, grana quadrangula,  
in binas partes dividua continet.

XVII. Lobus aromaticus subfuscus Tere-  
binthi corniculis similis.

Lobus oblongus aromaticus, Clus. exot. lib. 3.  
cap. 18.

Hic sex, septem, etiam octo uncias longus,  
vix semunciam latus, tenuem postinem ni-  
gium tenuem, Benzoini seicè odore, continet.



## FRUCTUS EXOTICI

**F**ructus exoticos plurimos Clusius proposuit, plurimos etiam à D. Jacobo Gaillio Amstelredam: ante octennium accepimus: quos quantum licuit in aliquem ordinem digestimus, aliquos ad arbores quibus consimiles sunt, vel saltem fructu, retulimus: alios verò ratione formæ distributos, hic recensemus.

*Fructus rotundi & orbiculares.*

I. Fructus magnus ex rotunditate compressus, cortice rugoso fusco.

Fructus crassus peregrinus, Clus. exot. l. 2. c. 7.

II. Fructus rotundus cortice fungoso subpurpurascens.

Fructus 1. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

III. Fructus orbicularis spadiceus lævis.

Fructus miscellaneus 3. Clus. exot. l. 2. c. 25.

IV. Fructus orbicularis fuscus, nucleo cineraceo.

Fructus miscellaneus 4. Clus. exot. l. 2. c. 25.

V. Fructus orbicularis flavus maculâ subfusca notatus.

Fructus peregrinus 6. Clus. exot. l. 2. c. 29. Lugd. Tab. Ger.

VI. Fructus orbicularis spadiceus nucleo duro.

Fructus exoticus 4. Clus. exot. l. 2. c. 19.

VII. Fructus orbicularis ex rufis nigricans.

Fructus peregrinus 3. Clus. exot. l. 2. c. 30. & in tab. altera, Lugd. Tab. Ger.

VIII. Fructus orbicularis fuliginosus.

Fructus 15. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

IX. Fructus orbicularis ater & acidus.

Fructus peregrinus acidus saporis, Clus. exot. l. 2. c. 13.

X. Fructus orbicularis cinericeus ut Chamaeriphus nucleus.

Fructus 12. navigat Botau, Clus. exot. l. 2. c. 15.

XI. Fructus orbicularis Arantij forma cineraceus.

Fructus minor 7. Paludani, Clus. exot. l. 2. c. 20.

XII. Fructus rotundus parvus putamine spadiceo flavescens, nucleo subacido.

Fructus 7. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

XIII. Fructus orbicularis compressus cineraceus.

Fructus minor 1. Paludani, Clus. exot. l. 2. c. 20.

*Fructus orbiculares sulcu nervisque distincti.*

I. Fructus orbicularis major fuscus striatus.

Fructus orbicularis peregrinus 1. Clus. exot. l. 2. c. 9.

II. Fructus orbicularis minor cineraceus striatus.

Fructus orbicularis peregrinus 2. Clus. exot. l. 2. c. 9.

III. Fructus orbicularis subniger & splendens sulcis distinctus.

Fructus 1. à Walachria, Clus. exot. l. 2. c. 22.

IV. Fructus alter splendens quatuor sulcis distinctus.

Fructus 9. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

V. Fructus orbicularis in summo lineâ trigonâ distinctus.

Fructus 10. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

VI. Fructus orbicularis Arantium sicum referens, quatuor venis distinctus.

Fructus 2. Jacobi Plateau, Clus. exot. l. 2. c. 19.

VII. Fructus orbicularis fuscus senis nervis distinctus ex Guinea.

Fructus orbicularis peregrinus 3. Clus. exot. l. 2. c. 10.

VIII. Fructus orbicularis spadiceus novem venis distinctus major.

Fructus peregrinus orbicularis nervis distinctus 1. Clus. exot. l. 2. c. 10.

IX. Fructus orbicularis minor novem venis, ut & semen, distinctus.

Fructus peregrinus orbicularis nervis distinctus 2. Clus. exot. l. 2. c. 10.

*Fructus figura oblonga ovali.*

I. Fructus ovi anserini magnitudine fusco cinereus.

Fructus peregrini pulpa, Clus. exot. l. 2. c. 13.

II. Fructus ovi anserini forma.

Fructus orbicularis peregrinus 3. Clus. exot. l. 3. c. 9.

III. Fructus ovalis fuscus nucleo avellanæ simili.

Fructus 2. à Gareto, Clus. exot. l. 2. c. 16.

IV. Fructus ovalis putamine crasso fibroso.

Fructus 3. à Gareto, Clus. l. c.

V. Fructus ovalis fuscus.

Fructus miscellaneus 1. Clus. exot. l. 2. c. 25.

VI. Fructus ovalis lapidi Judaico similis ex rufis nigricans.

Fructus peregrinus alter, Clus. exot. l. 2. c. 3. & in tab. 2. Lugd. Tab. Ger.

VII. Fructus olivæ ofsiculum referens.

Fructus minor 5. Paludani, Clus. exot. l. 2. c. 20.

VIII. Fructus ovalis spadiceus.

Nux peregrina 2. Clus. exot. l. 2. c. 13.

IX. Fructus oblongus fuscus striatus.

Ecc 3

Fructus

Fruſtus exoticus 3. Cluſ. ex. l. 2. c. 24.

X. Fruſtus oblongus arcuatus fuſcus.

Fruſtus 1. è navigat. Batav. Cluſ. ex. l. 2. c. 15.

XI. Fruſtus oblongus fuſcus ſplendens.

Fruſtus 1. Simonis Tovar Coxco cypote, id eſt nux ſive oſſiculum Cypote, Cluſ. ex. l. 2. c. 18.

XII. Fruſtus oblongus cineraceus nervis craſſis.

Fruſtus 3. Parduyni, Cluſ. ex. l. 2. c. 22.

XIII. Fruſtus oblongus cineraceus acidulus.

Fruſtus 12. & Oregioella, ex quo Cacao potio- nem conficiunt, Cluſ. ex. l. 2. c. 16.

XIV. Fruſtus oblongus cortice flavo ſpadiceo.

Fruſtus 13 à Gareto, Cluſ. ex. l. 2. c. 16.

XV. Fruſtus oblongus lobum referens niger.

Fruſtus 15. Gareti, Cluſ. l. c.

*Fruſtus pyriformes.*

I. Fruſtus pyriformis major rugoſus niger, binis cellulis diſtinctus.

Fruſtus exoticus 1. Cluſ. ex. l. 2. c. 24.

II. Fruſtus pyriformis minor ſpadiceo cinereus.

Fruſtus exoticus 2. Cluſ. ex. l. 2. c. 24.

*Fruſtus orbiculares & rotundi: & ovales  
tuberculo obſiti.*

I. Fruſtus orbicularis fuſcus tuberculis obſitus.

Fruſtus 2. Parduyni è Guinea, Cluſ. ex. l. 2. c. 22.

II. Fruſtus orbicularis cineraceus tribus foraminibus donatus.

Fruſtus 8 à Gareto, Cluſ. ex. l. 2. c. 16.

III. Fruſtus rotundus flavus tuberculis obſitus, linea eminentiore tranſverſa.

Fruſtus peregrinus 4. Cluſ. ex. l. 2. c. 30. & tab. alt. Lugd. Tab. Ger.

IV. Fruſtus rotundus flavus tuberculis obſitus.

Fruſtus peregrinus 5. Cluſ. ex. l. 2. c. 30. & tab. alt. Lugd. Tab. Ger.

V. Fruſtus ovalis ex fuſco ſubrubens tuberculis mucronatis obſitus.

Fruſtus 5. è navigat. Batav. Cluſ. ex. l. 2. c. 15.

VI. Fruſtus olivæ oſſiculum referens tuberculis obſitus.

Fruſtus minor 6. Paludani, Cluſ. ex. l. 2. c. 20.

VII. Fruſtus oblongus cineraceus durus tuberculis exaſperatus.

Fruſtus 1. Plateau, Cluſ. ex. l. 2. c. 19.

VIII. Fruſtus cordis formam referens, fuſcus tuberculis inæqualis.

Fruſtus minor 2. Paludani, Cluſ. ex. l. 2. c. 20.

IX. Fruſtus ſubrotundus rugoſus, ater.

Nux peregrina 1. Cluſ. ex. l. 2. c. 13.

X. Fruſtus Frago ſimilis.

Garnitre, fruſtus parvus & ſubtilis fragi ſimilitudine, qui globulorum vicem ſupplet, Linſe. p. 3. Ind. or. 21.

*Fruſtus angulis donati.*

I. Fruſtus orbicularis fuſcoſtrifidus granis reſertus.

Fruſtus miſcellaneus 5. Cluſ. ex. l. 2. c. 25.

II. Fruſtus rotundus inæqualis cineraceus ſaxeus.

Fruſtus 6. Camiri Indis, ex navig. Batav. Cluſ. ex. lib. 2. cap. 15.

Fruſtus peregrinus 2. Eid. l. 2. c. 29.

Nucis eſt magnitudine, putamine ſaxeae duritie, nucleo albo amygdalino.

III. Fruſtus Braſilianus inæqualis ſemine fuſco ſervido.

Fruſtus 1. à Gareto Aratucon dictus, Cluſ. ex. l. 2. c. 17.

IV. Fruſtus anguloſus cineraceus cortice fibroſo.

Fruſtus miſcellaneus 2. Cluſ. ex. l. 2. c. 25.

V. Fruſtus in gibbum extuberans cortice reticulato villoſo.

Fruſtus peregrinus reticulato corio ex Guinea, Cluſ. ex. l. 2. c. 11.

VI. Fruſtus niger in duas partes ſeparabilis aciduſculus.

Fruſtus 10. à Gareto, Cluſ. ex. l. 2. c. 16.

VII. Fruſtus avellanae magnitudine putamine velut in duas partes diviſo.

Fruſtus peregrinus 4. Cluſ. ex. l. 2. c. 29. Lugdun. Tabern. Ger.

VIII. Fruſtus ſubrotundus cineraceus dupli- angulo.

Fruſtus 9. è navig. Batav. Cluſ. ex. l. 2. c. 15.

IX. Fruſtus triangularis fuſcus.

Fruſtus minor 4. Paludani, Cluſ. ex. l. 2. c. 20.

X. Fruſtus pentagonus tuberculis inanitis obſitus.

Fruſtus minor 9. Paludani, Cluſ. ex. l. 2. c. 20.

XI. Fruſtus oblongus pentagonus fuſcus.

Fruſtus 2. è navigat. Batav. Cluſ. ex. l. 2. c. 15.

XII. Fruſtus criſtatus ſpadicei coloris.

Fruſtus 11. è navig. Batav. Cluſ. ex. l. 2. c. 15.

*Fruſtus diverſarum figurarum.*

I. Fruſtus in orbem convolutus fuſcus.

Fruſtus minor 11. Paludani, Cluſ. ex. l. 2. c. 20.

II. Fruſtus eſt quatuor membranaceis folijs compoſitus nucleo orbiculari.

Fruſtus 17. navigat. Batav. Cluſ. ex. l. 2. c. 15.

III. Fruſtus è multis fibris contextus ſpadiceus.

Fruſtus miſcellaneus 6. Cluſ. ex. l. 2. c. 25.

IV. Fruſtus metæ figuram referens cineraceus

Fruſtus

Fruſtus mior, Paludani, ad quem pro Baſami Peruani fruſtu miſſus, Cluſ. ex. l. 2. c. 20.

V. Fruſtus juli ſiguram quaſi exprimens cineraceus, grana ſpadicea continens.

Fruſtus miſcellaneus 8. Cluſ. ex. l. 2. c. 25.

VI. Fruſtus Braſil. ex ſuſco cinereus acidus.

Fruſtus ſecundus Gareti, Cluſ. ex. l. 2. c. 17.

VII. Fruſtus Quittenſis.

Fruſtus ad Dyſenteriam, Monardi, Lugd.

*Fruſtus vary.*

I. Fruſtus in Bali Inſula, ſub terra juglandis magnitudine ſed durior & oleaginoſior. quo ad cibos condiendos utuntur: Linſp. Ind. or. c. 39.

II. Fruſtus purpureus alij ſapore: par 6. Ind. Orient. c. 54.

III. Caurior fruſtus frequenter cibis adhiberi ſolitus, uberrimè in Guinea provenit: par. 4. Ind. Or. 2.

IV. Gato Gambar, fruſtus olivis aut Arecae ſimilis in Cambaja, qui dentium dolori medetur, par. 4. Ind. Or. 8.

V. Jalave Malays, arboris fruſtus glandis magnitudine, què in firmi potiunculis miſcent, l. c.

VI. Javanos fruſtus in Bantan: par. 3. Ind. Orient. 35.

VII. Indiamas fruſtus in Guinea: par. 6. Ind. Or. 19.

VIII. Lucumas fruſtus in India, quem nihil aliud quam lignum eſſe diſſimulatum ajunt: Joſeph. Acosta l. 4. c. 26.

IX. Madian, Main, Coſaſſani, ex civitate Dachen importantur, ad acuendam gulam & ebrietatem facilius ciendam: par. 4. Ind. Or. 8.

X. Tianco, fruſtus copioſè in Malacca, quem tuſum cum liquore bibunt, quoties male habent: l. c.

\*\*\*\*\*

## SECTIO TERTIA.

### A R O M A T A.

NUX MYRISTICA; MACIS ET MACER; CASSIA SIVE CANNELLA; CINAMOMUM; TAMALABATRUM SIVE FOLIUM; BETHRE ſive Tembul; Caryophylli Aromatici; Piper; Cubebæ; Fagara; Mango; Amomum & Amomis; Grana Paradifi & Cardamomum.

### N U X M O S C H A T A.

**N**ux Moſchata, quæ veteribus Græcis cum ſua Maci incognita ſuit at recentioribus moſchanaſer vel naſer alij ſaxinis dicitur: ſorte Nux Indica, in ſuſſimento moſcato Aëry.

I. Nux moſchata fruſtu rotundo.

Chryſobalanos Galeni quibuſdam. Comacum Theophraſti & Cinnamum Caryopon Plinij, Guilandino.

Nux Bandenſis, Jaubſant Arab. Avicennæ.

Mux myriſtica, Matth. Caſt. Lugd. qui & Acosta ſiguram in appen habet, Cluſ. ex.

Nux muſcata, Lac. Lon. Ad. Løb. ico. Frag.

Nux moſchata, Cord. hiſt. Lob. (cui & odorata & aromatica) Cæſ. Tab. Acosta.

Nux aromatites, quæ incolis Palla & lapatri, Garz. Linſe. Ind. Orient. p. 4. c. 22.

Arbor in Inſula Banda quæ nucem & macim proferit, Pyri magnitudine, folijs laurinis, latioribus brevioribus: fruſtus cortice denſo, ut in noſtris Nucibus regitur, cui alter tenuior reticulatus, ruſceſcens ſubſt. qui Macis dicitur. Fruſtus cum utroq; cortice muria conditus adſertur: quem & Saccharo condiunt & externum

corticem in capitis aſſectibus commendant. In Java majore, ex nucib. Conſervas & confectiones, & tam ex nucib. quam folijs, oleum conſciunt. Sic aliam in planis, quæ ad nos adfertur, aliam in montanis provenire ſcribunt, à cujus fruſtu cum vix matureſcat, ſaltem Macis adimitur.

II. Nux moſchata fruſtu rotundo parvo.

Nux moſchata humilis & fruſtu puſſillo in Moluccis, Acosta.

Nux aromatites in fruſtuſera in Moluccis & Zeilan, Garzia.

III. Nux moſchata fruſtu oblongo.

Nux moſchata maſcula vel major, Cord. hiſt.

Nux moſchata mas oblongior, Lob.

Nux myriſtica mas, Cluſ. exor.

IV. Macis Offinarum.

Macis dicitur cortex alter tenuis ruſceſcens, à Maceris Græcorum ſimilitudine, qui aëri expoſitus paulatim ſaveſcit.

Macer,

Fruſtus exoticus 3. Cluſ. ex. l. 2. c. 24.

X. Fruſtus oblongus arcuatus fufcus.

Fruſtus 1. è navigat. Batav. Cluſ. ex. l. 2. c. 15.

XI. Fruſtus oblongus fufcus ſplendens.

Fruſtus 1. Simonis Tovar Coxco cypote, id eſt nux ſive oſiculum Cypote, Cluſ. ex. l. 2. c. 18.

XII. Fruſtus oblongus cineraceus norvis craſſis.

Fruſtus 3. Parduyni, Cluſ. ex. l. 2. c. 22.

XIII. Fruſtus oblongus cineraceus acidulus.

Fruſtus 12. & Oregioella, ex quo Cacao potio- nem conſciunt, Cluſ. ex. l. 2. c. 16.

XIV. Fruſt. oblongus cortice flavo ſpadiceo.

Fruſtus 13. à Gareto, Cluſ. ex. l. 2. c. 16.

XV. Fruſtus oblongus lobum referens niger.

Fruſtus 17. Gareti, Cluſ. l. c.

*Fruſtus pyriformes.*

I. Fruſtus pyriformis major rugoſus niger, binis cellulis diſtinctus.

Fruſtus exoticus 1. Cluſ. ex. l. 2. c. 24.

II. Fruſtus pyriformis minor ſpadiceo cinereus.

Fruſtus exoticus 2. Cluſ. ex. l. 2. c. 24.

*Fruſtus orbiculares & rotundi: & ovales  
tuberculis obſiti.*

I. Fruſtus orbicularis fufcus tuberculis obſitus.

Fruſtus 2. Parduyni è Guinea, Cluſ. ex. l. 2. c. 22.

II. Fruſtus orbicularis cineraceus tribus foraminibus donatus.

Fruſtus 8. à Gareto, Cluſ. ex. l. 2. c. 16.

III. Fruſtus rotundus flavus tuberculis obſitus, linea eminentiore tranſverſa.

Fruſtus peregrinus 4. Cluſ. ex. l. 2. c. 30. & tab. alt. Lugd. Tab. Ger.

IV. Fruſt. rotundus flavus tuberculis obſitus.

Fruſtus peregrinus 5. Cluſ. ex. l. 2. c. 30. & tab. alt. Lugd. Tab. Ger.

V. Fruſtus ovalis ex fuſco ſubrubens tuberculis mucronatis obſitus.

Fruſtus 7. è navigat. Batav. Cluſ. ex. l. 2. c. 15.

VI. Fruſtus olivæ oſiculum referens tuberculis obſitus.

Fruſtus minor 6. Paludani, Cluſ. ex. l. 2. c. 20.

VII. Fruſtus oblongus cineraceus durus tuberculis exaſperatus.

Fruſtus 1. Plateau, Cluſ. ex. l. 2. c. 19.

VIII. Fruſtus cordis formam referens, fuſcus tuberculis inæqualis.

Fruſtus minor 2. Paludani, Cluſ. ex. l. 2. c. 20.

IX. Fruſtus ſubrotundus rugoſus, ater.

Nux peregrina 1. Cluſ. ex. l. 2. c. 13.

X. Fruſtus Frago ſimilis.

Garnitre fruſtus parvus & ſubtilis fragi ſimilitudine, qui globulorum vicem ſupplet, Linſc. p. 3. Ind. or. 21.

*Fruſtus angulus donati.*

I. Fruſtus orbicularis fufcus triſidus granis reſertus.

Fruſtus miſcellaneus 5. Cluſ. ex. l. 2. c. 25.

II. Fruſt. rotund. inæqualis cineraceus ſaxeus.

Fruſtus 6. Camiri Indis, ex navig. Batav. Cluſ. ex. lib. 2. cap. 15.

Fruſtus peregrinus 2. Eid. l. 2. c. 29.

Nucis eſt magnitudine, putamine ſaxeae duritie, nucleo albo amygdalino.

III. Fruſtus Bralſitanus inæqualis ſemine fuſco ſervido.

Fruſt. 1. à Gareto Aratucon diſtus, Cl. ex. l. 2. c. 17.

IV. Fruſt. anguloſus cineraceus cortice fibroſo.

Fruſtus miſcellaneus 2. Cluſ. ex. l. 2. c. 25.

V. Fruſtus in gibbum extuberans cortice reticulato villoſo.

Fruſtus peregrinus reticulato corio ex Guinea, Cluſ. ex. l. 2. c. 11.

VI. Fruſtus niger in duas partes ſeparabilis aciduſculus.

Fruſtus 10. à Gareto, Cluſ. ex. l. 2. c. 16.

VII. Fruſtus avellanae magnitudine putamine velut in duas partes diviſo.

Fruſtus peregrinus 4. Cluſ. ex. l. 2. c. 29. Lugdun. Tabern. Ger.

VIII. Fruſtus ſubrotundus cineraceus dupli- angulo.

Fruſtus 9. è navig. Batav. Cluſ. ex. l. 2. c. 15.

IX. Fruſtus triangularis fufcus.

Fruſtus minor 4. Paludani, Cluſ. ex. l. 2. c. 20.

X. Fruſt. pentagonus tuberibus inanitis obſitus.

Fruſtus minor 9. Paludani, Cluſ. ex. l. 2. c. 20.

XI. Fruſtus oblongus pentagonus fufcus.

Fruſtus 2. è navigat. Batav. Cluſ. ex. l. 2. c. 15.

XII. Fruſtus criſtatus ſpadicei coloris.

Fruſtus 11. è navig. Batav. Cluſ. ex. l. 2. c. 15.

*Fruſtus diverſarum figurarum.*

I. Fruſtus in orbem convolutus fufcus.

Fruſtus minor 11. Paludani, Cluſ. ex. l. 2. c. 20.

II. Fruſtus eſt quatuor membranaceis folijs compoſitus nucleo orbiculari.

Fruſtus 17. navigat. Batav. Cluſ. ex. l. 2. c. 15.

III. Fruſt. è multis fibris contextus ſpadiceus.

Fruſtus miſcellaneus 6. Cluſ. ex. l. 2. c. 25.

IV. Fruſtus metæ figuram referens cineraceus  
Fruſtus

Fruſtus miſor, Paludani, ad quem pro Baſami Peruani fruſtu miſſus, Cluſ. ex. l. 2. c. 20.

V. Fruſtus juli figuram quaſi exprimens cineraceus, grana ſpadiacea continens.

Fruſtus miſcellaneus 8. Cluſ. ex. l. 2. c. 25.

VI. Fruſtus Braſil. ex fuſco cinereus acidus. Fruſtus ſecundus Gareti, Cluſ. ex. l. 2. c. 17.

VII. Fruſtus Quittentis.

Fruſtus ad Dyſenteriam, Monardi, Lugd.

*Fruſtus varj.*

I. Fruſtus in Bali Inſula, ſub terra juglandis magnitudine ſed durior & oleaginoſior quo ad cibos condiendos utuntur: Linſ. p. 3 Ind. or. c. 39.

II. Fruſtus purpureus alijs ſapore: par 6. Ind. Orient. c. 14.

III. Cautior fruſtus frequenter cibis adhiberi ſolitus, uberrime in Guinea provenit: par 4. Ind. Or. 8.

IV. Gato Gambar, fruſtus olivis aut Arecæ ſimilis in Cambaja, qui dentium dolori medetur, par. 4. Ind. Or. 8.

V. Jalave Malays, arboris fruſtus glandis magnitudine. quæ inſirmi potiunculis miſcent, l. c.

VI. Javanos fruſtus in Bantan: part. 3. Ind. Orient. 35.

VII. Indiamas fruſtus in Guinea: part. 6. Ind. Or. 19.

VIII. Lucumas fruſtus in India, quem nihil aliud quam lignum eſſe diſſimulatum ajunt: Joſeph. Acoſta l. 4. c. 26.

IX. Madian, Main, Coraſſani, ex civitate Dachen importantur, ad acuendam gulam & ebrietatem facilius ciendam: par. 4. Ind. Or. 8.

X. Tianco, fruſtus copioſe in Malacca, quem ruſum cum liquore bibunt, quoties male habent: l. c.

\*\*\*\*\*

## SECTIO TERTIA.

### A R O M A T A.

NUX MYRISTICA; MACIS ET MACER; CASSIA SIVE CANELLA; CINAMOMUM; TAMALABATRUM SIVE FOLIUM; BETHRE ſive Tembul; Caryophylli Aromatici; Piper; Cubebæ; Fagara; Mango; Amomum & Amomis; Grana Paradifi & Cardamomum.

### N U X M O S C H A T A.

**N**ux Moſchata, quæ veteribus Græcis cum ſua Maci incognita ſuit at recentioribus mox enaſcer vel naſcer arbor, ut nix dicitur: ſorte Nux Indica, in ſuffimento moſcato Actj.

I. Nux moſchata fruſtu rotundo. Chryſobalanos Galeni quibuſdam. Comacum Theophraſti & Cinnamum Caryopon Plinii, Guilandino.

Nux Bandenſis, Jauſibant Arab. Avicennæ.

Nux myriſtica, Matth. Caſt. Lugd. qui & Acoſta figuram in appen habet, Cluſ. ex.

Nux muſcata, Lac. Lon. Ad. Løb. ico. Frag.

Nux moſchata, Cord. hiſt. Lob. (cui & odorata & aromatica) Caſ. Tab. Acoſta.

Nux aromatites, quæ incolis Palla & lapatri, Garz. Linſc. Ind. Orient. p. 4. c. 22.

Arbor in Inſula Banda quæ nucem & macim profer, Pyri magnitudine, folijs laurinjs, latio-ribus brevioribus: fruſtus cortice denſo, ut in noſtris Nucibus tegitur, cui alter tenuior reticulatus, ruſcens ſubeſt, qui Macis dicitur. Fruſtus cum utroq; cortice muria conditus ad-

corticem in capris affectib. commendant. In Java majore, ex nucib. Conſervas & confectiones, & tam ex nucib. quam folijs, oleum conſciunt. Sic aliam in planis, quæ ad nos adfertur, aliam in montanis provenire ſcribunt, à cujus fruſtu cum vix matureſcat, ſaltem Macis adimitur.

II. Nux moſchata fruſtu rotundo parvo.

Nux moſchata humilis & fruſtu puſillo in Moluccis, Acoſta.

Nux aromatites inſruſtiſera in Moluccis & Zeilan, Garziæ.

III. Nux moſchata fruſtu oblongo.

Nux moſchata maſcula vel major, Cord. hiſt.

Nux moſchata mas oblongior, Lob.

Nux myriſtica mas, Cluſ. exor.

IV. Macis Offinarum.

Macis dicitur cortex alter tenuis ruſcens, à Maceris Græcorum ſimilitudine, qui aëri expoſitus paulatim ſaveſcit.

*Macer,*

Macer, officinarum Macis, Cord. in Diosc.  
 Macis, veterum Macer seu medius nucis mosch.  
 cortex, Cord. hist.  
 Macis, Ad. Garziæ, Acostæ, Frag.  
 Macer, Tab. qui cum fructu pingit.  
 Bunapalla & Jaisol incolis, Garziæ, Linsc. Ind.

Oriental. part. 4. cap. 22.  
 Macis Javanensibus Massa & Fælien, Linscot.  
 Ind. Orient. part. 2. c. 22.  
 Beshafe Arab. Avicennæ cui odoratæ nucis involucrem est.  
 Nucum myristicarum flos, 4. par. Ind. Or. c. 21.

### MACER VETERUM.

**M**acer Veterum, cortex est arboris sui nominis, res à Maci recentiorum planè diversa: de quo sic Dioscor. l. 1. c. 110. *μακρί*, cortex est à Barbaria advehi: solitus, subtilis, crassus & gustu perquam astringens: & Plinius lib. 12. c. 8. *Macir* ex India (Galenum se. utitur) advehitur, cortex rubens, radice magna, nomine arboris sua. Arbor Ulmo multò maj. r in India Orien. ali. præsertim in Provincia Malabar, Acostæ.

Macer & Macir, Talisfar radicis cortex, Avic.  
 Macer, arbor dyentericiæ, à radicis corticis usu  
 & arbor sanctæ, Acostæ, Lugd in ap.  
 Cortex Xylocassæ facie, Ad. Lob. ico.  
 Macer veterum, C. u. exot. l. 4. c. 4.  
 Macer Giæcorum verum, ignotum putat Garz.  
 Macer veterum, Macir officinarum censent,  
 Cord in Diosc. & hist.  
 Macer veterum est alter cortex crassior nucis  
 moschatae, Cæsalp.  
 An idem.  
 Cortex ad alvi profluvia in novo orbe, Monar.  
 Arbor contra fluxum, Cast.  
 Cortex ad dyentericiam, Lugd.  
 Anonymos arbor in novo orbe folijs cordis figura, Frag.

### CASSIA SIVE CANELLA ET CINAMOMUM.

**K**assia sive *κασία*, κασι τὸ κασίον, quasi *νομάζον*, *κασίον* *ὀνομαζόν* τὰς αὐτὰς, κασίαι D. oscevidi l. 1. c. 12. complura sunt genera, quæ circa aromatiferam Arabiam gignitur: habet autem sarmentum crassi cortici, folia verò piperis: primum locum habet *ὑψηλὸς* rosarum odorem spirans: 2. *αἶον* indigenum, mercatoribus *Alexandrinu* daphniti, odore vinoso: 3. *μοσχεύτης* *βλατίς*, mosyleticæ germen: reliqua viles habentur, ut quæ *ἀσπρίμυρ*, nigra in; ucnila: & ea quæ *μύσα* ἢ *κάρνα* vocatur: est & quadam *ψευδοκασία* illi similima, quæ neg, acris neg, aromatica, & corticem medulla coherentem habet, &c.

*Κιννάμωμον* plura genera Diosc. l. 1. c. 13. regionum in quibus nascuntur nominibus designata: excellit quod *μύσχα* dicunt, quod similitudinem aliquam habet cum Mosylitide cassiæ, & quæ recens colore nigrum ex vino in cinereum vergens, nodosum, colore rufa, aut cardamomo proximum est, bujus generis quing, recenset.

Fabulosa varia & incerta, de Cassiæ & Cinamomo à veteribus Græcis & Latinis, ob longas & difficiles navigationes scripta sunt. Hinc Diosc. scribit Cassiæ esse virgulta crassi cortici, piperis folijs: Cinamomi verò descriptionem præfusa omittit. At Theophr. Cassiæ & Cinamomum, magnitudine Vitis, multos ramos, lignosus habere. Plin. l. 12. c. 19. Cinamomum dixit fruticem esse duorum cubitorum altitudine simplicissimum, palmi, minimum: Cassiæ fruticem esse trium cubitorum amplitudine. Galenus 1. Antid. arcam Romam delatam à Barbarorum regione tradit, longitudine cubitorum: quatuor cum dimidio: & licet Cassiæ & Cinamomum diversas arbores esse statuat scribit tamen Cassiæ sive Cinamomum transmutari: sic Cinamomi sarciculos, Cassiæ prorsus per similes. Genera Cassiæ eadem Galenus quæ Dioscor. recenset: item Cinamomi sex à Dioscor. etiam declarata. Theophr. 6. hist. 2. & Plinio. Cassiæ duo duntaxat genera sunt, candidum & nigrum. Receniores, qui judicio valent, Cinamomum officinarum vulgo Canella dictum, legitimam antiquorum Cassiæ dicunt: cujus genera à Dioscor. & Galeno tradita, apud Mercatores qui magnam copiam habent inter nosci possunt. Et in compositionibus Græcorum Xylocassiam id est Cassiæ ligneam sive Cassiæ odoratam postulanti bus, Canella nostra adhibenda: in Mauritanorum enim Medicamento, Cassiæ fistula purgatrix intelligenda.

I. Cinamomum sive Canella Zeilanica.  
 Cassia, Cinam. & Canella orientalis, Monard.  
 Cinamomum, i. e. lignum odoratum quasi Amomum ex Sina, Canella & Cassia idem sunt, Garz.

Darfini Avicennæ & Arabibus, quod Persis Lignum Sinenfe sonat.  
 Canella legitima, Matth. Lugd. Acostæ.  
 Cassia, Ang. Lob.



Cinamomum, Lac.

Cinamomum & Calsia unius plantæ cortices, Guil. the.

Cinamomum & Calsia Græcorum, Ad.

Cinamomum Seylenſe, Linſcorto Ind. Orient. part. 2. c. 16. & par. 4. c. 19.

Arbor in Zeilan frequens oleæ magnitudine, folijs forma ad Citri folia accedentibus, fructu rotundo exiguis olivis ſimili. Canella eſt ſecundus & interior arboris cortex, in tubulos convolutus, qui ſingulo triennio adimitur, & ab exteriori cinerea pellicula, qua obduſtus eſt, repurgatur: In Canarijs etiam Inſulis Cinamomi nulla eſt penuria, 3. part. Ind. Or. c. 5.

II. Cinamomum ſive Canella Malavarica & Javanenſis.

Canella ignobilior, Garzia.

Calsia veterum forte, Cluſ. ex.

Canella in ſylvis Malabar, Acoſtæ.

Cinamomum Malabaricum, Canella de Mato, ſeu ſylv. cinamomum, Linſc. Ind. Orien. par. 4. c. 19. & figura 17.

Cinamomum ſylv. Canella de mare, 2. par. Ind. Orient. c. 13.

Cortice eſt enodi cinereo in Malavar & Java: & ut Acoſta, fructus oleæ baccis par oſſiculum continens, qui fructus ſeſſili parte, parvo calice præditus eſt.

III. Cinamomum ſive Canella Peruana.

Canella in America, quæ calices & glandes ſuberis modo ſect, quam ſui generis arborem, non Canellam eſſe, Garzias ſcribit.

Canella Peruana quam Gomara, Auguſt. Carate, Petrus Cieca, & ex his Cluſ. notis in Garziam proponit.

Canella novi orbis Monardi, cui Calsia, Cinamomum & Calsia lignea, unius arboris cortices ſunt, & ſola loci varietate, altera alteram præſtantiorem facit: itaque Calsiam & Cinamomum ſolis nominibus diſſerre aſſerit.

Hujus fructum, qui parvo pileo ſimilis, ſua latitudine Taleri Germanici amplitudine æquat, in uſu eſſe ſcribit.

IV. Cinamomum ſive Canella tubis minoribus alba.

Canella alba quorundam, Cluſ. ex.

Duplex eſt: altera majoribus, longioribus & craſſioribus tubis: altera tubis tenuioribus & minoribus: Idem habet,

Canellam albam à radice: &

Canellam albam ex arbore.

Lignum aromaticum Monardi, Lugdun. Caſt. Frag. Cluſ. ex.

an Aſcopo, arbor lauro ſimilis, cujus cortex calidus & acris eſt, in Inſul. Virgin. deſcript. vel Ind. Occid. par. 1.

V. Cinamomum craſſiore cortice.

Xylocalsia, Ad. Lobel. qui an Pseudocinamomum Dioſcoridis ſit, dubitat, Lugd.

VI. Calsia lignea fuſca aromatica.

Xylocalsia ſubnigra, Lob. belg. & ico. an Calsia Syringitis, vel Syringis Cinamomo cognata, Cord. in Dioſc.

an Calsie genus, quod Galeno referente, junior Andromachus, & Calsiam ſiſtulum nominavit, quia inanis & cava & craſſi corticis, cujuſmodi in vulgari Cinamomo frequentiffimè conſpicitur.

VII. Cinamomum ſeu Calsia craſſior, quæ præter odorem & ſaporem in officiis occurrit, Pseudocalsiam eſſe non temerè quis dixerit.

VIII. Cortex cinereus acris ſapore.

Cortex eriophorus, Cluſ. ex. l. 4. c. 5.

#### Cinamomum veterum.

Cinamomum veterum, à Calsia ſive Canella diverſum eſſe volunt, cujus ſe tres ſurculos vidiffe Cluſius aſſerit, qui recti, ſed non enodes, cortice tenui, ſubcinerei coloris, jucundi & ſuavis guſtus, acrimonia linguam vellicante: lignum verò inodorum & inſipidum.

Galenus primus de Antidot. Calsiam quæ Zizir cognominatur, adeo Cinamomo ſimilem ſcribit, ut ejus loco divendita fuerit: & pro qualibet Cinamomi parte, duas Calsiæ adhiberi poſſe.

### TAMALAPÂTRUM SIVE FOLIUM.

**M**αλαπάτρων φύλλον, Latinis ſimiliter Malabathrum & Folium ſimpliciter, & Folium Indicum dicitur. Dioſc. l. 1. c. 11. μαλαπάτρων, inquit, nonnulli Nardi Indici ſolum eſſe arbitrantur, odorū quadam cognitione decepti: peculiariter genus eſt, quod in paludibus Indici gignitur: ſolum, id eſt, quod lentu paluſtrum modo aqua innatat, radicem non habens, &c. Er Plin. l. 12. c. 26. dat & Malabathron Syriæ arborem folio convoluta, arido colore: mox ſubjungit: in paludibus Indiæ gigni tradunt, lentu modo odoratum croco, nigricans ſcabro nigr.

quodam salis gustu: minus probatur candidum. Quibus verbum Plinium diversa Malabathri genera proposuisse videntur: at Dioscorides unicum. Sed quid velint, non assequimur: nostrum enim non innat aqua, sed in pro-cera arbore, procul ab aqua in Cambaya nascitur, secundum Garziam: at Linsc. 4. par. Ind. Or. c. 39. arbor est mediocrius magnitudinis, quæ non nisi ad fluminum ripas aut lacum enascitur, in omni quidem India vulgaris, præcipue tamen in Cambaya: solum odor qui Caryophyllorum, quare aliqui malè Caryophyll. folium esse putant.

Cadegi Indid, id est, folium indum, Arabib.  
Folium Indi Sepalsiariorum, Trag.  
Malabathr Mat. (cui & Folium) Lac. Lob. Tab.  
Cassia folium, Cord. in Diosc.  
Cassia aromatica folium malè, nec Cinamomi folium, nec Malabathrum, Cord. hist.  
Malabathrum, Folium, & folium barbaricum, res differentes sunt, Ang.  
Malabathrum & Folium, medicamenta duo sunt, Guil. the.  
Tamalapatra, ex qua voce corrupta Malaba-thum, Garz. Clus. Lugd.  
Folium nostrate, Malabathrum est, Ad.

Folium Indum Acoftæ, Cast. Frag.  
Folium Indum vocatum, Tembul Avicen. Cæs.  
Folium Indum, incolis Tamalapatra.

Figure: fructus glandis exigue effigie ad-pingitur à Clus. Lobel. & Lugd. quem Fructum Canellæ quorundam alijs Tembul convolvuli in India nomine à Cortuso, Clusius, uti in notis in Garziam monet, accepit: qui tamen Mala-bathri nostri fructum esse suspicatur.

Huc referantur  
Folia saporem Caryophyllorum referentia, in Insula St. Maria, ad littus Madagascar: part. 3. Ind. Orient. c. 12.

## BETRE SIVE TEMBUL

*Betre Mallaccensium volubili modo arborescens, fructu lactea candam emulante.*

I. Tembul pro Tambul, Avicennæ.  
Betre Garz. Frag. Lugd qui in append. figuram Clusij habet.  
Betre sive Betle, Aloyf. Cadamusto, Clus. ad Gar.  
Bere l. Lud. Romano, Odovardo Barbosa.  
Betel, Cast. Betele, Acoft.  
Beile vel Tab, Ab.  
Betelle sive Betre, Linsc. 4. par. Ind. Orient. c. 16. & figura 14.

Sunt qui Folium Indum putant, ut Barbosa: & Amatus utrumque, confundit, cum Betre folio acutius & tenerius sit.

Hoc Indi Orientales perpetuò mandunt, apud quos in maritimis regionibus provenit: at in Malaca Vitis modo feritur, & additis peda-mentis, Hederæ modo se sustinet.

II. Kaate, ex hujus arboris ligno pastillos con-cinnatos cū Betelle comedunt: Linsc. 4. I. O. 16.

## CARYOPHYLLUS AROMATICUS.

**F**rustus qui *Karyopollon* sive *napigollon*, (i. e. si verbum verbo reddas, Nucifolium, cum quo tamen simili-tudinem nullam habet) Latius Caryophyllum & Caryophyllus dicitur: à Germanis & Gallis, Clavum no-minatur, quod clavi modo capitatus sit. Hujus, nec Dioscor. nec Galenus meminisse videntur, licet Serapio Gale-ni falsio citet, forsitan rectius Aeginetam, vel Serbionem nominaturus. Apud Pl. l. 12. c. 7. bar leguntur: est etiamnum in India Piperis grano simile, quod vocatur Caryophyllon grandius fragiliusq. Verum hunc Pliny, al. qui non-um Theophr. g. l. 9. l. 1. esse putant: Comacum, inquit ex India & Arabia deportatur, ad unguenta idoneum est.

I. Caryophyllus aromaticus fructu ob-longo.  
Caryophyllon, ipse frutex. Ægin. Sethi.  
Chirunfel, Arabibus.  
Caryophylli Matth. Lac. Ludov. Romano, Ma-ximiliano Transylvanode Moluc. Tab. qui & Matth. oli & Clusij figuram (à Clusio tamen improbatam) exhibet.  
Caryophyllus Cord. hist. Ad. Cast. Cæs. qui Car-phellum: Q. Medici suspicatur.  
Caryophyllon sive Caryophyllon, Arabibus &

lensiq. Indis, Calasur, in Maluccis Chanque, Garz.  
Chamke in Maluco Insulis, in quibus solis na-scuntur, Linsc. 4. par. Ind. Orient. c. 12.  
Caryophylla arbor quæ Arabibus Siger: fru-ctus, Carnusul, Acoftæ.  
Caryophylli, Lob. Linsc. l. c.  
Caryophylli aromatici, Lugd. cui etiam in ap-pend. Caryophyllus Acoftæ.  
Caryophyllus florens & Caryophylli veri, Ger-cum utraq. Tabern. figura.

Arbor

Arbor est, nostris Malis, aut Pyris non minor, folijs venosis: & ut Linscottus, Lauri similibus, (mea verò ad Pyri folia accedunt) non ita angustis & oblongis, ut Lobelius, Tabernmontanus, Gerardus ex Clusij editione prima pinxere, & Lugd. suæ figuræ, ex Matthiolo desumptæ, folium adposuit: sic fructus non sparsim ramis inhæret, ut Acoſta, & ex eo Lugd. in append. pinxere, sed extrema parte bacillis oblongis insident, ut Clusius in notis postremis ad Garziam, Acoſtam, & exot. lib. 1. pinxit: qui demum in Auſtario ad exot. lib. Caryophyllorum ramulum cum fructus rudimento, florem nondum expletum sustinente, & eo qui primum formari incipit, exhibet. In Maluccis ut etiam Makian & Tidore fructifera: in Zeilan, infructifera gignitur: & in Ambona insula summa diligentia nunc colitur, ut ad curas posteriores Clusij plenius habetur. Hos rectè siccatos subflavescere, & ut nigriores evadant infumari, & ex recentibus aquam destillatione elici, & cum Sacchara Eleſtuarium confici, Linscottus l.c. scribit. Fructus qui in arbore remanentes crassiores fiunt, & quos Javanenses magis expetunt, dicuntur Caryophylli mares, Avicennæ. Caryophylli maturi seu majores, Cord. hist.

## P I P E R.

**P**iper, νέμεσις Græcè, Arabibus Fulsul & Fulsul dicitur. Dioscoridi lib. 2. cap. 12. arbor brevis, quæ fructum oblongum instar filiquæ profert, &c. & Plinio lib. 12. cap. 7. Piperis arbores Juniperi nostri similes sunt, & semina à Junipero distanti parvi filiquis.

Genera: Dioscorides (& cum eo Galemus) eandem arborem & longum & candidum & nigrum proferre, & sola maturatione differre credidit: quæ pleraque & Plinius habet: quæ cum salsa sint, hic non adscribemus. At Theophr. 9. hist. 22. piperis genera duo: unum rotundum Ervi modo, cute carneq. constans sicuti Lauri bacca, subnigrum: alterum oblongum, nigrum semina parva paraveri continens, quod altero longè validius. Verum Piper ad arbores, possimum Fausel ferriur, quæ circumvolvendo ascendit, folijs latius non serratis, Betre similibus, fructum habens racemosum, semper virentem, donec perfectè maturuerit: alia tamen est quæ Piper album, alia quæ nigrum fert, tæus parva inter arbores differentia, quantæ inter Vites, quæ uvam nigram vel albam profert, quamvis Ludovic. Romanus arborem quæ album profert proceriorem, crassiore caudice, majoribus folijs esse dicat. & Piper longum, non plus cum illius similitudinè habet, quam saba cum ovo.

## I. Piper rotundum nigrum.

Piper nigrum, Matth. Lac. Cast. Garz. Frag. Clus. exot. Lugd. qui in Append. Acoſta fig. habet, & insuper, Arborem piperiferam ex Theveto, Tabern. Linscotto in Arabia, Filfil; in Java, Sahang. 4. part. Ind. or. c. 18. & fig. 15. Piper rotundum nigrum, Cord. hist. Adv. Cæs. Piper nigrum in Calecut, Ludov. Romano. Piper rotundum Hippocratis, Garz.

Antophylli, Lob. Lon. Tab. Ger. Linscot.

Antophylli apud Nicolaum, Cæs.

Sic fructus qui ab arbore decutiuntur & maxime expetuntur, aliqui

Flores Caryophyllorum vocant, cum fructus rudimentum sint:

Caryophyllus immaturus aut minor, Cord. hist. Ita pediculi oblongi, à quibus flores dependent, festuæ Cordo, alijs Fusti, Lusitanis Bastan, dicuntur.

## II. Caryophyllus albus spurius.

Clusius in auſtario ad lib. exotic. Solani Beladonnæ, aut ei congeneris flores suspicatur: hoc Caryophylli quoque nomine à J. Pona Veronæ accepimus.

## III. Caryophylli odore fructus exotici.

Fructus caryophyllum olens avellanæ magnitudine, Garziæ, Fragoſo.

Fructus avellanæ nuci magnitudine, cujus folia Caryophyllos odore referunt, in B. 1. 1. par. 3. Ind. or. 15.

## IV. Caryophyllus aromaticus fructu rotundo.

Garyophyllon, Plinij.

Amomum quorundam, Clus. exot. l. 1. c. 17.

## V. Fructus fuscus formæ caryophylli aromatici majoris.

Fructus 7. ex navigat. Batavor. Clus. ex. l. 2. c. 15.

Grana perpetuo virent, at Decembri & Januario, ubi maturari incipiunt, sensim nigrescunt: & hoc vulgarissimum est, cum albi proventus rarior sit: cum viride est, ab indigenis sale & aceto conditur.

Quid sibi velit Matthiolus cum sua figura, quam & Cast. Lug. Tab. & Ger. habent, non assequimur. De qua figura sic Guilandinus scribit: Si frutex ille Piper est, vel etiam Amomum, ut

alij somniant, parum aberit, quin vulgare Ribes, vel Piper, vel Amomum esse possit.

## II. Piper rotundum album.

Piper album, Matth. Lac. Lob. Garz. Frag. Clus. ad Garz. Cast. Lugd. Tab. Linscor. 4. part. Ind. orient. c. 18.

Piper rotundum album, Cord. hist. Adv.

Piperis alterum genus, quod in Taprobana Molaga vocant, Lud. Romano.

Piper alterum candidum, Cæf.

Sabanh pute seu piper album, reliquis paulo exilius, in Sunda: part. 4. Ind. or. c. 8.

Hoc crassius est grano, nequaquam rugoso & acriore.

## III. Piper longum orientale.

Piper longum, Matth. Lac. Cord. hist. Adv. Lob. Garz. Frag. Clus. ad Garz. & exot. lib. 1. cap. 20. Linscorto & Javanensibus Pepileni.

Piper longum Orientale, Cast.

Macropiper minus, Tab.

Hujus arboris facies longè alia existit, Linscorto, non autem Clusio.

IV. Piper longum Occidentale dimidij pedis longitudine.

Piper, Monardi.

Piper longum Occidentale, Cast.

Piperis longi genus in India occidentali, Cæf.

Macropiper majus, Tab.

Piperis longi genus ex Carthagine, Frag.

Piper longum incolis Chiabe dictum, Linsc. 4. part. Ind. Orient. fig. 20.

Hoc priore longius, acrius & veluti ex multis granulis compositum.

V. Piper longum angustissimum ex Florida.

Piper longum, Felsel, Alpino.

Plantula peregrina, Clus. ex. l. 4. c. 11.

## VI. Piper oblongum nigrum.

an Piper longum, Diosc.

Habzeli & Piper Nigrorum, Serapioni.

Piper Æthiopicum, Matth. Lob. Cast. Lug. Tab.

Crone & Granum Anescen Avicennæ, Ang. Carpesium, Cord. hist.

Piperis aliud genus Æthiopicum, Frag.

Amomum officinarum nonnullarum & longa vita, Lob. ico.

VII. Piperi similis fructus striatus.

Haernia Serapionis.

Fructus cap. de Mungo additus, forte Negundo, Clus. ad Garz.

Mungo similis fructus, Lugd.

Ca: yophyllus Plinianus sive Negundo, Imper. Ngunpo, Garziæ, Acoftæ, Fragofo: mas procul aspiciunt Sambuco similis: fœmina folijs populi albæ similibus: fructus utriusque piperi similis & acris.

VIII. Lobus Æthiopico piperi similis, Clus. ex. l. 3. ca. 6.

## IX. Piper abortivum.

Dioscor. l. 2. c. 182. reperitur etiam quoddam in genere nigri, nutrimenti defectu, cassum seu inane & leve, quod *брызга* vocant.

Bresma sive Brasma, Cord. hist.

An exoticus fructus 4. ex Valachia, Clus. exot. lib. 2. cap. 22.

## X. Piper inane.

Piper quod lingua Malavarica à Canara nomen sumpsit, Garz.

Piper Canarium, Frag. Lugd. Linscort. 4. part. Ind. orient. c. 18.

Hoc cæruleum est, intus cavum, in cujus spacio granula quædam continentur, quod patulæ plebis usibus cedit: quare Canarium, i. e. rusticum vocari solet; & propter vilitatem, ad externos non effertur.

XI. Piper racemosum caudatum ex Guinea. Amomum, Ang.

Piper caudatum, Adv. quod pimenta del rabo Lusitanis, Clus. ad Garz. Frag. Lugd.

Piperis nova species, Imperato.

Pimenzo del Rabo, Linsc. 4. part. Ind. or. fig. 15.

## CUBEBAE; FAGARAS; MUNGO.

**Q**uas Cubebae officina vocant, *Althæarum nobilior*. Arabes Cubebe & Quabebe nominant: cujus arbor folijs est Piperis sed angustioribus. simili modo in altum repens, cujus fructus & forma & magnitudine piper referunt.

I. Cubebae vulgares, nec Arabum Cubebae, nec G. leni Carpesium, Matth.

Cubebae, Lac. Cord. hist. Garz. Acoftæ, Frag. Lugd. Cast. Tab. Linsc. 4. par. Ind. or. c. 29.

Cubebae Græcorum *μαγειρικόν*, Lon.

Cubebae officin. Piper rotundum, Theop. Piper

simpliciter Hippocrati cui & Myrtidano, Guineæ officinarum, Adv.

Cubebae vulgo, Amomi fructum putarim, Cæf.

Hæ à Javanensibus, nunquam nisi prius aqua decoctæ venduntur, ne apud externos quoque plan-

tentur. Fagaras

Fagara Avicennæ, Clus. in Garz. Lob.  
 Fagara, Cast. Tab. Lugd. Linf. cot. 4. part. Ind. or.  
 c. 7. & fig. 18.  
 Fagara major, Imperato.  
 III. Cubebis affinis Fagara minor.

Fagara minor, Imperato.  
 IV. Fructus niger Coriandro similis.  
 Mungo, Garziæ.  
 Melle Avicennæ pro Mex.  
 Mens, Bellunenſis.

## AMOMUM ET AMONIS.

**A**momum, Græci *ἄμωμον*, & Arabibus *Hamana* sive *Hamanus*, & Constantinopoli in mercatorum officina *Amama* nominatur. Dioscoridi l. 1. c. 14. parvus frutex est, in uva modum suapte ligno in seipsum contolutus: florem habet parvum cum Leucorum: folia verò Bryonia similia. Differentias verò facit ratione loci, Armeniacum præstantissimum: Medicum infirmum: Ponticum racemosum, fructu plenum & odore naves feriens. Et Plinio l. 12. c. 13. Amomi uva in usu est Indica vite labrusca, uti alij existimavere, frutice myrtosæ palmi altitudine, carpitur j, cum radice &c. addit: est & quæ vocetur Amomum, minus venosa atque durior, ac minus odorata: quo apparet aut aliud esse, aut immaturum colligi. At sic Dioscorides: Sunt qui Amomum, herba simul quæ *ἄμωμον* dicitur, adulterent, sed quæ & modica sit & fructu careat. Theophr. 9. hist. 7. Amomum alij ex Media alij ex India cum Nardo advehinant. Verum alij Rosam Hiericunticam: alij Cubebas: alij Piper racemosum: alij Piper Aethiopicum: alij quid aliud esse volunt. Vide & Adversar. auctores.

I. Amomum racemosum, quod verum credimus Amomum, Martinelli & Ponæ, de quo Nicol. Marogna Medicus Veronenſis librum Latine scripsit, quem Doct. Franciscus Ponæ Italicum dedit.  
 Amomum spurium, Clus. exot. austario.  
 Fructus j. è Walachria, Clus. exot. l. 2. c. 22.

Amomum verum Ponæ, Clus. cur. post. & ibidem sub Amomo.  
 II. Amomum spurium foliosum.  
 Amomum, Clus. ad Garz. Lugd. Tab.  
 III. Amom. arborè, folijs bryoniæ florib. violæ pingit Castor Durantes, sed quid sit ignoramus.  
 IV. Amomis, Clus. ad Garz. Lugd. Tab.

## GRANA PARADISI ET CARDAMOMUM.

**C**ardamomum, Græci *καρδάμωμον* (quasi *Nasturtium suave*) Arabibus *Cordiniens* nominatur. quod Diosc. l. 1. c. 5. non descripsit, sed solum quibus in locu optimum nascatur, his verbis expressit: Cardamomum optimum est, quod ex Coniagine. Armenia, Bosphoroq. devehitur: in India quoque & Arabia provenit: eligitur, quod est frangenti contumax, plenum, oclusum & caput odore tentans. gustu acre & subamarum. Plinio l. 12. c. 13. Simile hu (Amomo & Amomidi) & nomine & frutice Cardamomum, semine oblongo. &c. Et licet Dioscorides, Galeus & ceteri Græci, nunc tantum meninerint, Plinius tamen quatuor genera fecit: viridissimum ac pingue, acutu angulo: proximum è rufo candicans: tertium brevius atque nigrius: pejus tamen varium, odorisq. parvi. Est autem Cardamomum aroma Indorum culinis familiare, carnei quam elixant condientes, quod frumenti: modo provenit, & ocymi plantam sepe simulat.

I. Grana paradysi officin. cujus folia (quæ ut Nuccis moscharæ à D. Clutio Amstelredam. accepimus) sub Melegueta in Prodromo descripsimus.  
 Cardamomum majus, Matth. Lon. Lac. (cui etiam Cardamomum hortensæ) Cast. Lugd.  
 Grana paradysi, Cord. in Diosc.  
 Mellegetta seu Cardamomum piperatum, Eid. histor.  
 Millegueta, Adv. Lob.  
 Malagueta Garziæ (cui & Combazbange, Avicennæ) & ad Clus. cur. post.  
 Cardamomum primum, Cam. ep. alterum, Cæs.  
 Cardamomum Arabum majus, Tab.

Grana paradysi seu Meligettas, Linf. par. 3. c. 14.  
 Hoc Cardamomi minoris loco aliqui utuntur & Melegeta dicitur, propter similitudinem, quam cum Melicæ semine habet.  
 II. Granis paradysi sive Mellegetæ affinis fructus.  
 Fructus 14. sive Melegueta spuria, Clus. exot. lib. 2. cap. 15.  
 III. Cardamomum majus officinarum. \*  
 Saccolæ Arabum, aut Sacoulæ Avicennæ, Elachi Mauritanis.  
 Cardamomum medium, Matth. Lon. Castor. Lugdun.  
 Cardamomum majus, Cord. in Dioscor. (cui

Heyl Arabum) & hist. Clus. ad Dod. Linscot. 4. part. Ind. orient. c. 23.

Cardamomum majus vulgare, Adv. Lob. Clus. in Garz. Tab.

Cardamomum, Garz. Frag. secundum, Cam. ep.

Avicennæ duum generum, alterum Saccollae quebir, id est, magnum: alterum Saccollae cequer, id est minus.

IV. Cardamomum medium: Adv. & Lob. Tabernæm.

Cardamomum mediocre, Cord. hist.

V. Cardamomum simpliciter in officinis dictum.

Cardamomum minus, Matth. Lac. Lonic. Adv. Lugd. Tab. Linscot. l. c.

Cardamomum verum, Ang.

Cardamomum minus, Cord. in Diosc. & hist. cui & Helbane Arabum.

Cardamomum minus vulgare, Lob. Clus. in Garz.

Cardamomum primum, Cæs. tertium, Cam. ep.

VI. Cardamomum minimum: & Lob. Tab. Cardamomum quartum, Cam. ep.

\*\*\*\*\*

## SECTIO QUARTA.

RHUS; COCCONILEA SIVE COGGYGRIA; SORBUS;

AZEDARAETH; FRAXINUS; NUX JUGLANS; NUX AVEL-

lana, sive Corylus; Castanea; Fagus; Quercus; Robur; Quercus

excrementa; Viscum; Phellodrys; Super; Smilax

Arcadum & Ilex.

### R H U S.

**P**oss. & Hippocrati  $\rho\acute{\iota}\theta$ , à coccineis acinorum colore dicitur:  $\rho\acute{\iota}\theta$  enim  $\rho\acute{\iota}\theta\theta\acute{o}$  interpretantur, unde ruffus vox Latina: Rhus, inquit Diosc. lib. 1. cap. 147. quam aliqui Erythron, id est rubrum vocant, fructus est (sic supponit Arleus) rhus coriaria, sic vocata, quod coriary ea utantur ad coria spissanda: est verò arbuscula binum cubitorum, in qua folia oblonga subrubentia, per ambitum illic modo serrata: fructus autem racemulus similis, densus, cerebintini magnitudine, quadantenu latius, cujus corticosa tunica ambiens perutilis est. At Plinio lib. 24. cap. 11. Rhus qua Erythros appellatur, frutex est, & hujus semen aspergitur pro sale obsonij. Verum Plinius male à Rhoë coriariarum distinguit: de Theophrasti Rhoë vide in Viburno.

I. Rhus folio Ulmi.

Rhus, Matth. Ang. Cord. in Diosc. Lac. Lugd. Tabernæm.

Rhus coriaria, Dod. ut: Ger. & desc. Virgin.

Rhus, Rhus veterum, coriaria, obsoniorum & Sumac, Bellon.

Rhus obsoniorum, Ad. Lob. Cæs. Cam. Clus. hist. Sumach Arabum, Lon. Cast. Rauvolf.

Rhus obsoniorum, sive rubrum, sive culinarium, sive coriariarum, idem sunt: cujus feminis tunica externa, quæ sapore acido est, vice salis condimentis aspergebatur.

II. Rhus angustifolium, sub Sumach angustifolio in Prodromo describitur.

III. Rhus myrtifolia Monspeliaca.

Rhus Plinij exultimarus Monspelij, Gesn. hort.

Rhus Plinij myrtifolia Monspeliensium, Adv. Lob. ico.

Rhus sylvestris Plinij, Lob. Dod. Lugd.

Rhus myrtifolius, Tab. Cam. Cæs. alp.

Rhus Plinij nonnullorum, alij Driophanon ejusdem lib. 27. cap. 9. arbitrantur.

IV. Rhus myrtifolia Belgica.

an Myrtus nemoralis & Dryophanon Plinij, Ruell.

Elæagnus lacus Orcomenij Theophrast. Bellon. cult.

Rhus sylv. Plinij, Dod. gal.

Chamæelæagnus Dod. sed melior figura in editione Belgica.

Gagel Germanorum & Myrtus Brabantica quibusdam, Adv. Lob. vel Belgarum, Eid. Adv.

parte altera.

Elæagnus Cordij, Lob. ico.

Rhus sylv. altera, Lugd.

Rhus herba Plinij, Clus. hist.

Plinius l. 24. c. 11. nec Rhus inquit, Latinum nomen habet, cum in pluribus modis veniat: nam



nam & herba est sylvestris, folijs myrti, cauliculis brevibus, quæ venena & tinea pellit, & frutem coriarius appellatur, subrutilis, &c.  
Variat folijs aliquando lætioribus, aliquando longè angustioribus: aliquando foliorum Arbuti insitit crenatis, ut Roskiochio, nomine Rosmarini Septentrionalium, seu Myrti nostratis, à Doct. Backmeistero acceptimus.

## COCCONILEA SIVE COGGYRIA.

**K**occonileia apud Theophrastum 3. hist. 16. habetur. ubi plerique, nonnulli legunt, & Gaza, Prunum transtulit: de qua, ubi de  $\alpha\upsilon\tau\alpha\rho\iota\chi\alpha\upsilon$  (Arbutum & Portulacam Gaza reddit) egisset, subiungit: his solo simili arbor parva, quæ hoc proprium habet, quod fructus in lanuginem abeat: hoc enim de nulla alia arbore audivimus: Plin. l. 13. c. 22. Coggygriam legit: nam cum Andrachnen delineasset, subijcit: simili & Coggygria folio, magnitudine minor, proprietatem habet fructum amittendi lanugine, pappum vocant, quod nulli alij arborum evenit (imo Salici, Populo & Nerio similiter contingit) Verum & Pliny Cotinum lib. 16. c. 18. esse voluit, de qua sic: est in Apennino frutex, qui vocatur Cotinus, ad lineamentum, modo Conchilij colore insignum. Sane Alobroges Rbu vocant, & cortice (sicut & Austriaci circa Viennam) coria strassant: etiam ad pannos luteo colore tingendos utuntur: imò & radicibus pannos rubro colore inspicunt, Angulata notante.

Cotinus, Mart. Ang. Gef. hor. Cast. Cam. Tab.  
Cotinus coriaria, Dod. Eystet. coriarius Plinij,  
Ger. Rhus, Turn.  
Coccigria, forte Barba Jovis Plinij, Gef. hor.  
Cotinus Plinij, Rauvvolf.

Coccigria Theophrasti, Ad. Lob.  
Coggygria Plinij, Clus. pan. & hist. Tab. Ger. u.  
terq; bis pingit. sub Coccygria & Cotino Plinij.  
Coggygria Theophrasti, Cotinus Plinij, Lugd.  
Scotanum vulgo, Cæsalp.

## S O R B U S.

**S**orbus arbor  $\sigma\upsilon\upsilon\alpha$  nominatur Dioscor. l. 1. c. 137. qui non descripsit: at Theoph. 3. hist. 12. Sorbi folium totum spiroxæ nervaceoq; pediculo constat, pinnis similia & lateribus exunt: perinde ac si id unicum folium sit, ad nervosum usq; pediculum, itaquam in laciniis divisum: omnibus in postremo pediculi solum impar prominere, amblystictata, nec in extremum tam acutè micronata, sed rotundiora: florem racemosum habet ex una veluti clava ex multo parvo & albo constantem: fructus quoq; cum magnus ejus proventus est, racematim coit. &c.

Sorborum genera (eidem) duo sunt, semina fructifera, mas sterili (& 3. hist. 3. sylvestris maturior urbana est) fructu differet, quod alia orbiculatum, alia ovatum ferant: distant & succi: nam orbiculati magna ex parte odoratiore sunt & dulciores: ovati, sæpè acidi & minus odorati. At Plinio l. 15. c. 21. Sorbi quadruplex differentia: alijs enim rotundis Mali, alijs turbinata pyri, alijs ovata species, cum malorum aliquibus: odore & suavitate rotunda præcellunt: ceterum vim sapor: quartum genus terminale appellant.

## I. Sorbus fativa.

Sorbus, Brunf. Trag. Dod. ut. Ang. Lac. Cord. in  
Diosc. Gef. hor. Lon. Lugd. Tab. Ger.  
Sorbus domestica, Mart. Ad. Lob. (qui Ostriam  
Theoph. l. 3. c. 10. suspicatur) Cast.  
Sorbum ovatum, Fuch. Tur.  
Sorbus legitima, Clus. pan. & hist.  
Sorbus esculenta, Cam.

Sorbus sylvestris, March. Lugdun. Cast. Taber.  
Gerard.

Fraxinus bubula, Dod. gal.  
Fraxinus aucuparia, Gef. col.  
Ornus, Ruell. Gef. frac. Dod. Portæ.

Sorbi prima species, Tur.  
Sorbi s. genus aucuparium, Cord. in Diosc.  
Sorbus sylv. alpina, Ad. Lob. Cæf.

Sorbus aucuparia, Bello. Clus. pan. & hist. Thal.  
aucupalis, Cam.  
Sorbus torminalis, Lugd.

II. Sorbus sylv. folijs domesticæ similis.  
Fraxinea arbor, Trag.  
Grosser Mehlsbaum, Eid. Lon.

## A Z E D A R A E T H.

**A**zedaraeth Avicenn. l. 2. c. 17. arbor est nota habens fructum similem Nabach (i.e. Loto) & nominant eam in Rechi, arbori Myrobalanor. & est ex quatuor arborib; hanc esse eam quam subjecimus plures existimant.

Arbor fraxini folio flore cæruleo.  
Pseudoxycomorus, Mart. Cast. Tab. Eyst.  
Sycomotorus Italorum malis, Cord. in Diosc. Gef. h.

Perlaro, falso Sycomotorus Italorum, Bellon. cult.  
Azedaracht Avicennæ, Gef. hor. Rauvvolf. cui &  
Asterig Rhalis, incolis Zenselacht.

Azedaraeth

Azedarach, Dod.

Azedarac, Lorus alba Pelicerio, Clus, hisp. & hist. Camer.

Laurus Græca Plinij & Myxus alba, Gef. hor.

Zizypha candida Monspel. Lob. Ger.

Zizyphus alba Matthioli, Lugd.

Tuber, Zizypha Columellæ videtur forte & Plinij, Cæs.

Plinio lib. 15. cap. 14. de Malorum generibus agenti Tuberum duo genera: candidum & à

colore sericum dictum: penè peregrina sunt, in uno Italici agro Veronensi nascentia, quæ lanata appellantur: lanugo ea obducit, &c. ex his Plinij verbis quid colligas?

Ex nucleis precatorios globulos Monachi conficiunt, hinc arbor de gli patre nostro, Italici: Gallis verò, arbor Sancta dicitur.

Variat folijs, quæ in Italica laciniata, in Gallica solum crenata sunt, quod herbarij Lugd. auctor, duplici figura demonstrare voluisse videtur.

## FRAXINUS.

**F**raxinum, nulla arbor nota est inquit Dioscor. l. 1. c. 198. Theophrastus 3. hist. 11. descripsit, ejusq. genera duo fecit: unum excelsum, procerum, ligno candido, nervoso, molliore, crispiore, magis evodi. Alterum humilissimum, minus augefcens, scabrum, durum & magis flavum. Et Plinius l. 16. c. 13. inquit, Græci fraxini duo genera fecerunt, longam, eodem: alteram brevem, duriorcm fusciorcmq., laurinus folijs. Alij situ divisere: campestem enim crispam esse: montanam verò spissam.

### I. Fraxinus excelsior.

Fraxinus prior & βουβύλα (Fraxinus bubula Ga- zæ) Theophrasto.

Fraxinus bumelia, Plinio & Bellon.

Fraxinus, Brunf. Trag. Matth. Dod. ut: Gef. hor.

Lac. Tur. Lon. Ad. Lob. Tab. Lugd. Cast.

Fraxinus prima, & major, Anguil.

Theophr. monet Ideos existimasse fructu & flore catere: ferre tamen in siliqua fructum minutum nucis modo, qualem Amygdalæ, gustu subamarum: ferre & quædam alia οἰσπρία, veluti muscos, ut Laurus: cæterum densiores & magis compactos, globosos, non aliter, quam Platani pilulas. Sane globosos hos muscos, unâ cum fructu hist. Lug. pingit, qui circa Veris initium observantur: qui veluti ex musco glutinoso impensius resiccato concreti videntur: Sic Camermas floret nigris racemis seu granulis, sed fructum non fert, qui absq. fructu, ut juglandiù juli decidit: quare Thal. alia sterilis, alia frugifera.

Fructus ipsius sive semen, Ornoglossum & Lingua avis dicitur, Anguil. alijs fructus Fraxini: alijs lingua passeris: alijs anseris. Avicenna inter medullas computat.

Ex fraxino hastæ, mensæ, vasa & cutensilia mul-

ta fiunt: fiunt & pocula, ex quibus si quis assidue bibat, lienem extenuari ajunt: cujus nomine & corticis decoctum quidam exhibent: quo etiam aliqui venenenti Guajaci felici succellu utuntur, Cæsal. monente: addens ejus corticem internû, aquam, in qua maderit, cæreuleam reddere.

II. Fraxinus humilior, sive altera Theophr. minore & tenuiore folio.

Fraxinus syiveltris, Columellæ.

Ornus, Bellon. cult. (cui & pumila fraxinus & βουβύλα) Lugd.

Triplicem Fraxinum facit Thalius: 1. Fraxinum passim nascentem.

2. Fraxinum Fago similem, Buchschæn.

3. Fraxinum durum seu λεβίγιον, & Steinäschæn.

III. Fraxinus rotundior folio.

Ornus, Galli Pressani lib. de re rustica.

IV. Lign. peregrin aquam cæreuleam reddens. Lignum ad renum affectiones & urinæ incommoda, Monard.

Lignum ad Nephritidem, Lugd.

Lignum in Nova Hispania repertum, Cæs.

Lignum ex novo mundo Pyro simile, Frag.

V. Arbor Indica fraxino similis, oleæ fructu. Nimbo, Garziæ, Acoltæ, Cast. Lugd. Frag.

## NUX JUGLANS.

**N**uces juglandes, Dioscor. l. 1. c. 178. αἰσχυρὰ καὶ ὀνίαι, nonnulli αἰσχυρὰ dicuntur: & Theophr. 1. hist. 12. αἰσχυρὰ, Nux Juglans, Persica & Basilica nuncupatur. quod è Perside à regibus translata sit. Juglans verò quasi Jovis glans: hinc Cloatium, Macrobio referente, Dinglandem primo vocatam scribit, quasi Jovis σιδήανον. Arbor, αἰσχυρὰ: fructus, αἰσχυρὸν dicitur, quod caput, nῆπε τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τὸν νυκταλὶὸν odorū gravitate offendat, ut Pl. l. 15. c. 22. habet: imo l. 17. c. 12. juglandiù umbra capiti noxia: & l. 23. c. 3. afferit nuces juglandes Græcos à capitiù gravedine sic vocare. Genera: Pl. l. 15. c. 22. sola differentia generum in putamine duro, fragiliore & tenui, crasso, loculoso. ac simpli. Addam etiam in magnitudine & parvitate: quare recentiores 5. differentiis potissimum notantur.

I. Nux

## I. Nux juglans sive regia vulgaris.

Nux regia, Brunf. Cord. in Diosc.

Nux juglans, Trago, Matthiol. Lac. Gef. hor.

Lon. Dod. Ad. Lob. Cæs. Cast. Lugd. Tab. Cam.

Nux, Dod. gal.

Juglans, Fuch. Tur.

Has à duocortice & frangendi mora, Moracias & Moracillas appellari Hermolaus tradit, & Lug. & quæ à putamine vix purgari possunt, Sordæ nominantur, Cæs. salp.

Nuces regię maxima frequentia in Virginea habentur, eaq; duorum generum: unum forma & sapore parum ab Anglicis differt, putamine crassiore & duriori: alterum majus cortice scabro & duro, nucleo magno, dulci & oleaginoso, ex quibus contusis Lac conficiunt cum suis cibis miscentes: harum arborum nonnullę octuaginta pedes longę, part. 1. Ind. Occid.

## II. Nux juglans fructu maximo.

Nuces caballinæ, Lugd.

Ex harũ cuppis, marfupia pueris gestanda fiunt.

## III. Nux juglans fructu tenero &amp; fragili putamine.

Nuces juglandes cortice tenuissimo, Gef. hor. Mollusca & Persica, Suevio potę apud Macrobium: cum Tarentina eadem, aut proximę nature, Lugd.

## IV. Nux juglans bifera.

Harum & Plinius meminit, & in agro Patauino provenire Hermolaus asserit, Lugd.

## V. Nux juglans fructu serotino.

Nuces S. Johannis, quia ante diem S. Johannis sacrum, neq; folia, neq; nucleos ostendunt: cum verò id tempus adest par reliquis nucibꝰ, quoad

fructum & folia: harum Tragus meminit: Joh. Baubinus circa Tigurum, Dalechampius circa Lugdunum observavit, Lugd.

## VI. Nux juglans folio serrato.

Juglandis genus alterum, fructu teneriore & longiore, Clus. hist.

Arbores Indica Juglandi similes.

## I. Arbor Indica Mamei dicta.

Mamei arbor juglandis proceritate, folijs paribus, fructu duorum pugnorum, aliquando minore, Oviedo, Lugd.

Mamay, Gomaræ hist. Indicę.

Mamei arbor Castaneę formę, fructu etiam maxi-

mimi cydonij globum superante, Scalig. Lugd.

Mamei arbor mediocriis nucis magnitudine, fructu in Hispaniola rotundo, in continente longo, & crassiore, Benzo Americ. lib. 4.

Mamei fructus, par. 6. Ind. Occid.

Mameyen fructus melocotones sive Persica æquant superantve, Joseph. Acost. parte 9. Amer. l. 4. c. 24. Alias dulces, alias acidi. Idem.

## II. Arbor Indica folijs Juglandis, fructus nucis magnitudine.

Ambare, Garz. Acostę, Frag.

Ambares, Cast.

## III. Fructui prædicto affinis.

Fructus Brasilianus 1. &amp; 2. Clus. ex. l. 2. c. 7.

## IV. Arbor Brasiliana juglandi similis nucibus carens.

Copau, Ind. Occid. p. 3. c. 12.

## V. Hohos, Pacayes sive Guavas multi pro nuce juglande habuerunt: sæpius transplantatas, nuces Hispanicis similes gignere ajunt part. 9. Ind. occid. l. 4. c. 26.

## N U X A V E L L A N A.

**N**uces avellana, *ἀνελαινα* ἢ ἀπὸ τῆς *ἀνελαινας*, Dioscor. l. 1. c. 169. id est, nux Pontica & tenuis dicitur: at Theophrasto 3. hist. 15. *ἀνελαινῆς* *ἀνελαινας*, nuces Heracleotica (quod ex Heraclea Pontica translata) alijs Prænestina & Avellana dicuntur. Avellana Plinio l. 15. c. 22. quas ante Avellinas, patrio nomine vocabant: in Asiam Graciamq; à Ponto venere: & ideo Pontica nuces vocantur. At arbor Latinis Corylus dicitur. Theoph. 1. hist. 16. folia insecta habet ut Ulmus & Robur: 3. hist. 6. quidam florere existimant: 3. hist. 7. sed postquam fructus decidit, racemosum quiddam vermium prægrandis magnitudine nascitur, ex uno pediculo pinguis: 3. hist. 8. julos nonnulli vocant, quod ex minutis squamis innumeris ordine nucis pineę constat, &c.

Genera: Sylvestris est & urbana: ambobus genere constant, quædam enim rotundam, quædam oblongam nucem largiuntur: sed urbanarum fructus candidior est, Theoph. 3. hist. 15.

## I. Corylus sativa fructu albo minore sive domestica, Clus. hist. or.

Avellana domestica, Fuch. Tur.

Avellana tertium genus, Cord. in Diosc.

Corylus domestica rotunda alba, Cast.

Corylus hortensis, Dod. gal. sativa, Lon. Lugd. Corylus persimilis alno, Ad. Lob.

Ggg

Nux



II. Castanea sylvestris, quæ peculiariter Castanea.

Castaneæ populares & coctivæ, Plinio.

Castanea, Brunf. Trag. Tur. Fuch. Ang. Dod. ut:

Gefn. hort. Guil. Lac. Lon. Adv. Lob. Tab. Ger.

Castaneæ minores, Matth. Lugd.

Castaneæ sylv. Cord. in Diof. Cæf. Cast.

Hæ in aqua decoctæ pauperum jejunia saturant: & ex earum farina panis conficitur. Sic in Virginia Castanearum magna quantitas est, & in Florida, sed Gallicis magis sylvestres: p. z. Am.

III. Castanea humilis racemosa.

Castanea humilis, Joh. du Choul in hist. montis Pilati, Lugd.

IV. Castanea folio multifido.

Castanea equina, Matth. Dod. Ad Lob. Cast. Cl. pan. & hist. & hist. app. alt. Lugd. Cæf. Tab. Ger. an sit Myrobalanus folio heliotropij Plinij l. 12. c. 21. dubitat Cæsalpinus.

Ex Oriente primum Constantinopolim, hinc Viennam, ubi provenit, delata: & quia equis anhelosis prodest, equina dicitur.

V. Castanea leporino reni similis.

Castanea Peruana, Clus. hist.

VI. Castanea purgatrix.

Castaneæ purgativæ, Monard. Cast.

Fructus cholagogus, Monard. Lugd.

Ex maritimis Nicaragua in Hispaniam delatus.

VII. Castanea ex Bali insula.

Fructus pyri magnitudine, castaneæ forma coccice tenui minus tamen aculeato, albicans, sapore jucundo, Ind. or. par. 3. c. 39.

VIII. Arbor Mexiocana fructu castaneæ coccifera.

Arbor finium regundorum, Scalig. & ex eo Lug. quia in fructu coccus, quo ad picturas utuntur, & in tabellis pictis, cum literas non habeant, agrorum facies, sineque prædiorum servant. an Daburi, Clus. exot. l. 3. c. 19. Bixa Oviedi, Clus. exot. l. 3. c. 20.

IX. Fructus peregrinus Castaneæ similis. Gor fructus castaneæ similis sed amarus, Scalig. Lugdun.

## F A G U S.

**F**agus Theop. 3. hist. 7. *ἄγυς* (Gaza Scisima vertit, quod sit in laminis scissili) cujus fructum 3. hist. 10. describit, lavem, glandem, in calice echinato, placido tamen & lavi non hispido ut Castanea; illi tamen dulcedine & succo similem. Sed præter glandem etiam baccam parvam gignit, de qua sic Plinius l. 16. c. 16. Fagi glans nucleu simili, triangula cute includitur, & c. media parte folij, plerunque gignens superne parvulam baccam viridem cacumine aculeatam. Theophrasto 3. hist. 10. & 5. hist. 8. duplex est: altera montana candida: altera campestris, nigra: sed campestris minus utilis montanæ, quæ ad multa perutilis.

Fagus, Brunf. Trag. Matth. Angul. Dod. ut: Oxya, Bellonio.

Gefn. hort. Lac. Tur. Lon. Adv. Lob. Cast. Lugd. Cæf. Tab. Ger.

(lapid. Oxya Græcorum, Fragus recentiorum, Gefn. de Ornus, Pandectario.

## Q U E R C U S.

**Q**uercus *ἄγρς* Gracii: licet præsci Graci omne genus arboru *ἄγρς* nomine intellexerint, à verbo *ἄγρς* erumpo: sic Latini Glandis nomine, omne fructu complexi sunt, ut Jabolinus ait, ex Æplo Graci sermonis à *ἄγρς*, apud quos omnes arborum species *ἄγρς* appellatur, ut *ἄγρς* & *ἄγρς*, fiat dictio *ἄγρς*, de qua, quo verbo Cælius omnis fructus significari dicit. Quæ etiā glandu appellatione apud scriptores intelliguntur. à Gracii *ἄγρς* vocatur: sed revera *ἄγρς* ætiam arboris glandiferam denotat, & præsertim Quercum. Glandem verò (ut habet Plin. l. 16. c. 6.) quæ proprie intelligitur, ferunt, Robur, Quercus, Esculus, Cerrus, Ilex, Suber: quāvis Robur appellatione omnia genera contineri posse, Gaza censuerit: cum tamen Robur una solum species sit, quæ *ἄγρς* generi subjecta sunt. Et Theop. 3. hist. 9. Quercus genera sunt, *ἄγρς*, *ἄγρς*, *ἄγρς*, *ἄγρς*, *ἄγρς*, *ἄγρς*, *ἄγρς*, *ἄγρς*, *ἄγρς*, *ἄγρς*: Gaza sic vocat: Robur genera habentur, placida, cerra, latifolia, fagus, fuscicornis, quam aliqui recticorticem vocant.

I. Quercus latifolia, mas, quæ brevi pediculo est. n. *ἄγρς* & Idæorum & Maurorum, Theoph.

latifolia, Plinio.

Glandiferum arborum species tertia, Ang.

Platyphyllos mas, Lugd.

Glande est medioeri, calice tantum postulata scabritie asperato: sæpe ternis aut binis simul coherentibus, raro unica, in summo ramorum prodeunte.

II. Quercus latifolia femina.

Platyphyllos femina, Lugd.

Hæc per omnia minor, folijs ob densas lacinias veluti crispis: glandibus, interdum ternis aut quinis, sæpe ternis aut quaternis, raro binis, rarissime singularibus, calici firmiter adnexis. Verum sæpe penè rotundæ imperfectæ calyci continuæ repetiuntur, quemadmodum in historia Lugdunensi pingitur.

Ggg 2 III. Quer-

III. *Quercus latifolia* perpetuo vitens.

*Quercus* ubi *Sybaris* perspicua, quæ nunquam folia demittit, *Theop.* 1. hist. 15.

*Quercus* in *Thurino* agro, ubi *Sybaris* fluit, *Plin.* 1. 16. c. 21.

*Quercus* in *Appennino* & *Andium* *Gallicæ* gentis agro, *Lugd.*

IV. *Quercus* cum longo pediculo.

*Hemeris* *Idæorum*, *Etymodrys* *Macedonum*, *Hemeris*, *Plinio*; placida, *Gazæ*. (*Theop.*)

*Quercus*, *Trag.* *Matth. Fuch.* *Dod. gal.* *Tur. Lon.* *Tabernæm.*

*Quercus vulgaris*, *Lob. Ger.*

*Quercus vulgaris*, *hemeris*, *Cord.* in *Diosc.*

*Hemeris* *etymodrys*, *Lugd.*

Hæc peculiare, quod glans modo unica, modo gemina longo pediculo affixa dependeat.

*Quercus latifolia* amplissimæ circa *Viennam* *Clusius* meminit, cuius omnes glandes è longis pediculis dependentes, quasi viridi quadam excrecentia, multis inæqualibus angulis prædita, inclusæ erant, quæ resiccata gallarum modo firma & dura erat.

*Querc. Panuonica latifolia*, rectius *Cerrus*, *Cæ.*

Sic *Quercus præaltæ* & *vastæ* in insula *Virginia*: & in *Guayaquil* singularis præstantiæ & longissimæ durationis: *Joseph Acosta* 1. 4. c. 30.

V. *Quercus parva* sive *Phagus Græcorum* & *Esculus* *Plinij*.

*Φαγός, ἄνε τῶν ὀφθαλμῶν*, Latinis abesca vel esu, *Esculus*, quod fructus ejus dulcis sit, ac ceu *Castanea* edulis, cum cæterarum *Quercuum* fructus, suis tantum sapiat.

*Quercus*, sive *glandiferarum arborum* 1. species, *Ang.*

*Phægus*, *Quercus species*, *Cord.* in *Diosc.*

*Esculus* veteribus *Græcis* *πλάτωνα*, *Bellon.*

*Phagus* *esculus mas* & *fœmina*, *Lugd.*

*Ilicis* genus, quod in *Hispania* *Enzinas* vocant, *Cæsalp.*

## ROBUR SIVE QUERCUS GALLIFERA.

I. *Quercus* folijs molli lanugine pubescentib.

*Robur primum*, *Clus. hisp.* & *hist.*

Hujus altera species, quæ folio est minus amplo, & minore glande. (ne ferens.)

II. *Querc. gallam* exiguæ nucis magnitudi-

*Robur 2.* *Clus. hisp.* at 3. *Eid. hist.*

*Galla*, an *Theoph.* *Fagus*, *Adv.*

*Galla major*, *Lob.* & *Dod.* *Galla*, *Cast.*

an *Gallæ* magnæ, quas *Poma de Coquo* nuncupant, *Gazizæ.*

*Folio* præcedenti angustiore, infernè candicante, glande communiter unica, rarè gemina & aculeo magis pungente: quas *Hispani* sub cineribus coctas, secundis mensis apponunt.

*Quercus* genus à nostris diversum, quod veteribus ignotum arbitramur, cuius glandes minoribus fabis haud sunt majores: hæc *Bellon.*

VI. *Quercus calice* echinato glande majore. *Αἰγίω* *Idæorum*, *Aspris* *Maurorum*, *Latino-* *rum Cerrus.*

*Cerrus*, *glandiferarum 2. species*, *Ang.*

*Ægilops* sive *Cerris* majore glande, *Dod.*

*Quercus* *Ægilops*, sive præcelsa dicta *Cerris* *Plinij*, *Adv.*

*Cerris* *Plinij* majore glande, *Lob.*

*Quercus altera*, quæ *Cerrus*, *Cæf.*

*Cerris* sive *Quercus 4. genus*, *Lugd.*

*Cerris* *Plinij 1. Tab.*

Hiscè glandibus ad pannos atro colore inficiendos, gallarum vice utuntur.

VII. *Quercus calice* hispido glande minore.

*Ægilops* minore glande, *Dod.*

*Cerris* *Plinij* minore glande, *Lob.*

*Cerrus* *Ægilops* *Theoph.* *Clus. pan.* & *hist.*

*Glandifera folio* sinuato deciduo tertia, vel

*Quercus 3. species* quæ in *Etruria* *Farnia*, *Cæsalp.*

*Haliphleas*, *Cerrus fœmina*, sive *Quercus 5. genus*, *Lugd.*

Huc referatur,

*Quercus peregrina* sive *Mauritanica* grandissima glande, cuius ex *Scaligero*, *Lugd.* meminit.

VIII. *Quercus Burgundiacæ* calyce hispido.

*Quercus alia* *Bauhini*, sive *Haliphleas* *Sequanorum*, *Lugd.* nisi eadem cum priore.

IX. *Quercus* pedem vix superans.

*Robur 5.* *Clus. hist. hisp.* (at 7. in *hist.*) *Tab.*

*Quercus humilis*, *Dod. Ger.*

*Quercus pumila* fruticis specie, fronde *Ilicis* molliore, *Lob.*

III. *Quercus* folijs muricatis, non lanuginosis, gallâ superiori simili.

*Robur tertium*, *Clus. hisp.* (at quartum in *hist.*)

*Galla major altera*, *Lob.*

*Galla* sive *Robur majus*, *Ger.*

IV. *Quercus* folijs muricatis, minor.

*Robur quartum*, *Clus. hispan.* (at quintum in *hist.*) *Tab.*

*Galla minor*, *Lob. Dod. Ger.*

V. *Quer-*



V. *Quercus humilis* gallis binis, ternis aut pluribus simul junctis.

Robur humile, Clus. pan. at sextum, Eid. hist.

*Quercus* etiam miræ magnitudinis & amplitudinis reperiuntur in Septentrionali plaga *Harcyniæ* sylvæ, Plin. lib. 16. cap. 2. *Quercus* quæ *B. silvæ* in D. Petri nemore est, *Cardanus* lib. 6. var. rer. cap. 23. *Bellon.* Lugdun. & etiam *Gesnerus* meminere.

VI. *Glaus Virginea.*

Fructus exotici 1. vel glandis calix ex *Win-gaudecaovv* allatus, Clus. exot. l. 1. c. 16.

an *Mangummenauk*, *Virginie* historię, quæ in cibum cum piscibus & carnibus cedit.

VII. Glandium vel baccharum quinque genera, quæ in diversis arboribus nascuntur.

1. *Sagarémener.* 2. *Ofamener.* 3. *Pummuckoner*: ex his indigenæ oleū dulce eliciunt: 4. *Sapumener* dictum, costum *Castaneæ* est sapore, ex hac interdū panem pinfunt: 5. *Magūmenauck*, glans est *Querc.* illius provincię: omnibus decoctis in cibis utuntur in *Virginea*, par. 1. Ind. oc.

VIII. *Quercus lapidea.*

*Lithoxyla* sive ligna lapidea *Anglica*, Ad. Lob. *Ligna lapidea*, Lugd.

*Lithoxyla* ex *Cerro*, Clus. pan. & hist.

Verūm & *Abies*, *Alnus*, *Ulmus montana* & alia quoque ligna aliquando in lapidem mutantur, monente etiam *Gesnero* l. de lapidibus. *Abies* integræ cum cortice in *Elbogane* tractu, in lapidem versæ, *Agricola*.

*Fagus* altitudine 170. ulnarum cum trunco, ra-

mis, folijs, in saxo cinereo durissimo sub terra in valle *Joachimica* reperta: & ibidem ex *Alno* lapis, unde cotes fiant, arte conficere docet, *Jo. Kentmannus* lib. de fossilibus.

*Quercinum* lignum sub terra defossum, in coteram lapideam mutatum, manibus suis eruit *Langius*.

Arbores integræ petrificatæ, stantibus adhuc ramis, cortice, medulla ac radicibus, sæpissimè in *Bohemiâ* & vicinis locis subterraneis invenias, *Agricola* auctor.

Narrat *Porta* l. 2. *Magiæ natur.* alicubi succum abundantem petrificum ab arborib. per radices & trunci poros exfugi: atq; radices ipsas, truncum, ramos, folia & flores in lapide convertere.

Amnes & rivuli sunt in *Anglia*, ubi pali lignei, ridice, aut conti, si immergantur, aliquot mensibus lapidescunt, imò fere ferrescunt, &c. Adversar. quod in *Pannonia* quoque *Clusius* notavit. Sic in *Tercera* fons quoque, qui omnia vel illapsa, vel injecta, in solidissimum lapidem commutat, *Lin. scot.* p. part. Ind. or. 6.

Similiter in *Java* majore affirmant incolæ, flumen præterlabi, in quod si ligna quæcunq; immergantur, ea in lapides mutari. 2. p. Ind. or. 12.

Et *Plinio* l. 2. c. 101. in *Ciconum* flumine & in *Piceno* lacu lignum dejectum, lapideo cortice obducitur: & in *Surio* *Colchidis* flumine, adeo ut lapidem plerumque durus adhuc integat cortex: Similiter in flumine *Silaro*, non virgulta modò immerfa, verūm & folia lapidescunt, alias salubri potu ejus aquæ.

## QUERCUS EXCREMENTA.

**Q**uercus præter glandem plurima alia gignunt, *Theophr.* 3. hist. 8. & *Plinio* lib. 16. cap. 7. auctoribus.

*Galla Græcæ* non dissimilis, forè à nana id est fuligine: quod *Gallarum*, pannis nigro colore tingendis, magnus usus sit. Et licet *Plinius* l. 16. cap. 6. voluerit *Gallam* omnes ferre quæ & *Glandem*, *Quercibus* tamen magis peculiaris est. adeo ut *Dioscorides* lib. 1. cap. 146. *Gallam Quercus fructum* appellavit: quam *Greci* duplicem fecere: *Dioscoridis* altera dixerunt, parva, tuberosa, gravu, nullo foramine pervia: altera plana, levius & perforata, quæ major est. *Theophr.* 3. hist. 6. altera candida & exigua, quarum aliqua non majores sibi evadunt: altera nigra, & magnitudinem male nonnulla capeffunt: & cap. 8. *Quercu præter fructum* gignit *Gallam parvulam*, atque alteram resinofam & nigram: & *Plin.* lib. 24. cap. 4. *Galla genera facimus*, solidam, perforatam: Item albam, nigram: majorem & minorem. Hic notatu dignum, quod *Matthioli* in comment. addit: majores *Gallas* illud pestulæ vendicasse, ut quot annis, aut annonæ fertilitatem, aut sterilitatem, aut pestilentem autem prænunciem: nam si integra rumpantur quæ perforata non sunt, aut musca, aut araneus exit: si musca evolat, futuri belli: si verpax vermiculus, annonæ penuria: si currat araneus, pestilentium morborum præfagium esse. *Gallarum genera*, *Tabern.* & *Gerard.* quatuordecim proposuere. *Tragus* scribit, *Quercu* peculiare genus esse, quod *Gallam* ferat, nec in *Germania* provenire.

I. *Gallæ maximæ orbiculatæ.*

*Gallarum* 1. & 2. genus, *Tab.*

*Gallæ* ex Oriente: & Provinciales, *Lugd.*

*Gallæ orbiculatæ*, *Gerard.*

Harum aliæ sunt Orientales, aliæ Provinciales, & *Illyricæ*.

Ggg 3

II. *Galla*

III. *Quercus latifolia* perpetuo virens.

*Quercus* ubi *Sybaris* perfpicua, quæ nunquam folia demittit, Theoph. l. hift. 15.

*Quercus* in *Thurino* agro, ubi *Sybaris* fluit, Plin. l. 16. c. 21.

*Quercus* in *Apennino* & *Andium* *Gallicæ* gentis agro, *Lugd.*

IV. *Quercus* cum longo pediculo.

*H. meris* *Idæorum*, *Etymodrys* *Macedonum*, *Hemeris*, *Plinio*; placida, *Gazæ*. (Theoph.

*Quercus*, *Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. Tur. Lon. Tabernæm.*

*Quercus vulgaris*, *Lob. Ger.*

*Quercus vulgaris*, *hemeris*, *Cord. in Diofc.*

*H. meris etymodrys*, *Lugd.*

Hæc peculiare, quod glans modo unica, modo gemina longo pediculo affixa dependeat.

*Quercus latifolia* ampliffimæ circa *Viennam* *Clufius* meminit, ejus omnes glandes è longis pediculis dependentes, quali viridi quadam excrescentia, multis inæqualibus angulis prædita, inclusæ erant, quæ reliccata gallarum modo firma & dura erat.

*Querc. Pannonica latifolia*, rectius *Cerrus*, *Cæ.*

Sic *Quercus præaltæ* & *vastæ* in insula *Virginæ*: & in *Guayaquil* singularis præstantiæ & longiffimæ durationis: *Joseph Acosta* l. 4. c. 30.

V. *Quercus parva* sive *Phagus Græcorum* & *Efculus* *Plinij*.

*Quercus*, *quæ fructus ejus dulcis fit*, ac ceu *Castanea edulis*, cum cæterarum *Quercuum* fructus, sibi tantum sapiat.

*Quercus*, sive *glandiferarum arborum* 1. species, *Ang.*

*Phagus*, *Quercus species*, *Cord. in Diofc.*

*Efculus* veteribus *Græcis* *παραφύλλον*, *Bellon.*

*Phagus* *efculus* mas & femina, *Lugd.*

*Ilicis* genus, quod in *Hispania* *Enzinas* vocant, *Cæfalp.*

Folio præcedenti angustiore, infernè candicante, glande communiter unica, raro gemina & aculeo magis pungente: quas *Hispani* sub cineribus coctas, secundis mensis apponunt.

*Quercus* genus à nostris diversum, quod veteribus ignorum arbitramur, ejus glandes minoribus fabis haud sunt majores: hæc *Bellon.*

VI. *Quercus* calice echinato glande majore. *Alph. & Idæorum*, *Aspris* *Maurorum*, *Latino- rum Cerrus.*

*Cerrus*, *glandiferarum* 2. species, *Ang.*

*Ægilops* sive *Cerris* majore glande, *Dod.*

*Quercus* *Ægilops*, sive præcelsa dicta *Cerris* *Plinij*, *Adv.*

*Cerris* *Plinij* majore glande, *Lob.*

*Quercus* altera, quæ *Cerrus*, *Cæf.*

*Cerris* sive *Quercus* 4. genus, *Lugd.*

*Cerris* *Plinij* 1. Tab.

Hiscæ glandibus ad pannos atro colore inficiendos, gallarum vice utuntur.

VII. *Quercus* calice hispido glande minore.

*Ægilops* minore glande, *Dod.*

*Cerris* *Plinij* minore glande, *Lob.*

*Cerrus* *Ægilops* *Theoph. Clus. pan. & hift.*

*Glandifera* folio sinuato deciduo tertia, vel

*Quercus* 3. species quæ in *Etruria* *Farnia*, *Cæfalp.*

*Haliphleas*, *Cerrus* femina, sive *Quercus* 5. genus, *Lugd.*

Huc referatur,

*Quercus peregrina* sive *Mauritania grandifolia* glande, ejus ex *Scaligero*, *Lugd.* meminit.

VIII. *Quercus Burgundica* calyce hispido.

*Quercus* alia *Bauhini*, sive *Haliphleas* *Sequanorum*, *Lugd.* niscædem cum priore.

IX. *Quercus* pedem vix superans.

*Robur* 5. *Clus. hift. hisp.* (at 7. in *hif.*) Tab.

*Quercus humilis*, *Dod. Ger.*

*Quercus pumila* fruticis specie, fronde *Ilicis* molliore, *Lob.*

## ROBUR SIVE QUERCUS GALLIFERA.

I. *Quercus* folijs molli lanugine pubescentibus. *Robur primum*, *Clus. hisp.* & *hif.*

Hujus altera species, quæ folio est minus amplo, & minore glande. (ne ferens.)

II. *Querc. gallam* exiguæ nucis magnitudi-

*Robur* 2. *Clus. hisp.* at 3. *Eid. hif.*

*Galla*, an *Theoph. Fagus*, *Adv.*

*Galla* major, *Lob.* & *Dod.* *Galla*, *Cast.*

an *Gallæ* magnæ, quas *Poma de Coquonen-*

III. *Quercus* folijs muricatis, non lanuginosis, galla superiori simili.

*Robur* tertium, *Clus. hisp.* (at quartum in *hif.*)

*Galla* major altera, *Lob.* (Tab.

*Galla* sive *Robur majus*, *Ger.*

IV. *Quercus* folijs muricatis, minor.

*Robur* quartum, *Clus. hispan.* (at quintum in *hif.*) Tab.

*Galla* minor, *Lob.* *Dod.*, *Ger.*

V. *Quer-*

V. *Quercus humilis* gallis binis, ternis aut pluribus simul junctis.

Robur humile, Clus. pan. at sextum, Eid. hist.

*Quercus* etiam miræ magnitudinis & amplitudinis reperiuntur in Septentrionali plaga Hærcyniæ sylvæ, Plin. lib. 16. cap. 2. *Quercus* quæ B. filæ in D. Petri nemore est, Cardanus lib. 6. var. rer. cap. 23. Bellon. Lugdun. & etiam Gessnerus meminere.

VI. *Glans Virginea*.

Fructus exoticus et vel glandis calix ex Windaudeaovv allatus, Clus. exot. l. 2. c. 16. an Mangumenauck, Virginie historię, quæ in cibum cum piscibus & carnibus cedit.

VII. *Glandium* vel baccarum quinque genera, quæ in diversis arboribus nascuntur.

1. Sagatémener. 2. Ofamener. 3. Pummuckoner: ex his indigenæ oleû dulce eliciunt: 4. Sapumener dictum, coctum Castaneæ est sapore, ex hac interdû panem pinsumt: 5. Magûmenauck, glans est *Querc.* illius provinciæ: omnibus decoctis in cibis utuntur in Virginea, par. 1. Ind. oc.

VIII. *Quercus lapidea*.

Lithoxyla sive ligna lapidea Anglica, Ad. Lob. Ligna lapidea, Lugd.

Lithoxyla ex Cerro, Clus. pan. & hist.

Verum & *Abies*, *Alnus*, *Ulmus montana* & alia quoque ligna aliquando in lapidem mutantur, monente etiam Gessnero l. de lapidibus. *Abietes* integræ cum cortice in Elbogane tractu, in lapidem versæ, Agricola.

Fagus altitudine 170. ulnarum cum trunco, ra-

mis, folijs, in saxo cinereo durissimo sub terra in valle Joachimica reperta: & ibidem ex Alno lapis, unde cotes fiant, arte conficere docet, Jo. Kentmannus lib. de fossilibus.

*Quercinum* lignum sub terra defossum, in corem lapideam mutatum, manibus suis eruit Langius.

Arbores integræ petrificatæ, stantibus adhuc ramis, cortice, medulla ac radicibus, sæpissimè in Bohemiâ & vicinis locis subterraneis invenias, Agricola auctore.

Narrat Porta l. 2. Magiæ natur. alicubi succum abundantem petrificum ab arborib. per radices & trunci poros exsugere: atque radices ipsas, truncum, ramos, folia & flores in lapidē convertere.

Amnes & rivuli sunt in Anglia, ubi pali ligui, ridice, aut conti, si immergantur, aliquot mensibus lapidescunt, imò ferè ferrescunt, &c. Adversar. quod in Pannonia quoque Clusius notavit. Sic in Tercera fons quoque, qui omnia vel illapsa, vel injecta, in solidissimum lapidem commutat, Linscot. 3. part. Ind. or. 6.

Similiter in Java majore affirmant incolæ, fluxum præterlabi, in quod si ligna quæcunq; immergantur, ea in lapides mutari. 2. p. Ind. or. 22.

Et Plinio l. 2. c. 103. in Ciconum flumine & in Piceno lacu lignum dejectum, lapideo cortice obducitur: & in Surio Colchidis flumine, adeo ut lapidem plerumque durus adhuc integat cortex: Similiter in flumine Silaro, non virgulta modò immersa, verum & folia lapidescunt, alias salubri potu ejus aquæ.

## QUERCUS EXCREMENTA.

**Q**uercus præter glandem plurima alia gignunt, Theophr. 3. hist. 8. & Plinio lib. 16. cap. 7. auctoribus.

Galla Græci vnicè dicta, forè à γάλα, id est fuligine: quod Gallarum, pannis nigro colore tingendis, magnus usus sit. Et licet Plinius l. 16. cap. 6. voluerit Gallam omnes ferre quæ & Glandem, *Quercubus* tamen magis peculiariter est: adeo ut Dioscoridis lib. 1. cap. 1. 46. Gallam *Quercum* fructum appellaret: quam Græci duplicem fecere: Dioscoridi altera diaphanior, parva, tuberosa, gravia, nullo foramine pervia: altera plana, levius & perforata, quæ major est. Theophr. 3. hist. 6. altera candida & exigua, quarum aliqua non majores sibi evadunt: altera nigra, & magnitudinem mali nonnulla capeffunt: & cap. 8. *Quercus* præter fructum gignit Gallam parvulam, atque alteram resinofam & nigram: & Plin. lib. 2. c. 1. cap. 6. Galla genera facimus, solidam, perforatam: Item albam, nigram: majorem & minorem. Hic notatu dignum, quod Mattiæbolus in comment. addit: majores Gallas illud peculiare sibi vendicasse, ut quotannis, aut annonæ fertilitatem, aut sterilitatem, aut pestilentem auram prænnuncient: nam si integræ rumpantur quæ perforatæ non sunt, aut musca, aut araneus exit: si musca evolat, futuri belli: si verpat vermiculus, annonæ penuria: si currat araneus, pestilentium morborum præsagium esse. Gallarum gonora, Tabern. & Gerard. quatuordecim proposuere. Tragus scribit, *Quercum* peculiare genus esse, quod Gallam ferat, nec in Germania provenire.

I. Gallæ maximæ orbiculatæ.

Gallarum 1. & 2. genus, Tab.

Gallæ ex Oriente: & Provinciales, Lugd.

Gallæ orbiculatæ, Gerard.

Harum aliæ sunt Orientales, aliæ Provinciales, & Illyricæ.

Ggg 3

II. Galla

II. Galla oblonga: & Ger.

Gallæ ex Istria, Lugd.

Gallarum 3.4. & 5. genus, Tab.

III. Galla minor.

Gallarum 6. genus, Tab.

Galla viridis sive omphacitica, Ger.

IV. Galla gallericulata: & Ger.

Excrementa duo fungum quodammodo exprimentia, Lugd.

Gallarum genus 12. 13. & 14. Tab.

V. Galla angulosa.

Gallarum genus 7. 8. 9. 10. Tab.

Galla viridis sive omphacitica, Ger.

VI. Galla umbilicata.

Excrementum umbilicatum, Lugd.

VII. Galla Brasiliiana quinquangula.

Fructus miscellaneus 10. Clus. exot. l. 2. c. 25.

*Alia Quercus Excrementa.*

I. Excrementum moro simile.

*Σπυγίον* Theoph. 3. hist. 8. specie mori, sed durum & fractu admodum difficile: quædam veluti mora fert, Plin. lib. 16. c. 7.

II. Excrementa pudendi virilis effigie.

*Ανδρικός* sive colis effigie representans, Theoph. Veretrum, Lugd.

III. Excrementum tauri caput referens: &

*Ταυροειδές* durum & perforatum & tauri caput quodammodo æmulans, quod præruptum nuclei oleæ speciem intus ostendit, Theoph. Tauri caput imitantia, Plinio.

Gallarum genus undecimum, Tab.

Galla asinina, Ger.

IV. Pilulæ lanatæ: & Lugd.

*Πιλον* pilum quidam appellant: pilulæ sunt lanuginosæ, molles, nucleum duriorē amplexæ, quibus ad lucernas utuntur, Theoph. Pilulæ nucibus non abssimiles, intus habentes floccos molles, &c. Plin.

V. Pilulæ capillatæ: & Lugd.

*Σπυγίον* *νιπλον* *ίχον*, pilula comam habens, quæ inutilis Theoph. pilula alia inutilis cum capillo, verno tamen tempore mellei succi, Plin.

Bedeguaris effigie excrementum spongiosum & muscosum, Lob.

VI. Pilulæ in alis ramorum.

*Σπυγίον* *μαχαλγυρίε*, in ramorum alis pilulam aliam gignit, sine pediculo, concavosq; sessilem & verticillatam, &c. Theoph. gignunt & aliarum ramorum pilulas, corpore, non pediculo, adherentes, candicantes umbilicis, Plin.

Pilulæ sessiles, Lugd.

Capita multis squammis constantia, Clus. in Cerri historia: vide & Thaliū in Quercu.

VII. Pilulæ sē folijs convolutis.

*Σπυγίον* *πυλμαίον*, pilula sē folijs compressa & convoluta, Theoph. sē folijs convolutæ pilulæ, Plin.

Pilulæ foliosæ, Lugd.

an idem cum *μαχαλγυρίε* Theoph. 3. hist. 7. & Cachry Plinij lib. 16. cap. 8.

VIII. Pilulæ aquosæ: & Lugd.

*Σπυγίον* *ἐκ Ακτινίδος*: super folijs tergo adherentem pilulā fert candidam, aquosā dum tenera est, in qua culices, & maturescens in modum parvæ Gallæ durefcit, Theoph. in folio rubente aquosi nuclei, candicantes & translucenti, &c. Plin. *ὀρνυμίδας*, Galeno.

Pilulæ asinina, Trago.

Quercus vulgaris cum suis excrementis fungosis, Lob.

IX. Pumex quercinus.

*Ασβεστός* pumiceum lapillum quoque gignit, quanquam rarō: Theoph. aliquando & pumices gignit, Plin.

Pumex, Lugd.

X. Quercus excrementum villosum.

*Σπυγίον*, Diosc.

*Πυλμαίον*, Theoph. 3. hist. 9.

Panos arentes, muscoso villo canos sē ramis dependentes, Plinius l. 16. c. 8. vocat.

Sphagnos & Bryon, Plin. l. 12. c. 23.

Splanchnon & Hypnum, Lugd.

Ufnea, Arabum.

XI. Foliorum quercus gemmæ foraminulæ.

XII. Coccus Quercuum.

Coccus cochlearum exilium in similitudine in Ciliciæ Quercubus, Diosc. l. 4. c. 48.

XIII. Verruca seu nodi Quercus.

XIV. Quercus albumen.

XV. Uva Quercina.

Uva Quercina à me inventa, quā nihil præstantius in dysentericiæ etiam deploratis, Encelius l. 3. de lapid. c. 51. vide & Schenck.

Uva Quercina in annofarum Quercuum truncis, Thal. in Quercu.

an Hypodrys fungus rubes, ad Quercus radices: eodem modo quo Hypocistis sub Cisto pululante solet, Solinander consil. sect. 4. conf. 24. & 25.

XVI. Boleti Quercus, qui sē radicibus & circa radices gignuntur, Plin. l. 16. c. 8.

XVII. Quer-

XVII. Quercinum Agaricum vel Fungus. | XVIII. Quercus excrementum purgans: &  
de Boletis & Fungo inter Fungos aërum est. | Lob. obf.

## VISCUM ARBORUM.

**V**iscum licet multi arboribus adnascatur, quia tamen in Quercubus optimum provenit, unde Jon poeta sudorem Quercus vocavit, idcirco Quercus excrementum illud subjungere lubet. Viscum id est Aristoteli 1. gen. an. 1. dicitur, unde Latine Viscum fluxit: in Theoph. 3. hist. 9. & 16. quod nomen commune, ut Stelin Eubœum, Hyphear Arcadum vocabulum esse scribit. Dioscor. 1. 3. c. 103. id est (sic glutinum quod ex eo fit appellat) est fructus quodam rotundo frutice in Quercu nascentis, folijs buxo similibus conficitur, id est quidam derivari dixerunt ab *ix* significante nati, quasi id est a futuro *ix*.

Genera Visci: Plin. 1. 16. c. 4. in abiete ac larice (pino Theophr.) Stelin dicit Eubœa, Hyphear Arcadia nasci scribit: Viscum autem in Quercu, Robore, Illice, Pruno sylv. Terebinte, nec alijs (& alijs Theophr.) arboribus adnasci plerique: vide Theoph. 2. caus. 23. & hist. 16. At Dioscor. l. c. gignitur quoque in malo, pyro & plerique alijs arboribus atque etiam apud fruticum quarundam radices reperitur. Quare recentiores observant in abiete, acere, betula, castanea, cerro, corylo, cotoneo, cynosbato, ilice, larice, melleo, nuce, olea, oxycantho, oxycodro, pomo, populo nigra, pruno sylv. pyro domestica & sylv. quercu, robore, rosis, salice, subere, sorbo, terebintho & tilia. Veteres arborati sunt, Visci acini a Turco conestus, quod ad pulpam pertinet, concoqui: quod seminis est, incoctum ab alvo deici, sisti, in arboribus illis, in quibus isti quiescere consueverunt. Sed quasi cornua ex ossibus animalium: sic ex arboribus viscum educa, cum Scaligero exerc. 168. c. edimus.

## I. Viscum baccis albis.

Viscus, Brunf.

Viscum, Trag. Matth. Fuch Dod. ut: Cord. in Diosc. Ang. Tur. Lac. Lon. Ad. Lob. Cæf. (qui fruticem dicit) Clus. Cast. Tab. Ger.

Lignum Visci quercini & Lignum S. Crucis, Gentilis & Jacobus de partibus, vocant.

Quercium omnes commendat: quidam & quod Castaneæ adnascitur, probant: quod verò malo ac pyro syl. ac domesticæ, penitus inutile scribunt: & ut Bellonius refert, nulla Quercus est inter montem Athon & urbes Ceres & Tricala, quæ Viscum non alat: & à rusticis Oxo nuncupatur: nam tenacissimum Viscum ex eis baccis, quemadmodum Rhodienfes ex fructu Subere obtinent.

## II. Viscum baccis rubris.

Viscum baccis rubris in oleis circa Hierusalem, Bellon. Cast. Lugd.

Viscum baccis purpureis, in olea, Clus. hisp. & hist. qui & Visci oxeredri meminit.

## III. Viscum racemosum.

Viscum polycocon, Cam. ep.

Hoc à vulgari solum baccarum racematim coherentium copia differt.

IV. Viscum latifolium senis circulis utrinque insculptis.

Viscum Indicum, Adv. Lobel. Lugdun. Taber. Gerard.

V. Visci modo arboribus Indicis adnascens. Peruviana alia Aloës facie, arboribus innascens

Visci ritu, Ad. Lob. Lugd.

Planta Peruana Visci similis, Tab.

Viscum Peruvianum, Ger.

## P H E L L O D R Y S.

**Q**uam deinde quo Arcades nuncupant, natura est inter Illicem & Quercum media, atque, ad Illicem formam nam quidam esse putaverunt, Theoph. 3. hist. 18. auctore. Dicitur Phellodrys quasi Suberiquercus, nomine ex Subere & Quercu, alio, quod natura utrinque, participem esse ostendit. Hæc, Theoph. l. c. Illice mollior ac subtilior, Quercu durior ac spissior: colore ligni decoratæ, candidior Illice, sulvior Quercu: folio simili ambobus, verum majori quam Illex, minori quam Quercu: fructu Illice minore, at Quercu majore. Plinius 1. 16. c. 8. eandem cum Subere existimasse videtur, ut qui Theophrasti de Phellodry verba ad Suber transfulerit.

I. Phellodrys candicans latifolia molliter aculeata.

Phellodrys alba latifolia, Lugd.

an Suberella, Cæfalp.

II. Phellodrys candicans angustifolia serrata.

Phellodrys, Matth. Ad. (& Illex femina) Cast. Lugd. Tab.

sub Subere latifolio ramus serratis folijs apud Lobel. pingitur.

Phellodrys alba angustifolia folio serrato, Lug. Cerro.

Cerrosugaro Matthioli, Clus. hist.

III. Phell. nigricans latif. incisuris spinosus.

Phellodrys nigra latissimis folijs, Lugd.

IV. Phellodrys nigricans angustifolia.

Phellodrys nigra mediocribus folijs, Lugd.

V. Phellodrys folijs muricatis.

Phellodrys folijs muricatis calyce glandis echinato, Lugd.

## S U B E R.

**S**uber quoddam Græci à ποσειδώνιο fluitino, Suberiu modo, quod aequi semper innaret: qua ratione etiam Hæ, quoddam semper altum petat dicitur. Theophr. 3. hist. 16. arbor est caudicosa, parumque ramosa, proceratamen, multumque insignis, ligno robusto, cortice unico crasso, disrumpitur, solito: folio fraxini, crasso oblongiori & deciduo, fructu glandoso Agræ similis: corticem detrahunt, inversumque dividendum censent: alioqui arborem deterierem efficiunt: rursum vero intra triennium repletur. Plin. l. 16. c. 6. Suber inter glandiferas recenset: & c. 8. corticis usum in hyberno suminarum calcatu: quare non infacetè Græcos, corticu arborem appellasse scribit.

I. Suber latifolium folio deciduo, & Theophr.

Suber, Matth. Lac. Bellon. Cæf.

Phellos sive Suber Gazæ, Ang.

Suber Aquitanicum folio deciduo, Clus. hisp. & hist.

Phellos sive Suber in Aquitania, Dod.

Suber folio breviori & latiore, Lugd.

II. Suber latifolium perpetuo virens.

Suberifera latifolia Ilex glandæ echinato, Ad.

Suber Hispanicum latifolium perpetuo virens, Clus. hisp. & hist.

Phellos sive Suber in Hispania, Dod.

Suber latifolia, Lob. Cast. latifolium, Tab. Ger.

Videntur hæc duæ species saltem in eo differre, quod altera, quæ circa Pyrrhenæos montes, folijs hyberno tempore exuat, quod Theophr. de ποσειδώνιο Pyrrheno scribit: altera vero perpetua fronde in Italia ac Hispania vireat.

III. Suber angustifolium non serratum.

Suber 2. & angustifolium, Matt. Cast. Tab. Ger.

Suberifera angustifolia Ilex, Ad.

Suber folio longiore & angustiore, Lugd.

Suberis latifoliæ ramus dexter, apud Lob.

Suber alterum oblongis angustifolij, folijs, Cl. hist.

IV. Suberi affine lignum fomitis vicem præbens.

Lignorum duo genera Brasiliæ habent, quorum alterum est mollissimum, alterum clarissimum, quibus ad ignem excitandum utuntur hoc modo: virgam ex præduri illius ligni, pedali longitudine ab altera parte ad fusi modum excavant, hujus cuspidem in mollis illius ligni frusto defigunt, virgam maxima celeritate volvunt, quasi ligni suppositi frustum perforaturi, sicque non modò fumus quem Tatacon vocant, sed etiam ignis qui illis Tata excitatur, & gossypio, vel folijs fideis admotis, ignis concipitur, Læsius in hist. Brasiliæ c. 17.

an Lignum fomitis vicem præbens, Clus. exot. lib. 1. cap. 8.

Ligna in Brasiliæ quæ Urakuciba vocant, quæ exliccant, dein invicem terunt, ex quo attritus pulvis densus in flammatur. Stadius par. 3. Ind. Occid. c. 6.

V. Lignum leve fungosum è Java majore.

Lignum cotis vicem præbens, Clus. l. c.

Ac Geslib. de lapide, ubi adeo est lignum induratum, ut vel Cores ex eo fiant, aut fieri possint.

## I L E X E T S M I L A X A R C A D U M.

**I**lex Diosc. l. 1. c. 14. 4. & Theophr. 3. hist. 16. æquum, quia serra propter duritiem secanda fit. Est autem Theophr. l. c. folio Quercus, sed minore aculeatior: cortice leviori quam Quercus: arbor magna instar Quercus assurgit: materies spissa & robusta: radix alta admodum atque multiplex: fructus glandosus, sed glans ipsa pusilla est: veterem novum occupat, nam sero maturescit, quamobrem bisera à nonnullis existimata: fert præter glandem granum quoddam puniceum, & viscum atque hypbeæ habet, &c. Σμυλάκη Arcades vocant arborem Ilici similem folio tamen non aculeato, sed molliori profundiorique: nec materia ut illo solida spissaque, sed soluta molliorque, &c. Theophr. l. c. At Plinio l. 16. c. 6. Ilici duo genera: ex his in Italia folio non multum ab oleis distant, Smilaces à quibusdam Græci distant: in provincijs Aquifolia, &c.

I. Ilex oblongo serrato folio.

Ilex, Matth. Ang. Lac. Bellon. Cæf. Lugd.

Ilex arborea, Ad.

Ilex angustifolia, Taber.

Sanè Phellodryn, si faciem & folia perpendas, Ilicem quampiam dixeris: ipsum autem lignum, mollius & laxius Ilice, & fructus major quam Ilicis

II. Ilex folio angusto non serrato.

Smilax



*Smilax humilis angustifolia*, Lugd.

III. *Ilex folio rotundiore*, molli, modicęq; sinuato, sive *Smilax Theophrasti*.

*Ilex major*, Clus. hisp. & hist.

*Ilex major glandifera*, Dod.

*Ilex arbor*, Lob.

*Ilex*, Taber. glandifera, Ger.

*Ilex latifolia*, Camer. epist.

*Illicis alterum genus*, Cæs.

*Ilex in Gallia Narbonensi*, Lugd.

*Smilax Arcadum glandifera*, Lugd.

Fructu est majore & longiore Hispanica: at Narbonensis minore & brevior.

Huc referri debet

*Ilex Londinensis duplex*, quas Clusius in sua historia descripsit: quietiam in *Ilice Monspe-liaca*, aliquando granum ex puniceo nigricans, & interdum tenuem & capillaceum mucum cinereum, & ramis dependentem, non verò Viscum aut hyphear, observavit.

IV. *Ilex aculeata cocciglandifera*.

*Ilex* hæc à Diof. l. 4. c. 48. *νεμωδὴ βυγινὴ*, à Theophr. 3. hist. 16. communi nomine *νεμωδὴ*: à Plin. l. 16. c. 6. *Ilex aquifolia*, & c. 6. *Ilex parva Aquifolia*: à quibusdam *Phellodrys coccifera* appellatur. Est autem Diof. l. c. frutex parvus è cremiorum genere, cui grana ceu lentes adhærent, quæ decerpta reponuntur: hæc ille. Etenim in foliorum supina parte, nonnunquam sed rarius, in furculorum quoque nodis, granum quoddam rotundum, parvum rubens, sanguineo colore plenum innascitur, quod Diof. & Theophrast. *νεμωδὴ*: Pausanias, Coccum: Plinius, granum, coccum, quifquiliū (cusculium aliqui legunt.) Arabes, Chermes: officinæ granum tinctorium, nam in ipso grano vermiculus nascitur, ex quo Chermesinum conficitur: aliqui *Scarlatum* vocant: ex hoc quoque Monspefuli confectio *Alkermes* conficitur.

Coccum insectarium, Marthiol. Lacun. Bello-nio cult.

Coccus insectoria, Cord. in Diofcor. Ad. Lob. Cast. Tab.

Cocci insectorij arbuscula, Lugd.

*Granum & coccus Baphica*, Ang.

*Ilex in quo coccus baphica*, Bellon. & *Ilex pumila*.

*Granum tinctorium*, Lon. Cæs.

*Ilex minor coccigera*, Dod.

*Ilex coccifera*, Rauvvolf. Clus. hisp. & hist. Gerard.

*Ilex coccifera*, Bellon. Cam. ep. Tab.

*Ilex aquifolia*, Lugd.

*Illicis species*, Fragofo.

*Illicis alterum genus*, Quiquerano.

Huc referatur ex Anguillara

Agria quam Plinius *Aquifoliam* vocitat, quæ folijs est *Illicis* aliquantulum spinosis, glan-de minima, & quæ in agro Patavino provenit. an *Milav* sive *Acylica*, *illicis species* Bellon.

V. *Ilex aculeata baccifera folio sinuato*.

Hæc Theoph. 3. hist. 4. *αγία* (*Aquifoliam* *Gaza* vertit) quam perpetuò virere & in montibus nasci scribit: & Plinio l. 16. c. 21. *Aquifolio*, *folia* non decidunt, & montes amat.

*Aquifolia*, Trag. Dod. gal. quibusdā *Ruscus syl.* *Aquifolium*, Ruel. Marth. Bellon. Ges. hor. (quibusdā *Palma aculeata*) Lobel. Cast. Lugdun. Thal. Tab.

*Agrifolium*, Guilan. (fortè *Cratægus Theoph.*) Dod. Cæs. Cam. Ger.

*Aquifolium* sive *Agrifolium Septentrionis*, Ad. Paliurus secundus, Lacun.

*Ilex aquifolia*, Lonic.

an sit *Hedera* rigens Plinij dubitat Cæs. at Plinij l. 16. c. 34. hæc sunt: est & rigens *Edera*, quæ sine adminiculo stat, sola omnium generum ob id vocata cissos.

Hæc multis in locis tam pumila, ut ad frutices referenda sit: alijs in locis in justam arbo-rem attollitur: hinc apud Tragum *Aquifolia arbor*, & *Aquifolia frutex*.

Hæc per ætatem redditur folio nequaquam simbrato, nec pungente, sed solum extremitate acuminata, & hæc est

*Aquifolia* species *levi folio*, Ges. hor.

Rustici ex cortice radicibus detracto Viscum parant.

# \*\*\*\*\* SECTIO QUINTA.

TILIA; ULMUS; OSTRYS SEU OSTRIA; BETULA; ALNUS;  
EVONYMUS; VIBURNUM; POPULUS; GOSSIPUM SIVE

Xylon; Acer; Platanus; Sassafras & Ricinus.

## T I L I A.

**T**ilia, Theophr. 3. hist. 10. ἀλουργα δicitur, quod in tenuis assulas sive phylaras discerpatur: & inter corticem & lignum, alia tenuis interiores cortices sunt, & veluti membrana, à quib. aliarum quog. arborum cortices interiores, Tilia & Phylara vocantur: quod ex Plin. l. 16. c. 14. & l. 24. c. 8. colligere est. Theophr. l. c. altera mas est, altera femina: differunt inter se forma, tum ligno: & quod mas sterili est & sine flore: femina florem & fructum gignit, & c. folium figura Hedera folio simile, veram sensim magis rotundatur, & juxta pediculum, id quod velut in gibbum prominet, à folij medio, longiore tractu, in acutum magis cogitur: per ambitum crispis & serratis folia sunt, & c. Plin. l. 16. c. 14. Tilia mas & femina, quæ omni modo differunt, & c.

I. Tilia mas folijs Ulmi.

Tilia mas, Brunf. Dod. Lugd. quoad descriptionem, non iconem, quæ Ulmi est.

Hæc cum non semper fructum ferat, à quibusdam sterilis existimatur: interdum siliquas rotundas, compressas, coarctatas, cum fissura in summa parte edit, quarum singulæ & singulis petiolis dependent.

II. Tilia mont. maximo folio: an mas Theophr. Tilia sylvestris sive montana, Thal.

In monte nostro Murco provenit, in quo nullum hæc tenus fructum observavimus.

III. Tilia femina folio majore.

Tilia femina, Brunf. Mart. Fuch. Ang. Dod. gal. Gesl. hor. Ad. Lob. Cæs. Lugd. Tab.

Tilia, Tur. Lac. Lon. Dod. Latvia, Tr. g.

Philyta Græcis, Tilia Latinis, Guil.

Phillyrea, Cast. ico.

Ex tiliarum cortice funes, & ut Bellonius refert, in monte Athou etiam lagenæ fiunt.

Mirum profecto quod Plinius l. 17. c. 16. scribit Tiliam juxta Tiburtes conspici omni genere pomorum onustam, alio ramo nucib\*, alio bacis, aliunde vite, ficis, pyris, punicis, malorumque generibus, sed cui vita brevis fuit.

Ac tiliarum antiquarum radices sæpè numero simile observatur ei, quod ad Quercus radices Uva est, Thalia monente.

IV. Tilia femina folio minore.

Tilia sylvestris, Trago.

Tilia minor, Gesl. hort.

Hæc per omnia minor est, & fronde nigriore.

## U L M U S.

**Q**uia Latinis Ulnus, Græcis Diosl. l. c. 111. & Theophr. 3. hist. 14. qui genera duo fecit: unum ἐπὶ τῆς βῆ (montium) Gazæ, Ulnus montis, Plinio alterum τῆς ἀλῆς (Ulnus campestris Plinio) interest quod Ulnus proprius est, montium autior: folium individuum leviter circumferratum, oblongius quam pyræ, scabrum, leviter: materies flava, robusta, nervosa, deformis, quia tota cor est: sterili putatur. At Plinio l. 16. c. 40. semem fert latiusculum, rotundum tenuiter: qui l. 16. c. 17. Ulmi quatuor genera fecit. Græci, inquit, duo Ulmi genera novere: montis, quæ sit amplior: campestris, quæ fruticosa. Italia Atmia vocat excelsum, & ex ἡσπικα, ἀπὸ φέρει, quæ non sunt vigna: alterum genus Gallicæ: tertium nostrates, densiore folio & ab eodem surculo numerosiore: quartum sylvestre. Theophr. 3. hist. 8. Ulnus mas fert & folliculos quosdam: & à hist. 8. c. 8. νῦν οὖν (pervenit Dioscoridi) in folliculo gummi gignit & animalia quadam culicibus similia (et ut Dioscorides, humor in dum excoquitur, in animalia culicibus similia resolvitur.) Nam si Ulnus verno tempore pluvij, subit ogy, calore solis infestatur, ipsius folia protinus corrugantur, & vesicæ seu folliculi steroti humani figuræ generantur, quibus humor initio lentus, mox in gummi concrevens includitur, qui dum siccatur in vermiculos, qui canipes, culices: & miliones appellantur, volant. Addit Theophr. Cæs. brym (amentæ Gazæ) etiam edere peculiatrem, acutius, multam minutam, nigram. Semen à Plinio Samora vocatur.

I. Ulnus campestris, & Theophr.

Ulnus nostras sive Italica, Plinij.

Ulnus vernacula, Columellæ.

Ulnus, Trago. Mart. Dod. ut: Bellon. Lac. Turn.

Cord. in Diosc. & hist. Gesl. hort. Lon. Ad. Lob.

Cæs. Lugd. Cam. Clus. hist.

Ulnus

Ulmus in planis proveniens, Ang.

Ulmus 1. Tab. qui & 2. habet, quæ Ulmus, Ger.

Huc referri debet ea, cuius folijs averfa parte folliculi adnascuntur, quæ dicitur

Tilia mas, Matth. Adv. Lob. Lugd. Tab. Ger.

Carpinus nigra, Cast.

Ulmus aut ei similis cum folliculis, quam aliqui pro Tilia mare offerunt, Dod.

Notatu omnino dignum quod Clusius observavit, nempe Ulmorum, juxta Thormim amnem in Hispania nascentium, quasdam radices in tenuissima stamina desinere, quæ cum à præterlabentibus aquis perluuntur, rubescens colore contrahere, in quibus exigua quædam animalcula, exiguis locustis similia nascuntur & latitant, quæ piscatores in escam capiendis piscibus colligunt: quæ verò adole-

scunt ex radiculis emergentia, \*instar terrestrium locustarum avolare: postea certo tempore in aquas ad suum genus conservandum remeare. Sic Bellonius ex Ulmi cortice lagnas confici scribit.

II. Ulmus montana.

Ulmus latifolia, Trag. Ger.

Ulmus montana, Matth. Ang. Cast.

Ulmus alterum genus, Cord. in Diosc. Cæs.

Ulmus 2. Dod. tertia, Tab.

Ulmus similes arbores.

I. Cortex arboris Ulmo similis ad catarrhos.

Arboris cortex ad rheumatismos, Mon. Lugd.

Arbor vasta Ulmo similis cum amplitudine, tum forma.

II. Patal Indis arbor jam descripta minor, Monard. Lugd.

## OSTRYS SIVE OSTRYA.

**O**στρυς, quam nonnulli οστράν vocant, inquit Theoph. 3. hist. 10. est unica species. Oxya (id est Fagus, Scissima Gaze) suis satum cortice simile, folio pyri non multo oblongiore, in acutum contractiore & majore, fibrum multum & crassum, à medio dorsi in modum costarum rectâ secundum magnam fibrâ porrectis, in fibrâ ipsâ ringato, & in ambitu leviter serrato: materia dura, decolor, albidâ: fructu pusillo, oblongo, ordeo simili, flavo: radices sublimes habet. Et Plinio lib. 13. cap. 21. Ostrya quæ & Ostrya. arbor similitu Fraxino cortice & ramis, folijs pyri, paulo tamen longioribus, crassioribus, ac rugosis, incisurâ, quæ per tota discurrens: semine bordeo figura simili & colore.

I. Ostrya Ulmo similis fructu in umbilicis foliaceis.

Ornus, Trag. Lon.

Carpinus, Matth. Dod. Adv. Lob. Tab. Cam.

Carpinus alba, Cast.

Ulmus 3. species, fortè Ulmus syl. Plinij, Dod. gal.

Ostrya Cordi, Gesn. de lapid. Bellon. Thal.

Ostrya Theoph. Fagulus herbariorum, Cl. hist.

Fagus sepiaria, Gesn. hort.

Ulmus Atinia, Lugd.

Fagus similis altera, Cæs. alp.

Betulus, Lob. in ico. Ger.

(Cam.

Carpinus, Matth. quæ Ostrya satis repræsentat.

II. Ostrya Ulmo similis fructu racemoso lupulo simili.

Fagus similis prima, Cæs.

Hæc Italis, illa Germanis frequens, quam alij ad Ulmum, ad Fagum alij, alij vero ad Carpinum Plinij, quæ Aceris species est: alij ad Ostryon Theophrasti referunt.

## BETULA.

**B**etula vel Betulla, quæ quibusdam sic dicta videtur, quod bitumine seareat: Theophrasto 3. hist. 14. ομυδα folio est Carya (forte Oxya) paulo angustiore, cortice versicolore, materia levi, nec nisi ad baculos utilis: at Plinio lib. 6. c. 18. Betula arbor est Gallica mirabili candore atque tenuitate, terribili magistratum virginis, (idcirco arborem sapientia appellare consuevimus.) &c. Hujus corticis liber albus subest (qui liber Betula) tenuis, candidus, charta nostra modo, cui veteres opera sua, ante charta nostra usum repertum, inscribebant.

Betula, Trag. (qui papyri speciem veterum censet) Matth. Dod. ut: Ang. Bellon. Lon. Adv.

Lob. Lugd. Cast. Tab. Ger.

Populo albæ similis in alpibus, Cæs.

Hæc sæpe in arborem altam & crassam assurgit: aliquando pumila reperitur: hinc.

Betula arbor, &

Betula pumila, Thallio.

## A L N U S.

**A**lnus, quod amne alatur: αλνός Theoph. 3. hist. 14. sterilis est & unius generis, recta arbor natura, ligno molli, medulla tenera, folio pyri sed ampliore nervosiore, cortice scabro, intus rubescente, quo coria tingunt: radice

Hhh 2

radice est per summam terram sparsa, nec major quam Laurus: & 3. hist. 4. tum sterilis, tum fructifera florescit. Verum Theophrastus aliquando eam sterilem vocat, quia fructum non conspicuum, aut inusilem ferunt: quidam & cortice & fructu viridi, gallarum vice ad scriptorium atramentum utuntur. Plinius lib. 16. cap. 24. Alnus folia crassissima tribuit: & cap. 26. nullum semen aut fructum ferre scribit: fortè Aristotelis auctoritate motus, qui inter natura miracula retulit, quod Alni in sola Creta non sint steriles: sed ne apud nos quidem infructifera sunt.

I. Alnus rotundifolia glutinosa viridis.  
Amedanus, Crescentio.

Alnus, Brunf. Trag. Matth. Ang. Dod. ut: Turn.

Lon. Adv. Lob. Cæs. Cast. Lugd. Thal. Tab.

Alnus vulgo Schliro in Creta, Bellon.

Alnus vulgaris, Clus. hist.

Ad hujus radices quandoque excrecentiam ramosam, Uvæ quercinæ similem observavimus. Ex hujus ligno pali in aqua ædificiorum fundamentis subacti lapidescunt, cujus causam Vitruvius refert.

II. Alnus folio oblongo viridi.

III. Alnus folio incano.

Alnus hirsuta, in Matthioli nostri picta & descripta.

an Alnus altera, Clus. hist. qui figuram ex Lobelij iconibus habet.

IV. Alnus alpina minor.

Hæc cum prima convenit quidem, sed per omnia minor & humilior est, nec folia ita lento.

humore aspersa sunt: quæ in Alpibus Austriacis provenit.

Alnus baccifera.

I. Alnus nigra baccifera.

Avornus, Crescentio.

Gaulbaum/ Trag.

Frangula, Matth. Dod. Lugd.

Alnus nigra, Dod. gal. Adv. Lob. Cam. Thal.

Jovis barbæ species, Bellon. cult.

Alnus nigra baccifera, Lugd.

Alnus baccifera, Tab.

Arbor fœtida, Lon.

Siler Plinii quibusdam monente, Lugd.

Hæc dum pusilla est in locoque pingui folia oblonga & magna fert. Cortice interno multi pro Rhabarbaro utuntur.

Sunt qui & hirsutam notant.

II. Alnus nigra pusilla Thalij quid?

III. Alnus nigra polycarpus.

Reubert/ Lonic.

## E U O N Y M U S.

**E**uonymus (Theoph. 3. hist. ult.) arbor, nascitur magnitudine mali punici, atque folia ejusdem, majori quam Vinca pervinca: & molli ut punica: flos odore alba viola simili, odore insectis, fructus cum putamine siliqua Sesamæ proximus, intus solidus, præterquam quod in versus quaternos dividitur.

I. Euonymus vulgaris granis rubentibus.

Fusanus, Crescentio.

Carpinus, Theoph. Trag. Lon.

Euonymus, Matth. Don. ut: Ang. Turn. Gesn.

Hort. Adv. Lob. Thal. Cast. Tab.

Euonymus alijs Euonymus, Cord hist.

Siler Plinij, Cæs.

Tetragonia Theophrasti, Lugd.

Theophrasto 3. hist. 6. tetragonia (Quadratoria

Gaza vertit) serotino germine constant, sicut

Thuya & Taxus: hæc Theoph.

Fructus est communiter rubescere: rarius albo.

II. Euonymus granis nigris.

Euonymus alter, Clus. pan. & hist.

Euonymus pannonicus, Tab. Cam.

III. Euonymus latifolius.

Euonymus Pannonicus prior, Clus. pan.

Euonymus primus sive latifolius, Eid. hist.

Euonymus latifolius, Tab.

IV. Euonymo similis Ægyptiaca, fructu

baccis laurifolium.

Bon vel Ban, ex cujus semine Ægyptij potum

Caova conficiunt, Alpin. & Palud. notis in Lin-

scot. part. 2. Ind. or. c. 28. sed Choana vocat.

Buncho Avicennæ & Bunca Rhasis ex cujus

fructibus Turcæ potionem Chaube parant,

Rauvvolf.

Buna ex qua in Alexandria potio fit, Clus. notis

in Garz. Lugd. Tab. Belli ep. 4. ad Clus.

Elkane nonnullis, Pancio.

## VIBURNUM VULGO.

**E**t si Viburnum alicujus singulari plantæ nomen non sit, sed cujusq; virgulti fructusve proprium, Strabone & Diemefiano testibus, cum tamen vulgo buis, nomen hoc tribuatur, asserere placuit.

Steiner

*Steiner Mefibaum/Trag. Lon.*  
*Viburnum, Matth. Gefn. hort. Cam. Cast. Lugd.*  
*Spiræa Theophrasti Dalechampi, Lugd.*  
*Viurna vulgi Gallorum & Ruellij, Lob. Cast.*  
*Lantana, Gefn. hort. (quod leuti sint rami)*  
*Guildand. Dod. Cæf.*  
*Rhus coriariorum Theophrasti & Plinij Cæ-*  
*falpino videtur.*

Rhus (ait Theop. 3. h. 18. Fluidam Gaza vertit, nomen illi à *ρῖω* impositum fuisse existimans) alia mascula, alia femina, quia alia sterilis, alia fructifera: nec virgas longas gerit, neq; crassas:

folium Ulmo simile, nisi quod parum oblongius densumque aliquantulum: ramulorum novellorum folia paribus internodijs conjugatim condita adherent, & planè à lateribus ordo versus confpicitur: flos candidus racematim enascens: hic ubi defluxit cum labrusca rufescentiuntque ceu lentes tenues congestæ figura his quoque in modum uvæ, &c. Plinio 1. 24. c. 11. Rhus frutex est coriarius, subtilis, cubitalis, crassitudine digitali, cujus aridis folijs, ut Malicorio coria perficiuntur, &c. & alibi inter Syriæ arbores, Theoph. describit.

## P O P U L U S.

**P**opuli tria genera Plinius 1. 16. c. 23. fecit, albam, nigram & Lybicam: Theop. 3. hist. 4. λέων, αἰγερὸν ἢ μέγας: Gaza sic reddidit: primam quidem simpliciter nomine populi, 4. hist. 9. aliquando populi alba 3. hist. 6. Alteram populi nigra, 2. hist. 3. at 3. hist. 1. voces λέων ἢ αἰγερὸν, reddidit populum tam albam quam nigram. Tertiã, alpine nomine: nam 3. hist. 14. ἡ κίρσις αἰ παρῖονεν τῇ λέωνι, alpina, populo albæ non absimili: quãvis Gaza 3. hist. 6. ubi habetur λέων, αἰγερὸν, vocem posteriorem non reddiderit. Sic apud Dioscoridem 1. 1. c. 109. & 113. λέωνι ἢ αἰγερὸν legitur: ubi interpretes nomen populi addidere.

I. Populus alba (quæ λέων ab albedine dicitur) majoribus folijs.  
 Populus alba, Matth. Dod. ut: Cord. in Diosc. (cui & Farfarius antiquorum) Bellon. Lac. Adv. Lob. Cæf. Cast. Lugd. Tab. Ger.  
 Populi albæ alia species, Trag.  
 Populus alba latifolia, Lob. ico.  
 Populi prima species, Ang.  
 Populus alba Arabibus Haur, Rauvvolf.

Uvas lanosas quædam fert: quædam sterilis, ut etiam non floreat. Dioscorides σφαιρῶν, id est pilularum, prima foliorum germinatione erumpentium meminit. Theop. 2. caus. 2. τὸ λεόνιον ἢ αἰγερὸν δὲ καὶ κίρσις, i. e. populum albam in nigram transire ferunt, tum fronde tum etiam tota specie: & 4. caus. 6. populus alba in totum nigræ dissimilis, fronde formaque tota est, sed in senectæ similima efficitur.

Muscum quandoque etiam adnascitur, quem Populneum muscum Dioscorides & Galenus, unguentis & oleis inferunt.

II. Populus alba folijs minoribus: & Lob. in ic.

III. Populus nigra.

Populus alba, Trag. (cui & 1. five vulgaris) Lon.  
 Populus nigra, Matth. Dod. ut: Cord. in Diosc. Bellon. Lac. Ad Lob. Cæf. Cast. Lugd. Tab. Ger.  
 Populus secunda, Ang. Tur.

Quædam floret, & fructum non fert: quædam fructum fert, & non floret: flos instaramenti, colore rubente, aut candicante: fructus,

racemulus oblongus ex plurimis granis viridibus compositus, in quibus lana candida continetur: nonnunquam etiam ramis nodi quidam duri adnascuntur. Ex gemmarum (oculorum) viscido & flavo humore, Unguentum populæ in Vere paratur. Resina *ρῖον* ex hac colligitur Dioscoridi, qui & *δακρυον*, i. e. lachrymam destillatam concretere & Elestrum fieri ex aliorum sententia monet.

IV. Populus tremula.

Populus Lybica Plinio, alpina, Gaza.  
 Populus nigra, Trag. Lon.  
 Populus Lybica, Matth. Dod. ut: Bellon. Adv. Lob. Cast. Lugd. Thal. Tab. Ger.  
 Populus alpina, Bellon.  
 Populi 3. species, Ang. Cord. in Diosc. cui & Tremula Latinorum.  
 Populo nigræ similis in alpibus, Cæf.  
 Cercis Theophrasti five Populus Lybica Plinij, Clus. hist.

Hanc κίρσις Theophrasti volūt, de qua 3. hist. 14. ἡ κίρσις παρῖονεν τῇ λέωνι, sic Gaza, Alpina populo albæ non absimilis est, cum magnitudine, tum verò quod ramis albicantibus spargitur, folio hederæ, sed parte altera sine angulo, altera oblongo, in quæ angulum acutum exeunte, colore parce resupina, pronaque ferè simili: pediculo prolixo tenuique annexo, quare non erecto sed inflexo, cortice asperiori, quæ populus alba, &c. Sunt qui κίρσις à crepatu, non κίρσις dicendum

cescant. Aliqui Cratægem Theophrasti volunt, Lobelio monente. Plinio l. 16. c. 23. populus quæ Lybica appellatur, minima folio, ac nigerrima, fungisque enascentibus laudatissima.

V. Populus rotundifolia Americana.

Populus novi orbis, Adv. Lob. Cast.  
Populus America sive Peruana, Lugd.  
Populus Americana, Tab. Ger.

Populo similes exoticæ.

I. Arbor populo similis resinosa.

Focot Guebit, i.e. lignum expetitur, Frag.  
Tocot Guebit, i.e. lignum desiderij, Cl. in Mon.

Arbor in India occid. ex qua Idola conficiunt: sub cuius cortice, gummi Thure candidius, cuius loco etiam utuntur.

II. Arbor populo similis resinosa altera.

Tacamahaca colligitur in nova Hispania ex arbore odorata, magna ut Populus, cuius fructus coloratus ut Pæonia est, Monard. Frag. Lugd.

Tacamahaca 9. hist. Ind. occid. l. 4. c. 29. 'Gummi Tacamahaca ex arbore quæ folijs longis angustis, fructu prunorum magnitudine, 4 par. Ind. orient. 7.

## GOSSIPIMUM SIVE XYLON.

UT Græcè Ξύλον & τὰ ξυλίων, ita Latinè Xylon & Gossipium nominatur. At Theoph. 4. hist. 9. ἀπὸ τοῦ ξύλου πορὸν δicitur: in Tylo inquit, insula multa sunt arbores lanigera, quæ folia vitæ habent, verum minora, fructum fert in quo lana continetur mali magnitudine, vere nascitur occlusum, quod cum maturum est, aperitur & lana excipitur, quæ telas texunt. Plinius l. 12. c. 10. de his arboribus paulo aliter egit: & fortè seq. c. 11. eadem sunt arbores, quæ Gossampinos vocari tradit: qui aliàs inter lini genera, l. 19. c. 1. recensuit, his verbis: frutex quæ aliqui Gossipion vocant, plures Xylon & ideo lini inde facta Xylina: parvum est, similemque, barbata nuchæ defert fructum, cuius ex interiore bombycæ lanugo necitur: nec lini sunt ei candore mollitèrve preferenda.

I. Gossipium frutescens semine albo.

Coto & Bombax, Serapioni.

Xylon sive Gossipium, Matth. Guil.

Xylon, Fuch. Dod. gal. Gefn. hort. Lac. Lon.

Gossypium, Turn. Dod. Rauvvolff. Adv. Lobel.

Cast. Cæs. Lugd. Cam. Tab.

Bombax Officinarium.

Gossipium par. 4. Ind. occid. c. 15. & p. 8.

Algodon, Catoen sive Gossypium in arbusculis tam magnis quàm minoribus nascitur: aliud densum & crassum, aliud molle & tractabile, part. 9. Ind. occid. l. 4. c. 23.

Gossipium in sylvarum humilibus arboribus copiosè, Linfoot. Ind. or. part. 3. c. 9.

II. Gossipium arboreum caule lævi.

Gossipium perenne & arboreum, sive Asiaticum, Bellon. (tum, Alpin.

Gossipium arboreum, Gotne Mfegiar appellat.

III. Gossipium arboreum caule spinoso.

Gossipium Brasilianum, Bellon. & Belli.

Bombax Indica, Ponæ ital.

Xyloa, Stadio in Brasil. part. 3. Ind. occid. c. 38.

Xyliferæ arbores, Leriop. part. 3. Ind. occid. c. 12.

Hujus semina nigra sunt, in dena vel duodena grana ut modo congesta: cum Asiaticum singula grana separata habeat.

IV. Gossipium Javanense salicis folio.

Cylæ, Oviedo.

Lanifera arbor peregrina, Clus. exot. l. 1. c. 14.

an Lanifera arbor, Bellon.

## A C E R.

A CER Græcè ἄκερ & αἰκέρων dicitur. Theophrasto 3. hist. 11. ἐκ τοῦ ἄκρος (Acer Gazæ vertit) alijs bina, alijs tria genera faciunt: unum quod communi nomine ὀφειδάκων (Acer) vocant: alterum ὑψιαν (Carpinum) tertium vero καρίων (Lectrotariam Gazæ) At 3. hist. 4. ὀφειδάκων & quæ in monte ὑψιαν, quæ in planijs καρίων (Gallicum Gazæ) vocari tradit. Plinius lib. 16. cap. 16. Aceris plura genera: album, quod præcipui candoris, vocatur Gallicum: alterum genus (Zygias Theoph.) crispum macularum discursu, qui cum excellentior fuerit, à similitudine caudæ pavonis nomen accepit: è viliori genere crassivenium (clinetrotroch Theoph.) Graci situ discernunt: campestre candidum esse, nec crispum, quod glinon vocant: montanum verdè, crispum duriusq;: & tertium Zygiam, &c. quod alijs generi proprijs esse volunt & Latine carpinum appellant. Verum sic distinguere licet, quod Spendaminum acer sit nervosum & album: Zygias verdè, flavum & crispum: clinetrotroch, flavum & non crispum: glinon, candidum, minus crispum.

I. Acer montanum candidum.

Platanus, Trag. Lon.

Aceris species folio majore, Carpinus videtur, Sycomorus Ruellij, Gefn. hort. (Dod. gal.

Aceris prima species, Ang.

Acer, Cord. in Diosc. Cæs.

Aceris



Aceris species Platanus Gallorum, Bellon.  
Acer major, Cord. hist. Gefn. hort. Dod. Ad. Lob.  
Cam. ep. Thal.

Acer, *ἄκιστος* & antiquis, Ad.

Acer latifolia, Cluf. pan.

Acer montanum, Gef. hor. five Gallicum, Lugd.

Hujus turiones laete scitant, ut Ficus: sic quædam floret, quædam non floret, nec fructum fert.

II. Acer montanum flavum five crispum.

Acer crispa materia, Acer montana Asphendamos rusticis Cretensibus, Bellon.

Aceris altera species, quæ fortè Zygia Theo. Ad. Opulus montanum, Lugd.

Acer montanum in marem & fœminam distinguunt: mas colore magis flavo, ligno duriore & venosiore, magisque crispo, citiusque floret: fœmina tardius, & ligno est pallidior, minusque crispo. Germani ob flexuosos venarum distinctus ad opera lautiora utuntur, lignum nobile vocantes, ex hujus radicibus cochlearia pulchra conficiuntur.

III. Acer montanum tenuissimis & acutis folijs.

Acer acutioribus folijs, Gef. hort.

Acer tenuifolia, Thal.

IV. Acer campestre & minus.

Acer, Trag. Lob. Tab. minus, Gef. hor.

Acer campestre, Dod. gal. & Lugd. cui & Carpinus & Opulum campestris veteribus,

Opulus, Tur. Gef. hort. Cæf.

Acer tenuifolia, Cord. hist.

Acer, Opio cognominatum Romanis, Bell. cult.

Aceris species quæ Sphendamos Theoph. Ad.

Acer minor, Dod. Cluf. pan. Cam.

Platanus, Lon. ico.

Opulus & Rhambolinus, Cordi Schol.

Acer latifolium, Cluf. hist. ico.

Alibi frutex, alibi arbor est.

V. Acer trifolia.

Acer Monspessulanum, Lugd.

an Aceris arboris genus à reliquis diversum ad sextum id genus à nobis observatum, Bellon.

## P L A T A N U S.

**P**latani *ἄκιστος* & Græci, à latè diffusis ramis nomen sortita est: *ἄκιστος* enim dilato & speciosum reddo, significat: hujus apud Diosc. l. i. c. 107. nulla descriptio: at Theoph. i. hist. 16. platano folia ampla tribuit: & 3. h. 2. semen manifestum producit, eoque gignitur: quam (i. hist. 15.) in Creta Insula apud fontem flare assererat, quæ nunquam folia deperdat: & Plin. l. 2. c. 1. de Platano multa habet, ostendens quomodo mero asusque enutriatur: sicq; & arbores vino potare: Aelianus scribit (cum adeo patulurami diffundatur) Xerxes adeo ipsius umbra dalectatus, ut in Lydia diem integrum, cum maximo exercitu sub ea consumpserit.

I. Platanus, Match. Ang. Dod. ut: Cord. in Diosc. Bell. Gef. hor. Tur. ico Lac. Ad. Rauvvolf.

Lob. Cæf. Cast. Lugd. Tab. Cluf. hist.

Fructus ipsius *πλάτανος* Dioscoridis, pilulas Plinius l. 24. c. 1. vocat.

Ex hujus truncis crassis montis Athon incolæ

naviculas conficiunt, Bellonio eas describente.

II. Arbor Platani folio fructu peponis magnitudine eduli.

Mamœra ipsa arbor: at fructus Mamaon ab uberum forte similitudine, Lusitanis in America est mas sterilis, fœmina fructifera, Cl. cur. post.

## S A S S A F R A S.

Arbore ex Florida ficulneo folio.

Pavane Indorum, Monardi, Lugd. Frag.

Sassafras arbor, Monardi, Lugd.

Sassafr. Cast. Capevaccio, cui & Ind. Sassafragia.

Lignum ex India Occid. Sassafras vocant, Cæf.

Sassafras, ab indigenis in Virginea, Winauck

appellatur, par. i. Ind. Occident.

Ex Florida, novi orbis provincia, adfertur: fructum oblongum, rugosum, longissimis pediculis donatum habet. Hujus folia fructumq; Doct. Doldius p. m. una cum infinitis alijs ad me Norinbergam misit.

## R I C I N U S.

**R**icinus, Diosc. l. 4. c. 164. *κίον ἰνέρων*, à similitudine Crotonis vel Ricini animalis, quod semen ejus refert: quod animal Plinius l. 11. c. 34. & l. 30. c. 10. descripsit. Alij Pentadaitylus & vulgo Palma Christi, à figura foliorum, quæ palmam digitis expansis emulantur, Mauritaniæ Cerya. Dioscoridi: arbuscula est ne parva scem, habens folia Platani, at majora, leviora ac nigriora, ramis radicibusq; cavu bai undanum modo: semen in uvu aspersi. At Plinio l. 15. c. 7. Cici arbor in Aegypto copiosa, & in Hispania repente procrevit, altitudine olea, caule ferulaceo folio vitium, semine nyctarum gravidum, & c. meminit & l. 16. c. 22.

## I. Ricinus vulgaris.

Granum regium majus, Mesuæo.

Ricinus, Trag. Math. Fuch. Dod. ut: Ang. Cord. in Diofc. & hift. Gefn. hort. Lac. Lon. Adv. Lob. (Gallis Palma Christi) Cæf. Caft. Lugd. Tab. Cici. Gefn. hort.

Kikaion S. Jonæ: Alkaroa & Kerua Arabibus:

Mira sole Italis, Guiland. epist.

Ricinus vulgaris, Cam.

Phafelus Romanus Thufcis, Mar. Virgilio.

Ricinus, Kerua Tripoli, Rauvvolf.

Cerva aut Cataputia major, Frag.

Ricinus major, Eystet.

Folijs ludit: quare Theop. i. hift. 16. Crotonis folia initio cùm proveniunt, rotunda sunt, deinde in angulos formantur tâquam perfectè articulata. Ratione loci magnitudine variat: nam hominis crassitudine in Hispania Cluf. & magnas arbores in Creta, Bellon. vidit, ut scalis admotis descendere debeant: ex quo apud Hispanos oleum conficiunt, quod oleum ficus infernalis nominant. Monar. & Fragofo monentib.

Fitetiam in horto Eystetenli mentio Ricini minoris, qui omni ex parte prædicto magnitudine cedit.

## II. Ricinus vulgaris minor.

Ricinus minor, Eystet.

## III. Ricinus Americ. major semine nigro.

Ricinus Americus, Curcas incolis, Cluf. notis ad Monard. Lugd. Tab.

Ricinus Syriacus, Cam.

## IV. Ricinus Americanus minor.

Eravvay: Ricini pusillum genus, Cluf. exot. l. 2. cap. 21. &c

Ricini semina exigua l. 2. c. 25. sub fructu nono.

## V. Ricinus Americanus folio Staphysagriae.

Ricinus Americanus folio ficus Ponæ.

## VI. Ricinus Americanus falso creditus.

Dende Serapionis, & Abelmoluch Mauritiorum, Imperato.

Serapioni species tres sunt, Seni, Sahati & Indi: at Imperatus legit, Chinenfe, Indianum & Sahatenfe, quod minus probatur.

## VII. Ricinus affinis fructus.

Exoticus fructus quartus, Cluf. ex. l. 2. c. 24.

## VIII. Curcas Malavarensium: Carpata;

Cambayensium, Garziæ: fructus est magnitudine Avellanæ cum suo putamine, candidus, gustu quali sunt tubera costæ: forte Habilcul Serapioni.

\*\*\*\*\*

## SECTIO SEXTA.

## Pomiferæ Arbores.

MALUS; MALUS CYDONIA; CITRIA; LIMONIA; ARANTIA; PUNICA; PYRUS; PERSICA; PERSEA; AMYGDALUS; ARMENIACA;

Prunus; Myrobalani; Sebesten; Jujubæ; Cornus; Lotus; Guajacum; Ebenus;

Cerasus; Chamæcerasus; Stryax; Aria & Hamomilis; Cotonaster & Chamæspilus.

## POMUS SIVE MALUM.

**E**tsi Pomi nomen apud Latinos latius patet, quàm μήλον apud Græcos: attamen usus obtinuit, ut Pomus pro Malo arbore, & Pomum pro Mali fructu capiatur: quævis Plin. l. 15. c. 17. etiam ipsam arborem Pomum appellavit. At Græci si nullum Adjellivum addatur. Μάλιον μήλον, & Malum μήλον nominatur: derivatur autem μήλον, à verbo μέλω, quod idem atq. πορεύω, sive curo sollicitusq. sum, denotat: quia de ipsis prædictis mortales multum solliciti fuerunt, curæ, seduloq. studio digna judicant: & id forte propter insignem usum alimentarium cibariumq. Pomum autem, cujus primum inventor Dionysius ab Athenæa statuitur, forte sic dictum quod cerum plurima etiam sitim tollant, ita ut simul sint cibo & potui.

Genera malorum Diofc. sunt l. 1. c. 159. & seq. vulgaris, cotonea. persica. armeniaca, medica sive citria, qua Adjectivo addito distinguuntur. At vulgaris eisdem sunt, verna, melimela, epitotica, sylvestria. Sic Theop. 6. l. 1. c. 24. sunt tam sylvestria quàm urbana: & 4. hift. 16. sunt verna, ex omnibus infirmissima: 1. hift. 19. & 4. hift. 14. malu punica: & 4. hift. 4. malu persica & malu medica. Et Plin. l. 15. c. 14. mala genera enumerat, curia, xixipha, rubres, & quæ lanata vocantur: in summa genera 29. recenset. Mala, inquit, habent originem à Martino, Cestioq. & Maulio; item Claudio: quin & Cotoneo, insita ab Appio, Appiana cognominata, ideo huius cotone

neorum ut magnitudo qua Claudianus : sunt & Sceptiana ab inventore Libertino. Cato adjicit Quiriana. & qua tradit in doli condi. Scantiana : sunt parva gratissimi saporu, qua Petisia nominantur : patrias nobili a vère Camerina & Gracula. Cetera è causis traxere nomen : germanitatu coharentia & Gemella nunquam singula in fructu, coloru Serica, cognationu Melapia (quod malorum & pyrorum quandam speciem habeant.) Muslea à electitate miscendis : qua nunc Melimela dicuntur à sapore melleo. Orbiculata, à figura orbis in rotunditatem circumacta, qua Graci eporotica vocant : Mammatum effigie Orbomastica : à conditione castrati seminu. qua Spadonia appellatur Belge. Melosoly, solum unum, aliquando & geminum erumpit e latere medio. Celerrimè in fructu marcescunt Pannicea : stolidè timent Pulmonica : sunt quibus sanguinem est color, origine ex Mori insuetudine. Sunt & parva gratia saporu atq; etiam acutiora odore. sylvestria. Datu sermè vilissimu nomen, quanquam primu advenit, decerpit, propter antibus : hac Plin. & Colum. l. 5. c. 10. de malorum generibus egit : sic & Ruell. l. 1. c. 96. & ex eo Lugd. bisl. hù Pliny diversas species Gallu familiares adjicit. Nani singula regiones plurimas malorum differentias habent : sic Valerius Cordus in sua historia supra triginta genera recenset : Tabernamontanus viginti tres figuras habet : & Joh. Baubinus frater, in suo de balneo Bollenfis l. 60. genera cum suis figuris & descriptionibus exhibet. Nostri, imprimu magnificiunt ea qua Grumichet, id est, Prasomila (qua duplicia, nobiliora & vulgaria) nominantur, qua colore sunt in viridi pallido, figura oblonga, sapore ex dulci & acido mixto, qua feru cruda comeduntur, quare per totam hycem durant, agri asservantur, in cibum & medicamentu commendantur, qua forè Malactria Ruellij & Lugd. Secundum locum tribuunt illu, qua Currupendule vulgo Gallu dicuntur, & apud ipsos principatum obtinent, (quabodie prima commendationis ad nobilem Algerines confectionem, Ad.) Sic in Hetruria præstantissima qua Appiole & Milerose vulgò appellantur, Marthiole notant. Et Scaligero, ut ex eo Gesn. lib. de hortu, Mala apiola Itali dicta, qua dulciora quidem, sed tam jucundè fragrant, ut universas Indias sua suavitate superent. Sed subsisto, qui enim posset in tanta Malorum varietate, nominumq; pro cuiuslibet regionis & rustici placitu, diversitate, & cum quotidie novo infusionu ingenio, velut nova prodeant, sine errore ea recensere ? nec etiam opus est, cum arbores valde similes sint : licet fructus varii, siquidem poma magna sint & exigua : rotunda oblonga : candida, viridia, lutea : quadam rubedinu aliquid, alia multum habeant, & quadam foru tantum, alia & intus, & quidem vel rubru taurum notu, vel lineu oblongu aspersis : sapore quoq; alijs acido, aquoso, austero : alijs dulci : alijs indulci subacido, vel vinoso : alijs inter dulcem & æscendentem medio. Sunt deniq; præcocia, media, serotina. Sic malorum quadam genera, ramu & brachys sui in latitudinem diduci solent, ita ut recti cuiusdam speciem, pedamentu in orbem digestu sustentata, præ se ferant : peculiaria tamen videntur sequentia.

I. Malus pumila, quæ potius frutex quàm arbor.

Mala præcocia, Trag. Tab.

Malus humilis, cuius fructus pomum Adami, Gesn. hort.

Hæc duplicia rubentia & candida.

II. Malus exigua pallidis floribus.

Malus arbor cuius fructus poma nana, Cam.

III. Malus sine semine interius in fructu, Camer.

IV. Malus non florens, fructificans tamen, Gesn. hor. ap.

V. Malus folio pyri.

VI. Malus flore pleno.

Poma flore multiplici seu pleniflora, Eysl.

VII. Mala sylvestria, quæ & alba & rubra : maiora & minora.

Mala sylv. rubentia, Tab.

Malus sylv. rubens, Ger.

Malus sylv. major albus, Tab.

Malus sylv. alba, Ger.

Malus sylv. minor, Tab. Ger.

Arbores pomifera exotica.

I. Malus Maluccensis nonnihil spinosa.

Mala Indica, Acostæ, Lugd. Ber. Bor. Garziæ, Frag.

In hujus ramis formicæ alatae Laccam faciunt.

II. Mala Goënsia fructu octangul'ari pomi vulgaris magnitudine.

Carambolas, Garz. Frag. Acostæ, Lugd. Linsc. 4. par. Ind. Or. 10.

Carambolas, Camarix, Carabelli, Chamaroch, Bolunbac, Palud. in Linscort.

III. Mala Guianensis.

Pinae, quæ totius mundi poma superat, nec ulli meliora, quàm in Gujana, par. 8 Ind. Occid.

IV. Mala Americana pyri specie.

Pomi peculiare genus in Micaragua, nulli alteri Indiæ parti concessa, par. 5 Ind. Occid. c. 16.

Pomum Nicaraguae Bentzoni, Lugd. Clus. exot. lib. 2. cap. 28.

V. Pomo similis Brasiliiana.

Genipat Theveto, Lugd. Lelio

an Xagua, Oviedo.

Junt Pappayma, Lelio 3. part. Ind. Oce. 37. Clus. ex. l. 2. c. 11.

Duplex est, alia fructu majore & eduli; alia leuici minoris non eduli, & hujus fructus succo totum corpus inficiunt.

Theveto, Lelio.

V I. Fructus prædicto affinis.

Fructus Brasiliensis, & 2. Clus. exot. l. 2. c. 7.

V II. Pomo similis fructus Castaneæ asperioris.

Duraccon fructus tribus involucri donatus, in Java 4. part. Ind. Orient. c. 6.

V III. Arbor pomifera fructu aculeato melonis magnitudine.

Batan arbor, cujus fructus Dutyaen, flor Buza dicitur, Paul. in Lincot.

Daron, Costino, Scalig. Lugd.

Donones, Garz. Frag.

Durones, Acosta, Lugd.

Jaca major, Cast.

Guanabanus, Oviedo, Clus. in Garz. & Lugd. qui fructum pingit.

Guanabanus Oviedo hunc fructui valde similis Frag.

Dutyoen 2. Malacca, in l. par. 4. Ind. Orient. c. 13. fig. 12.

Fructus cuiusvis varietatis orbiculatus non reperitur, tantum in Malacca provenit.

I X. Annon, Oviedo, Clus. in Garz. magoam cum Guanabano similitudinem habens.

X. Abavo arbor radice tuberosa.

Babab, Alpino.

Abavo, Honor. Belli ep. 4. & 5. ad Clus.

Babab sive Abavi, Clus. exot. l. 2. c. 1.

Fructus Ethiopius melonis magnitudine, brevis lanugine obitus. Polii nunc singulariter, nunc binis, vel ternis, ferratis, uni petiolo adherentibus: acido non ferratis, etiam binis aut ternis, quando quis uno pediculo donatus, quæ ex Creta ab Honorio Belli accepimus.

Anidem cum

Guanabano Scaliger, Clus. in Garz. l. 2. c. 1.

Fructus quidam ex Guinea, Guanabanus sive Soligeri, Gesa, hinc.

X I. Arbor Chinesis fructu Anguriz magnitudine.

Brutianus, Scalig. Pigelette & l. 2.

X II. Arbor virens, foliis ovatis, signis magnitudine, Pepa in locis Hispanice, l. 1. c. 4. part. Ind. Orient.

Arbor fructu magnitudine latius, quæ feris, arbor anoris, ciz quasi matrimonio jungitur.

X III. Arbor Indica fructu Cueurbitæ forma & sapore, Higuero Oviedo, Clus. in Garz. ex. l. 2. c. 1. Lugd.

Fructus Higuero apud Clusium, Lob. Lugd. qui fructum & folium pinxit.

Higuero sive, Taber.

Hujus seminibus Cambales filum trajiciunt, erutibus aligant, & pro tintinabulis utuntur.

X I V. Arbor America foliis pomifera fructu triangulo.

Ahoray Theveto, Clus. in Garz. Lub. Tab. Lugd. qui arborum & fructum separatim pinxit.

Aoua lignum teneri odoris, cujus nucleus præsentaneum vocem, ex quo et epitaluca Brasiliensi facium. l. 1. c. 10. part. Ind. Occid. c. 12.

X V. Fructus capris magnitudine, line.

Locos fructus in Insula Negros in arboribus, ramis & cortice, acuminis, pyramide fibroso nucleo angulatis, part. 3. Ind. Occident.

X VI. Fructus Indicus trionibus expentus.

Bri dones, Garz. Frag.

Brindovo, l. in l. ot. 4. part. Ind. Orient. c. 10.

Ex cortice acium conficitur.

X VII. Arbucula mali similitudine, lacteam succum fundenti.

Pipitochi, Monardi, Cast. Lugd. Frag.

Ex ramis incisis lacteus humor emanat, cujus tres vel quatuor guttæ potentissime purgant.

## MALUS CYDONIA.

**M**alus Cydonia, Græcè *μαλὰ κυδωνία*, a Cydone Cretæ oppido, unde primum inventa, Plinio l. 15. c. 11. dicitur. Cotoneum malum primum Cato, dein Plinius nominavit. Fructus malus vocatur, Latine malum cydonium & cotoneum: officinu cydonium.

Duum generum Diofcorid. & Galeno: vera ac germana (ait Diofcorid.) qualia parva & rotunda sunt: alia vix struthia & magna, quæ minus utilia censentur: Theoph. 2. hist. 3. in quibus videretur, ex Struthio cotonea degenerare: & Galen. 6. tuend. seu quædam dulciora, majora ac minus acerba, quæ in Asia Struthia vocantur: 2. 2. in Cydonia 2. Struthys, quæ etiam Struthiomela nominat. aperte distinguit, Cydoniumque succum innuere sequitur: & maxime adstringentem. Columnell. l. 5. c. 10. tria genera facit Struthia, Chrysomela, Mala & Phylæ: plura eorum genera chrysomela incisuris distincta, colore ad aurum inclinat: quæ candidiora non ita cognominata, odori præstantissimi: est & Neapolitani sui honor: minorâ (forte majora legendum) ex eodem genere Struthia, odoratius yburant serotino proveniunt, præcoci verò Musica. Struthia autem Cotonea incisa summi genus fecere Mulvianum, quæ sola ex his vel cruda manduntur. Sunt præterea parva sylvestria & Struthis odoratissima, in sept. nascentia. Galii quoque, & Malu tria genera sunt, & minorâ Mala, majora Pyra cotonea vocant. Sic Persica arbore in malum Cydonia misita, Cydonium malum evasit, scribit ex Monardi Gesl. bor.

I. Mala cotonea minora.

Malus cotonea, Brunf. Trag. Matth. Ang. (cui & Matthiolo complex fructus) Fuch. Tur. Cast.

Malus cydonia, Gesl. bor. Lac. Lon. Ad. Tab. Cam. cui fructus vix generis.

Malus, Cord. hist. & fructus Mala cotonea minora sive cotonea.

Cotonea & cydonia mala, Lob.

Mala rotunda minora, nonnullis xperimela ab exterioris cutis colore, Dod.

Poma cotonea in Insula Picco, Ind. Occid. par 9 addit.

Ex his Genucnes suum delicatissimum Cydoniatum parat.

II. Mala cotonea majora.

Mala cotonea majora, Cord. hist. c. 11. dicit. in Diofcorid. Monet, & majora malis similia, minorâ vero, pyri modo turbinate, allicet.

Coto-

Cotonea magna & Pyra cotonea, Geln. horr.

Malva cotonea oblongiora & majora. Dod.  
Pyra cotonea, Cæf. Pyrum cydonium, Ger.  
Cotonea majora five Struthia, Cam. ep.  
Struthia & Pyra cotonea, Cæf.

III. Mala cotonea media.

Malva cotonea miltviana five notha, quia proveniunt ex  
Cotoneis quæ Struthis, vel e contra inorta fuere, Mattioli.  
Cæf. L. 1. 1. d.

Cydonia miltviana, Tab.

Majores sunt primis: at secundis minores.

IV. Malus cotonea tyvestris: & Cord. in Diof. & hist.

Hæc lativæ per omnia similis, ramis minoribus & fructu  
minore, quod sponte sua in Danubij petrosis ripis in

colibus proveniat.

V. Cydonia exotica.

Cydonia e Bengala, Garz.

Serifolia, Fragol.

Marmelos de Bengala, Cæf.

Malva cotonea five Mermelasta ex quo fructus, quem Capotes five Chircopores nominant, par. 9. Ind. occ. 1. 4. c. 15.  
Chircopores eadem ferè cum Capotes facie, in nova  
Hispania, idem.

Fructus eî cotoneo simili, folijs verò perfæx.

VI. Arbor Indica cydonij facie fructu melonis effigie.

Melo corcopali, Scalig.

Arbor cydoniz magnitudine & folijs, ejus fructus Corcopal, Theveto & Lugd.

## M A L U S C I T R I A.

**M**alus Citria, Græci *μῦλα μῦλον* malus Medica & Assyria dicitur, utroque nomine à regionibus ducto, ut habet Theoph. 4. hist. 4. Etenim Citrus apud Medos & Persas in primis frequens: dein Palady distinguitur Italianam translatam fuit: postea in Hispania in usum devenit, nec memora & campos occupavit: fructus *μῦλα μῦλον* in *πῖρρον*, addit Dioscorides l. c. 166. *ἡνεδρῖμῦλα*. Latine citria, citrea & citromela. Folium habet Theoph. simile & penè æquale Adrachne (Portulaca Gaza) aculeos quales pyrum, aut spina acuta, sed tenues & rebevierunt acutos & validos, Et Plinio lib. 12. cap. 3. Malus Assyria quam alij vocant Medicam, *ῖον* cum ejus est Unedon intercurrentibus spinis: Pomum ipsum (idem & Theoph.) alias non manditur, &c. Malum Dioscoridi, oblongum est, rugosum, aureo colore, cum gravitate odoratum: semen habet pyri. Sanè bu pomum olim non vesciebantur, sed propter odorem tantum & medicamenta erant in usu, arbore nimirum adhibe inculca, peramaros & acetosos fructus ferente.

I. Malus medica.

Citrum, Brunf Citria, Trag.

Citrangula, Monardi.

Citrus, Ang. Tab. Cæf. Ind. orient. part. 9. lib. 4. cap. 31. arbor, Cord. hist.

Malus medica, Math. Tur. Lac. Cord. hist. Dod. Lob. seu Citria, Eyft.

Malus citria, Dod. gal. Gef. hor. Lugd. Lon. Cæf.

Clus. hist. Cam. & Ind. occid. p. 3. & Ind. or. p. 3.

Citria & Mala Medica, Bellon.

Citrones, Rauvvolf.

Malva citrina & pomacitria, Ind. occid. p. 8.

Cedrus Theophr. at Diof. Medica malus, five  
Cidromela, Adv.

Fructus magnitudine variant: quædam in  
molem excrescunt Melopeponibus parem, ita  
ut a pondus librarum decem quandoque perve  
niant, ut Cardanus & Gesnerus notarunt, quæ  
nullo ferrè succo sunt, & ex Liguria & Adriatici  
maris insulis adferuntur: alia minora: alia Li  
monum magnitudine, aut paulo majora, & a  
lacu Benaco asportantur, quæ potissimum in ci  
bis expetuntur, & Pomceires, quasi Poma citri  
vocari, Lugd. allerit: sic alia prælonga, alia ro  
tundiora. Etenim hominum industria, transla  
tione, insitione, omni denique cultus mangonio.  
Citria in plures formas digessit, ut remissiore

sapore & vehementiore: item dilutiore, satuta  
toreque colore differant, non multum tamen na  
turâ & viribus, veluti Limonia, Arantia, atque ea  
quæ Poma Adami vulgo nominantur. Quare  
Monardes lib. de Arantijs scribit, Citriorum  
genera multiplicia fuisse insitione: ita ut repe  
riantur tot genera Limonum & alia, quæ nec  
Citro, nec Limonibus conveniant: quemad  
modum Zamboas Torongas, Limas, Limone  
s, quæ omnia nec prisce cognoverunt.

Sic citrum monstrosum maximum, calceum  
Turcicum referentem, in horto Stutgardiano  
natum, J. Bauhinus in suo l. de thermis pingit.

II. Malus medica maxima pulpa plurima.  
Ponzières, Cæf. qui à citrijs melopeponis ma  
gnitudine distinguit, & Ponzières inter Limone  
nem & Arantium ambigere scribit.

Hæc gustui non ita placent, sed quia pulpæ  
multò plus habent, officinis expetuntur, sac  
charo vel melle asservanda.

III. Malus medica fructu ingenti tuberoso.  
Melangula quæ alijs Citrangula, Cæf.

Citrij mali genus quoddam in Provincia, hu  
mani capitis magnitudine, Cam.

Citranguli nomine voluit Monachi in Mesuen  
c. de oleo e pomis Citranguli, non solum Citria,  
sed etiam Arantia & Limonia intelligenda esse.

IV. Malus medica ab Imperatore Carolo V. ex Ungaria in Hispaniam delata, quæ omnium mali Medici generum acidorum suavissimum, ut Clusius in sua hist. refert.

V. Malo Medicæ affinis Javanensis folio rotundiore.

Samaca fructus citri magnitudine, acidus, succulentus, granis nigricantibus, Linscot. part. 4. Ind. or. & hg. 14.

*Malus Limonia.*

I. Malus Limonia acida.

Malus limonia, Matth. Dod. Lon. Lugd. Cast. Tab. & Ind. occid. par. 3 & orient. par. 3.

Limones, Dod. gal. Cord. in Diosc. Bellon. Rauvolf. Tur. Adv. Lob. Cæs. Clus. hist. & Ind. occ. par. 9. l. 4. c. 1.

Limonia arbor ex citri genere, Cord. hist.

Tum facie, tum facultate Citria referunt: cujus plures differentie, quædam oblongiores, asperiores, cortice crassiore, Cucumeris aut Melonis effigie, & Limæ Adversar. dicuntur: alij cortice læviore tenuiore, succo acidior. Cordo quadruplex genus, 1. asnerini ovi forma & magnitudine: 2. minus, globosum, utroque capite veluti umbilico insignie: 3. ovi gallinarum figu-

ra & quantitate: 4. tertio æquale, globosum superficiei æquale.

II. Malus Limonia major dulcis.

Limones dulces, Cæs.

Limones dulces oblongis Limis similes, Clus. hist.

III. Malus Limonia minor dulcis.

Limones pusilli dulcissimi in Zeilan, Scaliger, Lugd.

an Limonis genus in Hispania, vix nucis amplitudine, Cæs.

IV. Malus Limonia folio serrato, fructu oblongo cortice tenuissimo.

Limas primum genus, Clus. hist.

V. Malus Limonia fructu rotundo orbiculato. Limas alterum genus, Clus. hist.

VI. Limones prægnantes alium fructum minorem in se continentes, Clus. hist.

VII. Limones variatum figurarum toti ferè carnei, Clus. hist.

VIII. Limones citrii mali grandioris magnitudinem æquant, Clus. hist.

IX. Limonium syl. in Syria provenientium, Scalig. & Lug. 1. meminere.

Limones sylvestres non majores ovo columbino, circa Cairum, Bellon.

MALUS ARANTIA.

**A**urantia, fortè à corticis colore, qui colore auri relucet, ut Aurea mala verè nominari possint: sive ab Arantia oppido dicta: veteribus ignota. insirione ad nos devenerunt. Citrus enim arbor, in Aurantio inserta ad magnam proceritatem pervenit: Arantius verò in Citro, tam humilis, ut Aurantii unius cubiti magnitudinem non excedat.

I. Malus Arantia major.

Pomum Arantium, Trag. Eys. sive Nerantium, Rauvolf.

Aurantia mala Matth. Lac. Cæs. Lon. Castor. Lugd. Tab. Cam.

Aurea & Aurantia mala Bellon. & Ind. or. par. 1.

Aureum malum. Gesl. h. Dod. gal. (cui & malum helpericum) Clus. hist. & Ind. occid. p. 3 & p. 8.

Arantia, Cord. in Diosc.

Arangius sive Citrus arbor, Cord. hist.

Arantia. Tur. Lob.

Malus anarantia, Dod.

Aurantia: nonnullis in locis Indiæ integræ sylvæ sunt arborum aurantia ferentium: in part. 9. Ind. or. l. 4. c. 11.

Genera plura sunt ab insirione prodeuntia: hinc pleraque cortice amaro, crasso, aureo; alia

subvirente: alia cortice tenuissimo, subrubente, medulla dulci: aliqua & cortice dulci: aliqua in uno poma duo genera botrorum habent: alia absque semine sunt. Sic & pulpæ sapore differunt, cum alijs acida, alijs dulcis, alijs vinosa, sive media sit.

Sic in regno Congiano habentur, quæ nec dulcia, nec nimis acra: & in insula Fayel, suavissima & sapidissima: par. 3. Ind. orient. c. 7. & in China poma aurea, quæ dulcedine saccharum vincunt, par. 2. Ind. or. c. 25.

Ex floribus aqua elicetur, quam Lanfam vocant.

II. Malus Arantia humilis.

Aurea malus pumilio, Clus. hist.

Poma Aurantia Nana dicta, t. yst.

III. Malus Arantia cortice dulci eduli.

Aurantia



A. Arantio in India insula Zeilan, cortice dulci & Cavi. S. alig. & L. gd.

Aurea malus eduli cortice, Clus. hist.

IV. Malus Arantia unico grano.

A. aurea malus *μικροκάρπια*, Clus. hist.

*Malo Arantio similes exotica.*

I. Malo Arantio parvis fructibus similis.

Aracinappil Indorum.

II. Arbor peregrina Aurantio simili fructu, Clus. exot. l. i. c. 13.

E Nigritarum regione delata, pulpa fungosa, nonnullis granis ut in ficulneis permixtis.

III. Coru folijs mali auræ, flore luteo, Aconitum Garzia & Fragosus, & Castor. folia mali pericæ, flores candidos tribuit, uterque radicis cortices ad ventris profluvia commendat: Lusitanis Herba Malauarna, Castori.

IV. Carcapuli, Acofæ, Lugd. append. Cast. fructu malo aureo æmulo.

Carcapuli, Linsc. 4. part. Ind. orient. cui fructus cerasi magnitudine: & fig. 17. iconem exhibet.

V. Guyabo pomifera Indica.

Guyabo arbor, at fructus Guyaba dicitur Oviedo.

Guajava, Scalig. Lugd. Clus. hist. app. 1.

Guayavas, Monardi, Lugd. app. Frag.

Guayavos, Gomaræ, & part. 4. Ind. occid. c. 28.

Alia sativa, alia sylvestris: sic alia pomis longiusculis aut rotundis, luteis aut viridibus: pulpa alijs rubra alijs candida.

*Malus Adami.*

Adami pomum vulgo dicitur, quia cortex rimis quibusdam exasperatur, ac si dentibus demorsus esset, quare pomum, quod Adamus in Paradiso degustavit, esse existimant.

Pomum Adami, Matth. Cord. in Diosc. Bellon. (qui à Citrij sive Poncires distinguit) Rauvv. Calt. Lugd.

Citrus altera, Cord. hist.

Malus Assyria, Dod. Tab.

Pomum Allyrium, Adv. Lob.

Poma Adami quæ Gallis Poncires, Clus. hist.

A Limonibus natura & viribus non multum differt, folijs Limonij, floribus Citrij fructu Arantij, sed duplo triplove majore.

## MALUS PUNICA.

**M**alus punica, Græci *πῦνη*, Dioscoridi l. i. c. 151. & Theoph. *πῦνη*, quo nomine & fructus donatur. Hippocrates l. de nat. mulieb. *πῦνη* appellat. Plinio l. 13. c. 19. Africa circa Carthaginei puniceum malum cognomine sibi vendicat, aliqui Granatum appellant. Communiter malum granatum, ab interiorum granorum multitudine: alijs a Granata Hispania regione, quod in ea copiose proveniat. Hanc Theoph. l. hist. 3. sic descripsit: radicem habet brevem & per summa terra adhaerentem: i. bift. 5. caudices multos: i. bift. 8. sed cortiores & breves: i. bift. 14. verum in ramos spargitur & molem superiorem, grandioreniq. gestat: i. b. 6. folia n. 15. sunt. i. bift. 17. fructus ex humore & cute constat: i. bift. 18. & acinos habet: i. bift. 22. verum in ipso fructu ipsum florem insidentem emittit: i. bift. 23. & ex anno in fructu gignit. &c.

Græci: Dioscorides dulcia, acida & vinosa recenset: & Theoph. l. hist. 19. succus acidus est: & 2. bift. 3. & 4. in Agypto acidum in dulcem quodammodo, aut vinolentum convertit: in Cilicia omnes sine nucle surgunt: Cilicia vero in sylvestrem transit: i. caus. 15. nonnunquam etiam fructum secundum ostendit 5. caus. 16. & punicea dulces magis putrescunt quam acida &c. Plinius l. c. divisit in genera, Aprinum vocando, cui lignosa & nuclea adest: sed candidiores nati & blandiores sunt acini, minusq. amaris distincti menbrana: alia feruntur corum, ut in saty. Communi & nucleos habentium quinque species, dulcia, acida, mista, acida, vinosa. Sancta & Aegyptia distinguuntur erythrococtu & leucococtu: vide & l. 23. c. 6. Verum cum plures pars huius in usum medicum veniant, nonnibus distincta, de his pauca.

Flores sativa punica, natiui dicuntur Diosc. l. i. c. 152. & Gal. 6. simpl. at Gal. 6. nat. & tenor, Cyrenus fructus rudimentum est, quod deciduo flore primum apparet & formatur: quæ Celsus, mali punici capitula vocat: & Plinios 23. c. 6. primum pars huius parsu florere incipientem, Cyrenus vocatur Gracu: & in hoc ipso Cyrenos folioli sunt, antequam scilicet malum ipsum prodeat, erumpentes, quos Balaustra vocari diximus. Verum Balaustra, vel in punice flos est Dioscoridi l. i. c. 154. cuius complura fini genera, candidum, rutilum & colore roseo: & ex Cyreno ac Balaustra velut ex Hypocistide succus ad eadem efficax elicitur. At officina citra distan Aconici Balaustra nominant, quibus Cyrenorum appellatio de sativa ignota est.

Mali punici persanem, quod tanquam corum sit, cortice durum, nucis involucto, cnerius. Malicorium vocant, quod Gracu, nunc videtur Diosc. lib. 1. cap. 153. monente, nunc tamen *πῦνη* *ἀπὸ τῆς ἀπὸ τῆς ἀπὸ τῆς* dicitur.

Marcellum medicum, & quos pinguis vocat. Plinio l. c. v. quia ex pumice acerbum est, & non esse novum. & Malicorum appellant Medicis. Offianum, Psidion.

## I. Malus punica fativa.

Malus punica, Trag. Marth. Dod. ut: Cord. hist.

G. Th. Tur. Lon. Lugd. Cam. fl. simplici, Eysl.

Malus punica fere granata, Cord. in Dios. Bellon.

Malum punicum, Adv. Lac. Lob. Cast.

Malus granata, Rauvvolff. Tab.

Punica quæ malum granatum fert, Cæf.

Poma five malus punica, Ind. occid. par. 2.

Differunt potissimum in succo, alijs acidus, alijs dulcis, alijs mixtus, medio quali sapore, quem vinosum vocant, & quæ medijs saporis, Arabes Musa, voce *misra* corrupta, appellant. Mala punica majora in regno Congiano habentur.

## II. Malus punica sylvestris.

Punica sylvestris, Cord. hist. Rauvvolff.

Punica granatum sylv. cujus flores Balauftia, Angul.

Sativa per omnia similis, sed spinis horri-

dior in Syria circa Alepum, Africa & Hispaniæ regno Granatæ.

## III. Balauftia flore pleno majore.

Malus granata sylv. flore pleno, Rauvvolff.

Balauftium, Lob. belg. Tab. Eysl.

Balauftium orientale, Cast.

Punica flore adeo multiplici folio, ut Rosæ videantur centifoliæ, colore saturato.

## IV. Balauftia flore pleno minore.

Balauftium flore minore Romanum, Eysl.

Folijs atrovirentibus, calice crassiore, flore minore, tritiorie, saturata purpura punicante a priore differt.

V. Malus punica fructu maximo. granis aureis. Malus aurea, Dod. qui Palam Arienum Plinij suspicatur, quæ tamen potius Musa est, quæ nullo est intus nucleo vel semine. Illa vero grana Mali punici majora obtinet. Quid sit igno-

## P Y R U S.

**P**YRUS, Græci *Ἀπρίον*, & de arbore & de fructu, sed propriè de sativa dicitur: nam *ἄπριον* pyrus agri, ut est (Pyrastrium Gazæ reddit) Diosc. l. c. 16. & 108. & Theophr. pluribus locis: quæ tamen differentia non semper observatur. *Ἀπρίον* autem dicitur Eustachio, quasi non habens vitæ pinguetudinem: alij ab Apria regione deducunt, quod ex ætate primum hæc arbor allata fuerit. Sic Pyramulæ a fructus figura quod ad pyramidam similitudinem a lato in acutum spectat, & in microneem turbinetur: & quemadmodum Mala, brevi pediculo annectuntur sic Pyra longo pediculo pendunt. Est autem Pyrus Theophr. l. hist. 5. natura firmiscula. 1. hist. 6. folijs orbiculatis. 1. hist. 21. floribus foliatis: 1. hist. 18. seminibus congestis, quæ aliquo putamine & tunica continentur: 1. caus. 23. quæ omnia serè puto plenioribus includuntur, quo plus temporis perdurare valeant.

Genera pyrorum multa sunt, Diosc. l. c. 17. addit Theophr. 4 b. 6. majorem in modum bonæ, frugis præterquam si quæ terotina. Plinio l. c. 11. sunt Superba parva sed ocysima: cunctis autem Crumina, & atissima: proxima y: Falerna a potu, quoniam tanta vi succi abundat: Lattea, a candore vocantur: alia colore nigro donantur. Syria: reliquarum nomina aliter in alijs atq; alijs locis appellantur. Sed confesio urbi vocabuli auctores suos nobilitare Decimiana: Dolabelliana longissimi pediculi: Pompejana cognomine mammosa: Iuliana: Severiana & quæ ex his nata sunt Tyrranniana, longitudine pediculi distantia. Favoniana rubra paulo superbius nigræ. Lateriana, Antiana post Autunalia acidulo sapore jucunde. Tiberiana, quæ maxime Tiberio præcipue pueri. Patriæ nomina habent serenissima omnium Amerina, Picentina, Nuntantina. Alexandrina. Numantina. Græca & Achæda spinosa arbore: & in y: Tarentina, Signina, quæ alia a colore Testacea appellantur, sicut et Chusa a colore gemme onychii purpura. Ab odore Myrtia, aurea, Nardina: a tempore Hordearia, quæ si hordeo maturescunt, a collo Anpallacea & Coriolana &c. Multo plura sunt hodie, imo infirma in tota Europa Pyrorum genera, quæ magnitudine, figura, oblonga, rotunda, orbiculata: odore: sapore, dulcia & succulenta, acida, sic alia sicca, alia pinguis: colore, & tempore quo maturescunt, alia tempestiva, alia serotina, alia perunt, alia servari possunt, differunt: & a primis inventis, regionibus, alijsq; notis nomina invenere, & nonnulla explicari non possumus, si qualibet regio sua habeat. & qualibet urbi peculiaris nomina y: etiam in his nonnullis eni quæ plurimum differentiæ occurrunt, ut videre est apud Tragum. Sic Val. Cordus quinque nomina J. h. l. de balni. 1. c. 1. 1. 1. supra quadragesima. Tabernamont. septendecim differentiis, quædam in primis inagru faciunt ea quæ ab odore & sapore Moschatellina, quæ Superba Plinij videntur, deinde in primis Ovata dicuntur: tum quæ Seneccitensis id est. Iardina nominantur, tandem Regellensis, & Regilla. Regia & Regulana, Ges. ex quorum suo Eletharum suavisimum paratur. Sic Galli. & haec in primis Norbristiana cognominata Carol. N. d. hano & Ing. ut videtur. & apud Car. Stephanum, Romanum, & hystoria Lugdunensi, in sua, de qua in Martioli & Casalpinus.



*asperfa sunt, quæ solè fpeclant, & intus in offu contactu vel buxæ & quidem pulpa candida, lutea rubca. Sin-  
minora, vel rubra sunt, vel flava. Ratione offu sic in aly: integer & facile a carne recedit: in aly a carne se-  
parari nequit, & quidem in aliquibus nucleis difruptum, in quibusdam per medium divifum reperitur. Perfica  
Persianu Hel dici, Rauvvolfiu monet.*

I. Perfica molli carna & vulgaris, vitidis & al-  
Perlicus. Brunf.

Perfica arbor & ejus primum genus, Trag.

Perfica, Fuch. Ang. Lac.

Perfica malus, Gef. hor. Ad. Lob. Lug. Tab. quæ  
alba, & Ger.

Milus Perfica, Dod ut | Turn.

Perfica viridia & alba, Matth. Cast.

Perficus alba & popularis, Lon.

Perficæ primum genus, Cæf. & vulgare, Lugd.

II. Perfica succo quasi sanguineo.

Perficæ tertium genus, Trag.

Perfica sanguineo succo madentia, Matth.

Perfica Ungarica sanguineo succo, Gef. hort.

Perfica in totum saturato colore rubentes. Dod.

Perfica Carota. Cast.

Perfica rubra, Lon. feu sanguinea, Cam. ep.

Perfica præcocia, Ger. ico.

Hæ duæ species lanatæ sunt, carnem succo-  
sam & flaccidam habent, quæ communiter à  
nucleo tota recedit: & alia sunt magna, alia  
parva: quædam prorsus viridia, quædam alba:  
quædæ maculis rubris pictæ: alia carne alba fla-  
vescente: alia rubra, ut sanguinolenta videatur:  
& hæc nucleo est alias foris rubente, alias nigro.

III. Perfica dura, carne candida, aliquando  
ex albo subrubente.

Rhodacina, Ægin. Aërio.

Perfica duracina, Matth. Ang. Bellon. Gef. hort.

Lon. Cast. Cæf.

Perficorum tertium genus five duracina, Lugd.

Duracina alba, Tab.

Duracina ob carnem duriores sic nominata,  
quæ Rhodacina dicta, aut ob odoris suavitatem,  
aut quod plerunq; rubro colore alterna sui par-  
te niteant: aliquando pugni magnitudine, &  
fructu anguloso, circa os rubente, quod aliquan-  
do per medium divifum, aliquando in partes  
difruptum reperitur, & à nostris Perfica moscha-  
ta dicuntur: Horum ut fequentium caro dura  
& nucleo tenacissimè adhæret: quæ aliquando  
etiam intus saturatè rubet.

IV. Perfica dura carne buxæ.

Perfica cotonea, Matth. Cast. Lugd.

Perfica Ungarica colore aureo, Gef. hor.

Perfica buxæ à Coroneis denominata, Cæf.

Perfica cydoniaria, Tab.

(ba. Perfica lutea, Ger.

V. Perfica æstiva Armeniacis similia, five

Perfica S. Johannis.

Perficæ quartum genus, Trag.

Perfica pumila, Cam.

Perfica præcocia, Tab. Perfica rubra, Ger.

an Perfica minima, Cord. hist.

Saporem pene similem cum Armeniacis ha-  
bent, sed ex eo genere non esse, nucleis scabris  
& striatus ostendit, &c.

VI. Nuciperfica, quod nucum juglandium  
faciem repræfentet,

Nuciperfica, Matth. Lugd. Cast.

Perfica nux, quæ Antiperfica Averrois, Ang.

Perfica præcocia, nuciperfica, Cæf.

Hæc etiam nulla lanugine pubescunt, & co-  
lore & sapore Perfica cotonea referunt.

VII. Perfica Amygdaloides.

Perfica amygdala, Matth. Lugd. Cast.

Amygdalus perfico infusus, Gef. hor.

Amygdaloperficus, Cam.

Pulpa Perficum, nucleus Amygd. dulcem sapit.

*Perfica similes exotica.*

I. Perficæ affinis in Taprobana.

Arbor Gehuph Indis Cobban, Thev. Lugd.

Fructus est rotundo, in quo nux Avellanæ par,  
nucleo amaro: gummi ex arbore utiliss. manat.

II. Perficæ similis putamine villosa.

Mangas, Garz. Cast. Frag. Acoftæ, Linsc. par. 4.

Ind. Orien. c. 7. fig. 14. item 5. & 8. par. Ind. Orien.

Rauvvolf. Manga, Scalig.

Manges, par. 7. Ind. Orient.

Exoticus fructus 4. Manga, Cluf. ex. Lz. c. 16.

an Mangelas fructus: par. 5. Ind. Orient.

Fructus verò Ambo & Amba vocatur.

Genera ejus plura, aliquando ab una arbore  
colore diverso prodeunt, subvirides, flavi, ex-  
viridi rubentes: siue nucleo ejus generis repe-  
riri Acofta scribit: biferæ maminit Garzias.

III. Mangus aliud genus.

Mangas Recheadas five Mangas in Achar, Linsc.  
par. 4. par. Ind. Orient. 7.

IV. Mangas fructu venenato.

Mangas sylv. aliud genus, Acoftæ, Lugd.

Mangas bravos, Palud. in Linsc.

V. Perfici

V. Perfici ofsculo fructus Malacensis.

Jambos, Garz. Frag. Acostæ, Lugd. Linsc. par. 4. Ind. Or. c. 9. fig. 13.

Jambeir arbor, fructus Jambos, Lusitanis; Jambali, Malabarensis, Acostæ.

Jambos, Arabibus; Tupha, Indis: Persis, Tuphar; Turris, Almat, Palud. in Linsc.

Duūm generum: unus obscurè rubet; alter ex candido rubescit, ofsculo ut in Persico, Garzizæ: at Paludano, alterius fructus completè rubet & nucleo caret: alter levius purpurascit, & rosam spirat.

VI. Goan arbor & fructus, ex cujus cineri-

bus Tuthia Alexandrina conficitur, Garzizæ.

VII. Guajanos in Hispania nova, fructus granis duris, minora poma æquantibus, prægnans: acin Peruhujus arboris facies diversa. par. 9. Ind. Occid. c. 24.

Perficorum genera omnia in nova Hispania & Peru, ut Melocotones, Albercokia & similes: exceptis Ducafnos, qui è Perficorum genere sunt, par. 9. Ind. Occid. c. 31. Sic in Angra perfica copiosissima esse, scribit Linsc. par. 3. Ind. Or. c. 6.

VIII. Matos ex classe Guayanoium & parvi albicantes Guaynavilli, naturæ frigidiusculæ: Joseph. Acosta l. 4. c. 24.

## P E R S E A.

**A**rbor Persea *νεσφία* Gracū, quæ à Persica diversa est, licet Theophrastus utramq; *νεσφία* nominet: at Gaza loco priori Persicam, altero Perseam transfudit. Dioscoridi l. 1. c. 187. *νεσφία* arbor est in Aegypto fructum ferens cibo idoneum, quem aliqui prodiderunt in Perside exitiosum esse, translatam verd in Aegyptum naturā mutata edulem fieri. Et Theophr. 4. hist. 2. est in Aegypto alia arbor Persea vocata, aspectu magna & pulchra, sed maxime similis pyro, & solis, & floribus, & ramis, sed folio perpetuo, &c. fructus pyri magnitudine, figura oblongus, Amygdali specie, colore berbidus, intus nucem habet quemadmodum prunum, sed multò minorem & molliorem, carnem valde dulcem, &c. Galeus 2. *νασι τόνου*, fructus est pyri aut mali magnitudine, noxia in Perside, vesca in Aegypto.

Persea, Matth. Lonic. Rauvvolf. cui Sepha Persianis.

Persea America Matthioli, Lugd.

an eadem cum Persea Plinij & Platarchi?

Persea, Clus. hisp. & hist. Lob. Cast.

Persea America Clusij, Lug. hic fructum Cucio-

phoræ adpingit, quod Clus. in hist. non probat. Persea Plinij, Cæf. qui dubitat an Anacardium ejus fructus sit.

Hujus folia à Doct. Jo. Anatolio Privæo, insigni apud Vesuntinos Medico & Botanico, unā cum quibusdam bulbis anno 1622. accepimus.

## A M Y G D A L U S.

**A**mygdalus, Gracū *κουγδαλία*, & per contractionem *αμυγδαλί* vocatur: fructus *αμυγδαλίη* *αμυγδαλίη*. Latini amygdala & amygdalum. Amygdalam ideo Gracū nominari Herodianus ait, *νασι τὸ ἐν τῇ αἰσὶ τὸ χλωρὸν ἰσχυρὸν ἀμυγδαλίη* *νασι*, quod post viride putamen, nucleos scarificatos ostendat & in tumulas debiscat, quas τὰς ἀμυγδαλίας vocant, Athenas lib. 2. teste. Antiqui, nucibus (ob offeum corticem) adnumerant, quas Cato Nuces Gracū vocavit, & Plinius l. 15. c. 22. tertio loco recensuit. Amygdalus Theophr. 7. hist. 12. inter arbores potissimum, vel sola ante folia flores emittit, vel unā cum folijs: 1. hist. 21. flores foliati sunt: 1. hist. 23. & fructum ex surculis annuini habet: 1. hist. 18. & ei semen protinus post tegmen ambiens subest: sed non nudum, verum ligno obductum. Idem ostendit, quomodo diminutione ex amaris dulces efficiantur: 2. hist. 8. 1. caus. 21. 3. caus. 23. 5. caus. 24. & Plinius l. 17. c. 17. sic etiam neglecta, ex dulci amara redditur, 2. caus. 20. Et Plinius l. 16. c. 25. floret prima omnium amygdala, mense Januario: Martio verd pomum maturat. Sunt autem duplices, dulces & amara, ut ex Dioscor. l. 1. c. 176. Theophr. & Plinio locum citis colligitur: ha salubriores, illa suaviores creduntur. Naxia amygdala, à Naxo Insula veteribus Gracis maxime commendabatur: secundas partes Cypria sibi vendit ab eis, quæ præter cæterorum morem tep. snō & acumine prodit.

I. Amygdalus sativa.

Amygdalus, Brunf. Trag. Dod. ut: Cord. in Diosc. (cui & Nux Græca) Geln. hort. Lon. Ad. Lugd. Cam. Tab.

Amygdala, Matth. Ang. Tur. Lac. Bellon. Lob. Cæf. Cast. Eyflet.

Amygdala sativa, Rauvvolf.

Sunt majores & minores: laudatur majores, quæ lanugine carent, idcirco P. uno inferuntur. Amygdalas minores, tam amaras quàm dulces, & quidem alijs triplo minores, adhuc putaminibus suis inclusas, ex Asia afferri, testatur Cord.

Kkk

iu

in sua historia. Sic Gesner. meminit Amygdali nuces rotundas ferentis. Nunc dulces habemus duplices, vel duro, vel molliore putamine.

II. Amygdalus sylvestris.

Amygdalus syl. in sepib. Tripolitanis, Rauv.

III. Amygdalus Peruana.

Fructus exorici Hispanensis 2. Clus. ex. l. 2. c. 18.

IV. Amygdalus Guyanensis, Clus. ex. l. 2. c. 6.

V. Amygd. lo similis fructus Peruanus fuscescus vel spadiceus, linea candida.

Fructus peregrinus 9. live Pepiras del Peru, id est, acini Petuani, Clus. ex. l. 2. c. 20.

Fructus peregrinus 9. in tab. 3. Lugd. Tab. Ger.

VI. Amygdalis similis Guatimalensis.

Avellana Mexicana, cujus fructum indigena:

Cacao appellant, quæ Palmarum naturam obtinet, Guiland. pap.

Cacavate Benzoni, Lug. In. oc. p. 5. vel l. 2. c. 16. 17.

Cacao. Jos. Acosta, vel Ind. Occid. par. 9. l. 4. c. 22.

Clus. ex. Lugd. Tab.

Fructus siliquis inclusus Amygdalarum speciem refert, cujus integræ naves plenæ ex Guatimala afferuntur: cum hac in nova Hispania mercatores negotiantur, cum ipsis monetæ usum præbeat & elemosynæ loco pauperibus distribuunt: quare per universam Americam multi usus: imò ex eo potum consuevit quem Chocولاتe nuncupant: Benzoni, Lugd.

VII. Amygdalis similis cortice spinoso.

Amygdalæ ex Andes: par. 4. Ind. Occid. l. 4. c. 26.

## MALUS ARMENIACA.

**M**alus Armeniaca, *malin* apud Græcos, & fructus *malin* apud Armenios, Dioscor. l. 1. c. 456. Persius subiungit: *minora quæ cypriocædæ*, Romanus *mekanina* dicuntur: Latine *præcocia*, quod ante alios sugaces fructus maturescant: nominantur & *Præcocia*: Galenus inter Persicos reposuit, ut & Plin. l. 17. c. 12. inquit: *post autumnum* (scil. Persica) *maturescunt, assate præcocia, intra triginta annos reperta, & primo denarij singula venduntur*. Superarica & Sabina veniunt: popularia undiq: pomum innocuum expectitur egru. Hic verbi Plin. duo Præcocin genera indicare, Dalech. amp. voluit: alterum Superaricam, amplum & magnum quod est Sabinorum loca advehebatur, vulgo Armenium majus: alterum vulgate parvum & strigosum, etiam Armenium dictum.

I. Mala Armeniaca majora.

Armeniaca, Ang. malus, Matth. Lac. Bellonio ab Armenijs dicta.

Armeniaca majora, Cam. Tab. Fyft.

Armeniaca major Baracocca vulgo. Cæf.

Malus Armeniaca major, Matth. ep. Ad. Lugd.

Mala Armeniaca maxima, Ges. hor.

Hæc mole corporis & suavitate præcellunt, & sapore differunt à minoribus, quæ sapore auriore sunt, quæ sine cultura & insitione exigua sunt.

II. Mala Armeniaca majora, nucleo dulci.

Malus Armeniaca candicante nucleo oblongo:

dalci ut in Amygdalis, Gesnero.

III. Malus Armeniaca minor.

Præcocia, Brunf. Ang.

Persica minor, Brunf.

Persicus præcox vel Armenia, Ges. ap.

Persici quatuor genus, Lon.

Armeniaca minor, Matth. Cam. Tab.

Malus Armeniaca, Dod. ut: Tur. Cord. in Dioscor. Lob.

Malum Armenium vel præcoquum commune, Gesn. hort.

Malus Armeniaca minor, Ad. Lug.

Armeniaca, Cæfalp.

## P R U N U S.

**P**runus nomen *malin* Dioscor. l. 1. c. 174. nota arbor est, cujus fructus esculentum est. Fructus nonnulla pruna dicuntur. Theophr. 3. h. 16. folia similia habet Arbutu & Andrashe, arbor parva: l. 1. c. 18. semen habet carne & nucleo interjacentem: l. 1. c. 29. succum dilutum: l. 1. c. 32. super fructum ipsum florem insidentem emittit: l. 3. b. 7. radice numerosa. Ne 4. h. 3. est & alia quedam arbor nonnulla magna fructum ferens similem mespilo, majorem, nucleum habens rotundum, &c. Eidem 9. b. 1. p. 1. prunus (pruno Gaza) humi in lachryma modo gignitur.

Genera: Dioscorides Syriacorum, & eorum quæ Damasci nascuntur, meminit. At Plinius l. 15. c. 13. Prunorum ingensturbæ versicolor, nigra, candicans: bordeacea appellata: alia eodem colore majora a sinina cognominata: sunt & nigra, ac laudatiora cerina atq; purpurea: nec non Armeniaca, &c. sic nucibus insita, ab utroque, nucipruna appellata, &c. nuper in Batrica malina appellari coeperunt, malis insita, & alia amygdalina, amygdalis: huius in ligno nucleum amygdala est: in peregrinis arboribus dicta sunt Damascena, &c. & pruna omnia post Catonem cupisse manifestum est.



Recentioribus, pro diversitate regionum plures sunt differentia, & quidem inexplicabiles, vario cultu & studio inferendi (cum & nuci, & malo, & amygdalo inferantur, quæ faciem parentis, succum adoptionis, ut Plinius dicit, exhibet) invenæ: nam variant magnitudine, figura, colore, sapore: magnitudine, sunt magna, media, parva. Figura, longa, rotunda, acuminata. Colore, alba, viridia, lutea, cerea coloris rubra, ex puniceo rubentia, castaneærum coloris, cærulea, ex cæruleo nigricantia. Sapore acida, dulcia, medijs saporis, austeriora: sic caro in quibusdam ficior, facile ab offese parabili, alijs humidior & pertinacius adhaerens. Ita alia alvum solvunt, quæ dulcia: alia eam cohibent, quæ austera & acerbæ. Sunt carne Pruni & cute subviridi Pruni, sed nucleos Perfici quæ Prunoperfica, Adv.

I. Prunus, Brunf. Trag. Matth. Dod. ut: Tur. Lon. Cast. Lugd.

Prunus fativa, Fuch. domestica, Lob. Ger.

II. Pruna magna dulcia atrocærulea.

Brabyia, Theocrito.

Pruna Damascena, Trag. Matthioli. Dodon. gal.

Cord. in Diosc. Lugd. Ger. desc.

Palma datur Damascenis, quæ ex Syria Venetias sicca adferuntur, quæ nucleo sunt longo & plano potius quàm rotundo, Bellonio monente: secunda quæ ex Pannonia (Ungarica quæ etiam Damascena, Cord. in Diosc.) & Transylvania adferuntur, ex Matthiolo Lugd. at Dodonæus ex Thoma Jordano, Moravica magis ad alvum leniendam commendat. Pruna Ungarica & Moravica, Cam. quæ Pruna Brunensis, Clus. hist.

Pruna Ungarica duplicitia, majora & oblongiora, alia minora, rotundiora & dulciora, Matth. Gesn. hort. Lugd.

III. Pruna parva dulcia atrocærulea: hæc

nucleum parvum, non multo Ceraso majorem habent, & à nostris Damascenula vocantur.

Pruna Damascena nostratia, Bellon.

IV. Pruna magna crassa subacida.

Pruna Ungarica præstantissima, Damascena fortè, Gesn. hort.

Huc referri possunt Pruna acida in insula S. Claræ, Ind. occid. p. 9. additam.

V. Pruna oblonga cærulea.

Prunidaçtyla, Trag.

Prunidaçtyla purpurea & ovata, Lugdun. qui Noberdiana & Juliana addit.

Hæc oblonga sunt, nucleo oblongo, aliquantum incurvo, quæ etiam condita Vesuntio, ubi Daçtily vocantur, adferuntur.

VI. Pruna nigra carne dura.

Pruna Iberica & Pertigona vocata, Trug.

Pruna Hispanica, Dod. gal.

Pruna Perdigona, Lugd.

Pruna perniconæ vulgo, Cæsalp. quibus addit

Massiniana, ijs grandiora.

VII. Pruna coloris cereæ ex candido in luteum pallescente.

Pruna cerea & Ceriola, Trag. Dod. gal. Lug. Tab.

Pruna cerea, Cord. in Diosc. Gesn. hort.

Pruna amygdalina, Ger. ico.

Hæc duplicitia: præcocia, quæ majora, & serotina, quæ minora, Camer. epit. Reperiuntur quoque magnitudine ovi gallinacei, aut etiam anserini, Gesn. hort. sic quæ juxta pediculum in longitudinem extenuantur, ut Damascena & Cætelana colore subviridi, Cæf.

VIII. Pruna magna rubra rotunda.

Pruna asinina, Trag. (& Pedicularia) Dod. gal. Lugd.

Pruna asinaria, Cæsalp. quibus addit Gubia ingustabilia.

IX. Pruna rotunda, flava, dulcia, mali amplitudine.

Pruna à malis cognominata, Cæf.

X. Pruna Augusto maturefcentia minora & austeriora.

Pruna Augustana & Albanula, Cæf.

XI. Pruna parva præcocia.

Pruna præcociora, à tempore avenacea dicta, Gesn. hort.

Prunus avenaria, Tab.

XII. Pruna parva ex viridi flavescencia.

Pruna parva serotina, cereola, Gesn. hort.

an Pruna viridacia, Gesn. & Verdacea, Cam.

XIII. Pruna amygdalina Plinij.

an Coccimelea, Theoph.

Amygdalina pruna, Lob. belg.

XIV. Pruneoli albi, oblongiusculi, acidi.

Pruna Galatensis, sive Perani pruneoli, Clus. pan. & hist.

XV. Pruna ex flavo rufescencia mixti saporis gratissima.

Pruneola quæ Brignolæ in scatulis reposita copiosè reperiuntur, Rauvvolff.

Pruna de Brignioles dicuntur à loco natali in

Kkk 2

Gallijs,

Gallijs, unde enucleata (nucleo parvo sunt) & exsiccata adferuntur, & in officinis nostris habentur, & tam cruda, quàm cocta comeduntur. Verùm & in hortis nostris habentur.

XVI. Prunus fructu rotundo nigropurpureo dulci.

Prunus cognominata Myrobalanus, Clus.pan. & hist. Cam. Tab. Ger:

Prunus Myrobalanus rotundus, Eyst.

Est majore & minore fructu, hicque pulpa dulciorem habet.

*Pruno similes exotica.*

I. Pruna Congiana lutea.

Ogegha arbor fructu luteis prunis simili, Pigafetta desc. reg. Congiani: vel Ind. or. par. 1. l. 2. c. 1. an Lanca fructus in Gilolo prunis cereis similis: par. 8. Ind. orient.

II. Prunus Brasiliiana.

Huourae Theveto, Clus. in Monardem. Huourae Brasiliensis, Guajaci species, Lerio part. 3. Ind. occid. c. 12.

III. Pruno similis fructus Chinenfis.

Lechyas fructus prunis similis, 2. part. Ind. or. cap. 25.

IV. Pruno similis ovalis, cortice & nucleo cinereo.

Guayavenfis fructus 2. Clus. exot. l. 2. c. 6.

V. Pruno similis oblongus spadiceus pulpa albâ.

Guayavenfis fructus 3. Clus. l. c.

VI. Pruno similis fructus subfuscus ex Guynæa.

Fructus exoticus 1. à Clutio, Clus. exot. l. 2. c. 23.

VII. Pruni figura fructus Guinenfis.

Fructus exoticus 2. à Clutio, Clus. exot. l. 2. c. 24.

VIII. Pruno cereo similis fructus Africanus.

Ergen arbor folijs myrti, fructu pruni cerei, offe amygdali magnitudine lineis binis distincto: in Præfat. par. 1. Ind. or.

IX. Prunus Hiericonthica folio angusto spinoso.

Zaccon, quia in planitie Hierichonris non longè ab ædibus Zacchæi crescit, Cast.

X. Pruna insana spinosa.

Nux insana, ab effectu Prunula insana nautis Belgis, Clus. exot. l. 2. c. 26.

Fructus prunis nostratibus minoribus similis, mentem capiens, 4. part. Ind. orient.

XI. Pruno similis spinosa.

Jangomas, Garz. Frag. Lugd. Linscot. 4. part. Ind. orient. 10.

Jangomi, Acostæ.

Fructus pruni facie, sed loco nuclei granulis turget.

XII. Pruno similis folijs, Laccam ferens: alij ex Sorbi vel Mespili vel Myrti ramis colligi volunt, Garz. Vide inter gummata.

*Prunus sylvestris.*

Prunus sylvestris, Græcis *πικνωμελη άγρία*, sive *άγριε πικνωμελη* dicitur, quod rotunditate & magnitudine Cocci, mala ferat; Virgilio 4. Georgic. Spinum dicitur: fructus Dioscorid. libr. 1. cap. 174. *άγριε πικνωμελη*: & Galenus 2. aliment. testatur in Asia *πικνωμελη* appellari, Latine Prunum sylvestre Prunellum & Prunulum vocant. At Theophrastum 3. histor. 7. *σποδισδα*, vel ut apud Athenæum libr. 2. legitur, *σποδισδα* vocari volunt. Spodias, inquit, velut sylvestris prunus habetur. Et Plinio libr. 15. cap. 13. pruna sylvest. ubique nasci certum est.

I. Prunus sylvestris.

Prunus sylvestris, Brunsf. Matth. Fuch. Dod. ut: Turn. Cord. in Dioscor. Bellon. (cui & Spino) Gesn. hort. Lonic. Adv. Lobel. Cæsalp. Castor. Lugd. Tab.

Prunus sylvestris vulgaris, Trag.

Huic peculiare, quod deflorescens, simul ac imbres contrigerint, fructus in oblongum & inane corpus convertitur, quos Itali Turcas vocant, Cæsalpino & Camerario monentibus.

Fructus alij sunt magni, alij exigui, nonnulli rotundi, quidam oblongi: cujus succus pro Acacia usurpatur, unde Stirpi Acaciæ Germanicæ nomen factum.

II. Pruna sylv. præcocia.

Pruni sylv. altera species, Trag.

Hæc majora sunt & Augusto maturantur, quare Germanis *Haberſchlehen*/reliqua *Eſchlehen* simpliciter nominantur.

In sylvestri fativaque pruno reperitur limus arborum, quem Græci Lichena appellant, Plinius libr. 13. cap. 7. at Dioscoride: Gummi vocat. Muscum qui innascitur, Chirurgi nostri magnificiunt.

## M Y R O B A L A N I.

**M**YRobalani, qui veteribus Græci incogniti fuere (quàmvis Bellonim Chrysobalanos Galeni velis) ab Arabibus verò inventi, & ex recentioribus Græci, Actuário cogniti: hos Avicenna, generis nomine Dilegi, & Serapio Hartileg donavit: quorum interpretes, cum viderent quodammodo ad glandis formam accedere, improprie MYRobalanos voverunt. Officinis MYRobalani & MYRobulani.

Genera quinque sunt, quæ Actuário *μυροβάλανος* *κίβδα*: *ισιδά* *ἢ* *ἀμμοσίονα*: *ἐμπιλετὰ*: *βελιτὰ* dicuntur: & arborum genera quing, diversa, quæ in regionibus sexaginta aut centum leucis à se distanti- bus nascuntur, Garziam monente, quæ Pruni magnitudine sunt & omnes sponte nascuntur. MYRobalanos ex Palmarum genere esse, Cæsalpinus censet, At Cordus scribit Arabibus recentioribus tres tantum cognitas fuisse, Indas, Chebulas & Citrinai, quæ ab una eademq; arbore desumantur: Belliricæ ex peculiari arbore esse: & Emblicæ peculiare genus dicit. Arabes fructibus Saccharo conditi utuntur, & Chebulorum major est gloria: & ad nos duo potissimum genera condita adferuntur, Chepula five Kebula & Bellerica. At Clus. in Garziam, Chepula varius ad nos adferuntur, & non nisi dura & male condita: Emblica verò copiosè recentissima & optimè condita. Sed de MYRobalani inter Indicos scriptores consule Garziam, Acoftam, Eragosum.

I. MYRobalani maximi oblongi angulosi pituitam purgantes.

Arabibus Quebolia & Quebulgi.

MYRob. Cepula, Mesu. Clus. in cor. Chepula, Actuário, Matth. Garz. Adv. Lob. Lugd.

MYRobalani Chebuli, Lac. Cord. histor. Gesn. Lon. Cæs. Cast.

MYRobalani Chebulæ, Tab. Ger.

MYRobalani Chebuli vel Quebuli, Indis Aretan: Linsc. 4. part. Ind. or. 38. qui tab. 16. sub Mirambolan majore, quæ alias Aretca vocetur, figuram exhibet.

Arboris folia Persicæ similia.

II. MYRobalani teretes citrini bilem purgantes.

MYRob. lutei, Actuário. flavæ, Garz. Lob. Lugd. flavæ, Matth. & luteæ, Clus. in cor.

MYRob. citrea, Mesu. citrini, Cord. histor. Lac. Lon. Adv. Cæs. Ger.

Arabibus Azafar.

MYRobalani flavæ, citrinæ, luteæ, Tab.

MYRobalani citrini, Bellon. Cæs. an Chrysobalanum Asclepiadis.

MYRobalani citrini, Indis Arare, Linsc. 4. part. Ind. orient. 38.

Arbor Sorbi folio.

III. MYRobalani rotundæ belliricæ.

Arabibus Belleregi: bellileg: bellegu.

MYRobalani belliricæ, Matth. Cord. hist. Clus. in cor. Garz. Adv. Lob. Lugd. Tab. Ger. bellirici, Lon. Cast. belerici, Lac.

MYRob. bellerici Gallæ modo rotundi, Cæs.

MYRobalanus belliricus, Cord. in Diosc. qui an Acacalis sit bellericus, vel emblicus dubitat.

MYRobalani Bellirici, Indis Guti, Linsc. 4. part. Ind. orient. 38.

Arbor est folijs laurinis subcinericeis.

IV. MYRobalani nigrae octangulares.

Arabibus Asuar.

MYRob. nigra, Actuário, Mesuæo, nigri, Adv.

MYRobal. Inda & Damafonia & nigra, Clus. in cor.

MYRobalani Indicæ, Lob. Tab. Ger. seu nigra, Matth. Lon. Garz. Lugd.

MYRobalani Indi, Cord. hist. Lac. Cast. Cæs. qui addit: nullo intus nucleo (quemadmodum & sequentes) manifesto.

MYRobalani Indici, Indis Resonualle, Linsc. 3. part. Ind. orient. c. 38.

Arbor folijs est Salici similibus, fructus octogono.

V. MYRobalani Emblicæ.

Arabibus Embelgi: Embleg: Ambegi.

MYRob. de Seni, Serapioni: Seniticæ Avicennæ.

MYRob. Empelica, Matth. empelitica five emblica, Clus. in cor.

MYRobalani emblici, Lac. Cord. hist. Lon. Adv. Cast. Cæs. qui addit, figura parvi mali, sed in parva fragmenta dissecti.

MYRobalani emblicæ, Lob. Lugd. (qui inquit potius fragmenta esse, quam integra pruna, quadantenus triangula,) Tab. Ger.

MYRobalani Emblici Indis Amuate, Linsc. 4. part. Ind. orient. 37.

Arbor est palmæ magnitudine, folijs minutim incisiss & nonnulli fructu minimo nascitur.

Duo posteriora genera Phœnicobalanos dici posse Cæsalpinus existimat: siquidem nullo intus ligno spectentur, & cum maturi sunt, nigrescant, ut Plinius l. 12. c. 22. testatur. Qui autem os intus habeant, ad Thebaicos & Arabicos MYRobalanos reducendos: de ijs enim Plinius, in

totum arentes Thebaidēs & Arabicæ macro corpore, exiles & assiduo vapore torrentes, crustam veridē quam cutem obducunt.

VI. Myrobalanis flavis similis fructus. Hovos fructus in nova Hispania, Gomara, & Clusius in Garz. Fragofo. Hobus sive Hovus, Benzoni part. 4. Ind. occid. c. 28. & Oviedo.

*Fructus Myrobalano similis.*

I. Fructus Myrob. oficulo similis niger acerb. Fructus minor 10. Paludani, Clus. exot. l. 2. c. 20.  
II. Fructus fuscus serratus Myrobalani forma. Fructus 11. Gareti, Clus. exot. l. 2. c. 16.  
III. Fructus Myrobalani nigri oficulo similis, nucleo subfusco.  
Fructus 10. è navigat. Batav. Clus. exot. l. 2. c. 15.

## PRUNUS SEBESTEN.

**P**runus Sebesten à Dioscoride & Galeno præteritur: at Aegineta, Actius & Aëtarius frequenter meminere. Dicitur *μύση*: fructus verò *μύση*, *μύση*, *μύση* à pom. mucoso lentore: Græci enim mucum *μύση* vocant. Arabibus & officini Sebesten. Plinius lib. 15. cap. 13. simul dici possunt populares eorum Myxa, qua & ipse nunc capere Roma nasci infitæ Sorbū. & lib. 13. c. 5. pruna in Damasco monte nata, & Myxa: utrumque jam familiare Italia: ex Myxiu in Ægypto & vina fallā.

I. Sebestena domestica: an *ἀπαμαξίς* Athenæo. Sebesten, Trag. Lac. Bellon. Rauvvolff. domestica, Alpino. Prunus Sebestena, Match. Lugd. Myxæ vel Sebastæ, Cord. hist. Sebestena, Gefn. hort. Cast.

Myxa, Dod. Adv. Lob. Cæsalp. Sebesten, Myxæ sive Myxaria, Tab. Ger. Myxos arbor, sive Sebestena nostra, Lugd. Differt à sequenti folijs latioribus & crassioribus: fructu majore, perfectiore & meliore.  
II. Sebestena sylvestris. Sebesten sylvestris, Alpino.

## ZIZIPHUS SEU JUJUBE.

**A**rbor, Ziziphus Columella l. 9. c. 4. dicitur: fructus verò Græci recentioribus, ut Aëtario & Simeoni Serbi *ζίζυφα*, *ζίζυφα*, & *ζίζυφα*, Latinis Zizypha: officini Jujube. Sunt qui signa Galeni 2. alim. esse velint, & quidem primus Serapio: at Guiland. in suo Theone, Zizypha & Serica distinguit. aliqui Tuberum genus, à colore Sericum, cognominatum, Pliny l. 15. c. 14. cum samen Plinium à Zizyphū distinxerit, inquit enim, aque peregrina esse Zizypha & Tuberes, qua & ipsa non pridem venerint in Italiam: hac ex Africa, illa ex Syria: & l. 17. c. 10. & Zizypha grano feruntur mense Aprilis: Alys Paliurus Africanus & Lotus secundus Polybii, Lobelio: Paliurus Theoph. sed non Africanus, forte Paliurus Dioscoridū & Pliny, Cæsalpino.

I. Jujubæ majores oblongæ. Jujubæ, Trag. Cord. hist. Lon. Adv. Cæf. Tab. Jujubæ domesticæ, quas Lotus Athenæi, Lotum in Pharide Theoph. & Lotum osseum Plinij Anguillara suspicatur. Jujuba Paliurus Africanum Theophrast. esse propemodum certus sum: Lotus Homeri 9. Odyss. Guil. l. c. Jujubæ Arabum, Lob. Zizypha, Match. Lac. Cast. Zizyphus, Dod. ut: Gefn. hort. rutila, Bellon. (Græcis vulgo Ziziphia) Clus. hist. & hisp. Zizyphus punicea, Lugd. rubra, Cam. Rauvvolff.

Jujubæ, Zinziphia Cretensis, Bellon. II. Jujuba sylvestris. Jujubæ & Paliurus 2. Theoph. Ang. Adv. Zizyphus sylvestris, Cam. Zizypha, Cast. ap. III. Jujubæ minores rotundæ. Jujubæ minores, Tuberes Plinio, Cord. hist. IV. Jujuba Indica: folia hujus subrotunda, ut vulgaris venosa, sesquiuicium lata, duas longa, per marginem crenis exasperata, parte averla molli rufescente lanugine testā: hæc Boræ nomine, cum ejusdem ramulo, cui Lacca adnata erat, ex India Reverend. D. Terentius misit.

## CORNUS.

**Q**uia Latinis Cornus, Dioscorid. l. 1. c. 17. 2. *νεαία* arbor fortis, fructum ferens olivæ modo oblongum, primo viridem, maturum verò flavum, aut cæteum, asculentum, Theop. 3. hist. l. 2. & 5. b. *νεαία*, quædam, mai, quædam

quadam semina, quam *Θαυμαριαν* vocant: folium habet Amygdala (alijs Mali legunt) nisi quod pinguius crassiusq; corticem nervosum, & tenuem, caudicem non nimis crassum: semina virga pappi, &c. Macedones ambas fructificare asserunt, sed semina fructum ingustabilem esse, &c. Plinio lib. 16. cap. 26. Cornus circa Solstitia, reddit primo candidum, postea sanguineum: ex eo genere semina post Autumnum fert bacca acerba & ingustabiles cunctis animalibus: ligno quoq; fungosa, inutili, cum mas è fortissimis quoz, sit: tanta differentia ab eodem genere sit: vide & l. 15. c. 24. & 24.

## I. Cornus hortensis mas.

Cornus, Brunf. Trag. Matth. Ang. Iac. Lon. Dod.

Ad. Lob. Cæs.

Cornus mas, Dod. gal. Bell. Ges. hor. Tur. Lugd. Tabern.

Cornus sativa & mas, Cord. in Diosc.

Cornus vulgaris mas, Clus. hist.

Fructus maturus colore variat; nam communiter rubet, & officulo longiore est: aliquando ceræ colore: rarius albet: saturatius etiam rubet officulumq; habet crassius & brevius, & hoc est Corni maris aliud genus, Clus. hist.

## II. Cornus sylvestris mas.

an Cornus femina, Cord. hist.

Cornus sylvestris, Cam.

Cornus mas pumilio, Clus. hist.

Hic in sylvestribus Thuringiæ & Austriæ inferiores provenit, solum frutescit, sed cultura in arbore pulchram exsurgit: fructus dulciores

sunt, quàm urbanæ, Hermolao, & plezanq; etiam majores, Camerario monente.

## III. Cornus femina.

*Θαυμαριαν* Theophr. quibusdam *ψαυμαριαν*, id est, falsa Cornus: Cornus femina, Plinio: quibusdam Virga sanguinea ejusdem, l. 24. c. 15, at nullas notas addidit.

Ligustrum, Brunf. ico.

Hartriegel/ Trag.

Virga sanguinea, Matt. Ruel. Ges. hor. Dod. Cæs.

Cornus femina, Dod. gal. & (Opulus Columellæ) Tur. Ges. hor. Ad. Lob. Thal. Lugd. Tab.

Cornus femina veteribus Macedonibus, Sanguineus frutex Gallis, Bellon.

Pseudocrania. Cord. hist. ico.

Sanguen vulgo, Cæs.

Sanguis & lingua sanguinea, Cast.

Ossea, Lon. Cast.

Cornus sylvestris, Lon.

## L O T U S.

**L**otus arbor triplex est Dalechampio in Plinio: prima qua *Λωτὸς Ἀσσυρίων* Dioscoridi l. 1. c. 171. quam dicit stirpem bene magnam fructum ferre pipere majorem, dulcem, edulem, stomacho aptum, Et Theophr. 4. hist. 4. *Λωτὸς* (Celtis *Γαζα*) magnitudinis quantæ pyrus, aut paulo minore, folium incisuræ habet, ut Ilex: cuius genera plura fructibus inter se discreta traduntur, &c. Plinio l. 13. c. 17. arbori Loto quam Celtsim vocant, magnitudo quæ pyri folio sicili, fructu dulci nunc exosse, nunc durum nucleum ambiente, colorem uva modo mutante, cum maturi esset: è quo vinum exprimitur. Arbor Syrtica eidem l. 24. c. 2. Altera *Λωτὸς* Theophr. l. 9. c. 13. (Jovis flamma *Γαζα*) quam improprie Loto vocant, ob fructu dulcedinem Ceraso similem, nucleo duro, & Plinio l. 16. c. 30. locos sive faba Græca, &c. & l. 24. c. 2. Tertia, qua Theophrasto secunda qua *Λαυροκράσις* quibusdam: quæ senectutia Clusio non placet. Addi potest quarta, ipsam Polyg. apud Athenæum l. 14. Sunt qui Guajacanam, Tuberum alterum genus Plinij, quorum inter Mala meminit, veline.

## I. Lotus fructu Cerasi.

(Dod. Cast. Lob. (& Lotus vera Theophrasti) Ges.

Lotus, Mat. Ang. & carbor del perlaro) Lac. Lon.

Lotus arbor, Bell. (Cacavia Cretensis) Ges. hor.

Ad. Lob. Cæs. Cam.

Lotus arbor sive Celtis, Tur.

Lotus Celtis arbor, Lugd.

Lotus domestica, Cast. app.

Bagolarus Tridentinis, Guil.

## II. Lotus Africana latifolia.

Diospyros, Theophrasti.

Lotus sive Faba Græca, Plinio.

Lotus Africana altera, Matth.

Guajacum Patavinum Fallopio, Ges. hort. Ad.

Lob. (& Lotus vera Theophrasti) Ges.

Guajacum, Cord. hist. icon. Lon. ico.

Guaicana, Bellon. cult. Eyf. vulgo, Cam.

Ermellinus, Cæs. qui Tuberum alterum genus

Plinij suspicatur.

Diospyros sive Faba Græca latifolia, Lugd.

Pseudolotus Matthioli, Tab.

Variat: nam in fructu Patavij, semina bina aut ternata plana & spadicei coloris observavimus: at quæ Viennæ & Bononiæ coluntur, etiam ex semine Italico natæ, fructus semine expertes, sola pulpa constare, Clus. in sua hist. notavit.

## III Lotus Africana angustifolia sive femina.

Pseu-

Pseudolotus, Matth. Cam. Tab.

Diospyros sive Faba Græca angustifolia, Lugd.

Lotus Africana, Tab.

Ziziphus Cappadocia, Ger. ico.

IV. Loti Africanæ similis Indica.

Indiæ Occid. palmæ sanctæ similis arbor, Ad. Lob. ico.

Palmæ sanctæ similis arbor, Lugd.

## LIGNUM GUAJACUM.

**G**uajacan nomen est Indicum, quod nunc Guajaci sive Gajaci nomine, per universum orbem cognitum est, quod alij Ebenum esse dicunt, à quo sola summa nigredine disidere videtur: quæ in Ebena summo splendore nigricat: in illo vero albescit: alij Buxi speciem: Sed novum est arboris genus, quod ex America, sive India occidentali affertur. Duplex est, magna matrice & propemodum sine matrice: non tamen diversarum arborum lignum esse censuimus.

I. Guajacum magna matrice.

Guayacan lignum Indicum ex Insula S. Dominici, Monardi, Lugd. & par. 4. Ind. Occid. 29. sive lignum sanctum, par. 9. Ind. Occid. l. 3. c. 22.

Guajaci primum genus, Monardo & Matth.

Guajacum, Bellon. Ad. Cæs.

Gayco & Gayacan, palus Indiæ Hispanis, Frag.

II. Guajacum propemodum sine matrice.

Guayacan genus alterum, quod lignum sanctum, illo præstantius, & ex Insula S. Johannis de portu divite affertur, quo maximè utuntur, Monard. Lugd.

Guajacum, Lac. Cord. in Diosc. & hist.

Palma aut palus sanctus Indiæ Occid. Penæ.

Guajaci 3. genus, Monardo & Matth.

Guajaci alterum genus, Cæs.

Hoc in plura genera ab aliquibus dividitur, ed quod non unum colorem habeat: quoddam enim nigricat: quoddam etiam spadiceo colore flavescit: quoddam præterea omnes istos colores discretos habet: Quare Manardus & ex eo Matthiol. tria genera notantur, quæ licet colore, magnitudine & pondere inter se discrepent, unius

tamen esse arboris, contra quàm Fallopius credidit, Matthiol. statuit, & causam refert in ligni maturitate, quod enim maturius, ed nigrius, & quanto minus adoleverit, tantò magis albicare asserit: probatur maximè, quod rufum, spadiceum flavum, lividumq; colores simul mixtos habet.

III. Guajacum folijs lentisci.

Guajacum cujus ramulum cum floribus & fructu pingit Clus. notis ad Monardem.

Lignum Ebenum sive Guajacum in Insula S. Helenæ, par. 1. Ind. Or. c. 1.

Fructus (quos copiosè cum suo gummi, Amstelrodano à D. Hofi accepmus) variant, nonnulli loculamentis sunt geminis, quorum alterum plenum, alterum inane: alij tribus, in quibus oscicula dura, longiuscula.

IV. Guajacum Orientale.

Palma aut Palum sanctum, Ad.

Guajacum folijs plantaginis, Cæs. Frag.

Lignum sanctum, Cast.

V. Guajaco viribus similis Indica.

Maggai, Indi morbum Gallicum curant, ejus suffragio sudores movendo, Fragosus.

## E B E N U S.

**E**benus, Græcis ἑβένος, duplex Diosc. l. 1. c. 129. Aethiopica nigra, venarum pectinibusve expers, cornu elabratò levore similis, &c. Altera Indica, lineæ candida & sulvis intercurrentibus, idemq; maculæ prædita, Theoph. 4. b. 5. Ebenus India peculiari est: cujus duo sunt genera, unum laudatæ materie puricbrumq; alterum ignobile, &c. Pl. l. 12. c. 4. Hebenur arbor, Neroni principi allata, quam nullam aliam nisi palmarum generis esse docuerint, cujus duo genera esse scribit: & l. 16. c. 40. spississima ex omni materie, ideo & gravissima judicatur: qua neq; cariem neq; vetustatem sentit: qua ut id. l. 6. c. 30. Aethiopia sylva meridiano cardine maximè virent.

I. Ebenus Theveto in Indiæ Insula Palmbotere præstantissima & nigra, & in 9. par. Ind. Occid. l. 3. c. 22. in Hispaniola.

Ebenus, Matth. Cord. in Diosc. Cæs.

Ebenum sive Xyloaloes officin. Ad.

Ebenus, Lugd. qui vult officinas pro Xyloaloes habere.

Valer. Cordus in Diosc. scribit, quoddam Guajacum lignum. Ebenum esse contendere: & Pena censet officin. Ebenum speciem Guajaci esse. Ebenus, Castori, qui eandem figuram habet, quam pro Ligno sancto posuit.

Ex hac in Italia sphaerulæ precatoriæ conficiuntur.



II. Lignum pice ferè nigrius & polito ebore  
Javius: arbor crasso cortice vestita, in cuius in-  
timis Ebenus clauditur: ejusdem generis ligna

rubentia, & alia ceræ modo flaventia reperun-  
tur: in Insula Mauritiana, 5. par. Ind. Or.  
Ebenum picis modo nigrum, 4. par. Ind. Or.

## LIGNA DURISSIMA FERRI DU- riticem æmulantia.

I. Ebenus Indica.

Lignum de Mangles, ex quo navium malos &  
antennas, ferè duritiam æmulantes, condunt:  
part. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 30.

II. Lignum de Cochi, quod ejusdem cum ferro  
ponderis, ex quo anchoras conficiunt, & à Lusita-  
nis Paio di ferro, hoc est, lignum ferreum vo-  
catur: par. 7. Ind. Or. c. 44.

III. Lignum Teixe dictum, adeo durum ut  
ferum æquet, in Pico Insula, quod valde pre-  
tiosum & utile, interius coccinum undulatum  
expressissimè referens, ex quo instrumenta fi-

unt, Liscot. part. 3. Ind. Orient. cap. 6.

III. Angelina arbor apud Cachinum, ex cu-  
jus continuo trunco naves Tonas vocatas ex-  
truunt tam grandes, ut una viginti vel 30. dolia  
à quatica vehi possint, cujus lignum adeo du-  
rum ut ferrum atterat, Linsc. par. 4. Ind. Orient.  
c. 14. & par. 7. c. 27.

An arbor cujus pars ima crassitie 24. orgyarum  
in Guineæ Insula Formosa: part. 6. Ind. Orien-  
tal. cap. 4.

An Angelina arbor, cujus solum nomen apud  
Acolam, cap. de ligno colubrinio.

## C E R A S U S.

Cerasus nigræ Theophr. 3. hist. 13. fructum nigram, Dioscoridi l. 1. c. 177. Cerasia & Cersia, dista autem  
à Cerasia Pontico municipio: unde Lucullus Romanorum Imperator, Mitridate debellans, primum  
in Italiam arborem deulit, & fructum gentilitio nomine Cerasium appellavit, Athenæo l. 2. & Plinio l. 15. c. 25.  
audioribus. Est autem Theophr. 3. natura peculiari arbor, magnitudine excellens, & flore candido pyro &  
mossile proximo, & fructu rubente, sive magnitudine, & c.

Genera: Plinio l. 2. Cerasorum, Aponiana maxime rubent: nigerrima sunt Albia, ut & Cecilianæ ra-  
tunda. Juncus gratissapor: principatus duracini, quæ Pliniana Campana appellat: in ripis etiam Rheni  
terris, in color è nigro ac rubenti viridique, similis maturiscentis semper. Minus quinquaginta est, quod prodierit  
qua vocant Laura, non ingratæ amaritudinis, insita in Lauro. Sine & Macedonica parva arboris, ratiō tria  
cubita excedenti: & minore etiamnum fructu Chamæcerasi: hæc Plinio. Verum non solum apud Gallos &  
Italienses etiam nunc apud nos magna Cerasorum varietas, quæ quotidie insitione & cultura augetur: nam  
plura sunt sativa, alia sylvestria. Sativa, fructus forma, colore & sapore variant. Sunt enim pomifera turbinata  
tore, longiore, rotundiore, majore, minore, cordi etiam figura: & alia pedicula longiore, alia breviora: singula,  
vel pluribus annis coarctantibus, ita ut ex uno petiolo vel singula, & quidem communiter, vel tota quæcunaque  
dependant: vel in racemi modum coarctentur. Colore albo sed rariim partim rubro, partim candido, &  
quædam in maturitate partim ex candido rubent, quædam magis: quædam plantæ ceræ quæ pravo insita sunt  
rubro rufescente, nonnunquam in atrum vergente, nigro etiam quædam nigerrimo & succo sanguineo, Labia &  
manus inspiciente. Saporis dulcis, acido, asperso, ex dulci & acido admixto: alia amaritudinis quid retinent, non  
tamen ingrata, Amarina dista: sic alia nimia sua dulcedine fastidium pariant: alia ob nimium acorem re-  
fruant: alia ob aquivivacitatem undantiam insipida sunt. Similiter quædam carnes sunt præduræ, alia carne  
molliore, sive teneriore & aquosa cassius: & quibusdam caro perniciusius nucleos daret, quibus alij fragilior,  
& nucleis non insuavis est. Sylvestria etiam variant, quorum quædam, licet in hortis & nostris plantentur, sylvestria  
tamen dicuntur, quia in montibus & sylvis, nonnunquam in dumetis reperiuntur: & quædam in sylvis aliis-  
simis, fructu parvo & exiguo carne, avium potius quam hominum cibum, ut et ceterum simul & amarum gustum,  
debent aliquam tamen diffinitionem subsistentiam.

I. Cerasa sativa, rotunda, rubra & acida, quæ

nostris, Cerasa sativa.

Cerasa Aponiana, Plinij.

Cerasus acida, Brunsf. Matth. Lugd. Tab. & alijs  
vulgaris, Ger.

Cerasia acida & vulgaris, Trag.

Cerasa quæ Gallis Griottes, cujus arborem  
Chamæcerasum dici, putat Ruellius.

Cerasa austera & majora, Cord. in Diosc.

Cerasia, Cord. Geslor. Lob. Cast.

Cerasus, Ad. tertia, Dod.

Cerasa Agriotta appellata, Cæs. qui Macedonica Plinij suspicatur.

Hæc in mediocri arbore crescunt, brevique pediculo & carne satis dura donantur: colore communiter rubro, aliquando nigricante; quoddam & quasi albidum quod rarius est: at quæ in alia ejusdem generis arbore insira, magna admodum Cerasa, ex brevibus pediculis dependunt, gignunt.

II. Cerasa lativa majora.

Cerasia Hispanica, Lob. Tab. Ger.

III. Cerasa acidissima sanguineo succo.

Cerasiorum primum genus, Trag. Cerasa austera, Matth. (cui & acidorum tertium genus) Cast. Lugd.

Hæc in altiore arbore proveniunt, & longissimum pediculum habent, ex quibus communiter nostrates (qui Biescheln vocant) Vinum cerasorum conficiunt.

IV. Cerasa crassa carne dura.

Cerasa duracina, Plinio.

Cerasa, quæ primo maturitatem sentiant, Ruel.

Cerasor. 4. genus, quæ forte Juliana Plin. Trag.

Cerasa maroba & duracina, Matth.

Cerasus altera, Dod.

Cerasa pulpa duriore, Duracina vocata, Cæs.

Cerasa Pliniana, Tab. præcox, Ger.

Nostr. Graffion vocant, quæ vel rubent, una tamen parte albidior, vel nigricant.

V. Cerasa carne tenera & aquosa.

Cerasa Juliana, Plinio.

Cerasa aquea, Matth. Tab. Gasconia, Ger. ico.

Cerasa pulpa aquosa, Cæs.

VI. Cerasa alba dulcia.

Cerasia dulcia, Trag.

VII. Cerasus major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente.

Cerasa Adiana, Plinio.

Cerasia nigra, Trag. Tab. Ger.

Cerasa Corbine, quod Corvorum modo nigricent, an Cæciliana Plinij, Matth.

Cerasus prior, Dod.

Hæc nostris sylvestria, & à Cordo in Diosc. Cerasa dulcia dicuntur, & duplicia habentur, rubra & nigra, ex quibus tam viridibus, quam exsiccatissimis, conficiunt. Et in Florida Cerasa sylvestria reperiuntur, an his similia?

VIII. Cerasus paucissimis folijs donatus.

Cerasa sine folijs, Lob. ico.

IX. Cerasus hortensis flore roseo.

Cerasi species major pauciores fructus edens, Lob. icon.

Cerasus multiflora secunda, Tab.

Cerasus flore plenissimo instar parvarum rosarum, Cam.

Cerasus multiflora pauciores fructus edens, Ger.

X. Cerasus hortensis pleno flore.

Cerasus vulgaris duplici flore, Lob.

Cerasus multiflora prima, Tab.

Cerasus multiflora fructum edens, Ger.

Cerasus flore pleno, Eysl.

XI. Cerasus folio laurino.

Cerasus Trapezuntina, Bellon. Ges. hor.

Laurocerasus, Eid. cult. Ges. hor. Clus. pan. & hist. Camer.

Lotus secundus Theophrasti, Lugd.

Variat: nam communiter sub pulpa ossiculum durum continet: at in eo quem Clusius Byzantio, Tarbison curmali, id est, Trapezuntina dactyli nomine accepit, non nucleus, sed semina bina aut terna, plana, spadicei coloris, nullo putamine includuntur.

XII. Cerasus pumila.

an Cerasus Macedonica, Plinij.

Chamaecerasus, Matth. Lob. Dod. cui & Cerasus 4. Lugd. Clus. pan. & hist. Cast. Tab. Ger.

Chamaecerasus sylv. Cord. in Diosc.

Cerasus humilis, Ges. hor. cui & Chamaecerasus, vel Macedonica Cerasus Plinij.

Chamaecerasus urbana, Ges. ad Cordi histor.

In orto Strutgardiano, Cerasum pumilam,

sesquicubitalem, fructu acidissimo, folijs quam

in Austriaca à Clusio pista, majoribus & longioribus, observavimus, an hæc

Cerasus Macedonica, Clus. hist.

XIII. Cerasus racemosa hortensis,

Cerasus racemosa, Matth. Lugd.

Cerasi genus quintum, Dod.

Cerasa uno pediculo plura. Lob. Lugd. Ger.

Cerasa uno pediculo binos aut ternos fructus ferens, Cam.

Cerasi species i. pediculo plura producens, Cast.

Cerasa uno pediculo plura, Tab.

Aliquibus ab uno pediculo terna, quaternæ, quinæve poma dependent: quædam racematim una modo dependent: hinc quæ figuræ in

Lugdunensi historia proponuntur, sub

Ceraso ex uno pediculo plura, &

Ceraso racemosa.

XIV. Ce-

XIV. *Cerasus racemosa* sylv. fructu non eduli.  
*Cerasi folijs arbuscula* sylv. Gesn. hort.  
*Pseudoligustrum*, à quibusdam *Pseudoagnos*, (id est *Vitex falsa*) Dod.  
*Cerasus racemosa*, Adv. Lob.  
*Cerasus avium racemosa*, Lob. ico.  
*Cerasia racemosa rubra & nigra*, Tab. Ger.  
*Padus* Theoph. Lugd.  
*Cerasus avium*, Clus. hist.  
*Cerasus racemosa* sylv. Eyst.  
 an *Cerasus* sylv. Cæf.

*padus* (padus) gaudet vehementer umbrosis, Theoph. 4. hist. nec plura habet.

XV. *Ceraso affinis*.

an *Cerasus sylvestris*, Trag.  
*Mahaleb*, Matth. Cast. Lugd. Tab. Clus. hist. & append. 2. lib. 1. Cam. qui addit *Chamæcerasum petræam*, aut *Petrocerasum* Gesnerum vocare.

*Macalep Arabicum*, *Cerasi* sylv. genus, Bellon. cult.

*Macholebum*, Cord. hist.

*Chamæcerasus Dalechampij*, Gesn. ad Cordum & hort. cui & *Chamæcerasus Syriaca*.

*Macaleb*, Ang. Lob.

*Vaccinium* Plinij, Lugd.

Aliquibus Theophrasti *λανδρα* (*Lacra* *Gazæ*, aliqui *Lacatham* legunt) quam 3. hist. 4. in Macedonia plana etiam descendere: & 3. ejusdem 7. auditu facilimam esse scribit. Sic & Plinij lib. 16. cap. 18. *Vaccinia*, quæ scribit in aquosis provenire, Italiae in aucupijs satum: Galliae verò etiam purpurea, tingendi causa, ad servitiorum vestes. Verum & Theophr. & Plinius brevior est, quam ut aliquid statui possit.

Fructus ex Syria advehitur, quamvis in Galisia, Bellonius: in Italia Anguillara: in Helvetia Gesnerus (apud nos rarius) observavit.

## CHAMÆCERASUS SPURIA.

I. *Chamæcerasus alpina* fructu rubro gemino, duobus punctis notato.

*Chamæcerasus montana*, Gesn. ad Cord. hist. & hort.

*Periclymenum rectum vel mas*, Eid.

*Chamæcerasus alpigena*, Adv. Lob. Lugd.

*Xylosteum alterum*, Dod. Eyst.

*Periclymenum rectum* 3. Clusij hisp. (at 4. in hist.) Lugd. Tab.

*Chamæcerasus*, Cast.

*Idæa* ficus nostra, vulgo *Frangula*, Lugd.

an *Corno* similis frutex in alpidibus, quæ *Cornus* semina Theoph. etiam dici posset, Cæf.

Fructus aliquando geminus in uno longo pediculo rubens, aliquando ex toto coeuntibus seminibus in bipartito conceptaculo, in quolibet duo aut tria sine ossæ.

*Ficum Idæam*, *ovoides* *magis* *robustum* Theoph. hist. 17.

& Plinij lib. 15. cap. 18. historia Lugd. censet.

*Xylostium* alijs, quasi lignum osseum, ob ligni duriciem dicitur.

II. *Chamæcerasus alpina* fructu nigro gemino.

*Periclymenum rectum* 2. Clus. pan. & hist. Lugd.

*Periclymenum nostrum* 2. Sabaudicum, Tab.

III. *Chamæcerasus montana*, fructu singulari cæruleo.

*Periclymenon primum*, Clus. pan. rectum 3. Eid. hist.

*Periclymenum rectum* 4. Tab.

IV. *Chamæcerasus dumetorum* fructu gemino rubro.

*Halimus*, Trag. Lon.

*Caprifolij* tertia species, Dod. gal.

*Periclymeno* cognatus frutex, Gesn. hort.

*Xylosteum*, Dod. Thal. Cam.

*Periclymenum alterum Allobrogum*, *Cornus* feminæ effigie, Adv.

*Periclymenon Allobrogum*, Lob.

*Periclymenum rectum* fructu rubro, Clus. pan. rectum primum, Eid. hist.

*Periclymenum rectum*, Tab.

*Periclymenum tertium*, Lugd.

*Xylostium* floribus albis vulgaris, Eyst.

Fructus gemelli instar exiguorum *Cerasorum*, plerumque æqualis magnitudinis; sæpe altero corum minore, eo tamen pleno remanente.

V. *Chamæcerasus folio aceris*.

*Chamæcerasus montis Generosi*, Gesn. hor. Lugd.

## STYRAX ET NARCAPHTHON.

Σ *Tifæ* Diosc. l. 1. c. 79. *lacryma* est arboris malo coroneo similis: & Theophr. 9. hist. 7. *Styrax* ad unguenta utilis est: plura non habet: & Plinij l. 12. c. 25. proxima Judea Syria supra Phœnicem *Styracem*: gignit: arbor est eodem nomine coroneo malo similis, *lacryma* & c. sed de *lacryma* (mercesinas).

I. *Styrax folio mali cotonei.*

*Styrax*, Matth. Ang. Lac. Bellon. Lon. Adv. Lob.

Cast. Lugd. Tab. Rauvolfi. Cam.

*Styrax arbor*, Gesn. hort.

*Styrax liquida*, Cast. ico.

Serapio fructum tribuit candidum avellanæ majorem, & ex interno nucleo oleum exprimi.

II. *Styrax folio aceti*: in Prodomo describitur.

III. *Storax rubra officinarum.*

*Styrax rubra*, Græcis hodie *Maurocapno*, Bellon.

*Nascaphum*, Cord. hist.

Tegnæ, Ital.: *Bufari*, Siculis, *Coil.*

*Cortex est arboris*, quem *Thus* Judæorum &

*Thymiana* vocant, quo Judæi in suffragiis frequenter utuntur.

an *Nidæaphis* live *inquætor*. Dioscoridis libr. 2. cap. 22. quod ex India desertur corticosum, mori libro simile, quod jucundi odoris gratia sufficit.

*Narcaphrithon* Dioscoridis, Lignum aquilæ Lusitanis dici, Amatus scribit.

*Nucis moscharæ* extimum corticem, *Narcaphrithum* Diosc. censet, Cæs.

IV. *Frutex rotundo argenteo folio* *Cyaniflore*.

*Pulcherriimus frutex*, Honor. Belli ep. 2. ad Clus. à quo ex Creta accepimus.

*Cyanus fruticosus* *Candia*, *Ponæ Ital.*

## ARIA ET HAMAMELIS.

**A**ria Theoph. 4. hist. 8. simili ex toto est *Lauro*: 5. hist. 4. materies durissima est, ut *Roboris*: 7. hist. 3. natura perpetua est: 7. hist. 10. carbones optimos ejus speciosissima materies facit.

I. *Alni effigie lanato folio major.*

*Aria* & *Metallum Italarum*, Ang. Lugd.

*Sorbus torminalis* Gallorum *Alisier*, Bellon.

*Sorbus alpina* vel *pilosa*, Gesn. hort.

*Aria* Theoph. effigie *Alni*, Adv. Lob.

*Aria* Theophrasti, Tabern. Cam. qui lanatam *Cordi* vocat.

*Sorbus Aria* cognominata, Clus. pan. & hist.

*Sorbi torminalis* alterum genus, Cæs.

II. *Alni effigie lanato folio minor.*

*Αμυγδαλίς* & *ιμαμυγδαλίς*, Athenæo.

*Diospyros* quæ *Sorbis* cognata videtur, Gesn.

*Pyraster Idæus* vel *petræus*, Eid. append.

*Myrtomelis*, Eid. in epist.

*Codomalo Cretensium*, Bellonio.

*Amelanchier Galloprovinciæ montana*, Adv.

*Amelanchier*, Lob.

*Vitis Idæa* 3. Clus. pan. & hist. 4. Tab.

*Hamamelis Athenæi*, Lugd.

*Bagolæ* quasi *bacculæ* alterum genus, Cæs.

Duplex est, alia folijs obtusis & latioribus: altera acuminatis & angustioribus.

## COTONASTER ET CHAMÆMESPILUS.

I. *Cotonaster folio oblongo serrato.*

an *Agriomelea*, Bellonij.

*Cotonaster* forte *Gesneri*, Clus. pan. & hist.

II. *Cotonaster folio rotundo non serrato.*

*Cotoaster* & *Cydonago*, Gesn. in epist.

*Epimelis altera*, Lugd.

III. *Chamæmespilus Cordi*, Thal. Cam.

*Chamæmespilum*, Gesn. ad histor. *Cordi*, Adv. Lob. ico.

*Chamæmespilus Gesneri*, Clus. pan. & hist.

*Epimelis*, Lugd. qui Dioscoridis vult, & *Mespilum Anthedon*, Theoph. 3. hist. 12.

Fortè eadem cum priore: quamvis illa folijs sic majoribus, nec baccis adeo rotundis.



# CASPARI BAVHINI PINACIS THEATRI BOTANICI LIBER DVODECIMVS.

## SECTIO PRIMA.

MESPILUS; BERBERIS; GROSSULARIA ET RIBES; SAMBUCUS ET EBULUS; FICUS; SYCOMORUS; MORUS; ARBUTUS; Laurus; Tinnus; Laureola; Chamelæa; Thymelæa;

Cneoron & Nerion.

## MESPILUS.

**M**espilus arbor, & ex *similis* & *amara*: fructus *pitrus* dicitur. Cuius Dioscorides l. i. c. 169. & 170. duo genera facit, alterum quod a nonnullis *A'quir* vocatur, spinosa est, folijs similibus *myricaribus*: fructum fert exiguo malo similem, suavem, continensem tria officula, a quibus nonnulli *tegenus* appellant. Alterum genus in Italia nascitur, quod nonnulli *amara* alij *Satanium* nominant; arbor est malo simili & folijs, nisi quod minoribus: habet verò fructum rotundum, esculentum, latiore umbilico. At Theoph. 3. hist. 12. Mespili tria genera, *quidam*, *amara*, & *hirsuta* (anthedon, setanea, gallica) ut idem dividere consuevit. Fert *Satan* a fructum *graciliorem*, *amariorem*, laxiorem & qui nucleos habet molliores: reliqui minor est fructus, odorator, &c. flos omnibus *Amygdala*, sed utrunque pallidus. Anthedon haud procera est arbor, in orbem comosa, folio valde fisso, Apio in extrema parte simili, maioribus incisuris rigido, &c. fructu ex longo ac tenui pedicello pendulo, qui antequam folia deciderent vehementer urbet, &c. Plinio l. 15. c. 20. Mespili tria genera, Anthedon, Setania: tertium degenerat, scilicet Anthedon similem est, quod Gallicum vocant, &c.

I. Mespilus Germanica folio laurino non serrato: sive Mespilus sylvestris.

Mespilus Setania sive Satania, Theoph. & Plin. Mespilus altera quae Epimelis Dioscoridi, sic dicta, quod ubi sponte provenit semper malum agrestem vicinam habet.

Mespilus, Brunf. Trag. (qui Cratagum Theop. censet) Tur. Gesh. hort. Lon. Ad Lob. Dod. Cæf. Mespilus altera, Matth. in edit. cum magnis figuris, Dod. gal.

Mespili altera species sponte proveniens, Cord. in Diosc.

Mespilus vulgaris, Clus. hist. Cam. ep.

II. Mespilus folio laurino major.

Mespilus fructu præstantiore, Trag.

Mespilus altera sativa, Cord. in Diosc.

Mespilus oxyacanthi in sita, Dod.

Mespilus domestica, Lob. ico.

Mespilus setanea, maioribus vulgari fructibus, Camer.

Mespilus setanea in sitione mitior sativa, Lugd.

Hæc in sitione in Pyrum sylvestrem, maxime Cynosbatum, sive Oxyacanthum, miscet, Cord.

ponum majus edit, nec spinis horret: & singula mala, ut & prioris quinos nucleos complectuntur, nisi forte interdum præter naturam, aut plures aut pauciores contineat.

III. Mespilus Italica folio laurino serrato.

Mespilus altera, Matth. edit. 2. & ico. Lac.

Mespilus setania, Ang. Lugd.

Mespilus altera, Cast.

IV. Mespilus Virginiana colore rutilo,

Mespilus, qui colore est rutilo ut cæra & valde dulcis, part. 1. Ind. occid.

V. Mespilus fructu albo,

Mespilus colore albo mali magnitudine, Scallig. Lugd.

VI. Mespilus Apij folio laciniato.

Mespilus Aronia, Dioscoridis.

Anthedon Theoph. & Plinij.

Paliurus Africana, Ruellio.

Mespilus prima, Matth. Lat. Cast.

Mespilus Aronia, Dod. ut Ang. Bellon. Gesh. hort. Adv. Lob. Lugd. Tab.

Mespilus propriè dicta, quæ tricotopos, Cord. in Dioscorid.



Paliurus Africana vinosa, Gefn. hort.

Azarolus, Cæf. Cast.

an Mespilus Gallica, Cam.

Hæc spinosa est, sed ubi magis domestica, spinis caret, etiam Theophrasto monente.

VII. Mespilus Apij folio sylv. non spinosa, sive Sorbus torminalis.

Sorbi quattuor genus, Trag. Cord. in Diof.

Sorbus torminalis, Matth. Cord. hist. Gefn. hort.

Turn. Dod. Lon. Adv. Thal. Cæf. Tab. Cam.

Sorbus torminalis Plinij, Lob. Cluf. hist.

Cratægus Theophrasti, Ang. Lugd. qui duplicem figuram habet, sub eodem titulo.

Mespili Aroniæ sylv. species, Gefn. hort.

Sorbi sylv. altera species, Cast.

Hypomelides Palladij, quibusdam.

*Κράταγος ἢ ἀπὸ ἀμύγδαλον*, Theophrasto 3. hist. 15. folium habet Mespili (scilicet Aroniæ) rigidum, sed majus, latius, longius, ejus modo laciniatum: arbor est non admodum procera, nec crassa: lignum varium, solidum, flavum, &c. fructus ejus est magna ex parte rotundus, qui maturescens flavescit & utrumque nigrescit, succo & gustu mespili: quare sylv. Mespilus videri potest. Plinio l. 15. c. 21. Sorborum 4. genus torminalis appellant, remedio tantum probabili, assiduum proventu, minimumque pomo, arbore dissimili, folijs pene Platani: & l. 27. c. 8. Theophrastus arboris genus intelligi voluit Cratægonon sive Cratægona, quam Itali Aquifoliam vocant.

VIII. Mespilus apij folio sylv. spinosa sive Oxyacantha.

Oxyacantha arbor est similis Pyrastro, minor

verò & spinosa valde: fructum fert Myrto similem, plenum, rubrum, fragilem, intus nucleum habentem, radicem multitudine & profundam, Dioscoridi, l. 1. c. 122.

Mespili 2. genus Plinij videtur: interdum ait, degenerat, tamen si Anthedoni similis est, quod Gallicum vocant, Theophrastus Anthedonidem nominat, quasi speciem Anthedonis.

Cynosbates Theophrasti, Trag. Lon.

Oxyacantha, Matth. Lac. Tur. Bellon. Ad. Lob.

Rauvvolff, Cæf. Lugd. Tab. Cam. Thal.

Oxyacantha Dioscoridis, Dodon. gal. Cord. in Diof. (& Latini veteribus simpliciter Spina) Gefn. hort.

Sorbus aculeata, Cord. hist.

Spina acuta quorundam, spina alba vulgo, Ang. Spina appendix Plinij (& ejusdem Spina simpliciter) Gefn. hort. Cluf. hist. cui & Oxyacantha vulgaris.

Mespilus sylvestris, Cast.

In hanc Mespilus optime inseritur.

IX. Oxyacantha Dioscoridis, sive Spina acuta pyri folio.

Oxyacantha legitima, Ang.

Pyracantha, Adv. Lob. Cluf. hist.

Rhamnus tertius Diof. Lobico.

Acuta spina, Cast.

Uva ursi Galeni, Lugd.

X. Mespilo similis fructus venenatus.

Arbuscula in lictore, quarum poma mepilia nostratibus similia, Leriio part. 3. Ind. occid. c. 12.

XI. Mespilo similis fructus fuscus.

Fructus octavus ex navigat. Batav. Cluf. exot. lib. 2. cap. 15.

## B E R B E R I S.

**A**N apud Theopb. 3. hist. 17. arbor circa idam proveniens, quam *Colyteam* vocant, genus aliud fruticosum, ramosum, alosum, invenitur rarum, folio Laurino, ulmeo simili, oblongius tamen: colore parte altera herbido, tergo autem albedo, nervosq; cortice non levi, sed quasi viri vestitur: ligno duro spisso, radices majorem in modum flava, &c. Spina appendix est appellata, quoniam bacca puniceo colore in ea appendice vocatur. Plin. lib. 24. cap. 13.

I. Berberis dumetorum.

Berberis, Brunf. Dod. gal. Turn. Gefn. hort. Lac. Lon. Adv. Lob. Cast. Lugd. Rauvvolff. Cam. cui

& Amirbaris Avicennæ.

Berberis vulgaris, Bellon. cult. Cluf. hist.

Spina acida, Brunf. 4. Dod.

Oxyacantha, Hermolao, Ruel. (cui & Spini vineta) Trag. Fuch. Eysf.

Oxyacantha Galeni, non Dioscoridis, Cord. in

Dioscorid. Tabernæm.

Crespinus, Marchiol. Cæsalp. cut & Ribes Serapionis fortè.

Oxyacanthus Galeni, Cam.

II. Berberis sine nucleo.

Berberis *amara*, Cluf. hist.

III. Berberis alpina Cretica.

Lycium Creticum, Hon. Belli epist. 1. ad Cluf. & Ponæ: hoc ab utroque accepti.



## GROSSULARIA ET RIBES OFFICINARUM.

**T**heophrastus 3. hist. 17. post Rhamnus, lo (equum Gaxa vertis) vel ut alij asos memorat, hu verbu: Aequorum alia candida, alia nigra: & sicut fructus, utriusque pro ratione discriminis, alius candidus, alius niger: nonnulli etiam medij quodammodo sunt, quibus flor in purpura candicans: nec enim fulvus, nec exalbidus est, &c. Non candidum, nonnulli Uvam crispam existimant: hac ille. Uvam crispam ab intortu & ventris, crispis folijs & acinis quos producit, vocant.

I. Grossularia simplici acino, vel spinosa sylvestris.

Uva crispa. Trag. Dod. ut: Fuch. Ges. hort. Lon. Ad. Lob. (cui Vitis precia Plinij) Tab.

Uva spina. Matth. Lac. Cæs. Cast.

Grossularia, Ruellio, Bellon. Thal. alba, Lugd.

Crispina ova, Cord. in Diosc.

Rocella Cardano l. 6. de var. rerum.

Ceanothus spina, Theoph. 4. hist. 11. vel Ceanothus asper, Ges. hort.

Grossularia vulgaris, Clus. hist.

Fructus maturus flavesceat, nonnunquam subrubet.

II. Grossularia spinosa sativa.

Uva crispa fructu Cerasi magnitudine, Ges. hort.

Grossularia majore fructu, Clus. hist.

III. Grossularia spinosa sativa altera folijs latioribus.

Grossul. fructu obscure purpurascens, Clus. hist.

Est & fructu ex atrocaeruleo, frutice leviusculis spinis armato; alia fructu hirsutius.

IV. Grossularia simplici acino caeruleo non spinosa, nunc in hortis habetur.

V. Grossularia multiplici acino sive non spinosa hortenstis rubra, sive Ribes officinarum.

Ribes hortenstis, Trag. vulgaris fructu rubr. Eyst.

Ribes vulgaris domestica, Matth. Cast.

Ribes, Fuch. Lon. Lac. Tab. rubra, Ad.

Ribes vulgo, Ang. Bellon. Cæs.

Uva urbi, Dod. gal.

Ceanothus levis, Ges. hort.

Ribesum septu rubro, Dod.

Ribes Arabum, Lob.

Grossularia rubra, Lugd.

VI. Grossularia hort. majore fructu rubro.

Ribes rubro flore, folijs & fructu majoribus, Clus. pan. & hist.

Ribes baccis majoribus, Comer.

Ribes major fructu rubro, Eyst.

Cultura aliquando in arbusculam abit, & acinis avellana majoribus acidissimi saporis Florentiae visam, Gesnerus lib. de hortis refert.

VII. Grossularia distinctis baccis.

Ribes monocarpus, Clus. hist.

VIII. Grossularia hortenstis fructu margaritis simili.

Ribes vulgaris fructu albo, Clus. hist.

Ribes fructu albo, Eyst.

IX. Grossularia vulgaris fructu dulci.

Ribes candidioribus folijs, Lob. obs.

Ribes vulgaris fructu dulci, Clus. pan. & hist.

Ribes minor fructu rubro, Eyst.

X. Grossularia sylv. rubra.

Ribes sylv. Matth. Ges. app. Lon. Cast. Cam.

Ceanothi levis genus sylv. Ges. hort.

Grossularie rubrae genus sylv. Lugd.

XI. Grossularia non spinosa fructu nigro.

Ribes sylvestre, Trag. Thal.

Ribes nigrum, Dod. gal. nigra, Ad. Lob. icon. Tabern.

Amomum falsum & Pseudoamomum, Ges. hort.

Ribesum fructu nigro, Dod.

Ribes vulgaris nigro fructu, Clus. hist.

Ribes baccis nigris, Cam. fructu nigro, Eyst.

Frutex Ribi similis fructu nigro, an arbor Piperis in Italia Plinij, myrto similis, Cæs.

Grossularia nigra alijs Pipirella, Lugd.

Variat baccis minoribus & majoribus.

XII. Ribes Arabum folijs petasiditis.

Ribes Arabum cum suis capteolis, Rauvolf. & Lugd. app.

Ribes legitima Arabum, Clus. hist.

Ribes Serapionis, Cam. hort.

An idem cum hac,

Ribes Serapionis folijs oxytaphi, Bellonio de coniferis, Dodon. & Lugd.

XIII. Ribes Rauvolfij congener planta,

Clus. ex. l. 4. c. 21.

## S A M B U C U S.

**S**ambucus, quae Graeco ἰσθό, sic videtur Ilernolao, a Sambuca, musici instrumento, quod, alij pelida, alij Smagadan vocant: & hoc ab auctore cui nomen Sambucus fuerit: Sambucus O. Sereno.

Genera duo Dioscoridi l. 4. c. 174. & 175. unum quod in arborem assurgit, &c. alterum genus humile vocatur, idq. humile atq. longe brevius, & ad genus herbaceum accedens, &c. Theop. 3. hist. 13. Sambucum arborescens pluribus verbis descripsit: verum utrinq. descriptiones, tanquam arboris notissimæ præterire lubet. Plin. l. 24. c. 8. utrinq. meminisse, addens Sambucum habere alterum genus magis sylv. quod Græci Chamæastem, alii helion (id est, palustrem) vocant multa brevius, &c.

### I. Sambucus fructu in umbella nigro.

Sambucus, Brunf. Matth. Fuch. Dod. ut. Cord. in Diosc. Bellon. Gesf. hort. Tur. Lac. Lon. Lob. ico. Cæf. Tab.

Sambucus vulgaris, Trag. Thal.

Sambucus fructu in umbella, Ang.

Sambucus domestica, Cast.

Sambucus campestris sive vulgaris, Cam.

Arbor aliquando, aliquando frutex est.

### II. Sambucus fructu in umbella viridi.

Sambuci aliud genus, Trag.

Sambuci altera species, Dod. ut.

Sambucus fructu albo, Lob. ico.

Variat baccis viridibus, in alijs albis, vel ex albo florescentibus.

### III. Sambucus racemosa rubra.

Sambucus sylv. Trag. Lon.

Sambucus montana, Matth. Gesf. hor. Cast. Cam.

Sambucus racemosa, Ang.

Sambucus tertia, Tur. 4. Dodon.

Sambucus montana racemosa, Ad. Lob. ico.

Sambucus montana seu *sp. montana*, Thal.

Sambucus sylv. sive montana, Lugd.

Sambucus cervina (quod hujus folia cervus maxime expetat) Tab.

Sambuci genus aliud minus, Cord. in Diosc.

Sambuci alterum genus, Cæf.

an *noxi*, Theoph. l. 3. c. 4. montibus autem propria, que in planis nasci nequeunt, abies, pinus,

picea, aquifolia, tilia, carpinus, pygus &c. quam postremam arborem Gaza in sua transfl. omisit.

an Sambucus montana Plinii, quam in montibus nasci tradit.

### IV. Sambucus laciniato folio.

Sambucus folijs laciniatis, Lob. Lugd.

Sambucus laciniato folio, Dod.

Sambucus laciniata, Tab.

### V. Sambucus humilis sive Ebulus.

Chamæaste, Dioscoridi.

Ebulus, Brunf. Frag. Matth. Fuch. Ang. Tur. Lac.

Bellon. Ad. Lob. Cast. Cæf. Lugd. Tab.

Ebulus sive humilis Sambucus, Dod. ut.

Ebulus sive parva Sambucus, Cord. in Diosc.

Ebuli & Sambuci alterum genus, Lon.

VI. Sambucus humilis, sive Ebul. fol. laciniato.

Ebulus laciniata, Ponæ Ital. qui ex hort. No-

bilis, Contareni ad me misit.

VII. Sambucus aquatica flore simplici.

an *opuntia*, Theoph. 3. hist. 7. Inter sylvestria

radicibus multis constat: & 4. hist. 8. & umbro-

sis locis vehementer gaudet, veluti Tamus.

Opulus, Ruellio.

Aceris species tertia, quæ Platanus aquat. Ang.

Sambucus aquatica, Trag. Matth. Lob. ico. Cast.

Lugd. Thal. Tab. Ger.

Sambucus palustris, Dod. ut. Gesf. femina, Cam.

Lycostaphylon (id est, uva lupina) femina,

Cord. hist.

Sambucus palustris, vel aquatica sylv. quibus-

dam Chamæplatanus, Gesf. hor.

VIII. Sambucus aquar. flore globoso pleno.

Lycostaphylus mascula, Cord. hist. Gesf. hor.

Sambucus palustr. vel aquatica hortensis, Gesf. h.

Sambucus rosea, Ad. Lob. ico.

Sambucus palustris 2. Dod. mas, Cam.

Sambucus aquatica colore densissima, Lugd.

Sambucus aquatica polyanthos, Tab.

Sambucus rosea, Ger. Eylf.

Floribus est pilæ in modum conglomeratis, &

communiter albis: rarius purpurei coloris, que

Sambucus palustris hortens. flor. purpurei co-

loris, Gesf. hort.

Sambucus rosea fl. purpureo multiplici, Tab.

Sambucus rosea flore purpurante, Ger.

## F I C U S.

**F**icus arbor, omni Græci, & fructu eundem appellantur. Genera, Dioscoridi lib. 1. c. 176. & 177. & Galen. 7. simpl. duo sunt: alia sicut est fœmina: omni iure: alia sylvestris, eundem agnoscunt, Plinio lib. 13. cap. 19. Caprificum. Theophrastus de Ficu, in libro de historia & causis plantarum, plurima habet: qui & Aegyria & Indica & Cypria (ut & Dioscorid.) & Caprifici meminit: & Plinio qui lib. 13. cap. 18. Ficum genera viginti novem proposuit: vel 2 figura, vel 2 genere, vel autem dicitur a fœmina inter pomorum genera referenda: & quodammodo magnitudine amula esse ferunt: quæ omnia, cum breviter insudavimus, præterire lubet. Verum primæ fructu,

fructum, tam sativam, quam sylvestrem ut *uol.* Latinis *Grossus* nominatur: ut *ficus* sic ea in furno, aut sole exsiccatur, qua quibusdam *passa* dicuntur, *ἰχθυή*, Latine *Carica*, nupin *Aegina*: quam vi *Carica* *ficus* peculiaris fructus sit in Syria provenientis, ut ex Plinio colligere est. Sic ipsa grana in fructu, *Gr. αἰμυρροπιδας* sumentia Plinius l. 15. c. 19. *αἰμυρροπιδας* vocant. Hujus & Mori folijs *Antiochia* *Bombyces* ali, & alba mori *athores* & *ficus* pumiliones ejus nomine coli, *Bellonius* scribit.

### I. Ficus communis.

*Ficus*, Brunf. Trag. Matth. Ang. Dod. ut: Cord. hist. Bellon. Gesn. hort. Lac. Tur. Lon. Ad. Lob. Rauvvolf. Cæf. Cast. Lugd. Tab. Ger. *Ficus sativa*, Fuch.

Fructus forma & colore differunt, nonnulli longiores, alij breviores: alij pyri forma, alij sessiles sunt, alij inter hos medij. Colore, albæ, pallidæ, virides, lutæ, purpureæ, subrusæ, ex cæruleo saturatè purpureæ, nigræ, aliæ deniq; vario colore spectantur. Sunt & albæ, quoad pulpam anteriorem. Siccarum sive passerum, triplex differentia adfertur, prima in sportheis, magnisq; corbibus: secunda, in cistis & similibus sportis lauri folijs immixtis: tertia, in parvis & turbinatis corbibus: è spatio contextis. *Malsilensium* cognomento, cæteris magnitudine quidem inferiores, saporis verò generositate superiores. Sic in regno Congiano, eximia magnitudinis, magnaq; copia: maximæ verò in Insula S. Helenæ. Tria *Ficum* genera (ut rectè Scaliger in Theoph. 5. caus. plant. 1.) fert *Ficus*: unum, valde tempore præcoccem, quem idcirco Græci *ἰσχυρὸν* quasi præcoccem vocarunt, atque is edendo est, *Bolas* Veneti vocant, Galli *Florones*: *Columella*, communi voce, priorem fructum: Plinius, præcoces. Aliud genus eorum est, quod postea prodit, cujus duæ species sunt: una quæ maturatur, *Ficum* dicimus, Græci *σύνωρος*: altera semper cruda est, & prius cadit quam absolvetur: eos Plinius abortus vocat: alio nomine *Grosfi* dicuntur, Græci *ἀμβύρα* vocant.

Variant etiam *Ficus* in India pro regionum diversitate: nam in Provincia bonæ spei, fructus perpetuo ferunt (part. 8. Ind. Occid.) & in Peru summa earum ubertas (part. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 31.) Addit Josephus Acosta l. c. in India Occidentali diversas esse valles, quæ integro anno fructus promant: sed admiratione dignius esse quod in Peru arbores reperiantur, quæ uno semestri ex uno latere, altero ex alio fructus protrudant. Sic in Mala 13. miliariorum intervallo à civitate de Los Reyes, *Ficus* est, quæ parte dimidia, quæ Austrum spectat, frondes & fructus fert, quando in montanis ætas viget:

altera verò pars, contra ratio anni tempore, cum in planis ætas est, idem cap. 32.

*Ficus* arbores Monardæ referente, ex Hispania in Peruanas Provincias delatæ, plurimos & optimos fructus gestant: & ut folia isthic non deponant, Deus singulariter voluit, quo semper præfens remedium adesset contra insecta, quæ *Araneæ* appellantur, quorum istibus virulentis, lac ex folijs *Ficus* manans, bis terve in vulnus instillatum, remedio est.

### II. Ficus humilis.

*Ficus pumila*, Matth. Dod. *Chamaeficus* sive humilis *ficus*, Lob. *Chamaefyce* arbor, Lugd.

### III. Ficus sylvestris Dioscoridi.

*Caprificus* vocatur è sylvestri genere *Ficus*, inquit Plinius libr. 15. cap. 19. nunquam maturefcens, sed quod ipsa non habet alijs tribuens, &c.

*Caprificus*, Ang. Cord. in Diosc. & hist.

### IV. Ficum specie fructus Peruanus.

*Papaie* fructuum genus *ficum* specie, 6. part. Ind. Occid. 18. qui & *Ficum* exiguorum *Tunne* nominatarum meminit.

### V. Fici similis arbor fructu oblongo.

*Ficus Nigritarum*, Thevet. Lugd. Est folio *Ficus*, fructu pedes duos instar *Cucurbitæ* longo, quem tanquam *Melones* escitant.

### VI. Ficus prædictæ similis fructu magno Meloni par.

*Chivef*, quod Syriacè *Ficum* significat, in Insula *Zipangu*, Thevet. Lugd.

### VII. Arbor Malacensis multis radicibus prædita.

Arbor contrarijs prorsus facultatibus donata: nam quæ solem orientem spectat, adversus omnia venena valet: quæ verò occidentem, venenum præsentaneum sunt. Ignatio Franciscano in itin. novi orbis: ex quo Clus. in Acostam cap. 41.

### VIII. Ficus Indica folijs Mali cotonei similibus, fructu sicibus simili in Goa.

*Ficus Indica* Theophr. 4. hist. 5. Indica, ait, regio arborem *Ficum* vocatam fortitur, quæ è ramis radices demittit singulis annis, non ex novel-

lis, sed ex anniculis, atq; etiam verustioribus: illæ se terræ conjungentes, seu sepem circa arborem faciunt, ita ut veluti tabernaculum condatur, quo etiam morari homines solent, &c. Plinio l. 12. c. 5. Ficus Indica exilia poma habet: ipsa se semper ferens, vastis diffunditur ramis, quorum imi in terram curvantur, &c. l. 7. c. 2. sub una Ficu turmæ conduntur equitum. Arbor Indica admirabilis, Straboni. Ficus Indica, Clus. ex. Lugd. Tab. Mangle forte, Oviedo. an Mangen, Ferd. Lopez. Arbor de rayz, id est, radico sa, Linsc. part. 4. Ind. Orient. 14. & fig. 12. Enzada, Pigafetta, part. 1. Ind. Or. c. 4. Arbor Goa sive Indica, Ger.

Ex cortice vestes conficiunt.

IX. Ficus Indica folio spinoso fructu majore.

Ficus Indica, Matth. Dod. ut: Cardano, Lac. Ges. Lob. Cast. Cæs. Eyst.

Carduus Indicus & Ficus Indiæ, Cl. cor. ad Dod.

Pala sive Ficus Indica, Bellonio.

Tuni siccifera Indorum, Ad.

Ficus Indicæ species, Tunc Indorum, Frag.

Anapallus Bellonij, Cam.

Tunes, Oviedo, Card.

Tunc, Opuntia, Lon.

Ficus Indica spinosa, Tab.

Tunc & Tunas Indorum, Lugd.

Opuntia vulgo habita, Cam.

Tunal in nova Hispania, nonnullis locis Cardii: part. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 23.

Tunales qui fructus bonos promunt; & magni qui in India æstimantur, Tunas vocari solent, Idem.

Arbor Nepal: fructus, Nucchi in Insula Cuba, Ferdi, Cortesio, Cardan.

Opuntiam nonnulli credunt, de qua Theoph. 1. hist. 12. sic: huic (Ficui Indicæ) similis est, vel potius quodammodo mirabilis, si qua ex folij radicem mittat, qualem circa Opuntem herbulam esse ajunt, quæ & esu suavis est. Plinio l. 21. cap. 17. item circa Opuntem, Opuntia est herba etiam homini dulcis, mirumq; è folio ejus radicem feri, ac sic eam nasci: Alijs Pala Plinij, & Tala Arriano, Guil.

Colore fructus variat, virides internæ purpurei, cerei, albi variegati.

X. Ficus Indicæ grana.

Cochinillia sive Grayn vermiculus sub folio Tunal: par. 8. Ind. Occid. l. 4. c. 13.

Quidam Tunas (id est, fructus) nullos gignunt, sed sub folijs fructum alium Greyn dictum edunt, vermiculum scilicet folijs adhærescentem & tenui pellicula obductum, & hæc celebratissima Indiæ Cochinillia, qua Grayne colorantur, Idem.

Arbor Cochenille, Claud. Durero.

XI. Ficus Indica spinosa sylvestris.

Cardis feu Tunades sylv. fructum nullum protrudentes: si verò proferant, meris spinis horrent, part. 9. Ind. Occid. l. 4.

XII. Ficus Indica folio spinoso fructu minore. Indorum ferruminatrix, Adverf.

Opuntia ostocollos, quos artuum fracturis & luxationibus profit: de qua & Author hist. generalis Indiarum.

Arbor rupturas consolidans, Ovied. qui suspicatur Carduum Tunes in hanc arborem transmutari.

XIII. Mippi nonnullis Indis Caiahaba, quæ ossium fracturis alligata ea ferruminare solet, Clus. ex. l. 4. c. 14.

XIV. Cereus Peruvianus spinosus fructu rubro nucis magnitudine. Cardui species, quem Christiani Cereum appellant, Oviedo.

Euphorbij arbor Cerei effigie, Ad. Lob. ico.

Euphorbium, Cast. ico.

Cereus spinosus, Lugd. Ger.

Cereus Peruvianus, Tab.

Stripites spinosi hæc altitudine, Linsc. 4. part. Ind. Orient. fig. 21.

XV. Ficus Indica lævis pilosa: hæc ex Creta missa: eaq; duplex, altera folio rotundo, altera folio oblongo.

XVI. Ficus Indica humilis: hanc ex horto Doctoris Saltzmanni Poliatri & Profess. Argentinensis habeo, quæ pedem vix superat, ramis est reflexis & veluri repentibus, flore magno, luteo: de qua in historia.

Ficus Indica minima, alijs Lichen marinus, vel Opuntia marina, de Bry.

## S Y C O M O R U S.

**Σ**υκόμορος, aliqui etiam *συκόμορος* vocant, est arbor magna, fico simili, largo succo abundans, folijs Mori: fructum ter quaterve anno proferens, non è summus ramus, sed è caudice ipso *τερυγίον* id est, caprifico similem, grassu dulciorem, sine granu interioribus, Diosc. l. 1. c. 181. At Theophr. 1. hist. 1. c. 23. *συκόμορος* οὐδὲν ἄλλο: πεccu-  
liatu vel maxime ortu. si quis fructus caudici profiliat, ut Moro Aegyptia: hanc enim ex caudice ferre nonnulli  
affirmant: alij grandibus ex ramu eam fructificare: & 4. hist. 2. & similis quodammodo moro nostrati est,  
quippe folio magnitudine aspecluiq; proxima: pomum est magnitudine ficu granu internu carens, &c. Plinio  
l. 23. c. 8. Mora in Aegypto & Cypro sui generis, largo succo abundans, summo cortice desquamato &c. &  
l. 13. c. 7. eadem fere qua Theophr. habet, Ficus Aegyptiam vocans.

I. Ficus folio Mori, fructum in caudice  
ferens.

Sycomorus, Matth. Dod. ut: Lac. Lon. Ad. (sive  
Morosicus) Lob Cast. Lugd. Tab. Ger.

Sycomorus, Ficus Pharaonis, vocant, Bellon.  
Gefn. hort.

Sycomorus Giumetz appellata, Alpino.

Porchel Theveti, Lugd.

Sycamine Theophr. Cæs.

Ficus Aegyptia, Rauvvolf.

II. Ficus folio Sycomori, fructum non in  
caudice gerens.

*Συκή* οὐκ ἔστιν ἡ γιγνιται, arbor specie differens,  
quippe quæ Ulmus cum sit, folia Sycamini re-  
fert: fructum verò gerit prunorum magnitudi-  
ne, & quàm pruna ipsa dulciorem, Dioscorides,  
lib. 1. cap. 182.

Fici Aegyptiæ similis quadantenus, quæ vo-  
catur Cypria ficus in Creta: nam & illa in cau-  
dice ipso fert pomum, & ramis cum in crassitu-  
dinem adolevere: sed hæc germina emittit sine  
ullis folijs radicis familia, &c. Plin. l. 13. c. 7.

Ficus Cypria in Sycomori genere, Matth.

Sycomorus in Cypro, Cord. in Diosc.

Ficus cypria, Dioscoridis, Sycomorus Græco-  
rum, Mumeitz Arabum, Rauvvolf. Lugdun.  
append.

III. Sycomorus folijs minoribus.

Sycomoro similis fructu flavescente sine granis  
in Mayo insula: 4. part. Ind. or. fig. 19.

I V. Ambulon, Scalig. Lugd. Archut in insula  
fert arborem, cujus è cortice fructus exit candi-  
dus, saccharite specie, & magnitudine corian-  
dri, Ambulon ei nomen est.

## M O R U S.

**Q**uia arbor *Μορία* ἢ *μυρία* Latine Morus, fructus *μύρον* ἢ *μυρίον* Morum dicitur. Diosc. l. 1. c. 180.  
arbor est nota: at Theophr. 1. hist. 15. Sycaminos (Morus Gazæ) serotina germine esse solet, sed nihilo  
tardius quam alia folia deperdit: 1. hist. 19. succu vinosus est: 1. hist. 21. flores sunt laticincti, &c. Plinio l. 15.  
c. 24. nec alio modo quam pomi magnitudine differunt mora Ostiensis & Tusculana: & l. 16. c. 22. arborum  
dilla sapientissima, qua novissima urbanarum germinat, nec nisi exacto frigore: quare l. 18. c. 27. cum germi-  
nare videri Morum, injuriæ postea frigori timere nolito.

I. Morus fructu nigro.

Morus, Brunf. Trag. Matth Fuch. Dod. ut: Lac.  
Turn. Lon Rauvvolf. Adv. Cæs. Lugd. Tabern.  
Ger. vulgaris, Cam.

Morus arbor fructu nigro, Gefn. hort.

Morus nigra, Cord. in Diosc. Bellon. Cast.

Morus rubra, Ang.

Morus celsa officinis, Lob.

Celsa quasi excelsa dicitur, ad differentiâ Ru-  
bi, cujus fructus etiam Mora, sed bati, dicuntur.

II. Morus fructu albo.

Morus alba, Matth. Ang. Gefn. hort. Lac. Adv.

Cast. Lugd. Cam. Tab. Ger. Rauvvolf. cui Tur  
Tripolitanis.

Morus alba, Gallis perperam Sicomorus. Bell.

Morus candida, Cord. in Diosc. Dod. Lob.

Morus primum ex Hispania in Indiam propter  
bombyces illata: part. 9. Ind. occid. l. 4. c. 32.

Hæc non solum colore & magnitudine, sed  
etiam sapore à nigris differunt. Folia in hac  
quando adhuc humilis est, lacinata & alius  
insecta habet, & non secus in nigra, quæ

Chamæmorus augmenti tarditate tantum à  
vulgari discrepans, Cam.

## A R B U T U S.

**A**rbutus Dioscoridi l. 1. c. 17. 5. *ἀρβυτὸν*, arbor est cydonia similis, tenui cortice, fructum habens pruni magnitudine, nuclei experiem, quem *μυμυλιν* vocant, qui ubi maturuit subfultum, aut rubicundum est. Theoph. 3. hist. 16. Comarus, quæ nemecylum cibo idoneum ferat, magnitudine non nimium prastat: corticem tenuem tamarici similem habet: folium inter ilicem & laurum: flores singulari appendice parte postrema racemati coherant, specie quævis myrto oblongo sinulu, non foliatus, concavus, tanquam ovum exsculptum ore aperto. &c. Plinio l. 15. c. 24. pomum duobus nominibus appellant Græci, Comarum & Memecylum, & apud nos alio nomine Arbutus, &c. l. 23. c. 8. Arbutus sive Unedo, fructum fert difficilis concoctionis.

## I. Arbutus folio ferrato.

Arbutus, Matth. Dod. ut: Bellon. Cord. in Dioscorid. Gesn. hort. Lac. Turn. Lon. Rauvolf. Clus. hisp. & hist. Cæsalp. Castor. Lugd. Tabern. Camer. Gerard.

Arbutus Theophrasti, non Dioscoridis, Ang. Oinarum & Conarum sive Arbutus & Unedo Theoph. Guil. pap.

Arbutus sive Unedo, Adv. (Galeno perperam Epimelis) Lob.

Arbor vastæ magnitudinis in Creta, cum alibi fruticet, Bellonio monente: & in fructu differentia, quidam parvi mali magnitudine, rubore magis nigricante, mollior & suavior in mediterraneis: quidam avellanæ magnitudine, flavior & asperior, in maritimis tractibus, Cæf.

## II. Arbutus folio non ferrato.

Andrachnes, Bellonio.

*Ἀρβυτὸν* Cretensium, Hon. Belli apud Clusium.

Andrachne Theophrasti, Clus. hist.

*Ἀρβυτὸν* (Portulaca aliquando, portulaca

Gazæ) folio Arbutu similis est, magnitudine non nimium præstans, cortice albo circumrumpi solito, fructum arbutu similem parit, Theophrasti 3. hist. 16. Adrachne sylv. arbor est, similis Unedoni, folio tantum minore, & nunquam decidente, cortice non scabro quidem, sed qui circumgelatus videri possit, Plin. l. 13. c. 22.

*Arbuti folio exotica.*

## I. Jambolones, Garziæ.

Jambolains, Acostæ, Frag. Lugd.

Jambolyn, Palud. in Linc. 4. part. Ind. or. 10.

Arbutum simile Myrto, Garz. Frag. folijs Arbuti (folijs oxyacanthæ Paludano) fructu olivæ Cordubensi simili, qui muria conditur.

## II. Carandas, Garziæ.

Caranda, Frag.

Auzuba, Oviedo, Frag. at Clusius, Carandæ ferè similem Oviedum describere, ait.

Fructu est exiguo malo perfimili, gratissimo uvarum sapore, qui muria, etiam aceto, tum in continente, tum in Balagete conditur.

## L A U R U S.

**L**adonem, Ladoni filiani formosissimam fuisse, Poeta fabulantur, quam cum Apollo deperiret, & ut possetur celeri cursu fugienti instaret, ab eo tandem capta, matrem tellurem precatur, ut in sinum se suum reciperet. Votum ac precibus tellus excitata, concessum arborem edidit. Re confecta desertus Apollo, arborem gentili nomine donavit, & vulso ramo sese coronavit. *Δάρε* ipsa arbor, & bacca *Λαυρίδι* Dioscoridi lib. 1. cap. 106. dicitur, qui aliam folio tenuiore, alteram latiore scribit: & Theoph. (qui hinc inde multa de Lauro habet) 3. hist. 12. alia est tenuifolia, figura similis Sorbu: & 3. hist. 13. latifolia, foliis molle atque oblongum habet, sicut Sambucus: & 3. hist. 8. Laurus uram producit & fructifera est, quanquam non omnis sed genus quoddam, verum sterilis copiosius, quam masculam nonnulli appellant. Plinius lib. 15. cap. 13. Lauri genera tradens, nemini ejus quam *Μυστακιν* vocat, folio maximo, flaccidior, & albicante. Delpheica, quæ aquali colore, viridior, maximè bacculi viridi rubentibus. Cypria, quæ folio brevi, nigro, per margines imbricato, crispâ. Tius, quæ aliquibus sylvestris Laurus, carulea bacca. Regia, quæ amplissima & arbore & folio. Baccalia, quæ vulgarissima est, baccarumq; fertilissima. Sterilis, quæ triumphalis sit. Affers & alia genera, nomine posuit, quam generis societate communicantia.

I. Laurus latifolia *λαυρίκη* Diosc.

Laurus, regia amplissima, Plinio.

Laurus latiore folio, Matth. Cast. Lugd.

Laurus latifolia, Cord. in Diosc. Bellon.

Laurus regia folijs ad Malum Medicam accedentibus, Cæsalp.

Laurus latifolia mas (quæ sterilis & femina)

## II. Laurus vulgaris.

(Tab.

Laurus, Brunf. Trag. Dod. gal. Gesn. hort. Lac. Lon. Lob. Eyll.

Laurus tenuifol. Matth. Cord. in Diosc. Lugd. Cast. Cam.

**Laurus**



Laurus altera species, Dod.  
 Laurus vulgarior baccifera, Adv.  
 Laur. mas (quæ sterilis & fœmina) Tab. & Ger.  
 Præter has Tabernæmontanus pingit  
 Laurum tenuifoliam marem,  
 Laurum tenuifoliam bacciferam, quæ Laurus  
 mas, Gerard.  
 Laurum angustifoliam marem.

Laurus quædam floret tantum flore copioso  
 racemoso, uvam Theoph. vocat, & fructum non  
 fert: alia fructum fert, in quo etiam differentia:  
 alterius, in rotundo modicè oblongus est: alte-  
 rius oblongus, gracilis & utrinque ovato mucrone  
 turbinatus. Lauros alibi frutescentes, in Achon  
 monte ingentes arbores fieri Bellonius scribit,  
 qui in Græcia quinque genera notavit. Et in  
 Indiæ occidentalis in sulis Nicaragua, & nova  
 Hispania Lauri venustæ & editæ exurgunt.

*Laurum sylvestris.*

Laurus sylvestris *Αἰγροῦ ἄγρια* Theoph. l. hist. 15.  
 inter perpetuè virentes è sylvestribus: Plinius  
 l. 15. c. 30. hujus inter Lauri genera meminit, in-  
 quies: Tinus, hanc sylvestrem Laurum aliqui  
 intelligunt, nonnulli sui generis arborem, cui  
 cærulea est bacca: & M. Cato lib. de re rust. 8.  
 Lauri sylvatici nomine intelligere videtur.

I. Laurus syl. Corni fœminæ folijs subhirsutis.  
 Tinus primus, Ang. Cl. hisp. & hist. Cam. Tab.  
 Laurus sylv. five Tinus, Gesn. hort. Cam.  
 Laurus tinus cærulea bacca, Adv. Lob. ic.  
 Tinus, laurus sylv. Cam. ep.  
 Laurus tinus Dalechampi, Lugd. (Lob.  
 Tini aliud genus Corni fœminæ proceritate,  
 Lentago, Cæsalp.

II. Laurus sylv. folijs venosis.  
 Tinus secundus Clus. hisp. hist. Lugd.  
 Tinus, Laurus sylv. Dod.  
 Tinus Lusitanica Clusij, Lob. Tab.  
 Thinnus, Cast. append.  
 Laurus tinus Lusitanica, Ger.

III. Laurus sylv. folio minore.  
 Laurus sylvatica, Ang.

Tinus five Laurus inodora & Italarum Lenta-  
 go, Bellon.  
 Tinus tertius, Clus. hisp. & hist. Lugd.  
 Laurus regia, Cast.  
 Tinus alter, Tab.  
 Laurus tinus, Ger.

*Lauri folio exotica.*

I. Laurifolia Magellanica cortice acri.  
 Cortex Winteranus, Clus. Lugd. Tab.  
 Lauro similis arbor, cortice piperis modo acri  
 in Pinguinum insula: 9. part. Ind. occid.  
 Cortices acerrimi: in 9. part. Ind. occid. addit,  
 Magellanica aromatica arbor, Clus. exot.

II. Laurifolia Americana, pomis capitis  
 magnitudine.

Cohyne in America Theveti, Lugd.  
 Maraka & Tamaraka fructus, Cl. noris in Garz.  
 Arbor fructu Struthiocæ medi ovum adæquante,  
 Lero par. 3. Ind. occid. c. 7. & 12. arbor Choyne.  
 Fructus instar Cucurbitæ, per quæ baculū figunt,  
 & Tamaraka instrumentū sit, Stad. in def. Brasil.

Ex fructu non eduli pocula conficiunt: Bra-  
 siliiani perforato, lapillis aut milio inditis, pro  
 crepitaculo utuntur, quod instrumentum Ma-  
 raka nominare, Lerijs cap. 15. refert.

III. Laurifolia Javanensis.  
 Mangestans folijs laurinis fructu exigui mali  
 aurei suavisissimi, Garzie & Clus. qui addit folia  
 mali formam magis referre.

Mangostans prunorum sylv. modo crescit: 4.  
 part. Ind. or. 6. sed figura, quæ tab. 15. habetur est  
 Ligustri Ægyptiaci.

IV. Laurifolia Guinenfis.  
 Arbor peregrina ex Guinea, Clus. exot. l. 1. c. 9.  
 Fructus instar mali magni ex flavo spadiceus,  
 nigro polline plenus.

V. Laurifolia Guinenfis altera.  
 Arbor peregrina Laurocerasi folio, an Bravas,  
 Clus. exot. l. 1. c. 12.

VI. Laurifolia Terenatensis.  
 Beretinus fructus, Clus. exot. l. 2. c. 17. Tab.  
 Beretinus arbor, Lugd.

L A U R E O L A.

**L** Aureola à similitudine cum Lauri folijs dicitur. quæ mas est & fœmina. & à Dioscoride l. 4. c. 148. & 149.  
 sub Chamædaphnæ & Daphnoide proponi à multis creditur. *Χαυροῦ ἄγρια* virgæ promittit singulari ramulo  
 constantes, cubitales, rectas, tenues, ac leves: & huic folia similia Laurus, at leviora multo & tenuiora. & viri-  
 diora: fructus verò rotundus rubens folijs annexus. *Δαφνοειδὲς* fruticulus est cubitalis, ramos multos habens à  
 medio sursum modo flexiles & foliosos: cortex verò circa virgæ viscosus valde: folia Laurus similia, at molliora,  
 validiora & fractu contumacia, mordentia & accendentia os & fauces: flores candidi: fructus verò nigri

*ubiematuruit: radix supervacua. Plinio l. 15. c. 30. est & Chamadaphne sylv. frutex: & l. 24. c. 15. Chamadaphne unico ramulo est, cubitali serè folio tenui, Lauri similitudine: semen rubens. At Daphnoideum Lauri genui fecit: sic enim l. 15. c. 30. Daphnoides frutex est ramosus, crassiore ac molliore quàm Laurus folio, cuius gustatu accenduntur os atque guttur: baccie nigro ruffis: & l. 23. c. 8. Daphnoides sylvestru Laurus est.*

I. Laureola semper virens flore viridi, quibusdam Laureola mas.

Thymelæa folijs viridibus, Mesuæo.

Laureola, Brunf. Gesn. hort. Dod.

Thymelæa, Trag.

an Chamædaphne, Matth. Lac. Lon. Cast. cui & Laureola minor.

Daphnoides, Dod. gal. Ang. Gesn. hort. Tab. cui & Daphnoides alterum genus.

Daphnoides sive Laureola, Adv. Lob. Lugd.

Daphnoides Dioscoridis, Cæs. cui & Mezereon, Arabum.

Baccis rubris dicit Matthioli: nigris in Silesia Camerarius.

II. Laureola folio deciduo flore purpureo: officinis Laureola femina.

Chamælea sive Mezereon, Trag.

Chamælea Germanica, Dod. ut: Cam. Thal.

Daphnoides, Fuch. Turn. Cam. ep. flore purpureo, Tab.

an Daphnoides, Matth.

## C H A M E L Æ A.

**X** *Amelæa, qua Latinis etiam Chamelæa, quasi humilis olea, à similitudine cum Olea, & Oleago. & Oleastella: Mauritani & hæc Thymelæa & præcedens Laureola, Mezereon dicitur. Dioscoridi l. 4. c. 172. ramos habet dodrantes, frutex est è cremiorum genere, folia habet olea similia ac tenuiora & densa & amara, qua gustum mordent & arteriam abradunt. At Plinio l. 15. c. 7. Chamelæa frutex furculosus, non altior palmo, folijs Oleastri baccisq. & l. 24. c. 15.*

I. Chamelæa tricoccus.

Thymelæa folijs magnis & tenuibus, Mesuæo.

Chamelæa latifolia vel alba, Serapioni.

Chamelæa, Matth. Dod. ut: Lac. Cord. in Diosc.

Bellon. Gesn. hort. & app. l. Lon. Clus. hisp. tri-

coccus, in hist. Lob. Cæs. Cast. Lug. qui figuram Matthioli & Dodonæi exhibet.

Thymelæa, Ang.

Mezereon Arabum, Ad. Lob. ico. tricoccus, Tab.

Chamelæa vera, Cam.

Flores pallidi, aut lutei: Hispanica candidior & brevior ipsa Gallica.

II. Chamelæa alpina folio infernè incano.

Chamelæa, Cneorò Galeni, Alypias Aëtij. Ang.

Chamelæa alpina incana, Ad. Lob. ico. Lugd.

Chamelæa incana Bononienfium, Lob.

Chamelæa altera, Clus. hisp. & hist.

an Chamelæa altera folio duro, Cæs.

## T H Y M E L Æ A.

**(Θ)** *Amelæa, qua & Latinis Thymelæa, quasi Thymelæa, ex Thymalo & olea mixta facie, quam aliqui Diosc. lib. 4. cap. 173. scribente, Chamelæam aut Cneoron vocant, ex quo Gnidium granum, quod ipsius semen est colligitur: hæc, ut idem, virgas edu speciosas, numerosas, tennes, bicubitales: folijs Chamelæa sed angustioribus & pinguioribus: floribus candidis, ac inter ipsos fructu ceu myrti parvo rotundo, &c. Plinio lib. 15. cap. 21. & in quo nascitur granum Gnidium, quod aliqui linum vocant: fruticem verò Thymelæam, alij Chamelæam: est similis oleastro, folijs angustioribus, gummosis si mordeantur, myrti magnitudine semine, colore & specie faris, ad medicinam tantum usum.*

I. Thy-

I. *Thymelæa* folijs lini.*Thymelæa* folijs parvis, Meluæ.*Chamelæa* tenuifolia & nigra, Serapioni.*Thymelæa*, Matth. Dod. ur: Lac. Bellon (cui & coccum gnidium) Lon. Clus. hisp. & hist. Lob. Cæf. Cast. Lugd. qui tres figuras apposuit.*Thymelæa*, Matth. ep. quoad folia, non fructum qui *Chamelæa* est.*Thymelæa* vera, Gesn. hort.*Thymelæa* grani Gnidij, Ad. Lob. ico.*Thymelæa* 1. & 2. Tab. nam Matthioli & Clusij figuram exhibet.an *Thymelæa* folijs lini, Cam.K *éup* (Cassiam Gaza vertit) Theophr. 6. hist. 2. esse, cuius duo genera proposuit, Guilandinus voluit, alterum *Chamelæam*, alterum *Thymelæam*.II. *Thymelæa* folijs acutis capitulo Succisæ, sive *Alypum* Monspeliensium.*Alypum* montis Ceti, sive herba terribilis Narbonensium, Adv. Lob.*Alypum* Penæ, Lugd. Tab.*Empetron* phacoides, Lugd.*Hippoglossum* Valentinum, Clus. hisp. & hist. Tabernæm.an *Alypum*, Matth. Lac. Cam. Lugd. & Alipia, Lon. quia Pena dicit apud Matthiolum picturam corruptam esse.III. *Thymelæa* folijs polygalæ glabris.*Sanamunda* viridis vel glabra, in Prodomo.*Thymelæa* species Myconi, Lugd.IV. *Thymelæa* folijs *Chamelæa* minoribus subhirsutis.*Sanamunda* prima, Clus. hisp. & hist. Rauvvolf. Lob. Cast. Tab.V. *Thymelæa* folijs *Kalilanuginosis* salis.*Empetron*, Ang.*Sanamunda* 2. Clus. hisp. & hist. Lob. Cast. Tab.*Cneoron*, Cæfalp.*Cneoron* nigrum Myconi, Lugd.*Sesamoides* minus Dalechamp. Lugd.*Phacoides* Oribasij quibusdam, Eid.VI. *Thymelæa* folijs candicantibus serici instar mollibus.*Tartonaire* Galloprovinciæ Massiliensium, Adv. Lob. ico.*Sesamoides* majus multorum Dalechampij, Lugd.*Sesamoides* majus Scaligeri, Tab.

Sunt qui cum sequenti eandem velint.

VII. *Thymelæa* tomentosa folijs Sedi minoris.*Sanamunda* 3. Clus. hisp. & hist. Cast.*Cneoron* Pantij.*Erica* Alexandrina, Lob. Tab.*Sanamunda* vocat Clusius, Granatenfes Mauritanos imitatus, quia his ad corpus purgandum frequenter utuntur: & quia *Thymelæa* facultatibus pollent, huc retulimus.

## C N E O R O N.

**C**neorum de multis plantis dici, non modo Plinius lib. 13. c. 21. testis est, qui *Thymelæam* *Cneoron* à quibusdam appellari scripsit: & lib. 21. c. 9. Cassiam ab Hygino vocari: & mox, Cneori duo genera sunt nigri atq; candidi, hoc & odoratum, ramosa ambo, florent post æquinoctium Autumni: quæ ex Theophr. transferantur. Sed recentiores alij ad *Lanreolam*, alij ad *Chamelæam* & *Thymelæam*: alij ad *Resmarinum*, alij ad alios referunt. Theophr. 6. hist. 2. *Cneoron* (Cassiam vertit Gaza) inquit genera duo, unum album, alterum nigrum: albo folium est curvatum, oblongum, figura oleæ quod immo simile: nigro, quale tamaricu, carnosum. Album supra terram minus se attollit, & parum quid olet: nigrum valde odoratum est: radix utriusq; in profundum descendit magna: rami multi, breves & lignosi, qui à terra, vel paulo supra dividuntur, leni admodum. &c. Et Guiland. *Cneorum* utrumq; *Chamelæam* & *Thymelæam* esse, ex Aretæ, Dioscoridi, Galeni, Acrij & Plinij traditione statuit.

I. *Thymelæa* affinis facie externa.*Cneoron*, Matthioli cap. de Cinam.*Cneoron* alterum Matthioli*Oleander* sylv. Avicen. Myconi } Lugd.*Cneoron* Matthioli, Clus. pan. & hist. Cam.Cassia Matthioli, *Chamelæa* species, Tab.*Thymelæa* minor, Cord. hist.II. *Cneoron* album folio oleæ argenteo molli.*Cneoron* album Dalechampij, Lugd.*Dorycnium*, Imperati.*Dorychnium* ex Sicilia, Cæf.*Dorycnium* verum Plateau, Clus. hist. ap. r.*Dorycnium* quorundam seu potius *Convolvulus* rectus Creticus, Ponæ Ital.III. *Cneoro* albo affinis.*Dorycnium* forte Dioscoridis, Ponæ Ital.

## N E R I O N.

**N**erion *ἡ ποδιδένδρον* Græci vocant: alij *ποδιδένδρον*, à flore rosa simili & folijs laurinis: quare Apuleio, Rosa laurea. Rhododendros, inquit Plinius l. 24. c. 11. quia ne nomen quidem apud nos Latinum inveniit, Rhododaphnen vocant, aut Nerium. Dioscor. l. 4. c. 82. frutex est folijs amygdalinis longioribus & crassioribus, flore roseo & siliqua fructui amygdalino proxima, quæ dehiscens lanosa natura, acanthij pappos repræsentante plena reperitur, &c. Plinio l. 16. c. 20. Nerion sempiterna fronde, rosa similitudine, caulibus fruticosum.

I. Nerion floribus rubescentibus.  
Nerion, Trag. Cord. in Diosc. Ad. Lob. Tab. flor. rubro, Eyst.  
Nerium, Matth. Fuch. Dod. gal. Turn. (qui 1. & 2. habet) Gesn. hort. Lac. Lon. Cast. Lugd.  
Oleander flore rubro, Ang.  
Oleander, Dese circa Tripolim, Rauvvolf.  
Rhododendron, Bellon. Gesn. hor. Dod.  
Oleander, Laurus rosea, Lob. ico.  
Rhododaphne, Gesn. hort. Cæf.  
Nerion sive Rhododaphne, Cam.

In nonnullis Cretæ Insulis ad ædicularum

trabes conficiendas aptum est, cum alibi parvum sit, Bellon.

II. Nerion floribus albis: & Lob. Lug. Tab. Cam. Nerion candidis floribus in montis Idæ convallibus, Bellon.

Oleander flore albo, Ang.  
Nerium sive Rhododendron flore albo, Eyst.

III. Nerio similis arbor: & Tab. Nerij facie arbor, Ad. Lob. Lugd. apud quem titulus transpositus est.

IV. Fructus Nerij siliquæ figura.  
Kaye Baka, Clus. exot. l. 3. c. 19.



## S E C T I O S E C U N D A.

CISTUS; CHAMÆCISTUS; LEDUM; LEDUM  
A L P I N U M.

## C I S T U S.

**K**ryos, *κρίος* ἡ κρίνος, Latinis similiter Cistus & Cistibus dicitur, fortasse quod ejus species aliquæ nigræ, id est, Hedera, folijs rotundius sit.

Genera duo: Cistus non ladanifer, & Cistus ladanifer, qui Ledum dicitur. Cistus Dioscoridi lib. 1. cap. 126. frutex est ramosus, foliosus, non altus: folia habens rotunda, nigra, hirsuta: flores masculo, veluti mali punice, sæmina verò albi, Plinius l. 24. c. 10. sic ait, Græci vicino hedera vocabulo, Cistibon appellanti fruticem majorem, Thymo, folijs ocimi. Duo ejus genera, flos masculo rosaceus, sæmina albus. Verum Plinius Cistibum cum Cisso, id est, Hedera, confundit, Theophrasti 6. hist. l. 1. lectione immendata, ubi nigræ pro nigra habetur, deceptus: & Ga-  
za, Hedera pro Cisso reddidit.

Cistus mas.

I. Cistus mas folio rotundo hirsutissimo.  
Cistus mas, Matth. ep. Ang. Tur. Lac. Lon.  
Cistus, Cæf. mas 4. Clus. hisp. & hist. Lugd.  
Cistus mas folio rotundiore Matthioli, Lugd.

II. Cistus mas folio oblongo incano.  
Cistus mas, Gesn. hor. Ad. Lob. Cam.  
Cistus, Dod. mas 1. Clus. hisp. & hist. Lugd.  
Cisti alterum genus, Cæf.  
Cistus mas latifolius, Tab.

Flos colore rubro est, eod; nunc saturatiore, nunc dilutiore.

III. Cistus mas angustifolius,

Cistus mas 2. Clus. hisp. & hist. Lugd.  
Cistus mas angustifolius 2. Clusij, Lob.  
Cistus mas angustifolius, Tab.

IV. Cistus mas folio breviori.  
Cistus mas 3. Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd.

V. Cistus mas folijs Chamædrys.  
Cistus mas 4. Clus. hisp. & hist. Lob. ico. Lugd.  
Cistus mas supinus sinuatis & fimbriatis folijs,  
Lobel.

Cistus mas tertius, Tab.

Cistus sæmina.

I. Cistus sæmina folio Salviæ.  
Cistus, Cord. in Diosc. Cæf.

Cistus

Cistus femina, Matth. Dod. ut: Ang. Gef. hort. Lacun. Turn. I. onic. Adv. Lob. Clus. hisp. & hist. Castor. Camer. & Lugdun. qui & Matthioli & Clusij figuram exhibet, ut & Tabernamontanus.

Cistus flore albo, Rauvvolfe.

Variat: est enim clarius & rectis virgis; est & supinus humi sparsus: in utroque flos candidus, quandoque luteus ochrae colore.

II. Cistus folio plantaginice.

Tuberaria major Myconi, Lugd.

Majorem & minorem Lugdunensis pingit.

III. Cistus femina portulacae marinae folio, latiore obruso.

Cistus folio halimi primus, Clus. hisp. & hist. Lob. Tab.

Cistus femina folio portulacae marinae, sive Crithmi, Lob.

IV. Cistus femina portulacae marinae folio angustiore mucronato.

Cistus folio halimi secundus, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd. Tab.

V. Cistus folio spicae.

Cistus folio lavendulae, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugdun.

Cistus, Tabern.

VI. Cistus folio Sampsuchi incano.

Cistus folio Sampsuci, Clus. hisp. & hist. Lob. Lugdun.

VII. Cistus folio Stechadis citrinae.

VIII. Cistus folio Majoranae.

Cistus folio majoranae defluxis floribus, Adv. Lob. icon.

Helianthes species Penae, Lugd.

IX. Cistus folio Thymi: & Clus. hisp. & hist. Lob. Lugd. Tab.

X. Cistus folio Salicis.

Cistus annuus primus, Clus. hisp. & hist. Lugd. an Hydrophyllon herba Athenaei, Clus.

Cistus annuus folio Salicis, Lob.

Cistus annuus, Tab.

Variat: primo folijs amplioribus, floribus majoribus: secundo folijs angustioribus, floribus minoribus.

XI. Cistus flore pallido punicante macula insignito.

Cistus annuus secundus, Clus. hisp. & hist. Lug.

Cistus annuus guttato flore, Penae.

Helianthemum flore maculoso, Colum.

Variat: est enim flore maculoso, macula ex nigro rufescente, sive puniceo: vel non maculoso.

XII. Cistus Ledi folio.

Cistus annuus folio Ledi, Lob. Tab.

Cistus annuus alter Lobelij, Lugd.

Alyssum trigonum, Eidem.

XIII. Cisti folio arbor exotica.

Arbor exotica Cisti folio, Ad. Lob. icon.

Cisti vel Ledi arbor peregrina Penae, Lugd.

Arbor cisti folio, Lob.

Cisti folio exotica arbor, Tab.

Cistus exotica, Ger.

## HYPOCISTIS.

Cum e Cisti radicibus, veluti germen quoddam expullulet, id quod Hypocisti dicitur, de copanch. Cisti, inquit Diosc. l. c. 127. radicibus adnascitur, quod eumque dicitur, nonnullis phedon, a nuxia, & mali punicae, rino simile est. quodam rufa: altera herbacea, tertia candida cernitur.

Hypocistis sub Cisto.

Hypocistis, Matth. Dod. gal. Ang. Cord. in Diosc.

Lob. Cast. Cael. Clus. hisp. & hist. Ad. Lob. Lugd.

Tab. Gerard.

Limodori genus, quod Hypocistis, Dod.

Succus qui extrahitur, etiam Hypocistis &

officinis Hypocistides, dicitur.

Sub Cisto Hispanice, rubram: sub Cisto folio halimi, luteam: & sub Ledo quem octavo loco recensuimus, varij coloris, pallecente, lineis purpurascens & nonnihil virecentibus distincto Clusius notavit: & hanc posterioriorem *acipodifera* sive Cynomori genus nuncupat.

## CHAMÆCISTUS.

I. Chamæcistus vulgaris flore luteo.

Hyslopus campestris, Trag.

Panax Chironium, sive flos solis, Matth. Cast. Lugdun.

Panax Chironium quorundam, Ang.

Gratia Dei, Dod. gal. Gefn. hort. cui & Hyslopides.

Helianthemum, Cord. hist. Lob. Thal. flore luteo, Eyster.

Consolida aurea Chirurgis, Cordi schol.

Nnn

Hyslo-

*Hysopus montanus* sive *sylv.* Lon.  
*Flos solis*, Dod. (cui & *Cisti* & *Ledi* quædam species) *Cæf.* Cam.  
*Helianthemum vulg.* dictum, *Clus. hisp.*  
*Helianthemum* *Plinij*, *Clus. pan.*  
*Chamæcistus primus*, *Clus. hist.* qui ad *Cisti* formæ tertiam classẽ reducitur.  
*Helianthemum Germanicum* secundum, *Tab.*  
*Helianthemum* sive *flos solis*, *Lugd.*  
*Chironia*, *Cæf.*

Hoc quibusdam *Panax Chironium* *Dioscor.* creditur. *Nasum xaphisum* folia habet amaraco similia, flores aureos, radicem tenuem, neq; altam, gustu acrem: sic *Dioscorid.* lib. 3. cap. 37. Ab alijs *Helianthe* *Plinij* lib. 24. cap. 37. censetur: *Helianthen* scribit vocari in *Themiscyra* regione, & *Cilicia* montibus maritimis folio *myrti*, sed quid in hac brevitate pronunciarer licet?

II. *Chamæcistus vulgaris* flore albo majore. *Helianthemum* albis floribus, *Lob. ico.* *Eyl.*  
*Chironia* flore candido, *Cæf.*  
*Helenium minus* *Dioscoridis*, *Lugd.*

A priore differt floris colore albo, ejusq; magnitudine, *Ladani* specie.

III. *Chamæcistus Friscus* folijs *Nardi* *Celticæ*.  
*Hirculus Friscus* *Dortmanni*, qui *Chamæcisti* genus. *Clus. cur. post.*

Hunc à *Dortmanno* quoq; accepimus.

IV. *Chamæcistus* folijs minoribus & incanis.

*Flos solis*, *Lob.* *Dod.* utriq; quoad iconem.  
*Cistus humilis primus*, *Clus. hisp.*  
*Helianthos* sive *Flos solis*, *Ad.*  
*Cistus parvus* *Clusij*, *Lob.*  
*Chironiæ* aliud genus, *Cæf.*  
*Chamæcistus quintus*, *Clus. hist. ico.* at 4. defer.  
*Helianthemum* secundum sativum, *Tab.*  
*Helianthemum Anglicum* luteum, *Ger.*

V. *Chamæcistus* folijs *Thymi* incanis.

*Panax chironium minus*, *Cam. ep.*  
*Chrysanthemus*, *Erica minima*, *Ad.*  
*Cistus humilis angustifolius*, } *Lob.*  
*Erica chrysanthemos minor*, }  
*Cistus humilis secundus*, *Clus. hisp. Lob. ico.*  
*Chamæcistus quintus*, *Clus. hist. desc.* at quart. iconẽ.  
*Helianthemum peregrinũ angustifolium*, *Tabern. Ger.*

Huc referatur

*Helianthemum Germanicum* 3. *Tab.*  
*Helianthemum album* *Germanicum*, *Ger.*  
 VI. *Chamæcistus quadrifolia*.  
*Helianthemum Sabaudicum*, *Tab. Ger.*  
 VII. *Chamæcistus* folijs *myrti* minoris incanis.

*Chamæcistus secundus*, *Clus. pan. 3. Eid. hist.*  
*Cistus humilis latifolius*, *Tab. Ger.*

VIII. *Chamæcistus angustifolia*.  
*Chamæcistus primus angustifolius*, *Clus. pan.*  
*Chamæcistus sextus*, *Eid. hist.*  
*Cistus humilis angustifolia*, *Tab. Ger.*

IX. *Chamæcistus serpillifolia* floribus canis.

an *Rosa alpina* altera folijs minimis, *Ges. hor.*  
*Alpina* altera, *Ad.*

*Anonymus altera*, *Clus. pan.*  
*Chamæcistus septimus*, *Clus. hist.*  
 X. *Chamæcistus hirsuta*.

*Chamæcistus quartus*, *Clus. pan. 8. Eid. hist.*  
*Cistus humilis Austriaca*, *Tab. Ger.*

XI. *Chamæcistus repens serpillifolia lutea*.  
*Chamæcistus tertius*, *Clus. pan. 2. in hist.*  
*Cistus humilis serpillifolia*, *Tab. Ger.*

XII. *Chamæstus ericæ folio luteus*.  
*Cori similimus frutex* in maritimis, *Cæf.*  
*Erica chrysanthemos*, *Lugd.*

*Coris* *Dioscoridis* *Guilandino* dicebatur.  
 Hujus duæ species altera brevioribus folijs & humilior, altera quadruplo longioribus & elatior.

## CISTUS LEDUM

**C**isti alterum genus, inquit *Dioscorides* l. 1. c. 128. à nonnullis *ladani* appellatum, frutex eodem quo *Cistus* modo nascens, sed folijs longioribus ac nigrioribus, quæ pinguis qui dæpiam verno tempore contrahunt, ex quo *ladanum* conficitur. *Plinio* l. 12. c. 17. sunt qui herbam in *Cypro* ex qua *Ladanum* fiat, *Ledon* appellent: etiam illi *Ledanum* vocant, huic pingue insidere. &c. *Ladanum* esse *osyris hircorum* barbi genibus, villosis inhaerens, &c. *Ladani* colligenda rationem *Dioscorides* & *Plinio* l. 6. referunt: quomodo verò in *Creta* colligatur, *Belonius* l. 1. obsert. c. 7. & ex eo *Clusius* descripsit.



I. *Cistus ladanifera* Monspelienſium.

*Ledum*, Matth. ep. Lac. Caſt. Lugd. Tab.

*Ladanum*, Matth. Ang. Caſ. Tab.

*Cisti ſpecies ſecunda*, Dod. gal.

*Cistus ladanifera*, Turn.

*Lada & Ladon cisto ſimilis frutex*, Cord. in Dioſc. & hiſt.

*Ledon alterum cisti genus*, Geſn. hort.

*Laudanum*, Loſſ.

*Ladanum latifolium*, Rauvvoſſ.

*Cistus ledon*, latifolium, Adv. deſc.

*Ledum latiore folio Italicum*, Cam.

*Cistus ledum Matthioli*, Ger.

II. *Cistus ladanifera* Hiſpanica incana.

*Cistus ledon*, Dod.

*Cistus ledon primum*, Cluſ. hiſp. Lob. Lugdun.

Gerard.

*Ledi ſpecies Bauhini*, Lugd.

*Ledon Cluſij*, Tab.

*Cistus ledon primum anguſtiſolium*, Cluſ. hiſt.

III. *Cistus ledon folijs laurinis*.

*Cisti ledi 2. altera ſpecies*, Cluſ. hiſp. & hiſtor.

Lobel.

*Ladanum alterum*, Caſ.

an *Cistus maritimus*, Lugd.

IV. *Cistus ledon folijs populi nigrae major*.

*Ledon 2. Cluſ. hiſp. Lugd. Tab.*

*Ledon latifolium 2. majus*, Cluſ. hiſt.

*Cistus ledon 2. Cluſij*, Lob. Ger.

V. *Cistus ledon folijs populi nigrae minor*.

*Cisti ledi 2. altera ſpecies*, Cluſ. hiſp. Lugd.

*Ledon 2. latifolium minus*, Cluſ. hiſt.

*Cistus ledon populnea fronde alter*, Lob.

*Cistus ledon 3. populnea fronde*, Lugd.

*Cistus ledon populnea fronde*, Tab. Ger.

VI. *Cistus ledon Cretenſe*.

an *Cistus mas*, Matthioli. in magnis figur. & Lugdun.

*Cistus 2. qua Ladanum in Creta colligitur*, Bellon.

*Ledon 3. Cluſ. hiſp. Lob. Lugd.*

*Ledon 3. Cyprium*, Cluſ. hiſt.

Plantæ ex qua *Ladanum Cretenſes* colligunt

folijs & floribus cisti fœminæ, Alp.

*Ledon à Græco diverſum & longè majus in monte Olympo*, Bellonius notavit.

VII. *Cistus ledon folio myrti*.

*Cistus ledon latifolium*, Adv. ico.

*Cistus ledon Ruſci aut Myrti folium*, Lobel. icon.

*Cistus ledon alied latifolium Penæ*, Lugd.

*Cistus ledon myrtifolium*, Tab. Ger.

VIII. *Cistus ledon hirsutum*.

*Ledon 4. Cluſ. hiſp. & hiſt. Lob. Lugd. Tabern.*

Gerard.

*Ledon alterum anguſtiore folio*, Cam.

IX. *Cistus ledon folijs oleæ ſed anguſtiore*.

*Ledon 5. Cluſ. hiſp. & hiſt.*

*Cistus ledon*, Adv.

*Ledon Narbonenſe*, Lob.

*Cistus ledon Narbonenſe*, Tab.

*Cistus ledon Lobelij*, Ger.

*Cistus flore albo*, Eyſt.

Huic ſimilem ſub

*Cisto adulterino pingunt*, Tab. & Ger.

X. *Cistus ledon anguſtiſ folijs*.

*Ledon 6. Cluſ. hiſp. & hiſtor. Lob. (qui in iconibus hunc cum priore junxit)* Lugd.

*Ledum quintum*, Cluſij, Lugd. Ger.

*Ledon Cluſij nonum*, Tab.

XI. *Cistus ledon folijs roſiſmarini hiſpidis*.

*Ledon 7. Cluſ. hiſp. & hiſt. Lob. Lugd. Tabern.*

Gerard.

XII. *Cistus ledon folijs roſiſmarini ſubtus incanis*.

*Ledon octavum*, Cluſ. hiſp. & hiſt. Lob. Lugd.

*Ladani ſpecies folijs Roſmarini*, Rauvvoſſ.

*Ledum Cluſij quintum*, Tab.

*Cistus ledon ſextum*, Cluſij, Ger.

XIII. *Cistus ledon folijs roſiſmarini ſed non incanis*.

*Ledon nonum*, Cluſ. hiſp. & hiſt. Lob. Lugd.

*Ledum Cluſij ſextum*, Tab.

XIV. *Cistus ledon folijs Thymi*.

*Ledon decimum*, Cluſ. hiſp. & hiſt. Lob. Lugd.

Gerard.

*Ledum Cluſij octavum*, Tab.

XV. *Cistus ledon folijs roſiſmarini ferrugineis*.

*Roſmarinum ſylv* Matth. Caſt.

*Chamaepeuce*, Cord. in Dioſcor. & hiſtor. deſc. Lugdun.

*Ledum folijs roſmarini alterum*, Lob.

*Ledum Sileſiacum*, C'oſ. pan. & hiſt. Tab. Ger.

*Ledum roſiſmarini ſi. lio*, Tab. Ger.

*R. ſmarinum ſylv. ſive Bohemicum* Matthioli, Lugdun.

Rosmarinus sylv. Dod. belg.

XVI. Cistus ledon folijs salicis angustifoliae.

Chamaerhododendros montana Allobrogum

lenticifolia, Adv. Lob. ico.

Rosmarinum sylv. minus, Cam. ep.

Rosmarinum sylv. *minus* } Clus. pan. & hist.

Cistus Sileiacus }  
Chamaerhododendros alpina angustifolia,  
Tabernæm.

Chamaerhododendros montana, Ger.

XVII. Myrtocistus Pennæi, Clus. pan. & hist. Gerard.

Myrtocistus Clusii, Tab.

*Ledum alpinum.*

I. *Ledum alpinum hirsutum.*

Alpigenæ Chamaerhododendri varietas, Lob.

Balsamum alpinum Gesneri, Lob. ico. Tabern. Camer.

*Ledum alpinum*, Clus. pan. & hist. Tab.

Cistus ledon alpinum, Ger.

II. *Ledum alpinum* folijs ferrea rubigine nigricantibus.

Frutex in alpidibus roseo flore, Gesn. ad Cordum cap. de Chamaererio.

Rosa alpina, Gesn. hort. & Fractio, potius *Ledum alpinum*.

*Nereum alpinum*, Gesn. de lunar.

Chamaerhododendros alpigena odora, Ad. Lob.

Ledi alpini genus alterum, Clus. pan. & hist.

Rhododendron alpina quibusdam, Cæs.

Evonymus Theophrasti, hist. 18. Lugd.

Chamaerhododendros alpina latifolia, Tab.

Chamaerhododendros alpigena, Ger.

Hujus ramis tubercula gallarum instar adnascuntur: & floris colore variat, communiter dilute rubentis: at in Pyrenæis, flore tantum albo reperitur.



## SECTIO TERTIA.

MYRTUS; RUSCUS; VITIS ET RADIX IDÆA; BUXUS;  
OLEA; SALIX; AGNUS CASTUS; SPIRÆA;

Ligustrum & Phillyrea.

## M Y R T U S.

**M**YRTUS & MURTUS Latinis: Græci *μύρτις* & *μύρτιν* nominatur, à Myrsine Atheniensis puella, pulchritudine & robore insigni, amica Palladi, quam juvenis ab ea cursu & palestra superatum interemis, invidia ductus, quod elegancia, ceterisq; natura dotibus, reliquis virginibus præsaret: arbuscula in demortua locum successit, semper Minerva, ut olea chara. Græcum ei nomen remanet, ut Plinius lib. 15. cap. 29. scribit, quo peregrinum esse appareat. At quibusdam sic dicta, propter amulam Myrtham quandam odori gratiam, qua in ejus bacca recentioribus, observatur. Et Theophr. Myrti pluribus in loca meminit, nulla tamen descriptione addita.

Genera Myrti multa sunt: est sativa & sylvestris: sativa aut nigra aut candida: sylvestris alia levius alia spinosa: illa, que sativa opponitur, interdum vel nigra, vel candida. Dioscoridi haud dubie cognita, ut cui lib. 1. cap. 155. *μύρτιν* sativa nigra, medicinae utilis, & candida: qua & Plinius lib. 23. cap. 9. habet, Theophrastus non videtur differentiam agnovisse, siquidem lib. 6. caus. 27. scribat, Myrtum Aegypti odoratam esse, quanquam cetera inodorata sint: verum hoc propter loca sepe diversa evenire. Plinio lib. 17. cu. alia patricia alia blebeia: addens: Catoni tria genera, nigra, candida, conjugalis: nunc & alia distinctio, sativa aut sylvestris & in utraque latifolia: in sylvestri propria oxymyr sine: sativarum genera copiarum faciunt. Tarentinam folio minore, nostratem paulo, exoticam densifolia, senio foliorum versibus: ramosa utraque alia: conjugalem existimo nunc nostratem dici: hac ille. Bacca *μύρτις* Græci, Latine Myrta & Murta, officinis Myrtilli dicuntur.

I. Myrtus communis Italica.

Myrtus, Matth. Ang. Cord. in Diosc. Gesn. hort.

append. Lon. Cæs. Lugd.

an Myrtus alba, Adv.

Myrtus communis Italica, Cam.

Alia est nigra, colore tantum fructus differens.

II. Myrtus latifolia Romana.

Myrtus nostras cum conjugali eadem, Plinio.

Myrtus

Myrtus Romana, Matth.  
 Myrtus major, Dod. gal. Adv.  
 Myrtus altera, Dod.  
 Myrtus fativa, Cast.  
 Myrtus laurea maxima, Lob.  
 Myrtus latifolia, Bellon. Clus. hisp. & hist.  
 an Myrtus exotica Plinij, Cæs.

Hanc & sterilem & fructiferâ Bellonius notat.

III. Myrtus latifolia Bœtica 1. vel folijs laurinis.

Myrtus Bœtica latifolia domestica 2. Clus. hisp. & hist.

Myrtus Bœtica latifolia domestica, sive laurea secunda, Lob.

Variat: hæc enim folijs est minoribus & paulo denfioribus: alia majoribus & paulo tenuioribus.

IV. Myrtus latifolia Bœtica 2. vel folijs latis confertim nascentibus.

Myrtus Bœtica latif. exotica, Clus. hisp. & hist.

V. Myrtus latifolia Belgica.

Myrti classis altera sive latifolia triplex, & Myrtus media, Clus. hist.

Varietates hujus sex Lobelius proponit.

VI. Myrtus angustifolia Bœtica.

Myrtus exotica, Matth. Cast. Lugd.

Myrtus tertia, Dod.

Myrtus Bœtica angustifolia exotica, Clus. hisp. & hist.

Myrtus exotica Plinij pluribus foliorum versibus, Lob.

an Myrt. baccis magnis cinereo cæruleis, Rau-

VII. Myrtus sylvestris folijs acutissimis.

Myrtus sylv. Matth.

Myrti majoris quinta species, Lob.

Myrtus Bœtica sylv. Clus. hisp. & hist.

Myrtus latifolia, Eyst.

sub Myrti ramulo cum flore ac semine pingitur apud Dodonæum.

VIII. Myrtus folijs minimis & mucronatis.

Myrtus albis baccis in Asia, Bellon.

Myrtus domestica fructu albo, Clus. hisp. & hist.

Myrtus prior, Dod. ico.

Myrtus nona angustifolia, Lob.

Myrtus Hispanica angustifolij, Cæs.

Myrtus minima angustifolia, Lugd.

Hujus & altera species, folio per omnia tene-riore, ex flore & angustiore.

IX. Myrtus minor vulgaris.

Myrtus Tarentina (à Tarento Apulæ urbe)

Matth. Cast. Lugd. Cam. Clus. hist. Eyst.

Myrtus minor, Dod. gal. Adv.

Myrtus minor & Tarentina, Clus. hisp.

Myrtus minor vulgaris, Lobel. qui differentias quatuor facit.

Myrtus, Tab.

Myrtidanum <sup>nupridam</sup> Dioscoridi l. 1. c. 116. est quod Myrto adnascitur, in æquabile, verrucosum & concolor: & perinde quasi manus Myrti caudicem amplectitur. Sed Plinio l. 14. c. 16. & l. 23. c. ult. Myrtidanum est vinum, ex sylvestris

Myrti baccis factum.

Myrti coccus.

Myrti excrementum sive granum kermesinum, ejusdem ferè cum Cocco baphica naturæ, Myrti minoribus ramis adnascitur, unico animali vi-

vo vesiculæ incluso, Bellon.

X. Pseudomyrtus, frutex myrto admodum similis Bellon. quid?

XI. Myrtus Indica.

Avacari, Garz. Frag. Cast.

In India orientali, in montibus Malavar.

Myrto similes exotica.

I. Myrto similis Indica fructu racemoso.

Coca, Ciecæ, Monard. Lugd. Clus. in Garz.

Coca herba, Benzoni part. 6. Ind. occid. l. 3. c. 10. & part. 9. l. 3. c. 20. & l. 4. c. 22. ubi habetur. Indis hujus folia pro pecunia esse.

Coca occidentalis, Fragoso.

Arbor pumila folijs Myrti, vel ut alij Rhois coriariorum, cujus in tota Peru usus est, folio ore detento, famem & sitim aliquandiu inter peregrinandum levantes.

II. Arbor tristis myrto similis.

Arbor tristis, Garz. Acoftæ, Frag. Clus. ad Garz.

Lugdun. (qui & Acoftæ & Clusij figuram licet diversimodè exhiber) Tab.

Arbor tristis, in Malacca Singady alijs parisiarico pul, quart: Turcis. gul: Linscot. part. 4. Ind. orient. 15.

Arbor tristis de Dia, part. 8. Ind. orient.

Arbor folijs Myrti Clusio: pruni alijs: cujus flores singulis modis renascuntur, qui albi, pediculo luteo aut rubeo firmati, quo Indi Croci loco utuntur, & ex floribus aquam extillant, quam Aquam de Mogli appellant.

De arbore tristis Garzias & Fragosus agentes, cum ejus flores gratissimi odoris sint, duorum adhuc florum meminere, & Linscottus peculiare genus exhibet.

I. Mogori priores dicti, mali aureæ floribus odoratiores, quarum stillatitius liquor eundem apud istos usum obtinuit, quem apud Hispanos aqua florum mali aureæ.

II. Champe dicuntur alij flores, quorum etiam magnus apud illos usus est, odore graviore, quam Liliū album, Garz. Frag.

III. Fulle, floscolorum genus apud Indos ex arbore quadam toto anno durans, suavissimi odoris, L. Infcot. 4. part. Ind. or. 10.

IV. Flos Indicus arboreus liliorum speciei. Floribundio, ex arbore quæ solum flores, fructus nequaquam gignit, Joseph. Acoftæ lib. 4. cap. 27.

## R U S C U S.

**R**uscus Dioscoridi l. 4. c. 146. *μυρτὸν ἄγλα*, myrtus sylvestris dicitur: alij *ὀσπύδον*, acuta myrtus & Myrtacantha. Plinius l. 23. c. 9. inquit, Castor Oxymyrinen myrti folijs acutis, ex qua fiunt rursuscope, Ruscum vocavit. Theophrastus h. h. 17. *μυρτομυρτίνον*. Huius fructum Arabes Cubebæ vocant, existimantes Carpesium apud Galenum 7. simpl. & 1. de Antidot. esse, quia nihil de Carpesio apud Dioscoridem, ut nec de Rusco apud Galenum inveniantur: sed revera Rusci fructus a Cubebæ differt, ut testis Leoniscenus notavit.

Ruscus, Trag. Matth. Cord. in Diosc. Gesn. Ruscum, Dod. ut. h. t. Bellon. Lac. Adv. Lob. Cæs. Lugd. Caltor. C. m. Tab. Eyf. Ger. sive Bruscus. Ruscus verus, Lon.

Ruscum, Dod. ut. Centromyrini Theoph. & Oxymyrine, Ang. Myrtus sylv. Turn. Myrtacantha, murina spina, Lob. ic. o.

VITIS IDÆA SIVE MYRTILLUS,  
& Idæa Radix.

**A** *μυρτὸν ἄγλα* Idæa, sive Vitis ea parte Idæ. quam vocant Phalacras, nascitur: est fruticosa, virgo parvulus & ramulus cubitalibus pene exporrigitur, quibus acini ad latera adherent, nigri, saba magnitudine, dulces, vinaceorum instar aliquid continentes: solum rotundum, individuum, parvum. Idem pene Plinius l. 14. c. 3. Myrtilli autem dicuntur à forma baccarum, quæ Myrti bacculi similes sunt.

I. Vitis Idæa folijs oblongis crenatis, fructu nigricante. Myrtillus, Matth. Lon. Cast. Vaccinia nigra, Dod. ut: Adv. Lob. Ger. Radix Idæa fructu nigro, Ang. Vitis Idæa nigris acinis, Gesn. Fraet. Myrtillus Germanica, Lugd. Vitis Idæa vulgaris baccis nigris, Clus. pan. & hist. Theophrasti, Eid. hist. Vitis Idæa nigra, Cam. Vitis Idæa 1. Tabern. & Vitis Idæa 2. major, Eid. Bagolæ 1. genus, Cæs. Fructus exigui, Gallis Bleuete: part. 2. Amer.

II. Vitis Idæa folijs oblongis albicantibus. Myrtillus grandis, Trag. Vitis Idæa nigra major, Thal. Vitis Idæa 2. Clus. pan. & hist. Vitis Idæa 3. Tab. Vaccinia Patnonica, Ger.

III. Vitis Idæa folijs oblongis acuminatis baccis rubris insipidis. Vitis Idæa rubra Bavaria, Cam.

IV. Vitis Idæa folijs subrotundis non crenatis baccis rubris. Myrtillus exiguus, Trag. Vaccinia rubra, Dod. gal. Adv. Lob. Radix Idæa fructu rubro, Ang. Vitis Idæa species altera acinis rubris, Gesn. Vitis Idæa rubra sive Vaccinia rubra, Dod. Rhus Plinij minor, Æmilij, Thal. Idæa vitis, Lugd. Vitis Idæa rubra, nonnullis Rhus minor Plinij, Cam. ep. Vitis Idæa buxæ folijs, Clus. hist. Folijs est buxi interdum levissimè ceu serratis marginibus.

V. Vitis Idæa folijs subrotundis exalbidis. Vitis Idæa altera, Clus. pan. & hist. Vitis Idæa Gesneri major, Cam.

VI. Vitis Idæa folijs carnosa & veluti punctatis, sive Idæa radix Dioscoridi. Uva urti Galeni, Clus. hisp. & hist. Lob. Tab. Vaccinia urti, Ger.

Diosc. l. 4. c. 44. *ἰδία πίσα*, oxymyrine (id est Rusco) similia habet: juxta ipsa verò capreoli

capreoli exigui sunt, ex quibus etiam flos erumpit: radix præclare adstringit.

*Ἀκινάριον* Galeno 6. de comp. med. *ἡνίκά τὸ πικρὸν* 4. in Ponto nascitur planta humilis & fruticosa, folio Memecyli (sive Arbuti) fructum ferens rubrum, rotundum gustu austerum.

Hanc ex Hispania folijs longioribus quidem accepi, apud nos tamen ad montem Crenza-censem provenit.

VII. Vitis Idæa palustris.

Vaccinia palustris, Dod. ut: Ad Lob.

Oxycoccum, Cord. hist. Cl. pan. Cam. Th. Eyst.

Acinaria palustris, Gef. hor. in Rosa alpina.

Serpillum acinarium, Gef. col.

Erica sexta bacifera, Lugd.

Vitis Idæa tertia in palustribus, Clus. hist.

An Samolus Plinij l. 24. c. 31. sit, Dodon. edit. gal. dubitat, Samolum, inquit Plinius, herbam nominavere, nascentem in humidis: nullas alias notas addit.

VIII. Frutilla in Chile.

Ceraforum ferè sapore, fructus est non arboris sed plantæ, coloris mori non satis maturi: par. 8. Ind. Occid.

## B U X U S.

**B**UXUS & Buxum, Græci *βύξ*, *ἡ δὲ πικρὴ τῆς βύξ*, à densitate ligni dicitur, Theop. 3. hist. 15. Buxum, magnitudine est haud procerum, folium ei Myrto simile: locis frigidis & asperis nascitur.

Genera tria Pl. l. 1. c. 16. Gallicum, quod in metis emittitur, amplitudineq; prociore, Oleastrum in omni usu damnatū, gravem præfert odorem. Tertium genus nostrates vocant sylvestre, ut credo mitigatū satum: diffusum & densitate parietum virens semper ac consile. Sic apud nos quedam frutex tantum est, quæ in arborem magnam assurgit: & ex ejus radice ob varias maculas, & interstos linearum discursus, cocclearia, cultellorum manubria, & imaguncula in monte Jura ad S. Claudium conficiuntur: Sunt qui florere negent, sed male.

I. Buxus arborecens.

Buxus, Brunf. Matth. Dod. ut: Fuch. Bellon. Gef. hort. Tur. Lon. Ad Lob. Cas. Cast. Lugd. Cam. Tab. Eyst.

Buxus vulgaris, Trag.

II. Buxus folijs rotundioribus.

Chamæpyxos, Trag. Tabet.

Buxus humilis, Dod.

Hoc ad areolas hortorum muniendas frequenter utuntur.

III. Chamæbuxus flore Colutæ.

Fruticulus exiguus folijs myrtinis, floribus papilionaceis ferè, diversi coloris, Cord. obs. syl. Rhus myrtifolius Plinij Gesneri, Cam.

Chamæbuxus, Gef. col.

Anonymos flore Colutæ, Clus. pan. & hist.

Anonymos Pervincæ folio, Cam.

Pseudochamæbuxus, Eyst.

an Myrtus tenuifolia, Thal.

Variat floribus colore & odore: colore, quia flavescunt, vel ex purpura rubescunt: odore, quia in odori majori ex parte, nonnulli odori sunt.

## O L I V A.

**O**lea, Græci *ἐλαιον* dicitur, quod à τὸ λαίον h. e. laxe vel lubricum deducitur: aut à λαῖν, id est, levigo, lubrico, quod producat id quod lavigat, lubricatq; videlicet oleum, cujus quavis lubricandi vis est. Sic & bacca, arboris nomine idem, Latine oliva vocatur: quas cum nigrescere incipiunt Drupæ, Græci Drypetes vocare, Plin. l. 15. c. 1. scribit: & Drupæ l. 12. c. 27. Arborem Dioscor. non descripsit: at Theop. multa hinc inde habet, inter quæ hæc placent: Olea arbor est multisida, 1. hist. 5. medullam parvam & incertam gerit ut buxum, 1. hist. 9. nodosa est, gongros (γόνγρος) à quibusdam vocatos habet, 1. hist. 13. viret perpetuè, sed non semper eadem durant folia, sed alia proveniunt, alia exarescunt, 1. hist. 15. & angusta sunt, 1. hist. 16. semen carnosum & nucleum interjacet, caro enim in nucleo est, 1. hist. 8. succum pinguis, 1. hist. 19. flores solitarii, sed pusilli, 1. hist. 21. & circa fructum ipsum producuntur, & prostrati perforati spectantur, 1. hist. 2. Oliva alia fructum nulla carne, sed oleo repletum producit: alia carnosum sine oleo præstant, 2. caus. 4. Genus alterum, quod Aegyptium appellamus, abertate ac magnitudine fructus excellit. Tandem 4. b. 8. Olea maritima meminit, quæ folia similia Aria habet, fructum proximum his olivis, & lachrymam emittere, ex qua Medici medicamentū sistendi sanguinem component.

Genera: Dioscorid. Olea sativa & olivarum colymbadum: Olea sylvestris & Olea Aegyptiaca l. 1. c. 137. & seq. meminit. At Virgilio, etiam Plin. l. 15. c. 1. referente, Olivarum tria genera, Orbites, Rhadon & Pausia: nec plura genera Hetruriam agnoscere, inquit Martialis. Plin. l. 15. c. 3. prima colligitur Pausia, cui plurimum carni: mox Orbites, cui oliv. post Rhadon: subjungit Liciniam, Cominiam, Contiam, Sergiam, quam Sabini regiam



regiam vocant: & mox: regie ab alij majorina, ab alij phaulia, grandissima, alioquin minimo, succo, & in Aegypto carnosissima, olei exiguum: Decapoli verò Syria per quam parvi, nec Cappari majoris, carne tamen commendantur. Colymbades franguntur, eademq; herbarum viridium succo conduntur (ut in Gallia Narbonensi, fumulo.) Sini & prandites, per se tamen siccata, viūq; passu dulciores, admodum rara in Africa & circa Emeritam Lusitania. Sic Columella decem genera, Pausia, Lavinia, Sergia, Radix, Nevra, Culminia, Orchites, Algiana, Murtea, Citreus. Sane Olearum differentia ex fructu magis quam arbore spectantur, scilicet magnitudine, pinguedine, probitate & colore. Et Bellonius de cult. notat, in vallibus Insulae Coreytrasm Græcia, Olea esse semper virentes, quæ in Quercu altitudinem excrevant.

1. Olea sativa, *ὀλεα σάτιον*.

Olea, Brunf. Trag. Tur. Cord. hist. Ang. Bellon. Ges. hor. Lon. Dod. Ad. Lob. R. uvvol. Cæs. Cam. & Ind. Occid. par. 9. l. 4. c. 32.

Olea sativa, Matth. Dod. gal. Cord. in Dioscor. Lucan. Cast. Tabern. (cui & domestica) Lugd. Clus. hist. Ger.

Nodos qui in caudice sunt, Theoph. 1. hist. 13. *γάρυξ* vocat: rustici in Hetruria (Cæs. alpino auctore) ova olearum vocant, eò quod sata numerosa lobole germinant. Ad nos adferuntur Hispanicæ, Genuenses, Narbonenses sive Malsilienses & Comenses.

In Virginia tria baccarum genera inter se differentia habentur, quarum forma glandibus similis, à quibus bonum oleum eliciunt, Thomas Hariot in def. Virgin. Ind. Oc. p. 1. sed quid sunt?

1. Olivæ maximæ Hispanicæ.

Olivæ Sergianæ regie, phauliæ, Plin.

Olivæ magnæ & carnosæ, Clus. hist.

Olivæ superbæ nucis ferè magnitudine, Cæs.

2. Olivæ minor. & Genuens. & ex Provincia.

Olivæ Lusitanicæ, Narbonenses. Boetia, Clus.

hist. ex quibus plus olei exprimitur.

3. Olivæ oblongæ atrovirentes ad lacum Comensem natæ adferuntur, quæ carne dura nec succulenta ofsi firmiter hærent.

4. Olivæ albæ.

Pl. l. 2. c. 3. olivarum albar. & nigrarū meminit. Oliva alba circa Hisp. & Ulyssiponam, Cl. hist.

In Hetruria habentur:

1. Minores rotundiores, plurimum olei habentes, quæ Olivellæ vocantur, Cæs. quas Mart. secundo loco recenset, & eas prægrandes arbores Juglandium modo ferre, quas Olivastæ rura Senensis vocitant.

2. Majusculæ & oblongæ oleum parcius sed dulcissimum redditentes, quæ nomine à radijs desumpto, Raggiaræ dicuntur, Cæs. hæ primæ sunt Matth. quas oleæ minores proferunt, quibus in cibis utuntur.

3. Majores & pulposiores ad condituras tan-

tum quæ sitæ, quas Regias Cæs. alp. vocat.

4. Sunt quædam, quarum caro ab olle recedit cum franguntur, virides, quæ conditæ gratissimæ sunt, quas Colimbades Cæs. alpin. censuit.

Colymbades quas *κολυμβάδες* Diosc. l. 1. c. 139. nominat, aliqui volunt esse olivas muric conditas, ab innatando sic dictas: quamvis Plinio l. 15.

c. 3. (quem Cæs. imitatur) distinctum genus fuisse videatur; quarum etiam l. 23. c. 3. meminit. Condiuntur autem plerumq; immaturæ per Hispaniam & Galliam Narbonensem: interdum etiam maturæ & nigrae, præsertim in Lusitania.

Olivarum feraces arbores, sed insuavi odore & sapore pejore, in Brasilia, reperiri, Benzo libr. 1. cap. 28. scribit.

II. Olea sylvestris folio duro subtile incano. *ἄγριον αἰὲν ἔχον*, & *ἀδύνη* *ἡλας* Diosc. l. 1. c. 137.

& cap. 141. scribit Æthiopica oleæ lacrymam Scammonio similem fulvam esse, & c. quod Gummi elemi esse Cæs. alpinus suspicatur.

Olea sylvestris, Matth. Lac. Tab. Ger.

Olea sylvestris sive oleaster, Ad. Lob. ico.

Oleaster vel sylv. olea, Cast.

Oleaster, Lon. Cæs. Clus. in hisp. & hist.

Hanc aliqui cum aculeis, alij sine ijs, pingunt: alij in descriptione aculeorum meminere, ut Matth. Dod. alij præteriè: sane fructus est multo minore & a sativa cultura differt: hinc & sativa si negligatur, in sylvestr. abit: & ut Theoph.

2. hist. 3. ex nucleo oleæ, *ἄγριον* nascitur.

III. Olea sylvestris folio molli incano.

Olea Bohemica, Matth.

Elæagnus, Matth. ep. Cam. ep.

Salix Amerina, Amato.

Chalef, Bellunensi.

Ziziphus Cappadocica Plinij, Bell. Dod. Lugd.

Ziziphus alba, Ges. hor. Clus. hisp. & hist.

Ziziphus alba Columella, Bellon. (cui & Ole-

aster perperam), Cam.

Oleatri species quibusdam, Ges. hor.

Olea sylvest. Septentrionalium; sive Eleagnos

Theophr. folio Viticis, Lob.





VI. *Salix alba angustifolia*, angustifolia, quæ alba.

*Elæagnus* Zeyheri de Paravincorum. Ang. Call. *Elæagnus* Dalechampi, & *Salix* genus, Lug.

*Elæagnus* nomen, ex *Elæa* & *agnus*, ex olea & vitæ compositum illi nomen ut Theop. 4. hist. II.

*Elæagnus* fruticosa planta est Agno similis, folio, figura eidem simili, molli, lanu, in folio, Malicydotæ, fl. albe populi minore, fructu nullo.

VII. *Salix humilis angustifolia*.

*Salix humilis*, Dodico.

*Salix humilis repens angustifolia*, Lob. Lugd. an Chanæica, Tab. & Ger.

VIII. *Salix oblongo incano*, acuto folio: quæ a loco in Prodomo describitur.

IX. *Salix fragilis*.

*Salix* candido cortice, Trag.

*Salix candida* vel Græca, Dod. gal.

*Salix* tertium genus, & *Salix alba*. Lon.

Hæc ad ligamenta plane inutilis est: communiter cortice albo, rarius rubro, de qua sub *Salice* i. in Prodomo.

*Salix* 4. genus, quam vulgo Vitricem vocent, quod vitri modo frangatur, Cæs. proponit, sed folia lata subrotunda & hirsuta tribuit.

X. *Salix* folijs glaucis & per ambitum hirsutis.

XI. *Salix humilis capitulo squamoso*.

*Salix Helice* Theoph. 3. hist. 13. Lugd.

*Salix angustifolia*, Cl. pan. Pannonica, Eid. hist. Sæpe folijs velicæ subrubentes, & furculis, pilulæ quædam scabræ videntur.

*Salix latifolia*.

I. *Salix latifolia* rotunda.

*Siler* arbor, Ang.

*Salix lato folio*, Gesn. hort.

*Chaleb Syrorum*, Gesn. quia fl. est odoratiss. Cam.

*Salix platyphyllos*, Adv. alia, Thal.

*Salix latifolia*, Cam. Clus. hist.

*Salix platyphyllos* five leucophlæos & *Elæagnus* quibuldam, Lugd.

*Salix asprea* rotundifolia, Tab. Ger.

De *Silere* Plinius l. 16. c. 18. hæc habet: non nisi in aëre proveniunt *Salices*, alni, populi, filer. In aqua telluris utilissima. &c. 21. *Sileri* folia sæpe decidere scribit, nulla alia nota addita: quæcunq; viribus l. 24. c. 17. egir.

Quæ carbo celsissime ignem concipit, quare æque exere, sub hære & aphronitro pulvis præcipuus conficitur: huius carbombis picinæ & oleæ munda opera utuntur.

II. *Salix alba ex rotunda latifolia* 2. o.

*Salix* quædam genus, Trag. Lon.

*Salix aquatica*, Lab. bico.

*Salix platyphyllos*, Thal.

*Salix asprea latifolia*, Tab. Ger.

III. *Salix latifolia minor*.

*Salix platyphyllos*, Thal.

IV. *Salix subrotundo argenteo folio*, quæ 3. in Prodomo.

V. *Salix maritima ostreorum restis innascens*. *Salix marina*, Lugd.

*Salix pumila latifolia*.

I. *Salix humilis latifolia erecta*: quæ 4. in Prodomo.

II. *Salix latifolia repens*.

*Salix pumila humilis*, seu *Salicula repens*, Cam.

*Salix pumila* genus 2. Clus. pan. & hist.

*Salix pumila*, Tab. humilis. Ger.

*Salix pumila*, folio latiore, Dod. belg.

*Salix leucophlæos palmum alta*, Lugd.

III. *Salix alpina pumila rotundifolia repens*, inferne subcinerea.

*Salix pumila latifolia prior*, Clus. pan. & hist.

IV. *Salix pumila folijs utrinque & calicibus & lanuginosis*.

*Salix abortiva*, Lugd.

V. *Salix saxatilis minima*, quæ 5. in Prodomo.

*Salix pumila angustifolia*.

I. *Salix pumila limifolia incana*.

*Salix pumila angustifolia prior*, Cl. pan. & hist.

*Salix pumila folio angustiore*, Dod. belg.

II. *Salix pumila brevifolia* quæ 6. in Prodomo.

an *Salix humilis repens*, Adv. Lab. bico.

*Salix pumila angustifolia altera*, Cl. pan. & hist.

Hæc variat: nam paulo latioribus folijs quæ in sabulosis Hollandiæ & in Oceano maris nascitur, Cl. sin mon. etc.

III. *Salix alpina Pyrenæica* quæ 6. in Prodomo.

IV. *Salix alpina angustifolia repens* non incana, quæ 5. in Prodomo.

*Salix exotica*.

I. *Salix Syriaca* folio oleag. & argenteo. Zarnab vel Zarnabum, Rhod. cap. 35. & Avicennæ cap. 749.

Zurumbeth Syriacæ, cap. 26.

*Elæagnus* Theophrast.

*Saffa* Syrorum. Rauv. & L. d. app.

*Calaf* seu *Ban*, Alpino.

Verum *Ban* folijs angustioribus, ut *Nip*.



III. Ligustrum folijs laciniatis, quod z. in Prodromo, & Ligutri nigri nomine ex Italia primum, dein pro Syringa laciniatis folijs ex horto Nobil. Contareni habemus.

IV. Ligustrum Ægyptiacum latifolium. Cyprus Græcorum, Alcanna vel Henne Arabum, nunc Græcis Schenna, Rauvvolf. & Lug. append.

Cyprus Plinij sive Alcanna, Belli ep. 4. ad Cluf.

Henne in Ægypto aliàs Alcanna, Bellonio.

Alcanna Arabum, Cluf. ad Bellon.

Alkana, Adv.

Flora et cultura hujus.

V. Ligustrum Ægyptiacum angustifolium. Ligustrum Ægyptium, Elhanne seu Tamaharendi, vel Alcanna Ancennæ Alpino.

Figura enim ab Alpino præmissa diversæ, à Rauvvolf. figura, & coloris est. posterioris monac: & Alpina sive Arabum bene reus Sambuci Horibus nunc est. ut uir quare an diversæ considerandum: ramum solum baccis minutis feminibus refertis onustum, sed sine folijs, ex Creta ab Honorio Belli habemus. In hist. orient. part. 4. figura tab. 15. sub Mangostans proponitur.

## P H I L L Y R E A.

**Phyllirea** Dioscor. lib. 1. cap. 125. arbor est Cyprî magnitudinem æquans, folijs oleaceis, sed latioribus & nigrioribus, fructu lentis & nigro, subdulci, & quasi racemato.

I. Phyllirea latifolia levis.

Phylerea arbor Galloprovinciæ, verior Macaleb Serapionis, Adv. Lob. ico.

Phyllirea, Cam. ep. \* norara.

Phyllira, Mahaleb Serapionis, Lugd.

Phylca Dalechampi, Eid.

Mahalepum Serapionis, Tab.

II. Phyllirea latifolia spinosa.

Phyllirea prima, Cluf. hisp. & hist.

Phyllirea prior Clusij, Lugd.

III. Phyllirea folio laviter serrato.

Phyllirea 2. Cluf. hisp. & hist. Lugd.

Phyllirea ferrata, Ger.

IV. Phyllirea folio Ligustri.

Phyllirea, Matth. Lac. Rauvv. Lugd.

Phyllirea Bellonij, Gesn. hort.

Cyprus latiore folio, Dod.

Phyllirea major, A. tv. Narbonensis, Lob.

Phyllirea tertia, Cluf. hisp. & hist. Lugd. Tab.

Phyllirea media, Cam. ep.

Alaternus major Dalechampi } Lugd.

Phyllirea Penæ major,

latrum, Cæf. & Phyllira, Theoph.

Phyllirea latiore folio, Ger.

V. Phyllirea angustifolia prima.

Cyprus, Dod.

Phyllirea quarra, Cluf. hisp. & hist. Tab.

Phyllirea angustifolia, Lob. Cam. ep. Ger.

Phyllirea minor, Adv. Penæ } Lugd.

Alaternus minor Dalech.

VI Phyllirea angustifolia secunda.

Phyllirea quinqra, Cluf. hisp. & hist.

\*\*\*\*\*

## SECTIO QUARTA.

PHILYCA; CELASTRUS; OENOPLIA; RHAMNUS LYCIUM; RUBUS; CHAMARUBUS; CAPPARIS; ROSA

Sariva, sylvestris, & Hiericuntica.

## P H I L Y C A.

**Phylca** Theophrasto 1. hist. 15. ex sylvestribus perpetuo viret: 3. hist. 6. inunte Vere germinat: s. b. candor ei Celastri modo, semper fronde abundat. Plincol. 16. c. 26. Alaternus dicitur, qui inter arbores non nullum erentes, hoc est, ne semen quidem refert, cui folia inter ilicem & Quercum.

I. Phylca minor.

Alaternus, Ang. Portæ, Cam.

Phylca Theophr. Alaternus Plinij, Elæprinos

Capparis Bellonio.

Alaternus Plinij (& Spina cervina quom-

dam) Lobel. icon. Gerard.

Alaternus prima, Cluf. hisp. & hist. Lugd. Tab.

Celastrus mas Theophrasti, Cæf.

Burgespine Monspeliensium, Adv. Lob. b.

Apharca Theophrasti, Lugd.

Phyllira

Phillyramas Theophrasti, Cæs.

Alaternus Turmæi, Tabern qui duas figuras  
adhibuit.

Alaternus Theophrasti 1. hist. 15. ex sylvestribus  
arboribus perpetuus virer: 3. hist. 6. fructum  
patitur cum usque ingreſcit & varia sit, matu-  
rescit alterum cum vitis foret: bis enim amba:

fructum ferre videtur.

II. Phillyca humilis.

Alaternus alter, Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab.

Alaternus alter humilior, lato folio, Lob.

Ilartum folio ad Illicem accedente, Cæs.

Celastrus æmina Theophrasti, Lugd.

Alaternus humilior, Ger.

## C E L A S T R U S.

**K**elastrus Theophrasti 1. hist. 6. cultum nullum patitur: 1. hist. 15. folia nunquam demittit: 3. hist. 6. &  
cetera sunt utrumque perficit 5. hist. 2. ad baculos idonea est.

Celastrus Theophrasti, Clus. in cur. post. hanc ex horto Leidenſi accepimus.

## O E N O P L I A.

I. Oenoplia non spinosa.

Sedar Serapioni.

Oenoplia seu Napeca Bellonij, Connarus Ale-  
xandrinorum fortè apud Athenæum, Clus. hist.

Hanc una cum fructu & floribus, ex Creta ab

Honor. Belli accepimus.

II. Oenoplia spinosa.

Nabca, Palurius Athenæi credita, Alpin.

Oenoplia spinosa, Honor. Belli, Clus. hist.  
& ep. 5.

## R H A M N U S.

**R**hamnus primus Dioscoridi lib. 1. cap. 119. frutex est circa sepes nascent: virgæ velut & spinæ aculeatæ,  
ut Oxycantha habens: folia verò parva oblonga, subpinguia, mollia: est & altera candidior. De ter-  
tia vide sub Paluro. Et Theophr. 1. hist. 15. primus frutex est perpetuo virens: 3. hist. 17. & alia candida, alia  
nigra, quædam diversus, ambe vero aculeigera: 3. hist. 18. peculiare racemis, quod per latera caulium sepiunt  
potius, & aut racemus omnium maximus propendet. Plinio lib. 24. cap. 14. inter genera Ruborum. Rhamnus  
appellatur a Græcis, candidior & fruticosior: ut flores ramos spargens reitit aculeum, non ut ceteri aduncum, folijs  
majoribus. Alterum genus est sylv. nigrum & quadantenus rubens: fert velut folliculos.

Rhamnus spinis oblongis, flore candicante. an Rhamni genus baccis nigris in Græcia,  
Bellon.

Rhamnus candida, Theophrasti.

Rhamnus primus, Matth. Ang. Lac. Lon. Clus.

& hist. Di. d. Rauvvolf. Lugd. Cat.

Rhamnus candida, Cord. in Diosc.

Rhamnus alter Dioscoridi Monſp. Adv. Lob.

Lugd.

Rhamnus. Bellon. Cæs.

Rhamnus circa Tripolim ipsis Hauset, Ara-

bus.

Hæſſigi five Rhamnus primus, Rauvvolf.

II. Rhamnus alter folijs fatis flore purpureo.

an Rhamno altero similis, Bellon.

Rhamni prioris altera species, Clus. hisp. & hist.

Lob.

Rhamnus primus alter, Dod.

Rhamnus alter Clusij, Lugd.

Rhamni species quæ Spina sancta, Colum.

III. Rhamnus tertius flore herbaceo baccis  
nigris.

Rhamnus niger Theophrasti,

Rhamni genus baccis nigris in Græcia,  
Bellon.

Rhamnus tertius, Clus. hisp. & hist. Dod. Tabel.  
Gerard.

Rhamnus primæ speciei tertius, Lob.

IV. Rhamnus Salicis folio angusto fructu  
flavescente.

Rhamnus secundus, Matth. Dod. ut: Lac. Lon.

Clus. hisp. & hist. Lugd. cum figura Matthioli &  
Dodonæi.

an Rhamni genus baccis rubentibus, Bellon.

Oleaster Germanicus, Cord. in Diosc. & hist.

Oleastri peculiare genus, Cord. ob.

Rhamni species, Cam. ep. & hort.

Rhamnus primus Diosc. Adv. creditus, Lob.

Rhamni alterum genus, Cæs.

Hippophæ Dioscoridi forte, Colum.

V. Rhamnus folio subrotundo fructu  
compressio.

Rhamnus tertius Diosc. quem scribit nigriori-  
bus, latioribusq; folijs & quadantenus ruben-  
tibus.

etiam alij, sed non Angli, & quædam Arabi  
 corum, & Hispani, & alij, & Rhamnus hi-  
 mo, & Hippocaulos habet. Buxus ve-  
 lina, & c. tenuis, foliis, & c. fructu ver-  
 citis. Sunt etiam Rhamni, & c. de-  
 ptiem ad Paliurum, & c. re, & c. o-  
 velint: de quolibet capite, & c. *καλὸς* frute-  
 it vulgo notus, aculeatus, foliis, & c. seme-  
 pingue, & lini seminis, & c. reperitur. De  
 quo Theophrastus lib. 8. cap. 1. hist. 8. spino-  
 lus: 1. hist. 6. folia com. & c. emorum lateribus  
 sinuata eriguntur. 2. hist. 6. & post Occasum  
 Vergiliarum fructum reddit: 3. histor. 17. habet  
 quoque nonnullas differentias: omnes autem  
 fructiferae, & c. & 4. hist. 4. in Africa plurima  
 est & fruticosa, folio nostrati (id est Jujubis)  
 simili, fructu diverso, fructum ferens latum in-  
 star folij, & c.  
 Spina Judaica, Crescentio.  
 Rhamnus tertius, Matth. Ang. Lac. Gefn. hort.  
 Lon. Cast. Cam. Colm.  
 Rhamni tertia species, Dod. gal.  
 Rhamnus niger, Cord in Diof.  
 Paliurus & Apaliura Græcis vulgo, Bellon.  
 Paliurus frutex, Gefn. app.

Paliurus, Dod. Adv. Lob. Ramez. Lig. Cam.  
 Cam. Egl.  
 Jujuba sylvestris & Spina Marruca, & Paliurus  
 Africanus Theoph. Cæs.  
 VI. Rhamnus catharticus.  
 Rhamni alia species Trag.  
 Spina insectoria, Matth. Bellon. Adv. Lob. Cam.  
 Clus. hist. Tab.  
 Spin merlo, Cast. ap.  
 Rhamnus solutivus, Dod. ut: Theophr.  
 Carvispina, Cord. h. 1.  
 Spina cervina vulgo, Guf. h. 1.  
 Spina alba, Lon.  
 Spina cervicalis vulgo, Cæs.  
 Rhamnus catharticus, Lugd.  
 Communiter frutex est: aliquando altitatem  
 altitudinem adipiscitur.  
 VII. Rhamnus catharticus folio  
 Hippophaes, Ang.  
 an Hippophæstum quorundam, Lugd.  
 VIII. Rhamnus catharticus minor  
 Spina insectoria pumila prior, Clus. pan. & c.  
 Rhamni solutivi minor species, Cam.  
 IX. Rhamnus folijs oblongis  
 Rhamnus Bavaricus, Lugd.

## L Y C I U M.

**L**YCIUM, a Lycia in qua magnus hujus proventus fuit: & *πυξάνθη*, id est Buxus aculeata. a similitudine  
 quadam cum Buxo dicitur. Est Dioscoridi l. 1. c. 132. arbor spinosa, virgu trium cubitorum, aut etiam  
 longior, ut, & a qua folia sunt buxo similia, densa: fructum habet instar piperis nigrum amarum, densum,  
 & c. com. verum pallidum Lycio densato similem, & radices numerosas, obliquas, lignosas: & c. h. 1. c. 132.  
 h. 1. c. 132. Lycium Indicum fieri ex frutice Conchide appellato: est & spinarum genere, & c. h. 1. c. 132. c. 132.  
 triubiales, aut etiam majores, a sinu transversa & Rubo crassiores: ruptu cortice rubescit, & c. h. 1. c. 132. c. 132.  
 similia. Et Plinius l. 12. c. 7. fert & spina piperis similitudinem, præcipua amaritudine, folijs parvis de  
 Cypri modo, ramis trium cubitorum, cortice pallido, radice lata, lignosa, & c. h. 1. c. 132. c. 132. c. 132.  
 conficendi docet: addens spinam ex qua Lycium fiat, in Grecia pyxanthem chironium vocari.

I. Lycium buxi folio.  
 Lycium, Matth. Tab. Ger.  
 Lycij nomine ostenditur, quæ tamen verum  
 non est, Ang.  
 Pyxantha, Dod. ut: Lon.  
 an Lycium seu Pyxantha Narbonensium, Ad.  
 Lycium alpinum, Lugd.  
 II. Lycium facie pruni, sylv. five Italicum.  
 Lycium italicum Matth. Lugd. Tab.  
 Spina insectoria pumila altera, Clus. pan. & c.  
 it. Pona.  
 Lycium Hispanicum, Ger.  
 III. Lycium Hispanicum folio oblongo.  
 Lycium Hispanicum, Lob. Lugd.

IV. Lycium Hispanicum folio buxi.  
 Lycium quorundam, Clus. insp. & c. h. 1.  
 an Tamaio, Lycium verum, Frag.  
 V. Lycium latifolium.  
 Paliurus alter peregrinus, Adv. Lobelius in  
 iconibus titulum habet, sed figura subjecta non  
 convenit, quæ sub Rhamno repetitur. & c. h. 1.  
 Oxvacanthæ Dioscoridis.  
 VI. Lycium Indicum.  
 Lycium Dalechampi, Lugd.  
 Grana luteo colore tingunt.  
 VII. Lycium Indicum folijs pruni.  
 Frutex spinosus peregrinus, Arabibus  
 hadh, incolis Zaroa, Rauv.





Acini haic bini, terni, quaterni, ad summum quini sunt.

### II. Chamærubus folijs Ribes.

Chamæmorus Norvegica, Clus. hist.  
Fructus rubeus aurpallidus.

III. Chamærubus folijs Ribes Anglica.

Chamæmorus, Clus. pan. & hist.

### IV. Chamærubus folijs Viris.

Chamæmorus altera Norvegica, Clusio in historiis rariorum.

## C A P P A R I S.

**K** A' n' n' a' p' i' t' Dioscorid. l. 2. c. 204. frutex est aculeatus per terram in orbem stratus spinas aduncas ut Rubus habet, folia rotunda, malo cydonio similia: fructum ut Olea, quæ cum debiscit albusiorem promittit, quod delapso quiddam glandu oblonga figura reperitur, quod apertum grana tanquam punica habet exigua, rubentia: radices lignosæ, magna ac numerosa. Theophr. 6. hist. 10. ramis aculeatis constat. 6. hist. 3. & non solum caule aculeato, sed etiam folio hispido: 1. hist. 6. & 3. hist. 13. quæ cultura deterior redditur, ut natura sylvæ dixerit sic 3. caus. 1. ubi Gaza vocem a' n' a' p' i' t' in eum vertit, ut & 6. hist. 5. & 7. hist. 8. alibi vero Capparin reddidit. Plin. l. 13. c. 23. Capparis, quidam & Cynoibatum vocant: alij Opobisaphylon: vide & L. 9. c. 8.

Genera: Dioscorid. habet Africam, Maritima, Apulani, & quæ e rubro mari & Arabia deferuntur: quæ qualitatibus variant: idem & Plinius lib. 13. cap. 23. refert:

### I. Capparis spinosa fructu minore, folio rotundo.

Capparis, Trag. Matth. Dod. gal. Ang. Cord. in Dioscor. Gesf. hort. Lac. Lon. Ad. Cast. Lugd. Rauvvolf. (qui & sylvestrium meminit) secunda, Tabern.

Capparis spinosa, Bellon.

Capparis retuso folio, Lob.

Capparis Italica, Cæf.

Capparis rotundior folio, Ger.

### II. Capparis folio acuto.

Capparis, Dod. prima, Tab.

Capparis folio acuto, Lob. Lugd. Ger. Eyf.

Capparis aliud genus, Cæf.

Plinio l. 19. c. 8. laudatiss. in Caria, proximum Phrygia. Verum Alexandria Ægypti Venerias præstantiss. adferri, Lugdun. scribit. De cultura Capparium Quiqueranus de laudibus Provincia legendus.

### III. Capparis non spinosa fructu majore.

Capparis non spinosa, Bellon.

In Arabia arborefcit & hyeme folia retinet.

Cappares Alexandria majores esse, quam alibi, quas Cappar appellant, Alpinus auctor est.

### IV. Capparis arborefcens fructu Juglandis magnitudine.

Capparis Arabica fructu ovi magnitudine, semine piperis instar acri, Bellon.

Capparium arbor, Rauvvolf. qui fructus magnitudinem non expressit.

Cappares plurimum ab his quæ in arborescunt & quæ in Græcia proveniunt, differentes in Tauri montis saxorum fissuris, Bellonius noravit.

### V. Capparis portulacæ folio.

Capparis leguminosa, Lob. Tab.

Capparis Fabago, Dod. Ger.

Capparis sylv. five fabaginea, Cam. ep.

Morgani, Syrorum. Andirian, Rhafis: Aridifrigi, Avicennæ, Rauvvolf. & Lugd. ap.

Fabago Belgarum, Lugd.

Telephium Dioscoridis & Plinij, Colum.

Peplios Petri Quich pharmacopæi Luretiani in cuius orto anno 1579. collegimus.

### VI. Capparibus similes baccæ in Virginea.

Sacquennumener baccæ planæ, quæ in stagnanribus aquis reperitur, part. prim. Ind. Occident.

## R O S A.

**R** Osa vetustas ex sanguine Veneris: & Turca ex sudore Mahometis, ortam sibi persuadent, cuius nomine folia Rosarum humi jacere non patiuntur: hæc Græci ῥόδον dicunt, quasi ῥόδον pro ῥόδον Erymologico: At Plutarcho 3. simpl. qui ῥόδον πάλιν τὸν ἑαυτῶν ἀπὸ τοῦ, quod largum odori effluviū emittat. Theophrastus 1. hist. 15. Rosa inter suffrutices est, & perpetuo cacumine viret: 1. hist. 21. flores bicolores sunt, quod in bu alverum florem infiducem medium gerit: 1. hist. 22. verum stipes super fructum est. 6. hist. 2. rami aculeati sunt. Et Plinio lib. 21. cap. 4. Rosa nascitur spina verum quam frutice, in Rubo quoque, proveniens, hic etiam juveni odori, quamvis angustis. Germinat omnium primo inclusis granoso cortice: quo mox instumescit & e-

in virides alabaſtros ſaſtigiato, paulatim rubefcens debiſcit ac ſeſe pandit, in calicū medio ſui ſtantiū com-  
plexu, intus apices.

Differentia Theophrasto 6. diff. 6. permulta ſunt. ſoliorum multitudine, paucitate, aſperitate, levitate,  
colore, odore: cum plurimū quina ſolia ſunt, quibuſdam duodena, vicienaq., alijs longè plura: ſunt enim quas  
Cemifolia vocant, ſed ſolia interna parva admodum ſunt: ita enim oriuntur, ut alia intus alia extra emicent,  
non tamen jucunda odore, odoratioribus inter amplia quibus pars ima ſcabra: & 6. cauſ. 29. urbana roſa odora-  
tor eſt ſylveſtri. At Plinius genera noſtri ſecere celeberrima, Præſtinam & Campanam: addidere alij Milet-  
ſam, cui ſit ardentiffimū color, non excedentū duodena ſolia: proximam ei Trachiniam, minū rubentem:  
mox Alabandicam vilioſiorem albicantibus folijs: viliffimam verò plurimū ſed miniuſimū Spineolam, &c. &  
mox: inter hæc media quam Coroneolam vocant: omnes ſine odore, præter Coroneolam, & in rubro natam:  
addit adhuc alia, quæ equivoce potius Roſa appellata ſunt: addit & ea quæ ex Theophrasto adſcripſimus Sane  
Roſa variat ſtorū colore, qui variū eſt, albu, candidu, pallidu, carneu, rubens: ſic differentia eſt in ſoliorum  
numero, magnitudine & odore: fructu quoq., aliqua differentia pro magnitudine & parvitate, aſperitate &  
levitate. Sic in India Occiden. roſis omnia plena paſim: & præter roſas ex Hiſpania importatas, ſpecies earum  
plurima alia naſcuntur, quarum alia rubra, alia crocea, nonnullæ æteruleæ, quadam candida viſuntur: quæ  
exiſtantiæ ſpecie capicibus ſuis geſtant: part. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 27.

#### Roſa ſativa.

##### I. Roſa rubra.

Roſa Mileſia, Plinij.

Roſa ſativa rubra multiplex, Brunf.

Roſa domeſtica punicea, Matth.

Roſa horteniſis rubra multiplex, Trag.

Roſa horteniſis, Fuch.

Roſa, Tur. Lac. Lon. rubra, Cord. in Dioſ. Lugd.

Ad. Tab. Ger.

Roſa rubra urbana, Gef. hort.

Roſa ſativa rubra, Ang. Caſt.

Roſa ſativa 3. quæ Provincialis Gallis, Dod.

Roſa Damascena, Lob.

Roſa rubens multifolia, Cæſ.

Roſa intenſe rubens, Cam.

Eſt ſimplex & multiplex, colore magis mi-  
nusque rubro: hucreferre oportet, ex Eyſtett.  
horto,

1. Roſam Mileſiam flore rubro pleno: vulgo

Roſa ſina.

2. Roſam Mileſiam flore ſimplici rubro, &

3. Roſam ex rubro nigricante flore pleno, &

Græcula Plinij, Camer.

II. Roſa rubra pallidior.

Roſa ſativa quarta quæ francha Gallis, Dod.

Roſa hoſofericea, Lob. ico.

Roſa rubicunda, Cam.

Roſa tertia, Cæſ.

Roſa Damascena rubra, Lugd.

Alijs Trachinia, Præſtina alijs, alijs Græ-  
cula Plinij: hæc priore minus rubet & flore ſim-  
plici plerunq; eſt, & folijs latiſſimis, cujus fru-  
tex ſpinis communiter caret.

##### III. Roſa ſaturatius rubens.

Roſa prima Præſtina ſimiles, Clu. hiſt.

Roſa purpurea, ſive in rubro nigricans, Cam.

Folij eſt quadragenis amplioribus, ſatura-  
tius rubentibus, ad nigredinem vergentibus &  
alabaſtro erafſiore.

##### IV. Roſa purpurea.

Roſa trachynia, Plinio.

Roſa horteniſis ex purpura albicans, Trag. Gef-  
ner. hort.

Roſa domeſtica carnis colorem referens, Matt.

Roſa incarnata, Ang. Cam.

Roſa ſativa ſecunda ſive incarnata, Dod.

Roſa rubra ſive carnei coloris, Bellon.

Roſa pallida, Ad.

Roſa roſeo colore, Cæſ.

Roſa ſativa purpurea, Caſt.

Roſa minus rubens, Lugd.

Roſa provincialis major, Tab. Ger.

Roſa provincialis fl. incarnato pleno, Eyſt.

Rofas purpureas ſive rubeas, colore carni ſi-  
miles Pharmacopœis Zebedenæ dici, Joanni-  
us in tractatu de pilulis Aloës ſcribit.

Quibuſdam Alabandicæ ſimilis, alijs Præ-  
ſtina, alijs Campana Plinij.

##### V. Roſa verſicolor.

Roſa præſtina verſicolor, Clu. hiſt.

Variat: nam ſos media ex parte candican-  
tibus, altera purpuraſcentibus folijs, vel venis ſi-  
milis coloris aſperſis conſtat. Vel folia quæ-  
dam integra alba, quædam integra rubra, inter  
ſe commixta ſunt.

##### VI. Roſa maxima multiplex.

Roſa centifolia Batavica rubra, Clu. hiſt. Eyſt.

an Centifolia veterum, quam in odora dicunt, cum hæc odora sit.

Variar: communiter flos ex albo rubet: habetur & alba, quæ

Rosa alba major Provincialis, } Clus. hist.

Rosa centifolia Batavica alba, }

Rosa provincialis flore albo, Eyst.

VII. Rosa multiplex media.

Rosa centifolia Batavica secunda, Clus. hist.

VIII. Rosa major Prænestina, Clus. hist.

Rosa prænestina variegata, Eyst.

IX. Rosa alba vulgaris major.

Rosa Campana Plinij.

Rosa sativa alba, Brunf. vel 1. Dod.

Rosa hortensis candida, Trag. alba, Ges. hor.

Rosa domestica alba, Matth.

Rosa alba, Ang. Cam. Lugd. Tab. Ger.

Rosa candida, Ad.

Rosa quarta candida, Cæf.

Hæc quibusdam spineola, alijs Alabandica Plinij censetur: foliorum numero flores variant: hinc

Rosa flore albo pleno; & Rosa alba flore simplici, Eystet.

X. Rosa alba minor.

Rosa laeteola quæ centifolia Plinij videtur, Camer. Eystet.

XI. Rosa moschata simplici flore.

Rosa moschata & Damascena, Matth.

Nesim (vel Nesim) Serapionis, Ang.

Rosa sativa quinta, Dod.

Rosa muscata simplex, Ges. hort. flore simplici, Lob. Gerard.

Rosa muscatula, Cæf.

Rosa alba Damascena flore simplici, Cast.

Rosa Damascena (quasi de Sceni apud Arabes) simplici flore, Cam. Eyst.

Rosa coroneola, quam Damascen. vocant, Lug.

Rosa muscata alba, Tab.

Hæc minor est & major, quæ

Rosa moscata major, Lob. icon.

Hæc alba est, nonnunquam ex albo ad puniceum nonnihil vergit.

Rosæ moscatæ cum syl. tum domesticæ, rubræ, albæ & virides, Bellon. l. de cult. meminit.

XII. Rosa moscata flore pleno.

Rosa coroneola, Plinio.

Rosa muscata multiplex, Ges. hort. Ger.

Rosa moscata, Damascena, Alexandrinæ, Eid. append.

Rosa sativa quinta multiplex, Dod.

Rosa moscata, Adv. Lob. icon. alba multiplex, Tabern.

Rosa muscatula multifolia, Cæf.

Rosa alba Damascena flore pleno, Cast. Eyst.

Rosa coroneola altera, Lugd.

Rosa Damascena sive moscata pleno flore, Cam. Alijs Prænestina Plinij.

XIII. Rosa moschata semper vires.

Rosa semper vires flore albo, Clus. hist. appen. alt. aut.

XIV. Rosa spinis carens flore majore.

Rosa sine spinis prima, Clus. pan. at secunda in hist.

Rosa sine spinis, Cam. Tab. Ger.

Colore est inter Prænestinas & rubras media: sunt qui & albo observant.

XV. Rosa sine spinis flore minore.

Rosa sine spinis altera, Clus. pan. & hist.

Colore faciem vini ferè refert.

XVI. Rosa subviridis.

Si in teneras Agrifolij arbusculas Rosæ inserantur, flores subvirides producuntur, Camerarius. Quamvis interdum anni constitutione frigidior & humidior, herbacei coloris rosæ, sine calyce proveniant, cujus causam Costæus de natur. stirp. explicat.

Si Brassicæ antiquo stipiti aut Quercui gemen tenellum Rosæ inseras, virides sed in odora Rosæ nascuntur, Carolus Stephanus.

In hortis Italiæ, cæruleas reperiri, in historia Lugdunensi habetur, ex Advers.

XVII. Rosam folio subrotundo & crispo, in horto Montembelgardico ante plures annos, sed absque flore observavi, cujus ramulum exsiccarum assero.

#### Rosa sylvestris

Rosam sylvestrem Dioscorides l. 1. c. 173. *rose* vocat, quam aliqui Oxyacantham appellant: frutex est (inquit) tubo longè major, arborescens: folia fert multò latiora quam Myrtus, aculeos verò circa virgas robustos: florem candidum, fructum oblongum, olivæ nucleo similem, qui dum maturefcit, fulvus, intus verò lanuginosus confpicitur. At Theoph. 3. hist. 12. Cynosbaros (cani rubus Gazæ) fructum subrotundum parit, malo punice similem: est inter fruticem & arborem, punice non absimilis folio amerinæ. Plinio l. 8. c. 4. radix sylv. rosæ, quæ Cynorhodos appellatur: & l. 21. c. 2. Cynorhodo

rhodo una medicina erat, Spongiolæ quæ in medijs spinis ejus nascitur.

I. Rosa syl. vulgaris flore odorato incarnato. Cynosbatos Dioscoridi, Lon. Adv. Cynorrhodos Plinij: & Barbaro. Senticanis & Cynosbatos, Brunf. Rosæ syl. primum genus, Trag. Rosa syl. Matth. Ang. Gesn. hort. Dodon. Tab. odora, Ger.

Cynosbatos procerior & Cynorrhodos, Cord. in Diosc.

Cynorrhodos seu Rosa canina, Thal.

Rosæ syl. vulgaris, Lugd. Cam. ep.

Rosa canina odorata & syl. Lob.

Rosæ syl. altior, Cæf.

Rosa canina, Cam.

Cynosbatos & Rubi tertium genus, Lugd.

Rosæ syl. odorata incarnato flore, Eyst.

Flores ex purpura dilute albicant.

Huic, ut & tertiz, Spongiola adnascitur, quam Plinius in Cynosbato, pilulam Castaneæ similem: in Cynorrhodo, spongiolam vocat. Rosæ syl. spongia dicitur Cynorrhodon, Ang.

Spongiola syl. rosæ, Dod.

Spongia Bedeguaris, Adv.

Bedeguar officinis perperam.

II. Rosa syl. flore majore & rubente.

Rosæ syl. flore rubro, Eyst. colore & majoribus folijs à priore differt.

III. Rosa syl. flore pleno.

an Rosa Alabaudica, Plinij.

Rosæ syl. odorata flore multiplici, Lob. ico.

Rosa canina duplicato flore, Cam.

IV. Rosa syl. folijs odoratis.

Englanteria, Ruellio.

Rosæ syl. altera, Trag. Gesn. hort.

Rubus canis, Englanterium, Turn.

Cynosbatos & Cynorrhodos altera, Cord. in Diosc.

Cynosbatos, Lac.

Rosæ 10. Cynorrhodi vel caninæ rosæ odorata species, Dod.

Rosæ syl. species altera, Lugd.

Rosæ eglanteria, Adv. Tab. Eyst.

Rosa canina, Ger.

Flores ex purpura saturata candicat.

V. Rosa syl. odoratissimo rubro flore.

Rosæ syl. tertium genus, Trag.

an Cynosbatos quarta, Cord. in Diosc.

Rosæ syl. Gesn. hort.

VI. Rosa syl. odorata albo flore.

Rosæ syl. humilior, Cæf.

Rosæ quarta an Græcula Plinij, Clus. hist.

VII. Rosa odore Cinamomi simplex.

Rosæ cinamomina & 7. vel syl. 2. Dod.

Rosede canelle, Lob. ico.

Rosæ cinamomea, Adv. Lugd. simplex, Cam.

an Cynorrhodos seu Rosæ sylvestris, Thal.

Pro Lychnide Plinij Gesnerus habet: & in Albio monte, majorem & minorem nasci tradit: illam sceminam, hanc marem faciens.

VIII. Rosa odore Cinamomi flore pleno.

Rosæ cinamomea pleno flore, Clus. pan. & hist. Eystett.

Rosæ cinamomea altera, Cam.

Spermoniam Plinij, sic enim, non Spineolam aut spinosam legendum, Barbarus vult: quavis alij Sybicum legendum putant, Cam.

Flos dilute purpurascit & in medio suave rutilat.

IX. Rosa rubra præcox flore simplici: exiguo odore & folijs latioribus à prædicta discernenda, Eyst.

X. Rosa minor rubello flore, quæ vulgo à mense Majo, Majalis dicitur.

Rosæ cinamomea altera, Cam.

Rosæ provincialis minor, Tab. Ger.

XI. Rosa lutea simplex.

Rosæ lutea, Ang. Adv. Lob. Cæf. Cast. Lugdun.

Cam. Tab. Ger. flore simplici, Eyst.

Rosæ citrinæ, Gesn. hort.

Rosæ syl. tertia, vel Rosæ octava, Dod.

Meminis Gesnerus Rosarum, quæ moschum fragrant & luteæ sint: tales non vidimus, sed fruticis folia odorata observavimus.

XII. Rosa lutea multiplex.

Rosæ flava plena, Clus. hist. & app. 2. & cur. post.

Rosæ lutea maxima flore pleno, Eyst.

Hæc duplex, altera florem totum expandit: altera verò semiclauso flore permanet.

XIII. Rosa campestris spinosissima flore albo odoro.

Rosæ campestris odora, & quinta, Cl. pan. & hist.

Cynorrhodon polyacanthos, Lugd.

Rosæ campestris odorata Clusij, Cam.

Rosæ Dunensis, vel species nona, Dod.

Rosæ præcox spinosa fl. albo, Eyst. (rubeat.

Flos albus, fructus maturus niger, cum aliorum

XIV. Rosa syl. pumila rubens.

Rosæ quarta, Cl. pan. at in hist. sexta & pumila.

Fructus maximus & pyri in modum turbidatus.

XV. Rosa sylv. pomifera major : hæc sequente altior, ramosior, paucissima aculeis, folijs majoribus, pallide virentibus, & apud nos locis humidis in Alectis provenit.

XVI. Rosa sylv. pomifera minor.

Rosa sylv. pomifera. Adv. Lob. Lugd.

Cynorrhodi species, Thal.

Rosa arvena, Tab.

Rosa pimpinella, Ger.

Hanc Lobelius spinis carentem, at Tabernæmontanus spinosam pingit: utramque habemus.

XVII. Rosa arvensis candida.

Rosa sylv. quarta species, Trag.

XVIII. Rosa campestris repens alba.

Cynosbates sive Cynorrhodos 3. Cord. in Diosc.

XIX. Rosa campestris spinis carens biflora.

Rosa Græca & Cynorrhodon læve, Lugd.

Flore est languide rubro, vere & autumno prodicens, quæ duplex, alia odoris expers, alia folijs exiguis suavissimi odoris, in monte Pilati Lugdunensium.

Rosa Hierichuntica dicta.

Nominis hujus autorem fuisse Monachum,

Bellonius refert, cum tamen circa Hiericho nunquam reperiat, sed in Arabia deserta, ad littora maris in fabulo: & Rauvolfius, in Syriæ testis & rudibus, ejus sylvestrem speciem invenit: hanc à pluribus nunc annis in hortulo meo colo, cum facile & crescat & floreat: de qua Joh. Sturmius Lovaniensis professor, libellum superstitionibus plenum, scripsit.

I. Rosa Hierichuntea vulgo dicta.

Amomum, Cord. in Diosc. & hist.

Amomis Diosc. & Plinii, Cæs.

Rosa Hiericonthea, Turn. Lōu. Lob. Garz. Cast. aperta & conclusa, Eyst.

Rosa de Hiericho & Rosa Mariæ monachii, Lugdun.

Rosa Hiericonthina 1. & 2. Tab. major, Ger.

Duplicem fecit Cordus, alteram inspidam inodoram, quæ Amomis: alteram aromaticam odoratam, quæ Amomum sit. Sed de Amomo vide suo loco.

II. Rosa Hiericonthea sylvestris.

Rosa Hiericonthica sylv. species, Rauv. Cam.

III. Rosa Hiericonthica exsiccata similis.

Blatterlos Holandis, fruticulus ad Scorbutum, Indiæ orient. part. 4. fig. 21.

\*\*\*\*\*

## SECTIO QUINTA.

MYRICA SIVE TAMARISCUS; ERICA; SABINA;

CEDRUS BACCIFERA; CUPRESSUS; JUNIPERUS;

Asparagus & Corrua.

### MYRICA SIVE TAMARISCUS.

**M**YRUS (Gaza modo Myricam, modo Tamariscum vertit) arbor nora est, fructum veluti florem serens compage muscosum: in Aegypto & Syria quædam nascitur sativa, cetera sylvestri simili, fructum serens Gallæ proximum &c. Sunt qui et candices alices conficiunt, quibus splentici poculorum vice utuntur: Diosc. l. 1. c. 116. Et Theophr. 1. hist. 16. Myrica folia carnosæ sunt ut Cupressi, & inter frutices numeratur: 5. hist. 6. in Tylo Arabia insula serunt Myrica lignum, non ut apud nos imbetillum esse, sed validum sicuti Illigneum, &c. Plinio l. 13. c. 21. Myricen & Italia, quam alij Tamaricen vocant, Achaia autem Bryau sylvestrem: insigne in ea, quod sativa tantum serat Gallæ similem fructum: & l. 24. c. 9. Myricen quam & Tamaricen vocat Lenam, similem scopis Amerinæ dicit, &c. & l. 16. c. 24. Tamarici folia carnosæ sunt: & l. 16. c. 21. quæ non cedunt: & c. 26. fructum nullum fert, ne semen quidem, scopis tantum nascens.

Genera duo sunt Dioscoridi sativa & sylvestris: & Plinio l. 24. c. 9. sylvestris plane sterili, altera mitior: hæc fert in Aegypto Syriaq; etiam abundanter lignosum fructum, majorem gallæ, asperum gustu, quo Medici utuntur vice Gallæ. Et Cordo testè monente, etiam in Germania duplex invenitur, alterum solidiore ligno, medulla exili, folijs tenuibus, ad Rhenum: alterum ligno non adeo solido, medulla ampliore & folijs latiusculis ad Danubium. Et præterior Tamarix, & humilior, quæ diminutiva forma Tamariscum dicitur.

I. Tama-



I. *Tamarix fruticosa folio crassiore* : sive Germanica.

*Tamariscus*, Brunf. Lon. fœmina, Cord. hist.

*Myrica*, Trag. Turn. Gesn. hort. Lac.

*Myrica* sylv. sive *Tamarix*, Matth. Cast.

*Myrica humilis*, Dod. gal.

*Tamarix* sylv. fœmina, Fuch.

*Tamarix humilis*, Cord. in Diosc.

*Myrica*, Gesn. hort. pannonica, Clus. pan.

*Myrica* sylv. altera, Clus. hist.

*Myrica altera* in Germania, Cam.

*Tamarix*, Dod. Tab. Germanica, Lugd.

*Tamariscus* Germanica, Adv. Lob. Ger.

Ex hac ad Rhenum nara, doliola sextarium dimidium capacia, confecta, Francofurtum deferuntur.

II. *Tamarix altera folio tenuiore* sive Gallica.

*Tamariscus*, Ang. Narbonensis, Adv. Lob. Ger.

*Tamarisci* aliud genus, Rauvv.

*Myrica* circa Montpelum, Gesn. hort.

*Tamarix Narbonensis*, Lugd.

*Tamarix Gallica* aut Hispanica, Clus. pan.

*Myrica*, Cæs. sylv. prima, Clus. hist.

*Myrica* sive *Tamariscus* Gallica, Cam.

*Tamarisci* sylv. genus, Alpino.

Hæc in arboribus quoque in Hispania excrescit, ut hominis ulna vix amplecti possit.

III. *Tamarix Ægyptia arbor.*

*Myrica ingentis magnitudinis* in Alexandria, Bellon.

*Tamarix gallis onusta* ad Nilum, Eid.

*Tamarix sativa & procera* in Ægypto, Cord. in Diosc.

*Tamariscus* Rauvv. & 1. part. Ind. or. l. 2. c. 7.

*Tamariscus* Ate vocata, Alpino.

*Myrica domestica* in Ægypto, Cast.

*Myrica sativa* Diosc. cum gallis mihi non visa, Clus. hisp. & hist.

Galla myricæ.

Chermæsel Arabibus, Bellon.

*Myricæ Ægyptiacæ* galla, Clus. hisp. & hist.

Fructus nucum magnitudine, figuræ inter se diversæ longi, breves, rotundi, lati, crassi, graciles, Alpino.

In Ægypto tã in humidis quàm siccis nascitur, ita ut utrobique sylvulæ reperiantur, Bellonius,

## E R I C A.

**E**rica arbor est fruticosa similis *Myrica*, at multo minor. Diosc. lib. 1. cap. 117. & lib. 3. cap. 174. Cori frutes est folia Erica, sed minore, pinguiore & rubente. Erica cacumine fructum fert sicut Pyraea & Amerina, Thopha. hist. 23. Erica in Græci vocant fruticem, non multum à *Myrica* differentem, colore v. s. marini & pend folio, Plin. lib. 24. cap. 9. qui lib. 11. cap. 16. mellis sylvestris erica meminit.

*Erica folio Myrica.*

*Erica folio Coridis.*

I. *Erica vulgaris glabra.*

*Erica vulgaris* Trag. Thal.

Ericæ, Fuch. Dod. gal.

*Erica prima*, Matth. Lac. Dod. Lugd.

*Erica*, Cord. in Diosc. Bellon. Lon. Cast. def. Tab.

*Irica*, Turn.

*Erica Myricæ folio*, Ad. Lob. Clus. pan. & hist.

*Erica vulgaris* sive pumila, Ger.

Flos communiter colore dilutioris purpuræ: & aliquando & autumnò & vere floret: aliquando etiam flore albo est, hinc

*Erica alba*, Tab.

*Erica pumila alba*, Ger.

*Erica flore albo minor*, Eyst.

II. *Erica Myricæ folio hirsuta.*

*Ericæ Myricæ folio similis*, Clus. hisp. & hist.

Selago Plinij quibusdam, lib. 24. cap. 17. similis herbæ huic Sabinæ est Selago appellata.

III. *Ericæ* genus, quod tota Græcia vulgo Phana dicitur, Bellon. sed quid?

I. *Erica maxima alba.*

*Erica prima*, Clus. hisp. Lugd. Tab.

*Erica coris folio prima*, Clus. hist.

*Erica major floribus purpurantibus*, Lob. Ger. defer.

III. *Erica maxima purpurascens longioribus folijs.*

*Erica secunda*, Matth. Dod. gal. Cast. Lug. Tab.

*Erica Coridis folio altera*, Clus. hisp. & hist.

*Erica juniperifolia densè fruticans* Narb. Lob.

IV. *Erica frutescens peregrina.*

*Erica peregrina* Brancionia, Lob.

V. *Erica major floribus ex herbaceo purpureis.*

*Erica tertia*, Clus. hisp. Lugd. Tab.

*Erica coris folio tertia*, Clus. hist.

*Erica major floribus herbaceis purpurantibus*, Lob.

*Erica cruciata*, Ger.

Huius altera species, cujus flosculi herbacei racematim & spicatum coherent.

VI. *Erica major scoparia folijs deciduis.*

P p p

Erica

Erica quarta, Clus.hisp. Lugd. Tab.  
Erica scoparia flosculus herbaceis, Lob.  
Erica quarta Montpelienfium, Lugd.  
Erica coris folio quarta, Clus.hist.  
Erica pyramidalis, Ger.  
Selago Plinij, Piræa Theophrasti, Guilandino dicebatur.

Hæc biflora est, & ex hac scopæ apud Montpelienfes conficiuntur.

V II. Erica ex rubro nigricans scoparia.

Erica tertia, Dod. gal. Lugd.

Erica nona, Clus.hisp. Lugd.

Erica pumila altera Belgarum, Lob.

an Erica tertia, Dod.

Erica decima tertia, Clus.hist.

Ex hac scopæ ad vestes purgandas conficiuntur.

V III. Erica humilis cortice cinericeo arbuti flore.

Erica sexta, Clus.hisp. Lugd. Tab.

Erica pumila calyculato unedonis flore, Adv. Lobel.

Erica coris folio sexta, Clus.hist.

Erica tenuifolia, Ger.

IX. Erica hirsuta Anglica.

Erica octava, Clus.hisp. Lugd. & Tabern. sub septima pinxit.

Erica juniperifolia altera, Lob.

Erica coriafolio duodecima, Clus.hist.

Scopa, Cæf.

Erica tenuifolia caliculata, Ger.

X. Erica ternis per intervalla ramulis.

Erica quinta, Clus.hisp. Lob. Lugd. Tab.

Erica coris folio quinta, Clus.hist.

Erica procumbens.

I. Erica procumbens ternis foliolis carnea.

Erica quarta, Clus.pan.

Erica coris folio nona, Clus.hist.

Haec sæpe capitula viridia è foliis compacta, capitulorum Thymi modo adnascuntur.

II. Erica procumbens herbacea.

Erica quarta altera, Clus.hisp.

Erica tertia, Clus.pan.

Erica coris folio octava, Clus.hist.

III. Erica procumbens dilute pupurea.

Erica altera, Clus.pan.

Erica coris folio septima, Clus.hist.

Erica baccifera.

I. Erica erecta baccis candidis.

Acacalis Dioscoridis, Amato.

Erica septima, Clus.hisp. Lugd.

Erica baccifera, Lob. Cast. ico.

Erica coris folio decima, Clus.hist.

Erica baccifera tenuifolia, Tab. Ger.

Frutex Lusitanis Camarinna dictus, Linscot.

Indiæ orient. part. 4. fig. 21. lit. C.

II. Erica baccifera procumbens nigra.

Erica baccifera, Marth. Cast.

Erica baccifera Matthioli, Lob. Lugd. Thal.

Erica prima, Clus.pan.

Erica coris folio undecima, Clus.hist.

an Coris, Cord. in Diosc.

## C A M P H O R A T A.

**C**amphorata dicitur, quod herba digitu friata, odorem camphoræ nonnihil referat: quam aliqui Selaginem Plinij l. 24. c. 11. quam Sabina similem dicis: alij ejusdem l. 24. c. 15. Chamæpeuce, quam Laricu selgi similem scribit: quidam Cneorum nigrum esse volunt.

I. Camphorata hirsuta.

Chamæpeuce, Ang.

Camphorata Montpelienfium, Adv. Lob. Camer. Taber.

Selago Plinij five camphorata, Lugd.

II. Camphorata glabra.

Camæpeuce & Camphorata minor, Lugd.

III. Camphorata congener.

an Anthyllis altera, Ang.

Anthyllis altera Italicorum, Lob. Lugd.

Camphorata altera, Tab.

Anthyllis lentifolia, Ger. ico.

## S A B I N A.

**S**abina hæc est, nonnulli hæc quæ Dioscoridi lib. 1. cap. 104.

Genera duo Dioscoridi l. c. unum folijs simile Cupresso, et spinosius & graveolens, acce ac servens. curia vero est arbor, & in latum magis se fundens. Alterum genus est folio Myrica simili. Plinio l. 24. c. 11. herba Sabina brachy appellata à Græcis, duum generum est: altera Tamarici simili folio, altera Cupresso: quam quidam Creticam Cupressum dicunt: & l. 17. c. 13. Sabina herba propagine feritur & avulsione.

I. Sabina

I. Sabina folio Tamarisci Dioscoridis.  
 Sabina, Brunf. Trag. Fuch. Dod. ut: Bellon. Gef.  
 hor. Tur. Lob. Cæf. Portæ: vulgaris, Cam.  
 Sabina sine baccis, five sterilis, Matth. Cast.  
 Sabina miti folio, Cord. in Diof.  
 Sabir: altera, Ang.  
 Sabina vulgarior, Ad.  
 Savina, Lon. mas, Tab.  
 Sabina Tamarisci similis, Lugd.  
 Sabina sterilis, Ger.  
 II. Sabina folio Cupressi.  
 Sabina baccifera, Matth. Rautvvolf. Cam Ger.  
 Sabina altera, Dod. ut:  
 Sabina, Lac. prima, Ang. qui Thyam Theophr.  
 censet.  
 Sabina major, Gef. ap.  
 Genuina sabina baccifera atrorubra, Lob.

Sabina Cupressi similis, Cord. in Diof. Lugd.  
 Sabina vera, Cæf.  
 Sabina fructifera, Cast.  
 Cum in arborem excrescit, quotannis baccas  
 juniperinis similes producit,  
 Sabina scemina minor, Tab.  
 III. Sabina folijs Cupressi altera.  
 Sabina baccata altera, Lob. Lugd.  
 Sabina alterius altera icon. Dod.  
 Savina scemina major, Tab.  
 Ramulorum exilitate & foliorum lenitate  
 tantum à priore differt.  
 Differt autem à Cedro, quòd Sabinae gravis  
 odor sit, & Sabinae extremi rami in acuta folia  
 definant, & baccæ minores sunt & nigrescant:  
 cum Cedrus Junipero odoratior sit, folio obtu-  
 so, & baccæ majores phœnicei coloris sint.

## C E D R U S.

Cedrus alia est conferta, alia baccifera: de baccifera sic Dioscor. l. 1. c. 105. dicunt & altera Cedrus parva,  
 spinosa Juniperi modo, fructum ferens magnitudine myrti rotundum. Kide & Theophr. l. 1. hist. 15. perpe-  
 tuò viret: l. 1. hist. 16. folia habet rara extremitate pungente: 3. hist. 12. quidam binam affirmant, alteram duntaxat,  
 alteram parvulam (puniceam Gaza) alij simplicem dicunt scilicet qui Idam incolunt, est Junipero non dissimi-  
 lis, sed folio maxime distat: quippe Cedro durum, acutum spinosum, Junipero mollius: excelsior quoque, Juniperi  
 nasci videtur: alij nominibus non dividunt, sed ambas Cedros appellant: Cedrum cum additioe ipsius  
 nuncupant. & C. Plinius l. 13. c. 5. Junipero similem habent. Phœnice & Cedrum minoris: duo ejus genera,  
 Lycia & Phœnicia: differunt folio: nam quæ durum, acutum, spinosum habet, Oxycedros vocatur, ramosa &  
 nodu infesta. Altera odore prestat: fructum ferunt Myrti magnitudine, dulcem sapore.

## Cedrus baccifera.

I. Cedrus fol. cupressi major fructu flavescente.  
 Juniperus major seu Cupressus syl. Dioscoridis,  
 in Codice Hermolai.  
 Cedrus Phœnicia, Plinij.  
 Cedrus Lycia, Matth. Gef. hor. Cast.  
 Cedrus pumila folijs obtusis & Phœnicia, Bell.  
 Cedrus minor, Cord. in Diof. Portæ.  
 Oxycedrus Lycia, Dod. Ger.  
 Juniperus major, Clus. hisp. & hist.  
 Cedrus phœnicea, Ad. media vel secunda, five.  
 Oxycedrus folio cupressi, aut Sabina major  
 Monspel. Lob.  
 Thuia genus quartum, Lugd.  
 Cedrus phœnicea secunda, Tab.  
 II. Cedrus folio Cupressi media majoribus  
 baccis.  
 Cedrus Lycia, Bellon.

## Cedrus minor altera, Diosc.

Cedrus phœnicea altera, Plinij & Theophr. vel  
 prima, Lob.

Thuia Mafsiliensium, Lugd.

## III. Cedrus folio cupressi minor.

Cedrus phœnicea minor vel tertia, Lob.

Hæ tres sola magnitudine differunt: verum  
 & duæ priores ratione ætatis variare censemus,  
 ita ut Matthiolus adolescentem, at Lugdunen-  
 sis historiam adultam exprime videatur. Sic &  
 ratione ætatis in folijs differentia: primò enim  
 prodeuntia, Juniperi vulgaris folia emulantur,  
 quæ paulo breviora & acuta: at adultæ, instar  
 foliorum Cupressi rotundantur, ita ut rami in-  
 feriores folijs pungentibus & acutis, summi ve-  
 rò, obrussis & rotundis vestiuntur: hoc expri-  
 mit figur.

Sabinae bacciferae, Advers. & Lob. ico.

## T H U Y A E T B R U T A.

Yer five bin Theophrasto 3. hist. 5. forma Cupressi similis, cum ramorum folijs, candidè fructibus, vel potius  
 seu Cupressus sylvestris: & 3. hist. 15. ex sylvestribus perpetuò viret. Plinius l. 13. c. 16. Thya ex Theophrasto  
 memi-

memini. quam aliqui volunt eandem cum Cedro Atlantica ejusdem. Brutam sic descripsit Plinius l. 12. c. 17. petunt in Helimaos arborem Brutam, Cupresso fuscæ similem, ex albidu ramis, jucundis odoribus, accensam & cum miraculo hispani Claudii Casarii prædicatam, odorem etiam proximum Cedro, &c.

Thuya Theophrasti.

Arbor vitæ, Bellonio, Ges. hort. Dod. Clus. hisp.

& hist. Cast. Tab. Ger. Eyst.

Arbor filicii similis, Oviedo.

Cedrus Lycia, Lob. an. & Ad.

Thuyæ tertium genus, Lugd.

Arbor paradisiæ Lutetian. Lugd.

Thuia sive Thya vulgo, Cam.

Hæc è Canada Francisco I. Galliarum regi, Arboris vitæ nomine oblata, fortasse ab odoribus vehementia, vel ob immortalem ejus comam, sic dicta.

## CUPRESSUS.

**C**upressus nuncupatur & Dioscoridis l. 1. c. 102. ἀνὰ τὴν νύκτα τὴν ἀνὰ τὴν ἡμέραν. Theophr. l. 1. hist. 1. proceræ & longo caudice constat, rami macilentio: l. 1. hist. 13. maius odor est semina: l. 1. hist. 14. simplici assurgit caudice ad longitudinem, sed non multum radicibus, neque ramis frequentibus patet: l. 1. hist. 15. vixit perpetuum: 2. hist. 3. plerumque ex semina marem provenire affirmant: l. 1. c. 15. huius fructus non id totum est, quod pila speciem gerit, sed quod cono innascitur prætenue, ex illo & quasi laricis semini proximum, quod pilula sua debescere delabitur. At Plinius l. 16. c. 33. Cupressus natu morosa. fructu supervacua, bacchi torva. folio amara: odore violento, ac ne umbra quidem gratiosa, materie rara, ut penè fruticosi generis, disti sacra, & ideo funebri signo ad domos posita: semina steriliu diu. Duo genera earum: meta in fastigium convoluta, qua & semina appellatur. maius spargit extra seramos, deputaturque, & accipit vitem, &c.

I. Cupressus, Matth. Ang. Dod. ut: Cord. in

Diosc. Ges. hor. Tur. Lac. An. Ad. Lob. Cæf. Portæ,

Lugd. Cam. Tab. Eyst.

Cyparissus, Cast.

Cupressus altera sive sylvestris, Ger.

Huius fructus sive conos, nuces vel pilulas

Cupressi. Officinæ Cypressi nominant: aliquibus Gabulæ dicuntur.

II. Cupresso similis arbor in Syria: an Cedrus major Dioscoridis.

Thya forte Theoph. cuius fructus pilularum

Cupressi magnitudine in Oriente notissim.

Abhel dicitur, Guilandino in problem.

Cedrus major Dioscoridis, Thya Theophr. &

Abhel, Guiland. in papyro.

Tac arbor Cupresso similis ex qua gummi Taxa, Rauvvolf.

Arbor cuius fructus Abhel Guilandino, Clus. hispan.

Habhel fructus, Clus. hist.

## JUNIPERUS.

**A**rabice ἰκὴν ἰκέρων: ἡ γὰρ τὸ τὴν ἀπὸ τοῦ ὀστέου, quod ejus odorem omnia reptilia adferantur: vel ἀπὸ τοῦ ἰκέρων τὰς ἀκρίδας νυμφαίους: Latine Juniperus dicitur, quod juniores & novellus fructus pariat, antiqui maturefcentibus: solam serè arborum sætus sui in biennium prorogare ajunt: cuius bacca cyparissides, in officiniu Grana Juniperi nominantur. Ejus verò lacryma, Vernix dicitur.

Genera: Diosc. l. 1. c. 103. cyparissides & quadam major est, altera minor: unum fructu, nuciæ ponticæ magnitudine reperitur: alterius verò solum aquat, ac rotundum est odoratum, dulci in mandendo ac subamaru. Arcentibus dictu. Plin. verò l. 16. c. 25. nec Juniperi florent: quidam duo genera tradunt: alteram florentem nec ferri: qua verò non floreat ferre, præteritum bacchi subnascensibus qua biennio bareant: sed id falsum: & l. 24. c. 1. Juniperus Cedro affimili: & ejus duo genera: altera major, altera minor: hæc Plin. Verum bacca in quibusdā gradibus, in alijs exigua: in his dulces, in alijs præorsu amara: alijs planè rotunda, quadam oblonga & acuminata.

I. Juniperus vulgaris fruticosa.

Juniperus, Brunf. Matth. Dod. ut: Lac. Tur. Lon.

Lob. Portæ, Ger. nostras, Cam.

Juniperus vulgaris, Trag. Clus. hist.

Juniperus minor, Fuch. Cord. in Diosc. Lugd.

Jylv. Cast.

Juniperus humilis, Gesn. hort.

Juniperi altera species, Ang.

Juniperus vulgarior, Ad.

Juniperi primum genus, Cæf.

Juniperus & Juniperus baccifera, Tab.

Hic describit etiam Juniperum majorem Germanicam, & fructum magnum verrucosum adpingit.

II. Juniperus vulgaris arbor.

Juniperus nata in Hispania, Plinio l. 6. c. 39.

Junipe.

Juniperus vulgaris celsior & arborefcens, Cluf. hisp. & hift.

Juniperus major fativa, Caft.

Juniperus urbana in arborem affurgens, Lugd.

Tales Thufcia alit, frequenter in agro Senenfi, ut Matthioli & Lugdunenfis monent: & in Hispania, ita ut ex ea trabes & ædium contignationes, multi fabricent, Clufio referente.

III. Juniperus minor montana folio latiore fructuque longiore.

Juniperus minima, Gefn. hort.

Juniperus alpina, Cluf. pan. & hift.

IV. Juniperus major baccæ cæruleæ.

Junip. maximus Illyricus cærulea baccæ, Lob.

an Juniperus alter, Cæf.

Juniperus major, Lugd.

Juniperus major Illyrica, Tab.

Juniperus maximus, Ger.

V. Juniperus major baccæ rufefcente.

Oxycedrus Theoph. & Galeni.

Cedrus phœnicea, Matth. Tab.

Oxycedrus, Dod. gal. Bellon cui & Juniperus, ruber, Cluf. hisp. & hift. Lugd.

Cedrus, Lac. Lon. minor & Cedrula, Gefn. hort. Cedrus magna five Juniperus peregrina, Cord. in Diofc.

Cedrus minor, vel phœnicea, Caft.

Oxycedrus phœnicea, Dod. Ger.

Juniperi prima species, five Diofc. Juniperus, Ang.

Juniperus major Monfpeliensium, Lob.

Oxyarceutis five Juniperus acuta, Adv.

an Juniperus montanus fructu flavo, Cæf.

Ertalch Scalig. grandior Juniperus, Lugd.

an Juniperus major Italica baccis rubris, Cam.

Alijs Cedrus Lycia Theophrasti.

VI. Junip. major fructu nucis magnitudine.

Juniperus major in Cupressi altitudinem affurgens, fructu dulci, Gallæ quodammodo simili eduli, nucleo olivæ nucleis simili, Bellon. quid?

VII. Arbor Americana oxyacanthæ similis.

Lignum exoticum, Cluf. exot. l. c. 6.

an affinis arbori Ertalch in Africa nascentis, cuius Joh. Leo in def. Africæ meminit, dubitat Cl.

Incolæ igne refinam eliciunt, qua picis loco utuntur.

## ASPARAGUS ET CORRUDA.

**E**τὶ Ἀσπάριον vel ἀσπάριον Galenus 2. alim. omnes propemodum teneros caules & tenera germina, seu ex oleribus & herbis, seu ex suffruticibus, seu ex fruticibus, arboribusq; vociter, attamen peculiari generi plantæ etiam tribuitur, qua sic dicta, quod cauliculos hos, qui prima germinatione à terra prodeunt, præcipuos habent.

Genera duo Dioscoridi lib. 1. cap. 152. petrea & fativa: & Galeno βασιλικοῦ regium & ἰλακοῦ palustre, sic enim Dioscorides, ἀσπάριον πτεράειον, quem μυρσάδιον (id est murinam spinam) vocant, vulgare est nota: & paulo inferius: Asparagum altitū, frutex est ramosus, folia habens multa, longa, semiculo similia, radice rotunda, grandi, tuberculum habente. Et Theophrastus 6. hift. 1. ἀσπάριον (hanc solam vocem per geminam Asparagum corrudam Gaza vertit) ex toto aculeata est, & nullum juxta aculeum solum gerit: & 6. hift. 3. juxta aculeos pusillum quiddam clava simile producit, ex quo stoculus tandem ipse erumpit: radice larga, alta, numerosa, eademq; tam crebra innititur, ut pars superna radicum tota connexa & continua reddatur, ex qua vel ipsorum caulium proventus scilicetatur, &c. Plinius lib. 19. cap. 8. omnium hortensium laetissima cura Asparagus, &c. Est & aliud genus incultius asparago, mitius corruda, passim etiam in montibus nascent, referit superiorū Germania campus non infacere Tibery Casari dicto, herbam ibiquandam nasci similitam asparago, &c. & paulo infra: indicavimus & Corrudam: hunc enim intelligo sylv. asparagum, quem Græci orminium aut μυρσάδιον vocant: & lib. 19. cap. 4. sylvestres fecerat natura corrudas, ut quisque demeteret passim &c. altiles spectantur asparagi: & lib. 20. cap. 10. Asparagi vires huius recensuit, subiungit: sylv. asparagum, aliqui Corrudam, aliqui Libycam vocant: Attici orminium huius efficacior vu & candidiore major: & lib. 21. cap. 16. in totum spina est Asparagus.

Asparagus folio molli.

I. Asparagus fativa.

Asparagus, Brunf. Trag. Matth. Fuch. Dod. gal.

Cord. in Diofc. & hift. Gefn. hort. (qui majoris

& minoris meminit) Turn. Lon.

Asparagus altitilis, Fuch. Tab. domestica, Bellon.

Asparag. Diofc. idē cum fativo & hortensi, Ang.

Asparagus fativus, Lac. Caft. f. ugd. Ger.

Asparagus hortensis, Dod. Adv. Cam.

Asparagus domesticus, Eyf. vulgaris, Lob.

Asparagi alterum genus, Cæf.

Hiccum in pratis Alfatix nobis vicinæ, & in pratis ad Danubium sitis, & in Burgundia circa Vesuntium spontè proveniat, hunc Plinium



intelligere censemus, cum in superioris Germaniæ campis provenire scribit, & hic dicitur Asparagus micior sponte nascens, Cl. hist. & hist.

II. Asparagus sylvestris tenuissimo folio.

Asparagus sylvestris, Matth. Cast.

Asparagi tertium genus sativo simile, qui Palatium leporis, Cæf.

Sola transplantatione & cultura à sativo differt.

III. Asparagus maritimis crassiore folio.

Asparagus *halimifolius* sive palustris, Galeno.

Asparagus palustris, Matth. Ang. Tab.

Asparagus marinus, Clus. hisp. & hist. Cam.

Asparagus maritimus Dioscoridis, Ad. Lob.

Asparagi alterum genus, Cæf.

Asparagus sylvestris, Ger.

*Asparagus Corrua distus.*

Corruam nonnulli distam volunt, teste Ruellio, quod ubi adolevit, facile corruat decidat: sic & Horminium, *ἀπὸ τοῦ ἰσχυροῦ*, quod est ruo.

I. Asparagus folijs acutis.

Asparagus petraea Dioscoridi & Galeno.

Corrua & sylv. Asparagus, Plinio.

Aspar. petraeus & Corrua, Matt. Tab. in ic. Ger.

Corrua, Dod. gal. Cord. hist. Rauv. Bello. Ad.

Lob. ico. Lugd. cui & Corrua Penæ.

Asparagi prima species, Ang. Cæf.

Asparagus sylvestris, Ges. ap. Lac. Dod. Cam. ep. sive Corrua, Bellonio.

Corrua prior, Clus. hisp. & hist. Tab.

II. Asparagus aculeatus alter, tribus aut quatuor spinis ad eundem exortum.

Asparagus sylv. alter, Dod. Ger.

Corrua altera Clus. hisp. & hist. Lugd. Tab. at in ico. Corrua Hispanica.

Corrua Hispanica altera, quæ Lusitana, Lob. at in icon. Corrua varietas.

Asparagi quartum genus, Cæf.

III. Asparagus aculeatus spinis horridus.

Polytricha Bellonio.

Asparagus sylv. tertius, Dod.

Corrua tertia, Clus. hisp. & hist. Lob. Lug. Tab.

Corrua Hispanica altera. Tab. in icon.

Asparagus sylv. spinosus, Ger.

Asparagi Theophrasti nomine, cui spina pro folio, ex Creta ab Honorio Belli accepimus.

IV. Asparagus acul. affinis triplici semper spina, Echinopoda Cretica, Hon. Belli ep. 2. ad Clusium, & Ponæ Ital.

Chenopoda Plinij suspicatur Hon. Belli.

Sic autem Plin. l. 11. c. 8. ceras ex omnium arborum satorumque floribus consingunt, excepta Tumice & Chenopode: plura non habet. Verum aliqui Echinopodolegunt, quam quidam Tribulum, alij Echibon, alij spinæ genus interpretantur. Sic Dalech. ad Athenæum per Echinopoda, Cardui Chij genus intelligit.



## SECTIO SEXTA.

CEDRUS CONIFERA; PEUCE SEU PINUS; PINASTER; LARIX; PITYS SEU PICÆA; SUCCI SIVE HUMORES PLANTARUM; GUMMATA;

Resinæ; Abies; Taxus; Draco arbor; Palma Dactylifera; Palma squamosa fructu; Palma nucifera; Nuces exoticæ & Arborea admirandæ.

### CEDRUS CONIFERA.

**K**Edr. Diose. l. 1. c. 105. arbor magna est, ex qua Cedria dista colligitur: fructum verò habet uti Cupressus, at grandiore multo: At Serapio, minorem legit. Et Guilandinus com. de Papyro vult eum esse arborem, quam sub Cupresso altera proposuimus. Theophr. 4. hist. 6. & 5. causa. Cedrum Syria gignit. eaq. ad triremes utuntur: 5. b. 5. ex Cedro simulacrum sculpere solent. Plin. l. 13. c. 5. Et majoris Cedri duo genera, quæ flores fructum non fert: frugifera non flores, & in ea antecedentē fructum occupat novus: semen ejus Cupresso simile: quidam Cedrelaten vocant: & l. 2. c. 5. Cedrum magna quam Cedrelaten vocant, dat picem quæ Cedria vocatur.

Cedrus conifera folijs laricis.

Cedrus major, Matth. Dod. gal.

Cedrus arbor conifera, Ges. hort.

Cedrus Hebræorum non Græcorum, forte Ce-

drus Syriæ Theophrasti, Ang.

Cedrus Diosc. & Sacrarum literarum idem, Ang.

Cedrus, Bell. (cui & Libani & Syriæ & in Amaleno) Rauv. Cæf. Tab. Libani, Ges.

Cedrus



Cedrus Libani quæ neque Dioscoridis neque  
Græcorum Cedrus est, Guil.  
Cedrus magna, Dod. Portæ.  
Cedrus Libani & Palæstina præcelsa, Ad. Lob.  
Cedrus phœnicia Matthioli, Lugd.  
Cedrus phœnicia nostra, Lugd.

Coni non dependens, sed sursum spectans,  
ut rectè Bellonius, Dodonæus & Dalecham-  
pius in hist. Lugdunensi, pingunt.

## DE PEUCE SEU PINU

**E**tsi nōn in nōre, à Gæza Pinus & Picea veretur, ab alijs tamen contrariis modo sit, & nōn Picea forte  
ob nominū similitudinem redditur: nec mirum, cum ut Dioscorides lib. 1. cap. 86. habet, nōre, vulgo nota  
arbor est, ejusdemq; generis est quæ nōre dicitur, siquidem hæc ab illa specie tantum differat: ita ut tam picea  
quàm pini fructus, qui in conis reperitur arboris, eodem cap. 87. momento, appelletur.

Genera: nōre Theophrasto 3. hist. 10. alia urbana, alia sylvestris: sylvestris duplex est, alteram Idæam,  
alteram maritimam vocant: harum rectior, celsior, materiq; celsior, Idæa: folio teneriori, imbecilliorq;  
maritima, & cortice laviore, utiliq; ad coria. Quod altera minus, Nux maritima totanda, brevior, debilis, &  
Idæa oblongior, viridis, minusq; bescens, tanquam sylvestris, &c. Idæa ramosior celsiorq; & picem copiosius  
grabet, &c. Macedonæi genus quoddam nōre simile dicunt, & marem brevior, folioq; durior: fœminam  
verò proceriorem, folijs pingui, mollem, procliviorq;. Marilignum circumcincta medulla durum & operi  
fabrili versuale: fœminatratu omnino facili atq; molli, quod quidem omnium ferè marium fœminatratumq;  
publica differentia est, ut cæsores materia asseverant, &c. ( & Plinius lib. 16. cap. 10. lignum maribus durum.  
& in fabrili opere contritum: fœmine mollius, publico discrimine in securibus ) Igitur nōre genera urbana  
atque sylvestris: sylvestris inas & fœmina, ac tertia sterilis. At Arcadia incolæ, nec sterilem nec urbanam  
nōre appellant, sed nōre, &c. Plinius lib. 1. in Europa sex genera cognatarum arborum ferunt (pinus, pinaſter,  
picea, larix, abies, tæda, taxus) ex his pinus atq; pinaſter, folium habent capillamenti modo prætenue, longumq;  
& mucrone aculeatum, &c. Pinaſter nil aliud est, quam Pinus sylv. mira altitudine & à medio ramosa, sicuti  
pinus in vertice: copiosiorq; pino dat resinam. Sic lib. 15. cap. 10. nucum pinearum genera quatuor recenset,  
1. grandissima, 2. Tascitina, 3. Sapiuca, & picea sativa, 4. ptyida, & pinaſter.

I. Pinus sativa.  
Pinus urbana folio perpetuo, Theophrasto.  
Pinus, Brunf. Trag. Dodon. ut: Bellon. Cord. in  
Dioſc. Lac. Turn. Lon. Cæſ. Caſt. Portæ: arbor,  
Gefn. hort.  
Pinus domestica, Matth. Tab.  
Pinus sativa, Ang. Lugd. Ger.  
Pinus vulgarissima, Adv. Lob.  
Pinus Italica, Cam.

Nucem *πυκνολογία* Theophrastus, alij *πυκνολογία*  
nucis & *πυκνολογία* vocant: & in hoc genere marem  
nucem rotundior, fœminam longior fer-  
re volunt.

II. Pinus sylvestris.  
Pinus sylv. montana Theophrasti.  
Pinaſter, Brunf. Trag. Tur. Gefn. hort. Lob. Cæſ.  
Thal. Portæ.  
Pinus sylvestris, Matth. Caſt. seu Pinaſter, Dod.  
Picea *βελανη*, Ang. (ut.  
Pinus sponte proveniens, Cord. in Dioſc.  
Pinus sylv. fructifera, Lugd.

In regno Congiano tanta copia, tantæque  
magnitudinis, ut inde naves conficiant: part. 1.  
Ind. or. 1.2. c. 1. & in insula Tercera scaphæ, cur-  
rus, rhedæ, & hujus generis alia opera extru-  
unt: part. 3. Ind. or. c. 6.

Sic in Andes nova Hispania, summa copia,  
ubi alia alba, alia rosea & fragrans: Joseph. A-  
cost. 1.4. c. 3. ubi de Cedro admiranda, verba fa-  
cit. Provenit etiam in Virginea & Florida.

Pinus sylv. montana, Tab.  
Pinus sylv. mug, Ger. ico.  
an Pinaſter. i. vel Austriacus major, Cluſt. hist. qui  
duplicem facit album & nigrum.

III. Pinus sylv. montana altera.  
Pinus tubulus, Plinius l. 16. c. 10. eadē, inquit,  
arbores (scilicet Pinus & Pinaſter) alio no-  
mine esse per ora Italiæ, quas Tibulos (strubus  
Hermolaus legit) vocant, pleriq; arbitran-  
tur, sed graciles succinioresque & enodes, li-  
burnicarum ad usus, penè sine resina.

Pinus sylv. Mug, Matth. Adv. Lob. Tab.  
Pinus sylv. altera, Dod. ut: sed edit. lat. tertia  
descriptio.  
Picea altera sive sylvestris, Ang.  
Pinus tubulus, Lugd.  
Pinus montana minor, Ger.

IV. Pinus sylv. montana tertia.  
Teda, Brunf. arbor, Lugd.  
Pinus sylv. cembro, March. Adv. Tab.  
Pinus sylv. tertia, Dod. gal.

Pinaſter, Bellonio.

Pinus ſylv. altera ſpecies, Dod.

Pinus ſylveſtris, Ger.

Plin. l. 6. c. 10. ſextum genus eſt Teda proprie dicta, abundantior ſucco, quàm reliqua. parcius liquidiorque quàm Picea, flammis ac luminis ſacrorum etiam gratia.

V. Pinus maritima major.

Pinus maritima prima, Matth. Tab.

an Pinus marina, Ang.

Pinus ſylv. quinta, Dod. gal.

Pinus maritima, Lugd. major, Dod.

Pinus maritima Theophrasti, Lob.

Pinus ſylv. montana, Ger.

Huc refer ſequentem, modo eadem non ſit,

Pinus ſylv. altera, Lob.

Pinaſter 2. & Pinus marina Theoph. Cluſ. hiſp.

Pinaſter alter Hiſpanicus, vel minor Hiſpanicus, Eid. hiſt.

Pini maritimæ majoris ramulus, Dod.

Pinus ſylv. ſive ſterilis, quia nuclej edules non ſunt, Lugd.

Pinus montana Theophrasti, Tab.

Pinus maritima major, Ger.

VI. Pinus maritima altera, Matth. Tab. Lugd.

Pinus idæa Theophrasti, Lob.

Pinus ſylv. quarta, Dod. gal.

Pinus ſylv. minor, Ger.

an Pinaſter primus, Cluſ. hiſp. & hiſt.

Hæc ab Auſtriaco majore, fortè tantum ratione ſoli diſtat, Cluſio monente.

VII. Pinus maritima minor.

an Piceæ genus alterum, Bellon.

Pinus maritima minor, Dod.

Pinaſter tertius, Cluſ. hiſp. Lob. Lugd.

Pinaſter tertius Hiſp. vel pumilo alter, Cl. hiſt.

an Pinaſtri alterum genus parvum in maritimis, Cæſ.

VIII. Pinaſter conis erectis.

Pinaſter pumilio, Cluſ. pan. Cam.

Pinaſter quartus Auſtriacus, Cluſ. hiſt.

IX. Pinaſter latifolius julis viſceſcentibus aut palleſcentibus, Cluſ. pan.

Pinaſter ſecundus Auſtriacus, Eid. hiſt.

X. Pinaſter tenuifolius julo purpureſcente, Cluſ. pan.

Pinaſter tertius Auſtriacus, Eid. hiſt.

Thæda, Tab.

Tæda ſive Pſeudopinus, Ger.

Hujus arboris ramos ſolent noſtrates Oenopolæ ante ædes ſuas proponere, ut Viennenſes Abietis teneriores ramos, & aliarum regionum incolæ Hederam.

XI. Pinus Indica nucleo purgante.

Pinei nuclej M. lucani, Acoſtæ, Monardi.

Pinei nuclej cathartici, Lugd.

Pinea purgativa, Caſt.

Pinei nuclej Indici, Fragoſo.

an Pinioen ſive Nuceſ pineæ ex Puna, Joſeph. Acoſt. l. 4. c. 29.

XII. Pino ſimilis Orientalis.

Cibage, Cam.

XIII. Pineos nucleos duros referens fructus.

Fructus peregrinus 8. Cluſ. exot. l. 2. c. 30. & in tab. 3. Lugd. Tab. Ger.

XIV. Pineæ nucis nucleo ſimile ſemen flavo ſpadiceum Braſilianum.

Fructus miſcellaneus 9. Cluſ. exot. l. 2. c. 15.

XV. Arbor ſpinofa fructu pineæ ſimili.

Cachi arbor ſpinofa, cujus fructus Ciccara, forma pineæ nucis, Scalig. Ludovico Romano, Nic. Coſtino, & ex his Lugd.

## L A R I X.

**Q**Uæ Larix aut Larex, etiam Græci *ἀδελφὴ* nuncupatur, à Theophrasto deſcripta ſuerit dubitatur: licet hæc vox in Gæzæ verſione reperitur: Gæzæ tamen Larix nihil aliud eſt, quàm niter Theophrasti, quam vocem plerumque Piceam interpretatus eſt: aſtramen interdum niter & vocem, per Piceam & Laricem ſimul expreſſit: ut videre eſt 9. hiſt. 1. ubi legitur *τιμωδον, νιτρον, ἀμυγδαλον* Gæzæ reddidit. *cerebinto, larici, piceæ, amygdala.* &c. Sic Plinius de Larice agens, ea qua Theophrastus nōn tribuit, omnia illa Larici adſcribit. ſic l. 16. c. 10. ſcribit: quinto generi ſitus idem. eadem facies, Larix vocatur, materies preſtantior, longè incorrupta, vix emori contumax, rubens præterea & odore acrior: pluſculum huic erumpit liquor, melleo colore atque lentore, nunquam dureſcenti: & mox: Larix nec ardet, nec carbonem facit. nec alio modo igni vi conſumitur quàm lapides. Verùm experientia Plinio contrariatur, & ipſiſuſ propria verba, dum inquit: in Macedonia Laricem maſculam vident, ſemina radiceſtantium. Et l. 16. c. 21. ei perpetuam comam tribuit, eum tamen in noſtra Larice contrarium contingat. Quare Gæzæ Larix, eſt niter Theophrasti: at Plinii Larix, eſt nōn Theophrasti. An forte hæc noſtra Larix, ſit Pinus urbana ſolito decidua Theophrasti. ſiquidem ſcribat

*Pini urbani genus quoddam solum habere perpetuum: sylvestri autem omni id perpetuum esse: ex quibus colligere licet urbani quoddam genus esse, cui folia decidunt, quod in sola Larice animadvertum est.*

Larix, Brunf. Matth. Bellon. con. Dodon. ut: Ex hac colligitur resina laricea, de qua inter  
Fuch. Gesn. hort. Lac. Turn. Lon. Adv. Lob. Cast. Resinas. Fungus etiam adnascitur qui Agari-  
Clus. pan. & hist. Lugd. Portas, Tab. Ger. Cam. cum dicitur, quemadmodum Larici adpin-  
Pani sylv. genus cui hyeme folia decidunt, Cæs. gunt, Lob. Tab. Ger.

## DE PITY SEU PICEA.

**P**ity à πύος differe videtur, Theopb. 3. hist. 10. quòd (scilicet Pinus) pinguior sit, folio tenuiori, magnitudine minor, erectaq; minus assurgit: praterea quòd eorum breviorum horridioremq; ferat, ac nucem magis resinofam. Ambabus folia capillata, sed Piceae materies candidior, similiorq; Abieti, atq; in totum minus spinosa. Et 3. hist. 6. quidam Pinum & Piceam florere existimant, quidam minime, sed Piceam nuncupari id est, nuncamentum gignere, quòd Grosius proportionem responder. Plinius lib. 16. cap. 25. Pinum Piceamq; ullo flore exhalari negat: experientia tamen refragatur. Et ut lib. 16. cap. 10. Picea plurimam resinam fundit, interveniente candida gemma, tam similis tibur, ut mista, visu discerni non queat, &c.

Genera duo ex Plinio colligimus, sativam & sylvestrem, illam Sapium, hanc Piceam nominat. Nam Sapium inferiorem & enodem Abietis partem significat: sicut superiorem partem nodosam durioremq; Fusternam, Plinio lib. 16. cap. 39. scribente: verum etiam arborem significat: hac enim lib. 16. cap. 12. habet: inter hac genera proprium quidam secere Sapium (Sapinum Turnebus legit) quomam ex cognatione earum feritur: eussq; arboris utras partes Tedu vocant, cum sit illa arbor nil aliud quam Picea, feritate paulum mitigata satu: Sapinum autem materies casarum è genere fiat. Sic Plinius ejus nucem Sapineam vocat: nam lib. 15. cap. 10. nucum Pinearum genera enumerans, tertium ait Sapinea, è Picea sativa, nucleorum cure verius quam putamine, adeo molli ut simul mandatur.

I. Picea major prima, sive Abies rubra.

Picea, Brunf. Matth. Ang. Cord. in Diosc. Gesn. hort. Lac. Lon. Adv. Lob. Cæs. cui & Tæda Plinij, Cast. Lugd. Thal. Tab. Ger.

Abies prima & rubra, Trag.

Abies, Dod.

Sapinus, Bellonio, Lac.

Picea Plinij & Abies mascula Theophrasti, Clus. pan. & hist.

Hanc alij Abietem marem Theophrasti: alij

Piceam pœcipue ejusdem 1. caus. 9. quam Gaza pediculiferam, Scaliger pediculariam interpretatur. Sic dicta Plin. 1. 16. c. 10. quod totis paniculis minoribus gracilioribusq; minimos ac nigros nucleos pediculis similes gignat: alij Tædam Plinij (de qua sub Pino quarta) faciunt.

II. Picea minor.

Picea pumila, Clus. pan.

Pinum tubulum sive tibulum Plinij, Dalechampia vocare videtur, Clus. hist.

## DE SUCCIS SEU HUMORIBUS

Plantarum.

**Q**uemadmodum multis animalibus pili & penna decidunt, & serpentes singulis annis exuvias deponunt: sic & plantæ folia, flores & fructus decidunt, & ex earum aliquibus humor superfluous profuit, at viribus lacryma: Ceraso, pruno gummi: picea, terebintho, lentisco, resina: alijs alius liquor quantitate molestus. Nam ut in animalibus sanguis turget, sic in plantis humor seu succus, qui si vel sponte prosiliat, vel arte educatur, ad earum conservationem facit: nam & plantæ suæ venas & nervos habent, per se nomine carentes, ut habet Theophrastus 1. hist. 3. quæ similitudine quadam nomina partium animalium sortuntur. Sanguis autem plantarum, earum succus proprius est, ut in Ficibus lac, secundum Aristotelem 1. de plantis: in Fice veluti humor: in quibusdam veluti oleum: in alijs picea quida similis: in nonnullis, ut gummi. Et ut Theopb. 1. e. humore plantarum deficiente, & ipsa deficere incipiunt, eòq; exsiccat, tabescunt: quem humorem nonnulli simpliciter & in succum in cunctis appellant, quidam absque nomine relinquunt: in quibusdam verò & in succum, inq; alijs Adnascitur lacrymam vocant. Idem ferè habet Theophrastus 6. caus. 17. & hic pro collisione diversitate, diversam crassitatem & colorem nascitur. Nunc si huius humoris consistentiam consideres (ex Theopb. 9. caus. 17.) alij callores, lentioresq; sunt: alij aequi, minusi, levari: hinc alij densari possunt, alij nequeunt: nonnulli etiam quòd densentur, atque concrecant, aliquid miscent. Quare succus plantarum, qui

humior est, quo planta nutritur, quique non sponte, sed precedente expressione, aut alia preparatione elicitur: quique, semper, tenuior est, nisi calore exsiccatum, induretur. Lignor vero sive *ἀνδρ*, crassior est, qui interdum sponte, interdum incisione delabatur, & velut lacryma profluit, unde communiter *ἀνδρ* lacryma vocatur. Qui si oleaginosus & liquidus fuerit, *πυρρὸν* dicitur: si terrestris, aqueus & in truncu arborum concretus, *νύμφη* gummi: qua vero naturam mediam inter gummi & resinas possident, & partim terrestria & aquea, partim oleaginea & pingua sunt, *νύμφη* partim gummi resina nominatur. Sed de succu inspissatu primum, dein de gummatibus, tum de Resina, & tandem de Pice.

De succu inspissatu.

I. Ammoniacum, *ἀμμωνιακόν* Dioscoridi l. 3. c. 98. est Ferulæ (*ἐνερ*) liquor, & totus cum radice frutex Agasyllis appellatur: Galen. 6. simpl. Ferulæ lacryma. Plinio l. 12. c. 23. Hammoniacum lacryma, ab Hammonis oraculo nomen habet, juxta quod gignitur arbor, quam Metopion vocant, resinæ modo aut gummi.

Ammoniaci lacryma, Matth.

Hammoniacum seu gutta Hammoniaca, Cord. histor.

Ammoniacum, Cæs.

Armoniacum officinis & Gummi ammoniacum.

Probat Dioscorides l. c. bene coloratum (exterius flavum, intus candidum) ligni & calculorum expers, rhuris glebarum granorumve similitudine, syncerum ac densum, nulla sorde spurcatum, castorei odore, & gustu amarum: quod genus *θραυστόμα* (thrauston Plinio, quasi dicas fragmentum) appellatur: alterum, quod terræ calculorumve particeps est, *φύρμα* (Phryma Plinio, i. e. mixtura) dicitur: & hoc ad medicamenta in aqua resolvitur.

II. Galbanum, *γαλβανόν* Diosc. l. 3. c. 97. liquor est Ferulæ in Syria nascentis, quam nonnulli Metopion vocant: Gal. 8. simpl. *γαλβανόν* succus est plantæ ferulaceæ: hoc secundum eundem l. de Antidot. in Sagapenum convertitur. Plin. l. 12. c. 25. Galbanum dat & Syria in eodem Ammono monte, è ferula ejusdem nominis resinæ modo, quam Stagonitin appellant, de qua & l. 24. c. 5. At Theoph. 9. hist. 7. Chalbānum in Syria nascitur ex Paco vocato.

Galbanum, Matth. Cord. hist. Cæs.

Probatissimum quod rhuris effigiem præbet, colore maximè flavum (tale enim recens est gummosum purum, pingue, minimè lignosum, odore gravi, nec valde humidum, nec penitus aridum, & cum accenditur clarum, flammam nutriendum: hoc Dioscorides resinā & ammoniacum, Plinius vero Sagapenum, adulterari scribit.

III. Opoponax *ὀππωνάξ* Diosc. lib. 3. cap. 55. ex Panacis Heraclei radice confusa colligitur. Gal. 8. simpl. radicibus & caulibus: at Mesuæo, ex ferulaceo panace: nonnullis ex Chironio. Opoponacis Plinius lib. 20. cap. 24. in Theriaca meminit.

Opoponax sive Opoponacum, Cord. hist. Lugd. Opoponax, Cæs.

Probat amarissimum, intus candidum aut subflavum, foris ad auri colorem inclinans, læve, pingue, Galbani instar lentescens, friabile, graveolens, & dum resolvitur propius ad lacteum liquorem accedens.

IV. Sagapenum: *σαγαπένον* Diosc. l. 3. c. 95. ferulaceæ herbæ liquor, quæ in Media nascitur: Gal. 8. simpl. ex planta ferulæ (panaci addit Clusius) a simili. Sanè ipsa planta Sagapenum dicitur, at liquor abusivè hoc nomen obtinuit, rectius Sagapeni succus diceretur. Plin. l. 20. c. 18. Sagapenum, Hammoniaci lacrymæ simile. Sagapenum officinis Serapinum, Matth. Cord. histor.

Sagapenum, Cæs.

Probat quod sincerum, pellucidum, foris rufis, intus cum frangitur flavis aut candicantibus guttis compactum, inter digitos lentescens, medio inter Silphium & Galbanum odore, acrique gustu: & ut Asa fœtida resolvitur.

V. Meconium, *μικονιον* Diosc. lib. 4. capite 65. succus est, ex papaveris nigri folijs & vasculis tufis expressus & exsiccatum, quem privatim Græci *μικονιον* vocant, sed liquore vitibus multò imbecillior est: propter aqueam & incoctam substantiam. Eidem l. 6. c. 17. *Μήκων* *ἐνερ* dicitur. Plinio l. 23. c. 1. Meconium: licet eidem l. 20. c. 19. Mecon tithymali species sit: & lib. 27. c. 12. meconion aphrodes, peplos est. Meconium, Lugd.

VI. Opium, *ὀπὸν* *ἢ* *μύκων* Diosc. l. 4. c. 65. est liquor lacteus, qui ex papaveris nigri scapo leviter inciso colligitur: ubi colligendi modum docet.

Opium

Opium, Matth. Cæs. Lugd.

Opium nigri papaveris liquor, Cord. hist.

Opium, Oſium Mauritanis, Garz. Frag. vide Acoſtam.

Amſion ſive Opium, Linſc. par. 4. Ind. Or. c. 14.

Opium triplex eſt: album quod è Cairo adfertur, quod forte Thebaicum: alterum nigrum & durum, ex Aden: terrium flaveſcens magis ac mollius ex Cambaja & Decan, Garz. Linſc. lib. c. at Fragofus, albicans & nigri tantum meminit.

Ex Papavere nigro elicitur, Plin. l. 20. c. 18. & Avicennæ: at apud Turcas ex papavere albo, qui totos agros, ut nos tritico conferunt, cum apud eos & Perſas in quotidiano uſu ſit, at drachmæ unius pondus: ejus enim uſu ſe animoſiores fieri credunt, neq; belli pericula reformidare, Bellonio ſcribente: & ut Linſc. l. c. qui ſemel, ſed ſenſim, niſi indies iteret, brevi tabidus moritur: & ſi per dies quatuor aut quinq; intermittat moritur. Paludanus in Linſc. ſcribit, Turcis privato nomine Maſlac vocari, & ab ipsis indies piſi magnitudine devorari.

Probatum candidum, vel leoninorum pilorum modo flaveſcens, in maſſam veluti ex granulis diverſi coloris coactum grave, denſum, ſolidum, ſine ſordibus exiſtens, amarum, guſtu calidum, odore gravi & viroſo, ſomnum inducens & in aqua promptè liqueſcens, Bellonio & Paludano monentibus: & hoc in Aſia minore in placentulis unciarum quatuor, vel ſe libꝛe pondogitur. Quis ergo noſtrum adulteratum eſſe non animadvertit? Attamen ex eo quod adfertur, eligendum, purum, colore maxime ruſſum aut ſpideum, cum frangitur, ſplendore quodam nitens & quod facile diſſolvitur, ſed non ceræ inſtar lenſificens.

VII. *Αλν*, Aloë & de herba & ejus ſucco denſato dicitur: ex Aloë, Dioſ. l. 3. c. 25. (*ἰνισμα*) ſuccus coactus ex India adfertur.

Genera duo (*ἰνισμα*) ſucci: alterum arenofum, quod veluti ſæx & craſſamentum puriſſimæ eſſe creditur: alterum (*ἰνισμα*) ad jecoris imaginem vergit, Dioſc. l. c. Recentioribus illam Caballinam, quodd equis & veterinarijs medicandis dicata ſit: hanc Hepaticam, quodd Hepatis modo coacta ſit, nominat: quam etiam nonnulli Succotrinam, quaſi ſucco citrina, quod ejus pulvis citrinus ſit. Vel potius Socotrina (ut Linſc. p. 4. Ind. Or. 6. & p. 4. c. 18.) à ſolo natali

Socotra Inſula, quæ alijs omnibus præſtat, ſolida atq; compaſta. Sunt tamen qui has differentias faciunt, ſuccotrinam, ſubcitrinam & optimam: alteram Hepaticam, nigriorem ſynceram ramen: 3. Caballinam, lividam, arenofam.

Aloë, Matth. Cord. hiſt. Lugdun. Aloë ex India, Cæſalp.

Eligenda pinguis, nitida, calculorum expers, ſub flava, hyeme friabilis, æſtate molliuſcula, hepatis modo coacta, facile humeſcens, eximieque amara: nigra contrà, fractuque contumax, improbanda: lavanda quin etiam & quod arenofum ſubſtitit abjiciendum, pinguiſſimum & quod leve eſt recipiendum: hæc Dioſc. l. c. Apulam & Hiſpanicam ſucco faciendi inutilem Cordus ſcribit: at quomodo tam Hepatica, quam Socotera dicta, ex noſtra Aloë elici poſſit, eleganter Doſtiſ. Fabius Columna in ſua plant. inopari offendit.

VIII. Succus Aloë facie.

Tratuch & Aiave ſuccus primus & America, Muſæ ſolijs involutus, Cluſ. ex. l. 4. c. 7.

IX. Scammoneum *σκαμμονία*, Scammoneæ plantæ ſuccus, qui ex radice lactei ſucci plena incifa & exſiccata reſervatur: cujus modum Dioſcorides l. 4. c. 171. docuit.

Scammonium, Plin. l. 26. c. 8. vocat: quem tantum uſui eſſe, Theophraſtus 9. hiſt. 12. ſcribit. Scammonium, Matth. Cord. hiſt. Cæs. Lugd.

Scammonea officinis ad Arabum imitationem hic ſuccus dicitur, qui denſatus in maſſas cogitur, & exſiccatus fuſcus, aut lividus, aut cinericeus, aut ſulvus redditur.

Differentiæ hujus ratione loci apud Dioſc. & Plinium: ille, quem quæ ex Myſia regione Aſiæ deportatur, commendat: natione autem Syriacum & Judaicum deterrimum haberi, ervi farina & Tithymalo adulteratum. At Plinio laudatur Colophonium, Myſium, Prienneſe: adulterinum verò fieri ervi farina & Tithymali marini ſucco, in Judæa ſerè, quod deprehendatur guſtu, cum Tithymalus lingua excaleſciat, &c. Quodd verò Scammonium noſtrum, notas à Dioſcorid. tributas non habeat, cauſa putatur, quodd hoc tempore veterem parandi modum non obſervent, ac non ex radice incifa, ut Dioſcorides docuit, ſed prorſus diſſecta, vel expreſſa, aut b ſtipitibus & ſolijs contuſis paretur: alioqui tanta Scammonij copia quotannis vix afferri poſſet: vel etiam lacte Tithymali adulteratum.

Opti-



Optimum est quod ex Anthiochia defertur, dein Armeniæ, Europæum omnino prævum est. Probat quod pellucidum, læve, rarū, spongiæ instar foraminosum, colore cum frangitur fulvum, taurini glutinis modo translucens: nec vehementer linguam excalefaciens (quod admittit Tithymali argumentum est) & cum linguæ affricatur, in candidissimum liquorem lacti similem se superficie resolvens: cito liquefcens, friabile, nō valde ponderosum, nec tetri odoris. At glebæ ingentes nigrae & graves, aut adulteratæ sunt, aut succus est ex tota planta expressus.

Hujus vehementia corrigitur à quibusdam Aloë addita; sed rectius, si Malo cydonio excavato indatur, pasta circumdetur, ut veteres fecere: aut ut alij, in succo Cydonio coquatur: melius verò si semina sceniculi, anisi, dauci adderentur. Sic correctum Diacrydium, quasi lacrymula dicitur, in officinis Diagredium, quod nimis recens, vehemens: antiquum imbecillum, quare tormina excitans: bimum optimum est.

X. Elaterium, *ἑλατήριον* Dioscoridi l. 4. c. 155. & Theophrasto 9. hist. 10. dicitur (Gaza agitata verit, fortè quia motu turbatorio corpus exagitat) Elaterium Plinio l. 20. c. 1. Hoc Dioscorides ex succo fructus, addito extrahendi modo: Theophrastus ex semine (fructum intelligens) liquato: Plinius ex succo è semine exprello fieri scribit. Hoc à bimatu ad decennium colore candido utile, Dioscoridi: Ægineta, quod anno antiquius non est, & quod virefcit probat. Theophrasto, omnium medicamentorum diuturnissimum, & optimum quod vetustissimum: hinc Plinius ex Theophrasto 9. hist. 14. ducentis annis servatum meminit. Hoc Hippocrates usus fuit, nunc verò ob ejus vehementia, non facile usurpatur. Elaterium, quod leve & candidum & igue instar pinguedinis accenditur, Bellon. Elaterium, Matth. Bellon. Cæs. Lugd.

Plinius l. 20. c. 1. meminit Cucumeris sylv. in Arabia nati, heliotropio simili, semine nucis juglandis, quod semine & Elaterio contra serpentes efficacissimum sit: hoc necdum novimus.

XI. Euphorbium *εὐφώριον*, succus est acerrimus, arboris ferulae speciem gerentis, Diosc. l. 3. c. 96. qui & colligendi modum docet, ut supra, l. 10. sect. 6. ostendimus: At Dodonæo non arbor, sed herba potius est, cujus folijs incisus li-

quor acerrimus, facileque concrefcens effluit: verum ætate arborefcere videtur.

Euphorbium Plinio.

Euphorbia, Matth. Cæs. Lugd. euphorbiae nominatæ plantæ liquor, Cord. hist.

Genera duo sunt: unum Sarcocollæ modo pellucidum, flavum, pisi magnitudine in guttas æquales densatum, modicè cavernosum: alterum in utriculis quibus excipitur, in massam densatur, candicans, aut vitri colore: adulteratur Sarcocolla, aut gummi & tithymali liquoris admixtione. Eligendum est purum, translucens, candidum aut flavum & acre, quod levi linguæ contactu os accensum diu detinet: quare etiam non sine molestia tunditur, nisi naribus diligenter obturatis & munitis.

XII. Succus liquiritiæ: ex radicibus succus exprimitur, & in pastillos condensatur ex Cappadocia, Hispania, etiam Bamberga ubi frequens est, adfertur.

XIII. Succus Acaciæ: ex Acacia in Ægypto (*ἰχθυόσμη*) succus exprimitur, qui in umbra siccatus, ex maturo quidem fructu niger, ex immatura subfervus redditur: aliqui tamen è folijs una cū ipso fructu exprimunt. Eligendus modicè fulvus & odoratus: hæc Dioscorides l. 1. c. 133. Acacia legitima, Matth. Lugd.

XIV. Acacia Germanica: ex prunis sylvestribus coctis succus exprimitur, insolatur & exsiccat, & tessulatim divisus, Acaciæ veræ loco asservatur. (Lugd. Succus è syl. prunis, Acaciæ succedaneum, Matth. Acacia Germanica, Dod.

De Manna,

I. Manna.

*ἀσπράγμη* & *ἀσπράμη*, Galeno.

Melleus humor in Robore, Theophrasto.

Mel ex aëre, cui cœlestis natura, Plinio.

Men, Siracost & Terniabin, Arabibus.

Thereniabin & Trungibin, Serapioni & Avicenna.

Manna purgatoria, March. (Cennæ.)

Drosomeli, Cord. hist.

Manna & mel roscidum, Cæs.

Manna, Persis Xercest, sive Xerkest, id est Lac arboreum, Linc. Cor. part. 4. Ind. or. 29.

Est autem Manna seu Mel aëreum vapor terræ succosus & optimus, æstatis calore elevatus, & in aëre in dulcem liquorem excoctus, noctis frigore coactus, & roris modo supra arborum & fruticum folia decedens.

II. Man-



## II. Manna liquida.

Cedrium mel Hippocr. Ros Libani Græcis, Bel. Terniabin Arabibus & Turcis, Eid.

Manna mellis instar liquida, Linscot.

an Manna Germanica liquida flava, & eu Syrupus folijs insidens, liquidum permanens, dum ab apibus auferatur, Cord. hist.

Hæc in monte Sinai colligitur, & instar mellis in fistilibus, Cairum venalis defertur.

## III. Manna officinarum.

Manna nostra laticæ, Rauvvolf.

Manna durior & concreta, quæ Mannæ nomine Cairi officinis reperitur.

Hæc communiter Calabrica nominatur, quia in Calabria circa Canis ortum ex Fraxino & Orno, ab incolis in usum medicum colligitur: quæ duplex in officinis.

Granata, quod minoribus granulis constet.

Masticina, quæ majoribus & masticis guttis propæ æqualibus.

Vel Manna foliorum, quæ minutioribus micis constat, quia ex folijs colligatur: & Manna corporis, quia ex ramis arboris habetur, Cæf.

Eligenda candida, recens, anno non vetustior: ruffa enim & fusca, in veterata est: adulteratur saccharo penidio, herbarum folijs circumvoluto: & quæ Sennæ folia granis suis amplectitur, factitia est.

In Apennino quoque, aliquando in canicularibus promiscuè in pluribus arboribus, sed præcipuè in Quercu & Salice colligitur, nunc concreta similis Calabrichi, nunc liquidior melli similis, Cæf.

## IV. Manna Persiana granis Coriandri.

Transchibil, mannæ species, quæ ex spinoso frutice, quem Arabes Agul & Alhagi vocant, colligitur, forte Manna Israëlitarum, Rauvv.

Mannæ genus aliud, Tiriam Jabyn, seu Trumbibyn dictum, quod ex floribus alijs quoque & folijs legitur, magnitudine seminis cannabini, colore rubro: cujus in Ormo & Persia, non verò India, usus est, Linsc. part. 4. Ind. Orient.

Ex Syria longè candidior Italica adfertur duplex: Masticina, quæ translucida Mastiche similis: Bombycina, minimè translucida, candore Gossipij, Matth. Cæf.

## V. Manna Calabrichæ similis Persica.

Mannæ tertium genus, cujus fragmenta folijs adhuc cohærentia advehuntur, Linscot.

## VI. Manna Armeniaca.

Manna fustis pugni magnitudine, fusci colo-

ris fortè Manna Alhagiezi Avicennæ, Rauvv.

## Succus exotici.

## I. Succus laxativus est flavo rufescens.

Succus undecimus qui Ghitta jamau dicitur, Cluf. ex. l. 4. c. 8.

Gutta Gamandra: gummi gorta: gutta gemau: gummi Peruanum alijs: alijs succus Gambici, vel Crambici.

Cattagauma, vel genu, Burgraf. in Achille.

Hic ex Sinarum regione adfertur: & aliqui Euphorbij succum censent, sed arbor tanta non est: alijs Rhamni solutivi: alijs Cataputiæ succus: alijs ex Scammonio & Tithymallo compositus nonnulli compositum ex Chelidonia majoris succo Scammonæ & Croco suspicantur: alij ex succo corticis mediani Frangulæ. Quid si fortè succus è floribus Ricini Indici expressus, & exsiccatus, cujus in Hydrioporum ferolis humoribus ducendis insignis usus.

an Gummi ad podagram ex novi orbis continente, quo isthic podagrici se purgant, Monardi, Lugd.

## II. Succus splendens Anethi odore.

Ufuc & Gyp succus 2. ex Amer. Cluf. ex. l. 4. c. 7.

## III. Succus Aspalatho similis Anethi odore.

Succus primus concretus à Gareto, Cluf. exot. lib. 4. cap. 8.

## IV. Succus colore albo, flavo &amp; rufo mixtis Anethi odore.

Succus quintus à Gareto, Cluf. l. c.

## V. Succus cinereus fœniculi odore.

Succus nonus, Cluf. l. c.

## VI. Succus aspalatho similis ater micis albis aspersis odoros.

Succus tertius à Gareto, Cluf. l. c.

## VII. Succus aspalatho similis inodorus.

Succus ater à Gareto, Cluf. l. c.

## VIII. Succus atrorubescens inodorus.

Succus decimus, an Bixa Oviedi, Cluf. l. c.

## IX. Succus flavus albis granis commixtis, gravi odore.

Succus quartus à Gareto, Cluf. l. c.

## X. Succus visco similis colore vario.

Succus circa bacillum concretus, Cluf. l. c.

## XI. Succus masticinæ resinæ non abfimilis.

Succus sextus à Gareto, Cluf. l. c.

## XII. Succus succino non abfimilis.

Succus septimus Anime similis, Cluf. l. c.

## XIII. Succus Sanguini draconis affinis.

Succus duodecimus, Cluf. l. c.

XIV. Succus camphoræ redolens ex radice Canellæ vulneratæ, Garz.

Canellæ liquor est viridi cortice præsertim radicis cum inciso, Acostæ.

# D E G U M M I

**G**ummi (nōnum Græci) lacryma est, in truncis arborum ipsam producentium coagulata & concreta, Galeno 7. simpl. cuius substantia magis aquea est, ut Resina oleaginosa: quare Gummi aqueum facile, oleaginosius difficiliter misceatur: contra Resina, quæ etiam flammam facile concipit, cum Gummi in igne crepiat, etsi calidum stillando procedat, ubi tamen aërem contrigerit, coagulatur & aqua simile est, ut Aristotelis 2. de plantis, verbi utar: quare id prunis ardentibus injectum, fragorem edit. Verum, ut idem Aristoteles, quedam quomodo concha & lapidei coagulantur, alia molliuscula: quedam pellucida, aureo colore flavescencia, alia obscura, pallidiora. Nunc ad specialia.

I. Gummi Arabicum: à Serapione sic dictum, quia ab Arabia regione Ægypto contermina importabatur.

*Karab* in vās ānq̄v̄r, Diosc. l. 1. c. 133.

Commis ex spina Ægyptiaca, Theoph. 4. hist. 3.

Gummi ex Ægyptia spina, Plinio l. 13. c. 11.

Gummi Acanthinum, Celsus, l. 5. c. 1.

Gummi Thebaicum, Galeno, nonnullis Babylo-nicum, quod Gummi est à Græcis simpliciter sic dictum, Matth.

Gummi Acaciæ, diversum ab Arabico vulgaris usus.

Gummi Arabicum & Acaciæ gummi, Bellon.

Gummi quod Arabicum cognominatur, Cord. histor.

Gummi Arabicum, Lugd.

Probat Dioscoridis vermiculatum, vitri modo pellucidum, ligni expers: proximum est candidum: at resinosum ac sordidum inutile est.

II. Gummi tragacanthum: quod ex radice plantæ spinosæ ejusdem nominis vulneratæ effluit, Diosc. l. 3. c. 13. qui *ἀνιμ* vocat, quamvis Theoph. 9. hist. 8. sponte profluere asserat.

*Τραγανθου*, Gal. & simpl.

Tragacantha lacryma, Matth. Lugd.

Dragaganium officinarum.

Gummi Tragacanthæ, Bellonio.

Tragacanthum, Cord. hist.

Probat Dioscorides pellucens, læve, gracile, purum ac subdulce: Vel eligito candidissimum, purum, æqualiter translucens, & cuius minima peritio, maximam aquæ copiam coagulet: & hoc non nisi pilis & pistillo calidis lævigatur.

## III. Sarcocolla.

*Σαρκολλη* (*ἀνιμ*) lacryma arboris in Perside nascentis thuri tenui similis, subpulva, gustu amariuscule, quod *ἀνιμ* admixtione adulteratur, Diosc. l. 3. c. 99. Sic Galeno & simpl. lacryma arboris Persicæ. Plinio l. 13. c. 10. fit & ex Sarcocolla,

ita vocatur arbor, gummi utilissimum, simile pollini thuris, & ideo candidum quam rufum melius: & l. 24. c. 14. sunt qui Sarcocollam spinæ lacrymam putant, pollini thuris similem, cum quadam acrimonia dulcem.

Sarcocolla, Mani. Lac. Cord. in Diosc. & hist. Cæs.

## IV. Gummi Hederæ.

*Καρδ* *ἀνιμ*, Diosc. l. 2. c. 210. Galen. 7. simpl. Lacryma hederæ, Plinio l. 24. c. 10.

E maiore Hederæ trunco vulnerato, & interdum sponte lacryma quedam, & gummeus succus exit, ex flavo rubescens, odore gravis, sapore acer.

## V. Cancamum.

*Καγκάμ*, lacryma est Arabicæ arboris (folia Myrti habentis, Amato) myrrham quadante-nus referens, visosi gustus, quæ tanquam thymiamare, id est, suffimento utuntur, Diosc. l. 1. c. 23. Et ut Plin. l. 12. c. 20. ex confinio Casiæ, cinamidq; & Cancamum ac Tarum invehitur. Verum illud Anime, hoc Agallochum sylv. Dalechampi-us in Plinium, credit.

Cancamum Dioscoridis, Laccam dicunt Serapio, Ægineia, Maithiolus: at Brassyolas, Garzias, Clusius, res diversas faciunt: aliqui non modò diversum, sed & incognitum putant: quidam Cancamum Dioscoridis, Benlvi esse volunt. Anijum, Amato.

Anime (quod ex Æthiopia Arabiæ finitima in Lusitaniam advchitur) Monard. Frag. & par. 9. Ind. occid. l. 4. c. 29.

Anime vulgo, quasi Aminea Myrrha, Cæs.

Anime triplex habetur: 1. fulvescit & pellucidum est: 2. nigricat & taurino glutini sive Colophoniæ ferè simile, vel Myrrhæ, quam & Minæam, à terra ubi præcipue nascitur, Dioscorides appellat.

Aminea Serapioni, unde Lusitanis corrupte pro Minea vel Aminea, Anijum & Hermolao Myrrha

Myrrha Aminea : 3. pallidum & retorridum, Clus. & Lugd.

Sic alia ex Hispania nova sive America, quæ Monardi Orientalis : alia candidior orientali, de qua Garzia & Cancamum Græcorum esse vult : licet aliqui Succini speciem suspicentur.

#### VI. Lacca officinarum.

Lac legitimum nomen, sic dicitur, quod hoc medicamentum, cum ejus ~~est~~ est, in Loc sive mellis crassitiem dissolvitur : & ubi præstantissimum nascitur, Trec nominatur.

Myrrha similis Avicenna.

Chermes Atarum quorundam.

Formicarum alatarum sterus, Amato.

Formicæ enim hanc Laccam elaborant, materiam ex arbore exfugentes (unde plerunque formicarum alæ permixtæ conspiciuntur) & hos ramulos arbore avulsos in umbra siccant, Garzia monente. Fortè rectius dixerimus, lacrymarum & reliquorum Gummi modo, sponte exudasse & concrevisse. Verùm & in arbore Benifera reperitur. Cancamum, officinarum Lacca, Matth. Cord. in Diosc. & hist.

Lacca Arabum & officinarum, an Cancamum Dioscoridis, Lob.

Lacca, Garz. Acolæ, Frag. Clus. Lugdun. (qui Cancamum esse negat) Tab.

Gummi Laccæ, legitimum est Cancamum, Cæsalp.

Lacca à Malajis Cajulacca dicta, ex qua ceram Hispanicam conficiunt, Linscot. part. 4. Ind. or. c. 24. & fig. 18.

Duplex habetur : ea quæ cum bacillis, vix enim sine ijs adfertur, quam Laccam Sumetri vocant, quia ex Sumetra insula, id est, Taprobana habetur : ut eam quæ in glebis sine furculis affertur, Laccam Comberti nominant : & altera factitia, qua insectores utuntur, quæ & suas differentias habet.

#### VII. Sanguis draconis officinarum.

*Alia dicitur, Diosc. l. 5. c. 109.*

Cinnabari seu sanguis draconis, Cord. hist.

Sanguis draconis, Matth. Cadamusto, Thevero, Monardi, Cæs.

Sanguis draconis verum est Cinnabarum Diosc. Cast. Cæs.

Est arboris exoticæ lacryma, nam statò anni tempore arbores ferro sauciantur, quæ anno sequenti gummi emittunt, quod coctum & defœcatum hoc gummi efficit : in Africa, in parva

quadam insula Atlantici Oceani prope Mederam : nunc laudatissima ex Carthagine Pertuana adfertur. Arborem hanc primus Clusius, arboris Draconis nomine exhibuit. At Acolæ, in India arbor Ber, sive Malus Indica dicta, æstate alatis formicis perpetuò onusta conspicitur, quæ in ejus ramis Laccam elaborant. Cinnabarim Dioscoridis, Solinus & alij censent, (at Clusius subdubitat) fortè quia Diosc. l. c. scribit, Cinnabarim altè & abundè coloratam esse, & eam ob causam quosdam *aliam dicitur* appellasse.

Duplex habetur, nativum & quoddam factitium, panibus coactum, ex rubrica & pice colophoniam, quo potissimum veterinarij utuntur, Cæs. Frag.

#### VIII. Asa fœtida.

Asam aliqui duplicem faciunt, aliam dulcem sive odoratam, aliam fœtidam : hanc Altit Arabum : illam Belzoinum officinarum esse, & utrumque è Laserpicio profluere volunt. Hic de Asa fœtida, quæ gummi est Laseris sive Laserpitij plantæ ferulacæ, quæ *elaboratur* Dioscoridi l. 3. c. 94. dicitur, ex cujus radice atque caulibus incisis (*ἐκ τῆς*) liquor hic colligitur.

Altit, Avicennæ : Anjuden, Indis.

Asa, officinis, sed rectius Asa, quasi Laser, fortè voce ex Laser corrupta.

Asa fœtida, laserpitij species, Cord. histor. Lugd.

Succus Lybicus, interdum Medicus & Syriacus, alias Cyrenæicus, à loco natali vocatur.

Duplex Theophr. 6. histor. 3. alter ex caule, quem *καυλίον* Scaparium : alter ex radice, quem *ρίζιον*, radiceum vocabant : & Plinio lib. 19. cap. 3. duo sunt nomina, Rhizias, atque Caulias vilior illo : & lib. 22. cap. 23. Silphium venit primo è Cyrenis : nunc ex Syria importatur, deterior Parthico, sed Medico melior, extincto omni Cyrenæico, &c. In officinis sæpe duplex : una pura & translucens : altera impura & turbida, cui Sagapenum (quo adulterari Diosc. scribit) cujus odorem refert, permiscetur, unde Germani Diaboli sterus nominant : utraque tamen gravis odoris est. Cujus si usus esse debeat ad medicamenta liquida, aqua aut aceto, aut vino injectum supra prunas resolvenda, & quod in fundo manet rejiciendum : vel per colum cui adhærebit, transmittendum.

IX. Gummi ex Molle fœniculi odore.  
Gummi album ex cortice arboris Molle, Lugd.  
a Succus octavus, Clus. exot. l. 4.

X. Gummi caryophyllorum, similis facultatis cum resina Terebinthina, Garz. Frag.  
Gummi ex atro rufescens, inter Caryophylla interdum reperitur, Clus. in Garz.

XI. Camphora officinarum,  
Capur & Casur Arabum, Garz.  
Camphora ex genere bituminis, Cæs.  
Caphura, Matth. Cast. (qui arborem adpingit) Lugd.

Camphora, vulgo Alcanfor, Frag.  
Est gummi-resina pellucida, candida, ex rimis arboris peregrinæ, juglandi nuci simili, folijs salignæ similibus, Garziæ: Dioscoridi & Græcis veteribus incognita: è recentioribus Aëtio & Sethi cognita.

Insula Borneo, arboribus camphoriferis refertissima est, nec preciosior in Oriente camphura habetur, Linsc. part. 2. Ind. or. c. 24.

Differentiæ duæ: 1. Caphura de Burneo, quæ rarò adfertur, & omnium nobilissima: (part. 9. Ind. occid. additam) altera ex Sina in Europam adfertur, Garz. Acoftæ, in panes orbiculares coacta: Et Arabes genera quatuor constituunt, in caput, pectus, crura & pedes dividentes, Garziæ & Fragofo momentibus: hincque alteram dicit Chyneam, à Chyna unde advehi soleat: vel Chnichen, Linsc. part. 4. Ind. or. c. 36. Sicalia iudis est, alia elaborata: rudis est ignem non

experta: elaborata, quæ folis aut ignis calore excocta atque purgata, album colorem contrahit, Matth. (odora.

Eligenda instar crystalli splendens, syncera,  
XII. Chonidetros gummi quoddam Succino crudo per simile, quod Caphuræ quæ ex Burneo adfertur, sæpe permiscetur, Lugd.

Gummi Chamædros vocatum, Garz. Frag.

XIII. Gummi Juniperi.  
Gummi Juniperum, Plinio l. 13. c. 11.  
Sandarach Serapioni, Cord. hist. resina majoris juniperi arida, dura, flava, Mastichi similis.  
Vernix Latinis & Vernilago, ab anni tempestate, quasi Veris ros.

Gummi Juniperi, Sandaracha & siccus Vernix, Matth. Juniperi lacryma, Vernix, Lugd.

Gummi est resinofum ex Junipero; sed ne quis vocum affinitate deceptus, Sandaracham Græcorum, quæ metallicum est, & Auripigmento cognatum, & exitiosum venenum, substituat.

Ab hoc differt Vernix liquidus, qui ex prædicto eoque syncero & oleo ex semine lini expresso fit, quo ad picturas & tabulata illustranda utuntur. Sandaracha verò Aristoteli (*ouv-Augæne*) 9. hist. 40. & Plinio lib. 11. cap. 7. est apud operantur cibus, qui sæpe invenitur inavorum inanitatibus sepositus, amari saporis vel ceruginosi mellis genus.

XIV. Gummi Ceraforum, Matth.

XV. Gummi Ulmi, vide in notis nostris in Matth.

## D E R E S I N I S.

**R**esina *pitru* lacryma seu liquor est pinguis ac oleaginosus, ex arbore sapinis sponse interdum eâ vulneratâ defluens: qui sponte defluit *mirricin* & *percepsin* dicitur. Est autem atque consistens duplex: liquida quæ Græcis *ῥηξ*, h. e. humida seu fluxilis, ut Terebinthina: altera durior & siccior, quam *gemma*, id est, solidam seu ossam nominant, ut Colophonia recentiorum.

*Resina humida.*

I. Terebinthina vera.  
*Terebinthe*, Dioscoridi.  
Gilen Albotin, Avicennæ.  
Terebinthina vera ex Cypro adfertur, Lugd.  
Terebinthina resina, Matth. Cord. hist.

Est liquor pinguis ex Terebinthi trunco & ramis defluens, quæ omnes resinas antecellit, Diosc. l. 1. c. 91. testimonio: quæ pro ratione loci magis commendatur, ut prima sit Chia, dein Lybica, tum Pontica: tandem Cypria, Syriaca, Judaica, Arabica. Hæc liquida destillat, dein paulatim arefcit & sæpe cum Thure adfertur, &

in templis cum eo suffimigatur, & ineptè Incensum, ipsum verò Thus, Olibanum appellat.

Probatur alba, pellucida & vitreo colore & in cæruleum vergente odorata & acris.

Et ut Diosc. l. 1. c. 91. & 92. resinas omnes antecellit Terebinthina, proxima huic lentissima: dein pinea & abiegna: post hæc picea & strobilina. Verùm Terebinthina Veneta, ex novellis Abietibus colligitur.

II. Resina laricea.

*Laricina* & *pitru* *laricina* Dioscoridi.  
Resina larigna, Matth. Cord. hist.

Terebinthina officinarum Germaniæ.

Hæc

Hæc ut Galenus 2. compos. med. secundum genera, 4. scribit, pro prima sæpe venditur (etiam nunc, non solum illius locum, sed etiam cognomentum sibi vendicat, Matth. & Lugd. quoque monentibus) quæ illa humidior & acriore est.

Optima quæ purissima, odoratissima, aliquantum translucida, & quæ ab intincto digito contumaciter & æqualiter diffundit.

III. Resina lentiscina sive Mastiche: & Matt. G'uten Romanum Arabibus. (Lugd.

Masticha seu Mastiche, hodie Mastix, Cord. hist. *Παστιχ* Dioscor. l. 1. c. 90. (resina lentiscina Plinio) cui & *μαστίχη*: ex lentisco effluit, & inter Gummi-resinas reponenda videtur. Et cap. 92. Terebinthinæ proportionem respondere scribit. Galenus vendit 3. compos. med. secundum gen. 6. Terebinthinæ præfert. Idem 2. ad Glaucon. Egyptiæ mastices meminit: nunc solos lentiscos in Chia, non autem in Gallia nec Italia (vel saltem exigua) licet similes sint, mastichen proferre, Bellonius allerit.

Mastiche etiam in Brasiliæ dumeris nascitur, Lerio, Ind. occid. part. 3. c. 12.

Probaturn candida, splendens, odorata, & friabilis: quæ in Chionata: deterior virescens & nigra bitumini similis Ægyptia, aut Pontica. Hæc thure & resina mista adulteratur.

Duplex est, propriè & impropriè dicta: propriè quæ ex lentisco effluit: quæ vel alba, vel viridis Dioscor. vel ut Galenus, alia alba quæ Chia: alia nigra Ægyptia: habetur & Cretensis, quæ flava: est & amara. Impropriè dicta est ea quæ ex spinosa planta emanat, Theoph. 6. hist. 4. vel ut Plinius, ex humili spina quæ Chamæleon est Dioscoridis: hæc est Acanthice mastiche Theoph. Gaza spinalem vertit.

IV. Thus sive Olibanum officinarum.

*Αιβαν* Dioscor. lib. 1. c. 81. sic dictum quibusdam, quod è monte Libano deferatur: vel potius à *αίβο* stillo: Thus verò, à *θύω* sacrificio.

Thus, Matth. Cord. hist. Cæs. Lugd.

Lovan Arabibus } Garziæ & Linscor. part. 4.  
Conder Avicennæ } Ind. or. c. 28.

Liquor est arboris Thuriferæ, quæ in Arabia thurifera cognominata, provenit Dioscor.

Primas tenet masculum *γαργύριον*, natura rotundum, candidum: at Indicum subulvum, & arte rotundum factum, quod *δρεμ* aut *οὐνχ*.

II. *ἀροβίαν* *ἀροβίαν* orobium, quod in Amelo nascitur, quod *νονιαν* vocant, minus est & fulvius.

III. *ἀρροβίαν* cognominatum, quod candidum & dum molliciter, mastiches more digitos cedit, Dioscor. l. c. Ex his colligitur veteres aliud Arabicum, aliud Indicum fecisse, cum tamen in India non nasci Garzias affirmet.

Et nunc plures species habentur, etiam Cordo in sua historia monente, colore & magnitudine granorum tantum differentes: 1. est Indicum dictum, quod maximis & inæqualibus glebis constat, lividum nigricansque candicantibus aut flavis maculis varium. 2. miammosum, oblongis grumis mammatum forma compositum. 3. masculum, parvis, rotundis, candicantibus aut flavis grumis, interdum singulis, interdum geminis velut testiculis constans. 4. Orobæum, minimis grumulis,ervo æqualibus, odore masculo simile.

At hujus pollen & farina ex crebra in faccie concussione, Manna dicitur: nonnunquam & cortex adhærens adfertur.

At Theveto aliud candicans, nitidum, quod æstate aliud rubescens & vilius, quod vere colligitur: Et ut Garzias, Frag. & Lug. quæ ex montanis fluit, laudatissima Melato, nobis mascula dicitur: quæ ex ijs quæ in planis, nigrum improbum, & cum aliarum arborum resinis permixtum, quæ naves, ut nos pice oblinunt.

V. Resina Cupressi.

*Κυπαρισίου ρητινῆς*, è cupresso etiam resina liquida fluit, Dioscor. l. c. 92. Matth. Lugd.

VI. Resina Cedri sive Cedria.

*Κεδρίαν* Dioscor. l. c. 105.

Cedrus dat picem quæ Cedria vocatur, Plin. lib. 24. cap. 5.

Cedria sive Resina ex Cedro, Matth. Lugd.

VII. Myrrha.

*Μύρρα* Dioscor. Theoph. Gal. 8. simpl.

Bola Indis, Garziæ & Linscor. par. 4. Ind. or. c. 28. Myrrha, Matth. Cord. in Dioscor. qui in histor. quinque dicit genera, & sextum adulterinum. Myrrha, Theveto, Garz. Frag. Cæs. Lugd.

Myrrha & Opocalpasum, lacryma est ex unius arboris trunco manans, Guil. the.

Myrrha suo surculo spinoso hærens, Ad. Lugd.

Lacryma est (seu gummeus succus concretus) arboris nascentis in Arabia, Ægyptiacæ spinæ similis, quæ incisa, in substratas regetes destillat, pars verò circa caudicem concrevit, Dioscor. l. c. 77. quæ & Theoph. 9. hist. 4. habet & feribit, Arborem esse minorem Thuris arbore & fruticosem,

cofiorem, caudice duro, contorto, cortice lævi; alijs, *Thuris* folium laetum & læve: *Myrrhæ* aculeatum non læve, Ulmeo simile, crispum extremo spina horridulum, Illicei modo, &c. Alij, terebintho: *Siodorus*, lentisco æquat. *Myrrhæ* arborem spinosam, folijs *Acaciæ*, se vidisse testatur *Bellonius*.

Differentiæ: alia *mi. di. di. mi.*, id est, campestris, quæ expressa *πασή* excipitur: Nam *Stacte* (quæ quibusdam *Styrax* liquida) ut habetur apud *Dioscor.* l. 1. c. 73. pinguitudo est recentis *myrrhæ* cum aqua pauca confusa & organo expressa, & ex qua unguentum factum.

*Stacte* nominatur: & *Cord.* hist. *Stacte* liquor ex *Myrrha*. Alijs tamen *Stacte* stillatitius ros est, qui ante corticem ferro solutum, sponte & sine plaga, sed veluti cutis poris hiantibus, quasi saliva quædam exudat. Alia *υβρία*: primas tenet *πρωλαδία*, à loco natali denominata, quæ subviridis, pellucida ac mordax: 2. tenuis, bdellij modo lentescens: 3. *νεοναδία*, nigra & retortida: 4. demum *εργασίνα* dicta, quæ aspectu gummi refert. Improbatur etiam quæ *δρυονία* nominatur: adulteratur gummi, *Dioscor.* l. 1. c. Hanc esse Anijum nigrum Lusitanorum, *Amarus* vult. Ex Arabia & regione *Alexim*, quæ *Æthiopia* est, adfertur, *Garzia* auctore. *Myrrha* animinea, *Dioscoridi*. Anime occidentale, *Hermolao*, *Lugd.* Anijum nigrum Lusitanorum, *Amato*.

Adversariorum auctores fulvam, albescentem & viridem se vidisse testantur.

Eligenda friabilis, levis, undiqueque concolor, quæ contracta intrinsecus lineas candidas inter currentes habet, unguium speciem præseferentes ac læves, quæ minutis glebis, amara, odorata, & acris: at ponderosa & quæ pice coloris, inutilis est.

*Myrrhæ* *Bæoticæ* etiam *Diof.* lib. 1. cap. 78. & *Galenus* meminere, quæ ex arbore quadam in *Bæotia* nascente, & radice incisa stillat.

VIII. *Styrax* (sive *Storax* officinarum) quia striatim ex arbore extillat.

*χρίψ* lacryma est arboris malo coroneo similis, *Diof.* l. 1. c. 79. & *Plin.* l. 12. c. 25. sive succus est gummeus resinofusq; *Syriacæ* cuiusdam arboris concretus, nullus enim liquidus & fluxilis est, nam lacryma quæ extillat, mox in glebam densam, pinguem & resinofam, aliquot granis albicantem, suavissimè fragrantem, conrescit.

*Sepalasiæ*, *Arabes* secutæ, in liquidum & siccatum distinguunt: liquidus est *Myrrha* *Stacte*: siccatum *Storax* calamita officinarum.

*Styrax*, *Matth. Cord. hist. Lugd.*

De hac *Plin.* l. 1. c. 25. lacrymæ ex austro junciores, intrus similitudo harundinis, succo prægnans: huc circa canis ortum advolant pennati vermiculi erodentes: ob id in scobe fordescit.

Dicitur calamita, quod in calamis è *Pamphilia* ferebatur: nam & cætera odorata olim arundinibus recondebantur, ne expirarent & vires amitterent, quod & de *Distanno* *Cretico* *Theophrast.* 9. hist. 16. scriptum reliquit. *Dioscoridi* est *παραβελίτι*, *παραβελίτι* & *παραβελίτι*: addit: inveniri & lacrymam gummi similem, translucidam, *myrrhæ* æmulam, quæ per pauca. Et *Plin.* l. 12. c. 17. ex Syria (& albi: ex Cypro, *Sydone*, & *Plydia*) revehunt *Styracem*, acri odore, ejus vi foris abigentes suorum fastidium.

Præfertur flavus ac pinguis (ruffus & pinguis ter lentus: deterior fuscior, & cano situ obdus) resinofus, albicantibus grumis, qui dum mollior, melleam humiditatem & odore perseverantem, ex se remittit.

Adulteratur arboris scobe, quæ vermiculorum erosione facta fuerit, & hunc *Styracem* ideo *οκλανήτιον* quasi vermiculatum cognominant, quod imperiti tanquam syncerum admittunt, *Diof.* At *Plinio*, cedri resinâ, vel gummi, alias melle, aut amygdalis amaris adulteratur.

Ex *Styracæ* affato fuligo quoque colligitur: & in Syria unguentum *Styracinum* conficitur, *Diof.*

*Styrax* liquidus: & *Cord.* hist. *Lugd.*

Alij ex *Styrace* calamita, laricea resina, oleo & vino simul coctis conficiunt, & quod post menses aliquot tenuissimum & liquidum, *Oleum Styracinum* vocant ex decoctione quorundam furculorum in aqua fit: licet aliqui *Styracem* liquidam, è peculiari arbore à *Styrace* discrepante, manare velint: & sic *Styracis* liquidæ duæ species erunt. At *Cæsalpino*, qui ad nos adfertur, laricæ resinæ est consistentiæ, cinereus, odore altero vehementiore.

*Storax* rubra officinarum, est cortex de quo inter arbores.

IX. Liquidambar, *Monard. Mexiocan. hist. Cæs. Lugd.* & par. 9. Ind. oc. l. 4. c. 29. resina est liquida, quæ ex India occidentali affertur: nam incisa arbore vastæ magnitudinis, quam *Americi* *Ocosolt* vocant, folijs *hederæ*, cortice crasso, cinereo



cinereo, quo inciso aut excavato effluit, ut ex Monardi & histor. Mexiocanæ auctore, Lugdunenſis refert: ex hac recenti, oleum odoratius per ſe ſtillare aſunt: ex primi quoque, ut majorem quantitatem habeant, ſed minus perfectum, quo chiroſtecas inficiunt: & cum Styracis odore ſit ad Styracis genera referri poſſe, Cæſalpinus monet.

#### X. Bdeſſium.

Bdeſſium nonnullis *muſſidunus*, alij bolchum appellant, lacryma eſt arboris Sarracenicæ, Dioſcor. l. i. c. 20. & Plinio l. 12. c. 9. vicina eſt Baſtriana in qua Bdeſſium nominatiſ. arbor nigra eſt, magnitudine oleæ, folio roboris, fructu caprifici, naturaque. Alijs, ex arbore valde ſimili ei quæ Myrrham proſect.

Duplex eſt: alterum quod probatur amarum, tranſlucidum, taurino glutini ſimile, intus pingue & facile molleſcens, lignorum & ſordium expers. Alterum ſordidum ac nigrum, grandioribus glebis in eſſas convolutum, quod ex India aſſertur, quod Adrobalon nuncupatur & omnium peſſimum eſt.

Deſertur & jam à Petra, ſiccum, reſinoſum, ſublividum, Dioſc. qui Sarracenicum, quod eſt Saraca feliciſ Arabiæ civitate dicitur, laudat; Galenus verò, Scythicum. Plinius, Baſtrianum. Laudatur etiam quod in Media naſcitur, Parthicum nominatum. Adulteratur gummi admixto Dioſ. Sunt qui Anime, legitimum Bdeſſium eſſe putent, Cluſ. in Garz. momento.

Bdeſſium. Matth. Lac. Cord. hiſt. (qui ſex ſpecies facit) Cæſ. Frag. Lugd.

Bdeſſij fructum Cortuſi Cluſius ad notas in Garz. pingit: Lugd. vide inter Palmas.

#### XI. Belzoinum officinarum.

Benzoinum, Laſerpitium non eſt, Matth. Benzoinum, benzoi & Aſa dulcis, Cord. hiſt.

Ben Judæum, Ruellio: forte nominum vicinitate lapſus, Ben jaoy, id eſt, filium de Jaoy, ubi plurimum naſcitur nominare debuit, Garzias. Benivi, quo neq; Græciæ, neq; Arabibus, neq; Judæis cognitum, Garz.

Belzoe vel Belzoin, vel Belzuinum vulgo, Lug. Belzoi vulgo, lacryma ex Oriente, Cæſalp. qui Myrrham ſuſpicatur.

Benevinum, Linſcot. part. 4. Ind. Or. c. 27.

Eſt Beniviſera arbor vaſta, ſolijs citri aliquantum minorib. parte averſa candicantibus, ex cuius ramis vulneratis gummi effluit, Garz. Cujus

plura genera, præfertur Amygdaloides (hanc Myrrham Troglodyticam Dioſcoridis, Amatus cenſet) quod unguis ſeu maculas candidas amygdalarum inſtar admixtas habet, & in Seylan provenit: aliud genus nigrius in Samaria & Jaoy, quod vilius: 3. quoq; nigrum eſt, è novellis arboribus profluens, quod priore odoratius, & ab odore grato Benive de Bonias, quaſi de floribus, vocant, Garz. Linſcot. part. 4. Ind. Orient. cap. 27. Quare aliud album, aliud nigrum eſt, Eidem part. 2. Ind. Oriental. cap. 22. commiſceri tamen ſolent, ut unâ commodius vendantur.

XII. Copal, Monardi, Cæſ. Lugd. & par. 9. Ind. Occid. l. 4. c. 29.

Copal aut Pancopal, Frag.

Reſina candida, diacitro valde tranſparenti haud diſſimilis, odorata, quæ ex Hiſpania nova aſſertur.

Genera duo ſacie Gomata in hiſt. Mexiocana: alterum rugoſum, molle, thuri ſimile Xolochcopalli vocatum: alterum præſtantius Copal cahuiel, quod pleriq; Myrrham exiſtimarunt, Cluſ. notis in Monard. Lugd.

Copal & Suchi copal, altera Styracis & thuris genera: part. 9. Ind. Occid.

XIII. Reſina abiogna Indica, Monard. Lugdunenſ.

Ex arboribus ſpurijs, quæ neq; pinus, neque cupreſi dici poſſunt, in quorum cacumine veſiculæ, quibus contraſtis, liquor guttatim ſtillat, quo ut Baſſamo utuntur: ex novis Orbis continente aſſertur.

XIV. Reſina eſt Pinu & Picea liquida quod emanat, quæ ex Gallia & Hetruria convahitur: dein è Colophone aſportabatur, hinc *colaphia* appellata, Dioſc. l. i. cap. 92. Sic etiam aliquando ex Populo proſluit.

XV. Reſina Carthagenſis, quæ à Carthagine novi orbis provincia mittitur, puriſſima, odorata, Terebinthinâ Venetâ multo præſtantior, Monard. Lugd.

XVI. Reſina Ambræ ſacie, Cluſ. exor. lib. 4. cap. 6.

XVII. Tacamahaca, reſinæ genus ex nova Hiſpania, odore gravi Galbani, Monard. Frag. Lugdun. & part. 9. Ind. Occid. l. 4. cap. 29. vide ſupra in Populo.

XVIII. Caranna, Monardi, Frag. & part. 9. Ind. Occident. l. 4. c. 29.

Caragna,

Caragna, Lugd.

Resina pinguis oleaginosa ex continentis parte interiore, colore & odore; sed graviore Tacamahaca.

Duplex est: nam præter illam, alia purior ex Carthagine crystalli modo limpida adfertur, quæ Caranna purior, Monard. Lugd.

XIX. Gummi Elemi officinarum.

Improprie Gummi dicitur, cum Resina sit, ut quæ flammam facile concipiat, & oleaginis diluatur: Diosc. l. i. c. 14. monente: Oleæ Æthiopice lacryma, similis quodammodo Scammonio (*σκαμμονιον*) fulva, ex parvis stillis conflata, mordax est.

Resina Elemi, aliquibus Gummi elemi, Cedri lacryma videtur, Cord. hist.

Gummi elemi officinarum, seu Oleæ Æthiopice lacryma, quæ in glebas concreta adfertur, quæ gustu iners, nec palatum ferit, Lugd.

Gummi elemi Æthiopice oleæ lacryma non est, Matth.

Similem ferè lacrymam, sed paucior, Oleæ & oleastri fundunt.

*Resina sicca.*

I. Colophonia officinarum.

Pix est quæ præ cæteris *στυπτη* & aliquando *συμμιμνή* quasi confusa, nominatur, quod ex mul-

tis simul congestis in massam induruerit, quæ igne liquata & repurgata durior & sicciore vadit.

Hæc duplex est, alia veterum, Diosc. l. i. c. 92. *κολοφονία*, quod ex Colophone olim advehebatur, & resina erat liquida, quam Cord. ejusdem arboris censet, à qua Elemnia resina profluit, Cedrus videlicet. Altera verò est recentiorum. Colophonina Hispanica & Græca, Matth. Lugd. Colophonina pix arida, quibusdam Pix Græca, Cord. hist.

II. Resina sicca, Græcis *συρπη* dicta, quæ absq; ignis ope cito concrevit, *συρπημα* *πυρρην*, quasi germinatio piceæ, Galeo nuncupatur: hæc resina est confusa ex Abietina, Strobilina, & Pityna. Nam ut Diosc. l. c. ex siccis resinis alia est Strobilina, alia Abiegna, alia Pineæ & Piceæ.

III. Strobilina *στροβιλινα* Diosc. l. c. Gal. quam alij ex Pinu, alij ex Picea, alij ex Pineis nubicus, quas Strobilos vocant, profluere dicunt.

IV. Abietina *αβιετινα* Diosc. à quibusdam male Colophonina dicta, quæ diu liquida permanet. Lapidès quoq; resinacei in India Occ. circa portum Tierra de Brea, tanta copia habentur, ut omnes totius mundi naves istis implere possis: hæc admodum bona pro navibus, nec ardore Solis liquefcit, part. 8. Ind. Occid.

## D E P I C E

**P**ix liquor est pinguis & resinofus, ex accensa tæda profluens. Tæda autem, etsi de arbore quoc, dicatur, hic tamen pini arboris morbus intelligitur, ubi ea per senectutem nimiam pinguedine veluti strangulata est, quæ tæda accensa, Pix nioxa effluit: hæc collatione purgata crassescit, sicciore duriorq; redditæ, *συρπη* nioxa sicca pix, & *πυρρην* Diosc. l. c. quasi iterata & secundo cocta pix dicitur: & Matth. Lugd.

Ex tæda, picem nigram & Cedriam confici, Bellonius scribit.

Zopissa verò & Apochyma, nominatur pix à navibus maritimis derafa, Diosc. l. c.

Pix navalis, ab illa secundum aliquos distinguitur, eam significantes, quæ picandis navibus apta, & non ab ijsa brasa est.

Differt autem Pix à Resina, quod hæc sponte effluerit, illa verò ignis beneficioeducta, & est

veluti Resina cocta: & ea quæ primo extillat, Pix liquida officinis, Pisselæon Dioscoridi, Cedria Plinio dicitur.

Pix five Bitumen, resinave in Siruam non procul à Moluccis, quod ex Samatra advehitur, qua picandis navibus utuntur, aliqui falsò Anime effecredunt, Garz. cap. de Lacca.

Sic Americani, ex arbore Oxyacanthæ simili, igne resinam eliciunt, qua picis loco utuntur.

## A B I E S.

**A**bies, Græci *αβιε* Theophr. 1. hist. 7. procera est & longo caudice, cui cortex tunici multiplex: 1. hist. 9. una tantum radice eaq; nervosa constat: 1. hist. 16. folia habet rara, eadem multifida & quasi serrata: 1. hist. 6. flos Cocco colore, &c. Plinio l. 16. c. 10. Abies è cunctis amplissima est, materies præcipua trabibus, nec Abietis forma alia quam Piceæ.

*Genera Theoph. 3. hist. 10. est quadam mas, quadam femina. mari folia acutiora, magis pungentia ac magis flexa, quare aspectu crispior tota arbor videtur. Materia candidior in femina, mollior operisq, faciliior & toto caudice procerior est: mari magis varia, latior, durior, medulla plenior & aspectu minus pulchra: conus maris, paucos nucleos habet in priore tantum parte: femina conos nulos omnino, ut Mace. Jones dixerunt. Plinio l. c. femina prolixior, materie mollior utiliorq, arbor rotundior, folio pinnata, densa ut imbres non transmittat, atque hilarior in totum: & lib. 16. cap. 24. folia insecta pectinum modo pungentia. Verum Theoph. 4. hist. 7. marinam habet, qua supra lapides patellarum modo adheret, &c. Sic in insula Virginia Abietes magne & prædite ad malos navium reperuntur.*

I. Abies conis sursum spectantibus sive mas.

Abies, Dod. gal. Lac.

Abies legitima vel mas, Bellon. con.

Abies altera, Dod.

Abies Pilati, du Choul, Lugd.

II. Abies alba sive femina.

Abies, Brunf. Trag. Match. Cord. in Diof. Gefn. hort. Adv. Lob. Thal. Cast. Lugd. Tab. Ger.

Abies femina, Ang.

Picea, Dod. ut:

Abies Plinij & femina Theophrasti, Clus. pan. & hist.

In hac Viscum, quod Stelin Plinius l. 16. c. 44. ex Theophr. 2. caus. 23. appellat, albis baccis præditum, Clusius observavit.

Inter cortices abietum novellarum, quæ tuberculis scætena, liquor præstantissimus, sed paucos, continetur, ita ut unumquodque tuberculum sæpè aliquot duntaxat guttas contineat, qui Italici lacryma dicitur: fortè apud Galenum 3. compol. medic. secundum genera, liquida Piceæ resina, quam Terebinthinæ loco institores vendebant: & hæc Abiegna lacrynia sive resina liquida, in quibusdam Italiæ locis, Oleum Abiegnum nominatur: officinæ Terebinthinam Venetam vocant. Verum ex gemmis quoque, more Populi, lacrymam fundit, Sic ex Abiete, veluti ex Pinu ac Picea resina etiam sicca & candida colligitur, quæ thus ementitur, ac pro eo à vulgo usurpatur.

## T A X U S.

**T**axus etiam si resinam non fundat, inter resiniferas tamen, propter similitudinem quam cum folijs habet, relata est, quæ a Theophrasto: quidā Nicandro: Dioscoridi l. 4. c. 80. quidā, quibusdam δόμαρος, Romanis τὰξος arbor est simili Abieti & folijs & magnitudine. At Theoph. 3. hist. 6. perpetuo vivet ex sylvestribus: 3. hist. 10. unius generis est, proceræ, autem facili, similisq, Abieti, sed non tam alta & alia magis sinuata: folio quoque Abieti simili, sed pinguiore & molliore: quæ in Arcadia crescit, ligno nigro aut puniceo constat: quæ autem in Ida, flavo & Cedro simili, quare aliqui emptores decipiunt, pro Cedro vendentes, &c. in Macedonia fructum abundè profert rotundum, sabà paulo majorem, rubrum, tactu mollem, &c. si ab aliquibus hominibus mandatur, suavu est & innoxium. At Matthioli apud Tridentinos perniciosum scribit: contra Pena, ejus baccæ à pueris in Anglia innoxie estari, refert. Plinio l. 16. c. 10. Similibus (scilicet Abieti & Piceæ) etiamnum aspectu est Taxus, minus virens gracilior, & tristis ac dira, nullo succo, ex omnibus sola baccifera: mas noxio fructu: lethale quippe baccis in Hispania præterea venenum inest, &c. Sunt qui & Taxica hinc appellata dicant venena, quæ nunc Toxicæ dicimus, quibus sagittæ tinguntur.

Taxus, Match. Ang. Dod. ut: Gefn. hor. Lac. Tur. Lon. Adv. Lob. Cæs. Lugd. Cam. Thal. Portæ.

Milax arbor, Cord. in Diof.

Smilax arbor, Cam.

## D R A C O A R B O R.

I. Draco arbor, Clus. hisp. & hist. Lob. Cast. Lugd.

Arbor Gadenfis Posidonij forte apud Strabonē. Draco, Tab.

Arbuscula Dragonalis, Frag.

Fructum ferre Cerasi magnitudine, Cadamustus, Thevetus & Clusius, & ex hoc, alij scribunt: & Dragonal nomine fructum missum, Clusius

in notis ad Monardem refert. Verum Monardes scribit, si à fructu, pellis qua integritur aufertur, Dracunculi effigiem apparere (ut apud Monardem, Lugd. pingitur) à quo fructu procul dubio arbor denominata sit: Vide Fragsum. Hujus lacryma Sanguis draconis dicitur.

II. Prægrande folium, Adv. Lobico. an Algæ similis grande folium, Cæs.

Folium arboris Draconis ex Indijs delatum, Lugd.

Folium palmæ filamentis & textura, Tab.

III. Draconi arbori affinis Americana.

P A L M A.

**A**rbor quæ Græci, Latinè Palma dicitur, fructus verò δακτύλιος ἢ περὶναι, Græci: Latinè Palmula & Dactyli: Arabibus, Tamar: at ut Dioscorides l. i. c. 148. φάσις in Aegypto gignitur: (at in tota India non reperiri, Guiland. de pap. scribit) ex ea verò fructus in melio Annuini vigore colligitur, Arabia Myrobatalano similis ac πικρά dicitur, viridis colore, referens mali cydoni odorem: si verò integre maturuerit, φαινεύεται & fiet. Et in fine seq. cap. postquam de Palmu Thebaicū egit, Aegyptiacos nucleos, ἐν τῷ χυμῷ φύλιν φασίναι, id est ex humilibus decerpi scribit. Idem cap. 150. involutum fructus palmarum adhuc florentium, etiam Palinam ἰδαίτην ἢ αὐαίτην (Palmitem Plinius) nominat: & fructus qui sub ea continetur, similiter elaten, quam à nonnullis βίβκος & appellatur. Sic quod in trunci superna parte includitur, ἰνισπάλος Theophrasto, Galeno (cui etiam κορυφὴ vertex & aliment.) & alijs Græci dicitur: at Diosc. ἰνισπάλος τὸ πέριον, medulla trunci improprie dicitur. Sanè Palma vitalis vni in vertice, ea contra pondus refurgit, & in ea uterq; sexus maximè elucet, in cuius quoque folijs scriptit asum, ut Guiland. de pap. exposuit. Plinius l. 13. & medullam & cerebrum vocavit: Serapio verò Cephalem.

Ex Theophrasto seqq. sufficiam (qua pleraque & Plinius l. c.) Palma cortice scabro constat. i. hist. 8. medullam omnino nullam habere videtur, i. hist. 9. quæ ad longitudinem tantum apertæ augeri, i. hist. 14. folia arundinacea habet, i. hist. 6. semina protinus post tegmen ambientsia subeunt, ut nucis & amygdala, sed cavitate nullam habent, sed tota plena atque perfolida sunt: tamen humor quos, quidam, calor, inest, i. hist. 18. mas flores, semina minimè, sed protinus fructuum promit, i. hist. 22. & quodammodo cacumine gignit, i. hist. 23. Verum 4. hist. 7. Palmam pelagicam scribit esse caudice admodum brevi, virgiferè rectū, quæ subitè exeunt, & c. folijs spinarum acanitarum, erecti tamen, nec circumflexi, & c.

Genera: Theophrasto 2. hist. 8. alia fructifera, alia steriles: illarum alia mares, alia femina: sic in fructu differentia: alij nucleum habent, alij eo carent. quidam durum, nonnulli mollem: sic colore, alij candidi, alij nigri, alij flavi sunt: magnitudine, quidam rotundi, veluti mala: alij parvi, cicerum magnitudine. Et Plinio l. 13. c. 4. palma genera undequingenta sunt: at clarissima omnium quæ Regias appellavere: quia Regibus tantū Persidū servabantur, Babylone nata: plura videantur ibidem: at quas in Caryotarum genere Nicolaos, in honorem Nicolai Peripatetici Philosophi, ab Augusto ita nominatas Aibeneum voluit, barum & Aeginera meminit.

I. Palma major.

Palma, Trag. Matth. Dod. ut: Ang. Lac. Turn. Cord. in Diosc. Gesn. hort. Adv. Lob. Cæf. Cast.

▲ costæ, Lugd. Cam.

Palma sive Dachel, Alpino.

Palma major, Bellon. (quæ in Aegypto celsissima) Tab.

Palma Tamara, in insula S. Thomæ, Roëlsio in ep. ad Clus.

Palma dactylifera, Linscot. 4. part. Ind. orient. figur. 14.

Pingunt arborem, dein fructum cum floribus & Spatha.

Spatha, Ang.

Dactyli cum palma elate, Matth.

Palma elate, Cord. in Diosc. Lugd. Tab.

Palmarum fructus, & flores & elate, Dod.

Caryotæ, Carotides, fructus palmæ dactyli, Cast.

Palmarum fructus sive dactyli, Lob.

Fructus dactyli in Italia, Caryotæ verò Dioscoridi & Plinio, Cæf.

Palmarum excelsam sylvā, in Arabiæ deserto Rauvvollsius transivit, & tres species Dactylo- rum observavit: 1. quales ad nos adferuntur: 2. penitus rubros: 2. flavos, primis minores sed fapidiores, qui à Serapione Hayron nominantur.

Palmæ cerebrum sive medullam, ἰνισπάλος Græci vocant, qua vescantur, ut etiamnum in Alexandria & quidem cruda, cinaræ etenim saporem refert: solent Aegyptij rustici palmas abortivas requirere, quarum cacuminibus excisis, candidam medullam eximunt & venalem proponunt. Varia palmarum genera sunt, spinosum in Creta, differens à Cephaloni sive pumila Palma, Bellon.

II. Palma minor.

*Xapaxipis*, Theoph. 2. hist. 8.

Chamærops, Plinio l. 12. c. 4.

Palma humilis, Matth. Cæf.

Cefaglioni, Ang.

Palma minor, Gefn. hort. Tab.

Chamæriphe, Dod. Adv. Lugd.

Palmites, Lob. Garz.

Palma Chamærops Plinii, Lugd.

III. Palma humilis exotica.

Chamæriphe peregrina: & ejus fortè folium,

Cluf. exot. l. 4. c. 12. & 13.

IV. Palmæ sylv. in Cambaya similis, Garz.

V. Palma Americana fructu racemoso.

Palma Yuridicta, Leriio in part. 3. Ind. occid.

Palmarum in America quatuor aut quinque genera reperiuntur: inter quæ frequentissima ea, quam Gerau, alia quoque quam Yri vocant: hæc fructu est rotundo ad effigiem racemi, tanti ponderis, ut ægrè una manu subleuetur, sed nucleus tantum Cerasi crassitudine edulis, &c. Leriuis.

VI. Palma manicam Hippocraticam refert.

Palma saccifera, Cluf. exot. l. 1. c. 2.

Ex insula maris Atlantici saccifera dicta, quia forma illico seu sacco, quale vinum aromates percolare solent: in quibus nuces orbiculares durissimæ continebantur.

VII. Palma Americana spinosa.

Hairi Theveti, Lugd.

Ayri Brasilianis, Leriio in desc. Brasil. five Am. part. 3.

Ebenum esse multi existimant: quia lignum ferri modo in aqua sedit, ex quo Barbari enses & sagittas, quæ ferreas loricas penetrare possunt, conficiunt: fructu est rotundo, pilæ lusoriæ magnitudine (cui nucleus ut nix albus, minime tamen edulis inest, Leriio) simili facie, nomine Kayama Oviedus descripsit.

VIII. Palma vinifera Theveti, ex qua incisa succus effluit, qui vasis terreis excipitur, & in quotidianam potionem, quam Mignol appellat, in promontorio Æthiopum (nunc promontorium Viride nominatum) reponitur: quæ suavisimi gustus, quamvis ejusdem arboris fructus, qui parvi sunt dactyli, acerbi sint nec facile edi possint. Sic ex palma Cichorin similis succus elicitur, Lugd.

an Palma cum grandibus folijs, ut unum viro contra pluvias tegendo satis sit, quæ pertere-

brata & cubulo immisso vinum copiosum, gustu Hispanico simile profundit, quod Vinum Palmitem Hollandi vocant: par. 5. Ind. or. fig. 2.

IX. Palma vinifera fructu ex arboris trunco spinoso.

Palmitas, cujus fructus pinæ nuci similes, Linsc. part. 3. Ind. or. c. 10. & part. 4. fig. 16. & part. 5. fig. 2. num. 7.

Palmitres arbores vinum exstillantes non secus ac arbores Cocos, part. 4. Ind. or.

Palmitres arbores ramis & frondibus carentes, fructu ex stipite Ananas non dissimili, grana plurima instar punicæ alicujus continente, par. 6. Ind. or. c. 38.

X. Arbor fructu nuci pinæ specie.

Melenken Theveti in Necumere maris Indici insula, Lugd.

Huc referri possunt

Palma aliæ, quarum fructus Cola dicitur, nuci pinæ majori similis, pulpa quadruplici, intus colore rubicundo castaneæ forma continens: Pigafet. desc. regni Congiani l. 2. c. 1.

XI. Palma humilis longis latisque folijs.

Palma, quam in Cypro crescere Theophr. 2. hist. 8. scribit, quibusdam: quod Guil. in The. refutat, quia hujus fructus sapidus non sit, cum Musæ longè suavisissimus sit.

Pala Plinio l. 12. c. 6. major alia pomo & suavitate præcellentior, quo sapientes Indorum vivunt: folium alas avium imitatur, longitudine trium cubitorum, latitudine duum, &c. arbori nomen Palæ, pomo Ariensæ.

Musa, Maum & Amusa, Serapioni, Avicen. Indis, Quelli, & Guinenisibus Bananas.

Musa, Matth. Dod. gal Bellou. Guil. Ad. Rauvv. Cæf. Cast. Frag. Tab. Lugd. Garz. cui & Ficus Martabanis.

Palma species pumila quæ Musas fert, Gef. hor. Musa Serapionis, Lob.

Musa sive Ficus Indica, Acoftæ, Lugd. app.

Poma paradysi, Lud. Romano, hujus enim arboris fructum Adamum comedisse volunt.

Dudaïm in Biblijs: Phyximilon Æschylo: Margraita Græcis & Latinis: Muz & Gemez, Mauritanis: Ficus Pharaonis, Kafi: Melapolanda, Indis orient. At Indis occid. Platanus: Abella, insulæ D. Thomæ inquilinis dicitur, teste Guil. in The.

Muz, Alpino.

Mauze Theveti, Lugd.

Huc referri debet,  
Paquouere Americanorum, Theveti.  
Musa pacouere Lugd. qui figuram Theveti à  
priori diversam exhibet.

Hujus folijs gummi Elemni, aliquando &  
Sacchari panes involvuntur.

XII. Musæ affinis in regno Catay.

Photel, nonnullis Ficus Phatonis, Thevet. Lug.

XIII. Musæ affinis altera.

Banam, fructus in regno Congiano, forma &  
gustu Musæ Egyptiacæ: par. 1. Ind. or. 1. c. 1.

XIV. Palmam referens arbor farinifera.

Zagu, Ferd. Lopez.

Sagu, Pigafetta, & ad Clus. cur. post.

Arbor vasta in regno Fansut, Polo Veneto.

Arbor farinifera, Clus. exor. 1. c. 3. & 16. Lugd.  
& Claudio Durero.

In Ternate insula Equatori proxima proven-  
it, cujus summum fastigium in caput orbicu-  
larum instar Brasiacæ capitatæ extubetat, in  
cujus medietullo farina, ex qua panes fiunt:  
sicut etiam apud Amboenses, & panes & alia  
cum lacte fercula conficiuntur.

Arborem quandam in insula Ternate de-  
truncant, findunt, ligna fissa tamdiu tondunt,  
dum farina decidat, quam Sagge nominant, ex  
qua panes candidos quadrilateros conficiunt:  
par. 5. Ind. orient. At parte 8. panis Sagu Mo-  
lucensium, ex radicibus arborum confectus di-  
citur. quare Lerijs in descript. Brasiliæ, putat  
farinam non ex ligno attrito, sed ex radicibus  
Aypi & Manior confici.

XV. Arbor exotica fructu dactylis simili.

Arbor tinctoria, Theveto, Lugd.

In regno Senegæ, arbor ex cujus nucleis ole-  
um expellitur cum aqua mixtum, pocula & pi-  
leos croceo colore tingunt.

XVI. Genus fructus palmulis simile, sed ut  
pipet linguam exurens, Linsc. part. 3. Ind. or. 10.

XVII. Arbor folijs amplissimis fructu cu-  
cumeris forma.

Bonannas part. 7. Ind. or. fig. 4. & part. 5. c. 7.

Bannana: part. 6. Ind. or. & part. 8.

Folia tantæ magnitudinis, ut virum aliquem  
cooperire possint.

Huc referri potest

I. Ficus Indica fructu racemoso folio oblongo.  
an Uva quam ex benedicta terra Moyfi actu-  
lerunt?

Platanus, Oviedo: & part. 4. Amer. c. 28.

Platanus Indica: part. 9. Ind. occid. 1. 4. c. 21.

Darach, Motis ipsa arbor dicitur: Avicenna,  
Serapio, Rhafis meminere, Paludanus notis in  
Linscot.

Ficus Indica, Linscot. 4. part. Ind. or. 11. & fig. 11.

Pacaire frutex, (ad Musam Matthioli accede-  
te cense) Lerijs 3. part. Ind. occid. 12.

Platanus sive Bonannas, part. 9. Ind. occid.

At fructus dicitur

Bavanas, Paron, Priam, Quelli Indis, pacona  
Brasiliensis, Linscot. 1. c.

Paco, Lerijs 1. c.

Pacona, part. 3. Amer. ep. 1. de Brasil.

Poma Paradyfi, Brocardo ter. sanct. desc.

Davanas fructus, part. 2. Ind. or. 4.

Vannanas seu Ficus Indica, in Sumatra, part. 4.  
Ind. or. c. 4.

Arbor Vannanas: part. 8. Ind. occid.

Genera plura: 1. cæteris crassius, Figos Dor-  
ta, Fici aulici Lusitanis dicuntur: 2. minus Se-  
neryn dictum: 3. Cadolyn: 4. ficus nobilissimæ  
Chyncapoloyn nuncupantur, Linscot. 1. c.

Folia hujus, quæ ulnam longa, tres Spitha-  
mas lata (lathij) aquatici sex pedes longa,  
duos lata, Lerijs) in variam supellestem In-  
dis in Goa cedunt, quibus & Turcæ papyri lo-  
cotentur Surculus sæpe 200. ficubus pregnans  
est, uvarum modo in se compressis: acini ex qui-  
bus dependent, sæpe in tantam molem grande-  
scunt, ut à binis botulis transversa pertica vix  
gestari queant: Toto anno fructifera est, & In-  
dis commeatum quotidianum largitur: Linsc.

Ex folijs in insula Capul, supparum confi-  
ciunt, quo corporis partem inferiorem & pu-  
denda tegunt: part. 9. Ind. occid.

Aliæ Platanus adhuc in India reperiuntur,  
exiles & candidi, quas in Hispaniola Domini-  
cos vocant: alibi etiam crassiores, & rubentes  
proveniunt: Joseph. Acosta 1. 4. c. 21.

II. Ficus Indica fructu racemoso altera.

an Ficus Indica circa Acelinum amnem nascen-  
tis, Theoph. 1. hist. 12. 4. hist. 5. & 2. caus. 14.

an Fructus arboris Gaguey, Oviedo.

Arbor peregrina fructum similem ficu gerens,  
Clus. exor. 1. c. 11.

Huc refertur oportet

Fructum exoticum tertium, Clus. 1. 2. c. 19.

*Palmæ nucem ferens.*

I. Palma Indica coccifera angulosa.

Jausial Indid est, nux Indica, Avicennæ.

Nux



Nux Indica, Matth. Adv. Lob. Cæf. Caft. Lugd.  
Nux Indica grandis, Cord. hift.

Palma in India nafcens, Theophr. Arnano,  
Straboni, Guil.

Coccus Indica, Lac. Frag. (ap.

Palma Indica Garziæ, quæ & Elephantis, Lug.

Nux Indica 1. & 2. Tab.

Palma nucs Indicas Coccus dictas ferens, Pi-  
gafettæ in desc. regni Congiani, five part. r. Ind.  
orient. lib. 2. cap. 1.

Palma Indica five Cocos, par. 9. Ind. occ. l. 4. c. 26.

Palma feu nucifera arbor Indica, quæ Arabibus  
Maro, Indis Tengamarian & Lanha : at nux,  
Arabibus Narel, Indis Tenga, Lufitanis Coquo,  
Linf. part. 4. Ind. orient. c. 12. & fig. 11.

Palma Indica Coco vocatur & fructum : part.  
9. Ind. occid. additam.

Cocos five nux Indica : part. 8. Ind. occid.

Coques nucs, ex cujus corticibus, corbes pa-  
rant : part. 9. Ind. occid. additam.

Palma Coccoichne, palma indica nucem Indicâ  
ferens, quas Linf. cortus rotundas pingit, cum ex  
Guinea triangulares advehantur, nili forte fuc-  
co plenæ rotundiores funt, Roëlius in ep. ad Cl.  
ubi Linf. corti figura à Clusio reprehenditur.

Fructus Lufitanis Coco & Coquen dicitur,  
ob tria foraminum veltigia, quibus Cercopi-  
theci caput repræfentant : & nucleus inclufus  
ficcatus, Copra nominatur, qui fructus & vi-  
ctum & amictum Indis fuppeditat, & omni  
tempore nucs fert, Linf. l. c.

In Caryotarû genere, quas Plinius Nicholaos  
appellat, aut quod Pateton vocat, effe volunt.

Liquorem colligunt ex nuce, quem Suram  
neminant : & Ambonenfes Vinum de palma :  
& quomodo vinum ex his fiat, oftenditur ad  
Clus. cur. post. Ex hoc fpiritus eliciunt, qui in-  
colis Arack, alijs Fula, five Mype, id eft Vinum  
fublumarum dicitur : fed & alio modo diffillata  
Sura, Uraca fit. In fumma ex hac Palma, fructus,  
oleum, lac, mel & acetum colligunt : ex cortice  
ligneo pocula, ex paleaceis nucum integumen-  
tis, funes ad naves, foliorum denique quoque  
ufus exiftit.

Genera Cocos feu Palmæ Indicæ quatuor  
funct : 1. nucum jam dictarum, ex quibus Indi  
universi omnem suum victum quærunct : 2. Lufi-  
tanis Arcaquero : quæ Areccam fert : 3. dactyli-  
fera, Tamar : 4. Lantor dicta, ex quo Indi papy-  
rum suum quærunct : 4. part. Ind. or. c. 3.

II. Palma coccifera figura ovali. (Garz.  
Coccus de Maldiva, Garz. Acostæ, Frag. Clus. ad  
an Nucum genus peculiare contra venena, in  
insula Melandyna, Linf. c. part. 2. Ind. or. c. 15.

Fructus argento includuntur, ut & priores :  
aliquando prægrandes admodum, interdum  
exigui in litus eiectione reperiuntur.

III. Palma Javanensis longissimofolio.  
Lantor, è Coquos feu Nucum Indicarum classe,  
folia viri longitudine proferens, part. 4. Ind. or.  
c. 7. & 6. fig. 15.

Fructum fert pusillum Cerasi magnitudine,  
qui nucleus carnosus dictum continet : hanc Pal-  
mam aliqui primæ feminam existimant.

IV. Palma coccifera ex Guinea.

Avellanæ Indicæ species, Matth. Lugd.

Avellana Indica, Lob. Tab. (Garz.

Fructus 1. cum Cocco affinitatem habens, Clus.  
ad Palma Ady Roëlius in epist. ad Clus. quian sit  
Palma Caryocides Diofc. & Galeni, dubitat.

Fructus Abariga incolis, Caryoces & Carcofo  
Lufitanis, Citrij mali magnitudine, ex cujus  
pulpa oleum exprimunt, id edulij miscentes :  
ex germinibus succum colligunt, quo ut Vino  
inebriantur.

V. Palma coccifera Brasiliana.

Sabucaje pomo est amobus pugnis ampliore,  
forma calycis, In quo nuclei amygdalinis simi-  
les, etiam sapore, Lero 3. part. Ind. occid. c. 12.

VI. Avellana angulosa villis obfita si modo  
à priori diverfa fit.

Fructus peregrinus 3. cum priore magnam simi-  
litudinem habens, Clus. exot. l. 2. c. 29. Lugdun.  
Tab. Ger. hujus nucleus pro

Fructu peregrino 5. proponitur à Clus. Lug. Tab.

VII. Palma coccifera minor. (Ger.

Palmitas quarum aliquas femellas dicunt, que  
vinum nullum proferunt, sed fructibus abun-  
dant, quorum nucleus juglandis magnitudine,  
cujus cortice aperto, tres in eo nucs, avellanis  
similes : part. 6. Ind. or. c. 12.

VIII. Palma cujus fructus Cucu.

Κυκλῶπιον inquit Theoph. 4. hift. 2. similis Pal-  
mæ, similitudinem in caule & folijs repræfen-  
tans : quæ cum aliquantulum increverit bifida  
fit, iterumque horum utrumque pari modo di-  
viditur : virgas breves nec multas proferit : fru-  
ctum fert magnitudine qua manum impleat,  
rotundum & oblongum, colore flavicante, fuc-  
co dulcem & gratissimum, non congestum ut

*Palmæ*, sed per singula discretum, nucleo magno vehementerque duro, &c.

Cuci Plinio l. 13. c. 9. qui eadem serē quæ Theophrasti. habet.

Cuciophera, Matth. Cam. ep. Lugd. ap. Tab. Ger. Cuciophoron, Ang.

an *Nux Indica minor*, Cuci Theophrasti, Cord. histior.

Bdellij fructus Cortusi, Clus. hist. Lugd.

Perseæ, hunc fructum adpinxit, Lugd.

Cuci fructus, suo pulvino nudatus, Clus. hist.

Cuci fructus, Linsc. part. 4. Ind. or. fig. 18.

IX. *Nuci Indicæ majori affinis fructus Brasiliæ*.

Fructus exotici quintus binis foraminibus parte anteriore, Clus. exot. l. 2. c. 16.

X. *Nucula Indica ex Guinea*.

*Nucula Indica*. Adv. Lob. ico.

*Nux alera*, Clus. exot. l. 2. c. 26.

*Nucula Indica secunda*, ad Clus. cur. post.

Ex folijs liquor exprimitur, aut ea in aqua decoquuntur, eoque pro potu utuntur: at ex fructu panem suavem conficiunt.

XI. *Palma* cujus fructus sessilis *Faufel* dicitur. *Faufel* Serapioni: *Filfel* & *Fufel*, *Avicennæ*.

*Avellana Indica*, Matth. qui una tabella triplices fructus pingit, ut & Lugd. hic tamen & nuncem ex Clusio adposuit.

*Faufel*, id est *Avellana Indica*, Cord. hist. Frag.

*Faufel* sive *Areca*, Garz.

*Areca* sive *Faufel*, Clus. in Garz. Lugd.

*Avellana Indica* cujus fructus *Areca*, *Acostæ*.

*Areca palmæ species*, Scalig. Vartomanno, cui fructus *Coffol*, & Lug. Romano *Chofola*, Lugd.

*Areca*, Cast. Tabern. Ger. hi duo & arborem & fructum, tam hujus quam sequentis, una tabella proponunt.

(Lob. *Faufel* cum suo involucrio & eodem exutu, Adv.

*Nuci Indicæ affinis fructus*, *Areca*, Cæs.

*Palmæ Indicæ altera species*, quæ *Lusitanis* *Arequiero*, quæ fructum *Arecca* seu *Faufel* parit, Linsc. 4. part. Ind. or. c. 5. & fig. 11.

*Arecca* & *Arrequa*, Supary, Arabibus *Faufel* fructus dicitur, Linsc. 4. part. Ind. or. c. 16.

Generatitia: 1. latere uno pressior, altero latio: & major: 2. minus, nigricantius, durius, *Checanyon* dictum 3. à cuius masticatione homo ac vino inebriatur, Linsc. l. c.

XII. *Palma* cujus fructus oblongus *Faufel* similis,

*Avellana Indicæ* genus oblongum, Clus. in Garz. Lob.

*Nux oblonga* quæ *Faufel* cum suo involucrio magnitudine æquat, Lugd. cui *Avellana Indica* 4. ordine in tabula.

XIII. *Palma* fructu nuce juglandæ minore & rotundiore.

Alia species *Coquillo* dicitur, in Chile fructu suaviore, part. 9. Ind. occid. l. 4. c. 26.

XIV. Fructus exotici *Faufel* affinis.

Fructus exotici 2. à Clusio, Clus. exot. l. 2. c. 23.

XV. Fructus *Javanensis* quadrangulus cortice reticulato spadicæo.

*Peregrinus fructus* *terpæ* prægrandis, alterius *Palmæ* fructus forte, Clus. exot. l. 2. c. 5.

Hunc cum pluribus alijs à D. Hoofft Guilelmi, Amstelrodami accepi.

XVI. *Nuci* de *Coulcul* quæ gemini pugni magnitudine sit, quæ parvis granis esui aptis, atque *Avellana* instar dulcibus plena sit, meminit *Bellonius* obs. l. 1. c. cult.

XVII. *Couroq*, fructus *Brasiliæ*, ex quo oleum exprimitur curandis vulneribus præstantissimum: *Lerius*, vel 3. par. Ind. occid. 10.

*Palma squamoso fructu*.

I. *Palma* conifera ex *Guinea* squamis ad pediculum conversis.

*Palmapinus* sive conifera, Adv. Lob. ico.

*Palmapinus sylvestris*, Lugd.

*Peregrinus fructus squamosus*, Clus. in auar. ad exot.

*Fruticis* aut arboris exotice ramus cum fructibus squamosis, Clus. cur. post.

Includitur nucleus durus, venosus, qualis interdum pro insigni a liquo lapide obtruditur.

II. *Palma* conifera squamis sursum cōversis.

Fructus peregrinus abiegnæ nuci similis, Clus.

exot. lib. 2. cap. 3.

III. *Palma* conifera squamis à prioribus differens.

*Palmapinus* sive conifera *Penæ*, Lugd.

*Palmapinus*, Cast. app.

*Palma* conifera, Tab.

IV. Fructus squamosus orbicularis major juglandis magnitudine.

Fructus peregrinus squamosus tertius, Clus. exot. lib. 2. cap. 3.

V. Fructus squamosus orbicularis minor, *avellana* magnitudine.

Fructus peregrinus squamosus secundus, & fructus

fructus Cannæ de Bengala creditur, Cl. ex. l. 2. c. 3.

VI. Fructus squamosus orbicularis sulcis rectis, obliquis & transversis.

Guayanae fructus elegantissimus, Cl. ex. l. 2. c. 4. Guanavatus, part. 9. Ind. occid. c. 28.

Variat fructu cordis effigie viridi: item orbiculari crocei coloris.

VII. Fructus squamosus pyriformis.

Fructus aspero cortice ex Baly insula, Clus. ex lib. 2. cap. 4.

VIII. Palma fructu aculeato ex arboris trunco prodeunte.

Jaca, Garz. Acost. Frag. Lugd.

Jaca minor, Cast.

Jaceros in Calecut, Ludov. Romano.

Jaca & Jaqua, Linsc. 4. p. Ind. Or. c. 6. & fig. 16.

Fructus melonis magnitudine: quoddam genus adeo augetur, ut ab uno homine ægrè attolli queat: Duplex est, alter & præstantior Barca: alter Papa aut Girafol appellatur.

IX. Arbor fructu Ananæ ex caudice emergente, nucleis turgente.

Arbor sine folijs seu ramis, in Insula minore S. Mariæ part. 4. Ind. Or. c. 6.

X. Arbor Indica fructu racemoso erinaceo.

Erinaceus Lusitanorum, Linsc. p. 4. Ind. Or. fig. 16.

Fructus in Baly Insula pomi ferè magnitudine, aspera & spinosa cute testus.

XI. Fructus cortice squamoso.

Fructus ex Bally pyri magnitudine, cortice instar piscis squamarum aspero, nucleo uno vel altero, Linsc. par. 3. Ind. Or. 39. & par. 4. c. 6.

*Nuces exotice.*

I. Nuculæ saponariæ non edules.

Arbores, quæ à precarijs sphaerulis & à saponi cognomen acceperunt, folijs filicis, Oviedo histor. Ind. Lugd.

Sphaerulæ saponariæ Oviedi, Monardi.

Fructus exoricus 16. Clus. ex. l. 2. c. 16.

In Hisp. fructu in negro cum aqua pro saponi utuntur: ex ossiculis sunt corollæ ebenis similes.

II. Nux vomica in Officinis.

Nuces vomicæ Seplassijs, quas Methellas genuinas crediderunt, Matth.

Nux vomica communis, nec vomica est, nec metella, Ang.

Nux vomica, Cord. hist. (cui & canina) Cast. Lugd. Tabern.

Nux metella, Lac. vulgò & Fungus orient. Cæs.

Nux metella vera, Vomica officinarum, Lon.

Vomica officin. falso Metella, Guil.

Tithymali myrsinitis fructus, Fuch. comp.

Nux vomica, fortè Curschula, Rauvolf.

Homini noxiam dicit Matth. innoxiam Milichius & Renodæus: potiones somniferas ex his se parasse, Brassavolus scribit.

III. Nux metel officinarum oculata.

Nux metel communis, Vomica non est, sed potius Metel verum, Ang.

Nux vomica, Lac. vera, Metella officinar. Lon.

Nux methel sive methela, Lugd.

Hippomane Cratæ quibusdam, Eid.

Fructus peregrinus sextus, Clus. exot. l. 2. c. 30. & in altera tabula, Lugd. Tab. & Ger.

Nucum genus gallis tum forma tum magnitudine simile, Ind. Or. part. 4. c. 2.

IV. Cocculæ Officinæ.

Baccæ cotulæ Elephantinæ Germanis pharmacop. Matth. epist.

Solani furiosi fructus, Cord. in Diosc.

Cuculi fructus Solani furiosi in Ægypto, Eid. h. Coco de levanti, quidam fructum Tithymali parali esse putant, Lac.

Grana orientis, Cornaro.

Nux vomica fortè, quæ officinis Galla orientalis, Cæs.

Cuculus Indicus, Cast.

Cocculæ orientales, Doam Sames in Halepo, Rauvolf.

Coco orientalis, Frag.

Cocci orientales, Tab. Ger.

Baccæ orientales & piscatoriæ, Condroncho.

Hæ sæpe racematim pediculis hærentes, hederæ corymborum modo ex Alexandria adferuntur. Pro pediculis nullum præstantius remedium inventum, Condronchus peculiari de his baccis tractatu scribit.

Quidam Solani manici, quidam Tithymali, quidam Clematidis fructum opinantur.

V. Anacardium: fructus hic veteribus Græcis incognitus censetur, quem recentiores Græci *anacardium* à cordis cum primis resiccati, tum similitudine, tum colore nominarunt. Baladar Arabibus, ut Serapioni.

Anacardium, Matth. Lac. Cord. hist. Lon. Cast. Garz. Acostæ, Frag. Lugd. Tab. Ger.

Anacardium. Arabibus Balado, Lusitanis Faba Malaccana, ex qua viridi Athar conficiunt, id est, sale & aceto maceratum condiunt, Linsc. part. 4. Ind. Or. c. 29.

Anacardus sive Anacardium: Persea forte Plinij Cæs.

Variat: nam quod in Malavar, oblongiore porrecto collo est, eo quod in Sunda prodit.

VI. Anacardij alia species.

Acajon, Theveti, Lug. Lerio 3. par. Ind. occ. c. 12.

Cajous Acoftæ, Cluf. ad Garz. Lugd. Ger.

Cajos, Linsc. part. 4. Ind. or. 2. & fig. 13.

Castanæ quæ ex Indijs adferuntur: (Rondil. cap. de memoria deperdita.

Anacardij aliud genus, quod Cajous, Frag. Tab. Fructus peregrinus 7. Cluf. ex. l. 2. c. 30. & in tab.

altera, Lug. Tab. Ger. nux est Cajous immatura.

Fructu ovi anserini forma, cujus extremo nux leporini renis figura (cujus nucleus suavissimus) adnascitur: ex fructu Canibales potioris genus conficiunt.

*Arbores venenata.*

I. Arbor fructu orbiculari venenato.

Penoabou Theveti, Lugd.

Arbor in America portulacæ folijs, & in fructu quolibet nuces senæ amygdalis similes, in singulis singuli nuclei, ad vulnera sananda, ut & oleum ex ijs expressum, utile.

II. Arbor fructu pilæ magnitudine.

Arbor venenata 1. Theveti, Lugd.

Hujus succo Canibales sagittas imbuunt.

III. Arbor succo venenato, radice esculenta. Arbor venenata alia, ex qua scarificata succus mortifer emanat, radice tamen esculenta, ex qua farinam, qua vescuntur, faciunt, Thev. Lug.

IV. Arbor fructu venenato, radice venenorum antidoto.

Arbor Baxama, cujus & umbra & fructus suffocant: cum tamen radix in alijs regionibus, venenorum antidotus sit, ut & fructus qui Rabaxit vocatur, Theveti, Lugd.

V. Arbor brassicæ folio excelsissima Americana.

Uhebebasou fructu pedis longitudine, quo a pum examina nutriuntur, Theveti, Lugd.

HERBAE ET ARBORES

*admiranda.*

I. Planta sanguineos sudores excitans, in epist. ad Monard.

II. Herba mortem aut vitam in morbis prænuncians, Monard. Lugd.

III. Baharas in Judæa radix colore flammæ as similis, circa vespæram veluti jubare fulgurans: quæ accedentem & evellere cupientem

ram diu refugit, nec prius fugam sistit, quam urina muliebri, aut menstruo sanguine conspersa fuerit, Joseph. de bello Judaico.

cum Aglaophoride sive Cynopasto terrestri Æliani: marmaritide Democriti: Cynocephalia & Osiride Apionis: moly, Homeris: & pœonia non Dioscoridis, sed Galeni, nisi fallor, convenit. Guil. pap.

Baaras aut Babras Josephi, ex loco natali, Ca. 1.

IV. Frutex Tartaricus.

Agnus Scythica, Borametz, Sigisf. Baroni ab Herberstein in hist. Moscovitica, Scalig. Lugd. Borametz Tartarica, Claud. Dureto, qui eum pingit.

Ex semine Melonis magnitudine crescit figura agni, quem omnibus partibus repræsentat & pro carnibus pilos gerit singulari cornu specie, & radix ad umbilicum surrigitur.

V. Arbor venereos stimulos domans: in epist. ad Monard.

VI. Arbor folijs ambulantibus, Pigafettæ.

Arbor in insula Cimbabon, Costæo, Guil. pap.

Arbor mira cujus frondes repunt, Scalig.

Arbor folijs virentibus & ambulantibus, Dureto, qui eam pingit.

In insula Cimbabon, arbor folijs Mori multum similibus, parte utraq; binos pedes breves & acutos habens, quæ ubi tanguntur, diffugiunt.

VII. Arbor Malavarensis folijs tactu se contrahentibus.

Arbor in provincia Pudefetan in Asia, Nicolao

Conti, Poggio Fiorentino, Cardano.

Arbor pudica, Scal. Dureto, qui arborem pingit.

Arbor verecunda in Pudefetaniam, Costæo.

Planta in Peru nascens, cujus folia contractu siccantur, Francisco Lopez: quam tamen Acuan verum aliqui vocant, Clusio monente.

Herba pudica, Lugd.

an Arbor circa Memphim, Theophr. 4. histor. 3. nascitur peculiaris quædam arbor circa Memphim, non folijs, vel ramis, vel tota forma peculiare quid sortita, sed eventus: facies enim ejus spinosa, folium filicibus (pennis Plinius) non ab simile: sed cum ramulos quispam cōtigerit, folia veluti ardescunt & languescentia contrahi ajunt, deinde paulo post ad vitam redire. Idem fere Plinius l. 13. c. 10. Huic arbori affinis herba, quam l. 10. f. 2. sub Herba viva proposuimus.

II. Arbor aquam fundens.

Arbor perennes aquas è folijs exudās, Benzoni in insul.

In Insula Ceyla def. vel Ind. Occid. par. 6. ubi  
& figura habetur.

Arbor mediocris magnitudinis in Insula Ferro  
est similis in toto oib. non invenitur, Linc.  
par. 3. Ind. Or. c. 5.

Arbor in Ferro Insula quæ incolis Garoe: Hi-  
spanis Sancta: veteribus historicis Til vocatur,  
par. 8. Ind. Orient.

Vide & Cardanum 6. variet. rer. 22.

Ombtron sive Pluviale (Plini) & Solini,  
hanc Insulam suspicantur Plin. l. 6. c. 32. in In-  
sula Ombria vocata, arbores similes Ferulae,  
ex quibus aqua exprimitur: ex nigris amara, ex  
canis idioribus potui jucunda. Verum Benzo &  
Linscottus, arbori folia Juglandis, quamquam  
paullò majora & perpetuò viridia, tribuunt, quæ  
fructum habet in cortice glandis instar penden-  
tem, cum nuculo suavissimo & valde aromatici  
gustus par. 8. Ind. Oriental.

In tota Insula nulla aqua reperitur, præter eam  
quæ ex illa arbore manat, quæ perpetua ac densa  
nebula, ubi solis æstus non flagrat, circumdat.

IX. Abores quibus ædiculæ superstruuntur.  
Ceibas sive Cerbas arbor maxima in Ind. Occi-  
dent., quam homines quatuordecim simul com-  
plecti nequeunt, Oviedo, Cardano, Francisco  
de Bello foresto.

Cerbas arbor in Nicaragua, quam quindecim  
complecti non possunt. Tantæ crassitie, ut In-  
di ædiculas supra construant, Petrus Martyr:  
pingit Claudius Duretus: vide & part. 6. Ind.  
Occid. 61.

Ceyba arbor, Leri de Bras. c. 12.

Ceyuas arbor grandis in India, ex quibus Indi  
suas Canoas fingunt & excavant, 9. par. Ind. Oc-  
cident. l. 4. c. 30.

Ligno est fungoso ut Suberis: fructu lana re-  
ferro & semine bombacis.

Quomodo Indi in arboribus domiciliis ha-  
bent, duabus figuris exprimitur, in parte 6. An-  
ticæ, & istorum ædificiorum meminit etiam  
Petrus de Cieca part. 1. Chronicæ Peruanæ c. 12.  
& 27. & 29, quæ valde capacia esse scribitur, ut plu-  
res etiam integras familias capere possint.

X. Arbor in summo cacumine saltem frondes  
minimas parturiens, ex cuius trunco integro,  
Canoas suas extruunt, l. inf. p. 4. Ind. Or. hg. 21.

XI. Licondo, arbor tantæ magnitudinis, ut  
sex vii brachia expansis vix possint circunda-  
re, & tantæ magnitudinis, ut 200. viros cum ar-

boris & tenuis capere possint, ex cuius trunco  
cavato scaphas conficiunt in regno Congiano,  
part. 1. Ind. Oriental. c. 4.

XII. Rarior arbor, ex qua in Virginea lin-  
tres fabricant, 1. part. Ind. Oriental.

XIII. & XIV. Yge, vera, arbores in Bra-  
silia quas integras decortiant, cortice illa  
ex quo scapham parant, quæ singule crigi-  
ta armatos vehunt. nam cortex pollicaris cra-  
ssitudinis, quatuor pedes latus, quadraginta lon-  
gus: par. 3. Ind. Occid. l. 3. c. 25.

Sic ex arboris Yuire vocatæ cortice, tiliz per  
simili, funes conficiunt: Leri de Bras. c. 14.

Lintres singuli, ex cortice arborum detracto  
constant, quos Ygar nominant, tantæ ampli-  
tudinis, ut singuli quinquaginta homines capi-  
ant: idem capit. 13.

XV. Gelfomoro arboris ab incolis dictæ cor-  
tex, in quibusdam Indiæ locis pecunia est: Pi-  
gasetta in desc. regni Congianil. l. c. 4.

XVI. Pindo herbæ caules aut Palmorum  
ramos, ad januas ædium Brasiliæ adponunt,  
Leri de Bras. c. 13.

#### Arbores anatisferæ.

I. Arbor ex cuius ligni putredine vermes, &  
ex his Anates viventes & volantes generantur,  
Claud. Duretus arborem pingit.

Hæstor Boëtius in desc. Scotiæ in Insulis He-  
bridibus, Klaki avem nominant, in quibus vim  
procreandi potius, quàm arboribus inesse, &c.  
quæ citantur à Cardano l. 6. de Var. rerum, du-  
bitatione prorsus digna dicens. Polydorus Vir-  
gilius pro fabula habet.

Olaus Magnus scribit, e lignis putridis fun-  
gos primùm enasci, ex his aves maritimas, quæ  
piscibus vivunt. Idem confirmat Cornelius Scri-  
bonius in epit. hist. de gentibus Septentrion.  
Alexander ab Alexandro de diebus genialibus:  
Antonius Torquemada in suo Hexamero: Joh.  
Baptista Porta in phytognom. Abraham Orte-  
lius in suo theatro. Sic Syl. Giraldus in l. 1. Hi-  
bernæ, Bernacæ dicuntur, quæ anatis palu-  
stribus similes, sed minores.

Bernacles, Ad. & Loo.

Britanniæ conchæ anatisferæ, Lob. belg.  
Anatisfera concha, Lon.

Ex furculis arborum conchæ anatisferæ, L. qd.  
Conchæ anatisferæ ex arbore dependentes &  
trunco adherentes, Aldriani de avibus & lib.  
de testaceis.

Continuè rubentia ferre, non sunt fructus terrestres, neque ex ijs anates oriuntur, sed Balani marinæ species, Colum.

In navigat. tertia Hollandorum per Norvegiam in Chinam Ann. 1596. live in par. 4. Ind. Or. hæc habentur: hoc loco Anserum rubentium ova magno numero collegimus: cujus generis anseres quodannis magna copia in Hollandia ad Wirlingam capiuntur: qui quo loco sua ova excluderent, hætenus nemini adhuc comperit fuit, cum multi eosdem in Scotiæ arboribus nasci, frustra contenderint.

II. Arbor ex cujus fructibus in aquam delapsis anates prodeunt, Claud. Dureto, qui ejus figuram proponit.

Arborem in Scotia apud Orcades Insulas reperiri audio, cujus fructus avem Anatam formam habens, producent, Æneas Sylvius in descript. Europæ.

Arbores in Scotia quarum fructus folijs involutus, si in aquam decidat, in avem transmutatur, quam avem arboream vocat, Seb. Munsterus in Cosmogr. Saxo Grammaticus etiam meminit. Arborum quarundam fructus similes conopini, si in mare decidant, in aves transeunt, quibus etiam in Quadragesima uti licet, Joh. Boticus in sua relat. De his etiam Pierius Valerianus in suis Hieroglyphicis, & Andreas Thevetus, in sua Cosmographia.

Fructus arboris non dissimilis arboribus nascentis, in tanta copia, ut folium vix cerni liceat: par. 8. Ind. Occid. descr. navig. 1. ipsius Drake.

In Guajana, Oltrea in arboribus, & non in terra crescunt, quod in India Occidentali & alijs lo-

cis frequenter isse non est, quem arborem Thevetus in sua Oltrea Antartica 2. 20. describit addita imagine peregrini capiti dam fructus: describitur etiam a Plinio l. 13. c. 25. par. 8. Ind. Occid. 1. 1. huj. Raleg.

III. Arbor cujus folia si decidant, sapienter ram, in aves volantes transmutantur in alijs mutantur, Claud. Dureto, qui hanc figuram

*Cornu plantæ de.*

Coronidis loco de Cornu plantabili quædam ex Hugonis Linchotani historia Indica quæ par. 4. Ind. Or. habetur, qui cap. 17. hæc fert, in Goa Insula, ad hunc nonnis eximium, juxta murorum terminos, locus quidam divinitus est, quo omnis generis pecudes maculantur, in quo animalium caelorum cornua passim objecta jacent, non solum seu nullius apertus usus, sed præcipue hanc ob causam, quod obijciuntur, quod Indis haud exigua cornua passim objecta sunt, si ei cornu ostendatur, ædibus obijciuntur: ita ut cornu ostendenti, a magistratu pœna constituta sit. Hæc cornua, si illo loco aliquandiu jacuerint, radices in terram deligunt, & nulla ejus in plurima quasi filamenta illa protuberante, & hoc modo in solum se innitente: radix brassicæ similis: sicut plures manibus evulsi, duas tresve spithamas elongatas, id quod nullo uspiam terrarum angulo similiter fieri compertum est. Hujus caulim vivam & immotam qui scrutantur & assequuntur, nemo quod sciam, & plures commiserunt.

nam & terra, in omni illo centro, valde laxosa & lapidosa est, &c.

SOLI DEO GLORIA.



CON-



# CONCLUSIO.



Utm ad huius Operis in quo DEI Opt. Max. admirandam sapientiam, clementiam ac bonitatem, in tot millibus ΠΑΝΤΑΙΡΕΟΝΤΩΝ velut digito solum demonstrare volumus, finem pervenerimus. Tibi DEVS, qui solus immortalis es, tibi inquam, ΤΡΙΝΥΧΙ & ΥΠΙ ΤΡΙΝΥΧΙ & ΠΑΝΑΕΑ Parenti, sit honor & gloria in sacula, quod pro ineffabili tua misericordia, inexplicabili clementia, inexhausta bonitate (ut qui sumus) ipse B. T. S. & Sapientia es, mihi misero peccatori tua gratia adfuisse, tuoq. auxilio, ut ea quae nunc supra quadraginta annos, in Plantarum historia adeo admiranda, suspicienda, vaga, & anag. imperferuabili simili, in qua potentiam tuam, sapientiam & bonitatem de larasti, partim varijs & laboriosis peregrinationibus, partim diligenti Botanographorum lectione, partim optimorum virorum communicatione, observavi, & observata Veterum & Recentiorum relatione comprobari cognovi, in hunc Indicem conferre potuerim. Tibi aeternae DEVS, pro mea vita & beneficijs, toto vitae meae tempore adeo clementer affeceris, mihiq. tuâ curâ tantum servas, sit laus in sacula. Insuper devoto pectore & supplex rogo, ut porro & mentem & intellectum meum illumines, manum meam regas, ut ea quae solum nomine in hoc opere attigi, & quorum historiam in ΤΗΛΕΤΡΟΒΟΤΑΝΙΚΟ, (cujus Operis hic solum Index est) fideliter tradere & absolvere possim, quod ea ad altissimi tui Nominis gloriam, ad tanti generis utilitatem vergant, cum sine Tuo auxilio à nobis nihil, at Tua ope omnia praestari possint. Largire quæso tuum S. Spiritum, ut miracula tua in Arborum & Herbarum creatione, explicare queam. Tuo enim jussu, ut cum Sancto tuo Propheta loquar, terra, tertio Creationis die ΣΤΙΡΞΕΣ creavit, Herbas frugiferas, & Arbores fructiferas, quæ suo quæque in genere fructum ederent, & in quibus suum semen incesset in terris: tradidisti sexta die homini omnes Herbas, quæ sunt in omni terra solo frugifera, omnesq. ab oreo fectu pradias Arbores semen parientes, quibus ad alimentiam uteretur. Sic bestijs terræ, tribus omnibus, aërisq. volucribus, & quacunque vitali spiritu animata in terris morantur, his omnem Herbarum viriditatem ad paslum dedidisti. Quare o S. ΤΡΙΝΙΤΑΣ meo instituto clementer adesse digneris, quo opus, à multis annis inchoatum, ad felicem finem perducere queam: siquidem

Nullius sit felix conatus, & utilis unquam,  
Consilium si non detq. juvetq. Deus.

F I N I S.

ΤΙΧΗ ΚΑΙ ΠΟΝΩ.

# APPENDIX.

## ALIQOT PLANTARUM DESCRIPTIONES ADPONERE LUBET:

Ad pag. 75. post *Allium Pyrenaicum* ponatur.

**ALLIUM** live *Moly Virginianum*: folijs est gramineis angustis, palmaribus, nervosis acuminatis, per margines nonnihil asperis, & cauliculus superantibus: cauliculis semipalmaribus, umbella ceu in *Moly* luteo insidet, quam flores plures purpureo cærulei oblongis pediculis donari, ijsq; trifolij insident: at umbellæ folia bina oblonga, ut in *Allij* live *Moly* montani speciebus, sed latiora, subjiuntur. Hoc Phalangij Virginiani nomine Luteria ex horto Jo. Robini, D. Georgij Spörlinus Basileensis, Medicinæ candidatus, in hoc studio versatissimus, una cum alijs multis, Anno 1622. misit.

Ad pag. 138. lin. 21.

**BOTRYS** ambrosioides Mexiocana: radice est oblonga, fusca, capillaribus fibris cincta, intus candida: caule pedali, etiam altiore, sed cubitum non superante, eoq; subrubente quandoque, rotundo, striato, pilis levissimis & rarisissimis aspersis: folijs pallide virentibus, Atriplicis sylvestris vulgaris forma similibus, oblongis, sinuatis, pediculis oblongis donatis & absque ordine caulem ambiens: ad singulorum exortum, ramuli unciales, ut in Atriplice emergunt, pluribus velut capirulis alternatim dispositis, congestis, quibus singulis foliolum exiguum subijcitur, quibusq; apertis flosculi exigui, luteoli, ut in Botry conspiciuntur, hisq; semine minutum copiosumq; succedit. Planta annua est, ex semine deciduo sese propagans. Et licet tota planta primo intuitu Atriplicem referat, ita ut Atriplex Mexiocana dici possit: attamen propter florem gravem quidem, sed non inprimis, & si poen aromaticum ad Cuminum accedentem, & propter florum & seminum copiam, ad Botrym referre maluimus: hocq; primo nomine Parire Mexiocani in horto Cl. D. Georgii Plateri Anno 1619. crevit.

Ad pag. 141. lin. 34.

**MILLEFOLIUM** aquaticum cornutum minus: hoc propterea minus, quod profusa filicellæ capillares tenuissimas habet: ex quibus cauliculi palmares, pilo tenuiores quosvis solida plura, etiam quovis pilo tenuiora & breviora orbiculatim ambiunt, quæ simul parva lacinia magnitudinem non æquant: ex quorum pedicelli tenuissimi prodeunt: flores necdum observavimus. Hoc in fundo paludis in Michelfeldensium D. Sporlinus, Anno 1621. reperit.

Ad pag. 184. inter *Aconitum* & *Doronicum*.

**DORONICUM** Americanum laciniis, tota folia habet atrovirentia nonnihil lenticulata & aspera, in quinas lacinias divisa, quarum quilibet uncias quinq; vel sex longa, dum lacinia incumens definit & per margines profundius incisa est: quarum tamen media in summitate triloba: caulis est rotundus, striatus, lævis, circa minus summatem folia ex rotunditate autem incisa, non quidem laciniata, sed per margines profundius incisa: caulis summo flos magnus luteus Doronici forma, folijs luteis oblongis discum ambientibus, quare ad Doronicum retulimus licet Aconiti Americani nomine Luteria D. Spörlinus misit, (ex horto Vespas. Rot. in Italiam Luteriani seduli, a quo multa nos exstatum) & ad viri altitudinem assurgere statuit.

Ad pag. 242. lin. 28.

**LYSIMACHIA** lutea corniculata: planta ramosa ad viri altitudinem assurgens forma ad *Lyfimachiam* latifoliam purpureâ filicellam accedens: hæc ex radice oblonga, filicellam crassitudinem superante, paucis foliis stipitata, caulis exurgit initio rotundus, deinceps medium, ob plurimos ramos angulosos, sed nuncius, lævis, statim a radice in brevioribus majoribus ramos, hique in alios lævis, capillares, brachiatus, qui rotundi, paucissimis pilis

ad hunc inde marginem parvis rubentibus : angustis, ex quibus tanquam ex poris pilus prodegit. Folia superantia, ad radicem plura, oblongum, latitudine unciam vix excedentia, quæ trassa, pallide viridia, lævia, in æthere delincentia : quorum in æthere quandoque laciniata, reliqua vero oblique sinuata, per quorum medium costa alba, ut in *Lyfimachia* Chamænerion dicta, excurret : ex alarum sinibus periculos articulatæ & rotundus prodit, cuius pars supra articulum triangularis fistulosa, cuius latus magnus, flavus, quadrifolius, extra folia est : error qui cum primo florere incipit, quadrangulus est, quo aperto, verum Sole tantum lucente, in ejus medio stilus conspicitur, qui viridis ad articulum usque descendit, & apicibus major sulphurei coloris crucis in modum effunditur, ornatus est, quem stamina octo circumstant, quorum quatuor singulis folijs adposita, alia quatuor ipsis interjecta sunt : hisque singulis capitulum oblongum albicans insidet : ipsi vero flori, calycis in modum, folia quatuor oblonga, angusta, pallida subcitantur. Flos odoratus est, nonnihil ad Keiri, vel potius *Lithophodeli* lutei odorem accedens, ultra diem non persistens : cum is qui sub vespem aperitur, ad sequentis diei vespem flaccescat, unde *Ephemerum* dici meretur. Flore, cum pedicello ad articulum delapso, altera pediculi pars sesquiuncialis, sensim ad uncias binas, etiam ternas oblongatur, & in siliquam sive corniculum abit, & propter semen copiosum, nigrum, parvumque quod continet intumescit : quod ubi maturuit ipsa cornicula quæ utrinque ad caulibus latera numerosa sunt, in quatuor partes dividuntur. Hujus semen, *Lyfimachia* Virginianæ nomine anno 1619. Patavio accepimus, quod Vere satum, tota æstare & hyeme sine cucule remansit : at sequenti anno, circa Veris finem aulescere, & Junio florere cœpit : nunc vero ex deciduo semine (annua enim planta est) autumnio delabente, singulis annis in hortu meo copiose & usque in autumnii finem vivit. *Matthioli* *Ephemerum* esse suspicatus sum, sed tam nullas, nisi *Dioscoridis*, notas adnotare, nil pronuntiare licet.

Ad pag. 28.

*ISTHUS* prunæ angustifolium umbellatum : cauliculus est palmo minore, rotundo novum, diffusissimum, oblongum, nonnunquam

utrinque binis, ambiunt, in cus summitate flores quatuor in bella dispositi, cæteris, parvis oblongi, cævi, per ora in quinque crenas divisi. Hoc ex horto Patavino, ante plures annos D. Heyl, nunc *Danilisci* medicus, attulit.

Ad pag. 201.

*VIRGA aurea Mexicana* : ex una radice caules plures, nonnihil tamen reclinati, surgunt : circa quos folia palmaria, sesquiunciam lata, crassiuscula, splendentia, in summitate tamen multo breviora : ex foliorum alis ramuli prodeunt, quibus flores saturatè lutei, sursum spectantes & unam tantum caulis partem occupantes, insident. Lutetiæ in horto Robini D. Spörlinus collegit.

Ad pag. 299.

*VITIS Virginiana* : folijs est *Vitalbæ* nonnihil similibus, sed multo latioribus, rotundioribus & tenuioribus, viticulis suis altè scandens, & suis claviculis arbores comprehendens, cuius fructus corymbis hederaceis similes esse dicunt. Lutetiæ in horto Robini D. Spörlinus legit.

*VITIS Canadensis* nomine, ex eodem horto misit alterius fruticosæ plantæ folia, tria in uno pediculo, instar foliorum *Trifolij* disposita, pediculo longo glabro, folijs latis, crassis : quod si pediculis aculei additi forent, arboris *Coral*, quam *Cladius* in *Append. histor. lucrar. plantarum* descripsit, pronuntiarem.

Ad pag. 414. post lin. 37.

**II.** *Rhus Virginianum* : arbuscula est *Rhoë* vulgari major, folijs multo majoribus, acutioribus, mollioribus & viridioribus : quorum quælibet pinna, uncias quinque & sex longa sunt, & sequentis quod ex *Tupinambault* habemus, longiora, latiora, protundius crenata & viridiora : folia verò superiora *Jasmin* albi folijs similia sunt : rami ex stipite pullulantes, tenella cervorum cinnamomi ex crasso medio erumpentia, referunt : similiter etiam hirsuti sunt, eundem colorem, eandem figuram habent. spicam, *Rhoë* vulgari multo majorem habet. Ex eodem loco habemus.

Ad pag. 444. b.

*PRUNO* *Sylvestris* affinis *Canadensis* : frutex est sesquicubitalis, caule lignoso, totum atro-rubente cortice vestito, in ramulis rachistrotis folia habet *Ruræ* *Hypericoidis* similia : floris, *Pruni sylvestris* floribus similes, sed multo

minores, copioses, candidos, pediculis oblongis uncialibus & capilli modo tenuibus, caliculis virentibus sustentati, insidentes; in quorum medio, filamenta plura exigua & tenuissima: hos nullo fructu succedente, Luræ in horto Robini decidunt: qui Hypericum frutescens nominat, & Canada allatum allert.

Ad pag. 432.

RICINUS Americanus folio Staphisagria: hujus ramum habemus cubitalem ferè, lignosum, crassum, rufescentem & circa foliorum exitum hirsutum, quem folia pallide virentia, pediculis oblongis & hirsutie asperis donata, ambiunt: folia inferiora, ad foliorum Ficus formam nonnihil accedunt, & in lacinias quinque divisa sunt: superiora verò, quæ Staphidis agria folijs similia, in ternas lacinias secta sunt: omnia verò per circumferentiam crenis acutis exasperantur & nonnihil pubescunt, ita

ut tactu mollia sint: caulibus summis, & in ramulos aliquot villosos dividitur, quibus per quinque folijs, ex intensa purpura rubentes (hæc figura pictor expressit) insident. Plura nō licet, cum solum ramum siccum, cum figura coloribus illustrata, Ricini Americani folijs Ficus nomine anno 1621. Verona ab insigni Pharmacopœo & Botanico, D. Johanne Pona, una cum alijs elegantissimis acceperimus & quotidie, ex Illustr. & Magnifico Dn. Nicolai Contareni Senatoris Veneri, instructissimum viridario, multa pulchra & exotica, ipsius opera, accipimus: pluraque quotidie ab ejusdem filio Francisco Pona, Philosopho & Medico apud Veronenses clarissimo expectamus, & non solum plantas & semina; verum etiam Naturæ ~~parentis~~ Parentis sui, duplici Indice ab ipso complexum, veluti nuper ad nos perscriptis.

#### A P P E N D I C I S F I N I S.



### L A V S COGNITIONIS SIMPLICIUM.

#### ORIBASII XV. COLLECTAN. CAP. I.

*Simplicium medicamentorum & facultatum quæ in eis insunt, cognitio ita necessaria est, ut sine ea nemine sit medicari queat: ita enim magna nobis suppetit copia, & nos in quaerendo, & in opportunitate medicamentorum facile comperimus. Valet enim eadem notitia ad componenda medicamenta conficienda: præterea verò ad eorum vires Universales inveniendas pertinet, & quod artus est apud omnes passim.*

#### AETII TETRAE. II. SECT. IV. CAP. LI.

*Omnium simplicium pharmacorum vires nosse oportet eum qui aliquod compositum est facturum: quoniam si eas non noverit, etiam ea, quæ ab alijs composita sunt, rectè utetur; maxime cum iude hæc descripta fuerint.*

#### FERNELIUS IN SUA MEDENDI METHODO.

*Simplicium cognitio, collectio, delectus, expurgatio, conservatio, præparatio, correctio & mixtura, industria seorsim ad Pharmacopœiam referuntur, ac pertinent: quorum tamen & Medicum in priviū gnatum, peritumq; esse oportet, siquidem apud artus ministros auctoritatem de præceptisq; suam ratinere ac tueri velit, quos docere hæc ipsa debet.*

M O N O  
T O T P I Σ M E Γ I Σ T O  
Θ Ε Ω  
Τ Ι Μ Η Κ Α Ι Δ Ο Ζ Α  
Ε Ι Σ Α Ι Ω Ν Α.

INDEX

*Notandum ubi (a) habetur columnam primam, ubi (b) colum-  
nam secundam. ubi a.b. utramque: ubi nec a nec b) semper primam  
p. in e. columnam denotare.*

	Bariga	109 b	Acetabulum Fuch.	187	nij	307 b	Alexander Turn.	354 b
	Abaco	444	Acerola ejulq. species	112	Aethiopsis ejulq. species	241	Alfalfa Trag.	139
	Abaciza Ponz	393 b	Acerolella Lon.	114 b	Aca Cretenium	381 b	Alga Trag. 141. b. secunda	193 b
	Abela	393 b	Achanasa Thev.	111 b	Agallochum 353. sylv.	498 b	Alga anastifolia	364 b
	Abelmosch	475 b	Ac. 304. alpini. 331 b. 134 b		quibuldam	397	Bombicina 363 b. in pna	364
	Abelmosch Ponz	31 b	Ach. 304. alpini. 331 b. 134 b		Agaricus arboreus 375. faxa	175 b	ces Lugd.	364
	Abdelm Alpin	311 b	Achillea montana Lob.	134	Agalaga	439 b	lactifolia 364. marina 1	364
	Abelra	384 b	Achilades	439 b	Agavanus Ponz	380 b	ibid. b. minima Czf. ibi	364
	Alvel	458 b	Aemaria marita 365. palu-		Ageratum ejulq. species 221.	tinctoria.		364
	Abies Dodon 49. ma-		stru	471 b	Dod. gal. 364. ferulace.		Algodon	430
	ma 365. malcula Theoph.				um	134	Alhagi Rauwolf.	394 b
	493.		Aconitum ejulq. species 133.		Agriahid Alpin	479	manna	479
	A. 304. alpini. 331 b.		barzichoides 182. candi-		Agrotarum Gazz	314 b	Alephas And. Ang.	442 b
	Abro. 304. ejulq. species 136.		dum Lugd. 182. eandem		Aglaophotis And. Ang.	314 b	Allyum M. 304. 393	442 b
	formia ejulq. species 136 b		um 182 b. pardalaneus		land.	312 b	Allyum C. 1	442 b
	formia Fuch.	138 b	ejulq. species 184. pardal-		Aglophotis Corru	354	Alma 304. 34. Marit.	184
	Abur Alpin	343	aneus Fuch. 167. race-		Agrot. Trag.	113 b	Lugd. 304. Cadi 304. Trag.	184
	Abnethum ejulq. species 138		mum 184 b. saluterum		Agnes calus ejulq. species	312 b	216. Lob. 191 b. Gm. 351 b	184
	alb. referent 136. dulce 139.		Tab. 167. Gelfo.	184	475. Serithea	312 b	267. Diole. Colum. 244	184
	marinum 137. montanum		Aconitum Americanu 310 b		Agria Angul.	415 b	Czf. 244 b. alterum Bon-	184
	ejulq. 304. 393 b.		Aconitum lycoctoniu genus		Agrimooia	312 b	ni 244. 243. pratense	184
	Al. 304. 304. 304. 304.		Lugd.	312	Agriomoides Col.	312 b	C. 244.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Acorus ejulq. species 34		Agriocina Ponz	384 b	Alima bottivodes 186 b. 187	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Acorus Theoph. Ang.	374	Agriocina Ponz	384 b	fons glabro 186 b. silva-	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Acha Plin.	183 b	Agriopistinae Belli	313	rum Col.	244 b
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Acua portus 24 b. Acua ve-		Agriolani Belli	21 b	Allyon And. Ang. Col. Col.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		rum	312 b	Ahovay Theveti	434 b	Marit. 304. Dod. 304. b. Fr.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Aculeata Lonic.	178 b	Aypi	91	east. 238. Czf. 250. Diole.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Aculeola Gazz	381 b	Ayr Hyacinthus	475	304. b. montanum Colum.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Acy. mofchata Czf.	319	Ayr Palma	307	243. Gm. Czf. 304.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Acua Pina Czf.	454 b	Ayave	491 b	Gm. Czf. 304. 304.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Acutella Cord.	189	Ay. Claf.	91 b	neum ebf. 304. 304.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Adianum ejulq. species 355.		Aruga Matthiol. 249. lutea		Allyon C. 1.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		albin Czf. ib. Lob. 318 b.		Claf.	250	Allyon arvense albin. T.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Tab. 356 b. aureum Tab.		Azoon arborefcens 282 b.		ber. 114 b. major Tab. 114	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		356. fureatum Thal.	358	daphnyllum 223 b. tele-		b. P. 304. 304. C. 304.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Adiantum nigrum. Czf. 358 b		phum 209		304. 304. 304. 304.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		I. 304. 355 b. Tab.	355	Azoon perlimi 304. 304.		A. 304. 304. 304. 304.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Adonis ejulq. species 178		Alabaftrici Lob.	322	A. 304. 304. 304. 304.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Adoreum Lugd. 21. Dod. 22		Alaterum Lugd.	376 b	A. 304. 304. 304. 304.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Adraehne Theoph. Cl. 460		Albahaec Acufz	426 b	Al. 304. 304. 304. 304.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Adrachia Cierenf.	460	Alburn olus Dodon.	165 b	A. 304. 304. 304. 304.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Agilop Phnii. Trag. 21. Gelf.		Alch. Gef.	289	A. 304. 304. 304. 304.	184
	Alb. 304. 304. 304. 304.		9 b. Marit. Lob.	10	Alcanna Arabum	476	Alinum ejulq. species 321. 322	476
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Agilop arbor	430 b	Alca ejulq. species 316. Sy-		guinum 74. b. bicorne 74	476
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Aggypton Gratevz	389	ruca 311. Veneta ibid. ve-		b. caninum ejulq. species 321	476
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Agolethron Plinij 18 b.		scaria Dod. 317. villosa ib.		343. 304. 304. 304.	476
	Alb. 304. 304. 304. 304.		Gefneri	88 b	Alch. melch Alpin	331 b	Al. m.	





- Arachnoia ejusq;* spec. 307.  
*rotunda* vulg. Trag. 143 b.  
*rot.* vulg. similis Trag. 178 b.  
*Artemisia ejusq;* species 208 b.  
 sylv. 210  
*Artemisia Tab.* 95 b. Bronf.  
 96 b. Plinij Lac. 97  
*Artemisia Lob.* 208 b.  
*Arnabum* 35  
*Aromata* 407  
*Araguero* 509, 510  
*Artemisia ejusq;* species 157.  
*marina* 139. monoclonos  
 132. polyclonos 131. ramo-  
 fa 133. tennifolia Fuch. 135.  
 secunda Clapp. Turcica 138  
*Arthanita* 308  
*Arthetica Pandet.* 260  
*Arthetica Thal.* 335  
*Arthetica Cam.* 241  
*Arth. vulgo* 274 b.  
*Arth. ochi* 383  
*Arth. ochi* sub terra 277 b.  
*Artuto Coruſi* 310  
*Arum ejusque* species 195.  
*Aegyptiacum* 196. palustre  
 Geſn. 195 b.  
*Arundinaceae pinnata* Lobel.  
 387 b.  
*Atundo ejusq;* species 17. In-  
 dica Guil. 17 b. ejus ſpe-  
 cies 18. *lutea* permos Geſ.  
 258. minima Lugd. 5 b. *ſac-*  
*charifera* 18 b. *vericolor*  
 ibid. *volubilis* 39  
*Aſa ite.* *ſexida* 499 b.  
*Aſarina Matt.* 197 b. Lob. 136 b.  
*Aſium* 197. *muti* Lugd. 359 b.  
*Aſcalonitici* Cxf. 72  
*Aſcebra magnum* Meſ. 120  
*Aſclepias ejusq;* species 303  
*Atyrum Cord.* 179. ejus ſpe-  
 cies 380  
*Aſcolimbros* Bellon. 384  
*Aſcopos arbor* 409 b.  
*Aſcouas Lob.* 151  
*Aſpalathus ejusq;* species 392.  
 & 394  
*Aſparagus ejusq;* species 489  
*Aſperula ejusque* species 314.  
*marula* Col. 314 b.  
*Aſperugo Plin.* 334. Dod. 157 b.  
*Aſphodelus ejusq;* species 18.  
*ſermina* Fuch. 77 b. Galeni  
 70 b. *hiſſaceus* Tab. 8  
*Aſplenium* Matth. 354 b. ſylv.  
 Trag. 359  
*Aſſa ſive Tamarindi* 405 b.  
*Aſter Anticus ejusque* species  
 266. *luteus* alter. Lugd. 18.  
*cernuus* ib. *cræuleus* Clap.  
 267. *conyzoides* Lob. 266  
*th. Peruanus* 277 b. *purper-*  
*ſoch.* 267. *non articus* Tra-  
 ge. 167  
*Aſtergiſ Rhaſis* 415 b.
- Aſterias* 351  
*Aſtragaloides* Dod. 351. her-  
 bar. Lob. 349 b.  
*Aſtragalus ejusq;* species 351.  
 Lugd. 344 b. Column. 351.  
 Monſpel. 349  
*Aſtrantia* 156. nigra 186  
*Athanaſia* 132  
*Attagene Theoph.* 300  
*Atrachys ejusq;* species 372.  
 Matth. 379 b. *Cynria* Lugd.  
 ibid. *marina* 384. ſylv. Tra-  
 ge. 379  
*Atropis ejusque* species 119.  
 ſyl. 118, 119. *maritima* 120  
*Avati* 25  
*Avellana ejusque* species 417.  
*Indica* 509 b. *Mexicana*  
 442. *porgeas* 418 b.  
*Avena ejusq;* species 23. *Græ-*  
*ca* 10. *nigra* ibid. *herdes* ib.  
*Avicularia* 215  
*Avornus* 428 b.  
*Auranitiales* 436  
*Anrea mala* 167 b.  
*Aurelia Gazz.* 264  
*Aureum malum* 436  
*Auricula Judæ* 372. *leporis*  
*Cxf.* 187 b. Geſ. 278 b.  
*Auricula muris ejusque* species  
 262. *mutis* Dod. Trag. 254.  
 Cam. 333 b. Col. 263 b. Cxf.  
 246 b. 249. *major* Trag. 129  
*Auricula urſi ejusque* species  
 242  
*Auzuba* 460 b.  
*Axi* 102  
*Azarolus* 454  
*Azavav* 286  
*Azedaræth* 415.
- B.
- Baccæ Orientales* 311 b.  
*ex Virginea* 472  
*Baccharis Alpini* 266. Dio-  
 scor. 238. Monſpel. 267.  
*Rauvolf.* 264  
*Baccho* 91 b.  
*Baculæ Cxf.* 452 b. 470  
*Bacularius Guil.* 447  
*Baharas* 512  
*Balador* 511 b.  
*Balanus myrteſica* 402  
*Balanſia* 438 b.  
*Balaſe* 230. *criſpa* 231  
*Balaſium ejusq;* species 420  
*alpinum* 468  
*Balaſium fruſtus* 407. 418 b.  
*Balaſtina aggreſſa* Trag. 218  
*Balaſtina ejusq;* species 306.  
 altera Col. 307 b. *minor* 221  
*Balaſtina.* *Brum.* 225. *offici-*  
*cinæ.* Eſyl. 218  
*Balaſtæas* 157 b.  
*Bambus* 18  
*Bamia* 317 b.
- Banum* 578  
*Banque* 427  
*Banobab Alpini* 330  
*Bapnſecula* 273  
*Baracocca* 442  
*Barba capræ ejusq;* species 163  
*capri* Cxf. 183 b. *hitei* 274.  
*ſylvana* Cxf. 194  
*Barba caprina miſor* Geſ. 316  
*Barba Jovis* 390. Cxf. 397  
*Barbarea* 98 b. *minor* 101 b.  
*marialis* ibid.  
*Bardana* 192  
*Baryococcalon* 168  
*Baſilicon ejusq;* species 225.  
*ſyl.* 204. *aquaticum* 129 b.  
*Batan* 91  
*Batallas* 41  
*Bathleſchala* 169 b.  
*Baticula aſſ.* *Batis* ibid.  
*Batie Indi* 318 b.  
*Batrachion Apuleij* Dod. 179.  
*Cluſ.* 180  
*Bavanus* 508 b.  
*Bancia* 355 b.  
*Baxama* 512  
*Bellidum* 303. *ejus fruſtus* 510  
*Beccabunga* 252 b.  
*Bedeguar* 483  
*Bedengian* 167 b.  
*Been album* Geſ. Dod. 205  
*Been rubrum quibſdam* 161.  
*officin.* Guil. 192. *quibſ-*  
*dam* 205 b.  
*Behen album & rubrum Ara-*  
*bum* 235. *Anquil.* 151 b.  
*Beidelſar Alpini* 116 b.  
*Bella donna* 166  
*Bellon Lugd.* 328 b.  
*Belvedere* 212  
*Bellis ejusq;* species 261. *ex-*  
*rula* 262. *lutea ejusq;* ſpe-  
 cies 262 b. *lutea Dalech.*  
 265 b. Plinij 176 b.  
*Belmuſcus Aegy.* *Ponæ* 317 b.  
*Belzonium* 503  
*Benedicta* Trag. 321 b.  
*Ben Judzum* 303. *magnum*  
 Monard. 418. *parvum* Mo-  
 nard. 402 b.  
*Ben 433 b.* *Acotiſz* 499 b.  
*Berberis ejusq;* species 454  
*Berennus fruſtus* 461  
*Bernacles* 513 b.  
*Berula Tab.* 251 b.  
*Berſafe Avic.* 408 b.  
*Beta ejusq;* species 117. ſylv.  
 Cord. 191. Plinij 192.  
*Betella* 410  
*Betonica ejusque* species 235.  
 altit. 206. *aquatica* 235 b.  
 216. *ſortida* 236 b. ſylv.  
 Fuch. 209 b. 210. ſylv. *Pau-*  
*li* *Quadrantio* 231 b.  
*Betonica Pauli* Dod. 246. *Ca-*  
 248  
*Betre* 410  
*Benla* 427  
*Berulus* ibid. b.  
*Berugo* 300  
*Berzardica radix* 14  
*Bibocilla Cxf.* 191  
*Bidenæ.* Cxf. 321  
*Bifolium* 87. *Lonic.* 302 b.  
*Bila radix* 239 b.  
*Bifermas Cam.* 238  
*Bifingua* 307  
*Bifmalva* 315  
*Bifnaga* 311  
*Biforta ejusq;* species 192  
*Biaa Ovied.* 419 b.  
*Blaſtaria ejusq;* species 249  
*Blatterlos Holland.* 284 b.  
*Blitum ejusq;* species 118. *In-*  
*dicum* 150. *Peruanum* 121  
*Bolbonach* 203  
*Bolens quercus* 422 b.  
*Bolunbac* 433 b.  
*Bombax* 430. *humilis* 263  
*Boo vel Bao* 428 b. *Alp.* 474 b.  
*Bonacas* 308  
*Bonduch Ponæ* 399 b.  
*Boniſma* 384 b.  
*Boniſſia* 305  
*Bonus henricus* 115 b.  
*Bons Dod.* 338. ſylv. 388 b.  
*Boracem* 512 b.  
*Boræ* 446 b.  
*Borda* 289  
*Borrage* 256. *minor* ſyl. Col.  
 257 b. *minima* Lugd. 259 b.  
*Borty rubrum* 131 b.  
*Bortys ejusq;* species 138  
*Bortys ambroſioides* *Mexi-*  
*cana* 520  
*Bourgeſpine* 476 b.  
*Brabyla* 441  
*Branca oriſina* 177. *ſtaſica* 385.  
 aculeata ibid. b.  
*Brallium arbor* 393  
*Brasſica ejusq;* species 110. ſyl.  
 ejusq; species 112. *marina*  
 295. *ſpinofa* 111 b.  
*Brasſica Murtiana* 359 b. *pra-*  
*terſis* Loon. 376  
*Brefma* 412 b.  
*Brindones* 434 b.  
*Bryon Plinij* 422 b. *laſtice-*  
*ſolij* Lob. 364  
*Bryonia ejusq;* species 297  
*Britannica* Plin. 101. *Ang.* 242  
 b. *Cam.* 211. *Gefner.* 110.  
 Geſn. Lob. 205 b. *quorum*  
 213 b.  
*Briza* 212  
*Bromos* 9 b. 10 b.  
*Bronella ejusque* species 260.  
 234 b.  
*Brutabæ* 434 b.  
*Brufcus* 470  
*Bubonium Hippocr.* 139. *lu-*  
 248  
*Buc-*

<b>Ruccium</b> Dod. 142 b	<b>Calamagrostis</b> Trag. 4. 12 b.	<b>Capos</b> 143. Plinij 178 b	<b>Caryophyllata ejusq;</b> species 321. Veronenum 143 b
<b>Rutranion</b> Cordo 212	<b>Lugd.</b> 154	<b>Capotes fructus</b> 437 b	<b>Caryophyllus ejusque species</b> 260
<b>Rucos</b> Rucos fructus 295	<b>Calamba</b> 393	<b>Capparis ejusque species</b> 280	207. barbatus ejusq; species 208 b. 309. caribuanus, 208 b. 309. caruleus ibid b.
<b>Rugifolium</b> frivum ejusque species 256. fylv. Lon. 154. fyl. ejusque species 156 b. echinoides 128 b. rubium Lon. 235	<b>Calamitosa ejusque species</b> 222. aquatica Tab. 1b. montana Trag. 215. ocimoides Tab. 217. 12111a Fuch. 260	<b>Alpini</b> 266	<b>Caryophyllus hortensis simplex ejusq;</b> species 282. arborecens ibid. b. virginicus Tab. ibid. b. monanus Lobel. 211. pumilio Clusij 206 b
<b>Rugul.</b> Dod. 260	<b>Calamparc</b> 393	<b>Caprifolium ejusque species</b> 302. terria Dod. 451 b	<b>Caryophyllus</b> 101
<b>Ruparidium</b> Fracast. 182	<b>Calamus aromaticus</b> 34. Indicus 18 b. Peruvianus spinosus 387 b	<b>Cappiola Leonie.</b> 101	<b>Caryophyllus holostius ejusque species</b> 110 b
<b>Rubus arvensis</b> 47. coronarius 43. crinitus 48 b. cruentus Hipp. 76 b. efculentus 42. 48. leucanthemus 70. foliosus 70	<b>Calathiana veina</b> Lugd. 188	<b>Capitulum ejusque species</b> 101	<b>Caryophyllus indicus ejusque species</b> 132. Saxatilis ejusq; species 111. simplex laciniatus ejusque species 209 b
<b>Rubus eriophorus ejusq;</b> species 47. laevis Czf. 48	<b>Calendula ejusq;</b> species 175. alpina Ger. 185	<b>Caradana</b> 450 b	<b>Caryophyllus fylv. ejusq;</b> species ibid. prolifera ibid.
<b>Rubus fylv.</b> Czf. 43. fylv. bifolius Gef. 45 b. Gef. 52 b. Fuch. 71. unifolius Clus. 56 b. Lugd. 183. vomitorius Martb. 43. Lon. 45 b. 46	<b>Calichimachia</b> Ang. 222	<b>Carapall</b> 437	<b>Caryophyllus aromatic.</b> 410. Plinij Imper. 412 b
<b>Rubine</b> Plinij 42. 43	<b>Calla Plinij</b> Dalech. 195. 196 b	<b>Cardamine</b> 104. alpina 104 b. 105	<b>Caryox</b> 504. 509
<b>Rubocastanum ejusque species</b> 162. Coniophyllum Camer. 161 b	<b>Callia ejusq;</b> species 175. alpina Gef. Tab. 185. Africana 131 b. palustris Clus. 276 b	<b>Cardamomum ejusq;</b> species 411. Arabum 102. Lac. 146	<b>Carolina homilis</b> Col. 380. fyl. 379
<b>Rubocodion</b> Theophr. 32 b	<b>Camarinas</b> 486 b	<b>Cardes radix</b> 91 b	<b>Carabadium</b> 146
<b>Runa</b> 428 b	<b>Camarrosum Rhafis</b> 293 b	<b>Cardi</b> 458. fylv. ibid. b.	<b>Carabe</b> 402
<b>Runa palla</b> 408	<b>Camelina</b> Dod. 109	<b>Cardiacia</b> 130. melica 129 b	<b>Carosabactis</b> 298 b
<b>Runcho Aviceni.</b> 428 b	<b>Camir fructus</b> 406 b	<b>Cardispeum</b> Tab. 343	<b>Caros alpinum</b> Gef. 145 b
<b>Runlas</b> 95. adulterinum 99	<b>Camolanga</b> Clus. 311 b	<b>Cardonem</b> Czf. 381 b	<b>Carota</b> Martb. 151 b
<b>Runium</b> 162. Dalech. 150 b	<b>Camotes</b> Clus. 91	<b>Cardoparium</b> Gef. 381	<b>Carpeum</b> Alpin. 266. Czf. 410. Cast. 164. Cord. 412 b.
<b>Ruphthalmum ejusq;</b> species 334. Fuchij 131 b. ellebori species Dod. 186. Lon. 261	<b>Camulus</b> Theophr. 383 b	<b>Carduus</b> ejusq; species 372	<b>Lonic.</b> 412
<b>Rupulium ejusq;</b> species 178	<b>Campanula ejusq;</b> species 93. arvensis Dod. 215. alba fyl. 294. autumnalis Dod. 188 b. carulea 295. Indica 295 b. laefcens Clus. 93. lutea liliifolia Lcb. 214	<b>Carduus acutus</b> Lugd. 380 b	<b>Carpinus</b> Lugd. 431 b. Martb. 417. nigra ibid. Theophr. Trago 418
<b>Rupulium</b> 165. 166. angulifolium alpinum 272 b	<b>Campanula hirsuta ejusque species</b> 94. fylv. Trag. 143. 244	<b>Carduus acutus</b> Lugd. 380 b	<b>Carpobalsamum</b> 400
<b>Rus pastoris ejusque species</b> 108. minor 105 b	<b>Camphora</b> 500	<b>Carduus chondrilloides</b> Lugd. 381 b. chrysanth. Dod. 381	<b>Carthamum offic.</b> 378. fylv. Czf. 379
<b>Rus marina</b> Czf. 368 b	<b>Camphorata</b> Lob 486. Czf. 311. 221. quovindum 238 b	<b>Carduus eniocephalus</b> Dod. 382 b. exetici 382	<b>Carvisolia</b> ibid.
<b>Rusciclon</b> Plinij 153	<b>Canarotus</b> 19 b	<b>Carduus ferax</b> Lugd. 379 b	<b>Cassia</b> Martb. Tab. 465. Latio. Ang. 217. Latin. Guil. 196 b
<b>Rutomus Anguil.</b> 194 b. Czf. 112 b. Clus. 34 b. Dod. 152	<b>Canada</b> 277 b	<b>Carduus ejusq;</b> species 385	<b>Cassia alba</b> Dalech. 216. nigra Dalech. 217. potius Lobel. 212 b
<b>Rutus</b> 471	<b>Canaria Plinij</b> 1. Plin. Ang. 8	<b>Carduus horreus</b> 383. Indicus 458. laevis 381. lanecolatus Tab. 381 b	<b>Cassia</b> 408 b. 409 b. fistula 409. nigra Dod. ibid. H-gnea Czf. 212 b
<b>C.</b>	<b>Canarium</b> 498 b. Græco 499	<b>Carduus mollis ejusq;</b> species 377 b. piutaria Lugd. 384	<b>Callida</b> Col. 231 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus mollis</b> 377 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callina</b> Fuch. 219 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus ejusque species</b> 381. spinosif. ejusq; species 385. stellatus ejusq; species 387. stellatus Lob. 272	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella fistula</b> 403	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> Ang. 17. Indica ibid. b. 19 b. Hierofolymitan. 18 b. melica ibid. b. de Bengala ibid. b. ejus fructus 511. G-givoma 19 b	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod. 385. liliifolia 387 b	<b>Callista</b> 170 b
<b>C.</b>	<b>Canella</b> 36	<b>Carduus sphaerocephalus</b> 378 b. fylv. Czf. 382. fylv. Dod.	

Cattagouma	497 b	Cerretta Czf.	235	Cordi	395 b	viscosa	133
Cattaria Dod.	228 b	Cer. spinofus	458 b	Chamxelinum	214 b	Chondrilla altera Diof.	1 ob.
Caulis ejusque species	152	Cerinth. ejusq. species	218	Chamxmelum ejusque species	135	Choni. Galeni Ang.	ibid.
Bellon.	161	Ceronia Theoph.	402	Chamxeranthemum Fuch.	134 b	Chondri. tragopogonanthem.	ibid.
Caucasus	71	Cerurus ejusq. species	430 b	Chamxeranthemum Fuch.	142 b	Choni. Thal.	274
Caucus Ang.	11	Cerofugaro	424	Chamxeranthemum Fuch.	142 b	Chonideros gummi	100 b
Cauda equina	16	Cervaria Gef.	248	Chamxeranthemum Fuch.	134 b	Choryza Lugd.	307 b
Cauda Lob. 4 b. vulpina	190	Cervicobolus Matth.	376	Chamxeranthemum Fuch.	452	Chrysanthemum ejusque species	134
Bellon.	398	Cervicia	94	Chamxeranthemum Fuch.	215	Chrysanthemum Dend.	185
Caulis capitatus Trag.	111	Cervipina	478 b	Chamxeranthemum Fuch.	71	Chrysanthemum Dend.	185
Cauloroth.	ibid.	Cetrach Czf.	354-359 b	Chamxeranthemum Fuch.	459 b	Chrysanthemum Dend.	185
Cautior fructus	407	Cevadilla Monard.	23 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cazumba	37 b	Chazin Japonia	147 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cazabis panis	91	Chazophyllum ejusque species	151	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cazabis Garz.	14 b	Chazal Alpini	311 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Ceanothus Theophr. Lugd.	377	Chazaleum Plinij Lugd.	165 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cedria	501 b	Chalciofus Czf.	388 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cedrium mel Hipp.	487	Chaleb Cluf.	474	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cedrus 393 b. baccifera	487	Chaleb Bellon.	472 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Lycia Matth.	487	Chambelal Cryza	24 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
phoenicia Lob. 487. Matth.	489	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cedrus conifera	490	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cedrus	491	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cedrus Gef.	489 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cefaglion	507	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Celbas	515	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Celape	298	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Celastus	476 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Celofia Trag.	121 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cemos Plinij	264	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Centaureum aquaticum Gef.	279 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Centaureum majus	117	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
rorum Gef.	273	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
norbum	Lugd.	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Lugd.	270	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
pratenfe Gef.	271	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Centaureum minus ejusque species	278	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
minus vilcofum	205 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Centrauroides Thal.	135	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Centella	300 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Centaria Theoph. Czf.	280 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Centimorbia Gef.	309 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Centineria	189	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Centonia Gef.	158 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Centrum galli	258	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Centromyriani Theoph.	470	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Centomgrana	282 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Centummodia Bruaf.	181	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Centuoculus Czf.	250	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Americanus 263. Plinij Anguil.	205	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cepa ejusq. species	71	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
lonia 72. fcdilis ibid	ibid	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cepha Dod.	52 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Pancij	287 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cera Hispania	499	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cerastus ejusq. species	449	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cemola	450 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Ceratia Plinij Col.	322 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Ceratonia	403	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cercis Theoph.	429 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
gluata Theoph.	402 b	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185
Cerefolium magnum	160	Chamxeranthemum Fuch.	456 b	Chamxeranthemum Fuch.	480	Chrysanthemum Dend.	185

- Cicuta ejusq;* species 160. ma-  
xima Eyslet. 154 b  
*Cicutaria ejusque species* 161.  
 odorata 165  
 Cidromela 435  
 Cyle Oviedo 430 b  
 Cymbalaria 305, verior Co-  
 lum. 287  
 Cymnagero 146 b  
 Cymnium bulbosum Pl. Col. 162, equinum Trag. 158 b  
 Cynagrostis 1  
 Cinamomum ejusq; species  
 408, veterum 409 b  
 Cynanthemis Lob. 135 b  
 Cinara ejusq; species 383  
 Cinnabarium 499  
 Cineraria 131  
 Cynoccephalus Plinij Lugd. 111  
 Cynocephalea Guil. 512 b  
 Cynocrame Cxfal. 119, 24 b  
 Lon. 302 b. Matth. 112, le-  
 guma ibid. b  
 Cynoglossum ejusque speci-  
 es 157, Matth. 155, Trag. 257  
 Cynoglossum montanum e-  
 jusq; species 218  
 Cynol. minor Brunf. 254 b.  
 quorundam 189, 24 b  
 Cynomorion Plinij 87  
 Cynops Theoph. Gef. 191 b  
 Cynotrachos Plinij 433, po-  
 lycanthos Lugdun. ibid. b  
 Cynobatos Diof. Adv. 483.  
 Theophr. Trag. 454 b  
 Cynoforbis ejusq; species 80  
 draconias 86, militaris e-  
 jusq; species 81, macrocau-  
 les 85 b. palustris 86  
 Cynopastoxierrestris 512 b  
 Cyperella Cordi 7 b  
 Cyperus ejusq; species 13, Ba-  
 bylonicus Corn. 31 b, eleu-  
 lentus 14 b. graminea 6 b.  
 Indicus 36, 37, longus & ro-  
 tunde 34  
 Cypote Claf. 404  
 Cypras Diof. Tra. 475 b. Gre-  
 corum 476. Dod. ibid. b  
 Circea Diof. Cxf. 102 b. Lu-  
 terna f. lob. 186 b. Mon-  
 speli. lob. 167, Tragi 121  
 Cirium Italicum Fench. 156  
 Cistium ejusq; species 377, Lu-  
 teum Lob. 379  
 Cistus ejusq; species 464  
 Cistus sedon ejusque species  
 467, Sileciacus 468  
 Cytinus 437  
 Cytisus ejusq; species 189, Co-  
 lum. Cam. 332, Tragi 328 b  
 Cierrago Gef. 129  
 Citrangula 435 b  
 Citreolus Cxf. 310  
 Citrullus 312  
 Citrus 435  
 Clavi filiginis 24 b  
 Cleimatus daphnoides ejusq;  
 species 301, Aegyptia Plin-  
 ij 302 b. cærulea 398, mi-  
 nima 141 b  
 Cleimatis ejusq; species 300  
 Cleome Oltavij Ang. 101  
 Clymenon Diof. Colum. 475  
 b. Colum. 287 b. Isalor-  
 um Lob. 280 b  
 Clymenon fremiana Gef. 230.  
 mas Gef. 135, minus Lugd.  
 136 b. Marth. 344, quorum-  
 dam Lob. 300 b  
 Clinopodium Cxf. 218 b. e-  
 jusq; species 224, alpinum  
 Ponz. 247 b  
 Cneoron album Lugd. 463 b.  
 Theoph. 462 b  
 Cneoron Cxf. 463 b. Galeni  
 Ang. 462 b. Marth. 206 b.  
 463, Theoph. 217, 463  
 Cnicus ejusq; species 378  
 Coagulum teiræ Plinij 86 b  
 Coca 469 b  
 Cocimelea Theoph. 443 b  
 Coecognidium 159 b. Bello.  
 463, Cord. 462 b  
 Coecum infectiorum 415  
 Coecus baphtica 425, Indica  
 509  
 Coecus radicum 159, 181  
 Cochinita Frag. 159 b. 451 b  
 Cochlearia ejusq; species 110  
 Guiland. 152 b  
 Cochuecho Acoft. 91 b  
 Cocconile arbor 415, grana-  
 438 b  
 Coecular officin. 511 b  
 Coecleba radix 91, 92  
 Codaminum Gef. 52 b  
 Codomalo Bellon. 452 b  
 Coffol fructus 510  
 Coggygia 415  
 Cohnye Thevet. 461 b  
 Cole Myconi a. Theoph. 278  
 Cola 507 b  
 Colchicum ejusq; species 67.  
 Alexandri Lob. 69, Ilyri-  
 cum Ang. Lob. 68, luteum  
 69 b. montanum 68, vau-  
 gatum ibid. verum 69  
 Coles Camer. 315 b  
 Coles phalcolos 404  
 Colyrea Theophr. 454, Lug-  
 dun. 391, tertia Theophr.  
 402 b  
 Collum grais German. 318  
 Colocalia 155 b. 196  
 Colochienii Belli 379 b  
 Colocythis ejusq; species 313  
 Colophonita 504  
 Columbaria Lob. 270 b  
 Columbaria Barba 269  
 Columbina Cxf. 144  
 Colubina Trag. 152  
 Colus Jovis Lob. 138 b  
 Colus rustica Cord. 379  
 Colutea ejusque species 390  
 Coma aurea 144  
 Comacum Theoph. 407  
 Comandoravium 319  
 Comaron Apuleij 326  
 Comarus 460  
 Combretum Plinij 7 b  
 Conchæ anatifera 513 b  
 Conder Avicenn. 501  
 Condurum Plinij 165, 204 b  
 Conduci 343 b  
 Conserva Plinij Lobel. 364 b.  
 marin. Lob. 368 b. tricho-  
 des Lugd. 364 b  
 Conyza ejusque species 265.  
 alpina Gef. 131 b. Hippocr.  
 158, montana Lugd. 265 b.  
 palustris ibid. Eyslet. 310  
 marina Lugd. 331  
 Conyzoides cærul. Gef. 265 b  
 Connarus Claf. 477, Theo-  
 phrast. 460  
 Connina 119 b  
 Confilugo Ruell. 185, Vegeti  
 186 b  
 Confolia aurea Cord. 465 b.  
 rubra Tab. 316  
 Confolida ejusq; species 159.  
 aurea Tab. 268, Sarrac-  
 enica Eysl. ibid.  
 Confolida media ejusq; spe-  
 cies 260, minor Ad. 161 b.  
 palustris Tab. 266 b  
 Confolida regalis ejusq; spe-  
 cies 142  
 Convolvulus ejusque species  
 294, argenteus 195 b. ma-  
 ritimus Imperati 295  
 Convolvulus pennarus Col.  
 398 b. rectus Ponz. 463 b  
 Copal 503 b  
 Copan 417 b  
 Copey 19  
 Coquilho 510 b  
 Coral arbor Cluf. 402 b  
 Corallina ejusq; species 364.  
 Lob. 363, altera Tab. 664.  
 Brisan. Lugd. 368 b. mon-  
 tana Tab. 361  
 Corallina Aegin. 172  
 Coralloides Cordi 322. Lo-  
 bel. 366 b  
 Corallum ejusq; species 366  
 Coralli herba 184 b  
 Corehorus Dalech. 129, Lob.  
 317, Plinij 152, Gef. 155 b  
 Corcopal fructus 455 b  
 Corandrum ejusque species  
 158  
 Corydalis Cam. 143  
 Corylus ejusque species 417  
 Coryt ejusq; species 280, Dio-  
 dor. Guil. 466 b  
 Coisnu cervinum Lobel. 190.  
 planabile 514 b  
 Coisnu ejusque species 447.  
 forma Cxf. 451  
 Coronilla Imperialis ejusq; spe-  
 cies 79, regia quorundam  
 168, fragol. 176 b. Solis  
 Tab. 276 b  
 Coronella Cxf. 365 b  
 Coronilla Lob. 349  
 Coronopus ejusq; species 190  
 Gef. 179 b. Marth. 190 b.  
 cæruleus Gef. 131, Lon. 8.  
 Coronopus ea Cod. Gef. 338 b  
 Cor Indum Lob. 343, D. Tho-  
 maz 338 b  
 Corrigiola Cord. 281  
 Coriæ ad alvi profluvia 208  
 b. eriophorus Claf. 409 b.  
 W' interan. 461 b. xylocaf.  
 facie Lob. 408  
 Cortufa Marth. 243 b  
 Corrua ejusq; species 490  
 Coru Acoft. 437  
 Cosmofandalos Poëtarū Do-  
 don. 77  
 Costa Camer. 129  
 Costus ejusq; species 36, Mat-  
 thiol. 156, Arabicus 36, ama-  
 rus, dulcis 37, niger Eyslet.  
 183 b  
 Costus minor Gef. 225, hor-  
 torum Lob. 226 b  
 Cora Cxf. 136  
 Coryledon ejusq; species 185.  
 alpina Cluf. 183, Diof. 187.  
 aquatica Lob. 180, syl. Trag.  
 304, tertia Dalech. 143 b  
 Coronis 415  
 Coris lignea 421 b  
 Coronialet 412  
 Coronea malus 434  
 Corronaria Lob. 263  
 Cotula ejusque species 135 b.  
 lutea Dod. 154 b. marina  
 Lob. 186  
 Coureocubias 402  
 Cquelcoul Marth. 401  
 Couroq Letrio 510 b  
 Craeca ejusque species 345.  
 maior Tab. ibid.  
 Crassula major Cxfal. 27 a b.  
 minor Dodon. 183, festrata  
 Thal. 285  
 Crategus Theop. 425 b. Tra-  
 gi 435, Lob. 430, Lugd. 454  
 Cræzognon f. lac. 109, Ang.  
 ibid. b. Dodon. 110 b. Lo-  
 bel. 234, 24 b  
 Crater Jovis Frag. 276 b  
 Crautophyllon Thal. 176  
 Crepanella Cam. 97 b  
 Crepis Dalech. 124 b  
 Crellione Cxf. 114 b  
 Creta marina Lon. 228  
 Crias Aguleij 249 b  
 Crispu-

<i>Crispula</i> 133	<i>Daitylon</i> Col. 124	<i>Dotterblumen</i> Dod. 174	<i>Elleborine</i> 183
<i>Crispula uva</i> 455	<i>Damaſonium</i> Lugd. 185. Cor- di 186 b. Dod. 187. Dioſc. 187. Dioſc. Col. 142. Dioſc. Caſ. 244 b. Stellatum Lug- 190	<i>Draba ejuſq. ſpecies</i> 109. Dod. 106 b. minima Col. 108 b	<i>Emerus</i> Caſ. 197
<i>Crispinus</i> 454 b		<i>Draco herba</i> Dod. 38. arbor Cluſ. 309	<i>Empetron</i> Aug. 463 b. pha- coides Lugd. 463. Rondel. 188. Tragi 182 b.
<i>Criſta</i> Caſ. 234. alpina Caſ. 163 b. galli Lob. 37	<i>Dante radix</i> Acoſt. 129 b	<i>Dracunculus ejuſq. ſpecies</i> 194. eſculentus 98. horrenſ. Matth. 98. major Brunſ. 192	<i>Endivia major</i> Tragi. 122 b.
<i>Critumum ejuſq. ſpecies</i> 183. agrefte Tragi. 386 b	<i>Daphne Alexand. Fuch.</i> 304 b	<i>Dracuncium majus</i> 194 b	<i>Enger</i> 113 b
<i>Crocodillon</i> Ad. 381. Caſ. 386. Lugd. 380. 381 b. Trag. 380 b	<i>Daphnoides</i> 301. Fuch. 482	<i>Dragonal fruſtus</i> 309 b	<i>Englantaria</i> Roell. 483
<i>Crocus ejuſq. ſpecies</i> 65. au- tumalis ibid. Indicos A- coſt. 37	<i>Darache</i> 408 b	<i>Dragone</i> Caſ. 98	<i>Enneadynamis</i> Gef. 309
<i>Cocum anguſtiſ. ejuſq. ſpecies</i> 67. Inteus ejuſq. ſpecies 46 b	<i>Darſeni Avicena.</i> 408 b	<i>Drakena radix</i> Cluſ. 14	<i>Enneaphyllum</i> Lob. 354. Plin- nij Lugd. 87 b. 180 b. 185
<i>Crone</i> 412 b	<i>Davania</i> 508 b	<i>Drymopogon</i> Tab. 144	<i>Enula</i> 276
<i>Croron Nicandri</i> Aug. 15 b	<i>Daucoides majus</i> Cord. 112. minus Cord. 153	<i>Dryophanum</i> Plin. Roel. 181	<i>Enzanda</i> Pigafert. 438
<i>Craciaria</i> Dodon. 335. muralis Col. 334 b. gentianæ ſpe- cies 188	<i>Daucus ejuſq. ſpecies</i> 150. of- ficien. 151. acantocarpos Col. 152 b. Creticus Lob. 148. al- ter Fuch. 157. alter Plinij Col. 153 b. leiſtanoides Cord. 160. lepiarius Gef. 152 b	<i>Dryopteris</i> Matth. 318	<i>Ephedra</i> Plinij 152 b.
<i>Crucialis</i> Caſalp. 157 b. ma- nitim. 334	<i>Delphinium</i> Cluſ. 142. bu- cinum Dioſc. Lob. 245 b	<i>Droſera</i> Cord. 310	<i>Ephemerum</i> Dioſc. Lob. 243. Matth. & Lob. 244. quo- runda 304 b
<i>Crus galli</i> Brunſ. 179	<i>Deinde</i> Serap. 432 b	<i>Droſomeli</i> 496 b	<i>Ephemum non lethale</i> Fuch- ſij 304
<i>Cucubæ</i> 411	<i>Dendrobryon</i> Col. 361 b	<i>Dulcamara</i> Dod. 167	<i>Epilobium</i> Gef. 245 b. b
<i>Cuci</i> Plinij 510	<i>Dens canis</i> 37. canis gramin 116. Lonie. 310	<i>Dulcis radix</i> Tragi. 352 b	<i>Epimajorana</i> Tab. 124 b
<i>Cucuphora</i> 509 b	<i>Dentaria</i> 310	<i>Dulciſſida</i> Gazz 312	<i>Epimedium</i> Col. 155. Dodo. 276 b. Plinij 70 b. Lob. 325
<i>Cucuphicus</i> Creteſ. 338 b	<i>Dentali</i> Cluſ. 87 b	<i>Dulbaba</i> Arabum 312	<i>Epimelis</i> Dioſc. 455
<i>Cucubalus</i> Plinij Ad. 150 b	<i>Dentaria ejuſq. ſpecies</i> 312	<i>Duracina</i> 440	<i>Epimelis</i> Gal. 460. Lugd. 452
<i>Cucullata</i> Lugd. 245 b	<i>Dentaria</i> (Orobanchæ ſpe- cies) major Matth. 11. minor Cluſ. ibid. b	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Cucullus</i> Feracel. ibid.	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Cucumis ejuſq. ſpecies</i> 310. afinicus 314. Gal. 310. ma- ritimus 311	<i>Dentellaria alta</i> Gef. 101	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Cucumis puniceus</i> Cord. 306	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Cucumer marinus</i> Aldroan. 369 b	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Cucurbita ejuſq. ſpecies</i> 312. lacinata ib. Sophor Plinij 316. ſylveſtre. 313	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Culcas</i> 196	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Culcas minores</i> Lob. 83	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Cuminum ejuſq. ſpecies</i> 146. pratense 158. lativum alter. Caſ. 151 b. ſylv. Gef. 142. ſyl. alter. Matth. 142. Fuch. 145. Matth. Lob. 172. ſil- quum ibid.	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Cuneno Melitenſ.</i> 28 b	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Cunila</i> Caſ. 218	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Cunilago</i> Plinij 266	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Cunopium marinus</i> Bellon. 369	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Cupreſſus herba</i> Cord. 136 b. Dod. 339	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Cureas Baſilium</i> 401 b. Ri- cini ſpecies Cluſ. 432 b	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Cureuma</i> 219 b	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Cuſſus altera</i> Serap. Tragi. 295	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Cnatarapama</i> 184 b	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187
<i>Conſebula</i> Rauwolf. 511 b.	<i>Dentellaria</i> Rond. 97 b. Gef. 126. Lugd. 323	<i>Duracina</i> 440	<i>Epipactis</i> Camer. 136 b. Ev- retr. 187

D.

**D**aburi 419 b  
Daehel 506  
Dactyl. lib. b. Trapezon. 405 b  
Dactyl. botan. eſcul. Tab.  
lij 150. alt. Thal. 185

**E**banus Acoſt. 393 b  
Ebenus 448. 507. ejus ſpe-  
cies 391. Cretica 390  
Ebulus 416 b  
Echinomelos Col. 384  
Echinopoda Belli 394 b. Gef.  
381. Cretica Ponx 490 b  
Echloides Col. 254 b  
Echium ejuſq. ſpecies 254.  
Fuchſij. Lobel. 256. mini-  
mum Col. 254  
Echium ſcorpionides ejuſq.  
ſpecies ibid.  
Egano Ang. 391  
Eghelo Dod. ibid. b  
Elzaguus Matth. 472 b. 473.  
Lugd. 474 b. Lob. 475 b.  
Bellon. 414 b  
Elzaprinos Bellon. 475  
Elaphobolus nigrum Lon.  
150. Dioſc. 155. Gef. 178. al-  
bum Lon. 157. Matth. 155 b  
Elaterium 314. 496  
Elatine ejuſq. ſpecies 252.  
Brunſ. 306. Caſ. 115 b. Cor-  
di 295. Dod. 250. Tragi 257  
b. centia Tab. 345 b  
Elemi 504  
Eleiſphaeos 337  
Eleoſclinum Lob. 164  
Elephas Col. 248 b  
Elhanne Alp. 474 b  
Elkarie 418 b

V u u g Ervi.

- Ervium Czf. 344. Lug. 342.  
 fylv. Dod. 343  
 Ervum Tab. 346. album Fuch.  
 343. candidum Trag. 344  
 b. fylv. Fuch. 344  
 Eukhara coralloid. Cluf. 366 b  
 Efulus Plinij 420  
 Efula ejusq. species 191 b. 192  
 Indica 116. rara Lob. 291.  
 minor Lugd. 191. torunda  
 292  
 Etalac Sealig. 489 b  
 Evonymus ejusq. species 428  
 Theoph. 468 b  
 Euparion ejusque species  
 320. 321 b. cannabinum  
 Lobel. 321. Meflus Maith.  
 221. Mef. Cord. febol. 170  
 Euphorbium 387. succus 496.  
 arbor 458 b  
 Euphrasia ejusq. species 133.  
 cerulea 154. gramen 210 b.  
 nobilis 247. 4. Trag. 254.
- F.
- Faalim Thev. 276  
 Faba ejusq. species 338. ar-  
 borefens 338 b. Aegyptia  
 196. ficulnea 347. Græca  
 Plin. 447. 448. inverfa Czf.  
 343. Lob. 287. Trag. 391 b.  
 Malucana 511 b. purgatrix  
 338 b  
 Fabago 402. Belgarum 480 b  
 Fabaria 287  
 Fael Serap. 400  
 Fafago Australis 368  
 Fagara 413  
 Fagotriticum 27 b  
 Fagus 419. fepiaria 427  
 Far 21. 22. clufinum 22 b. ha-  
 lifafrum 22  
 Farfara 197  
 Farfara antiquor. 429  
 Farfugium Caf. 276 b  
 Farrago Plinij 23  
 Ferrumaciat Indor. 478 b  
 Favagella Czf. 309 b  
 Fauel 85. 110  
 Fausbaum 428 b  
 Fegopyron Dod. 27 b  
 Felcel 412  
 Ferraria quorundam 335 b.  
 Gefa. 276 b  
 Ferrum equinum ejusq. spe-  
 cies 349  
 Ferula 148. fagapenifera 149  
 b. Tragi 395 b  
 Ferulago 148  
 Fefluca ejusq. species 9 b  
 Fefluago Gazæ 10  
 Ficaria Brunf. 359  
 Ficus ejusq. species 457. Aë-  
 gyptia 459. Cyprina ibid. b.  
 Indica 457 b. 458. Idæa 451.  
 Lincot. 518 b. Martaba-
- nis Indica 507. Pharaonis  
 459. infernalis 172  
 Filago Dod. 263  
 Filifil 411  
 Filipendula ejusq. species 163  
 b. Tab. 162  
 Filius ante patrem 245 b  
 Filix ejusq. species 357. faxa-  
 tilis 358  
 Filicula ibid.  
 Filiculis oculos Caf. 387  
 Fior capuccio Czf. 142  
 Fiftula Lob. 17 b. pafforis Lo-  
 nic. 190. pafforis Avicen.  
 244 b  
 Fiftularia ejusq. species 163  
 Flamma Ang. 131. Gef. 97 b.  
 203 b. Jovis 300 b. ranun-  
 culus 180 b. refta Camer.  
 300 b. repens ibid.  
 Floers 37 b  
 Floribandio 470 b  
 Flos Africanus ejusq. species  
 122. ambarulus Dod. 215.  
 coccineus Lugdun. 203 b.  
 Conftantinopol. 203. cu-  
 culi Dod. 104. Trag. 205.  
 Tab. 210. frumenti 273  
 Flos hepaticus Taber. 309 b.  
 Hierofolymit. 203. Mexi-  
 coanus 193 b. nodis Gefa.  
 297. pallionalis 301 b. Per-  
 ficus Cluf. 41 b. regius Do-  
 don. 142  
 Flos mirabilis Perovian. 168 b  
 Flos fanguineus Monardi 306  
 b. Searleti Lon. 209. Solis  
 Dod. 466  
 Flos Solis ejusq. species 276 b  
 Farnetianus 277 b  
 Flos in odoris Fuchij 395 b  
 Trag. 165. trinitatis Eyflet.  
 100  
 Foetor Gæbii 430  
 Foeniculi ejusq. species 147.  
 aquaticum 141 b. erraticum  
 Lonic. 188 b. maritimum  
 Lob. 288. montanum Tra-  
 gi 148. porcimum Lob. 149  
 b. fylv. Trag. 161 b. rortuo-  
 fum Lugd. ibid.  
 Foenum Burgundiacum Lo-  
 bel. 336  
 Foenum Græcum ejusq. spe-  
 cies 348. fylv. Tragi 353  
 Folium Indi 410. prægrande  
 Lobel. 505 b. palmæ Sila-  
 menta 506  
 Fontula palmum Lob. 193 b  
 Forbifolia Gefa. 321  
 Formetone Czf. 27 b  
 Fragaria ejusque species 326.  
 quaria Trag. ibid.  
 Fragula Cord. ibid.  
 Fragula Matth. 428 b. Lug-  
 dun. 471
- Fraxinella Czf. 303  
 Fraxinella Dod. 222 b  
 Fraxiones ejusq. species 416.  
 bubula 415 b  
 Fraxinea arbor Trag. 415  
 Frifoles 346 b  
 Frizoles Guatell. 340 b  
 Frutillaria ejusq. species 64  
 Frometone alterum Czf. 195  
 Frondipora 367 b  
 Fructus chologogus Monard.  
 Lugd. 419 b. exotici 409.  
 fub terra Lugd. 276  
 Frumento 37  
 Frumentum amyllum 22.  
 barbarum Ruel. ibid. b. fa-  
 rum Lon. 9. Indicum 24.  
 loculare Ruel. 21. Sarra-  
 culum 27 b. fylv. 10  
 Fruex coronarius Czf. 358 b.  
 spinofus peregrinus Rau-  
 volf. 478 b  
 Frutilla 471 b  
 Fucus capillaceus 364. cupref-  
 ceus 365 b  
 Fucus foliaceous ejusque  
 species 365. fungularis 364.  
 ferulaceus Lobel. 365. lin-  
 za 364  
 Fucus marinus Dod. 365. b.  
 folijs abrotani 365. marin.  
 baceifer. ibid. b. vermicu-  
 laris 366. nofter 364 b  
 Fulle 470 b  
 Fumaria ejusq. species 143  
 Fumaria bulbola ejusq. spe-  
 cies ibid. b. bulbola mini-  
 ma Tab. 178 b  
 Fungus ejusq. species 369. A-  
 manira Gal. 372. auncular.  
 Czf. 368. boletus Czf. 371 b  
 Fungus capreol. Tab. 370 b.  
 cervinus Maith. 376. cly-  
 peifor. Lob. 373 b. conoci-  
 elle. Portæ 371 b. coralloi-  
 des. Cluf. 371. digitelli Tra-  
 gi 372. eufenifens 370. 371  
 Fungus galericularis Lobel.  
 372 b. gallinaceus Czf. 371.  
 galucii Portæ 370. igoia-  
 rius Trag. 372 b. læniat  
 372. lanceus 371 b. lepori-  
 nus Cluf. 371  
 Fungus marinus Ald. 369 b.  
 Dod. 374 b. minimus Czf.  
 367 b. mofcarius 373. ma-  
 ximus 373. orbicularis Do-  
 don. 374 b. orientalis 511 b  
 Fungi noxii ejusq. species 372  
 Fungus petreus 375 b. penic  
 Col. 370. 372 b. Czf. 375.  
 piperinus. Portæ 371 b. pra-  
 teolii. Czf. 372 b. pruvilli.  
 Czf. 371 b. quercinus Col.  
 ibid.  
 Fungus ramofus ibid. fæxus
- Cluffi 375 b. in faxis 372.  
 fpongiosus Lug. 370. fail-  
 lus. Czf. 371. rustici. Czf.  
 falpis. 370  
 Fufius 418  
 Fufiti 411 b.
- G.
- Agel German. 414 b  
 Gagey 508 b  
 Gaiderothymum 236 b  
 Galanga ejusq. species 35  
 Galbanum 494  
 Galbulæ fructus Cuprefsi 488  
 Galeadragoi Xenocrati An-  
 guli. 385  
 Galega ejusque species 352.  
 montana Lugd. 351 b. fylv.  
 Dod. 345 b  
 Galeopsis Lob. 230. Dod. 235.  
 lutea Lugd. 238 b  
 Galestra Trag. 197  
 Galla 410. myricæ 485 b. te-  
 rebinthi 400 b  
 Galli crus Apul. 8  
 Gallitricum 238  
 Gallium ejusque species 335.  
 tertium Tragi 334 b. tetra-  
 phylon Colum. 333 b  
 Galum radix 193 b  
 Ganri radix 37 b  
 Garb five Garab Arab. 475 b  
 Garophyllon Plinij 413 b  
 Garobolia Czf. 321 b  
 Gariote fructus 406 b  
 Garofinum 219 b  
 Garo camber 407 b  
 Gebuph arbor 440 b  
 Geidaur Lugd. 36 b  
 Gelapo 298 b  
 Gelbenech Ang. 279  
 Gellifimum ejusque species  
 397. rubrum Czf. 168 b  
 Gellifomoro 513 b  
 Gemet 507 b  
 Genipat 434  
 Genista ejusq. species 395. A-  
 rabica Bello. 395 b. humi-  
 lis Dod. 397. Iluensis Lug.  
 396 b. rofunda. Czf. 394 b.  
 rubra Czf. 212 b  
 Genista spinofa ejusq. species  
 394  
 Genista fpatium ejusq. spe-  
 cies ibid.  
 Genistella aculeata. Lob. 395.  
 montana. Lob. 396  
 Genifium Brunf. 108 b  
 Gentiana ejusq. species 187.  
 concava 205. paluftris 188  
 b. pratensis 188  
 Geniella ejusque species  
 187 b  
 Geranium ejusq. species 377.  
 banachoides ibid. colum-  
 binum 318 b. mofcatum 319  
 nodo-



- nodosum Clusj. 318 b. robertianum 319 b. laxatile Camer. 318 b. sanguineum 318. tuberosum ibid. b.  
 Geranium folio malvæ ejusq; species 315. b. primum quorundam Logd. 173  
 Gerat palma 507  
 Geroropogon Gef. 174  
 Gebyllus Gef. 71 b.  
 Geum alpinum 143 b. Gcf. 322. Plinij 321. rivale Gef. neri 322  
 Githajama 497 b  
 Gicherum Czf. 791  
 Giganthea 177 b  
 Gigarum Czf. 191  
 Gymnactiton kordeum Camer. 22 b  
 Ginge Cam. 343 b  
 Gliodium ejusq; species 151  
 Giophyron Thal. 211  
 Gyp succus 497 b  
 Girafoloryz 24 b. fructus 511  
 Gith 145  
 Githago Trag. 104 b  
 Gladiolus ejusq; species 44. æruleus Trag. 31 b. cæruleus major Trag. 30 b. fœtidus 30. luteus Fuch. 34 b. palustris Cord. 12 b. Tab. 15. Clusj. 102 b  
 Gladiolus Indicus 19 b  
 Glans virginica 421. nucupariaria 403  
 Glanthe terrestris Clusj. 344 b  
 Glanthevia Ceren. 101 b. Belli. Ponæ 139  
 Gliaum ejusq; species 133. Ang. 104 b. fyl. Czf. 97 b  
 Glancium 167 b. Diof. 172  
 Glauz. Anguil. 332. Clusj. 347. Gef. 310. vulgaris. Lob. 313. maritima 215  
 Glycistia Plinij 323  
 Glyzvrhiza ejusq; species 351. spinosa. Lac. 386  
 Glyzvrhiza afragaloides 328  
 Globularia Monfp. 262  
 Glarea Alboum. Avic. 700  
 Gnaphalium ejusq; species 163. Diofcor. Tragi 4 b. Diof. Ponæ 222. maritima Dalech. 265  
 Gaeocoma 402 b  
 Goss arbor 441  
 Gongolaris marina Imp. 365  
 Gomphrena Lugd. 121 b  
 Gori fructus 419 b  
 Godypinum ejusq; species 430. muicis 363 b  
 Gotoc album 170 b. rubrum 191 b  
 Grain 25  
 Gramen & ejus species 1. aculeatum 7 b. 8. a. alopecu-
- roides 4 b. amorettes 2. a. b. anthoxanthum 3 b. aquaticum panicul. 3. aureum. ibid. arvense panicul. 3. 2. rundaicium 4 b. 7. avenaceum 10 b  
 Gramen bufonium 7. bulbosum 1. 3. casioisum 1. canarium 7. 3. earyophyllatæ folijs 3 b. 4. cyperoides 6 a. 7 a. b. cristatum 3 b. cruce 7 b  
 Gramen dactylon 7 b. 8. a. di- stachyophoron 9 a. dulce 1 b. echinatum 7 b. equi- num 3  
 Gramen festuca 9 b. filice- um 2 b  
 Gramen geniculatum 8 b. glumiosum 10 b  
 Gramen holosticum 7 a. hor- deaceum 9 a. hirsutum 7 a  
 Gramen juveum 5 b. 4. 2. 7. leucanthemum 7 b. lepo- rium 2. loliaceum 2. 3. 7. 9  
 Gramen mannæ. maritimum 6. 10 b. miliaicium 8 b. monranum 3  
 Gramen nemorosum 7. 10 b. nodosum 2  
 Gramen panicum 4. 8. pani- colarum 2 b. panicula eri- spa 3. pennarum 5. phala- roides 4. 9 b. pratensis 2 b  
 Gramen fegetum 3. sylvati- cum 7. forghinum 8 b. spar- tium 5. spicatum 3 b. 5 b. spica lerizæ 9. spica gemi- na 9. fœcatum ibid. tritici 8 b. Ariarum 7  
 Gramen rosmosifum 4 b. 7. rypoides 9. tremolium 2. riglochis 6 a. b. xerampe- linum 3. 7  
 Gramen 2. Plinij Ang. 222 b. 3. Plinij Ang. 223 b. leucan- themum Dod. 210 b. flori- dum Cam. ibid. maritimum Clusj. 211  
 Gramen Parnassij ejusq; spe- cies 309. Lugdun. 199 b. Marth. 304  
 Granadillo lignum 393 b  
 Granadilla Monard. 301 b  
 Granum alzelin 14 b  
 Granum Aniceum 412 b. ben- 422. kermesinum 469 b. regium Mesf. 412. tinctori- um 421. viride 410 b  
 Grama paradyfi 413  
 Gratia Dei Aug. 279. Czf. 146 b. Dod. 465 b. Gallo- rum Gef. 278. Germano- rum Trag. 319 b  
 Gratiola ejusq; species 279. emulea 246 b. minor Gef.
- neri 218 b  
 Grossi ficum 457  
 Grossularia ejusq; species 455  
 Guacaranæ Monard. 221 b  
 Guadarella Czf. 100  
 Guayaba 437 b  
 Guajabara 19  
 Guajacum Paravinum 447  
 Guajanæ fructus 511  
 Guajanor 441 b  
 Guayavas 437 b  
 Guama Oviedi 404  
 Guanabanus Oviedi 434. Sea- ligeri 434  
 Guanas 417 b  
 Guanavano 439 b  
 Guanavayus 451  
 Gummi ejusq; species 498  
 Diofcor. ibid. elemmi 472. 504. ex molle 500. ad po- dagram  
 Gutta Gamandra ibid.
- H.
- Habaziz Portæ 14 b  
 Habbures Cam. 190 b  
 Habascor radix 92 b  
 Halilecouleou Serap. 432 b  
 Habzeli Serap. 412  
 Hachal Indi Clusj 68 b  
 Hamodori Clusj. 39  
 Hamorrhoidalis Aldr. 281 b  
 Cast. 130. herba Brunf. 309  
 Haernia Serapion. 412 b  
 Hais 91 b  
 Hairei Thetvi 507  
 Halicacabum 166. peregrin- uum Fuch. 343  
 Halimus ejusq; species 120  
 Halimus Lac. 475. Trag. 411 b  
 Haliphleos 420 b  
 Hamamelis Athenæi 452  
 Hareomeon Bellon. 226 b  
 Hartriegel 447 b  
 Hastula regia Trag. 282 b  
 Harle radix 91  
 Haur Arabum 429  
 Haulegi 477  
 Hebulben 401 b  
 Hederalis 303  
 Hedera ejusq; species 306. Cilicia 196. rigens Plinij Czf. 435 b  
 Hedera terrestris ejusq; spe- cies 306  
 Hederula Trag. 305 b. palu- stris Tab. 362  
 Hederæ lacryma 428 b  
 Hedyppois 126  
 Hedyllum ejusq; species 348. clypeatum Lob. 350. minus Tab. 349 b. mini- mum Lugd. 348  
 Helbane 414 b  
 Helenium ejusq; species 379. comageum 37. Theo-
- phrast. 214  
 Helianthemum ejusq; species 466. ejus species Lugdun. 465 b  
 Helichrysum ejusq; species 264. Italicum Matth. 147. fylv. Trag. 163  
 Heliochrysis Trag. 113  
 Heliotropium ejusq; species 153. erectum Ger. 254  
 Helleboraster Lob. 185  
 Helleborine ejusq; species 186 b. Dalechamp. 199  
 Helleboreus albus ejusq; spe- cies 186 b  
 Helleboreus Hippocr. Taber. 186  
 Helleboreus niger ejusq; spe- cies 185. ferulaceus Adver. 186  
 Helzine Matth. 121. eissam- pelos 124. 125. fylv. Thal. 168 b. Itan Guj. 295 b.  
 Hemesis 420  
 Hemerocallis Diof. 77 b. 78. Chalcedon. 73. Valentina Clusj 54 b  
 Hemionitis ejusq; species 313  
 Hendelstrauti Tragi 285. ex- rubro flore Trag. 150  
 Henne Arabum 476  
 Henophyllum Gefu. 304  
 Hepatica Tab. 362  
 Hepatica anrea Tab. 330 b.  
 Hæla Cordi 309. palustris ibid. b. scitellata Tab. 332 b. trifolia Lob. 330 b  
 Hepatorium aquaticum Dodo. 321  
 Heptaphyllon Fuch. 326  
 Heracantha Tab. 379  
 Heraclea Tragi 231 b  
 Herba alba Plinij Lugd. 8 b.  
 amoris Czf. Lugd. 359 b.  
 287 b. articulata Tab. 209.  
 cava Imper. 364. Malava- nica 437. mimosa 360. mole- ibid.  
 Herba S. Alberti Czf. 101 b.  
 Anroan 97 b. S. Barbara Fuch. 98 b  
 Herba de Baleria 186 b. be- nedicta Brunf. 321. de Ben- gala 320 b  
 Herba caneti major Lon. 155.  
 minor Cord. 182. cervi Gef. 148. clytix Cam. 153 b. colla Czf. 156 b. 5. Cru- cis 169  
 Herba doria Lob. 268. fullon- um Brunf. 188. garraria Marth. 122. Gerardi Dodo. 155 b. Kunigundis 320  
 Herba Laurentiana 260  
 Herba S. Jacobi 131. Joannis infantum Monard. 114 b. Ju- daica

2aica Gef. 233. Dod. 146 b.	Horaceum ejusque species 126.	Hebrorum 177. montana	Jubaea Claf.	90 b
Julia Ang. 231	arborescens 129. alperum	Lon. 466. nemorum Lugd.	Isioma I. infic.	ibid. b
Herba 5. Mariae Calat. 126 b.	126. echinoides Tab. 128 b	234 b. vulgaris Car. 179 b	Isythus ejusque species 126.	
Molucana 311. nimola	Hieracium chondrillae folio	Hivourabe	aphyllocaulos Thal. 129 b.	
Lug. 350. moll. Acoft. ibid.	ejusque species 127 b. Cretic-	Hobos Linc.	platyphyllus Thal. 124 b.	
Herba mortem praedicens 512	eum 127. dentis leonis fol.	Hoyer Steinbrech. Lon. 205	lylv. Trag.	123
radioli Apul. 359. Scutella	126. furidum ibid. b	Hoytin Thever.	Inturus Garz.	410
Linc. ibid. viv. a. Cluf. ibid.	Hieracium frutescens ejusque	Holcus Plois Ang.	Jolo Suchel	133 b
Herba Papagalli Dod. 121 b.	species 129 b. insybaceum	Holconitis Hipp.	Jundraba alfidoides Col. 107 b	
paralytis 241. paru Martli.	128. majus 126 b	Holofechonoi Lugd.	Jon thalpi Col.	107
167. perforata Trag. 279.	Hieracium montanum ejus-	Holofleum ejusque species 190	Jovis barba Plinij	473
pudica Lugd.	que species 128. glabrum	Maith. 7. alterum Tabel.	Jovis Ros Theoph.	203 b
Herba rena Gef. 156 b. renom	129. phlomisoides 128 b. pra-	358 b. earyophylleum Ta-	Jphyon Theoph. Ang.	22 b
morbus curans Mon. 123 b.	sentie ibid. b	ber.	Jranoch	491 b
adripiuras 282 b	Hieracium Sabaudum ibid. b.	Holoiburia Arist.	Jrion Fuch. 95. Marthiol. Lo-	
Herba laera Dalecham. 231 b.	128	Hordeum ejusque species 22.	bel.	101
Ang. 269 b. Sardo Dod.	Hierobotane inai Lugd. 249.	alterum ibid. b. causticum	Jris ejusque species 30. alba	
177. Gail. 180. Simeonis	Bront. 249. foemina Brunt.	23 b. Galasicum 24. gla-	31. Africana ibid. Afratica	
316. Strophani Taber. 168 b.	100. Lugd.	brum 22 b. marinum 9. du-	ibid. b. agria Theophr. 30.	
Stella Dod. 190 b. studiofor-	Higero Oviedo 434 b	dam 12 b. spurium 9	- biflora	32
um Tab. 212	Hysocyamus ejusque species	Horminum ejusque species	Jris angustifolia ejusque species	
Herba trientalis Cord. 191 b.	169. peregryn. Dod. 167 b.	238	32 b. pruum redolens 33	
trinitatis Fuch. 199 b. ruti-	Peruvianus Cord. 168. Do-	Hovos fructus 446	Jris chalcodonica 31. Dama-	
ca 107 b. rutca Lob. 282.	don. 169	Hoxocoquomaclit Cam. 351.	fecda & Dalmatica 31 b.	
torca moniao. Gef. 281 b	Hyofiris Plinij 271 b. Taber.		Florientina 31. Hlyria 31. 32.	
Herba venti Trag. 179. Mon-	127 b		latifolia 30. Lufitanica 31 b.	
spel. 230 b. Ungarica Lon.	Hyecoon ejusque species 172.		32. lutea 32 b. 34 b. Mauri-	
317. vulneraria ad flomen	Marth. 317. forte Lug. 337 b		tanica 39 b. maritima 32	
Trag.	Hypericum ejusque species 279		b. 33	
Herba Wiapala 326 b	Hypericum frutescens 321 b		Jris praenosis 30 b. Pharaonis	
Herba admirandae 512	Hippia Lob. 250 b		31 b. Soliana 31. Tripolita-	
Hermodia Lysol Mefini Gef.	Hippion Gef. 188		na 32 b	
8 b. 7. Tragi 308 b. vulgo 67.	Hypochoeris Dalech. 125 b. Ta-		Jris bulbosa latifolia ejusque	
veius 40 b	bern. 127 b		species 38. angustifolia 38 b	
Hernaria Dod. 282	Hypocistis 465		cxrules 40. lutea 39. ver-	
Hesperis ejusque species 202	Hypodryi 422 b		feolor	39 b
Hetic Americanorum 90	Hypoglossum Valentium		Jris suberosa Lob.	40 b
Hyacintho asphodelos 70 b	Cluf. 463		Jfates ejusque species 115. Jyl-	
Hyacinthus ejusque species	Hippomane 511 b		lob.	204 b
41. Arabicus 45. autumnal-	Hippometis Palladij 454		Jfchzmon Lob.	8
li 46 b. 47. botioides 42 b.	Hippophic 293. Diofe. Col.		Jfchas alter Cluf.	292 b
43. Campan. flore 44 b.	477 b. Anguil. 478 b		Jfhyllon Cord.	278
Colchici folio 47 b. com-	Hippophaefum 189. Col. 389		Jfopyrum Diofeor. Col. 144.	
pus 42	Lugd. 478 b		Marth. 145 b. Czfai. 343 b.	
Hyacinthi flore oblongo 43	Hippoglossum Lugd. 303 b.		Gefa.	327
b. 44. obfoleto 44. Indicus	Marth. 304 b		Iva monfchata Tabern. 138 b.	
47. latifolius 46 b	Hippopalathum Marth. 114 b.		Nonfepient. 249. Rhiz-	
Hyacinthus non fcriptus e-	Lob. 115 b		torum 132 b	
jusque species 434 a	Hippomanes Cratvez Ang.		Jucca Benzoni	91
Hyacinthus Orientalis ejusque	128		Juglans	417.
species 44 b. flore pleno 45	Hippomarathrum Cam. 147		Jujubz ejusque species 446.	
b. ferritius 45. Ornitho-	a. Belli b. Franco 158 b. Ta-		Jylv. Czf.	478 b
galoides Cord. 70 b	bern. 162 b		Jnhila Scalg.	330 b
Hyacinthi Peruanus 47 b. de	Hippocelinum Theoph. 154 a.		Juncaria Tab.	334
padre nostro 69 b. poftira	Dod. Fuch. Lob. b. Lugd.		Juncellus Ad.	12 b
um Lob. 38. 39. Lobel. 40.	178 b		Juncus avellana Ama. 14 b.	
Trag. 77 b. racemofus 45. b.	Hipporus Lob. 15. Saxea Claf.		odor. aquat. Dod.	163
Hyacinthi flellaris species	365 b		Juncus & ejus species 15. a-	
41 b. Tripolitanus 45. Vir-	Hirculus 165. Frifcus 466		curus 11 b. asper Dod. 20 b.	
gilij 31. ura ramola 42 b	Hirundinaria Tab. 309 b		bombycinus 12 b. Lob. a.	
Hibers Fuch. 104	Hirundinaria Trag. 303		b. capitulis equiseti ibid.	
Hydrolapathum Lob. 116 b	Hysifolia 128 b		capitulo lanuginoso ibid.	
Hydropiper ejusque species	Hyfopoides Cam. ibid. Gef.		clavatus ibid. cyperoides	
101. lancolatum Lugdum.	neri 465 b		ibid. floridus ibid.	
180 b. rubrum Fuch. 195 b.	Hyfopus ejusque species 217.		Juncus laevis 12. lychnaeche-	
Lugdum.	campetris 465. Diof. 223 b		moi 7. 12. majus grami-	
			neus	

neus 4 b. maritimus 4 b.  
melanocera 12 b. odora-  
tus 11. rotundus ibid.  
Juncus petrosus Aug. 366  
Junci pappayma 434  
Juniperus ejusq; species 422  
major Diof. 487  
Juniperi gummi 500 b  
Juncal Avicue. 508 b  
Jussa 346 b  
Juvv Claf. 399  
Jzia 379  
Jxone Theophr. 380  
Jxocaulos Thal. 205 b. alte-  
ra Thal. 210 b  
Jxopus Cordi 330.

K.

Kaavy potus 25  
Kaare arbor 410 b  
Kaye Baka 464 b  
Kaifebu openank 91 b  
Kali ejusq; species 289.  
tium Alpini 191 b  
Keiri 202 b  
Kxanferlin 222 b  
Kecmia 316 b  
Kiana Diof. 309  
Kikation S. Jonz 432  
Kifimien 402 b  
Klaptentusef 361 b  
Kxentufere 428 b  
Koavvel Tragi 281.

L.

Lablab Alpini 341  
Labrum venosus ejusque  
species 385  
Labrusca 199  
Laburnum 391  
Lacaria Theophr. 451 b  
Laeca 499  
Lac arborum 496 b. lunz  
Gefa. 375 b  
Lachryma Christi 218. Jobi  
ibid. Joppi 401 b  
Lactaris Plinii 129 b  
Lactariola Cxf. 126  
Lactuca ejusque species 122.  
fylv. ejusque species 123 b  
Lactuca agnina Taber. 165 b  
Leporina Apulej Ang. 128.  
Trag. ib. murorum Cxf.  
petraea Cretica 93. 124 b  
Lactuca maritima Tab. 360  
Lactucella repens Cam. 262 b  
Ladanum 467  
Ladannum fegetum Plin. Lug-  
dun. 233 b  
Lagenulz Americanz 313  
Lagochimica 272 b  
Lagochimilla Bellou. 264  
Lagochymeni Bellou. 126 b  
Lagopyron Hipp. Gef. 263 b.  
Adverfar. 328 b  
Lagopodium Tab. 333

Lagopus ejusq; species 328 b.  
Diof. 321. 328 b. primus  
Trag. 332. alter Trag. 263 b  
Lamium ejusque species 130.  
panonicum Cluf. 236  
Lampfana Math. 95. Lob. 125  
Lauria Imper. 206 b  
Lancea fructus 444  
Lancea Christi Gef. 230. Cz.  
falpin. 354  
Lanceola Cxf. 89 b. mou-  
na Gef. 90  
Lancus 35  
Lanifera arbor Cluf. 430 b  
Lantana Dod. 429  
Lautor 19. 509 b  
Lapathum ejusq; species 113.  
Egyptiacum 116. aquati-  
cum ibid. b  
Lapathum fylv. latifolium  
ejusq; species 114 b. folio  
acuto 115  
Lapides refuacei 504 b  
Lappa ejusque species 198. 2.  
preffus Trag. 152. boaria  
Lugd. 153. fyl. Trag. 168 b  
Lappago 334. Plinij 250. Cz.  
falp. 333 b  
Lappula casatia 152 b. rufi-  
corum Lugd. 257 b  
Larix 492 b  
Laserpitium ejusque species  
156. Lac. 155. Angul. 158 b  
Lata fructus 439 b  
Lathyrus ejusq; species 293  
Lathyrus ejusq; species 343  
Lavandou 35 b  
Lavandula ejusq; species 216  
Lavandula folio arbor Cluf.  
401 b  
Laver Dod. 104 b. Fuch. Dod.  
Lob. 114. minus Lou. 163  
Laureola ejusq; species 462  
Laurus ejusque species 460.  
Graza Plinij Gef. 426  
Laurus Alexandrina 303 b. ta-  
xa Plinij 305  
Laurocerafus 450 b  
Lecyas fructus 444  
Ledum ejusque species 467.  
alpinum 468. Silefiacum  
467 b  
Legumina 337. capreolis do-  
nata ibid. carearia 346  
Legumen leouinum Rucl. 17  
Lemna Theophr. Lugd. 362  
Lens ejusque species 346. ma-  
jor repens Tab. 330  
Lentago 461 b  
Lentibularia Gef. 141 b  
Lenticula marina Lobel. 365.  
palustris ejusq; species 362  
Leuticus ejusque species 399  
Leo herba 87 b. Dod. 379 b  
Leucoboranos Gef. 87  
Leucopetalon Math. 314.

alterum Cxf. 143 b  
Leontopodium Lou. 254 b.  
Diof. 264. Brunfels. 319.  
Creticum 190. vulgare  
Math. 263 b  
Lepidium ejusque species 97.  
Diof. quibus 226 b. mion-  
tie. alt. Cluf. 104  
Leplab Clufij 341  
Lerchenblumen/ Gef. 242 b  
Leucaantha Aug. 377. Dod.  
380. Lac. 381. Lugd. 382 b.  
quorundam Lugd. 382 b  
Leucanthemum alpin. 136 b  
Leucas Cxf. 231. Diof. 327  
Leucographis Plinij Ang. 268  
Lugd. 381 b  
Leucoum aizoides Col. 284  
b. bulbosum ejusq; species  
55. non bulbosi species 200  
Leucoum corniculat. 202 b  
Creticum ejusque species  
201 b. luteum ejusque spe-  
cies ibid. allysoides ibid.  
maritimum 202. montan.  
107 b. Syriacum 202 b  
Leucouneifoliorum 35  
Leucouneifolius 51 b  
Levisticum Lob. 157  
Libanotis ejusque species ib.  
coronaria 217. nigra Thal.  
150 a. Taber. 150 b. Theophr.  
151 b. Sterilis Tab. 123 b  
Libanotis ferulz facie ejusq;  
species 150  
Libysticum Fuch. ibid.  
Lichen ejusque species 362.  
Diof. Col. 361 b. arborum  
Tab. ibid. marinus 458 b.  
marinus Cluf. 364. Plinij  
Col. 362 b  
Lieheu primum Plinij 285  
Lychnis ejusque species 203.  
Chalcedonica Lob. b. eoc-  
linea ib. marinus Lob. 205  
Lychnis coraaria ejusq;  
species 203 b. aquatica 204.  
multiplex ibid.  
Lychn. alpina species 206 b.  
hirsuta species 206. fege-  
tum species 204. fylv. spe-  
cies 205. viscofa species  
ibid.  
Lycinum ejusq; species 478.  
Creticum Belli 454 b  
Licouido 513  
Lycopericum 167  
Lycopodium Tab. 360 b.  
Lycopis ejusque species 257.  
Ang. 250. Cord. 254. Fuch.  
257. Anglica 256  
Lycopos Fuch. 230  
Lycostaphylou Cord. 456 b  
Ligum Aloex 393. America-  
num varium 392. aquili-  
num 393. squila Amaro

452 b. aromaz. Monard.  
409 b. Brasiliam 393  
Ligum Calamba ibid. de  
Cochi 449. totis vicem  
prabens 424 b. colubri-  
num ejusque species 391.  
exoticum Cluf. 489 b. cio-  
tie. alt. Cluf. 393 b  
Ligum ferri durine 449. fo-  
mitis vicem prabens 424 b  
Ligum Gnajacum ejusque  
species 448  
Ligum de Maugles 449. Mo-  
lucense 393 b. uephiri-  
cum 416 b  
Ligum odoratum Cxf. 392.  
rubrum Cxf. 393. Pava-  
num ibid. b. Rhodium 392.  
Belli 399  
Ligum Sambarae 393 b.  
Sandrum 448 b. S. Cruces  
433. Sapo. 393 b. Teixu  
449  
Ligna petrefacta diverfa 421  
Lignitum ejusque species  
162. Aug. 156 b. Belgarum  
Lob. 161. Math. 157 a. vul-  
gare 157 b. fylv. 161  
Lignitum ejusq; species 475.  
Brunfels. 447 b. nigrum  
476. Columella 291. orien-  
tale 398  
Lilac March. ibid.  
Liliago Cord. 29. Cxf. falp.  
80 a. b  
Liliasphodelus Cluf. 80  
Liliconatellus ejusq; species  
56. 57. orientalis 55  
Lilium album ejusq; species  
76. Alexandr. 69 b. aspho-  
deli radice 80. marinum  
54 b  
Lilium bulbiferum ejusque  
species 77. Canadense 79.  
fauis 80 b. floribus reflexis  
77 b. Persicum 79 b. po-  
lyrrhizon 29  
Lilium purpuraceum ejus-  
que species 76 b. rubrum  
77. variegatum 64. Zuffi-  
utare 78  
Lilium convallium 304. ve-  
lun Theophr. ibid.  
Limas 436 b  
Limeum Gail. 26 b. Plin. 184  
Limnium Cord. 279  
Limnium Cord. 16  
Limnium Cord. 16  
Limnium Austriac. Cluf.  
86 b. Dod. 87  
Limones ejusq; species 436  
Limouium ejusq; species 192  
Moufepellum 161. Lon.  
191. Gef. 192. aliud Lugd.  
261. pratense Trag. 327  
Limus arborum 444 b  
Linagrostis 4 b  
Linna

<i>Linaria ejusque species</i> 212.	<i>Lugd.</i> 318. <i>tetragonobolus</i> Camer. 332 b. <i>urbana</i> March. 333	<i>minor</i> Fuch. 309 b	<i>Dodon.</i> 213 b
<i>aurea</i> Trag. 211. <i>boryodes</i> Col. 259 b. <i>hederulz folio</i> Colu. 306 b. <i>quarta</i> Trag. 212 b. <i>rubra</i> Lugd. 245 b	<i>Lotus arbor ejusque species</i> 447. <i>alba</i> 416. <i>Africa</i> 447	<i>Malicorium</i> 437	<i>Maflac</i> 495
<i>Lingua avis</i> 416. <i>pallens</i> 1b. <i>pallens</i> Trag. 259 b	<i>Homeri</i> Guil. 446. <i>altera</i> Theophr. Lugd. 450 b. <i>vetustum</i> Cord. 393	<i>Mahnathalla</i> 14 b	<i>Mafla</i> 408 b
<i>Lingua cervina</i> 351. <i>cervina</i> ramola Colum. 354 b	<i>Lozan</i> Arabum 501	<i>Malope</i> Plinij 315	<i>Mafluche</i> 501
<i>Lingua</i> Plinij 180 b. <i>major</i> Lugd. 266 b. <i>serpentina</i> Czf. 354	<i>Luciola</i> Gef. 354. <i>Fracta</i> 330. <i>Czfalp.</i> 7 b	<i>Malva</i> <i>ejusq.</i> species 314. <i>altera</i> Czf. 316. <i>Theophr.</i> 316	<i>Maflia Gallorum</i> 224
<i>Lingula vulnear.</i> Cord. <i>ibid.</i>	<i>Lucum</i> 25	<i>b. Veneta</i> Lun. 317	<i>Maluria Belli</i> 319 b
<i>Linocarpus</i> Thal. 214 b	<i>Lucumas fructus</i> 407	<i>Malva arborea</i> 315 b. <i>erifpa</i> 315. <i>rofea</i> <i>ibid.</i>	<i>Mater violarum</i> Lugd. 159 b
<i>Linofyrus</i> Lob. 223	<i>Luania ejusque species</i> 354	<i>Ma lva vilcus</i> Ang. 315 b	<i>Mates</i> 404 b. <i>Iodorum</i> 309 b
<i>Linofpartum</i> Theophr. 5	<i>Anguil.</i> 333. <i>arthritica</i> 242. <i>aspera</i> Gefo. 201 b. <i>burifla</i> Anguil. 227 b. <i>radiata</i> Lobe- 330	<i>Malus</i> <i>ejusque species</i> 435. <i>ran- tia ejusque species</i> 436. <i>Aflyria</i> 437 b	<i>Mates</i> 441 b
<i>Linum ejusque species</i> 214. <i>marium</i> Imper. 364 b. <i>prateafe</i> 4 b	<i>Luania Græca ejusq.</i> species 201. <i>Græca tertia</i> Czf. 101 b. <i>quarta</i> Czf. 107 b	<i>Malus</i> <i>citria ejusque species</i> 435. <i>cydonia ejusque species</i> 434	<i>Matricaria ejusq.</i> species 333
<i>Liquidambar</i> 502 b	<i>Lunaria</i> <i>major</i> Gefo. 318 <i>minor</i> Czf. 349. <i>lutea</i> Lugd. 107 b	<i>Malus granata</i> 418. <i>marina</i> Aldroan. 369 b. <i>Indica</i> A- coltz 433 b	<i>Matrifalyta</i> Col. 218
<i>Liquiritia succus</i> 496 b	<i>Luparia</i> Tragi 183	<i>Malus limonia ejusque species</i> 436	<i>Matri ylya</i> Trag. 354
<i>Lirium mas</i> 39. <i>alterum</i> Theophrast. 69 b	<i>Lupitrepitus</i> Col. 374 b	<i>Malum</i> <i>Helpericum</i> 436. <i>in- lanum</i> marin. 369 b	<i>Mauropapnos</i> 452
<i>Lyamachia ejusque species</i> 244. <i>Lon.</i> 395 b. <i>galeri- cula</i> Eyst. 236 b. <i>Lob.</i> 246 b. <i>lutea</i> 245. <i>corniculata</i> 510 b. <i>filiquola</i> 245 <i>spicata</i> 246	<i>Lupinus</i> <i>ejusque species</i> 347. <i>Africanus</i> 348 b. <i>Creticus</i> <i>ibid.</i> <i>syvl.</i> Czf. 352 b. <i>syvl.</i> <i>rufficus</i> Czfalp. 350	<i>Mamara</i> 431 b	<i>Maurouia</i> 97 b
<i>Virginea</i> 245. 530 b	<i>Lutium</i> <i>ejusque species</i> 298. <i>syvl.</i> Thal. 318	<i>Mambo</i> Lugd. 376	<i>Mauz</i> 507 b
<i>Lithobryon</i> Col. 361	<i>Lurea herba</i> Plinij 395 b. <i>Vi- truvij</i> 100	<i>Mamelarbor</i> 417 b	<i>Mazza</i> <i>de Congo</i> 27
<i>Lithoontriboo</i> Lugd. 282	<i>Luteola ejusq.</i> species <i>ibid.</i>	<i>Maudeochade</i> 91	<i>Mechinum</i> 35
<i>Lithophyton marium</i> Gef- neri 366	<i>Lutum herba</i> species <i>ibid.</i>	<i>Manderoch parpie</i> <i>ibid.</i> b	<i>Mecocham ejusque species</i> 494 b
<i>Lithoreoleucon</i> Col. 201 b	M.	<i>Mandepore</i> <i>ibid.</i>	<i>Medelufum</i> Cord. 164
<i>Litholpermum ejusq.</i> species 258. <i>angustifolium umbel- latum</i> 521. <i>fruticofum</i> 255 b	<i>MAchalefaqua</i> 475	<i>Mandioeca</i> 90 b	<i>Medica ejusque species</i> 329.
<i>Lithoblafla</i> Col. 107	<i>Macalep</i> Lob. 451 b. <i>al- bum</i> Rauvvolf. 405 b	<i>Mandragora ejusque species</i> 145	<i>Arabica</i> Cam. 319 b. <i>Dio- fcor.</i> 330. <i>flava</i> Cluf. <i>ibid.</i> <i>lunata</i> Lugd. <i>ibid.</i> <i>marina</i> L. ob. 319 b
<i>Lithoxyla</i> 421	<i>Macatto</i> 184 b	<i>169. Theophr.</i> Dod. 164. <i>Czfalp.</i> 108 b	<i>Medeum</i> Diof. Rauw. 94
<i>Loborum species</i> Cluf. 404	<i>Macozvver</i> 321 b	<i>Mandues</i> 91 b	<i>Mehenbeihene</i> 418 b
<i>Lobus crassus</i> Cluf. 338 b. <i>c- ebiodus</i> Cluf. 399 b	<i>Macier veterum</i> 401	<i>Manga</i> 440 b	<i>Melampyrum ejusq.</i> species 214
<i>Loca</i> 21	<i>Macer</i> 407 b	<i>Mangier blanco</i> 439 b	<i>Melandryon</i> Plinij 163. <i>ge- nuinum</i> Col. 204 b. <i>quo- rundam</i> Cluf. 209
<i>Locos fructus</i> 434 b	<i>Macouna</i> 341 b	<i>Mangle Oviedi</i> 418	<i>Melanguia</i> 415 b
<i>Locusta</i> Gef. 165 b	<i>Madian</i> 407	<i>Mangeflans</i> 461 b. 472 b	<i>Melanzium ejusque species</i> 145
<i>Lolade</i> 196	<i>Madrepora</i> Imper. 367	<i>Manio</i> 91	<i>Melanzana</i> 167 b
<i>Lolium 9. maritum</i> <i>ibid.</i> b. <i>rubrum</i> <i>ibid.</i> Fuch. 204 b	<i>Meiblaum</i> Trag. 429	<i>Manigette</i> 25	<i>Melcagris</i> 64
<i>Lozchitis ejusq.</i> species 359. <i>Czf.</i> 63 b. <i>major</i> Callier. 40 b. <i>prior</i> Dalech. 187 b	<i>Maggai</i> 448 b	<i>Manihot</i> 90 b	<i>Melenkeo</i> 507 b
<i>Lotoniflos</i> Ponz. 312 b	<i>Magillrantia</i> Cam. 156 b	<i>Manioa</i> 496 b. <i>Germanica</i> 497. <i>hquida</i> <i>ibid.</i>	<i>Mel frugum</i> Diof. 27. <i>Ga- zia</i> 331 b
<i>Lorus ejusq.</i> species 331. <i>Egy- ptia</i> 193. 196. <i>afperior</i> L. ob. 352 b. <i>campellum</i> Trag. 328. <i>caneapyllos</i> Lugd. 349. <i>hortorum</i> Lob. 331 b. <i>latifolia</i> Lugd. 333 b	<i>Magouna</i> 440 b	<i>Manus marina</i> Gef. 369 b	<i>Melica</i> 22
<i>Lotus Lybia</i> Lugd. 332 b	<i>Magummeoauk</i> 421	<i>Marabilles del Peru</i> 168 b	<i>Melica Cam.</i> 331. <i>Fuch.</i> <i>ibid.</i> <i>vulgaris</i> Czf. 332
<i>Lotus pratensis filiquola</i> Cluf. 332 b. <i>purpurea</i> Lugd. 328	<i>Manalep</i> March. 451. <i>Serapi- on</i> Tab. 476	<i>Maraka</i> 461 b	<i>Meliorum quarta</i> Trag. <i>ibid.</i> <i>quinta</i> Trag. 349 b. <i>lepti- ma</i> Trag. 332. <i>major</i> rertia Trag. 330
<i>pentaphylla</i> Gef. 332. <i>qua- drifolia</i> Tab. 327 b. <i>filiquo- la</i> Cam. 332 b	<i>Marale</i> Cord. 241 b	<i>Marmel</i> 12	<i>Melilotus</i> <i>major</i> pinguis Eng- dun. 389 b
<i>Lotus fava</i> Fuch. 331. <i>syvl.</i> <i>Matthiol.</i> <i>ibid.</i> <i>syvl.</i> <i>minor</i>	<i>Majorana ejusq.</i> species 224. <i>major</i> Taber. 223 b	<i>Marmelitis</i> 312 b	<i>Melinum</i> Czf. 338 b. <i>alterum</i> Czf. 248
	<i>Mays</i> 25. 26	<i>Marmelos</i> 435 b	<i>Meliffa ejusque species</i> 229. <i>yliv.</i> 210
	<i>Mala</i> <i>Æthiopica</i> 269 b. <i>lofa</i> na Fuch. <i>ibid.</i> <i>Peruviana</i> Eyster. <i>ibid.</i>	<i>Marubium ejusque species</i> 229. <i>agrefle</i> Trag. 236. <i>ho- mile</i> 211 b	<i>Melilophylo</i> 229. <i>Fuchij</i> 331 b
	<i>Malabathrum</i> 410	<i>Marrago</i> Chymif. 77. <i>Con- ftantinopoli.</i> 76. <i>Imperi- ale</i> 78 b. <i>Poinpooium</i> 79	<i>Mellegeta</i> 413
	<i>Malaccosifus</i> Lugd. 306. <i>Da- moeratus</i> Ang. 294. <i>Gefo.</i> 297. <i>major</i> Lugd. 296 b.	<i>Maro herba</i> Dod. 251	<i>Meloeftus</i> 384
		<i>Marum ejusque species</i> 224.	<i>Meloefta A'pini</i> 317 b
			<i>Melo corcopali</i> 435 b
			<i>Melogenza</i> 167 b
			<i>Melo ejusque species</i> 310
			Melope-

- Melopepo ejusq[ue] species 31a.  
 Lon. 310. Galeni Cef. ibid.  
 Melothron 297. Theoph. 167  
 Melopisus 168  
 Melt 20  
 Melrofidum 496 b  
 Memecylon 460  
 Menianthes palust. Lugd. 327  
 Mentha sativa ejusq[ue] species  
 226. aquatica 227 b. cata-  
 racta 266. Sarracenia Lug-  
 dun. 288 b  
 Mentha sylv. ejusq[ue] species  
 227  
 Mentastrum ibid. b. Brunf.  
 229 b  
 Mentha marina Rond. 369  
 Mercenalis ejusq[ue] species  
 121. montana 122. sylv. se-  
 cund. Trag. 306 b  
 Mesereum German. 462  
 Mespilus ejusq[ue] species 453.  
 anthedon 452 b. Atonia  
 453 b. sylv. 454 b  
 Metle Avicen. 413 b  
 Meragueluoux 439 b  
 Metallum Italorum 452  
 Meum ejusq[ue] species 148. a-  
 quaticum Gef. 141 b  
 Mexereon Arab. 462  
 Myacanthos Theophr. Lug-  
 dun. 387  
 Myagrurn ejusq[ue] species 109.  
 Taber. 104 b. alterum mi-  
 nus Lugd. 334  
 Mignol potio 507  
 Milax arbor 305. Aye Acy-  
 ca Bellon. 425 b  
 Miliana herba 8 b  
 Milia Abrayn 22 b. 25  
 Milium ejusq[ue] species 26. A-  
 thopicum ibid. b. agreffe  
 27. alterum Theophr. 28.  
 capreaurum 307. Indicum  
 24. 25 b. 26  
 Milium syl. Taber. 234 b. fo-  
 lis 258  
 Milicaris Galeni 225 b  
 Millefolium ejusq[ue] species  
 140. aquaticum 141. no-  
 bile 132  
 Millefolium aquaticum cor-  
 nutum majus 141. minus  
 140 b  
 Millegrana 281 b  
 Milienoria 235 b  
 Millepura Imper. 367  
 Millo 26  
 Milzarella 221 b  
 Mimulus Plinij 163 b  
 Myofotis Lob. 254 a. b. par-  
 va 208 b  
 Myofuros 290 b
- Mippi 458 b  
 Mirabilis Peruviana 168 b  
 Mira folie Italij 411  
 Myrica ejusq[ue] species 484.  
 marina Cluf. 365 b  
 Myrtillophyllum aquatic. 141.  
 pelagium Cluf. 363 b  
 Myrobalanus ejusq[ue] species  
 445. folio Heliotropij Pl-  
 inij 419. Trogloditum Plin-  
 402  
 Myrrha 501 b. Aminea 499  
 Myrrhis ejusq[ue] species 160.  
 cincinnatia 162. lappa Lug-  
 dun. 151 b  
 Myrrhida Plinij Lob. 319  
 Myrtacantha 470 b  
 Myrtidatum 469 b  
 Myrtillus ejusq[ue] species 470  
 Myrtocitrus 458  
 Myromelia Gef. 452 b  
 Myrtus ejusq[ue] species 468  
 Biabatica 441 b. Indica  
 469 b. ligustrifolia 475 b  
 nemoralis 414 b. sylv. 470  
 b. reuifolia L hal. 471 b  
 Myrtococcus 469 b. exere-  
 mentum ibid.  
 Muhradatum cratevz Cz-  
 Galp. 87  
 Muros Aetij Ang. 206 b  
 Myrus 446. alba 416  
 Mochus Cef. 344. Dod. 346  
 Mogori 470  
 Moly ejusq[ue] species 75. alre-  
 rum Plinij 20 b. monta-  
 num 75. mofchatum 10 b  
 Moly Homeri Gail. 512 b  
 Molybdena Plinij Ang. 97 b  
 Dalech. 386 b. Plinij forte  
 192  
 Molyza Hipp. 74  
 Mollie Cluf. 399  
 Mollugo ejusq[ue] species 334  
 Molluca nux 417  
 Moloch a Serapion. 351  
 Molon Plinij 163 b  
 Moluca 229 b  
 Momordica 306  
 Monococcon frument. 21 b  
 Monophyllum 304  
 Monorebia Gefa. 84  
 Morabati 479. terrestria 326  
 Moracia buces 417  
 Morgani 480 b  
 Moringa 399  
 Morochen 25 b  
 Morus gallioz 250. 251. dia-  
 boli 269. ranx 293  
 Morus ejusq[ue] species 459  
 mofchata Cordi 178 b. ex-  
 rulea 221 b  
 Momeit Arabum 459 b  
 Mungo 413 b. fimilis  
 Murra 468  
 Musa 407 b
- Muscari 403  
 Muscipula 205 b. 206  
 Mulcus arboreus 361. coral-  
 linus, Tab. ibid. fernicula  
 ibid. b  
 Muscus maritimus ejusq[ue] spe-  
 cies 363. 364  
 Mulcus pulmonarius 361 b  
 pyxidosis 361. queruus Col-  
 lum. 361 b. ramofus 361 a. b.  
 scoparius, Lob. 361  
 Mulcus saxatilis ejusq[ue] spe-  
 cies 362. stellaris rolcus 361  
 Mulcus terrestris ejusq[ue] spe-  
 cies 360. capillaris Dodon.  
 356 b. clavatus 360 b. cor-  
 niculatus 358 b. denticula-  
 tus 369. filicinus ibid. flo-  
 ridus 206 b. in parietibus  
 Cxfalp. fax atili aut sylv.  
 Tragi 358  
 Musco fimilis ad pifces capi-  
 endos 360 b  
 Mustelina Gef. 148 b  
 Mux 507 b
- N.
- NAbca Alpini 477 b  
 Nachani 99 b  
 Nanas Theveti 384  
 Napoca Belli 477  
 Napellus ejusq[ue] species 183 b  
 Moyfis 184  
 Napobrassica 112 b  
 Napus ejusq[ue] species 95  
 Nareffoleucioim 55 b  
 Nareffolium 43 b  
 Nareffus ejusq[ue] species 48. Nuchani  
 Africani 49 b. 50 b. albus  
 49 b. aquaticus 5. d'Argi-  
 ers 51. autumnalis 51. 69 b  
 Nareffus calice oblongo 53.  
 calice magno & parvo 51 b  
 magno & oblongo 51. can-  
 didus 46. exeruleus 45. 49.  
 Conftantinopol. 63 b  
 Nareffus Diof. 49. flore ple-  
 no 53 b. Indicus 49. junci-  
 folius 51. latifolius 49 b. lu-  
 teus rotus 50 b  
 Nareffus maritimus 54 b  
 Martius 55. medio luteus  
 50. orientalis 49 b  
 Nareffus Persicus 69 b. por-  
 raceo latifolio 48. angu-  
 stofolus 51. quartus Marti-  
 70 b  
 Nardus 13. agreffis 164. cel-  
 tica 165. celtica altera 185.  
 Italica 216. montana 165.  
 sylv. 197  
 Nardhecia Theophr. 148 b  
 Nascaphrum 452  
 Naffos 17 b  
 Naffurium ejusq[ue] species  
 103. aquaticum 104. Baby-
- lonicum Lob. 109. hyber-  
 num Thalij 99. hortense  
 103. Indicum 306. mariti-  
 mum Lugd. 99 b. monta-  
 num 104 b  
 Naffurium palustre Gef. 99.  
 pratense 104. sylv. Thal-  
 103 b  
 Naffurtiolum Gef. 105  
 Natrix Plinij Ang. 222 b. Lo-  
 bel. 389 b  
 Negundo 412 b  
 Nenuphar 193  
 Neotria Dod. 86 b  
 Nepa Theophr. Lob. 394  
 Nepeta agreffis Lob. 222.  
 Trag. 229 b. aquatica Tra-  
 gi 227. fruticosa Cord. 222.  
 minor Cam. ibid. b. mon-  
 tana Cord. 229. vulgaris  
 Trag. 228  
 Nepetella Eyll. ibid. b  
 Nerion ejusq[ue] species 464. al-  
 pinum Gef. 468 b  
 Nicoitiana ejusq[ue] species 69  
 Nidus avis 86 b  
 Nigella ejusq[ue] species 145.  
 Brunf. 204 b  
 Nigellastrum Dod. ibid.  
 Nil Avicennaz Frago. 113. A-  
 rabum Gef. 295  
 Nimbo 416 b  
 Nimpaxa ejusq[ue] species 193  
 Noccus herba 14  
 Noli me tangere Gef. 307  
 Nofzlichea Lob. 67  
 Nuchani 43 b  
 Nuchti 478  
 Nummularia ejusq[ue] species  
 309. sylv. Gef. 252  
 Nux juglans ejusq[ue] species  
 417. barbata Plinij 418 b  
 Nux mofchata ejusq[ue] species  
 407. Randonis ibid. Indica  
 Marti. 507. de Coulcoul  
 510 b  
 Nux infana 444. metella Mat-  
 thiol 168. officinali. 511 b.  
 purgativa 418 b. velicaria  
 401 b. vomica officio. 511  
 Nuces exotice ibid.  
 Nucularia stritria 162  
 Nucula Indica 510  
 Nuciperfca 440 b.
- O.
- Occhio xochiel 48 b  
 Ochrus sylv. Lob. 343  
 Ocymastrum Fuch. 225. Mat-  
 thiol. 204. alterum Trag.  
 235. verrucosum Gefner.  
 168 b  
 Ocymastrum Valentinum  
 Clufij 230. Valerianibos  
 Lob. 165  
 Ocy-

Ocymoides alpinum Gefue.	105 b.	fructuofum Camer.	105.	lychnitis Col.	106 b.	minus feu album Lugd.	105.	musculosum Ponx	106 b.	no-	di-florum Cam.	105.	pere-	grinum Gef.	103.	polygon-	folio Lobel.	126 b.	repet-	Cam.	ibid																																																																																																																																																																																																																																																									
Ocimum ejusque species	125.	lylv.	ibid	Ocimum cereale	17 b.	Ocofolc	501 b.	Ocularia	233 b.	Oculus bovis Brunf.	161	Oculus Christi Lugd.	161	Odontis Cam.	105 b.	Odontitis Gef.	110.	Tab.	134.	lutea Lugd.	177 b.	Oeanthe ejusque species	162.	fructus	199 b.	Oenopia	477	Oenothera Plinij	245 b.	Oefum Theoph.	473	Ocium Plinij	90	Oegha	444	Ocaponauk	91	Okindiger	340																																																																																																																																																																																																																																							
Olea ejusque species	471.	Æthiopica Cordi	391.	Bohe-	mica	471 b.	Olcauder	464.	lyl.	Avic.	423 b.	Oleaster	471 b.	Germanicu	477 b.	Oleum abiegunum	501 b.	ly-	lacinum	501 b.	Olibaum	500 b.	101	Olyra Ad.	22.	Cord.	23	Olfenichium Cord.	115 b.	Olfuftrum Czf.	154 b.	Olus Hispanicum Trag.	114 b.	Olus Judaicum Avicen.	Rau-	wolf.	317	Omphalocarpus Plinij	334	Onagra Czf.	145 b.	Onobolium Hipp.	Ang.	185	Onobrychis arvensis ejusque species	115.	leguminofae-	rusque species	350.	Fra-	caf.	313	Onochites	155 b.	Onogrys Nicandri Gef.	381	Ononion ejusque species	389	Onopordon Dod.	381 b.	Ger.	385 b.	Lugd.	384 b.	Onopoxisteria Lugd.	381 b.	Dodon.	385	Onopteris Tab.	355 b.	Onofma Math.	151	Ophioglossum ejusque species	374	Ophioleoron	374	Ophrys ejusque species	87	Ophthalma	233 b.	Opinavv	91	Opium	494 b.	Opocarpum	501 b.	Opopanax	494 b.	Opulus Colum.	Dod.	447 b.	campeftr.	431 b.	montana	456 b.	Lugd.	431.	Ruellij	456 b.	Opuntia	458.	marina	Coitufi	362 a.	Osteocollus	458 b.	Olfrea in arboribus	114 b.	Olbiochryfo Belli	330	Orchis ejusque species	81.	ab-	ortiva Cluf.	86 b.	andrach-	nitis	83.	84.	agustifolia	Fuchfij	81.	antropophora	Col.	81 b.	bifolia	81.	Cam.	83.	trifolia	ibid.	Orchis fectida ejusque species	81 b.	fucum referens	83.	la-	tefola	80.	lutea	83.	84.	me-	luritis	Lobel.	83 b.	mon-	ana	16 b.	Orchh morio ejusque species	81 b.	muscam referens	83.	minor odoratus	86 b.	odo-	rata	84.	ornithophora	Lo-	bel.	83.	84.	Orchis palmaria ejusque species	85.	repens	84 b.	rotunda	Lugd.	81 b.	Orchis Serapias ejusque species	81.	Sphegodes	83.	Brace-	matica	81	Ordillon Ang.	161	Oregioella Cluf.	406	Oreofelinum Tab.	150.	Ang.	151.	Fuch.	153.	Dod.	Lobel.	Tabern.	ibid b.	Origanum ejusque species	213.	tertium Diof.	Qnad.	221 b.	verticillatum Thal.	225	Oryza	224.	Germanica	21 b.	lylv.	1	Ornithogalum ejusque species	69.	Arabicum	70.	luteum	ejusque species	71.	spica	rum	70	Ornithopodium ejusque species	350.	alt.	Dod.	349 b.	Crooglossum	416	Orous	415 b.	Bellog.	416 b.	Pande	415 b.	Tragi	417	Orobancha ejusque species	87.	Geln.	86 b.	Ruellij	291.	Theoph.	294 b.	legumen	Lugd.	345 b.	Orobis ejusque species	346.	Americanus	344 b.	Orobis fylv.	ejusque species	351.	lylv.	Trag.	345	Oronion Dod.	112	Orvala Dod.	238	Orzada Monard.	23 b.	Oliamener	421	Olyrin Dod.	121.	Lob.	ibid.	b.	Auftriaca Cluf.	213.	minor	ibid.	b.	Oseleus Czf.	211.	212.
Ormundula Lob.	358.	Trag.	345	Ormundula Lon.	358	Ofsar Belli	116	Oftea Lon.	447 b.	Osteocollon Lugd.	155 b.	Ca-	mer.	109 b.	Ostetricium montanum Tra-	gri	86.	lylv.	Trag.	155 b.	Ostrucium Lon.	156	Olftra Cord.	417.	Theoph.	398.	Theoph.	Lob.	415	Olftry Theoph.	417	Othonna Lob.	131 b.	Otitis Tab.	106	Ova oleatum	472	Ovaria Gef.	226 b.	Ouludia Lugd.	57	Ouararia	184 b.	Oxyagrostis	7	Oxalis ejusque species	114	Oxya Bellon.	419	Oxyacantha	454	Oxyacanthus Galeni	ibid.	Oxyarceus	489 b.	Oxycedrus Lob.	487.	Theo-	phraft.	489	Oxycocon Cordi	471 b.	Oxylapathum	115.	aquat.	193	Oxymirine Ang.	470 b.	Oxyphoricum	403	Oxys Plinij	330	Oxyfcheon	100 b.	Oxytriphylon Lobel.	311 b.	Trag.	330 b.																																																																																																																																																																																																
P				Pacayes	417 b.	Pacal Indis	417 b.	Paco	508 b.	Pacaire	ibid.	Padus Lugd.	451.	Pæonia	313.	Galen.	112 b.	P-gatovir	15	Payeu Lugd.	189	Pala A riena Plinij	438 b.	Bel-	lon.	458.	Plinij	507 b.	Palatum leporis Czf.	490	Palea de Mecha	490	Paliurus Africana Ruel.	478 b.	Gef.	454.	Thoe.	453 b.	Paliurus Athenæz	477 b.	Bel-	474.	Lacun.	415 b.	Palla Garziz	407	Palma Christi Gallorum	431	Palma Christi ejusque species	85.	palustris	444 b.	Palma aut Palus sanctus	444 b.	Palma ejusque species	506.	earyotis Diofcor.	109 b.	ci-	ebotis	97.	cyppia	Theo-	phraft.	ibid.	b.	Palma coccifera ejusque species	108 b.	Indica	509.	fac-	cifera	Cluf.	507	Palma squammosa fructu e-	jusque species	510 b.	vin.	182 b.	altica.																																																																																																																																																																																														
fera Thevetio	507.	Palmapinus	500 b.	Palmaria sanctæ similis	448 b.	Palmaria Tab.	185 b.	Palmetia humilis Sealig.	19	Palmsolium giganteum Im-	per.	364 b.	Palmaria	507 b.	semellæ	509 b.	Palmita marina Imper.	345	Palmita Tab.	405 b.	Palmo d'Agula Linæ.	394.	del	cebra	301	Palto arbor	439 b.	Palndapium Tab.	154	Palus Indis	448	Panax ejusque species	156.	a-	clepius	158.	chironium	Theoph.	Ang.	176.	Camer.	156 b.	Math.	461.	Tab.	266.	Lugd.	156.	178.	Lon.	ibid.	b.	chironium minus Camer.	446 b.	Panax costium Tab.	156 b.	Panax Heracleum Math	156	b.	Ang.	319 b.	Czf.	156	Panax peregrinum Dod.	ib.	Pharnacium Plinij	168.	re-	centium	olofatri	Lobel.	156.	Syriacum	ibid.	tenul-	folium	Theoph.	158	Pancration Gef.	42.	43.	Dodon.	Lon.	54 b.	Diof.	Cluf.	73.	Czf.	71.	Indicum	55	Panicaulcus Czf.	161 b.	Panica strela Czf.	8 b.	Panicum ejusque species	127.	Æthiopicum	ibid.	b.	Indi-	cum	162.	17.	peregrinum	15 b.	lylv.	12 b.	Panis enculi	330 b.	porcinus	308.	Indorum	90 b.	31	Pannacchio Persiano	80	Pannoni libito	19 b.	Pao de Cebra	301	Papaje fructus	457 b.	Papas Indorum	167	Papaver ejusque species	172 b.	eritarum	178.	eraticum	ibid.	b.	Heracleum	Colom.	127 b.	Spinofum	171 b.	ipu-	meum	Lob.	105.	Czf.	1293	b.	Diofcor.	quorundam	279.	G. fa.	291 b.	Paperas	19	Papyrus ejusque species	ibid.	Papillaris Cam.	125	Papules Critica	343 b.	Paquouere	508	Panaceoceleum Guiland.	168	Paralytic	421 b.	144	Parapara	184 b.	Cluf.	341 b.	Paravas	123 b.	Paricaria	121.	Monfpel.	1308	lylv.	234	Paritico	469 b.	Paronychia Ang.	Tab.	182 b.	altica.																																																																																								



- altera Matth. 182. alincola  
 Lob. 108 b. Hispanica  
 Clus. 181 b. myagrifolia  
 Geln. 109  
 Paronychia Matth. 156. laci-  
 niata 185. rutaceo folio  
 Lob. ibid.  
 Parote Mexioe. 118. 510 b  
 Parthenium ejusq. species 133  
 Trag. 131. nobile Geln. 135  
 Passerina Trag. 159. minor  
 saxatilis 174 b  
 Passula Corinthiaca 139  
 Pastellus herba Linc. 113 b  
 Pastinaca ejusque species 151  
 aquatica Lob. 154. latifolia  
 155. latifolia fyl. Dod. ibid. b  
 marina Lob. 188 b. nigra  
 fyl. Dod. 162 b. pratensis  
 Theoph. Cord. ib. b. Syriaca  
 Lugd. 155 b  
 Patrea 311 b  
 Pater noster Lugd. 14  
 Pavane Indorum 431  
 Pavana 393 b  
 Pavate 399 b  
 Pedcea veneris Lob. 151  
 Pedicularis ejusq. species 163  
 Cor. 324 b. fixida Trag. 185  
 Paderota Pauls. 147  
 Pedana Guiland. 133  
 Pegana Narbou. Ad. 336 b  
 Pelecus Geln. 329  
 Penobfou 513  
 Pennachio marions 366  
 Penna marina Rondel. 369 b  
 Imper. 363 b  
 Pentaphyllum ejusq. species  
 315  
 Pentorobon Plinij 323  
 Pepsia 434 b  
 Pepitas del Peru 441  
 Pepsos Quith 420 b  
 Pephon Dod. 182  
 Pepsus ejusq. species 293  
 Pepsus Lob. 191  
 Pepsus ejusq. species 311. latus  
 312. Matth. 310  
 Pepsina Czf. 119  
 Perchepter Lob. 152 b  
 Perdicium 111. Theoph. 130  
 Petebeceue 169  
 Petichymenon ejusq. species  
 301  
 Petichymenon Allobrog. 411  
 b. rectum 411  
 Periploca ejusq. species 373  
 prior Dodon. 294 b. altera  
 Dod. 305. minor Lob. ibid.  
 serpens Lob. ibid. b  
 Peristrona Cratere Ang. 150  
 Peristrona ejusq. species 277  
 altera Lugd. 154 b. minor  
 Geln. 112 b. napifolia Lob.  
 ibid. filiquosa Lobel. ibid  
 fyl. Brunf. 87  
 Perfoliata Achillea Geln. 171  
 Perloro gramen secundum  
 Bellon. 415 b  
 Permonaria Ang. 360 b  
 Persenfa Dod. 197  
 Persica Cluf. 441. forte Plu-  
 nij 512  
 Persica ejusque species 440.  
 nux 417. minor 442 b  
 Persicaria ejusque species 101  
 filiquosa Lob. 307  
 Personata Plinij 197. 198  
 Personata Alotifacie 423 b  
 Persvina Trag. 301  
 Pes aserionas Fuch. 119. afi-  
 ni Pandect. 110. cati 367 b  
 columbinus 318 b. corvi  
 Brunf. 179 b. leoninus Ad.  
 264. leonis 319. mulvi An-  
 goul. 336 b  
 Petastres ejusque species 197  
 Petrocelafus 457  
 Petromarula Belli 93  
 Petroseodon Geln. 77 b  
 Petroselinum 153. fyl. 163  
 Petroselinum vicinum Trag. 161  
 Petrum Thever. 149  
 Pence ejusque species 491  
 Peucedanum ejusque species  
 149. Lon. 158 b. aquaticum  
 Tab. 141 b  
 Phacnides Oribasij 463 b  
 Phagus Gracorum 420  
 Philangies Cord. 19  
 Phalangium ejusque species  
 ibid. b. Crete ibid.  
 Phalaris ejusque species 28.  
 parva Czf. pratensis Lob.  
 a. fyl. 8 b  
 Phallus Hollandicus 85. 374 b  
 Piana Bellon. 485  
 Phaeolus vulgaris ejusq. spe-  
 cies 339. Elichipicus 340 b  
 Africanus Clus. 340. Braff.  
 lianus 341 b. Guineensis ib.  
 Nigritarum ibid.  
 Phaeolus Indicus ejusq. spe-  
 cies ibid. peregrinus Clus.  
 338. 340. Belli 351. Peruanus  
 338 b. primus Trag. 342  
 Phaeolus sativus Dod. 338.  
 fyl. Dod. ibid. b. fyl. Lugd.  
 343. sylvarum Lugd. 351.  
 Turcicus Czf. 339  
 Phaeolus Czf. 339 b  
 Phaeolus Romanus 432  
 Phyllia Gail. 416 b  
 Phyllirea ejusq. species 476.  
 Czf. 426 b. Dod. 479  
 Phyllitis ejusque species 353.  
 lacustris Cord. 193  
 Phyllon Lugdun. 184 b. 185  
 Theoph. Cord. 121  
 Phyllon spicatum & testicu-  
 latum 121  
 Phytocuma Czf. 93. Matth. 93.  
 Belli 112. Montpel. 100 b.  
 Diose. Colum. 270 b. mi-  
 nus Col. 171  
 Physimlon 507 b  
 Phlomis Lobel. 141. phlo-  
 mos 239. 240  
 Phleon & Phleus Theop. 194  
 Phleus mas Lugd. 194. for-  
 mina Lugd. 15  
 Phlox Theoph. 178. 103 b  
 Phoenicobalanus 445 b  
 Phoenix carduus 379 b  
 Phoenix 9 a. b.  
 Phorbion Galeci 123  
 Photel 508  
 Phicalida 97 b  
 Phthora Lob. 184  
 Phthorodon 314  
 Phu ejusq. species 164  
 Picea ejusq. species 493. Do-  
 don. 505  
 Pycnomorus Ang. 100. Dio-  
 seor. Cortuso 167. Brunf.  
 115 b. Colum. 169 b. Crete  
 Lob. 379 b  
 Picro Lugd. 118  
 Pigamum Lugd. 336  
 Pygus Theoph. 476  
 Pila marina Czf. 368 b  
 Pilosella ejusque species 162.  
 major 112 b. major Gallor.  
 Thal. 119. minor Fuch. 163.  
 filiquosa Cam. 108 b. fyl.  
 Trag. 254  
 Pimento del rabo 412 b  
 Pimpinella ejusq. species 159.  
 fol. Agrimoniz 321 b. Ro-  
 mana Czf. 161. spinos.  
 Clus. 388 b  
 Pinas 384 b. 413 b  
 Pina radix 91 b  
 Pindo 513 b  
 Pinea purgativa 492 b  
 Pinguicula Geln. 143 b  
 Pinocen 492 b  
 Pinipinichi 434 b  
 Pinaster ejusque species 492.  
 Austriacus 491. Belli 491  
 Pinus ejusq. species 491. ma-  
 ritima 492. tabulus Plinij  
 491 b. fyl. Czf. 493  
 Piper 411. abotivum 412 b.  
 Ethiopianum ibid. cauda-  
 tum ibid. longum ib. Mar-  
 thiol. 411 b. rotundum 411  
 Piper Indicum ejusque spe-  
 cies 102  
 Piperis radix Diose. 35 b  
 Pipitrus Brunf. 97  
 Pyracantha Lob. 454 b  
 Pyramidalis Lugd. 93  
 Pyra infana Czf. 167 b  
 Pirra Theoph. Guil. 466  
 Pyralis 439. Idzus Geln. 452 b  
 Pyretbrum ejusq. species 148  
 Brunf. 98. fyl. Dod. ibid. b.  
 alpinum Geln. 139 b  
 Pyrola ejusque species 191  
 Pyrum marium Ald. 369  
 Pyrus ejusq. species 438  
 Pifa unda Indica 399 b  
 Pium ejusq. species 342. cor-  
 datum Lobel. 343. Graco-  
 rum Trag. ibid. nigrum  
 Cam. 338 b. Tab. 343. fyl.  
 Trag. 344  
 Pifum Americanum Lugdun.  
 343 b. Indicum ejusq. spe-  
 cies ibid.  
 Piffaleon 504 b  
 Piffacia ejusque species 408  
 Piftana Magonis Plinij 1.0.  
 bel. 194  
 Pistolochia Fuchij 143 b. Do-  
 don. 307 b  
 Pitine Theoph. Ang. 345 b  
 Pitys ejusque species 419  
 Pitula ejusque species 192.  
 major 291  
 Pix 504. navalis ibid.  
 Pyracantha Dod. 478  
 Planta Banatica Clusij 246.  
 marina retiformis Clus. 366  
 b. sanguinem moveas 512  
 Plantula peregr. Clus. 418  
 Plantago ejusque species 189.  
 albidia Dodon. 190. maritima  
 ibid. b.  
 Plantago angustifolia ejusq.  
 species 189 b. aquatica ejus-  
 que species 190  
 Plantaginii similis Lugdun.  
 ibid. b.  
 Planta leonis Dod. gal. 186  
 Plantula cardamines emula  
 105  
 Platanaria Dod. 35  
 Platanus Theop. 437. aquatica  
 456 b. Oviedij 508. Lo. 431  
 b. Trag. 430  
 Platyphyllus 419  
 Plumbago Clus. 97 b. Plinij  
 quondam 101. Plinij  
 forte 192  
 Pnemonanthus Lob. 183 b  
 Podagraria Lob. 156  
 podagraria 178 b  
 Poonia ejusq. species 313. flo-  
 re pleno 124. Indica 343 b.  
 malcula Lon. 122 b. Gale-  
 ni 112  
 Polemonium Tab. ibid. pe-  
 trorum Geln. 105. alc. Dod.  
 165. palustre 279 b  
 Polemonium Montpel. Lob.  
 398 b  
 Polyacantha Cord. 38. Theo-  
 phrast.

- phrafi. Lugd. 381 b  
 Polyanthemum Ang. 178. p.  
 luitre Dod. gal. 180  
 Polycarpum Lugd. 18  
 Polycnemum Lugd. 339 b  
 Polygala ejusque species 215  
 legumen ejusque species 349  
 Polygala Ang. ibid. b. Gelfo.  
 350. Camer. 351. Cordi 351.  
 Lugd. 350  
 Polygonatum ejusque species  
 303. Tragi 304. b. 105  
 Polygonum ejusque species  
 181. baceiferum 15. cocti-  
 ferum Tab. ibid. femina  
 Matth. ibid. bederacum  
 Colum. 159. marium Ta-  
 bern. 15 b  
 Polygonum masculum fruti-  
 colum Thal. 184. quartum  
 Plinij Cluf. 15 b. Plinij Da-  
 lech. 212 b  
 Polypodium ejusque species  
 359. livenfe Lugd. ibid. b  
 Polypodium marinum Im-  
 per. 363 b  
 Polypremoo Lugd. 167 b  
 Polyrhizos Lugd. 311 b.  
 Plinij 186  
 Polyspermon Lob. 118  
 Polyricha Bellon. 490 b  
 Polyrichum aureum ejusque  
 species 356. Apuleij album  
 Lon 357 b. officinar. 356  
 Polium ejusque species 210.  
 Græcorum Col. 136 b. ma-  
 ritimum 121  
 Pomom Adami 437 b. para-  
 dyfi 107 b. 108 b  
 Pomom amoris Lob. 167 b  
 Hiericonicum Imper. 168  
 spinosum ibid.  
 Poneris 437 b  
 Ponrica nux 418  
 Populago Tab. 276 b  
 Populus ejusque species 429.  
 albae similes Cæf. 437  
 Porti corallio affines 437  
 Porrum ejusque species 7  
 Portulaca ejusque species 288.  
 aquatica 151 b. major 187.  
 marina Dodon. 120. 1011a  
 Brunf. 383  
 Portulaca arbor 450  
 Potamogeton ejusque species  
 193. Caloris 141  
 Potares 91  
 Potentilla herbariorum 331  
 prima Ang. 154. secunda  
 Ang. 163 b  
 Potentium ejusque species 388  
 Pothol Theveti 459  
 Potheos Theophr. 103 b. ex-  
 rules Lug. 301. Theophr.  
 quorundam 129  
 Poutiou 146 b  
 Prasiium Ang. 330 b  
 Priapeia Gelf. 170 b  
 Primula vers ejusque species  
 141. Cæf. 161 b. Brunf. 67  
 Præcocia 442 b  
 Procra 361  
 Proterpinaca Apul. 181  
 Prunella ejusque species 260  
 Prunus ejusque species 442.  
 Myrobalanus 444. sylvestr.  
 ibid. b  
 Pruno sylv. affinis Canaden-  
 sis 511 b  
 Prunus infusa 444  
 Prunidactyla 443  
 Pseudocactus cæruleus Tra-  
 gi Lugd. 31 b  
 Pseudognus Dod. 451  
 Pseudomomum Gelf. 455 b  
 Pseudopisus Matth. 344 b  
 Pseudopocynon 307 b  
 Pseudosiphodelus Cluf. 19 b  
 Pseudobunias Dod gal. 99  
 Pseudocapsicum Dod. 167  
 Pseudocamæboxus 471 b  
 Pseudocamæboxus Gelf. 149  
 Pseudocyperus Lob. 6. Thal.  
 ibid. b  
 Pseudocytisus Dod. 390  
 Pseudoclinopodium Matth. 335  
 Pseudocolocynthis Eyst. 314  
 Pseudocoronopus Dod. gal.  
 190  
 Pseudocostus Matth. 156 b  
 Pseudocrania Cordi. 447 b  
 Pseudodidymus Matth. 212  
 Pseudoeleborus Matth. 186  
 Pseudoeupatorium Dodon.  
 gal. 320  
 Pseudoniris Dod. 14 b  
 Pseudoleontopodium Mat-  
 thiol. 163 b  
 Pseudoligustrum Dod. 451  
 Pseudolysimachium Dodon.  
 245 b  
 Pseudolouchitis aspera Mat-  
 thiol. 359 b  
 Pseudomelanchium Matth.  
 104 b  
 Pseudomelilotus Cam. 331.  
 Pseudomyrrum Matth. 109  
 Pseudomyrrus Bellon. 469 b  
 Pseudomoly Lugd. 111  
 Pseudonardus Matth. 216  
 Pseudonardus ejusque spec.  
 91 51 b. gramineo folio 51 b  
 Pseudorachis Cluf. 84 b  
 Dod. 87  
 Pseudosymonotus Matth. 415  
 Pseudofructum Matth. 100  
 Pseudoturpetum 149 b  
 Psyllium ejusque species 191  
 Pispacia Belli 313 b  
 Pispelida Belli 313 b  
 Psarmica Matth. 98. altera

Matthiol. 172. moorana  
 Lugd. 185  
 Pteridion Cordi 358 b  
 Pteridion mæf. Cordi 358  
 Puchio Linf. 36 b  
 Pulegium ejusque species 211  
 aquaticum Eyst. 127 b  
 montanum Lon. 115.  
 petrum Gelf. ibid. syl. Do-  
 don. 128 b  
 Pulicaris herba Lugd. 191 b  
 Pulicaria Gazæ 165  
 Pulmonaria ejusque species  
 159. Gallica Lob. 129.  
 Gelfo. 322. minor Lugd.  
 158 b. Romana Cæf. 156.  
 Vegetij Gelfo. 185  
 Pulmonaria Matth. 361 b  
 Pulmo marinus Matth. 369  
 Pulsatilla ejusque species 177  
 Pamelæ quercinus 421  
 Pummuckooer 421.

**Q**uadrifolium pbæum  
 Lob. 317 b  
 Quamoclit 398 b  
 Quercilus frutex 403 b  
 Quercula 148  
 Quercus ejusque species 419.  
 excrementa 411. gallifera  
 410. lapidea 411  
 Quercus marina, Cluf. 366.  
 Lob. 365  
 Quinquefolium ejusque spe-  
 cies 315. album ibid. ere-  
 dum ibid. b. fragiferum  
 Tab. 316. luteum 315.  
 tuberosum 316 b  
 Quinua Cluf. 121.

**R**abaxit 111  
**R**adicula Dod. 96.  
 Imper. 106 b. sylv. 97  
 Radix Cæf. 96. china 196.  
 Carlo sancto 198 b. cava  
 Lob. 143 b. cava minima  
 Ger. 178 b. conra vene-  
 ra 14. conra yerva 14.  
 S. Helenæ ibid. 122a Col.  
 305. Ang. 470. Quimbai  
 198. Rhodia 185  
 Radices quibus lodi vescun-  
 tur 90. in Virginea 91  
 Ranunculus alpinum Cæf. 468 b  
 Ranunculus ejusque species  
 178. Aconiti folio 182. a-  
 quaticus Fuch. 180. arvo-  
 rum Lugd. 79 b. Asiaticus  
 Cluf. 181. Asphodeli ra-  
 dice ibid. b  
 Ranunc. bulbosus Lob. 179  
 Creticus 181. echinatus  
 179 b. 180. flammæus Lob.  
 ibid. b. fenniculatus Col.  
 141 b. fl. globosus Dod. 182 b

Ran. grumosa radice ejusque  
 species 179. lanceolatus  
 Tab. 180 b. lanuginosus  
 181. latifol. Lugd. 309 b.  
 longifolius 180 b. Lufita-  
 nicus 181 b.  
 Ran. montanus 180 b. ejusque  
 species 181 b. nemorosus  
 176 b. nemorum Lugd. 177. 178.  
 palustris 180. phragmitis  
 178. pratensis 178. laxatilis  
 181 b. tuberosus Dod. 179  
 Rapa ejusque species 189  
 Rapa brassica 111  
 Raphanus ejusque species 96  
 aquaticus 97. major ibid.  
 rusticus 96 b. Lob. 97.  
 sylv. Cord. 95. Lob. 97  
 Rapistrum ejusque species 95.  
 aquaticum Tab. 97 b. sylv.  
 Ironis folio Col. 101 b  
 Rapum Americanum 90.  
 Brasilianum ibid. genifitæ  
 87. sylv. Matth. 90 b  
 Rapunculus ejusque species  
 91. aiopceuroides Cluf. ib.  
 corniculatus Col. ibid. b.  
 bortenſis Trag. 155. nemo-  
 rosus 93. spicatus 92. um-  
 bellatus Thal. ibid.  
 Rapuntium umbellatum  
 Col. 187  
 Rattiak 113 b  
 Regina prati Dod. 46 b  
 Releda ejusque species 100.  
 lapidea ibid. b.  
 Releda maritima 365 b  
 Resina ejusque species 100.  
 laricea ibid. b. sicca 104 b  
 Resina bovis ejusque species 108  
 Resula 366 b  
 Rha ejusque species 116  
 Rhubarbarum ibid. Indicum  
 197 b. monachorum Tia-  
 gi 115 b  
 Rhagadiolus Cæf. 128  
 Rhamnus ejusque species 477.  
 ternus Diof. Lob. 454 b  
 Rhamnium 116. 117.  
 Rhabar Lugd. 307 b  
 Rhizotomus Plinij 38  
 Rhodocina 440  
 Rhododaphne Cæf. 464  
 Rhododendron Diof. 464.  
 alpinum Cæf. 468 b  
 Rhodora Plinij 163  
 Rhubarbionis 431 b  
 Rhus ejusque species 414.  
 coriariorum Cæfalp. 429.  
 herba Plinij Cluf. 414 b  
 Rhus myrsinif. Plin. 471 b.  
 Plinij minor 470 b. Vir-  
 ginianum 511 b  
 Ribes ejusque species 455.  
 Serap. Cæfalp. 454 b. Ca-  
 mer. 455 b  
 Rici.

Ricinus ejusq. species	431	Sagapenum Gefn.	156.	la-	Sargazo Lugd.	365	Scolopendria Trag.	354.	le-
Americanus folio	431	ficus	494 b	ryma	Sari Theophrast.	19.	Indorum	359.	guminoſa 349. major Lon.
51 b		Sagei amener	431	246 b	Saleni	99 b	Scoparia	359.	vulgar.
Rima maria Ang.	110	Sagitta ejusq. species	194		Sallitica Italorum	374 b	Scopa regia 98 b.	Plinij Da-	
Ritro Theoph. Lob.	381 b	Saga	504		Sallaſtras	431	lech.	131 b.	238
Robur ejusque species	420	Sahang	411		Sallitragia Indica	ibid.	Scordium ejusq. species	247.	
Robur	11 b	Salicia Gefn.	245		Sarcyrium Cæſal.	40 b.	alterum Plinij 238.	major	
Roccella Imper.	365 b.	Salicastrum Plinij	297 b.		cum 85. caſtrum 86. eri-		Plin. Gefn.	248	
Cardan.	451	Plinij Czſ.	167		thronium 44. erythron-		Scordonia Plin. Belli	248 b	
Rogga ejusq. species	23	Salicornia	289 b		Lob.	87	Scorodonia Thal.	247 b	
Rola ejusque species	480.	Saliuoca	165		Saryium mas 81 b. 82.		Scorodoprafum	74	
alpina Gefn. 466 b.	468 b.	Salix ejusque species	473.	A-	brum Brunſ. 87 a. b. pri-		Scorpioides ejusq. species	287	
Hiericonth. 484	Hieric.	merina Amat. 473 b.	Mat-		mum Brunſ. 80. octavum		aquaticum Gefn.	254.	al-
Frago. 276 b.	molcara	thbin. 475. Plinij 473.	Helic-		Trag. 186 b. trifolium Do-		album Gefn. 253. legumino-		
482. pomifera 484.	Sper-	Lugdun. 365 b. Sabina Co-			don. 45 b. Dioſc. 57. Fuch.		ſa Lob.	350 b	
monia Plin. 483. b.	sub-	lumel.	473 b		83. Lugd. 87 b. trifolium		Scorpius ejusque species	354.	
viridis	482 b				Matth.	374 b	maſtitum	15 b	
Rofa fylv. ejusq. species	482	Salix pumila ejusque species			Sactyrium ntrunq. Matth.	85	Scorzonera ejusq. species	275.	
Rofa Indica Gefn. 132.	Jun-	474 b			Satureia ejusque species	218	quarta Cluſ.	129	
nonus 76. mariana 203 b.	205	Sallaparilla	291		lutea Lugd.	234 b	Scoratum	419	
Rofa græca Plinij	203 b	Sallola Czſ.	289		Savina fylv. Tragi	360 b	Scrophularia ejusque species		
Ros Liban.	497	ſalvia ejusque species	237.	a-	Saxifraga tertia Matth. 249 b.		Ang. 282 b. quorundam		
Rosmarinum fylv.	415 b	236. Trag. 247 b. montana			terna Czſ. 113 b. terra Co-		not Brunſ.	309	
Matth.	467 b	Gef.	248		lum. 251 b. Anglica 281. an-		ſcutellaria	237 b	
Rofmarinus 217. ferulaceus		Salvia vitæ Lob.	358 b		tiqorum 211. aurea 309 b		Sebeſten	444	
Ad. 158. Theoph. Ang. 177		Samaia fructus	436		Saxifraga alba rotundifolia		Secacel Arabum Lugd.	155 b.	
Ros Solis ejusq. species	357	sambae	397. 398 b		309. Fuch. 356. prima Mai-		182 b.	quorundam	
Roftrum portinum	116 b	sambaya	36 b		thiol. 218 b. magna Matth.		male	303	
Rora	28 b	sambaranae	393 b		211. terra Brunſ. 218. al-		ſecale ejusque species	23	
Rubella tinctorum	364 b	Sambucus ejusq. species	456		tera Czſ.	333 b	ſecali mater	ibid. b	
Rubeola ejusq. species	334 b	Samolus Plinij	252 b. 471 b		Saxifraga montana Gef. 322		Seamonea Alpin.	303	
Rubea ejusque species	333	samparantoo	399 b		lutea Gefneri 336. lute.		Seamonea Alpin.	303	
marina Lob. 334. piceata		Samplicus ejusque species			Fuch.	331	ſedum ejusque species	284.	
ibid. Virginea ibid. b.		214			Saxif. Pannonica 150. petræa		alpinum ejusque species	125.	
Rubus ejusque species	479.	Sanamunda 278 b 321.	Cluſ		Pong 182 b. pimpinella 159.		Sedum aquatile 246 b.	Madag-	
canis tur.	483	Sana ſancta	269		Romanorum Lugd. 101.		galcaricum 283. paluſtre		
Rubus Idæus non ſpicuolus		Sandalia tement Czſ.	343		rubra Tab. 65 b. Brunſ. 266.		Cluſ.	205 b	
326		Sandalia tement Czſ.	343		rubra Thal.	315	Sedum folijs laciniaſis ejusq.		
Roeula marina Trag.	98	Sandalida Cretica	332 b		Scabioſa ejusque species	269.	ſpecies 284 b. minus ejusq.		
Rumex ejusque species	115	Sandaraba Ariſtot.	500 b		alpina Lob. 270. arvenſis		ſpecies 283. petræum Pon.		
Ruticus 470. fylv.	415 b	Sandarax	ibid.		269. capitulo globuloſo 270		277 b		
Rufco affinis Czſ.	303 b	Sanguen Czſ.	447 b		b. folio ſciſſo Czſalp. 269.		Sedum ſerratatum ejusq.		
Rura bacicifera Tab.	398 b.	Sanguinalis mas Cord.	281		montana 270. ovilla 92 b.		ſcies	285	
canina L. ob.	236 b	ſceminia Cord.	16		pratensis 269. prolifera 270		ſciſſifera	473	
Ruta capraria Tab.	352.	Sanguinaria Trag.	271		illeſita	271	Selago Plinij ejus species	360	
lunaria Tab. 354 b. mu-		Sanguiforba	160		Scammonæa ejusque species		b. Plinij Czſ. 284. quibuſ.		
rraria Dod.	356 b	Sanguis draconis herba	255.		294. minor Plinij Tab. 295		dam 485. Guil. 486. Lu-		
Ruta ejusque species	336.	officin	459		b. parva Cam. 294 b. Para-		ibid.		
hypericoides	280 b	Sanicula alba Gef. 322. officii			vina	295 b	Selinum 153. montanum Clu-		
Ruta pratensis ejusque species	336.	na 319. ſceminia Fuch.	286		Scammoneum luteus 295 b		ſij	150	
Ruta fylv. Dioſc. 379 b. fylv.		Sanicula alpina ejusq. species			Scandix ejusque species	151.	ſclerays	243	
Czſ. 336. alt. Czſ.	337 b	242			153		Semen Canarienſe 128. Con-		
Ruthrum alterum Lugd.	381.	Sanicula rotundifolia ejusq.			Scandola 125. fylv. Ang.	224	giamum 27. ſanctum 139 b		
		species	243 b		ſclerata Apuleij	139 b	280 Semenina	139 b	
		Santalum ejusq. species	392.		Scheha Arabum	476	ſemperivum ejusque species		
		cineciolum 393. rubrum ib.			Schenna Græc.	72 b	ſciſſa 182. tertium Dioſcor.		
		Santolina Dod.	136 b. 137		Scheenaprafum	72 b	Col.	285 b	
		Santonium Cord.	136 b		Schvva den	8	Sempia	366 b	
		Sapinus Bellon.	493		Scilla ejusque species	73	Sena Ruellij 396. vera	397	
		Saponaria ejusq. species	206.		Scirpus Trag. 7. Indicus	22.	ſeneio ejusq. species	131	
		de concava ibid. b. minor			major	ibid.	ſenecio carduus Col.	130 b	
		Lugd.	ibid.		ſclarea Matth.	238	ſenis 479. canis	483	
		Sapumener	421		Scolymus ejusq. species	383.	ſerapius Dioſc. 81. barracini-		
		Sarcocolla	498		Dioſ. Lugd. 383 b. Theophr.	11	ti 85 b. minus	86	
		Sarcophago	97 b		Cluſ.	384	Serapium officina.	156	
							Seri-		

S Abdariffa  
Sabina ejusq. species  
Sabucate  
Sabanhpute  
Saecharum albus 116.  
Mambu  
Saeccolaa  
Sarcemimemor  
Saffaf Syroium

- Serica* 444  
*Sericeum* 416 b  
*Serifolia Frago.* 435 b  
*Scrophium Diof.* 1. Lob. 137 b  
*Getman. Trag.* 105 b  
*Seriola* 125  
*Seris Diof. ib. longifolia* 130  
*Ser montanum Czf.* 165 b  
*Serpentina Fuch.* 129. Brunf. 309. *foetida Fuch.* 192.  
*major Lugd.* 194 b. *minor* 195 b  
*Serpentina Dod.* 190 b  
*Serpyllum ejusq. species* 120.  
*hortense* 219  
*Serpyllum acinarum* 476 b  
*Serratula* 238  
*Sertula campana Matth.* 331  
*Sertularia Imper.* 364  
*Sesamoides majus & minus* Lugd. 463 b  
*Sesamum verum* 27. Tra. 109  
*Sesban Alpini* 352  
*Sesamoides magnum Lacun.* 100. Lobel. 185. *Salmantica Cluf.* 206  
*Sesamoides parvum* 100 b.  
*Cord.* 186. *Marthiol.* 130 b.  
*Diof.* Lob. *ibid.*  
*Seseli ejusque species* 151. *athiopium Matth.* 157. *Czf.* 177. *Creticum* 148. *Castibene* Marth. 151 b. *aliud* 161.  
*Seseli palustre Cam. ibid.* *polypodiaceum Lob.* 148.  
*Fuchij* 150. *Ang.* 160. *Marthiol.* 161  
*Seutolmalache* 115  
*Seutolaparthum* *ibid.*  
*Seutolaphyllum* 118  
*Sferro cavallo Gef.* 349  
*Sycamine Theoph.* 459  
*Sycaminodes Theoph.* 422  
*Siciliana* 250 b  
*Sycomoros ejusque species* 459. *Italic.* 415. *Ruel.* 430 b  
*Sida Theoph.* 306 b  
*Sideritis ejusque species* 233.  
*prima Matth.* 230. *secunda Marthiol.* Lugd. 232 b. 233 b.  
*tertia Matth.* 232 b. 136. *Angul.* 319  
*Sideritis secunda Diof.* Col. 160 b. *Czf.* 236 b. *tertia Diof.* Col. 319  
*Sideritis prima Thalij* 136 b.  
*eximia Thal.* 246 b. *Heraclida Diof.* Col. 232 b. *Czf.* 233. *Fracast.* 238. *montana Lob.* 233 b  
*Sideritis latissima Fuch.* 98 b.  
*harissima Plinij Gesf.* 119.  
*Monspeli.* 236 b. *pratensis Lugd.* 234 b.  
*sigillum Maris Czf.* 187.
- Dodon.* 297  
*Sigillum Salomonis ejusque species* 303. *Czf.* 186 b  
*Silaum Plinij Ang.* 154. *Czf.* 161. *forte* 162 b  
*Silene Theoph.* Aldroa. 205 b  
*Siler montanum Lobel.* 162.  
*officin. Ger.* 161 b. *Creticum Cam.* 162 b. *pratense Dod.* *ibid.*  
*Siler Plinij Czf.* 422 a. *Lugd.* 422 b. *arbor Ang.* 474  
*Silybum Lob.* 381. *Lugd.* 381  
*Siligo Lob.* 21. *Trag.* 23. *Turcica* 22 b  
*Silqua Theoph.* Tragi 339  
*Silqua arbor ejusque species* 402. *Indica* 403  
*Silquastrum Bellon.* 402  
*Silquastrum ejusque species* 102  
*Silphium Diof.* 156  
*Silphium succus* 499  
*Symphitum ejusque species* 259. *petraeum Thalij* 211.  
*Lob.* 260 b. *terrtum Taber.* 1. & 2. *Tab.* 268 b  
*Symphitum petraeum Marthiol.* 220  
*Symphitum maculosum ejusque species* 259  
*Symphonia Plinij* 121 b  
*Synanchia Lugd.* 333 b. 334  
*Sinapi ejusque species* 99. *agreste Trag.* 95. *albi Lugd.* 112. *echinatum Lugd.* 99 b. *pamulum alpini Cluf.* 105. *sylv. Fuch.* 100 b  
*Sinapi & Thlaspi media provinciali planta* 109 b  
*Sion Crataev.* 104 b. *Fuchij* 252 b. *ejusque species* 254  
*Syphonium Tab.* 9 b  
*Sippo Brasilian.* 298 b  
*Syringa ejusque species* 398.  
*lacinia folijs* 476  
*Syrinx Lob.* 17 b  
*Sisium ejusque species* 155.  
*Persuanum Tab.* 91 b  
*Siser Matth.* 151 b. *palustre Lugd.* 163  
*Sison Diof.* 154. *Lon.* 161  
*Sisymbrium Matth.* 228. *cardamine Lugdun.* 104. *sylv. Czf.* 97 b  
*Sisymbria mentha Lob.* 227. *Gerar.* 228.  
*Sisymbrium ejusque species* 40. *Cord.* 71  
*Smilax aspera ejusque species* 295  
*Smilax arbor Lugd.* 245. *Ca.* 505 b  
*flor.*  
*Smilax hortensis ejusque species* 295
- Smilax levis ejusque species* 294  
*Smyrniolum Matth.* 154. *Cord.* 155. *Fuch.* 128 b  
*Soda Lob.* 289. *Cam.* 316 b  
*Sodouwaya* 246 b  
*Solaris herba Garze* 253  
*Sol Indianus Lon.* 276 b  
*Solanum ejusque species* 166.  
*bacciferum ibid.* b. *Mexicanum* 162 b. *spinosum* 167  
*b.* 168. *tuberolum* 167  
*Solanum pomiferum ejusque species* *ibid.* *peregrinum Lac.* 343. *terraphyllum* 1. *obel.* 167. *triphylla* *ibid.*  
*Soldanella ejusque species* 295  
*Solea equina Lugd.* 349  
*Solidago Brant.* 261. *Ang.* 261  
*Sarracenia Lon.* 235. *alia Trag.* 246. *tertia Trag.* 266 b  
*Solitoria Thal.* 357  
*Sonchus ejusque species* 213.  
*arborescens ibid.* b. *asper* 124. *lævis ibid.* *lanxus Dalech.* 224 b  
*Sonchus montanus ejusque species* 124 b  
*Sonchas villosus ejusque species* *ibid.*  
*Sophora Alpini* 352  
*Sophia chirurgorum* 105 b  
*Sora potus* 25 b  
*Sorbus ejusque species* 415. *alpina Gesf.* 452. *aculeata* 454 b. *terminalis Gallor.* 451. *tormin.* *Lob.* 454  
*Sorgha* 266 b  
*Sparganium Dod.* 12 b. *ejusque species* 15. *Ruell.* 395  
*Placz* 69 b  
*Spartium ejusque species* 396.  
*Advers.* 395  
*Spartum Plinij s. aphyllon Lugd.* 394 b  
*Sparha* 506  
*Spatulæ foetida* 30  
*Speculum Veneris* 215 b  
*Spelra Czf.* 215. *Trag.* 221  
*Spergula ejusque species* 255  
*Sphecelus Guil.* 236. *quorundam* 238 b. *sylvest.* 247 b.  
*Theoph.* 237  
*Sphærinis* 273 b  
*Spagnum Plinij* 422 b  
*Sphærinæ japonariz* 511  
*Sphoodilium ejusque species* 157  
*Spica celtica* 265. *Indica* 23. *Indica sylv.* 226  
*Spicanti vulgo* 259  
*Spica nardus* 216  
*Spina acaciz Lob.* 392. *acida* 454. *alba Czf.* 381 b. *Fuch.* 381. *Dalech.* 386. *Lob.* 382. *Lon.* 478 b. *Marth.* 381
- Spina Arabica Czf.* 381. *Dodon.* 381 b. *Lugd.* 381. *ceruina* 478 b. *Christi Czf.* 394. *hirti* 388  
*Spina appendix Plinij* 454 b  
*Spina infectoria* 474 b. *Judeica* 478. *Lasinorum* 454 b. *Marraca* 472 b. *regia Theophrast.* 387 b  
*Spina felinitis Theoph.* *Lugd.* 386. *solistialis* *Lob.* 387 b. *solist.* *altera* 272  
*Spinachia* 114 b  
*Spinastella Tab.* 387 b  
*Spin merlo Cast.* 478 b  
*Spizra Theoph.* 475. *Lugd.* 429  
*Spini vineta* 414  
*Spit Czf.* 248  
*Spongia ejusque species* 368. *in rosis* 483  
*Sponia Solis Thal.* 357  
*Spuma maris Czf.* 368 b  
*Squamia* 88 b  
*Squianthum* 11  
*Stachys ejusque species* 236.  
*spinola ibid.* b. *Ang.* 216 b.  
*Plinij* 238 b  
*Stacta* 502  
*Staphylinus Trag.* 151  
*Staphylindendrum Plin.* 401 b  
*Staphys agria* 224  
*Stactæ Lugd.* 221  
*Stelephorus Theoph.* 4  
*Stella viscum* 505  
*Stella leguminosa Lob.* 350 b  
*Stellaria Lugd.* 251. *aquatica Lob.* 241 b. *argentea Camer.* 246 b. *Brunf.* 334. *Marthiol.* 320  
*Sternutamentaria Lob.* 98  
*Stryax ejusque species* 452. *laccryms* 502. *liquida* *ibid.* b.  
*Storax ejusque species* 273. *capitata* 271. *Salmantica* 272. *Theoph.* *Lugd.* 194 b  
*Storax Diofcor.* *Bellon.* 382 b.  
*Theoph.* *Czf.* 387  
*Strochias Arabica* 216. *clisma* 264  
*Storax* 502  
*Stramonia* 162  
*Siratotes* 140. *potamios Dod.* *don. gal.* 286 b  
*Stratiotes Diof.* *Alpin.* 362 b. *aquatica Czf.* *ibid.*  
*Strychnodendron Lob.* 166 b  
*Strychnon.* *vide Solanum.*  
*Strumaria Lob.* 198 b  
*Struthium Lacun.* 100. *Cord.* 156. *quorundam* 165. *Fuch.* 206  
*Struthiopteris Cordi* 359.  
*Thal.* 358  
*Suber ejusque species* 424  
*Succia ejusque species* *Marthiol.*

diol. 149. tertia Trag. 127 b.	Ternaria Tab. 126 b.	Typha ejusq; species 10. Dio-	330 b. capitulo spumoso
Succidus Avic. 116 b.	Teiræ glandes Lob. 344 b.	lor. 4 b. cerealis Dod. gal.	330. cetrinum 312 b.
Succus Cyrenaisius 499 b.	Testiculus canis 80 b. hirci-	21 b. Portæ 23	Trifolium cochlearium ejusq;
Succi exotici 497 b. planta-	82 b. mulcarius 83. vnl.	Tiphium Theoph. 197	species 339. cochlearium c.
rum 493	pinus 82 b. 83	Tii Linfcoi 310 b.	chinium ibid. b. cornicu-
Sudar Serap. 477	Tetragnonia Theoph. 428	Tithymalus ejusq; spec. 190	larium Dod. 331. 332
Sultan Zambach 76	Tetrabit Lob. 133	amygdalus ibid. characias	Trifolium falcatum Cluf. 330
Sumach 414	Tetrorchis 124 b.	ibid. cyprissus 191 b. den-	frutrum Tab. 317. fragile-
Sumeg Egypt. 145 b.	Teucrium ejusq; species 147.	droides 190 b. bellioleopius	rum Clu. 339. globosum ib.
Superba 109 b. 110	alpinum 124 b. pratense	191 a. b. latifolius 191. luti-	Trifolium hepaticum ejusq;
Suturan 196 b.	Lob. 149 b. Trag. 146. 147	folius 191. leptophyllus ib.	species 330 b. maritimum
Sura liquor 509	Thaliditum ejusq; species 336	b. lunata flore 190 b. ma-	Czislip. 339
Surdæ nuces 417.	Thaliditum Tab. 105 b.	ritum 191. syl. Lon. 307.	Trifolium montanum ejusq;
	Thaumetum Cord. 104 b.	verrucosus Lugd. 191	species 338. oculatum Ang.
	Thapsia ejusque species 148.	Tithymalus tuberosus ejusq;	331 b. odoratum Dod. 331.
T. 127 b. Asclepiadis Ang. 333	species 192	species 192	Fuch. ibid. b.
Tabacum Monard. 169	Thapsus barbatus 139	Tocoi Guebir 430	Trifolium pratense ejusque
Tabaxir 18	Thelgion affinis Czislip. 309	Tokann 310 b.	species 337. palustre Dod.
Tac arbor 418 b.	Theobromum Plinij 111 b.	Tomas gran. 109 b.	ibid. petraum 339
Tacamaea 430 b. 103 b.	Thiliseria Theoph. 447 b.	Tomonque radix 37 b.	Trifolium spicatum ejusque
Tacori 506 b.	Thymelæa Ang. 461. Matth.	Tomentum Cord. 126	species 338 b. spinosum 330.
Tagari radix 91 b.	463. Trag. 461. minor Cor-	Tora Gef. 184	stellatum 339. vesicarium
Tagetes India Fuch. 133	di 463	Tordylion Cord. 148. Lob. 161	332 b.
Tal Lugd. 19	Thuya 488. quarta Lugd. 487	Tormentilla ejusq; spec. 316	Trifolium frutescens Dod. 398 b.
Tala Arriano 418	Thalpidium cornutum Tra-	Torna bona Czislip. 169 b.	Triacatella Cam. 126 b.
Talassie 196	gi 110	Tota bona Lob. 115 b.	Trinias Matth. 324 b.
Talissaf Avic. 408	Thalpi ejusque species 105.	Toucon Brasileen. 360 b.	Trionum Theoph. 317 b.
Tamajo 478	Alexandrinum 108 b. alter-	Trachelium ejusq; species 94.	Triorechis 83. lueta 82 b.
Tamalabathrum 410	rum Diofcor. 96 b. alterum	giganteum 95. petreum	Trifolium ejusq; species 167.
Tamar 509	Craievz 103. alpinum 107	Ponz 93 b. 94 b. thyrifoi-	Diofcor. 149
Tamaraka 461 b.	Thalpi Alyfion ejusq; species	des Cluf. 154 b.	Triffago Matth. 128
Tamarindus 403	ibid. amarum 106. arve nle	Tragacanth 388. lacryma 498	Trincofepelum 33
Tamariscus ejusq; spec. 424	laris filiquis 105	Tragium Gef. 15 b. L'ed. 122	Triticum ejusque species 21.
Tamarum Czislip. 197	Thalpi cypreus ejusq; species	b. Crenicum Bellon. 180 b.	amylæum 21. baccharium
Tamus Gels. ibid.	107 b. Creicum 106 b.	Diofcor. Col. 160. alterum	25. Indicum. ibid. marium
Tamato 479	Thalpi farum 101. hederac-	Diof. Lugd. 116 b. Germa-	Dod. 9. syl. Czislip. 10. temu-
Tanaceium ejusq; species 131.	ceum Lob. ibid. b. incanum	nium Dod. gal. 119 b.	lentum Lob. 9
Africanum ib. Peruanum	Lob. 108 b.	Tragum ejusque species 189.	Trition vaccinum Trag. 354
Cord. 133. album Trag. 98.	Thalpi fruticulum ejusque	vulgare Cluf. 98. cereale	Trizago 138 b. Col. 149 b. pa-
agreste Brunsf. 321. lanugi-	species 108. majus 97. mi-	Trag. 12 b.	lustræ Ad. 147
nosum Lugd. 141	nus 105 b.	Tragus Lob. 15 b. herba Cor-	Trollius flos Gef. 181 b.
Taraxacon 126 b.	Thalpi montanum 105. 106 b.	di 183	Trombas 19
Taraxon 98	Gef. 103. persulatum 106	Tragopogon ejusque species	Trumgiba 497
Tarconraie Lob. 463 b.	Thalpi saxatile 107. spinos-	174	Tsinavv radix 92
Tarum Cordi 393 b.	us 106. vaccaria folio 105	Tragorchis 82 b.	Tubak & Tubacka 169
Tarupara 126 b.	b. 106. villosum 106. Ve-	Tragorignum ejusq; species	Tuba amoris Trag. 176 b.
Taravia 117	ronice folio 108 b.	113. Clu. 122. nothum Lug-	Tuberaria major Lugd. 465
Tiula Guil. 168	Thalpi umbellatum ejusque	dun. 155 b. prallidus 133.	Tuber Phoy Cxl. 416. Cord.
Taura Gef. 354	species 106	Tragofelinum Tab. 139. 140	446 b.
Taxus 101	Thymbra ejusq; species 118	Tragostrophon Dod. gal. 17 b.	Tupha 441
Teda arbor 491 b. Tab. 492 b.	Thymus ejusque species 119.	Tranibibil 497	Tubuli ad asthma 19
Tegname 452	latifolium 120. nigrum	Trati Manib. 14 b.	Tucro 148 b.
Tephium ejusq; species 127	Taber. 119 b.	Traupalus Theoph. 416	Tulipa ejusque species 56. A.
Lac. 110. Diofcor. 118. macu-	Thymum magnum Alp. 123 b.	Tremula Linn. 419 b.	penica 63 b. buiferia 61.
losum Cam. ibid. Diofcor.	Thysellum Plinij Lob. 113 b.	Trec 499	dubia 62. fere pleno ibid.
Col. 480 b.	Thyracine Galea 123 b.	Tribulus aquarius 124. mi-	63. filij. vacanth. 60. min. 63
Telephylleum Craievz 127 b.	Thus terræ 129	noi Cluf. 193 b. maritimus	Tulipa picea ejusq; species
Tembul 410	Thut 901. Judæcrum 452 b.	Lugd. 128 b. sylv. Lon. 112	57. pumilio 63. rufola 61
Terebinthus ejusque species	Thurn arbor 399	b. terrestris Matthiol. 350.	Tulipa serotina ejusq; species
400. India 401	Tianco fructus 407	Lugd. 319. 330	60 b. varij coloris 57 b. vi-
Terebinthina Veneta officin.	Tibead 43 b.	Trichomanes ejusq; species	rida 61
105. vera 500	Tigridis flos Lob. 48 b.	356	Tumale Guil. 167 b.
Ternabin 496 b.	Tilia ejusq; species 426. 428	Trifolium ejusq; species 317.	Tunal 418
Terracrepola Lugdun. 120 b.	Matth. 427	acerolium 330. alpinum Pon-	Tunica minima Lugd. 111 b.
Czislip. 124 b.	Tinctorius flos Trag. 127	noz 318. Americum 337 b.	Tunc h. uera Ad. 418
Terra merita 37	Tinios 461	alphakites 327. aureum	Tuone 481 b.
Teruola Czislip. 14 b.			





# ERRATA

Pagina 2. lin. 5. Thab. lege Tab. p. 8. l. 37. SORGHINUM. p. 11. b. l. 36. altera. p. 17. l. 7. Plutarcho. p. 19. b. l. 9.  
 Acorum. p. 12. a. l. 14. Tragus. ſive Olyra. p. 13. b. l. 13. hiſt. 7. p. 14. a. l. 39. Triticum. p. 36. l. 18. Actua-  
 rius. p. 37. a. l. 15. Coſtuz. p. 46. a. l. 39. Gallacia. p. 48. b. l. i. eriophorus. p. 71. b. l. 9. lutei. p. 78. a.  
 l. 18. punſatum. p. 93. b. l. 11. Rapunculus. p. 106. a. l. 4. Craievz. p. 113. l. 19. LAPATIUM. p. 114. a.  
 l. 3. lapathum. p. 119. l. 4. zurcum. p. 146. a. l. 41. noia. p. 150. l. i. Rapbylino. p. 169. b. l. 41. quia. p. 191.  
 l. 6. Coronopo. p. 193. a. l. 43. primz. p. 216. b. l. 18. ferratz. p. 218. b. l. i. conferia. p. 220. l. 33. Pium.  
 p. 221. b. l. 45. birca. p. 237. b. l. 18. legimus. p. 251. a. l. 41. delectus. p. 288. a. l. 13. Keſum. p. 295. a. l. 5.  
 Orobanche. p. 305. b. l. 16. huic. p. 306. l. 4. Chamzelema. p. 330. a. l. 15. corduta. p. 334. b. l. 10. ſuxa-  
 rila. p. 344. l. 37. legumen. p. 369. l. 5. pungat. p. 372. b. l. 14. ſalignus. p. 395. l. 38. in carne. p. 411. b.  
 l. 17. radicez. p. 431. l. ultim. gracilium. gravidarumque. p. 446. l. 13. coepere. p. 473. l. 14. vinearum.  
 pag. 489. Lat. Ormigiom. Hujus. Hæc ſunt, Lector benevole, ſphalmata, quæ ſenſum turbare po-  
 tuiſſent. Leviora facile condonabis.



2.  
CASPARI BAVHINI  
VIRI CLARISS.

Π Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Σ

*Theatri Botanici*

IN QVO  
PLANTÆ SUPRA SEXCENTÆ  
*ab ipso primum descriptæ  
cum plurimis figuris  
proponuntur.*

Editio altera emendatior.



BASILEÆ

---

IMPENSIS IOANNIS REGIS,  
A. C. clb lxxi.

# AD MEDICINÆ STUDIOſOS.



**D**IGNA ſane eſt, CANDIDE Lector, Galeni i. de Antidotis ꝑ. ſententia, quæ ab omnibus Medicis perpendatur. Medicus ait omnium **STIRPIUM**, ſi fieri poſſit, peritiam habeat, conſulo, ſi minus, plurium ſaltem quibus frequenter utimur. Nam qui ſtudio Medico operam dare in animo habet, nil in artis operibus laude digni præſtabit, ſi **HERBARUM** cognitione deſtituatur: tam enim medico neceſſaria ſunt *ὡς ὅτε εἴηται αἰνὰ γὰρ τῶν τῆς ἰατρικῆς ἐργῶν*, ut Oribaſius ſcribit: ſiquidem partem Medicinæ potiſſimam ſemper complexa ſit: Homeri Scholiaſta *ἢ ἀρχαία ἰατρικὴ ἐν βοτάναις* ¶ ſeu ut Seneca, Medicina quondam paucarum herbarum ſcientia fuit. Et apud Plutarchum Tryphon aſſerit, Chironem & Cadmum Agenorideni, qui duo primi Medicinam exercuiſſe credebantur, ægros ſuos ſolis herbis & radicibus ſanaſſe. Sic cum Eurypylus apud Homerum ab Alexandro ſagitta ſauciatus fuiſſet, vulnus ejus Patroclus ita curavit.

*αἱμαὶ κελευθὸν  
Νίτ' ὕδατι λιαροῖ, ὅτ' ἂν ῥίζαν βάλῃ πικρὴν  
Χερσὶ διατρίψας ὁ δ' ὠκράτῃ.*

Hæc & ſimilia mecum perpendens, nunc ab annis quadraginta quatuor, ſtudio Botanicum, ea qua fieri potuit diligentia excolui, nullis laboribus, nullis ſumptibus parcens, ne quidem moleſtas peregrinationes intermittens, quo & plantarum cognitionem, quantum fieri humanitus licet, ſolidam mihi compararem: eaſdem colligerem & collectas aſſervarem, & cum authorum deſcriptionibus conferrem: unde factum, ut domi meæ in horto meo ſicco ſupra quatuor millia Plantarum demonſtrare poſſim, quod quam plurimi & Doctores & Studioſi diverſarum nationum teſtari poterunt, ut qui eas ſingulas, à me ipſis demonſtratas, uti frequenter ſoleo, viderint. Et ad huius fidam cognitionem Authores etiam conſulè diſcere, quare omnes quotquot hæcenus habere potui, qui de herbis ſcripſere, ut & Florilegia, mihi comparavi. At quia non omnis fert omnia tellus, infinitis literis ad clariffimos viros datis, ut alibi plenius, ſuppellectilem meam Herbariam auxi, & ex ipſorum literis non pauca ad rem facientia cognovi. Quare ne talentum à Domino mihi concreditum deſoderem, ſed Spartam quam naſcuſum exornarem, ante annos viginti quatuor, in juvenum gratiam Phytopinacis partem primam propoſuimus, in quo plantas ſparſum ab authoribus deſcriptas, certa metho do propoſuimus, & quidem ſupra bis mille & circiter quingentas: cujus libri exemplaria cum fuerint vendita & diſtracta, proxime ſi Deus volet, Pinacem Theatri noſtri Botanici, qui loco Phytopinacis erit, dabimus, una cum ſynonymiis herbarum ſupra quinq; millium, convenienti metho diſpoſitarū, quo eo Studioſi in Herbationibus uti poſſint. Sic & Matthiolum emaculatum cum ſynonymiis & multarum novarum Plantarum auctario, ante annos viginti duos dedimus: &

ante

ante annos novendecim in historiam Lugduni suppresso nomine editam, animadversiones scripsimus: & ante septennium Tabernamontanus, plurimis & plantis & medicamentis additis locupletior redditus, excusus fuit. Nunc vero **PRODRUM THEATRI** nostri **BOTANICI** damus, in quo supra sexcentæ plantæ à me primum descriptæ, exhibentur: & licet earum aliquæ apud C. Clusium, & nobiliss. Fabium Columnam Lynceum, & perpaucæ in horto Eystadiensi reperiantur, nostris tamen adjecimus, quia eas in supra dictis libris, antequam horum scripta prodirent, descripsimus: Figuras quas sculpi curavimus, tot quot ad manus fuere jam absolutæ adjecimus, sperantes futurum, ut & reliquæ **THEATRO** addendæ, sculpanitur. Hoc labore nostro, juvandi studio instituto, utere, donec Theatrum nostrum Botanicum accipias. Nam cum & Johannis Bauhini Illust. Ducis Wirtembergici Archiatri, fratris mei pie defuncti, opus præclarum sub prælo sit: & etiamnum Romæ, historiæ plantarum Mexiocanarum cum figuris excudatur, & ad medium absoluta sit, ut ex literis clariss. Fabii Columnæ cognovi, hæc opera expectare animus est, quo, si Deus volet, in Theatro nostro, & uno volumine omnes omnium plantarum, à quibuscunque authoribus propositarum descriptiones, & quidem methodice, omnibusque supervacuis recisis, tibi, Candide Lector, exhibere valeamus, sicque perfectum opus accipias.

His interim in rem tuam utere, authori fave, & si potes plantarum transmissione juvato: & si quæ minus recte proposita animadverteris, pro humanitate tua moneto: monitus non solum gratias habebō, sed etiam lubens, quod hominis ingenui, & fatebor & sententiam mutabo. Nam ut recte Galenus, *χαλὶπὸν αὐθροπον οὐτὶ καὶ δὲ μαρτάνειν, ἐν πολλοῖς, τὰ μὴ ὅλως ἀγνοῦσαι, τὰ δὲ κακῶς κρίνειν, τὰ δὲ ἀμειλίς, ἢ ἄρα ἔχοντα.* Nunc nomina eorum à quibus plantas accepimus subijciamus, cum ingenuum deceat, per quos profecerit, fateri, quod hæcenus fecimus, & porro, si Deus volet, facturifumus. Vive & vale. Basileæ Idibus Martij, M DC XX,

*NOMINA EORVM QVORVM OPERA  
in prodromo adjuti fuimus.*

- A** Clutius Medicus Amstrodamenfis.  
 Arnoldus Gillenius, Ducis Megapolitani Medicus.  
 Bernhardus Paludanus, Medicus Enchusianus.  
 Caspar Weckerlinus, p.m. Argentinenfis Medicus.  
 Caspar Bartolinus, Haffniæ Medic. Professor.  
 David Vafnarus, p.m. Lubecenfis Medicus.  
 Daniel Lotitzius, Paterniacenfis Medicus.  
 Everhardus Vorftius, Profef. Lugd. Batavorum.  
 Fabius Columna Lyncæus.  
 Fridericus Meyer, p.m.  
 Ferrandes Imperatus, Pharmacopæus Neapolitanus  
 Georgius Rumbaum, Medicus Vratislavienfis.  
 Henricus Heyl, Medicus Dantifcanus  
 Honorius Belli, Medicus in Creta.  
 Iacobus Alinus, Medicus Hamburgenfis.  
 Iacobus Antonius Cortufus, p.m. Patricius Patavinus & horti præfectus.  
 Iacobus Cargilltus, Medicus in Scotia.  
 Iacobus Zvingerus, p.m. Medicus Bafileenfis.  
 Iacobus Hagenbachius, Bafil. Medic. Studiofus.  
 Ioachimus Burferus, Medicus Annæbergenfis.  
 Ioannes Bauhinus, p.m. Wirtembergenfis Archiater.  
 Ioannes Fleifferus, Vratislau, D. qui in Virginitia obiit.  
 Ioannes Francus, Senior Medicus Camicenfis.  
 Ioannes Henricus Cherlerus, p.m. Medicus Bafileenfis.  
 Ioannes Neudorffer, Medicus Norimbergenfis.  
 Ioannes Pona, Pharmacopæus Veronenfis.  
 Ioannes Rudolphus Saltzman, Poliater & Profeflor Medicinæ Argentinæ.  
 Ioannes Sigfridus, Medicinæ Profeflor Helmftadij.  
 Laurentzius Rosenau, Pharmacopæus Lineburgenfis.  
 Laurentius Scholtzius Senior, p.m. Medicus Vratislau.  
 Leonhardus Doldius, p.m. Medicus Norimbergenfis.  
 Ludovicus Furer, Senator Northufanus.  
 Ludovicus Iungermannus, Profeflor Gieffanus.  
 Matthias de Lobel, p.m. Botanographus Angliæ.  
 Matthias Lifterus, Medicus Londinenfis.  
 Nicolaus Agerius, Phyfices Profeflor Argentinæ.  
 Nicolaus Contarenus, Patritius Venetus.  
 Olaus Worm, Profeflor Haffniæ.  
 Paschalis Gallus, Piſtavienfis Medicus.  
 Philippus Stephanus Sprengerus, p.m. Pharmacopæus Heidelbergenfis.  
 Samuel Sattler, Ducis Brunfvic, Medicus.





THEATRI BOTANICI  
CASPARI BAVHINI BASILIEN-  
SIS ARCHIATRI  
PRODROMVS.

**P**LANTARVM *universalem historiam, in THEATRO, Deo clementer  
vitam viresque largiente, proposituro, hoc vero in libro, solum  
Plantarum à me descriptarum, historiam expressuro, eandemque  
methodum, quam in Theatro, observaturo, à GRAMINIBVS auspi-  
cari lubet.*

LIBER PRIMVS.  
DE GRAMINIBVS.

CAPVT I.

**G**RAMINIS differentias ducentas in  
THEATRO nostro, si Deo placuerit,  
proponemus, in præsens vero eas  
graminis species, quas à cæteris Bo-  
tanicis prætermittas censemus, bre-  
viter describere est animus; & id perspicue &  
sine omni verborum lenocinio: tu DEVS cœ-  
ptis clementer, quod supplex peto, aspira.

I. GRAMEN caninum vineale: radice est alba,  
tenui, repente, geniculis distincta, ex quibus fi-  
bræ capillares in terram defiguntur: culmos ha-  
bet tenues, læves, geniculatos, in terram reclina-  
tos: ex quorum geniculis singulis, folium, duas,  
tresve uncias plerumque longum, angustum, a-  
trovirens prodit: culmorum summo panicula  
brevis, parumq; expansa, ex parvis glumis com-

posita, insidet. Apud nos in vinearum viis, solo  
aliquantulum duriore, circa æstatis initium re-  
peritur.

II. GRAMEN caninum supinum panicula-  
tum dulce: ex radice oblonga, capillata, & ni-  
gra, folia pauca, lævia, viridia, angusta, uncia-  
rum trium vel quatuor longa, prodeunt; inter  
quæ calamus tenuis, internodiis distinctus, fo-  
liis paucis oblongis cinctus: parte inferiore su-  
pinus, mox palmum longus, erigitur, & panicu-  
lam tenuem, albam, glumis exiguis donatam,  
sustinet: agris Londinensibus udis gaudet,  
unde D. Lobelius, Graminis dulcis  
nomine misit.

*Gramen caninum maritimum  
asperum.*



III. GRAMEN caninum maritimum asperum, radicem habet ex multis fibris oblongis, albis, capillaribus compositam, ex qua ramuli plures dodrantes, in terram primum reflexi prodeunt, calamis rotundis rufescentibus donati, quos folia quasi in fasciculo juncta, brevia, dura, veluti in aculeum fastigiata, in circuitu leviter hirsuta, ferre instar minutissime exasperata, cingunt: spicæ, folliculo primum inclusæ, angustæ, ceu ex lappulis elegantissimis, exiguis, asperis & echinatis composita. In littore Veneto, maritimis quoque circa Anconam, & Monspeluli reperitur. Lobel. adversariorum parte altera in catalogo graminum, gramen caninum medicatum maritimum spica echinata C. Bauhini (sed sine descriptione) vocat, quia hoc nomine in Phytopinace nostro ante annos 24. brevissime descripsimus.

*Gramen caninum maritimum  
spicatum.*



IV. GRAMEN caninum, maritimum spicatum, ex radicibus tenuibus, lignosis, levissime capillatis, viticelli plures repentes, rotundi, læves, pedales, cubito etiam longiores, frequenter geniculati, unde ramuli plures, foliolis arundinaceis brevibus & angustis cincti, prodeunt, quorum superioribus spica triuncialis, ex cinereo nigricans insidet. Ad littus maris, non longe Monspelio, D. Salzmännus legit & communicavit.

V. GRAMEN murorum radice repente, ex radice nigricante repente & capillacea, culmi plures, pedales, incurvi, tenues, geniculati, foliis paucis, brevibus & angustis cincti, prodeunt: quorum summitati panicula albicans, sesquiuncialis, ex minimis glumis contexta, insidet. Hoc in muris fossarum interiorum urbis nostræ provenit.

VI. GRA-

Gramen nodosum spica  
parva.Gramen nodosum avenacea  
panicula,

VI. GRAMEN nodosum spica parva: radice est parva, nodosa, albicante, fibris paucis & brevibus donata, cui ceu alter nodulus oblongus infidet, qui in calamum cubito altiore, laevem, internodijs aliquot distinctum abit, folio ad quemlibet nodum uno, angusto, uncias quatuor vel sex longo: in summitate spica unica vix uncialis, mollis, typhini graminis forma. In dumeris udis circa Befordiam (urbe diei itinere Basilea distante) provenit, ubi D. Ioannes Bauhinus frater meus p.m. collegit & transmisit,

GRAMINIS nodosi avenacea panicula descriptionem hic praeterimus, cum ab aliis proposita fuerit; solum figuram novam, cum a nullo perfecte fuerit delineata, addere placuit.



Gramen bulbosum aquaticum.

Gramen tremulum minus panicula parva.



VII. GRAMEN bulbosum aquaticum: Bulbum unicum habet, elegantem, cum recens est, maculis luteis striatum, carne alba, nullius odoris nec saporis, in ima parte quasi candulam habens, ex quo pediculus duarum unciarum exurgit: cujus summo radix manifeste fibrosa ad foliorum exortum conspicitur: folia aliquot habet lariuscula, palmatis, striata: an calomum ac florem proferat ignotamus, cum tale à D. Vasmaro anno 1592. Lubeca acceperim: s: scribit se in ripa fluminis Tranæ invenisse flutibus forte projectum, quod absque dubio sub aquis nascatur, foliorum contemplatione id docente: imbecilliora enim est, quam ut sine fulciente aqua sese fulsine possit: quod in Phytopin. etiam innotuimus.

VIII. GRAMEN bulbosum ex Alepo: Radice est bulbosa, cortice reticulato obvoluta, cui fibrae parvae capillares subjiuntur: culmos duos

tresve striatos, sesqui spirham æ altitudinis habet, foliis plurimis, oblongis, gramineis cinctos: spica, hordeo marino similis, culmo infidet, quam folia, vesicæ instar, parte inferna cingit, eamque superat. Hoc siccum apud Joh. Bauhinum fratrem vidimus.

IX. GRAMEN tremulum minus panicula parva: Radicibus rufescentibus hue illuc repentibus, nectitur, unde culmi palmares duo vel tres, geniculo uno vel altero distincti, foliis gramineis virentibus & glabris, angustis, acuminatis, quorum anum jubam vesicæ in modum obvolvitis, & suo acumine vel superat, vel saltem adæquat quæ multis laminulis squamatis, lenticulæ similibus, rotundis, spadiceis sæpe coloris, filotenuissimo ad pensis, constat: ex quibus stoculi tenues, ex flavo pallentes, in vere emicant. In præcis nostris montosis & ericetis provenit, & vulgo Hasenbrod'id est, leporinus panis, dicitur.

Gramen tremulum maximum.

Gramen pratense paniculatum molle.



GRAMINIS tremuli maximi, cujus Cæſalpi-  
nus ſub Phalaride altera, & Cluſius in Cur. poſt.  
ſub gramine Amourettes majore meminit, Fi-  
guram à nemine propoſitam adponere placuit.

GRAMEN pratense paniculatum molle, cum  
nomine graminis lanati in hiſtoria Lugdunenſi  
propoſitum ſit; ſolum Figuram veram ſpectan-  
dam exhibemus.

X. GRAMEN pratense paniculatum majus  
angultiore folio: ex radice capillacea, ruſſeſcen-  
te, folia capillacea; quædam brevia, quædam

palmum ſuperantia prodeunt: inter quæ cul-  
mi tenues, geniculati, cubitum ſuperantes, uno  
alterove folio brevi cincti, in quorum ſummo  
panicula leviter expanſa, unciarum quatuor  
longa, quæ ratione loci, ſtrigoſior vel lætior: In  
pratis & dumetis ad ripam Wiſſæ fluminis ap-  
ud nos reperitur.

Huic ſimile ad ripam prædictam invenitur,  
potiſſimum radicum capillarium, ut & caulium  
numero, paniculis & in iis glumis longio-  
ribus varians.

Gramen panicula mul-  
tiplici,Gramen arvense panicula  
crispa,

XI. GRAMEN panicula multiplici: ex radice multis cirris villosis albicantibus composita, culmi plurimi, palmares, læves, geniculati & recurvi, foliis gramineis, oblongis, angustis vestiti, exurgunt, quibus panicula triuncialis angusta varie divisa, per maturitatem rigida & spadicea, insidet. Monspefuli provenit; majus & minus reperitur, & gramen minus duriusculum vocatur.

GRAMEN arvense panicula crispa, cujus figura apposita, pro gramine à Matthiolo, gramine Xerampelino à Lobelio, gramine bulbofo Dalechampi in historia Lugd. describitur, figura non feliciter expressa,

XII. GRAMEN montanum panicula spadicea delicatiore: Radice est alba, brevi capillacea, culmis ternis, quaternis, geniculatis, pedalis, uno alterove folio cinctis, quæ etiam ad radicem brevia & pauca sunt: in culmorum summo panicula triuncialis, spadicei coloris, ex locustis minimis composita.

Hoc tamen variat magnitudine, cum & caule sesquicubitali & spica semipalmari inveniat: provenit locis saxosis, majus quidem in monte

Crentzacho: minus vero in monte  
Wasserfall dicto.



Gramen paniculatum odoratum.



XIII. GRAMEN paniculatum odoratum: Radicibus candidis, geniculatis serpit: culmo est bicubitali geniculis paucis distincto, foliis angustis, longissimis, paniculam superantibus, in acumen fastigiatis, suavem odorem spirantibus: cuiusculmo panicula parva, leviterque sparsa, à pitore non rite expressa, insidet. Apud Borussos provenit, & à Regiomontanis gramen Mariæ

dicitur, quod in fasciculos collectum, propter odoris fragrantiam, vestibus adjiciunt, ut D. Vafmarus, qui plantam transmisit, perscripsit.

XIV. GRAMEN sylvaticum paniculatum altissimum: ex radice repente fibrosa, calami duorum triumve cubitorum exurgunt, qui paniculas parvas sustinent; foliis est latis, cyperi æmulis. Hoc in sylvis circa montem Belgardum provenit, ex quo rustici chlamides pastorales, & torques equis aratra vehentibus conficiunt.

XV. GRAMEN palustre panicula speciosa, Hoc ad bicubitali altitudine exurgit, calamo satis crasso: foliis est paucis pedibus latiusculis, per marginem asperiusculis, quorum aliqua tubuli instar, calamum media ex parte ambiunt: panicula est jubata sesquipalmari, ex elegantissimis, parvis & subrotundis laminellis composita. In humidis circa Patavium legimus: & in Hassiæ stagnis reperiri intelleximus.

XVI. GRAMEN palustre paniculatum minus, Ex radice crassa fibris albicantibus, durioribus donata, calamus rotundus, striatus, cubitum superans exurgit, quem folia pallide virentia, latiuscula pedalia, subaspera investiant: panicula palmaris est, rara, ex locustis albicantibus, aristis oblongis armatis, composita. Hoc in dumetis humidis circa montem Crentzafensem provenit: & in udis Michelsfeldensibus altius exurgit.

XVII. GRAMEN maritimum fluitans cornutum. Ex radice exili capillata, culmus tenuissimus, geniculatus, cubito longior producitur: ex quolibet geniculo, folia juncea, communiter bina, culmum basi lata, instar vesicæ, ambientia, in latus sparguntur, indeque cauliculus unus aut alter educitur, & tandem in capitulum membraneum finit, quod in foliola bina, terna, rarius quaterna, angustissima, in latus reflexa, & cornuta definit. Tota planta, stagnis Monspe-liensibus mari finitimis, innatat.

## Gramen cristatum.



XVIII. GRAMEN spica cristata lævi, vel gramen cristatum. Radicum capillamentis plurimis oblongis albicantibus abundat, quæ in unum veluti cespitem coeuntia deorsum repunt: culmis est pluribus sequicubitalibus, geniculis paucis donatis: foliis brevibus angustis, & cir-

ca caulem paucis, uncias quatuor vel quinque longis: spicam habet tenuem oblongam, pallidè virentem, quæ galli cristas plurimas, vel semen capitis gallinacei dictæ plantæ refert, cuius nomine cristatum in Phytopinace appellare placuit: quod nomen & D. Lobelius in Adver. parte alt. probavit, gramen cristatum Casp. Bauhini nominans. Provenit in prato infra patibulum, aliquando ad mœnia Basilienfis.

Idem, sed spica elegantiore & densiore, in monte Wasserfall & Monspessuli observavimus: simile ei ex Anglia D. Lobelius, multis annis post, misit.

XIX. GRAMEN spica cristata subhirsutum. Hoc à priore differt, radicum capillamentis rufescentibus, culmis tenuioribus, parte inferiore levi lanugine aspersis & humilioribus: foliis longioribus: spica candicante, minus compacta, nec ita eleganter cristam exprimente: quod in dumetis circa Cliben copiose provenit.

XX. GRAMEN spicatum angustifolium montanum. Hoc à gramine caryophyllato pratensi differt foliis, quæ angustissima; cauliculis, qui in hoc tenuissimi, plures & longiores: & loco, cum hoc solum in montosis, Majo mense florens, proveniat.

XXI. GRAMEN sylvaticum angustifolium spica alba. Ex radice rufa, transversa, fibræ capillares descendunt, & folia plura, capillacea, palmaria, etiam breviora, rarius longiora exurgunt, una cum culmis tenuissimis, ipsis foliis plerumque brevioribus, quibus spica ut plurimum simplex, candida, exiguis aristis donata, unciam vix superans, insidet: quod in sylvis humidis Huningenfium reperitur.

Gramen spicatum folio aspero.

Gramen caryophyllatum montanū spica varia.



GRAMEN spicatum folio aspero, in historia Lugdunensi, nomine graminis spicati Dalechampiij proponitur, cujus figuram perfectam adponere placuit.

XXII. GRAMEN caryophyllatum nemorosum spica multiplici. Radice est ex fibris capillaceis rufescentibus composita, ex qua, tanquam ex cespite, folia semipalmaria, etiam breviora, Vetonice caryophyllatæ similia, prodeunt: inter quæ culmi quam plurimi capillacei, nudi, folia aliquando superantes, spicas multas brevissimas & rufescentes sustinentes, exurgunt. Hoc in umbrosis & humidis ad Birsam & Wiesam reperitur. Huic non multum dissimile, sed radice magis geniculata, in via Richana ad sepes ad sinistram reperitur.

XXIII. GRAMEN caryophyllatum montanum spica varia: Radicibus est parvis, fibrosis, oblongis, nigricantibus, ex quibus instat cespiti-

tis folia, aliquando palmum longa, angusta, ut in gramine spicato caryophyllatæ foliis prodeunt: inter quæ culmi plures, tenues, foliis nudi, in summitate spicam modo divulsam, modo compactam sustinentes. In nostræ urbi vicinis collibus reperitur.

XXIV. GRAMEN spicatum foliis & spicis hirsutis mollibus. Radice est arundinacea transversim repente, paucis fibris capillata, ex qua culmi molles cubitum superantes, foliis oblongis, angustis, spicas superantibus, & molli lanugine alpersis, quasi per tubulos transeuntes, exurgunt: quorum summo spica angusta, unciæ duas longa, mollis, modo simplex, modo gemina, rarius triplex, alternatim disposita, insidet.

Hoc in arenosis ad Birsam reperitur.

Gramen typhoides maximum spica longissima.



Gramen alopecuroides, spica aspera.



XXV. GRAMEN typhoides maximum spica longissima. Ex radice parva, nodosa, cui fibræ exiguæ & plurimæ adnatæ, culmus exurgit rectus, sesquicubitalis, internodiis rarioribus distinctus, qui in spicam rectam, teretem, palmarem, virescentem, in maturitate albicantem, tactu mollem, definit, utriculis aristas oblongiusculas & copiosas exhibentibus. Inter fruteta circa Gœppingam Ducatus Wittenbergici primum, dein non longe Basileæ, in sepibus agrorum inter Michelsfelden & Huningen, & in salicetis Michelsfeldæ legimus.

XXVI. GRAMEN phalaroides minus, sive Hispanicum: hoc foliis est oblongis, angustis, viridibus, quorum unum vel alterum, culmos cubitales, tenues, tubi instar cingit: in culmorum summo spica Phalaridis similis, sed angustior, uncias tres longa, infidet: nec radicem, nec se-

men vidimus: & nomine Phalaroidis alterius Hispaniæ, D. Gillenius, transmisit.

XXVII. GRAMEN phalaroides spica molli, sive Germanicum: culmo est cubitali, prioris crassiore, uno alterove geniculo distincto: folio uno vel altero, eoque brevi, culmum ambiente, cujus summo, spica biuncialis, prioris angustior, cinericei coloris, splendens & mollis infidet. Hoc Ulmenfes, apud quos provenit, à colore, Onocordon appellare intelleximus.

GRAMEN alopecuroides, spica aspera, nomine Graminis echinati apud Lugdunensem describitur, quare solum figuram meliorem addere volumus.

XXXIII. GRAMEN tomentosum alpinum & minus. Ex radice parva inutili, calamus raro dodrantem superans, foliis duobus tribusve vestitus exurgit, cujus summitati pappus sub-

rotun-

rotundus infidet. Provenit in Helvetia, in D. Bernhardi monte minore ad lacum: ex Rhœtia D. Burferus attulit.

XXXIX. GRAMEN sparteum Basiliense, sive capillaceo folio majus. Ex radice fibrosa, culmi plures exurgunt, qui statim in folia capilli instar angustissima, in acumen molle fastigiata, palmum, sæpe pedem altiora, absumuntur: nec paniculam, nec spicam observavimus. Tota planta insigniter viret, & ex multis plantis simul junctis cespes constituitur: in paludibus Michelfeldæ provenit: uti mihi anno præterito M. Hagenbachius, una cum aliis Graminibus plurimis, ostendit.

XXX. GRAMEN sparteum Hollandicum, sive capillaceo folio minus. Hoc pro radice fibellæ tenuissimas albas habet: folia copiosa, capillacea, pallida, trium quatuorve unciarum, inter quæ culmi tenuissimi, palmo altiores, uno alterove internodio donati & pene nudi: efferuntur, qui paniculam pallidam divulsam sustinent, & communiter plures cespitem constituunt. Nomine Sparti Hollandici ex sylva Hagana D. Weckerlinus misit.

XXXI. GRAMEN sparteum Monspelicum capillaceo folio minimum: Radicem habet ex fibris albis, oblongis, capillaceis compositam: folia capillacea, uncialia: culmos tenuissimos, nudos, trium quatuorve unciarum: paniculas parvas ex locustis minimis compositas & per maturitatem rufescentes: quod Monspeluli in agris æstivo tempore reperitur.

XXXII. GRAMEN sparteum setas equinas referens. Hoc album est, & ex radice alba setarum instar folia cubitorum quatuor longa producit, quæ forma, & tenuitate, & robore, caudam

equinam, ejusque setas referunt: ex quibus laeve insulæ incolæ, capetia texunt. Cujus forte mentio fit in C. Clusij curis posterioribus, sub Herba, Sparto Hispanico non absimili.

Sic ex Insula Virginea, arboris ejusdem cortex candidissimus, in pili tenuitatem divisus adfertur, è quo incolæ pannos texunt: hunc corticem à D. Gillenio, Gramen vero à D. Saltzmano accepimus.

XXXIII. GRAMEN sparteum variegatum: hoc foliis est quatuor vel quinque unciarum, rotundis, variegatis, quorum alternatim pars una viret, altera rubet: quod primo vere in Franckenhusii montibus copiose reperiri, D. Iungermannus anno 1602, scripsit, & colorem cultura mutare monuit, spartiq; nomine, solum folia, misit.

XXXIV. GRAMEN foliolis junceis brevibus majus, radice nigra. Ex radice capillata, nigra, folia juncea, rarius duas tresve uncias superantia, prodeunt: inter quæ culmus tenuissimus, pedalis, lævis, ejus summo glumi minimi, quæ admodum in gramine exili duriori, alternatim dispositi sunt: ad mœnia urbis nostræ legimus.

XXXV. GRAMEN palustre junceum racemoso semine: foliis est paucis junceis, culmo cubitali, ex ejus summitate, inter bina foliola, veluti racemus parvus propendet: in aquis circa Francofurtum ad Oderam D. Fleissnerus collegit, & anno 1605. communis cavit.



Gramen junceum folio articulo  
aquaticum,

GRAMEN junceum folio articulo aqum:  
cum: et si pro aquatice altero à Lobelio, aquatice  
à Tabernæmontano pingatur; verum cum folio-  
rum articuli non exprimantur, novam pro The-  
atro nostro sculptam, addere visum fuit: & cum

Gramen junceum folio articulo cum  
utriculis,

post fœniseium, caulis palmaris exurgat, cui ra-  
ro capitula corymbacea insident, sed utriculi  
unciales paleacei, in capillamenta fisci, modo  
virides, modo purpurescentes, idcirco figura  
• exprimi curavimus.



Gramen montanum junceum capite  
squamoso.



XXXVI. GRAMEN montanum junceum capite squamoso: Radice est parva, fibrosa, circa quam folia bina, ternave semipalmaria: culmus junceus, levis, enodis & nudus, pedem superans: cujus summo capitulum instar Phalaridis squamosum in apicem desinens, ex albo leviter rufescens, insidet, cui utrinque foliolum rigidum subjicitur; quorum longius, unciam superans, deorsum vergit, alterum quod triplo brevius, recta effertur. In Baldi montis summitatibus legitur.

XXXVII. GRAMEN junceum minimo capitulo squamoso: Radiculæ capillares sunt, folia pauca capillacea, unciarum fere duarum, inter quæ culmi unciarum quatuor vel quinque exurgunt, in quorum fere summo capitulum unicuique minutissimum squamosum rufescens, cui culmi apex supereminet. In aquosis circa Al-

torffium Noricorum, unde D. Doldius misit: & Francofurti ad Oderam, provenit.

XXXXIII. GRAMEN junceum minimum alterum: à priore differt potissimum capitulis, quæ & summo cauliculo insident, & squamosa non sunt: in fossis Patavinis, aqua defluxa, reperitur.

XXXIX. GRAMEN junceum minimum maritimum. Tota planta dodrantem non superat, cespiti similis, ex cujus singulis radiculis, singuli cauliculi exurgunt, foliolis capillaceis paucis cincti, qui exiguis utriculis donantur: hoc in Zealandiæ maritimis ad oppidum Gous, D. Gilenius collegit & transmisit.

XL. GRAMEN cyperoides latifolium spica spadiceo viridi majus: Radice est oblonga multiplici, rufa, mire capillata, caulibus triangulis, cubito minoribus: foliis arundinaceis, pedalis, & quam in vulgari angustioribus: spicis ternis, quaternis, rarius quinis, alternatim succedentibus, angustis, trium quatuorve unciarum longis, coloris spadiceo-viridis, quarum primæ semper folium oblongum angustissimum subjicitur. Hoc in humidis ad Sellam novam Monspessuli primum vidimus: dein ex Lusitania, à D. Franco Graminis Spravvaldensis nomine accepimus.

XLI. GRAMEN cyperoides angustifolium spica spadiceo-viridi minus: Radice est brevior, lignosior, parum fibrosa, & rufa: caule triangulo, pedali: foliis angustis, duris, semipalmatis, in acutiem desinentibus: spicis aliquot angustissimis, oblongis, spadiceo-viridibus, alternatim dispositis, & pediculis longis capillaceis insidentibus, quod Aprili mense circa Birsam reperitur. Aliquando tamen altius exurgit.

XLII. GRAMEN cyperoides spica pedula longiore & angustiore. Caule est cubitali, anguloso, striato, foliis oblongis, angustis, basi oblonga, caulem instar tubi vestientibus, ex quo veluti tubo, spicæ singulæ, uncias quatuor vel sex longæ, angustæ, prodeunt & propendunt, ipsæ vero folium cuiuslibet spicæ subiectum, oblongum est. Hoc locis humidis circa Thermas Apponenses Patavinorum crescit.

XLIII. GRAMEN cyperoides spicis minoribus minusque compactis. Ex radice fibrosa, lignosa tamen, folia prodeunt angusta, graminea passim longa inter quæ caustis sesquicubitalis, tri-

quetrus, subasper, & magna ex parte nudus exurgit: in cuius summo, spica parva divulsa, & quasi aculeata consistit, quæ semina oblonga, subnigra, in aculeatum cuspidem desinentia, continet.

Hujus tres differentias notavimus: 1. est latioribus & longioribus foliis, spicis majoribus, & ad rivulum molendinarium urbis nostræ trans Rhenum reperitur. 2. à priorè rarioribus & minoribus spicis differt, & in via Richana ad sepes crescit. 3. foliis est angustioribus, brevioribus, spicis inter duas priores mediis, quod Patavii locis humidis anno 1578. collegimus, & cum D. Guilandino ostendissemus, Ischæmon Plinii censuit, quod non probamus: idem sed per omnia minus anno 1579. Monspeffuli in humidis invenimus, quod gramen cyperoides nominabant.

XLIV. GRAMEN arundinaceum plumosum album. Radice & foliis est arundinaceis, & in arundinis altitudinem excrefcit: caule anguloso albo, paniculam arundinaceam, ramosam, palmarem, albam, mollem, splendentem, in-

star serici albi sustinet. Non longe Monspeffio, circa Perault & Magolanam reperitur.

XLV. GRAMEN nemorosum paniculis albis capillaceo folio: cespitis instar gramen hoc existit, quod ex radicibus capillaceis, folia copiosa, viridia, pilis tenuissimis similia, pedem longa, emittit: inter quæ culmi tenues geniculati, cubitales, aliquando sesquicubitales, pene nudi, in paniculam rariorem albicantem, palmo minorem, ex glumis parvis aristis donatis compositam, abeunt: in Querceto non longe Michelsfelda copiose provenit.

XLVI. GRAMEN holosteum alpinum minimum: Tota plantula uncias tres non superat, foliis capillaceis uncialibus, cujus culmis capitula paleacea insident, copiose in Helvetia, in S. Bernhardi monte minore, provenit.



Gramen hirsutum latifolium minus juncea  
panicula.



Gramen hirsutum capitulis  
psyllii.



GRAMINIS hirsuti differentiæ sunt plures:  
est latifolium majus ab aliis descriptum: est mi-  
nus juncea panicula, magnitudine potissimum à  
priori differens, cujus figura adposita: est & ca-  
pitulis psyllii, quod exile hirsutum cyperoides

Lobelio dicitur, cujus hic exactior figura exhi-  
betur: est denique hirsutum angustifolium ma-  
jus hic descriptum; & minus, quod gramea  
Leucanthemon in histor. Lugdun.  
dicitur.

*Gramen hirsutum angustifolium  
majus.*



XLVII. GRAMEN hirsutum angustifolium majus. Ex radice exigua fibrosa, rufescente, culmus unicus, cubito altior, ut plurimum lævis, exurgit, in cuius summitate panicula alba, mollis, lexiter sparsa, ex multis laminulis composita, in quarum qualibet semina minuta, subnigra & subrotunda: foliis est paucis, angustis, palmatis & villosis (sculptor in pilis exprimendis lapsus est) aliquot culmum cingentibus: ipsi vero paniculae, utrinque folium tenuissimum subjicitur, quorum alterum panniculam superat, alterum non adaequat. Provenit in nostris paludosis pratis Michelfeldensibus.

*Gramen spica subrotunda  
echinata.*



XLVIII. GRAMEN spica subrotunda echinata, vel gramen echinato capitulo. Radice est capillacea, alba, foliis paucis angustis, tactu subasperis, duarum triumve unciarum, inter quæ culmi festucarum instar læves, uno alterove folio cincti, prodeunt: & quidem terni, vel quaterni, sed altitudine inæquales, alter enim duarum, alter trium quatuorve, alter sex unciarum: quibus singulis capitulum unicum, instar tribuli echinatum & spinosum, insidet: flores & femina non observavimus.

Hoc locis sterilibus circa Monspelium crescit idem sed majus ex Hispania D. Albinus attulit, quod videtur clariss. Columnam gramen echinatum tribuloides appellasse.

XLIX. GRAMEN spica plana echinata. Plantula palmaris est, radícula ex fibellis albis composita,

fit ex qua foliola capillacea, pauca, unciam longa, & festuca tenuissima, prodeunt: spicam habet uncialem, planam, quæ ex utriculis minutissimis aristas acutas emittit: ex Hispania D. Albinus attulit.

L. GRAMEN montanum panicula miliacea sparsa. Ex radice fibrosa rufescente, folia pauca, angusta, uncias quatuor vel quinque longa, unum culmo tenuissimo cubitali, uno altero vefolio vestito, exurgunt, in cujus summo panicula sparsa, ex locutis minutissimis composita: in monte Crenzacenfi provenit.

L I. GRAMEN arundinaceum panicula miliacea: Ex radicibus fibrosis albis, unus & alter culmus cubitalis exurgit, quem parte inferiore folia arundinacea unciarum trium cingunt. At

partem supernam duobus nodis distinctam, folia duo angustiora, longioraque vestiunt: in cujus summo panicula trium unciarum, milii paniculae similis: in agris Patavinis reperitur, & à gramine miliaceo à Lobelio proposito, plane diversum est.

LII. GRAMEN arundinaceum Sorghi panicula sparsa. Hoc culmisi est cavis, magna ex parte reclinatis, ita ut capillaribus radicibus terræ affigantur, qui per folia (quæ longiora & angustiora quam in priore) veluti per tubum trans-eunt, & in summo paniculam fere palmarem, sparsam, parvis utriculis donatam, sustinent.

Locus natalis memoria excidit.

Gramen latifolium spica triticea compacta.



Gramen angustifolium spica tritici muticæ simili.




LIII. GRAMEN latifolium spica triticea compacta: Culmo est sesquicubitali, uno alterove geniculo distincto, foliis frumentaceis, pedalis, spica triticea, palmari, lata, glumis acutis carente: Basileæ, ad agrorum margines.

LIV. GRAMEN latifolium spica triticea divulsa. Hoc à priore, spica potissimum differt, quæ in spicas distinctas & angustas divulsa est, & sibi invicem alternatim in culmo subsequuntur, quarum utriculi brevissimis aristis armantur; in Italia ad agrorum margines.

LV. GRAMEN angustifolium spica triticea compacta: Hoc foliis est angustioribus, sesquipalmaribus rigidis, acuminatis & albicantibus: culmo lævi, rotundo, striato, sesquicubitali: spicis palmaribus, compactis: utriculis rigidis & acuminatis. Basileæ, ad sepes locis aridioribus extra portam Blasianam.

LVI. GRAMEN angustifolium, spica tritici

Gramen spica brizæ majus.



muticæ simili. Radicibus oblongis, geniculatis, nodosis candidis serpit: culmis est sesquicubitalibus, rotundis: foliis junceis, oblongis, duris, in acumen fastigiatis: spica oblonga triticea, ei Tritico, quod aliis spica mutica dicitur, simili: glumis paucis, oblongis, aristis carentibus. Locis arenosis circa Basileam, ut ad Cliben provenit. Wüßengrass appellare lubet, quod in Phytopinace sub gramine arundinaceo spica triticea posuimus: & Lobelius in Catalogo Graminum, quem ad vers. p. 2. addidit, gramen frumentarium, segetaleve triticeum, live triticea spica Cas. Bauhini nominat.

LVII. GRAMEN spica secalina: ipsi Secali similimum: calamo est tricubitali, lævi geniculato & pallente: foliis paucis longiusculis: spica uncias quatuor longa, oblongis aristis armata: quod Basileæ, in agris frumentaceis frequenter reperitur.

Gramen maritimum panicula loliacea.



LVIII. GRA-



**LVIII. GRAMEN** spica brizæ majus. Radicibus & culmis est frumentaceis, foliis angustis, spicis palmaribus, multiplicibus, utriculis aristis brevibus armatis, flosculis, ut in tritico, luteolis: Tota planta ad viri altitudinem assurgit, & apud nos locis acclivibus ad Rheni ripam, & ad montis Crenzazensis ascensum provenit.

**LIX. GRAMEN** spica brizæ minus: Tota planta palma minor est, radice exili, fibrosa, foliolis ad radicem brevibus, mollibus, canescentibus, spica unciali, quæ modo simplex, modo gemina & terna, utriculis aristis armatis: in agris Monspelienf. D. Saltzmannus legit.

**LX. GRAMEN** loliaceum latifolium spica angustiore: Ex radice alba, arundinacea, fibrosa, culmi aliquot bicubitalis exurgunt, foliis paucis, latiusculis, oblongis cincti, quorum summo spica angusta, uncias quatuor vel quinque longa, Phœnici vel Hordeo murino similis. Basileæ circa Cliben, longioribus & brevioribus foliis variis, reperitur.

**LXI. GRAMEN** loliaceum minus, spica simplici: Ex radice capillacea, cauliculi plures, rotundi, duri duarum unciarum, & etiam semipalmares, foliis paucis, angustis & brevibus cincti, exurgunt, quibus spica duarum unciarum, angusta, loliis similis, insidet: in agris Monspelienfibus frequens est.

**LXII. GRAMEN** loliaceum minus supinum spica multiplici. Hoc majori ex parte repit, & cauliculis est multis, unciarum quatuor, foliis paucis, & spica multiplici, cujus utriculis semen parvum oblongiusculum includitur; & hoc apud Monspelienfes provenit.

**LXIII. GRAMEN** maritimum panicula loliacea. Ex radicibus capillaceis, cauliculi plures, rotundi, recurvi, altitudine impares, palmo inferiores geniculati, foliis paucis, angustis, oblongis cincti, exurgunt, paniculam loliaceam, trium quatuorve unciarum, sed ramosam, sustinentes: locis maritimis circa Monspelium, unde D. Saltzmannus attulit, provenit.

**LXIV. FESTUCA** graminea glumis vacuis. Ex radicibus fibrosis simul junctis, culmi aliquot geniculati, pedales, ad radicem lanugine pubescentes, foliis angustis, paucis donati exurgunt, qui glumos plurimos, laeves & vacuos, filamentis tenuissimis adpendentes, partim virides, partim spadiceos, aristis oblongis donatos, sustinent: hæc apud nos in testis & muris crescit; &

cum glumi longis filamentis adpensisint, facile à quovis vento agitati, tremunt, hinc Monspelienfibus gramen tremulum dicitur.

Hæc aliquando, apud eosdem, glumis paucioribus & aristis longioribus & recurvis in agris reperitur, & festuca graminea aristis incurvis, nominari potest.

**LXV. FESTUCA** graminea effusa juba. Hæc altius exurgit, caule viridi & rotundo, qui in jubæ pedalis longitudinis effunditur, cujus glumi angustiores & longiores, brevibus aristis cincti, pediculis capillaceis, oblongis insident, qui per maturitatem albicant: inter segetes reperitur.

**LXVI. FESTUCA** juncea folio. Ex radice parva, fibrosa alba, folia pauca, juncea, semicubitalia longa, ut & culmus rotundus, cubitalis exurgit, qui in paniculam avenaceam, sed angustiore, albam, angustam, desinit, quæ ex oblongo folliculo (à folio constituto) paniculam longe superante, prodeit, cujus glumi rari, aristis longissimis & argenteis donantur. In Valesia ad paludem urbis Sedunenfis copiose provenit, unde D. Burserus nobis attulit.

**LXVII. FESTUCA** juncea folio spica gemina. Hæc culmo est sesquicubitali, rotundo, geniculato & ramoso, cujus summitati spicæ vix uncia longæ, molles, rufescentes, aristis oblongis armatæ, liliæamogramini villosæ similes, insident, & semper duæ simul, uni oblongo pediculo insidentes, junguntur: folia habet juncea, longa, inordinate disposita. Locus natalis excidit.

**LXVIII. FESTUCA** pratensis lanuginosa: ex radice capillacea, rufescente, folia multa, angusta, pedalia, una cum culmis tenuibus, bipedalibus, foliaceis, molli & pauca lanugine (culmi potissimum) aspersis, exurgunt: spica est oblonga, angusta, ex glumis oblongis, aristis donatis composita, & quasi in paniculam parvam expansa. Basileæ passim in pratis.

**LXIX. FESTUCA** dumetorum. Ex radice capillacea nigricante, culmi plures geniculis distincti, paucissimis pilis aspersis, duorum triumve cubitorum, foliis oblongis, angustis cincti, exurgunt, in quorum summo spica oblonga, locustis raris, oblongis, cauli proximis, & aristis armatis constans: Julio mense, in dumetis circa Birsam, verumetiam in vepribus, locis siccioribus, provenit.

**LXX. FESTUCA** dumetorum angustissimis & pilosis foliis: Radix est albicans, ex durioribus fi-

bris composita: ex qua calami aliquot tenues, uno alterove geniculo distincti & pene nudi, exurgunt: folia sunt brevia, angustissima, levi mollique lanugine hirsuta: calamorum summitati

veluti panicula, ex spicis pluribus composita, quarum quælibet capillaceo pediculo insidet, multis glumis aristis & candicantibus constans: provenit in dumetis circa Cliben.

*Gramen montanum avenaceum locustis rubris.*



*Gramen avenaceum lanuginosum glumis rarioribus.*



LXXI. GRAMEN montanum avenaceum locustis rubris: Ex radice tenui, repente, alba, fibris capillarib. utrinq; donata, culmus simplex, lævis, pene cubitalis (rarius ex una radice plures exurgunt) circa radicem purpurascens, qui quasi in spicam tenuem desinit, cuius glumi ut plurimum ab una parte siti sunt, & foris ex nigro purpurascunt, intusque albi sunt, in quorum medio utriculus parvus, candidus, pedicello donatus, semen minutum continet: foliis glumi paucis, angustis, acuminatis, circa radicem brevibus, ac circa culmum, quem duotriave cingunt, longioribus communiter spicam superantibus, lulo &

Augusto, hinc inde in montosis & umbrosis, ut circa arcem Richenstein, in monte Muteto Basileensium, & monte Crenztacensi reperitur.

LXXII. GRAMEN avenaceum lanuginosum glumis rarioribus. Ex radice fibrosa, folia juncea oblonga, & culmi plures, juncei, cubitum superantes, paucis foliis donati, exurgunt, in quorum summo glumi rariores, albi, lanuginosi, utriculum continentes, quib. semen nigrum, splendens, inclusum est: locus asperis circa Montspelium provenit: diversum est à Gramine montano avenæ semine.

Clusij.

LXXIII. GRA-

Gramen glumis variis.

Iuncus acutus capitulis Sorghi.



LXXIII. GRAMEN glumis variis: Ex radice crassa, membrana, alba rugosa intacta, caules bini, ternive, pedales, fragiles, læves exurgunt, quorum summo spicæ similis panicula uncialis, ex glumis varii coloris, insidet: folia plura ad radicem angusta, palmaria, saturate virentia: locis montosis circa Montembelgardum provenit, unde à fratre p.m. accepimus.

## DE IUNCOS.

## CAPUT II.

IUNCUS differentias viginti quatuor in Theatro proposituri, paucas hic apponemus: præmissa figura Iunci acuti capitulis Sorghi, qui Iuncus maritimus primus, adversariorum auditoribus; & Iuncus rotundus alter, Cæsalpino dicitur: cum hujus figura à nullo fuerit expressa.

*Juncus acutus maritimus caule triangulo.*

I. *Juncus acutus maritimus* caule triangulo: Radice est repente, fibrosa, à qua aliæ radiculae, prioribus exiccatis, nascuntur: hinc caules, quos ad radicem breviter folia cingunt, pedales, trianguli exurgunt & in extremitatem pungentem desinunt, infra quæ in latere floccus racemosus, rufescens exit. Hic in litore Veneto, & à Perault via qua Monspelio ad mare itur, provenit: & ad Danubium Lintzii D. Burserus legit.

II. *Juncus* exiguus montanus mucrone carens. Radice est pusilla, nigra, capillacea, cauliculo quatuor vel quinque unciarum, cujus summo capitulum parvum, ex fusco purpurascens, quadrifidum, in exiguum rigidiusculum filamentum abiens, insidet: foliola ad cauliculi principium tria, juncea, unciam longa; in Tauro Rastadiensi, D. Burserus eruit.

*Juncus acuminatus reflexo trifidus.*

III. *Juncellus inutilis*, sive *Chamaeschænos*: hic radice est fibrosa, & pro plantæ magnitudine, cum unciam vix superet, satis crassa, folijs est tribus quatuorve junceis. Tiguri prope lacum Felinum, Majo mense, Joan. Bauhinus p.m. collegit, & à C. Gesnero, ipsi *Chamaeschænos* nominatus fuit.

IV. *Juncus acuminatus reflexus* alter: caule est sesquicubitali, rotundo, lævi, aphyllò, panicula umbellæ simili: atro splendente, pediculo carente, filamentis cæruleis, ut in *Aphyllonthe*, donata, quam caulis duarum triumve unciarum, acutus, sed mollis, parumque reflexus superat: in Provincia Galliae provenit.

V. *Juncus acuminatus reflexus trifidus*: Ex radice nigra, geniculata & fibrosa, junci plures, tenues, palmum superantes exurgunt, qui in summo in tres, rarius quatuor stylos, tenuissimos, trium

trium quatuorve unciarum, dividuntur, in quorum summitatibus, post junci divisionem, paniculae parvae locatae sunt. In monte Fracto Lucernatum, in Pyraenis & Montibus Moraviae provenit.

*Juncus alpinus capitulo lanuginoso.*



VI. *JUNCUS capitulis equiseti fluitans*: Ex radiculis capillaceis, juncus recurvus tenuissimus prodit, qui in plures juncellos duarum triumve unciarum subdividitur, quorum aliqui

erecti, aliqui reflexi, capitulum minimum sustinent, & juncellis singulis foliolum tenue capillaceum adponitur. In aquis Angliae fluitat, unde D. Gillenius attulit.

VII. *Juncus alpinus capitulo lanuginoso*: Radice est subnigra, tenui, fibrosa, ex qua aliorum juncorum more, loco foliorum, quasi styli tenues, recti, rotundi, & quidem plurimi, in laeve acumen vergentes, longitudine dispari, quorum longissimi, vix palmares sunt, & ad radicem rufescunt: & subhirsuti sunt: inter quas caulis unicus, strictus, ad spithamæ, plus minusve, altitudinem exurgit, cui capitulum unicum, oblongum, molle, lanuginosum, haud multum leporum caudæ dissimile, insidet: cujus nomine *χαίρηλας, uxor* in Phytopinace appellavimus: in montosis Harcyniæ provenit, ad acidulas, inter fontem acidum Ribelsavv & Griefsbach, ubi Julio mense Joh. Bauhinus p.m. collegit, & nomine Junci alpini cum cauda leporina misit.

VIII. *Juncus alpinus bombycinus*: Ex radice aliorum juncorum simili, folia juncæ exurgunt, inter quæ culmi plures tenuissimi, palmo minores, qui capitulum parvum, lanugine alba ornatum sustinent. In montibus Moraviæ loco dicto Kessel, D. Fleissner eruit, & communicavit.

IX. *Juncus floridus minor*: Radice est candida, geniculata, fibris plurimis adhaerentibus: caule palmari, foliis ternis, juncæis, oblongis, acutis, duobus caulem superantibus, cujus summo, singulis pediculis, qui quini sunt alternatim sibi succedentes, flores (quos non vidimus) insident, quos fructus gemini rotundi Orobanchæ magnitudine sequuntur. In palustribus Helvetiæ circa cænobium Eremitanorum, & in monte Fracto ad lacum Pilati Lucernatum, D. Burserus observavit.



*Cyperus rotundus inodorus Germanicus.*

DE SPARGANIO.

CAPVT IV.



DE CYPERO.

CAPVT III.

**C**YPERUS longus inodorus sylvaticus: Radices habet oblongas, geniculatas, rufescentes, folia plura, palmaria, viridia, angusta, subspera, ad principium membrana rufescente simul vestita: caulem hactenus nullum observavimus, in sylvis, montosis, humidis, ut in monte nostro Muretto, provenit.

CYPERUS rotundus inodorus Germanicus, sub aquatico septentrionalium à Lobelio descriptus, cum non recte sculptus sit, figuram exhibere debuimus.

**S**PARGANIUM minimum: plantula est uncium quatuor; nam radícula ex fibellis oblongis componitur, unde cauliculus unciarum duarum effertur, & in capitulum exiguum subrotundum, cui aliud minus insidet, herbacei coloris & formæ, quemadmodum in sparganio majore, definit: circa quem folia utrinque quaterna, vel quina, angusta, cauliculum superantia. Plantulam hanc D. Furerus anno 1617. transmissit, his ascriptis: Sparganium minimum & semestrale; Northusij in lacunis quibusdam cœnosis, quarum partes superiores per æstatem exsiccantur.

DE EQUIRETO.

CAPVT V.

**I. EQUISETUM** palustre linariæ scopariæ folio: Ex radice repente geniculata, caulis rotundus, calami in modum inanis, geniculis distinctus, cubitoque altior affurgit: folijs ad geniculam pluribus, linariæ vulgaris folijs latioribus, & linariæ scopariæ similibus, viridibus, oblongis, fragilibus, subsperiusculis: julos in cacumine non observavimus, licet quandoque velut in ramos dividatur. Basileæ, in paludibus Michelfeldensibus, & etiam in rivulo juxta patibulum, reperitur.

**II. EQUISETUM** palustre minus polystachion: Radice est repente; geniculis distincta, caule tenui, cubito minore, geniculis crassioribus articulum utrinque; ternis, vel quaternis, junceis, palmaribus, quib. pene singulis minuta spica juli instar insidet: caulis vero julum oblongum, minus compactum, stoculis pallidissime rubentibus donatum, sustinet: in aquosis Michelfeldensibus.

**III. EQUISETUM** palustre tenuissimis & longissimis setis: Culmo est inani, bipedali, geniculis pixidatum cohaerentibus articulo, cum cæteris conveniens, exceptis folijs, sive setis junceis, longis, multoque tenuioribus: in palustribus Michelfeldensium.

**IV. EQUISETUM** nudum minus variegatum Basileens. Ex radice, parva, nigra, transversa, nihil



nihil capillata, cauliculi plures, inæquales, rarissime pedales, communiter palmares, semipalmares & multo breviores, striati, pallide virentes, geniculis parte infera nigris, superne albidis, articulati: folijs carentes, & cavi: in quorum summitatibus capitulum brevissimum juli instar insidet, quod à corona alba, ex octo, novem, etiam duodecim foliolis acutis composita, sustentatur: & quando pedibus calcatur, crepitat. Provenit ad ripam Rheni, juxta locum die Baar dictum. An Gesnerus libello de stirpium collectione, hoc intellexit? dum inquit: Hipparis lacustris quædam foliis mansu arenosis, in fine Julij flores, uti puto: plura non habet.

Equisetum sætidum sub aqua repens.



V. Equisetum sætidum sub aqua repens: Radice est fibrosa, caulibus tenuissimis, rotundis, per obliquum, ut Saccharum penidium, striatis, geniculatis, fragilibus, per terram sparsis, quan-

doque cubitalibus, in plures cauliculos brachiat, foliis aliquot brevibus, in breves apices distinctis, ad genicula junctis. Tota planta fragilis, quæ aquis cœnosis dum innatat viridis est, at extracta & exiccata, incana & friabilis, ita ut non solum digitis in pulverem comminui possit, sed sponte in pulverem abeat. Odoris est lutosi & sulphurei. Solum in aquis cœnosis demersum reperitur, quod primum Patavii in fossis Thermarum Aponitarum: dein non longe Lucerna: tum Basileæ cis pontem Birsæ, Michelsfeldæ & Huningæ, in fossis observavimus.

## DE ARVNDINE SIVE CALAMO.

### CAPVT VI.

I. CALAMUS aromaticus Syriacus: Ex radice inutili, trium quatuorve unciarum longa, summo capite nonnihil extuberante & in paucas fibras desinente, caulis (modo unus, modo plures) fere bicubitalis, rectus, rotundus, lævis, fragilis, multis geniculis distinctus, exurgit, qui intus cavus, spongiosus & membranula (quasi tela alba subrepta) uti harundines præditus, qui assulatim frangitur, & in plures ramos dividitur, hique in tenuissimos subdividuntur, ad modum Ligustri Aegyptiaci Alpini, vel Lentisæ Peruanae sive Molle Clusii: qui flores parvos, foliaceos, plurimos, singulis tenuissimis pedicellis insidentes, sustinent, ex quorum medio apex styli instar prodit. Folia pauca, semper bina ex adverso ad singula genicula fixa, caulem amplectuntur, unciam lata, sesquiunciam longa, nervis aliquot per longum excurrentibus. Caulis sapore est aromatico, vel amaro, quo in Theriaca pro calamo utitur. Hujus caulis partem anno 1579. à D. Paludano ex Aegypto reduce, Patavii accepimus. Verum cum totam plantam à D. Doldio habeamus, brevem ejus descriptionem (cum ab aliis non proponatur) adjicere lubuit.

II. ARUNDO Anglica foliis in summitate distinctis: Hæc foliis est cubitalibus, duarum triumve unciarum latis, nervis aliquot, per folii longitudinem excurrentibus & elevatis: foliis in summo in duos, tres & quatuor apices divisus: hanc D. Cargillus ex Anglia misit.

III. ARUNDO Indica latifolia flore luteo punctato: Ex radice nigricante, nodosa, & fibris crassioribus donata, aliisque nodis adnascens, ubi

caules plures sesquicubiales, crassi, arundinis instar nodosi, prodeunt, circa quos folia pallide virentia expansa, lata, in acumen desinentia, nervosa & tenuia: quæ, cum primo ante caulium exortum nascuntur, corniculorum chartaceorum modo convoluta existunt. Cauli, flores, gladioli floribus forma similes, coloris lutei, punctis aspersis variegati, capitello hirsuto inhæret, quod flore delapso augetur, subasperum fit, & semen nigrum, subrotundum continet. Hæc ut omnibus sui partibus, ita & semine minor est, quam ea quæ florem minii coloris habet. Hanc in horto habemus, in olla colinius, hyberno tempore in cellam reponimus, quæ primo vere plu-

res caules, antiquis resecdis profert, & Julio mense floret.

# DE SECALE.

## CAPVT VII.

SECALE latifolia: Culmis exurgit candicantibus, rotundis, striatis, quibus spica palmum longa, crassa, aristis longissimis, & ut in vulgari tenuissimis denticulis exasperatis armata, insidet: folia habet cubitum longa, unciam lata & per marginem leviter exasperata: grana non vidimus: spicam & folia ex horto Nobiliss. Contareni, Senatoris Veneti, habemus.

# LIBER SECVNDVS.

## DE GLADIOLO.

### CAPVT I.

GLADIOLUS angusto gramineo folio: pro radice bulbum geminum habet, unum alteri insidentem, caulem lævem, teretem, pedalem: folia bina ternave, graminea, angustissima, striata, mucronata, palmaria: flores ternos, quaternos, pallide rubentes, supra se invicem ad caulis summum utrinque ex sex foliis oblongis commissi: quibus ut in cæteris, folliculi semen paleaceum continentes, sed minores, succedunt. Ex Hispania D. Albinus, in Muræna collectum attulit.

### DE HYACINTHO.

#### CAPVT II.

HYACINTHUS minimus maritimus. Tota planta uncias, sex est: ex bulbulo parvo

oblongo, cortice villosio testæ, cauliculi duo vel tres nudi, inter folia angustissima exurgunt, quibus capitula minuta, rotunda, sursum porrecta insident, flosculis minutis cæruleis, quibus veluti siliquæ oblongæ usculæ, semen minutum continentes, succedunt. Montpess. in littore maris anno 1595. D. Gallus collegit: eundem & loco eodem, sed uncias tres non superantem,


D. Weckerlinus anno 1615. eruit,

& communicavit.

35050



*Narcissus angustifolius albus minor.*



DE NARCISSO.

CAPVT III.

**I.** *Narcissus angustifolius albus minor.* Ex radice bulbosa, tunica subnigra tecta & paucis fibris capillata, folia bina vel tera oblonga, angusta, portacea exurgunt: inter quæ cauliculus palmaris, cuius summo bini flores, parvi, albicalice oblongo, angusto donati, insident: non longe Monspelio in saxosis & montosis reperitur.

**II.** *Pseudonarcissus* gramineo folio, sive *Leuconarcissus æstiuus*: Ex radice, oblongum, angustum bulbum imitante, exiguis capillaceis fibris prædita, membrana fusca tecta, folia bina, croceis æmula, oblonga, exurgunt, quæ sæpe cauliculum superant; qui nudus, tenuis, trium, quatuor, quandoque quinque unciarum, fo-

liolis ternis, quaternis, brevissimis cinctus, florem unum stellatum, intrinsecus albicantem, extrinsecus venis purpurascens, variegatum, ex foliolis sex compositum, sustinet: in cuius medio cauliculus brevissimus, in stylum abiens, quem staminula apicibus candidis donata, cingunt, cui capitulum triquetrum, semen continens succedit. In alpinis Helvetiorum & Rhetorum, ut monte Spligel & ad Themas Fabbrias, Iulio mense floret: sed & Augusti fine, in Tauro Austriæ monte, D. Burserus eruit.

DE ALLIO.

CAPVT IV.

**I.** *Allium junci* folium bicorni luteum: ex bulbo oblongo, capillaceo, tunica alba vestito, caulis rotundus, palmo altior, foliis junceis duobus tribusve vestitus, exurgit, umbellam parvam luteam sustinens; cuius flores singuli, filamentis oblongis insident, ex sex foliolis luteis compositi, in quorum medio staminula toridem, & in medio stylus, quibus capitula trigona, semen continentia, succedunt: ipsi vero umbellæ, foliola duo angustissima, quorum alterum communiter longius, in latus expansa, subjiuntur. Monspelio D. Saltzmannus attulit, & D. Burserus in Austria prope Stain & Baden, eruit.

**II.** *Allium montanum minus*: ex radice parva, aliquantum nodosa & fibrosa, cauliculus unus & alter tenuissimus, nudus, tres, quatuor, etiam sex uncias altus, inter folia oblonga, angusta, exurgit, qui capitulum minimum (quod apertum non vidimus) sustinet: in petra circa Oenipontem reperitur.

**III.** *Allium montanum* radice oblonga: priori simile, sed caule altiore & foliis longioribus, capite rotundo pallide purpurascens, floribus ex foliolis sex, totidemque staminibus composito, non longe Monspelio, loco montoso, qui Hortus Dei dicitur, observavimus: quod forte *Allium montanum* sive *Petroscorodon Gesneri* in libro de Hortis.



Moly moschatum capillaceo folio.



DE MOLY.

CAPVT V.

I. **M**OLY Affricanum umbella purpurascen-  
te: ex radice bulbosa, caulis (modo un-  
nus. modo plures) cubito altior, nudus  
& cavus, una cum foliis aliquot latiusculis, in a-  
cutum desinentibus, palmaribus & etiam ses-  
quipalmaribus, per marginem, instar graminis  
hirsuti, pilosis: umbella, caulis summo insidet,  
cujus flores communiter ex quinque foliolis,  
dilute purpurascens, pediculis oblongis  
& firmis insident: quibus vesicula, duo triave  
semina nigra rotunda includens, succedit. Odo-  
re est Allii graviore. Hoc Argentina à D. Mey-  
ero acceptum, in horto ab aliquot annis alimus.

II. **M**OLY moschatum capillaceo folio: bulbo  
est parvo oblongiusculo, rufescente & veluti re-  
ticulato cortice testeo, ex quo cauliculus tenuis,  
palmaris, rarissimè pedalis emergit; circa quem  
folia juncea vel potius capillacea, sed sine ordi-  
ne, quæ modo unciam, modo tres quatuorve un-  
cias longa (quæ nimis lata in figura exprimun-  
tur) cauliculi summo pedicelli quini, seni, septeni,  
veluti in umbella dispositi, à duobus exiguis  
foliolis sustentati, insident: quorum singuli flo-  
sculum ex sex foliolis acutis compositum, obscure  
albentem lineis fuscis per medium discurrenti-  
bus dissectum & staminulis aliquot donatum  
sustinent: his capitula rotunda semina tria vel  
quatuor, nigra, oblonga, triquetra, continentia,  
succedunt: flos Moschi vel Zibethi odorem spi-  
rat, & in collibus Monspelio vicinis provenit;  
unde D. Saltzmannus anno 1798. attulit, & post-  
modum aliquot annis in hortulo coluimus.

DE ORCHIDE.

CAPVT VI.

I. **C**YNOSORCHIS angustifolia hianthe cucullor:  
huic radices subsunt duæ globosæ, altera  
major & vegetior, altera flaccidior, qui-  
bus superne fibræ aliquot adherent: caulis ca-  
vus, striatus, cubito minor, foliis aliquot pallide  
virentibus, levibus, striatis, uncias sex longis, se-  
munciam latis inferne, & uno alterove superne,  
amplexantibus: spicam habet oblongam, ex  
oblongiusculis pediculis dependentibus, hian-  
tem cucullum referentibus: hanc in pratis Pa-  
tavinis legimus.

II. **C**YNOSORCHIS militaris montana spica ru-  
bente conglomerata: ex radicibus prædictæ si-  
milibus, caulis cubitalis, rotundus, cavus, paucis  
folijs angustis, striatis, uncias sex longis cinctus,  
exurgit, cujus summo spica, ex floribus parvis, e-  
legantè rubentibus conglomerata, insidet: quo-  
rum labrum in quatuor parvas barbulas dividi-  
tur, calcare tenuissimo à tergo. Nasctur in her-  
bosis montis Mutetæ, Majo florens: quam prius  
Patavium observavimus.

III. **C**YNOSORCHIS militaris pratensis elatior  
floribus variegatis: hæc priore est testiculis mi-  
noribus, caule breviorè, folijs latioribus, uncias  
duas longis, etiam caulis summum, rubi instar  
cin-

cingentibus: spica brevior, ex floribus priore longo minoribus, iisq; ex albo & rubro eleganter variegatis. In pratis humidis Michelsfeldensibus, & trans Rhenum reperitur.

IV. CAMÆORCHIS alpina folio gramineo: planta palmaris est, ex cujus radice gemina, globosa, oblonga, folia angustissima, utrinque quaternaria, cauliculum nudum, triunciale, qui inter ea fertur, superantia exurgunt: spica unciali, cui utrinque foliolum brevissimum subjicitur: flosculi virides galericulati sunt. In monte Helvetiorum Gothardo, copiose & acervatim, Junio florens, reperitur.

V. ORCHIS montana Italica flore ferruginea lingua oblonga: Testiculos duos habet parvos, rugosos, quorum alter, ut in reliquis Orchidibus vegetior, hinc communiter solum unus testiculus reperitur: quorum summo, fibræ oblongæ, varic & oblique sparsæ, adpositæ. Caulis cavus nonnunquam pede altior, quem folia angusta paucaeque uncias tres vel quatuor longæ bali sua vestiunt, at cuilibet flori folium breve quidem, sed latius & in apicem desinens, subjicitur. Flores quini, seni, alternatim in caulis summo dispositi coloris ferruginei, obliqui ru-

buli forma, quorum lingua propendens oblonga est, & ex basi latiore in apicem abit, cui legumentum pallidioris coloris, vesicæ instar impositum, etiam in apicem & communiter bifidum finit: floribus utriculi, semine pulverulento repleti, succedunt. Hanc in Italiæ montibus Bassanensibus legimus: & Matthiolum sub Testiculi tertij specie prima, in figuris majoribus exprimere voluisse, censemus, cujus tamen figura mala, & sine omni descriptione, & ut in historia Lugdunensi sub Testiculo 3. Matth. At fateor pejorem esse eam figuram, quam Matthiolo meo emaculato addidi, desumptam ex Tabernæmontani figuris: tunc enim quid sibi vellet Matthiolum, non constabat, imo etiamnum dubium: quare aliam figuram delineari curavimus. Hujus haud dubie species, quam doctissimus Columna in sua Ecphrasi minus cognitarum stirpium, Orchidis macrophyllæ nomine & eleganter descripsit, & icone expressit.



*Orchis palmata pratensis angustifolia.**Orchis palmata angustifolia minor flore odoratissimo.*

**VI. ORCHIS palmata pratensis angustifolia** major: radices habet parvas, veluti palmas geminas, in binos digitos distributas, fibris paucis annexis: folia liliacea, angusta, lævia & palmaria, per quæ veluti tubum, caulis cubitalis cavus effertur, cui spica fere palmaris angusta, ex floribus dilute purpureis, breviculcare donatis composita, quibus singulis foliola oblonga acuminata subjiciuntur, & capitulum oblongum, semen aliarum instar continens, succedit. Hæc in pratis udis Michelfeldæ, ipsa æstate reperitur.

**VII. ORCHIS palmata angustifolia minor flore** odoratissimo. Radice est gemina, oblonga, angusta, palmæ simili, in tres quatuorve fibras crassissimas divisa, supra quas ex imo caule fibræ aliquot ortæ expanduntur: ex radice folia quina aut sena, oblonga, graminea prodeunt, inter quæ caulis unicus palmaris, paucissimus & exi-

guis foliolis donatus, qui velut in spicam biuncialem abit: cui flores dilute purpurei odoratissimi insident, qui galea tecti, labro prominulo, in quatuor barbulas divisi sunt, & parvo calcari, à tergo prominente, donati. In pratis humidis Michelfeldæ provenit & autumnofloret (quavis etiam Monspeßuli reperiatur) & sub Satyrio octavo in Phytopinace descripsimus.

**VIII. ORCHIS palmata flore viridi:** ex radice gemina, palmata & parva, caulis palma altior, folijs paucis, nervosis, uncias tres longis, unam latis, vestitus exurgit, spicam habens triuncialem, flosculos paucos, subvirides, galea tectos, & labro prominulo in duas barbulas diviso, quibus singulis foliolum oblongum, angustum subjicitur. In montibus Bohemiæ, Silesiæ finitimis, in Saxo Mommelgrund, copiosam Junio florentem, D. Fleisserus observavit, & attulit.

**IX. Or-**



## Orchis palmata montana maxima.

## DE OPHRII.

## CAPVT VII.

**O**PHRIS minima: è radice subflavescente fibrosa & Orchides redolente, cauliculus simplex, trium quatuorve unciar. sub foliolis prodit, cui foliola duo Ophrios vulgaris modo apponuntur, quæ parua sunt, glabra, splendentia, coloris unifolii & nonnihil in cordatam effigiæ, è rotundiuscula figura discedentia, quib. cauliculi altera pars, similiter trium, quatuorve unciarum supereminet, cujus summo flosculi parvum herbacei insident, in Ophris vulgaris florib. exilitate sola recedentes, quib. vascula exigua succedunt. Florentiis in locis ubi sponte provenit, Iulio potiss. mense floret: at in hortos, cum gleba soli natalitii translata, citius. Nasçitur plurimùm, ut D. Furerus monuit, à quo eam (sed prius à D. Sigfrid.) accepimus, Ophridii seu Bifolii Brocckenbergici minoris nomine, in opacis muscosisq; sylv. Broccio & Ossinannino vertici dicto.

## DE OROBANCHE.

## CAPVT VIII.

**I. OROBANCHE** flore majore ex cæruleo purpurascens: Radice est crassa, longa, fibrosa: caule semipalmari, foliolis paucis, brevissimis, crassis & acutis cincto, qui in quinque; sex, etiã plures pediculos triunciales, nudos, absumitur, quamvis etiã ex folior. alis pediculi prodeant, quorum summo calyx, uncialis sinuat\* insidet, & ex quolibet flos unicus, cæruleo purpurascens, lōgo pediculo donatus, exit, qui magnus, uncias duas longus, forma galericulatus, & veluti rostrat\*, ut in Alestorolopho, ex quo filamentum oblongum, reflexum prodit: quid flori succedat, non constat. Hanc, in Pyrenæis montib. D. Burf. legit & comunicavit.

**II.** Monere lubet de vulgari Orobanche, eam recte à Theophrasto Limodoron, quasi famem adferens, vocari; eo quod plantæ cui adnascitur, alimentum subtrahat. Hanc enim semper alterius plantæ radici adnatam observavimus, ut Genistæ vulgaris & Hispanicæ, Hieracio Sabauda, Trifolio, Astragalo sylvatico & aliis.

**III. OROBANCHE** quæ Hypopitys dici potest: hæc Orobanche vulgari similis, sed humilior & nigricans, caule unciarum quatuor, quasi squamis contexto: flores in summo, veluti in parvam spicam congesti, Nido avis similes, albidiores tamen, rariore ac duriores. Sub piceis, abietibus & pinastris (hinc hipopitys) provenit. Sapore est ali quantum astringente.

**IX. ORCHIS palmata montana maxima:**

Radices habet geminas instar palmarum duarum sibi invicem junctarum, & velut in plures digitos divisarum, quarum altera alba, vegetior ac solida, supra quas fibræ paucæ conspiciuntur. Caulis est bicubitalis, striatus, vacuus, quem folia pedalia primum, mox palmaria, sesquiunciam lata, nervis distincta, complectuntur: in cujus summo flores in spica palmari digesti, coloris dilute purpurei, qui parvi sunt galeola tecti, labro exiguo propendente, in angustissimas barbula diviso, & à tergo oblongo, capillaceo calcaris donati; ad quorum exortum foliola singula, quasi in filamentum abeuntia, observantur: his capitulum oblongum, striatum, semen exiguum scobis instar continens, succedit. Hæc in montibus vicinis, potissimum Muræto, copiose Majo florens, provenit.

LIBER TERTIVS.  
DE RAPVNCVLO SIVE CAMPA-  
NVLA GLABRA:

## CAPVT I.

Rapunculus spicatus cæ-  
ruleus.



Rapunculus alpinus sive Pyramidalis  
minor.



**R**APUNCULUS spicatus datur spica alba, vel cinericea, vel coloris violacei saturi; hic solum figura Rapunculi spicati cærulei- adposita, cum jam descriptus sit.

**I. RAPUNCULUS alpinus** sive Pyramidalis minor: Radix Rapunculi forma: caulis unus, sesquipalmaris, foliis pallide virentib. per ambitum crenatis, acuminatis, unciarum latis, tres longis, alternatim cingitur: in summo flores pauci, cærulei, campanulæ forma, pedicellis annexi & filamento oblongo ex eorum medio prodeunte, donati propendent: quibus singulis capitulum oblongum, pertusum ut in campanula perfici folia succedit, cui semen minutum includitur: in Italia provenit, sed locus excidit.

Rapunculus alpinus corniculatus.



**II. RAPUNCULUS alpinus corniculatus**, quem nomine rapunculi alpini spicato simili, ante annos viginti duos in Phytopinace, dein in Matthiolo emaculato, descriptimus; nunc vero diligentius, cum eam ex Baldi rupium fissuris, absq; radice eruerimus, ut figura nostra in Matthiolo exprimit, postmodum à D. Neudorffero cum radice, & perfecte oblongata: Bellidis cæruleæ forma accepimus.

Radice est tuberosa inæquali, quasi ex pluribus grumis compacta, alba, digiti crassitie aliquando lignosa, pallida, rugosa & palmari: ex qua cauliculus (modo unus, modo plures) tenuis ac striatus, unciarum quatuor exurgit: folia, quæ saturate virentia, tenuia, ad radicem aliquando ex rotunditate oblongata: Bellidis cæruleæ forma communiter subrotunda, crenata, Alliarie forma, sed minora, pediculis uncias quinque vel sex longis prædita, ex radice una cum cauliculis exurgunt: quæ vero cauliculis & quidem pediculis brevioribus adhærent, longiora sunt & angustiora, profundius, sed rarius, incisæ, quorum quina vel sena, stellæ in modum umbellæ subjiciuntur, quæ cauliculi summo insidet, & ex floribus viginti, etiam pluribus, arcte junctis & ex cæruleo purpurascensibus constat, qui, ex calicibus pediculis latis brevibus & striatis donatis prodeunt: ex singulo calice flos unus, ad exortum tumidus, oblongus, sensimque angustatus, & in extremitate crenatus, formam cucurbitæ virescens referens, in medio tumore, incisuræ superficiariæ quinque conspiciuntur: apertus, ex foliolis quinque compositus, filamenta aliquot exhibet, inter quæ unum longe producit, in summo bipartitum, aliquando instar capreoli vitium contortum: semen non fuit observatum. In Baldi montis jugis, inter præcipitia propendet, ubi Augusto mense florentem anno 1578. collectum, quod cum Patavii D. Guilandino ostenderemus, Rapunculum montanum, à D. Cortufus, Cantabiscam alteram Anguillaræ nominabat. Io. Pona in suo Baldo ante annos quindecim excuso, Trachelii petræi minoris nomine proposuit.

**III. CAMPANULA alpina latifolia flore pullo**: hæc cauliculo est tenuissimo palmo minore, qui ad partem usq; mediam, foliis uncialibus, subrotundis, alternatim dispositis, leviter crenatis, pallideq; virentibus, cingitur: at pars superior

È

nuda

nuda est, cui fere semper unicus flos, mediæ magnitudinis, pulli coloris insidet. In alpebus Austriaci, ut Sneeberg & aliis D. Burserus reperit, & Rapunculi alpini latifolii nomine, misit.

IV. *CAMPANULA alpina linifolia cærulea*. Ex radice tenui, alba, cauliculi quaterni, quini, plures paucioresque, palmares, & sesquipalmares, graciles, rotundi, simplices, emergunt: foliis oblongis angustissimis, confuso ordine septi: flores summitate cærulei, ut in Rapunculo vulgari, quibus capitula, exiguum semen continentia, succedunt. Hæc rupes & summa juga montis Wasserfall, Julio mense florens, exornat.

*Campanula alpina rotundifolia minor.*



*CAMPANULA alpina rotundifolia minor*, à Clusio sub *Campanula alpina* minore describitur: verum figura quam addit est *Campanulæ rotundifoliæ vulgaris minoris*, quare veram figuram adposuimus.

V. *CAMPANULA rotundifolia minima*: plantula est unciarum trium, ex cujus radícula alba, capillari, oblonga, exurgunt cauliculi (sæpe unus, plerumque terni, quaterni) tenuissimique, subrubentes & ad radicem subhirsuti, majori ex parte nudi, singuli unicum flosculum subcæruleum deorsum nutantem, calathi forma, ex unico folio sex angulo compositum, sustinent, quibus capitula foraminibus pertusa, ut in reliquis campanulis, succedunt: foliola habet potissimum ad radicem, exigua, subrotunda, ferrata, rigidiuscula, quandoque rubentia. Hanc in Rhætorum alpebus, cum Italiam peteremus, anno 1577. Septembri mense adhuc florentem inter saxa copiosissime observavimus, nec altiore invenire licuit: quam cum D. Cortuso ostendissemus Cantabricam Plinii nominavit. Plinius l. 25. cap. 8. suæ Cantabricæ, quæ per Divi Augusti tempora à Cantabris reperta fuit, caulem junceum, pedalem tribuit, in quo sint flosculi oblongi veluti calathi: in quibus semen perquam minutum, & quæ ubique nascatur.

VI. *CAMPANULA Cymbalariae foliis*: ex radice exigua capillacea & albicante, cauliculi tenuissimi, virides, nonnunquam palmum superantes, & mox in alios brachiat, prodeunt: quibus folia rara, subrotunda, hederacea, vel potius *Cymbalariae* foliis similia, angulosa, viridia, tenuia, longis pediculis donata, sine ordine adherent: flores cærulei, oblongi campanulæ forma, aliquando summis cauliculis, aliquando pedicellis binuncialibus, ex eorundem lateribus exurgentibus, insident. Hæc non longe Tolosa in Ericetis provenit, & quia vix sola sustinetur,

Ericetis incumbens exurgit: eandem etiam circa Lutetiam D. Chérolerus legit.

2075

Campanula serpillifolia.



Campanula foliis subrotundis.



VII. *CAMPANULA serpillifolia*: Totaplan-  
ta, floribus exceptis, serpillum refert: nam  
radice est tenui, obliqua, tenuissimis fibris capil-  
lata, & hinc inde repente: cauliculis plurimis  
rubentibus in terram reflexis, cui novis fibellis  
adherent, qui in ramulos plures tenuiores divi-  
duntur: quos foliola Serpilli, vel potius Num-  
mulariæ, quæ flore est purpurascens, forma sub-  
rotunda, duo semper opposita, quædam majora,  
quædam Serpillo minora, crenata, subtus palli-  
de virentia, pediculis brevissimis, & levissime  
pubescentibus, ambiunt: cauliculi aliquando in  
pediculos nudos, flores sustinentes desinunt: ali-  
quando ex cauliculorum lateribus pediculi tri-  
unciales in summo nudi floribus ornati exur-  
gunt: flores bini vel terni campanulæ forma, ex  
cæruleo rubentes, deorsum nutantes, singuli sin-  
gulis pedicellis donantur. Hujus ramulum à D.  
Bauhino fratre primum habuimus, dein in Bal-

do cum floribus legimus: tum à D. Paschali Gal-  
lo, qui eam in Rhætia ex rupibus dependentem  
collegit.

Similem, sed foliis inferne albidioribus & su-  
perne pallide virentibus, in Insula Toupinam-  
bault Brasilianorum natam, D. Burferus com-  
municavit.

DE TRACHELIO SIVE CAMPA-  
NVLA HIRSVTA.

CAPVT II.

I. *CAMPANULA foliis subrotundis*: ex radice  
tenui repente, caulis sesquipalmaris levi  
lanugine pubescens exurgit, quem folia  
pauca, subrotunda, uncias duas pene longa, lata-  
que, pediculo oblongo donata, tenuia, subaspe-  
ra, per ambitum crenata, cingunt: in caulis sum-  
mo flores pauci, dilute cærulei. Campanulæ for-  
ma, deorsum pendentes, ex quorum medio sty-  
lus

Ius exurgens, extra florem fertur. Hanc cervicariæ minoris rotundifoliæ nomine D. Sigfridus, Helmftadio mifit.

Hæc à campanula hortenfî Rapunculi radice differre videtur altitudine, foliorum longitudine, florum magnitudine & numero, quæ pro radicibus multas, tenues, transversas & oblique repentes fibras, habet, ita ut ex hortorum areolis vix extirpari poffit, à quibus radices oblongæ, candidæ, Rapunculi radicibus fimiles, demittuntur.

II. CAMPANULA Drabæ minoris foliis: ex radice Rapunculi minoris forma, caules fefquipalmares, lanugine leviffima afperfi prodeunt,

Campanula foliis Echii floribus villofis.



quos folia, Drabæ minoris foliis fimilia, subrotunda, viridia, unciam longa, femunciam lata, per ambitum crenata, & in acumen falcigata, fubafpera, pediculis carentia, alternatim veftiunt: flores pauci, fubcærulei, fexanguli, calathi forma, mediocris magnitudinis & pediculis oblongis donati, fummo cauli infident. In pratis circa Valefianorum Thermas copiofe provenit, unde D. Burferus attulit.



Campanula foliis Echii.





III. *CAMPANULA* folijs Echij floribus villosis: ex radice oblongiuscula, folia angusta quatuor & quinque uncias longa, subaspera, prodeunt; inter quæ caulis palmaris, rarius pedalis, rotundus, subasper, paucis brevibus & angustis foliis vestitus, exurgit, ex cuius summitate flores unciales, lati, Campanulæ forma, quini, feni, cærulei, alternatim dispositi, brevibus pediculis dependent: quorum extremitates, quemadmodum & calices, pili oblongi, pappi instar, ambiunt. Hæc in Baldo repetitur & Helvetiorum alpinibus Gorthardo & monte Frasco: diversa plane à Trachelio montano historiæ Lugdunenſis.

Hujus & minor species, quæ minus hirsuta, semipalmaris, foliis brevibus, cauliculo gemino, ex quorum quolibet reflexo, unicus, illo tamen minor, dependet: quam ex Helvetiorum alpinibus D. Burſerus attulit.

Campanula adhuc alia datur foliis Echii, quam cum Cluſius nomine Trachelii *Öuzerida* descripſerit, nullam vero figuram adpoſuerit, eam præcedenti jungere volumus.

## DE RAPISTRO.

## CAPVT III.

**R**APISTRUM floribus Leucoji marini: plantula semipalmaris est, radice oblongiuscula, alba, fibellis donata, cauliculis trium quatuorve unciarum: foliis vulgari Rapistro luteo similibus, parvis, uncialibus, crenatis, & subasperis: flosculis parvis subcæruleis, Leucoji marini similibus, quibus reliquæ parvæ, angustæ, semen minutum continentes, succedunt. Circa Massiliam in rupibus D. Burſerus legit.

II. *RAPISTRUM* monospermon: ex radice longiuscula albicante, parum fibrosa, caules pedales, quandoq; altiores, rotundi, tennes, ramosi, eleganter virentes, leviterq; hirsuti exurgunt: folia humi sparsa, crassa sunt, Rapi foliis similia, ad principium laciniata, dein subrotunda, leviter sinuata & subhirsuta: flores secundum cauliculos palmares & tennes, velut in spica dispositi, quadrifolii eleganter lutei aureive, quibus similia succedunt rotundæ (eleganter propter strias, per eas quemadmodum in semine Coriandri discurrentes) in filamentum oblongum abeuntes: quæ quasi geminæ sibi insident, paræ tamen superiore majore, cum in ea semen par-

## Rapistrum monospermon.



vum oblongiusculum, sed unicum (unde ei nomen) contineatur. Hujus semen, nomine Lampsanæ monospermi, D. Doldius misit, & hic Basileæ in horto D. Zvingeri, Majo mense floruit.

Hoc ipsum postmodum, sed multo strigosius (illud enim cultura elegantius) in agris qua Augustam Rauracorum itur, ad rubram domum observavimus: idem sed humilior & valde ramosum, foliis parvis, eleganter viribus, in agris: circa Huningen ad sylvam, invenimus: & simile Monspelio, ubi quoque sponte crevit, habemus.



## DE NAPO.

## CAPUT IV.

**N**apus sylvestris Cretica: foliis est ad palmi longitudinem accedentibus, instar foliorum Rapistri albi, vel Irionis vulgaris, in lacinias octo vel decem divisas, per margines crenatis, asperis: caule albido, rotundo, ramofo, subaspero, summitate, cui flores non insident, aculeata, floribus (quos non vidimus, ut nec radicem) siliquæ angustissimæ biunciales succedunt, quæ semen exiguum nigricans continent. Ru-  
niadis agrestis nomine, ex Creta ab Honorio Belli accepimus: & à Cretensibus

συλῆστρος vocatur.

## DE RAPHANO.

## CAPUT V.

Raphanus aquaticus alter.



**R**APHANUS Creticus: ex semine Cretico ab Honorio Belli, Ramolo nomine misso, Raphanus in hortis nostris crevit, cujus planta tota, toto habitu à vulgari non dissidebat; radice oblonga alba & gustus acerrimi; caule non adeo alto: foliis minus hirsutis & asperis, flore modo purpureo, modo albo: siliquis & seminibus minoribus.

Raphani aquatici duas figuras, tanquam optimas, adposuimus, sed sine descriptione: cum is, qui foliis est in profundas lacinias divisus sub Radicula sylvestri, à Dodonæo: sub Raphano syl. aquatico, à Lobelio in editione Belgica: Raphano aquatico à Tabernamontano, sive sylvestri & palustri in historia Lugdun. describatur: alter vero, nomine Rapistri aquatici à Tabernamontano exhibetur.

Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias divisus.



## DE DRACUNCULO.

## CAPVT VI.

**D**RACUNCULUS alpinus folio scabiosæ: radicebus est fibrosis, cauliculis rotundis, pedalis, in summo in alas brachiatis: foliis instar scabiosæ laciniatis, alte incisus & crenatis, alternatim dispositis & pallide virentibus: flosculis, in summis virgulis, quoad discum medium subluteis, quem foliola alba, ut in Chamæmelo vulgari, ambiunt. In Helvetiorum pratis alpinis prope Fabarias & in Gotthardo provenit, Iulioque floret.

Eruca latifolia.



## DE ERUCA ET SINAPI.

## CAPVT VII.

**I.** ERUCA latifolia: hæc caule est cubitum excedente, albo, crasso, striato, ramoso: foliis glabris

pallide virentibus, ad radicem pedalis, profundis incisuris laciniatis, per quorum medium nervus latus excurrit, quem utrinque foliorum lacinæ biunciales, alarum instar, triangulares, corosæ, figuræ diversæ, inferne & superne continuæ cingunt: quæ vero in caule breviora sunt, & horum quædam Erucae vulgaris foliis similia, suprema vero angusta & parum sinuata: in caulibus summo flores satis magni, aurei, quadrifolii, staminibus plurimis donati, quibus siliquæ oblongæ strictissimæ succedunt. Erucae nomine in horto sata: an forte Eruca tertia Anglica, in horto Camerarii?

**II.** ERUCA sylvestris minor Bursæ pastoris folio: ex radice crassiuscula, cauliculis palmo altior, subasper, brevibus alis brachiatus exurgit: folia ad radicem sparsa, sesquiunciam longa, Bursæ pastoris medicæ modo laciniata, subspera, in caule nulla, nisi quæ alis, & quidem vix laciniata, subjiuntur: flores subaurei, satis magni, longis pediculis insidentes, quibus siliquæ breves succedunt. Monspeluli collecta.

**III.** ERUCA sylvestris minor incana: ex radice cauliculi læves, virentes, quatuor, sex & octo unciarum, in plures alas unciales divisi prodeunt: folia ad radicem plura, biuncialia, tenuissime laciniata, quæ etiam cauliculos alternatim cingunt, omnia incana sunt: flosculi plurimi, pallide lutei, quibus strictissimæ & breves siliquæ succedunt: Monspelio D. Rumbaum attulit.

**IV.** ERUCA lutea sive Barbarea flore pleno: hæc à vulgari magnitudine differt: caule est crassiore & striato, sed brevior: foliis uncialibus: floribus nonnihil quam in vulgari majoribus, aureis & plenius. Inter segetes Paterniacenses, & juxta Arburg arcem Bernatum, lunio floret.



*Eruca cærulea in arenosis crescens.**Eruca maritima Italica.*

V. *ERUCA cærulea in arenosis crescens*: Ex radice rufescente, oblonga, tenui, leviter fibrosa, caules plures palmares, rarius sesquipalmares striatos, hirsutos, ramulis aliquot brachiatos, emittit: folia ad radicem per terram sparguntur, erucæ vulgaris instar sinuata, & quasi circumrota, hirsuta, aspera, sesquiuncialia, sed etiam breviora & angustiora, quæ in caule rariora sunt, minus sinuata & aliquando integra: flosculi elegantè cærulei, vel purpuro-cærulei, quadrifolii, filamentis brevibus donati, ramulorum extremis insident, quibus siliquæ oblongæ, tenues & læves, semen minutum subrufum & acre includentes, succedunt. Provenit apud nos locis arenosis, ut iis quæ Birsa alluit: sic quibusdam in locis in muris reperitur: imo etiam altissimis jugis & petris circa Dellspergam & Lauffen Rauracorum: in Phytopinace, & Matthiolo, addita figura, quoque descriptimus.



VI. *ERUCA maritima Cretica* siliqua articulata: tota planta albicat, folia habens ad radicem breviora, angusta, in minores lacinias divisa & subaspera: cauliculis est palmaribus, reflexis, striatis (flores non conspecti) siliquis plurimis, incurvis, articulatis, trium quatuorve unciarum, asperis, semen minutum subrufum continentibus, quam ex Creta Honorius Belli misit.

*ERUCA maritimæ Italicæ* siliqua hactæ cuspidi simili, figuram perfectam adposuimus, cuius tres diversæ una cum descriptione (inter quas una ex Lobelio desumpta, qui nomine

Cakile Serapionis *Erucæ* folio, napi flore exhibuit) in Lugdunensi historia proponuntur.

*Eruca Monspeliaca* siliqua quadrangula  
echinata.



VII. *ERUCA* Monspeliaca siliqua quadrangula echinata. Hanc Monspessuli anni 1579, ubi collegiſſenſus, ſic deſcripſimus, quemadmodum in

Phytopinace videre eſt: ex radice ſemipalmari craſſiuſcula, leviter fibrata, albicante, caules ad exortum purpureſcentes, terni, quaternive, pedales, aliquando cubitales, rotundi, ſtriati, ſubſperis, in ramos brachiati exurgunt: folia ad radicem humi ſparſa, pauca, oblonga, anguſta, ſinuata, hirsutæ aſperæ, bina ternave ſimul juncta, in caulibus, præſertim ſiliquis onuſtis, pene nulla, oblonga, leniter ſinuata: ſtoſculis eſt luteis quinqueſoliis, quibus ſiliquæ ſuccedunt quadrangulæ, in apicem acutum rigidumque deſinentes, leves, oblongo pediculo inſidentes, per maturitatem duriffimæ: quarum quælibet latera quatuor obtinet, quæ ad formam alarum per cæcis eleſata, in medio ſinum oſtendunt: his per longum diſſectis, utrinque duæ capſulæ diſtinctæ conſpiciuntur, in quarum qualibet, ſemen unicum ruſum, cochleæ inſtar convolutum acuminatum & acre continetur. Iunio menſe florentem & ſiliquas ferentem, legimus. Hanc videtur Herbarii Lugdunenſis auctor, ſub *Sinapi echinato* voluiſſe proponere, verum figura vitioſa & deſcriptio non ſufficiens.

*SINAPI* parvum ſiliqua aſperæ: radice eſt oblonga craſſiuſcula & capillata, ad quam folia plura, *Eruce ſylveſtris* minoris forma, ſed minoris forma, ſed minora, in lacinias tenuiſſimas diſviſa, & acria: cauliculi plures, recurvi, leves, duarum triumve unciarum (rariffime cauliculus palmaris erigitur) in alas unciales brachiati: flores parvi, pallide lutei, quibus ſiliquæ multæ ſtriætæ, unciales & aſperæ, in latera divaricatæ, ſemen minutiſſimum continentes, ſuccedunt: circa Monſpelium provenit.

Resedæ affinis Phyteuma.

Erysimò similis hirsuta alba.



DE RESEDA.

## CAPVT VIII.

**R**ESEDA linariæ foliis: ex radice candida, longiuscula, caulis cubitalis rotundus, in ramos palmares diuisus, foliis linariæ strictissimis, oblongis, viridibus vestitus exurgit: rami singuli, in florum oblongam veluti spicam abeunt: quam flosculi parui, muscosi, tenuibus capillis mentis ornati, ut in Resedæ minore alba (quam Sesamoidem parvam Salamanticensem Cuiusvis nominat) pallide flavescentes constituunt: quibus capitula vel vascula angulosa, bifida, exili semine pallido plena, succedunt. Hæc in solo arenoso conuallium montium Pyrenæorum, à D. Bursero collecta.

RESEDA affinem facimus eam quam Phyteuma Montipchensium, Lobelius & Lugdunenses



vocant, describunt & depingunt: verum cum foliis nunc oblongis, nunc in aliquot lacintas diuisis reperiatur, una figura exprimitur voluimus.

DE ERTYSIMO.

## CAPVT IX.

**E**RTYSIMO similis hirsuta: ex radice oblonga, alba, lignosa & fibrosa, caulis modo unus, modo plures cubitales, aliquando subrubentes, striati, hirsuti, aliquando in ramulos brachiati, exurgunt: folia plura, ad radicem humiliora, aliquando pediculis carentia, sequentibus longiora, aspera, hispida, subalbicantia, per ambitum crenata, rarius laciniata, & quæ in caule minora sunt, cumque basi latiore cinguntur: secundum ramulorum longitudinem, veluti in spica flosculi albi, quadrifolii, pedicellis, insidentes, qui in siliquis oblongas, strictas, seminum



## DE PERSICARIA.

## CAPVT X.

nutum continentes .abeunt. Provenit locis fa-  
xosis, ruderibus, muris, ut hic Basileæ ad mœnia,  
ad arcem Mönchentsein, primoque vere floret:  
Monspessuli quoque in ruderibus umbrosis, sed  
per omnia minor: rarius in arenosis, ut apud nos  
ad Wiefam fluvium, Patavii similiter collegi-  
mus, & hanc D. Guilandinus Dryophanon Pli-  
nij lib. 27. cap. 9. Drabam alteram & Thlaspi spe-  
ciem: at D. Cortusus, Erysimum tertium nobis  
nominabat: postmodum Barbaram muralem  
Joan. Bauhinus frater appellavit. Hujus descri-  
ptionem & iconem, in Matthiolo emaculato,  
exhibuimus.

PERSICARIA angustifolia; ex radice nigrican-  
te, fibris oblongis capillata, caules plures  
cubito altiores, rubentes, læves, geniculis  
distincti exurgunt: quos folia, Persicariæ vulga-  
ris foliis triplo, quadruplove angustiora, duas,  
rarius tres uncias longa, ambiunt, & in summo  
in ramulos brachiantur, quibus spicæ oblongæ,  
floribus pallide purpurascensibus ornata; ut in  
vulgari insident. In humidis circa Michel-  
feldam, æstate florens, repe-  
ritur.

Nasturtium hortenfe latifo-  
lium.



Nasturtium hortenfe crispum angusti-  
folium,



Nasturtium hort. crispum latifolium.



DE NASTURTIO.

CAPVT XI.

**N**ASTURTIVM hortense duplex est, plano & crispo folio: illud latifolium, cuius solum

figura adposita, & angustifolium vulgarius: hoc, quod crispum similiter duplex est.

I. NASTURTIVM hortense crispum: hoc, foliis exceptis, cum vulgari convenit: hujus enim folia crispa sunt: estque duplex, latifolium & angustifolium, quemadmodum binis figuris in Matthiolo exhibuimus (cum sæpius in hortulo nostro creverit) & hic repetere placuit.

II. NASTURTIVM pratense parvo flore: ex radice tenui, fibrosa, caulis cubitalis, viridis, varie incurvatus exurgit, foliis atrovirentibus, oblongis, Erucae sylvestris minoris, aut Sij forma, utrinque longis petiolis in lobos subrotundos, aliquando oblongos divisis, & per ora dentatis, cincti: in caulis summo, flosculi parvi albi, velut in umbella dispositi, quibus siliquæ parvæ semine minutissimo refertæ succedunt. Circa Montembelgardum locis humidioribus provenit. Suspiciamur Matthiolum, quem Tabernæmontanus secutus est, sua figura Sisymbrii aquatici alterius, duas plantas miscuisse: ita ut florum umbella, huic jam descriptæ, folia vero, Nasturtio pratensi vulgato magno flore, conveniant.

☞ (: ) ☞

NASTUR

*Nasturtium aquaticum majus & amarum.*



*Nasturtium alpinum minus Resedæ foliis.*



**NASTURTIIUM** aquaticum majus & amarum, quod Thalius nomine Sifymbrii alterius specie secunda descripsit, & sæpe inter Nasturtium aquaticum supinum reperitur, à quo sapore amaro potissimum distinguitur, hic describere nolimus: at figuram adponere, cum nullus eam exhibuerit, voluimus.

**III.** **NASTURTIIUM** sylvestre minus: ex radice tenui capillacea, cauliculi plures (& quantum ex sicca colligere licet reclinati) trium quatuorve unciarum emergunt: foliis Nasturtij vulgaris forma, sed minoribus, per terram sparsis & etiam cauliculos cingentibus: in quorum summo flosculi parvi albicantes, valvulae exiguae, ut in Iberide, vel Butsa pastoris minima. Hoc primò vere, ad alveos aquarum falsugine imbutarum Franckenhusij Thuringiorum, copiosissime erumpit, unde D. Furerus cum aliis elegantissimis, I-

beridis pusillæ, seu Nasturtii sylvestris Franckenhusiani nomine, misit.

**IV.** **NASTURTIIUM** alpinum minus Resedæ foliis: ex radice alba tenui & oblonga, cauliculi leves, tenues, recurvi, communiter indivisi, palmoque minores prodeunt: foliis longis pediculis, instar Resedæ vulgaris, præditis, in lobos tres, vel quatuor subrotundos, divisis: flores in cauliculorum summis albi, mediocris magnitudinis, quibus filiquæ strictissimæ, sesquiunciales succedunt. In Rhætorum alpinis Julio florens, reperitur. Verum ex Helvetiorum alpinis & Pyrenæis, longe minus habemus, ita ut tota planta absque radice uncias tres non superet.

**V.** **NASTURTIOLUM** alpinum capsula Nasturtij hortensis: radice est lignosa, parum fibrosa, cauliculis uncias duas non excedentibus: foliis parvis, angustis, crassis, angue brevioribus: flos-

culis parvis albis, capsulis satis magnis, Nasturtio hortenſi ſimilibus. In Rhætia monte Nombre prope Balneum Worms, æſtare floreus, Ioh. Bauhin. frater collegit.

VI. NASTURTIIUM alpinum Bellidis folio majus: Ex radice caulis cubitalis rotundus, lævis, ad exortum ſtatim diviſus, prodit: folia habet tenuiſſima, bellidis forma, uncias quatuor longa: quæ vero in caule ſunt, pediculis carent, & inſtar Thlaſpi vulgaris lato ſemine, leviter ſinuata, cum ambiunt: flores albi, in caulis ſummo, quaſi in ſpica uncias ſex longa, quibus ſiliquæ triunciales, angulæ, ſemine ruſcente, rotundo, plano, reſertæ, ſuccedunt. Circa Fabarias Thermas, ad aquæ deſluxum, D. Burſerus legit.

VII. NASTURTIIUM alpinum foliis Barbareæ: Radice eſt parva, capillacea, albicante: caulicu-

lis pluriſibus tenuiſſimis, frigidus, reflexis, non nihil villoſis, non in ſeminalibus ſiliis, ſemipalmatis, palmatis & nonnullis cubitalibus: foliis ad radicem pluribus, parvis, tenuiſſimis, viridibus, foliorum Barbareæ modo, ſed minus frequenter ſinuatis, quæ in cauliculis raro ſunt, & quædam minime ſinuata: ſiſculis eſt minimis albis: ſiliquis oblongiſculis & ſtriſtiſſimis. Hoc Cardamine aut Erucæ pecu-

liaris nomine, D. Burſerus ex Austria, ſed in ſinibus Bohemiæ collectum, tranſmiſit.



*Thlaspi villosum* capsulis hirsutis.



DE THLASPI.

CAPVT XII.

similia, atroviuentia, glabra, pediculis carentia, cingunt: flores parvi, albi: siliquæ Bursæ pastoris forma, sed majores: Non longe Monspelio, in horto Dei dicto, D. Burserus collegit.

II. THLASPI vaccariæ incano folio minus: Totâ planta villosa, & incana est: ex radice crassiuscula, rufescente, cauliculi semipalmares, etiam minores, recurui & quasi repentes, villosi & incani prodeunt, foliis parvis incanis, vaccariæ similibus, pediculis carentibus & alternatim dispositis, vestiti: in quorum summitate flosculi plures, albi, quasi in subrotunda spica uniti, quibus thecæ parvæ succedunt. Hoc in agris Monspelienfibus repens, & in Provincia prope Massiliam, paulo majus & erectius reperitur.

III. THLASPI villosum capsulis hirsutis: ex radice tenui, oblonga, albicante, caulis pedalis unius rotundus, villosus exit: ad cujus exortum folia aliquot humilstrata, longis pediculis donata, orbiculato cuspidè, hirsuta: quæ vero in caule, longe breviora, pediculis carentia, latiore basi ipsum amplectuntur, quorum quædam leviter crenata sunt: flores albi quadrifolii: siliquæ magnæ, hirsutæ, compressæ, longo pediculo donatæ, superiore parte fissæ, utriculis duobus præditæ, in quibus semen rufescens, acri sapore præditum, continetur. Hoc anno 1577. in horto Patavino (postmodum Monspeluli sponte natum) collegimus: cujus semine, in Italia pro vero Thlaspios semine, olim usos fuisse, ex D. Cortuso cognovimus: hoc in Phytopinace primum sub 19. Thlaspi, dein in Matthiolo, figura addita, exhibuimus.



I. THLASPI vaccariæ folio, Bursæ pastoris siliquis, quod est cubitali, rotundo striato, lævi, viridi, ramolo, quem folia vaccariæ

IV. THLAS-

Thlaspi Creticum flore albo.



IV. **THLASPI** Creticum flore albo: radice est oblonga, paucis fibris donata, cauliculis palmum superantibus, rotundis: foliis paucis, oblongis, angustis, lævibus, alternatim caulem vestientibus: in cauliculorum summo, flores candidi magni, quibus thecæ magnæ, apice medio donatæ succedunt. Hoc Thlaspi, Cappadocici fructantis flore albo perennis nomine, D. Doldius Norinbergâ milit.

V. **THLASPI** saxatile rotundifolium: Ex radice alba, longa, fibris carente, sublignosa, cauliculi plures, tenues, pedales, reflexi, & fibris capillaceis, deorsum millis, terræ affixi, prodeunt, foliis est parvis, subrotundis, tenuibus, inter quæ cauliculi palmares, nudi exurgunt, flores paucos pallidos sustinentes, quibus siliquæ parvæ, tenuissimo filamento donatæ, semen minutum concludentes, succedunt. In locis petrosis circa oppidum Lauffen M. Hagenbachius reperit.

Thlaspi alpinum minus capitulo rotundo.



VI. **THLASPI** alpinum folio parvo crenato: vel Thlaspi alpinum minus capitulo rotundo: à radice crassa, è rupium fissuris prodeunte, caules exurgunt tenues, palmares & sesquipalmes in ramulos brachiati: folia habet ad radicem plura, brevina, acuta, leviter crenata, longis pedicellis donata, in caule pauca & angustiores flosculi in summo albicantes, quibus folliculi copiosi, oblongis pedicellis insidentes, tenues, subrotundi, septo membranoso distincti, semen minutum flavum & acre continentes, succedunt. Provenit in monte Wallerfall, & in Helvetiorum ac Rhætorum alpinis. Hujus in nostro Matthioli & figuræ & descriptionem, sub Thlaspi saxatili minori folio exhibuimus: & Thlaspi alpini majoris iconem addidimus: utramque & hic exhibemus.

VII. **THLA-**



Thlaspi alpinum majus capitulis rotundis.



Thlaspi montanum incanum luteum.



VII. THLASPI alpinum repens: ex radice oblonga, cauliculi plures, per terram repanditrium quatuor vel quinque unciarum, foliis parvis subrotundis, inordinate dispositis, vestiti prodeunt, floribus copiosis magnis & albis ornati, quibus siliquæ, Thlaspi bellidis folio similes, succedunt: sapore est Erucæ. D. Burser. ad Thermas Fabarias Helvetiorum, dein in Austria collectum, transmissit.

Variat ratione loci: illud enim foliis est leviter hirsutis, floribus communiter purpurascens, rarius albis: hoc vero foliis est glabris, floribus albis.

Et sic Thlaspi montani incani lutei serpillis folij majoris figura erat adponenda, cum minus recte sculptor, apud Lobelium nomine Thlaspi supini lutei, expresserit.

VIII. THLASPI biscuratum villosum flore calcarati donato: caule est cubitali hirsutie aspero, summitate in alas brachiato: quem folia crassa, villosa, aspera, per marginem profundis incisionibus crenata, quædam sinuata, uncias duas longa, semiunciam lata, usque ad summum, basi lata vestiunt: flores habet luteos, magnos, calcarati ut in linaria donatos, quibus peltæ duæ rotundæ unitæ, semen continentes, & in apicem oblongum desinentes, succedunt. In saxosis Gallo provinciæ Bormij non longe ab Insulis Stechadibus provenit, unde D. Burserus attulit.

IX. THLASPI fruticosum leucoij folio latifolium: caulibus est pedalis rotundis, lignosis, quos folia pallide virentia, Leucoij forma, sed breviora & angustiora, vestiunt: flores in summitate pallidi, magni, & vascula bifurcata. Circa Massiliam D. Burserus legit.

G


Idem,

Idem, sed minus & foliis angustioribus, ex Italia, Thlaspi perpetui nomine, habemus.

X. *THLASPI Alexandrinum*: planta est elegantissima, dodrantalis, ex cujus radice singulari, caules plures in ramulos brachiati, prodeunt, & ad divisiones singulas, folia subrotunda perfoliatae instar, ramulos ambiunt: à ramulorum extremitatibus, ex pediculis dependent siliquæ plurimæ, fere circinatæ, ut in Thlaspi tenuifolio Fuchsii, eoque ordine, sed majores. Nasturtii vulgaris fere magnitudine, in angulum oblongum cum cuspidē desinentes, quæ in partes duas finduntur, & membranulam tenuem relinquunt. Hoc apud Iohan. Bauhinum fratrem vidimus, quod à

Cortuso accepit, ut in Phytopinace monuimus.

*Bursa pastoris major loculo oblongo.*



DE BURSA PASTORIS.

CAPVT XIII.

I. *BURSA* pastoris major folio non sinuato: radice est longiuscula tenui, aliquando capillata: caule palmum superante, communiter uno (rarius pluribus) ramoso: foliis atroviuentibus, ad radicem longis pediculis donatis, quæ circa caulem alas duas habent & basi completuntur: floribus & thecis cum vulgari conuenit. Basileæ in arenosis: Italiæ sylvestribus, circa Monspelium (ubi tamen longe minor est) quoque notauimus.

II. *BURSA* pastoris major loculo oblongo: radix tenuis, fibrosa, inutilis & alba, cauliculum palmarem, hirsutie asperam ramosum, aliquando vix semipalmarem, sed alis carentem, emittit; ad cuius exortum, folia aliquot inter se viridia, humistrata, uaguis magnitudine, ovali figura, serrata, hirsutie aspera: quæ vero caulem ambiunt, pauca sunt & pediculis carent, flosculi in summo multi, parui, congesti, albi, quibus oculi parui oblongi, è petiolis oblique tendentibus succedunt: quibus semina duo, parua, fulua, acris saporis, includuntur, quæ loculo maturo aperto, & tantum altera parte foliacea relicta, decidunt. Apud nos locis siccioribus & campestribus, Martio florens & loculis onusta reperitur, ut in Phytopinace monuimus. Monspessuli, Thlaspi Veronicæ folio nominatur, & hanc videret Dactyl. Columna,

sub Draba minore murali discoidæ descripsisse.

63. a. 5.

*Bursa pastoris alpina hirsuta.**Myagrum monospermon latifolium.*

III. *BURSA pastoris alpina hirsuta*: radicē est unciali, foliis copiosis pallide virentibus, in orbem humi stratis, mollibus, incanis, lenticulę magnitudine, leviter crenatis, aliquando integris: cauliculis aliquot tenuissimis, leviter hirsutis, pene nudis, tres quatuorve uncias longis: flosculis parvis, albis: oculis flavescentibus oblongis, multo quam in vulgari majotibus, semen minurum rufum continentibus: in alpihus Helvetiorum, ut monte Praeto & Spligel, reperitur.



DE MYAGRO.

CAPVT XIV.

I. *MYAGRUM foetidum*: ex radice caules cubitales, aliquando sesquicubitales, virides, crassi, rotundi & asperi exurgunt, quos folia pallide virentia, subaspera, levissime sinuata, quatuor vel quinque uncias longa, sesquiunciam lata, alternatim cingunt, qui in summo in alas breves dividuntur; quibus flores pallide lutei, longis petiolis donati, veluti umbellę insident, hisque utriculi orbiculati, minurum semen continentes, succedunt. Hoc apud nos in arenosis ad pontem fluminis Wisen repertum, quod ad differentiam vulgaris, ab odore, foetidum appellare placuit.

II. *MYAGRUM monospermon latifolium*: caule est cubitali, aliquando altiore, rotundo, tortuoso, varie & inæqualiter brachiato: foliis vulgari viridioribus, latioribus, linea alba divis, obtusis, latiore basi caulem amplexantibus, iis quæ ad radicem sunt, Cichorii sativi modo laciniatis, reliquis aliquando sinuatis: floribus luteolis, parvis, quibus utriculi oblongi peræ similes, superne in duas extuberantias desinentes, quorum medio apex insidet, per maturitatem, uti & totus fructus, durus: in cuius utriculi medio, cavitas unica, semen unicum (unde nomen) rufum, oblongum continens. Sapore *Myagro* non respondet. Hoc in horto D. Felicis Plateri primum, dein in horto Illustris Ducis Wirtembergici, quod Montembelgardii frater coluit, (cui semen Bricourrues nomine missum fuit) legitimus: ex Euganeis quoque accepimus, & Pleudoisfatidem ab Alpino vocari intelleximus. In Phytopinace primum sub s, dein in Matthiolo figura addita, descriptissimus.

III. *MYAGRUM monospermon minus*: ex radice parva, tenui, capillata, albicante, caulis unus vel alter tenuis, pedalis prodit, foliis paucis tenuissimis, pallide virentibus vestitus: quorum ea, quæ ad radicem per terram sparguntur, parum sinuata sunt, pediculis oblongis donantur, & unciam lata sunt: at quæ in summo caulis, basi sua in alas abeunte, caulem amplexantur: in summo flosculi albi, conglobati: quibus utriculus parvus, semen continens, succedit. *Monspelsuli*, non longe à monte Calcaris, D. Burserus collegit.

IV. *MYAGRO similis filiqua rotunda*: radix caulem cubitalem, hirsutum, fragilem, in ramos varios brachiatum, emittit: cui fossa ad radicem hirsuta, aspera & succulenta, quæ masticata, cum visciditate levem acrimoniam exhibent, sex uncias longa, sesquiunciam lata: quæ vero caulem ambiunt minora, pediculis carentia & alata: flores pallidi, minuti, quasi in spica semipalmari dispositi, quibus semen parvum, rotundum rugosum, in apicem desinens, quodlibet pedicello oblongo insidens, primum viride, per maturitatem nigrum, medulla flava, oleaginosa

*Myagro similis filiqua rotunda.*



plenum, succedit. Annua est planta, ex semine deciduo renascens, Julio & Augusto florens. Ioan. Bauhino in horto Montembelgardiano nomine alicujus *Myagri* crevit. *Monspelio* prope Lunellam natum, Lepidij & à D. Doldio.

*Thlaspi* nomine Norinberga, accepimus.



## DE DRABA.

## CAPVT XV.

I. **DRABA** tenuifolia velut spicata: radice est oblonga, tenui, albicante, caulibus pedalis, aliquando cubitum superantibus, fragilibus brevibus brachiatis: foliis paucis, tenuibus, pallide virentibus, nonnihil in ambitu dentatis, triuncialibus, unciam latis, basi lata caulem cingentibus, alatis, gultu fervente & acris prodeunt: floribus albis, parvis, in cauliculis palmaribus, quasi in spica natis, quibus singulis semen rotundum parvum, longo pedicello infidens, succedit. Hanc Bononiæ D. Agerius legit, & Drabam ferventem vernam nominari affirmavit.

II. **DRABA** flore cæruleo galeato: ex radice fibrosa albicante, Asclepiadi simili, gustus fervidioris aromatici, caulis unus (aliquando dico) cubitalis, lævis, striatus, in ramos brachiatus, exurgit: quem folia pauca vestiunt, quorum inferiora subrotunda, lævia, per marginem crenata, uncias duas longa, uncia minus lata: superiora verò angusta, acuminata & dentata, floribus est cæruleis galeatis, ut in Orchide, unciam longis, alternatim in caule dispositis. Lutetia D. Cherlerus, ex Gallia Narbonensi, D. Burserus, attulere.

## DE COCHLEARIA.

## CAPVT XVI.

I. **COCHLEARIA** minor erecta: Ex radícula capillacea, cauliculus tenuis, lævis, palmo minor, prodeunt: foliola habet ad radicem pauca, exigua, oblongis capillaceis pedicellis donata, & quæ cauliculum alternatim ambiunt, lente minora sunt, exiguis pedicellis donata & instar Cochleariæ Britannicæ sinuata: in cauliculo summo, flosculi albi, quibus siliquæ parvæ, oblongæ, semen minutissimum nigrum continentes, succedunt. Hæc in Daniæ Insula Amagria, in autumnò à D. Olao Worm collecta, & Hassnia, Cochleariæ nomine transmissa fuit. Similem sed palmarem, cauliculo crassiore in duos ramulos diviso, ex eodem loco, D. Caspar, Bartolinus misit.

II. **COCHLEARIA** Danica repens: hæc unciarum trium est, radícula & foliolis priori similibus, sed numerosioribus, inter quæ cauliculi semiunciales, minutulis flosculis albis ornati: Hæc eodem quo prior loco provenit, humi instar herbæ cancri serpit, omnino folijs, floribus, seminum loculis & gustu priori respondens, quem admodum D. Olao Worm perscripsit, & D. Bartolinus, Cochleariæ marinæ parvulæ repentis nomine misit.

## Brassica spinosa.



DE BRASSICA.

CAPVT XVII.

I. **N**APOBRASSICA. Radicem habet Napo, aut Carotæ pene similem, admodum fibrosam & villosam, ut barbata aut pilosa, propter multiplices & minutas fibras, dici possit: & licet frequenter fibram pollice crassiorē habeat, attamen semper prima radix tuberosior & longior, quæ Napum imitatur, conspicitur; ex hac caulis sesquicubitalis, lævis, rotundus, in ramos brachiatus exurgit: folia ad radicem, una cum pediculis oblongis, palmatis. Brassicæ sylvestris modo & subrotunda, & in profundas laciniâs divisa; quæ vero in caule oblonga sunt; angusta, sinuata, pediculis carentia: flores lutei, intensioris coloris, quam in vulgari, magni, qui in cauli palmum excedente, inordinate longis pediculis insident, quibus siliquæ angustæ, unciales

succedunt. In locis frigidioribus agri Norici montanis potissimum & versus Bohemiam colitur, & ab incolis Dorfen vel Dorschen appellatur. Radix eius apta est, quare aliqui eam ut Brassicam floridam condiunt: pauperes minutim ut Rapas concidunt: sic per hyemem in cella in arena, vel ad cibum, vel ad semen sequentis anni, asservatur. Aliquando radix propter nimiam æstatis frigiditatem & loci angustiam, lignosior evadit: quare post sationem, in area spatiosa plantanda est.

II. BRASSICA spinosa. Hujus solum binos ramulos habemus, quorum descriptionem subjungamus: caulis lignosus, crassus, in ramulos duos, alterum palmo majorem, alterum minorem, rotundum, lævem, striatum dividitur: circa quæ folia biuncialia, & semiunciam lata, per ambitum leviter sinuata, quibus & minora interjiciuntur: ramuli in spinas acutas, unciales & minores abeunt. Ramulum unum Patavii in horto Bembiano natum, à D. Camerario; alterum ex horto D. Alpini privato accepimus, cujus figuram etiam Matthiolo nostro addidimus.

III. BRASSICA sylvestris alpina: ex radice exigua, alba, caulis palmo altior, rotundus, lævis exurgit: foliis est tenuibus pallide virentibus, leviter sinuatis, circa radicem oblongis, plerisque uncialibus. in caule paucis, pediculis carentibus: in summo flores albi quasi in umbella dispositi, longiusculis pedicellis donati: siliquas non vidimus. Hanc in Austriæ montibus natam, Turritis alpini nomine, D. Burserus, misit.

DE ACETOSA.

CAPVT XVIII.

I. **A**CETOSA America foliis longissimis pediculis donatis: ex radice caules plures, rotundi, striati, læves, cubitales, in terram reclinati, prodeunt, qui mox in plures ramos oblongos brachiantur: folia habet pallida & veluti nitroso pulvere obsita, angulosa, non tamen ut in vulgari bifurcata, aut alata, sed potius Atriplicis forma biuncialia, & pediculis triuncialibus donata, mollia, carnosa, sapore acido, ex quorum sinibus alæ surgunt, foliis minoribus, sed eadem forma: in quorum, ut & caulis summo, flores exigui, muscosi, veluti in spica dispositi, emicant: quibus fructus foliacei (ex tenuibus rufescentibus membranis, elegantissimis venulis, veluti in Fritilla-



allaria, per eas discurrentibus, compositi) ut in aliis, sed quadruplo, quam in vulgari majores, ex parvis pedicellis dependētes, succedunt: quibus semina triangularia oblonga, rufescentia & splendentia inclusa continentur. Hanc aliquot annis in horto aluimus.

II. ACETOSA rotundifolia alpina: planta palma minor, ex cujus radícula, folia quina, fœna, violæ luteæ alpinæ modo rotunda, unguem lata, pediculis tres, etiam quatuor, uncias longis & tenuibus donata, prodeunt, & inter hæc, cauliculus lœvis & nudus sexuncialis, exurgit: in cuius summo flosculi muscoli parvi, veluti in spica unciali, cui foliolum simili forma subjicitur. Hæc in muris Nosodochii, quod in monte majore Bernhardi Helvetiorum est, provenit, unde D. Fleischer attulit.

III. ACETOSA scutata repens: radiculis est rufescentibus, cauliculis nodosis, tenellis, per terram repentibus, uncias quatuor longis: foliis unguem latis, sed longis pediculis cauliculos æquantibus, donatis, formam scuti, vel potius Aronis folium referētibz, in medio tamen utrinque sinum obtinentibus & in apicem desinentibus. In horto Patavino nata.

IV. ACETOSA Cretica femine aculeato: radice est parva, rufescente, fibrola, in summa tellure hærente: cauliculis quandoque pluribus palmam superantibus, humi reclinatis, quandoque uno, sed in ramulos brachiato: foliis parvis, oblongis, pediculo donatis, auriculis carentibus: flosculis multis, exiguis, muscosis, circa ramulos semipalmares in modum spicæ alternatim dispositis; quibus semen succedit, tenuibus membranis aculeatis inclusum, cui pediculus oblongus, incurvus, tenuis, ut in Caltha additur. Junio floruit & semen maturuit, anno 1594. in Illustr. Ducis Wirtebergici horto, qui Montembelgardi colebatur, femine Florentia à Casabona misso: Hanc in Phytopince & Matthiolo, figura addita, Acetosæ Creticæ nomine, proposuimus.


V. ACETOSA lanceolata angustifolia repens: hæc cauliculis est pedalibus, rotundis, striatis, per terram sparsis, foliis ternis, quaternisve, alternatim in caule dispositis, unciis quatuor à se invicem distitis, angustissimis, crispatis, uncias quatuor longis, lanceam referentibus, cum ex

Acetosa Cretica femine aculeato.



pediculo in alas duas utrinque bifurcatas abeant, sensimque angustiora reddantur: floribus est minutulis, rubentibus, spicæ oblongæ adhærentibus. Hæc in arenosis circa Norinbergam reperitur, unde D. Doldius anno 1604. misit.



*Lappathum maritimum foetidum.**Centaureum alpinum luteum.*

DE LAPPATHO.

CAPVT XIX.

**L**APPATHUM maritimum foetidum: radice est & caule atrorubente. pedali, incurvo, quem folia atrorubentia, subrotunda, longis pediculis donata, & uncialia interdum sinuata, communiter alata, ambiunt: ex quorum sinu ramuli exurgunt, similibus foliis cincti, quorum superiora leviter per ambitum dentata sunt: in caulis summo flosculi quadrifolii, muscoli, quasi in spica dispositi: quibus utriculi foliacei, subrotundi, satis magni, semen continentes, succedunt. Hæc dum viret, gravis odoris est, & in maritimis non longe Monspelio provenit.



DE CENTAURIO MAIORE.

CAPVT XX.

**C**ENTAURIUM alpinum luteum: radicem habet rectam, profunde descendentem, crassam, parumque fibrosam, substringentem & Centaurii majoris sapore fere præditam. Caulis est sesquicubitalis, etiam bicubitalis, rotundus, striatus, in alas brachiatus: foliis ludit, quæ enim ad radicem palmaria, & sesquipalmaria uncias quatuor lata, inæqualiter laciniata & crenata, glabra, pallide virentia, nervo albo folium percurrente: at quæ in caule sunt, planta florescente, quædam cubitum superant, quædam palmaria sunt, & in partes decem, duodecim, pauciores, pluresve, uncias quatuor longas, semunciam latas, per marginem leviter dentatas, ita secantur, ut folia peculiariter esse videantur. Flo-

res lucci, Centaurio majori similes, ramulis insident: ex calice enim squamoso, florum stamina plura prodeunt: ex capitulo ante meridiem liquor pellucidus, & Mannæ instar dulcis, in guttis seu stillis sponte exudat, & capitulum compressum & succuin, altero tamen die hunc humorem emittit. Floribus semina Centaurij similia, aliquanto tamen minora, succedunt. In monte Baldo provenit: plantam & semina, D. Doldius Norinberga quoque misit.

*Beta Cretica semine aculeato.*



*DE BETA.*

*CAPVT XXI.*

**B**ETA Cretica semine aculeato: ex radice tereti, brevi, parum fibrosa, caules plures cubitales, per terram sparsi, rotundi, striati, ad radicem levi hirsutie canescentes, in ramulos effusi, exurgunt: folia habet pauca, Betæ nigrae similia, sed minora, longis pediculis donata: flores parvi, ex flavo virescentes: fructus statim ad radicem multi conspiciuntur, & hinc inde per caulem, ad quodlibet fere folium asperi, extruberantiis donati, in aculeos tres, in latera reflexos abeunt: in cujus cavitate, granum unum continetur, forma seminis Adonidis subrotundum, in apicem abiens, duplici membrana rufa testum, interiore, proxime medullam albam farinaceam cingente. Hanc primum in horto D. Zvingeri, Iulii mensis principio florentem & Augusti fine semine prægnantem, eamque aridam legimus, & nunc à multis annis in horto nostro, colimus: cujus descriptionem in Phytopinace primum, dein in Matthioli, figura addita, exhibuimus.



*Atriplex sylvestris lappulas habens.*



CAPVT XXII.

**A**TRIPLEX sylvestris fructu compresso roseo vel stellato: à radice caulis exurgit pedalis, rotundus, incurvus, lævis & albus, qui statim in aliquot ramos inæquales, & hic in alios minores, dividitur; folia habet alba, quasi polline aspersa, unguem lata, sinuata vel angulosa, ut in Atriplice sylvestri, quæ Pes anserinus dicitur, pediculis carentia: his fere singulis, fructus foliaceus, pallidus, compressus appo-

nitur, cujus formam elegantem vix exprimere licet: is enim in medio leviter extuberat, quatuor alis extuberantiis, in circumferentia adpositis, quas tamen sinus leves intercedunt, ea plane forma, quæ rosæ depressæ, in quorundam nobilium insigniis pingi consuevere: in singulis quatuor extuberantiis, semen compressum, medioeris magnitudinis continetur. Si fructus hi mori rudimentum exprimerent, ad Atriplicem sylvestrem bacciferum Clusij referti posset: Hanc Monspessuli circa mœnia collegimus.

II. ATRIPLEX sylvestris lappulas habens: ex radice parva fibrosa, cauliculi palmares, striati, emittuntur, quos folia atrovirentia, parva angulosa, alternatim disposita, brevibus pediculis donata, cingunt: ad quorum exortum lappulæ duæ, Coriandri feminis magnitudine, adherent, semen nigrum, parvum, compressum continentes. Hanc Atriplicis syl. insipidæ parvæ erectæ nomine, D. Doldius misit; at in monte Ventoso Galliæ Narborensis, altius excrevit. Hanc in Phytopinace sub octava descripsimus, etiam in Matthiolo, ubi figura à sculptore non satis recte expressa addita, quare aliam in nostro Theatro, si Deus volet, & etiamnum, proponimus.

III. ATRIPLEX maritima angustifolia: caule est subcano, lignoso, cubitali, ramoso, in spicis, alias breviores, alias longiores, pallide flavescentes, & maculis nigris punctatas abeuntibus: foliis inferioribus uncias duas, absque pediculo longis, angustis, crenatis, nigricantibus, superioribus, angustioribus, & plerisque crenis carentibus: plura non licet, cum solum ramum sic cum Ruppellæ collectum, D. Rûmbaum attulerit.



DE HALIMO.  
CAPVT XXIII.

**H**ALIMUS minor: ex radice tenui, capillata, caulis cinericeus, palmum superans, varie incurvatus exurgit, qui paulo supra radicem, in ramulos plures tenues, uncias tres longos, abit: foliis paucis cinericeis, & oblongo rotundis: sed in ramulis angustioribus nonnullis iustar Atriplicis, utrinque una lacinia divisus: flosculi plures, parvi, herbacei, muscosi, intus luteoli, longis pedicellis, per ramulorum summities sparguntur: quibus vascula quadruplicia, semen parvum, griseum, reniforme, continentia, succedunt. Hic infra Northufam in der gülden Aylt provenit, ut ex literis D. Fureri colligere est, qui plantam nomine Halimi aurei arvi anno 1617. transmisit.

Cynocrambe Dioscoridis.



## DE CYNOCRAMBE.

## CAPVT XXIV.

**C**YNOCRAMBE Dioscoridis: ex radice oblonga, tenui, fibrosa, viticuli plures, palmares, quandoque longiores, rotundi, striati, læves & succulenti, virides, aliquando parum rubescentes, reclinati, geniculis plurimis distincti, prodeunt: ex quorum singulis emergunt primum foliola duo, Alfines forma subrotunda, mox alternatim ex una parte eodemq; loco folium sextuplo majus, oblongo pediculo donatum, oxalidis rotundæ folio oblongius, quadam veluti aspergine obsitum, succedit: tandem ad idem geniculum, alia decuplo minora, bina, terna, etiam sena norantur: juxta quæ ab ima radice, ad viticulorum summa internodia, flosculi, bini, terni, quaterni, muscosi, ex herbaceo albidii, plurimis filamentis donati: quibus succedunt fructus rotidem, geniculis inter folia hærentes, Mercurialis forma, sed minoris, rotundi, duriusculi, primum virides, postea ex nigro cinerei, medulla alba referti. Herba gustu est insipido & aquoso. Monspensuli locis umbrosis legimus: mox cynocrambe nomine & plantam & semen, à D. Cortuso accepimus, quæ copiose nobis provenit. Hanc videtur doctiss. Columna in suo Phytobasano, Alfines nomine expressisse, quam in Matthiolo descripsimus, & figuram adposuimus.

32075

*Lactuca folio oblongo acuto.**Sonchus asper laciniatus Creticus.*

DE LACTUCA.

CAPVT XXV.

**I.** *Lactuca folio oblongo acuto*: hæc radice, caule, floribus, aliis lactucis similis est, & solum foliis differt, quæ leviter sinuata sunt, palmum longa, uncias duas lata, in acumen fastigiata, & nervo per folium excurrente elevato. Huic, *Lactuca Gallica*, apud Durantem, valde similis est, quam à Ioan. Bauhino fratre accepimus, & in horto Montembelgardiano postmodum legimus.

**II.** *Lactuca Italica laciniata*: hujus folium tenuissimum est, pallide virens, in plures partes semipalmares & laciniatas divisum: per reliqua vulgari *Lactucæ* similis, quæ esu tenerissima: ex semine Italico in horto copiose crevit.



DE SONCHO.

CAPVT XXVI.

**I.** *Sonchus asper laciniatus Creticus*: ex radice, cauli scubitalis, inæqualis, striatus, asper, cavus & ramosus exurgit: foliis ad radicem palmariis\* & sesqui palmariis, primis quidem vix laciniatis, aliis vero in plures & magnas laciniatas divisis, & in circumferentia nonnihil asperis: floribus est luteis, magnis, quorum singuli singulis oblongis pediculis insident, qui aliorum more in pappum in quo semen latitat, abeunt. Hic ex semine ex Creta accepto in horto crevit.

**II.** *Sonchus asper*, subrotundo folio: ex radice exili, longiuscula, cauliculus rotundus\*, palmaris, aliquando sesqui palmaris, parte inferiore brevissimis aculeis exasperatus, exurgit: circa quæ filia pauca,



pauca, subrotunda, sesquiuncialia, quorum quædam sinuata, omnia tamen per marginem, ut & nervus per folii medium excurrans, levissimis aculeis exasperantur: in cauliculi summo duo tresve pediculi, quorum singuli unum florem Hieracio similem, parvum, luteum, qui in pappum abit, sustinent. Monspelii sponte nascitur, & Sonchus aspera vulgi flore Hieracii nominatur.

Est hujus & minor species, capillari radícula à qua pedicelli bini, quatuor vel sex uncias longi, aliquot vero vix unciales, unicum florem parvum luteolum sustinentes, exurgunt: flori, semen minutum nigrum, pappo adhærens, succedit: circa radicem folia sena, septena, parva, obtusa, per latera dentata. Ibidem reperitur.

III. *SONCHUS lævis* in plurimas tenuissimas lacinias divisus: caule est viridi, lævi, striato & pedali, in summo in alas brachiato: foliis in plures angustas lacinias divisus, ad caulis divisionem majoribus: floribus luteis mediocribus & in pappum abeuntibus, Monspelluli ad muros, ut & Florentiæ, apud quos in acetaria venit, provenit.

IV. *SONCHUS angustifolius maritimus*: radice est palmari: tenui, fibris carente, foliis ad radicem pluribus, atroviresentibus, uncias quatuor, quandoque sex longis, rarius unciam latis, per margines spinulis exasperatis, & reliquorum Sonchorum instar lac fundentibus, inter quæ caulis unicus, palmaris & sesquipalmaris, tenuis, lævis, duobus tribusve foliolis sua basi eum cingentibus, ejus summo flos unus, (rarius duo) satis magnus & luteus insidet, & tandem in pappum abit. In litore Veneto ad Lio primum, dein circa Monspelium, ætatis initio collegimus.

V. *SONCHUS montanus lævis laciniatus minor*: ex radice crassiuscula caulis in principio crassus & lignosus, rotundus, lævis, statim in alas brachiatus, ad cubitalem altitudinem accedens, exurgit: foliis est sesquiuncialibus, in paucas lacinias, late distantes & acuminatas divisus: flores in caulis summo, veluti in spica alternatim dispositi, parvi, & palliduli. In montibus Euganeis frequens est.

VI. *SONCHUS villosus luteus minor*: ex radice rufa longiuscula, fibris carente, cauliculi bini, terni, rotundi, nonnihil villosi, palmum superantes, & in summo in ramulos binos, ternosve

*Sonchus montanus lævis laciniatus minor.*



divisi, prodeunt: folia pauca ad radicem, uncias quatuor longa, sed angustissima, lacinias late à se distantibus & lævibus, divisa, quæ circa caulem strictissima & uncialia: flores in summis ramulis intense aurei, ex parvis capitulis, suavi tomento villosis prodeuntes, in pappum abeunt. Tota planta leviter tomentosa est, & à quibusdam

Hieracium tomentosum dicitur. Monspelluli in luco Gramuntio provenit.

☉ o (30)

## Cichorium spinosum Creticum.



DE CICHORIO.

## CAPVT XXVII.

**C**ICHORIUM spinosum Creticum: ex radice oblonga, mediocriter crassa, fibris paucis donata, denso cortice albicante tecta, caulis durus, lignosus, mox in ramos multos palmares, virides, striatos, late diffusos brachiatus, qui omnes in oblongas, communiter bifurcatas, aliquando trifurcatas quasi spinas, seu cornua finiunt: folia circa radicem plura per terram sparguntur, quæ oblonga, angusta, acuminata & Cichorii vulgaris modo in ambitu circumfusa, vel in plures lacinias superficiarias & subrotundas divisa, quæ in cauliculis angustiora, nec circumfusa: amara sunt, non lactescunt & cito pereunt, etiam reliquis plantæ partibus eleganter virentibus. Flores, in ramorum maxime

alis, ex calicibus imbricatis prodeunt, forma vulgaris similibus, sed longe minoribus, cærulei coloris, ex quinque foliis summa parte leviter incisfis, compositi, in quorum medio stamina aliquot flava continentur: his semen vulgari simile, parique thecæ inclusum, succedit. Iulio & Augusto floret. Hoc primum Chondrillæ spinosæ, dein Cichorii spinosi nomine & plantam & semen D. Dold. misit: ex quo in horto D. Zvingeri crevit: postmodum ex Creta ab Honor. Belli Cichorii spinosi appellationes, qui monuit, vulgo *gavvasari*, hoc est, hydriam spinam dici, quo Cretenses in Cichorii defectu utantur. Hujus primum in Phytopinace anno 1596. meminimus, dein in Matthiolo iconem cum descriptione anno 1598. exhibuimus: postmodum Chondrillæ peregrinæ nomine Clusius, & apud eundem sub Cichorio spinoso Cretico Belli, Pona ann. 1601. proposuere.

## DE DENTE LEONIS.

## CAPVT XXVIII.

**D**ENS Leonis latifolius caulescens: caule dest cubitali, hirsuto, rotundo, striato, & cavo; quem folia basi alata, in lacinias aliquot divisa, subrotunda, uncias sex longa, sesquiunciam lata, marginibus nonnihil pilosis, cingunt, quæque in caulis summo tantum leviter sinuata, proxime caulem vestiunt: flos magnitudine fere & colore, sed pallidior, ut in Dente Leonis vulgari. Plantam hanc absque radice ex horto nobiliss. Nicolai à D. Loretio accepimus.

II. DENS Leonis tenuissimo folio: ex radice crassa, rufa & fibrosa, folia aliquot tenuissima, virore splendentia, palmaria, uncias duas lata, primum profunde laciniata, dein quælibet lacinia, ut plurimum utrinque duplici, vel triplici levi lacinia (vel potius apice) subdivisa prodeunt, ut & pediculi tenuissimi, nudi, duabus uncis foliis longiores, florem parvum sustinentes. In Austria prope montem Dravensstein D. Burserus reperit.

III. DENS Leonis minor foliis radiatis: ad radicem parvam nigricantem, folia plura per terram sparsa, uncias tres longa, semunciam lata, in plures lacinias profundas divisa, quibus hoc peculiare, quod quodlibet folium in summo in tres profundas lacinias dividatur, & harum quælibet

ber apices plures, quasi radios obtineat: foliorū pediculi levissimis pilis pubescunt, cauliculi plures, læves & nudi, quorum unus palmo minor erigitur, reliqui breviores reclinati, singuli florem unicū, parvum, luteum, in pappum abeuntē, sustinent. D. Neudorfferus communicavit.

IV. DENS LEONIS minor aspero folio: ad radicē parvā albicantē, folia plura subrotunda, duas tresve uncias longa, unā latā, lacinia- & per ambitum levissimis spinulis, ut in Soncho, exasperata: cauliculus duarum unciarum, florem latius magnum, pallide luteum sustinet. Monspeßuli provenit.

Hieracium dentis leonis folio hirsutū asperum minus.



# DE HIERACIO.

## CAPVT XXIX.

HIERACIUM dentis leonis folio hirsutū asperum minus: radice est parva, oblonga, ad cauliculorum & foliorum exortum rufescente, folia ad radicē pilosa, aspera, angusta, uncias duas longa, in lacinias divisa, inter quæ cauliculi nudi, asperi, modo unus, modo bini, ternive, palmam non excedentes exurgunt, florem unicū, aureum in pappum abeuntē, sustinentes. Monspeßuli provenit.

Idem, sed longe asperius, foliisque latioribus, ex Hispania D. Albinus attulit.

II. HIERACIUM minus glabrum: ex radice albicante, oblonga, tenui, cauliculi palmares, rarius pedales, tenues, læves, virentes, in alas divisi, exurgunt; folia habet pauca, ex virore splendentia, oblonga, angusta, raris lacinias prædita: quorum quædam basi latiore & alata, cauliculum amplectantur: floribus est minoribus, quam in ulla specie, aureis, quorum singuli singulis pedicellis, unciam superantibus, insident, & aliorum more in pappos abeunt. Apud nos circa autumnum florens, in agris reperitur.

III. HIERACIUM dentis leonis folio obtusius minus: ad radicē parvā folia sena, septenave: terræ incumbunt, quæ crassa & aspera, uncias duas longa, unciam semis lata, obtusa, nec profunde laciniosa: inter quæ caulis lævis, nudus, & cavus exurgit, qui florem unum pallide luteum & magnum sustinet. Provenit in pratis: extra minorem Basileam.

IV. HIERACIUM dentis leonis folio floribus parvis: ex radice parva, lignosa, fibrosa, capillacea & albicante, caulis pedalis, rotundus, aliquantum hirsutus exurgit, quem ad radicē: folia pauca, subaspera, coriacea, acuminata, uncias tres longa, semunciam lata, cingunt: in caule ad ejus medietatem pauca, solum dentata, eumque basi sua comitentia: cujus summo flosculi plures, lutei, pedicellis brevissimis insident. Hoc in Gallia Narbonensi circa Massiliam repetitur.

V. HIERACIUM dentis leonis folio bifloro:

bosum: radix ex aliquot oblongis quasi Asphodeli bulbis compolita, de se mittit caulem cubito altiore, nudum, levē, striatum, circa medium in ramos pedales (unum vel alterum) divisum, quorum quilibet florem parvum, subflavum, sustinet: folia ad radicē per terram sparsa denti leonis similiter sinuata & corrofa, inferne molli lanugine pubescentia, superne subaspera, unciam lata, tres longa, Monspelio D. Saltmannus attulit.

VI. *HIERACIUM tomentosum* Hispanicū: tota planta mollis est, incava, tomentosa; radicem habens cortice rufescente testum, caulem palmare, rotundum, incanum: folia ad radicem oblongis pediculis donata; uncias tres quatuorve longa, semunciam lata, mollia, crassiuscula, ad formam foliorum dentis leonis vulgaris sinuata, quæ in caule angustiora, minusque profunde sinuata: cauliculi summo, flores bini, terni, lutei, brevissimis pedicellis insident, quorū singuli ex eleganti calice hirsuto in plures apices diviso, emicant. In aridis & saxosis Aragoniæ, D. Albinus observavit.

VII. *HIERACIUM maximum asperum* Chondrillæ folio: caule est sesquicubitali, crasso, rotundo, inæquali, striato & aspero: in summo in ramos semipalmares brachiato: quorum singuli singulos flores luteos sustinent: folia habet paucā, alternatim caule ambientia, Chondrillæ modo in lacinias divisa, uncias tres longa & hirsutæ aspera. Monspessuli in asperis, quæ loca carigæ vocant, provenit.

VIII. *HIERACIUM alpinum angustissimo oblongoque folio*: ad radicem duriusculam rufescentem, folia plura graminea, palmo longiora, glabra, atrovirentia, observantur: inter quæ caulibus cubitalis, lævis, rotundus, striatus, paucis foliis cinctus & circa medium in plures ramulos divisus, exurgit: ramulis singulis flos unicus, parvus, luteus insidet, cui semen parvum succedit, quod cum suo pappo à vento excutitur. In monte Baldo reperitur.

IX. *HIERACIUM alpinū pumilum* Chondrillæ folio: tota planta palmaris est, ex cuius radicē alba, cortice nigricante testā, folia aliquot prodeunt lævia, pallide virentia, uncias quatuor longa, pediculis longis donata, vix lacinia: inter quæ cauliculus exurgit rotundus, foliis Chondrillæ modo divisis cinctus, qui in summo in duos, tresve

ramulos unciales dividitur, quorum singuli florem unum luteum satis magnum sustinent. Crescit in Sneeberg Austriæ, ubi D. Burserus legit, & anno 1616. Hieracii aphacoidis nomine, transmisit.

X. *HIERACIUM intubaceum flore luteo*. Hoc foliis est intubi, caulem proximè ambientibus, aliis integris, aliis in sinus profundos lacinia, longitudine uncias quatuor, latitudine sesquiunciam superantibus, atrovirentibus & lævibus: caulem habet tenue, pedalem, ramulosum, reclinatū & lævem: cauliculo pene palmari nudo, flos unicus, luteus, mediæ magnitudinis insidet, cui semen parvum pappo inclusum succedit. Hoc (ut & subsequens) Hieracii Aphacoidis nomine à D. Doldio, dein ex Italia, Sonchi Hieracitidis nomine accepimus.

XI. *HIERACIUM intubaceum flore magno albido*: hoc foliis est priore longioribus, larioribus: magisque lacinia: flore etiam majore, albido, medio luteo, foris subrubente.

XII. *HIERACIUM proliferum falcatum*: radicem habet albicantem, oblongā, tenuem, capillatam: folia atrovirentia, dentata, aspera, uncias duas longa, semunciam: cauliculos læves, rotundos, parum foliatis, palmares: capitulum parvum, ex plurimis stylis gracilibus, per maturitatem recurvis, & asperis, compositum, inter quæ flos luteus, medio fuscus: at sub floribus capitulo, communiter utrinque ramulus unus, rarius duo, lævis, nudus, uncias quatuor, quandoque superans, exurgit, quibus utrinque foliolum angustissimum subjicitur, & horum summo similiter flos insidet, & sæpe sub hoc quoque flore, pedicellus flosculum sustinens, emergit.



Hoc minus etiam reperitur, ita ut tota planta, palmum non excedat. Monspessuli in loco Gramuntio reperitur, & quod minus est. Hieracium medio luteum vocant.

XIII. *HIERACIUM minimū falcatum*: plantula est uncias sex non excedens, radícula longiuscula, tenuissima, rufescente, ex qua cauliculi aliquot capilli crassitie, in ramulos divisi, inter folia lacinia, lævia, uncias duas longa, at angusta, exurgunt: flores singuli exigui, luteoli, pedicellis singulis insident, qui instar prioris in stylis minutissimos recurvos & pungentes, absumuntur. In arenoso litore maris non longe Monspelio invenimus.

XIV. *Hier-*

XIV. *HIERACIUM montanum* rapifolium: ex radice rufefcente, oblonga, parum capillata, folia pauca, ad Rapæ vulgaris modum, in laciniis subrotundas, per margines finuatas, & ad tantum asperas, divifa, pediculis oblongis rubentibus & asperis donata, prodeunt: inter quæ caulis cubito altior, cavus, ftriatus, rufefcens, uno altero brevi folio cinctus, exurgit, qui fuperne in ramulos plures dividitur, quorum fingulis, flos communiter unus, rarius duo, pediculis tamen diftinctis infidet, luteus, mediæ magnitudinis, qui tandem in pappum abit. In monte Wafferfall provenit.

XV. *HIERACIUM montanum* foliis dentatis flore magno: hoc foliis eft atrovirentibus, lanugine carentibus, ad radicem maxime difpofitis, uncias quinque longis, unam latis, per circumferentiam & dentatis, & leviffima lanugine pubefcentibus: inter quæ caulis pene nudus, pedalis, cavus, hirsututis afper, exurgit, qui florem unum eumque magnum, faturate luteum, elegantiffimè quali calici inclufum, fuffinet. Hoc in Helvetiorum montibus, Gorthardo, & circa Thermas Fabarias, crefcit.

XVI. *HIERACIUM* ramosum magno flore: hoc caule eft bicubitali, rotundo, fubafpero, in ramos divifo, quibus fingulis, flos magnus, aureus, dentis leonis forma infidet: folia habet pallide virentia, nonnihil afpera, finuata, & per margines exiguis pilis donata, longitudine palmum fuperantia, tres uncias lata, per quorum longi-  



nem, cofta infignis excurrit, à qua per tranfverfum venæ iterantur. In montibus Bellunenfibz reperitur.

XVII. *HIERACIUM alpinum* non laciniatum flore fufco: caule eft fefquipalmarum, hirsuto, parte fuperiore aphylo: foliis ad radicem hirsutis, obfcure virentibus, acuminatis, duas trefve uncias longis, unciam latis: floribus aliquot parvis, fufcis, in pappum (cui fermen parvum oblongum & nigrum includitur) abeuntibus, & caulis fummo infidentibus: quod in Rhæticiis montibus provenit.

XVIII. *HIERACIUM hortense* non laciniatum floribus atropurpureis: caule eft bicubitali, hirsututis afpero, & pene aphylo: foliis ad radicem paucis, palmaribus, uncias tres latis, obfcure virentibus, leviter hirsutis, & per marginem levi lanugine pubefcentibus, floribus atropurpureis, in medio fubflavis & mellei odoris: quod à quibusdam Pilofellæ majoris nomine (liquidem cum Auriculæ muris majore Tragi, multum affinitatis habeat) in hortis colitur: & à priore cultura folum differt videtur.

*Hieracium pumilum saxatile asperum, radice præmorfa.*



XIX. *HIERACIUM pumilum saxatile asperum* radice præmorfa: ad radicem crassiusculam nigricantem, in fibras oblongas, præmorfas abeuntem, folia plura, villosa, acuta, longis pediculis donata, uncias tres, quatuorve longa, semiuunciam lata, in circuitu rarioribus dentibus donata: inter quæ cauliculus palmo minor, hispidus, tenuis & rotundus, uno alterove foliolo vestitus exurgit, florem subluteum sustinens, cui semen parvum, nigricans, pappo immersum, succedit. In alpijs provenit.

Variat: nam & altera est species, foliis subrotundis, duas trefve uncias, absque pediculis binuncialibus, longis, sesquiunciam latis, per marginem crenatis: cauliculo longiore, tres quatuorve flores sustinente, & hoc *Hieracium saxatile asperum* radice præmorfa, folio subrotundo dici potest.

Est & tertia species, radice crassa, caulibus in plures ramulos divisis: quod in saxosis prope Clusam Solodurensum nascitur.

Priori plane simile *Hieracii* parvuli quarti nomine doctiss. Columna p. 2. proposuit, solum in eo differens, quod nostrum hirsutum sit, suum vero glabrum asserit.

XX. *HIERACIUM montanum lanuginosum* laciniatum parvo flore: ex radice oblonga, atrov rubente, folia plura, pediculis uncias tres longis, donata, crassa, profunde laciniata, acuminata, molli lanugine pubescentia, superne atrovirentia, & quasi maculata, alia sesquiunciam lata, alia sesquiunciam lata, alia angustiora, inter quæ cauliculus palmaris, tenuis, mollis exurgit, cuius summo, flores aliquot lutei, parvi, & quidem singuli singulis pedicellis insident. Apud Montspelienfes, in horto Dei crescit.

XXI. *HIERACIUM capillaceo folio*: radice est *Scorzonera* simili crassa, oblonga, tunica fusca & rugosa vestita, ex qua cauliculi bini, palmares, læves, singuli florem unicum, pallide luteum, mediæ magnitudinis, sustinentes exurgunt: folia ad radicem plurima, pili multar tenuia, duas, rarius tres, uncias longa, rigidiuscula, atrovirentia, rarius cauliculorum partem cingentia.

Montspelio D. Saltzmannus attulit,

An forte *Scorzonera* species?



XXII. *HIE-*



*Hieracium murorum angustifolium non sinuatum.*



XXII. *HIERACIUM murorum angustifolium non sinuatum*: ex radice crassa, rufescente, caulis sesquicubitalis, pene nudus, rotundus & asper exurgit, in ejus summo quasi in umbella, flores plures, parvi, lutei, resident, folia ad radicem subnigra, mollia, uncias sex longa, vix semunciam lata, in caulis parte inferiore pauciora, breviora, angustiora, longe à se invicem distantia & inordinate disposita: in muris nostris reperitur: quod circa Patavium, longe minus observavimus.

XXIII. *HIERACIUM* profunde sinuatum pubescens: radice est nigricante, lignosa, fibrosa, caule bicubitali, rotundo, fistuloso, levi lanugine, ut & tota planta, pubescente, in ramos brachiatos: foliis ad radicem oblongis, acutis, profunde sinuatis, etiam laciniatis, oblongis pediculis donatis, per caulem paucis, similiter acute laciniatis: flo-

res singulis pediculis, aurei, in pappum abeuntes, insident: In pratis Michelfeldensibus siccioribus, ad dumeta etiam in dumetis, provenit.

XXIV. *HIERACIUM* fruticosum latifolium glabrum: ex radice fibrosa, nigricante, caules bicubitales, rotundi (levissimis pilis hinc inde aspersis) exurgunt, qui in summo in ramulos breves brachiantur, quibus flores pallide lutei, ut in *Hieracio Sabauda* sive fruticoso insident: hos folia ambiunt alternatim disposita, tenuia, atrovi-  
rentia, acuminata, uncias quatuor vel quinque longa, sesquiunciam lata, per marginem oblongis & raris apicibus donata: hoc in montosis circa acidulas Petrinas Julio floret.

XXV. *HIERACIUM* fruticosum folio subrotundo: caule est cubitali, rotundo, striato, subaspero, qui in summo in ramulos, trium quatuorve unciarum brachiat, qui singuli, singulos flores, pallide luteos, in pappum abeuntes, sustinent, quem folia subviridia, subrotunda, acuminata & dentata, uncias duas longa, sesquiunciam lata & leviter hirsuta, basi sua cingunt: quod *Hieracii foliati* nomine D. Jungermann. misit.

XXVI. *HIERACIUM* fruticosum minus: hujus varietas triplex occurrit: nam licet ex radice fibrosa, & quasi præmorsa, caulis pedalis simplex exurgat, attamen foliis brevibus & lævissimis, circa Patavium: at circa Norinbergam, paucis, brevibus, subrotundis, in circumferentia crenatis & asperiusculis provenit,



*Chondrilla viscosa humilis.**Chondrilla purpurascens foetida.*

DE CHONDRILLA.

## CAPVT XXX.

I. **C**HONDRILLA viminea viscosa Monspeliaca: ex radice oblonga, pallide lutea, caulis bicubitalis, albus, rotundus, striatus, in plures ramos brachiatus, exurgit: folia, caulis partem inferiorem cingentia (prima enim humi sparsa cum cito marcescant ut in vulgari, non notata) saliginis similia, uncias sex vel octo longa, semunciam lata & laevia, rarius una, altera vel lacinia donata: at superiora ramos cingentia, instar Chondrillæ in tenuissimas & acutissimas lacinias dividuntur: flores parvi, lutei, ut in vulgari dispositi, in pappum, cum semen maturuit, evolantes. In aridis aggeribus viarum, aestate circa Monspelum & in monte Lupi, reperitur.



II. **C**HONDRILLA viscosa humilis: ex radice longa, tenui, alba, cauliculi plures, tenues, reflexi, pedales, prodeunt, quos utrinque ad palmæ longitudinem, flores lutei, oblongi, in pappos abeuntes alternatim cingunt: folia habet ad radicem oblonga, angusta, quædam sinuata, quædam integra, & in caule paucissima: in agris Basileensibus autumno florens, invenitur.

III. **C**HONDRILLA purpurascens foetida: ex radice oblonga, tenui, fibrosa, caules plures, ad cubiti altitudinem accedentes, ad exortum parum pilosi; ex rubore obscuro, cum foliorum pediculis splendentes, alias virides & striati, in summitate aphylli, exurgunt: folia ad radicem pluripalmum excedentia, instar foliorum Chondrillæ Sefamoidis dictæ, plus minusve sinuata, & acuminata mollia, aliquando pilis exiguis cincta, nervo folium percurrente, inferne (ut & foliorum

*Iacobæa maritima latifolia.**Iacobæa alpina foliis rotundis serratis.*

Iiorum pediculi) hispido: singulis caulibus, qui raro brachiantur; flos unicus peramœnus, magnitudine & forma *Parmicæ Austriacæ* insidet, cujus discum medium, foliola sedecim & plura oblonga diluto rubore purpurascencia, in apicibus divisa, orbiculatim cingunt: qui, ubi semen maturuit, in paprum oblongum abit. Hanc *Iulio* mense florentem, primum in horto *D. Zvingeri* legimus, & in nostro coluimnis: ferendam vocamus, quia flos, antequam aperiatur, gravem odorem spirat, qui & in foliis aliquantum advertitur.

DE *IACOBÆA*.

**I.** *IACOBÆA maritima* sive *Cineraria latifolia*: hæc ex radice caules cubitales, rotundos, cædido, mollique tomento obductos, in alas brachiatos, emittit: folia inferiora subrotunda,

cum pediculis pedem longa, uncias quatuor lata ad modum *Brassicæ vulgaris* laciniata, & per marginem sinuosa, superne ex viridi nigricantia, inferne incana, quasi cinerib. aspersa & mollia: at superiora minora & acutiora: flores, qui in hac quam vulgari majores, oblongis pediculis incanis & nudis insident, quorum discum aureum folia latiuscula, pallidiora, orbiculatim cingunt, qui tandem in poppos cum semine abeunt. Hanc à *D. Doldio* accepimus.

**II.** *IACOBÆA rotundifolia incana*: radice est crassiuscula transversa, rufescente, in fibras oblongas abeunte: caule pedali, incano: foliis subrotundis, crassis, superne virentibus, inferne incanis, uncias duas absque pediculis, longis, sesquiunciam latis, in ambitu dentatis, at in caule paucis & angustissimis: flos, qui *Scorzonæræ* flori similis, summo cauli insidet, satis magnus & luteus:

luteus: toti plantæ lanugo quidem aspera est. In provincia Galliæ D. Burserus legit.

Iacobæam alpinam foliis rotundis serratis, sub conyza alpina sive montana, Gesnerus pro-

posuit: at Clusius, Iacobæam 4. vel latifoliam 2. nominavit & descripsit: hujus figuram à nemine, quod sciam, positam, addere placuit.

## LIBER QVARTVS. DE TANACETO.

### CAPVT I.

**T**ANACETUM alpinum: herbula est unciarum quatuor, vel sex, odore aromatico prædita, tota incana, & pilis mollibus vestita: radice longa, crassiuscula, foliis uncialibus, tenuissimis, ut in Millefolio alpino, à quo, odore potissimum discernitur, divisis: in caulicorum summo, flores in umbella dispositi, albi & parvi. Hoc in altissimis montibus Helvetiorum & Rhætorum crescit: & hoc forsan Gesnerus in catalogo horum Germaniæ, Ivam Moschatam Rhætorum appellat.

### DE CHRYSANTHEMO.

#### CAPVT II.

**C**HRYSANTHEMON latifolium Brasilianum: caule est aspero, striato, cubitali, quem folia rara, lara complectuntur, quæ circa basin uncias duas lata, quatuor, etiam quinque, longa, sensimque angustiora reddita aspera sunt & per margines levissimis dentibus exasperata, ex quorum sinu pediculi oblongi prodeunt, florem luteum sustinent, cujus discum ex pluribus oblongis luteis apicibus, compositum, folia septem latiuscula, in binas vel ternas crenas fissa cingunt, totusque flos à quinque foliis viridibus inæqualibus veluti umbone sustentatur. Hæc in ramo exiccato, quem Chrysanthemi Brasilianni nomine, ex horto nobiliss. Contareni habemus, notare potuimus.

### DE CHAMÆMELO.

#### CAPVT III.

**I.** CHAMÆMELUM leucanthemum Hispanicum magno flore: caules habet cubitales, striatos, in summo brachiatos, quos folia pediculis carentia, satis à se invicem dissita, cingunt, quæ uncialia, angusta, in lacinias tenues, obtusas, sed bifidas, divisa: florem habet quadruplo vulgari majorem, disco pallide luteo, quem folia circiter vicena, alta, lutea, sinuata ambiunt, cui femina, ut in vulgari succedunt: annum est & odoratum, à D. Gillenio, una cum sequenti & utriusque semine, missum.

**II.** CHAMÆMELUM luteum Hispanicum odoratum: hoc caule & foliis cum vulgari leucanthemo convenit, sed floribus luteis & odoratis, priori quidem minoribus, sed vulgari duplo triplove majoribus, disco luteo, quem folia quatuordecim, luteo colore splendentia, cingunt: in horto meo crevit.

**III.** CHAMÆMELUM leucanthemum incanum Hispanicum minus: plantula est palma minor, radice parva, fibrosa, rufescente, ex qua cauliculus tenuis, uncias quatuor altus, nudus, exurgit, florem unicum, satis magnum, disco pallide luteo, foliis pluribus albis cincto, sustinens: foliola ad radium parva, incana, tenuissime instar Abinthii Galatici, vel Abrotani, divisa, quæ insipida & inodora sunt. In regio Granadæ, ad agrorum margines, D. Albinus collegit.

## DE ABROTANO.

## CAPUT IV.

**A**BROTANUM campestre incanum, Carlinæ odore: huic radix est oblonga, fibrosa, rufescens, caulibus pedalis, folia, eo modo quo Abrotani maris inferiora, divisa, incana, & si terrarum Carlinæ odore, ut & sapore: in reliquis, cum Abrotano campestri convenit. In Aultria, ad Linzium urbem circa vias provenit, unde D. Burserus misit.

## DE ABSINTHIO.

## CAPUT V.

**I. A**BSINTHIUM ponticum Creticum grati odoris: caule est cubitum superante, rotundo, incano, in ramos plurimos, quincunciales diviso, foliis tenuibus, multum divisis, mollibus & incanis: floribus vulgari forma & colore similibus, paulo tamen majoribus. Hoc, quemadmodum Honor. Belli ex Creta anno 1596. (addita planta) perscripsit, in Creta frequentissime provenit, perpetuo virescit, odorem gratum spirat, nihilque amarum est, aut si quam secum amaritudinem habet, ea valde obscura est, in viridi enim, nulla percipitur: ab asinis & pecoribus, omnibusque brutis valde expetitur. Vocatur, *αἰνία*, & non *ἀλσυνθία*, quemadmodum Anguillarum in Græcia vocari perperam scribit: ego legitimum Ponticum esse judico: hæcenus Belli. Hac de re dicturi sumus plenius, si Deus volet, in Theatro nostro.

**II. ABSINTHIUM** alpinum incanum: ex radice rufescente, capillacea, cauliculi plures palmares, reclinati, rotundi & albicantes, foliis quam paucissimis vestiti prodeunt: folia, divisa & colore, Absinthii Pontici tenuifolio incano, similia sunt: ex cauliculorum parte media sursum versus, pedicelli tenuissimi, unciales, cum subiecto foliolo, tenuissime diviso, recti, alternatim exurgunt, qui capitulum squamatum, flores pallidos continens, sustinent: quibus semen minutum, nigrum, Tanacetum odore succedit: tota planta odore & sapore est Absinthii, & in Valesianorum alpidibus, ut in petris supra Gemme, D. Fleissnerus 1606. & D. Burserus 1614. collegit.

**III. ABSINTHIUM** alpinum candidum humile:

radice est crassiuscula, oblonga, rufescente, in fibras abeunte, ex qua folia candida, oblongis pediculis donata, tenuissime divisa, cum cauliculis (aliquando unico) trium, quatuorve unciarum longis, rotundis, albo tomento vestitis & ad exortum reclinatis, prodeunt: quorum summo capitula squamata, plura simul, ut in Stœchade lutea, sed minora, disposita, luteos flores continentia, insident. Tota planta candida est, quatuor vel sex uncias vix superans, & valde amara: ex Gletzerberg, Helvetiorum monte, non longe ab Augusta valle, D. Burserus attulit.

**IV. ABSINTHIUM** alpinum umbelliferum: hoc non tanquam novum proponimus, cum à Clusio, Lobelio, Tabernæmontano, Gerardo, & in historia Lugdunensi descriptum & pictum fuerit, sed quia in hoc varietatem observavimus, & de hoc item esse scimus, quare de hoc pauca aspergere lubet. Nam Nicol. Clavena Bellunensis Pharmacopæus, Absinthii umbelliferi historiam (addita figura) & usum insignem proponens, novum esse Absinthium, & à se primo in montibus Bellunen-sibus inventum, libello Venetiis 1610. cussu asserit: contra quem Pompejus Sprechius, Pharmacopæus Venetus, tractatu peculiaris, sequente anno Venetiis edito, disputans, novum non esse, sed à C. Clusio, pridem nomine Absinthii alpini umbelliferi, propositum fuisse affirmat. Sane occurrit varietas, sed tantum in magnitudine: nam id quod in monte servæ Belluni natum, foliis est latioribus & longioribus, quam sint ejus quod in Helvetiorum alpidibus, & Baldo monte provenit: quo adhuc minus est, quod in Austriæ monte Trauvenslein reperitur, quemadmodum ex horto Patavino habemus, umbella ex minoribus floribus composita, instar Millefolii vulgaris, floribus præsertim antequam aperiuntur, magis conglomeratis: quare tantum ratione loci differre censuimus, & quidem ex plantæ inspectione & examine diligentiore, ut qui in Baldo & Helvetiorum alpidibus collegimus: Belluni natam, Clus. Angelus Busti Medicus Venetus: Austriacam vero,

D. Burserus transmissit.

fit,

## DE MILLEFOLIO.

## CAPVT VI.

I. **M**ILLEFOLIUM maximum umbella alba: caulibus est sesquicubitalibus crassis, rotundis, striatis: foliis circa radicem palmum longis, uncias quatuor latis, tenuissime incisfis & velut è multis minutissimis alatis foliolis constantibus, sed minoribus & tenuissime incisfis, quæ circa caulem sunt, qui in ramos plures brachiantur, quibus singulis umbella, uti in Millefolio vulgaris, sed major, flosculis albis referta, insidet. In horto Patavino crevit.

II. **MILLEFOLIUM** purpureum majus: ex radice crassa satis, caules plures ad cubitum & sesquicubitum excrescunt: foliis ut in vulgatissimo Millefolio dispositis, umbella magna, flores elegantissimos rubri coloris & quinquefolios continens, in quorum medio apices pallide flavescences, qui gratiam addunt, emicant: flores contriti, medicatum odorem spirant. Hoc Gôp-

pingæ primum in Pharmacopæi horto legimus, & nunc in horto colimus: quod Clusius nomine Millefolii rubro flore proponere videtur: an hoc forte Matthiolo Millefolium majus?

III. **MILLEFOLIUM** incanum Creticum, sive Millefolium Dioscoridis: caulibus est lignosis, rotundis, incanis, sesquipalmaribus, foliis Chamaecyparissi forma oblongis, denticulatis, incanis, vel ut Dioscorides, avicularum pennas imitantibus, caules in summitate in ramulos abeunt, qui umbellam satis compactam ex floribus ex albo flavescensibus compositam, sustinent. Hoc ex horto magni Ducis Hetruriæ, primum à D. Paschali (ut in Phytopinace monuimus) dein ex Creta à D. Honorio Belli accepimus: quod legitimum Dioscoridis Millefolium esse censemus, cujus in Epistola 2. Belli ad Clusium, sub Stratiote Millefolio mentio fit, qui in Creta *μυρίφυλο* vocari scribit.



Millefolium aquaticum pennatum  
spicatum.

Millefolium aquaticum cornutum.



IV. MILLEFOLIUM aquaticum pennatum spicatum: ex radicibus fibrosis, tenuibus, rami prodeunt plures, cubitales, cavi, striati, in alas brachiati, aquæ innatantes: ex quorum geniculo quolibet, folia terna, vel quaterna quasi stellatim circumjecta, tenuiter incisa, pennam & forma & tenuitate referentia, colore fusco prodeunt: at cauliculorum summitates palmares, ex aqua recti attolluntur, spicam purpurascentem, lunio & Iulio mensibus, sustinentes, quæ in flosculos copiosos, pallide luteos, simul junctos, Anethi semen forma referentes, expanditur: his succedunt capitula nigra ac prædura, plerumq; quaterna, quina, etiam plura, cauliculorum fastigia, quæ super aquam eminent, rotatim ambientia, quibus singulis cavitas exigua, semen continens inest. Hoc in piscinis provenit, quod primum in fossa arcis Weckenthal in Alsatia, observavimus: & Tragus, Algæ tertiæ, vel Algæ Vergilii

nomine, exprimere voluisse videtur. Hujus ut & sequentis descriptionem in Phytopinace, Matthiolo, & Tabernæmontano emaculato, una cum figura exhibuimus.

V. MILLEFOLIUM aquaticum cornutum: hoc prioris modo aquis innatat, caulibus cubitalibus, tenuibus, ramosis, fragilibus, dense geniculatis, quos folia ambiunt tenuia, capillata, quorum inferiora, cornua cervina æmulantur & exiccata rigescunt: superiora vero, tenuiora, tenuiusq; divisa sunt: ex ipsis geniculis, pediculi, modo trium, quatuorve unciarum prodeunt, singuli, singulos flores, parvos, albicantes, quadrifolios sustinentes: quibus capitulum parvum Ranunculi forma, ex quinque senisve granulis virentibus compositum, succedit. In rivulis circa Hiltelingam, non longe Basilea primum, dein in fossis horti Montembelgardiaci observavimus.

*Consolida regalis latifolia parvo flore.*



DE CONSOLIDA REGALI

CAPVT VII.

**C**ONSOLIDA regalis latifolia parvo flore: ex radice fibrosa, oblonga, rufescēte, caulis cubitalis, rotundus, striatus, levissimam hirsutic albicans, in ramos brachiatus, exurgit: quem folia tripartita primum, dein ad formam foliorum Ranunculi arvensis echinati, divisa cingunt, quę in summo caule pauciora, quędam tripartita, quędam integra: flores sunt subcæreuli, corniculato donati, Consolide regalis segetum similes, aut minores: quibus siliquę oblongę, parvę, semen parvum continentes, succedunt. Hanc Delphinij Dioscoridis nomine, à D. Ferrando Imperato, Pharmacop. Neapol. insigni, accepimus: dein videntē in horto D. Zvingeri p. m. legimus, in Phytopinace descripsimus, in Matthioli. quoq; & Tabernęm. figura sub Consolida regali peregrina parvo flore, posita, in qua tamen sculptor prima folia omisit.

*Chelidonium majus foliis quernis.*



DE CHELIDONIO.

CAPVT VIII.

**C**HELIDONIUM majus foliis quernis, flore laciniato: hoc à Chelidonio majore vulgato, foliis & flore tantum differt: folia enim, quercus tenera folia æmulantur, cum argutius incisa sint & teneriora, superne ex virore nigricantia, inferne pallida, levissime, ut & caulis, hirsuta: flos luteus, communiter quadrifolius, foliis ejus per ora dissectis & velut fimbriatis. Ex horto Philippi Stephani Sprengeri Pharmacopę Heidelbergensis, primum habuimus: dein in horto Montembelgardensi, ubi tota æstate floruit, legimus: quod si in parietinis seratur, formam retinet, lætiore vero in solo, aliquando degenerat. Hujus in Phytopinace meminimus: in Matthioli & Tabernęm. figura addita, descriptissimus: postmodum & Clusius, nomine Chelidoni majoris laciniato folio in sua historia proposuit.

DE

## DE AQUILEGIA.

## CAPVT IX.

I. **A**QUILEGIA montana magno flore: hæc in Aquilegiæ vulgaris altitudinem excre-  
scit quidem, sed foliis primum differt,  
cum in laciniastenuiores, easque non obtusas, ut  
in aliis, sed acutas dividantur, & folia pene sub-  
rotunda sint: sic & floribus est cæruleis, vulgari  
similibus, sed multo maioribus. In monte prope  
Thermas Fabarias copiose provenit, unde D.  
Burserus attulit.

II. **AQUILEGIA** montana parvo flore thalictri  
folio: ex radice parva, folia thalictri forma, sed  
exigua, pallide virentia, prodeunt: inter quæ  
cauliculus tenuis, palmo minor, duobus tribus-  
ve foliolis brevibus, oblongis, minime divisus,  
exurgit, florem unicum cæruleum sustinens, for-  
ma quidem vulgari similem, sed quintuplo mi-  
norem. In Helvetiorum alpibus, reperitur: in Mo-  
ravia, prope urbem Trebis, sub arce Smilo, in  
pratibus vernali tempore copiosissime reperiri, mi-  
hi relatum.

III. **AQUILEGIA** hortensis multiplex flore par-  
vo: hæc ab hortensi, quæ multiplici flore est, so-  
lo flore differt, qui in hac triplo minor, & colore,  
qui pullus est, in horto meo provenit.

## DE NIGELLA.

## CAPVT X.

I. **N**IGELLA latifolia flore majore simplici cæ-  
ruleo: ex radice tenui, oblonga, flavescen-  
te, caulis cubitalis, rotundus, viridis &  
lævis, in summo ramosus, exurgit: foliis ad ra-  
dicem tenuissimè laciniatis, in caule vero aliquân-  
do inferiorum instar tenuissimè divisus: flores au-  
tem quam in cæteris ampliores sunt, quinque-  
folii, folio quolibet unguem æquante, superne  
elegantè cærulei, in versa parte pallidi, venis e-  
latis percurrentibus: floribus succedunt capita  
pentagona, hexagonave dura, in totidem corni-  
cula in latera reflexa superne divisa, quæ mem-  
branis interne intercurentibus, semine subni-  
gro, inodoro, plena sunt. Hæc æstivis mensibus  
in hortulo nunc 23 annis aliquot floret, ex femi-  
ne deciduo, cum annua planta sit, sese propa-

gans: cujus semen, Nigellæ Hispanicæ nomine,  
missum fuit.

II. **NIGELLA** Cretica: radice est oblongiuscu-  
la, tenui, parum fibrosa & flavescente: caule cu-  
bito minore procumbente, striato, viridi, glabro,  
& paulo supra radicem in alas tenues & teretes  
brachiato: folia prima per terram sparsa, instar  
foliorum Consolidæ regalis vulgaris in lacinias  
dividuntur, quæ vero in caulis summo oblonga,  
& ut in Nasturtio, divisa, ex viridi nigricant:  
flos unicus, unguis magnitudine, quinquefo-  
lius, cuilibet cauliculo insidet, colore ab initio  
ex viridi nigricante, mox vero sub cæruleo,  
mucronibus suam viriditatem reservantibus,  
forma Nigellæ arvensis, quæ multo minor est, re-  
spondens: in cujus medio stamina plura, vi-  
ridia, apicibus cæruleis donata: capitula pen-



tagona, hexagonave succedunt, quæ in toridem cornicula longa, instar cornuum hirci intorta, finiunt, quæ semen nigricans minutum continent. Hujus semen ex Creta primo allatum, & à D. Doldio, cum planta, transmissum, ut in Phytopinace monuimus, & figuram cum descriptione Matthiolo addidimus, at in Tabernæmontano emaculato, figura male sub titulo nigellæ flore pleno posita. Hanc Clusius in post. histor. Melanthium simplici flore Creticum nominare videtur.

Ab hac diversa est, quæ in horto nobiliss. Contareni colitur, foliis fœniculi, floribus ex albo flavescentibus, semine nigro, anguloso & acri, quam cum integram non habeamus, plura de ea in præsens non licet.

#### DE HIPPOMARATHRO,

##### CAPVT XI.

**H**IPPOMARATHRI Cretici nomine, ex horto Clariss. Nicolai Contareni, Senatoris Veneti, habemus ramos cubitales, rotundos, læves, striatos, pallide virentes, in alios brachiatos: folia sunt fœniculi modo, in tenuissima, sed longe brevissima segmenta divisa: caulium summitatibus umbellæ parvæ insident: gustantibus

plantæ siccæ folia & caulem, de sapore nihil certe pronunciare licuit: quare ut totam acquiramus plantam, studebimus.

#### DE ANETHO.

##### CAPVT XII.

**A**NETHUM sylvestre minus: radice est albicante, uncias tres longa, tenui, quemadmodum & caulis, qui pedalis, albus, rotundus: foliis est uncias quatuor longis, tenuissime, ut in vulgari, divisis: umbella parva, ex festucis octo vel novem uncialibus composita, flosculis luteis, semine parvo oblongo. In hortulo meo crevit, ex semine à doctiss. Columna, nomine Anethi sylvestris ex Sicilia, misso: quod minus appellare lubuit, cum Cæsalpini, Anethi sylvestris in Sicilia, quod sativo grandius sit, meminerit.

(4) o (30)

Daucus montanus apii folio minor.

Daucus Alsaticus.



DE DAUCO.

## CAPVT XIII.

I. **D**aucus montanus apii folio flore luteo: caule est cubitali, anguloso, glabro, in breves alas brachiato: foliis apii forma, sed brevioribus, per ambitum minime ferratis, quorum pediculus striatus est: umbellas parvas habet, flores elaphobosco similes, luteos. In Calenberg & prope oppidum Baden Austriæ D. Burserus legit.

Huic similem sed per omnia maiorem, caule crasso canaliculato, ramoso, foliis latioribus, minimeque crenatis, umbellis maioribus ex floribus pallidis, in horto Patavino anno 1578. collegimus, quem Daucum tertium Dioscoridis Guilandinus, acipsius successor Cortusus, Pseudopyrochrum nominavit.



II. **D**aucus pratensis apii folio: radice est oblonga, pallide rufescente cortice recta, sapore & odore pastinacæ, sive Dauci officinarum, superne hirsuta & villosa, ex qua alæ prodeunt, foliis pluribus uni costæ inhærentibus, per ambitum incisus & ferratis, forma montani majoris, sed longe minoribus, pallide virentibus: inter quæ caulis pedalis, rarius cubitalis, tenuis, striatus, paucis genicul s distinctus, in ramulos aliquot divisus, exurgit: ramorum extremis, umbellæ candidæ, florum exiguorum insident, quibus semen oblongiusculum, nigricans, aromaticum succedit. Hic in pratis humidis Michelsfeldæ provenit.

III. **D**aucus Alsaticus: radice crassa, oblonga, in fibras crassiores divisa, nactur, cujus summo, multa villosa capita, ut in plerisq; ferulaceis adposita: unde magnæ foliorum alæ exeunt, foliis multis in plures partes dissectis, uni costæ inhæ-

rentibus, ex adverso nascentibus, constantes: inter quæ caulis (modo unus, modo plures) ad viri altitudinem exurgens, subruber, striatus, geniculis aliquot articulatus, in ramos plures, hique in alios divisus, ad quorum genicula minores foliorum alæ: extremos ramulos umbellæ satis magnæ; flosculorum flavescentium, exornant: quibus semina plana succedunt. Iunio & Iulio floret in dumetis Alsatiæ superioris: eundem copiosissime in Alsatiæ inferioris pratis humidioribus, ut inter Scelladium & Argentinam fre-


quenter observavimus. Multum similitudinis habet cum Thyssellino Plinii Lobelii sive Apio palustri Dodonæi: verum Thysselinum, non ita alte exurgit, & tota stirps lacteo succo abundat. Hic Daucus, sapore est & odore pastinacæ.



Scandix Cretica major.



Scandix semine rostrato Italica.





## DE SCANDICE.

## CAPVT XIV.


I. SCANDIX Cretica major: ex radice oblongiuscula, nonnihil fibrosa, caulis cubitalis, striatus, in plures ramos diuisus, & potissimum ad alarum exortum, leuissime pilosus, exurgit: foliis ad radicem, pediculis oblongis, Pimpinellæ saxifragiæ minoris æmulis, latiusculis, subrotundis, ex opposito correspondentibus, per ora oblique dissectis, pallide virentibus, una cum pediculis leviter pilosis: at caulem ambientibus & superioribus, instar foliorum Scandicis vulgaris, tenuissime diuisis: umbellæ parvæ sunt, sparsæ, flores albos, & quam in vulgari maiores, sustinentes: quibus succedit semen rostratum, decem, duodecim & pluribus rostris, subasperis, simul junctis, quorum cuilibet apices duo quasi aculei rigidi, præfiguntur. Hæc Patavio primum Scandicis Creticæ nomine missa, dein ex semine in horto nata, cujus descriptionem in Phytopinace sub 4. dein & Matthiolo addita figura, exhibuimus.

II. SCANDIX Cretica minor: ex radice gracili, oblonga, recurva, alba, cauliculi perbreves, aliquando palmares, tenues, tenui lanugine pubes-

centes, in ramulos, paucos breves & graciles diuisi prodeunt: quibus umbellæ exiguæ, floribus albis, pusillis, paucis, quinquefoliis (licet aliquando flores corymborum modo densi conspiciantur) veluti stylosum cacuminibus insident: his succedunt rostra ut in priori, sed breviora & pauciora (communiter quaterna, quinave in horto observavimus) in apice similiter bipartita, quæ semina sunt. Folia si terantur, non injuvundi odoris sunt & saporis aliquo modo Chæresolii vulgaris. Hanc primum ex horto magni Ducis Hetruriæ à Casabona, Anthrisci Plinii nomine; dein ex Creta ab Honorio Belli, accepimus: quam etiamnum in horto colimus, Majori florentem, & Julio semine prægnantem. Hujus in Phytopinace meminimus, & Matthiolo (ubi icon crassior est) addita figura, sub scandice Italica descripsimus, & postmodum Clusius in sua historia, Anthrisci Plinii, & doctiss. Columna, Aniso Marathri Apuli (à suavi odore & sapore, medio inter Anisum & Fœniculum) nomine proposuere.

Hujus varietas à me observata apud Monspelienfes: nam quæ in saxosis provenit, odore est fœniculi: altera vero, quæ in agris, inodora est.

*Caucalis semine aspero flosculis sub-  
rubentibus.*



*DE CAUCALIDE.*

CAPVT XV.

I. **C**AUCALIS nodosa echinato semine, radix oblonga, tenuis, alba, caules emittit binos ternosve rotundos, striatos, asperos, qui in alios brachiantur: quorum alii semipal-

mares, incurvi, alii bipalmes erecti prodeunt, quos folia pallinacæ sylvestris æmula, at breviora & pauciora, multoque tenuius divisa, aspera, ex virore nigricantia, ad singula pene internodia, oblongis pediculis donata, cingunt: flosculi exigui, ex quinque foliolis compoliti, subrubentes, vel pallidi, aliquando albi, brevissimis pediculis insident: his capitula parva edlinata & conglobata succedunt, in horum qualibet semen unicum continetur. Hanc Iunio mense anno 1578. in horto Patavino collegimus. & in Phytopinace, Caulalidem semine ad caulium nodosecinnato, nominavimus; verum & nomine I. appellæ caninæ Corruſi (Luceria quoque; & ex Angliâ) missa fuit: cujus figuram Matthiolo adposuimus. De qua doctiss. Fabius Columna: Scandici nulla melius nostro iudicio quadrare videtur, ex nobis observatis hucusque plantis, nisi illa quam doctiss. Caspar Bauhinus. pro Caulalide altera nodoso echinato semine addidit, suo Synonymiis ornato Matthiolo, &c.

Caulalidis semine aspero flosculis subrubentibus, figuram addere visum fuit, cum à Cordo quidem & Thallio, sub Daucidide minore describatur, sed huius icon à nemine proponatur.

II. CAUCALIS tenuifolia montana: radice est crassa, ex qua caulis exurgit pedalis, qui statim ad radicem, in cauliculos palmes, rotundos, leves, dividitur, hique in minores subdividuntur; quorum etiam minutissimis alis ad radicem in tenuissima segmenta, & quæ in caule, in capillacea, dividuntur. Semen parvum est, oblongum, striatum: Julio Mense florens, in Sabaudia inter Tarentesiam & Monasterium collecta.

Apium hortense maximum.

Apium peregrinum foliis subrotundis.



DE APIO.

CAPVT XVI.

**A**PIUM hortense maximum: ex radice oblonga albida, & pro plantæ magnitudine tenui, folia prodeunt, pediculis palmari- bus, & sesquipalmaribus, striatis, pallide viren- tibus, tripartito primum diuisa, quorum quodlibet rursus tripartitur, ipsæque particulae triplo quadruplo, quam in Petroselino vulgo dicto majores, per ambitum incisa, pallide virentes: inter hæc caulis cubitalis & sesquicubitalis, tenuis, striatus exurgit, in cuius summitate folia oblonga, angusta, minime incisa, à pictore præ- termissa. Umbellam habet parvam, albam, exi- guis flosculis refertam, quibus semina Petroseli- ni forma, sed duplo triplove majora, gustu non- nihil aromatico donata, succedunt. Nomine A-



pii Anglicani, primum apud nos satum. An for- te hoc Selino Anguillara opinione 7. intelligen- dus, quod in uniuersa Græcia, potissimum in Chio & Creta pro Selino habetur. Hoc in Phy- topinace descripsimus, & in Matthiolo figuram exhibemus.

APIUM peregrinum foliis subrotundis, Clusius sub Selino peregrino primo descripsit: at quia figuram non adposuit, eam hic propo- nimus.



**S**MYRNIUM peregrinum folio oblongo: hujus inferiora folia ex radice prodeuntia, Apii foliis similia sunt, in complures particulas oblongas diuisa, oblongis pediculis donata, per ambitum profundius laciniata, pallide virescentia: quæ vero in caule sunt cubitali, ltriato, non subrotunda, nec duplicia, ut in communi Smyrnio peregrino, sed eorum primum quidem, uncias sex longum, tres latum, per ambitum profundius incisum: superiora vero per quæ caulis ad exortum transit, & simplicia sunt, uncias tres longa, duas circiter lata, & superna quæ leviter crenata sunt, sensim minora sunt: caulis in summo brachiatus, & cuilibet æ ramuli quaterni, rarius quini, biunciales insident, festucis aliquot, umbellam exiguam flosculorum luteolorum sustinentes: quibus semen nigrum, subrotundum, succedit: radicem non vidimus. Hoc in horto, D. Camerarii crevit, & D. Doldius transmisit.

**A**NGELICA sylvestris hirsuta inodora. radicem habet crassam & fibrosam, foris pullo cortice tectam, intus albam, rediuiam & odore medicato: caulem cubitalem, in breues alas brachiatum, parte inferna, paucissimis pilis cinctum, nigrum: folia Angelicæ sylvest. siue Podagraræ æmula, in alas, modo binas, modo ternas, easque aliquando uncias quatuor longas, tres latas, aliquando vix unciales, diuisa, in ambitu profunde incisa atrovirescentia, hirsuta, quarum pediculi hirsutie asperi sunt: umbellam habet parvis floribus albis refertam, quibus semen oblongum nigricans succedit. Hanc ex Lusatia, nomine herbæ Podagraræ cognatæ,

D. Francus misit, cujus in horto Lusatiæ meminit.



## Sphondylium alpinum glabrum.



## DE SPHONDYLIO.

## CAPVT XIX.

**I.** SPHONDYLIIUM hirsutū foliis angustioribus: Hoc à vulgari foliis solum differt: nam cum vulgare foliis sit amplius, plerumq; ex quinque partibus latis subrotundis compositis: hoc folium habet, in lacinias oblongas, angustas, acuminate, hasque in alias, inordinate tamen divisas, & per marginem crenatas. Hoc in pratis alpinis Rhæticis observavimus: dein ex Lusatia à D. Franco accepimus.

**II.** SPHONDYLIIUM alpinum parvum: ex radice caulis exurgit pedalis, qui in summo in alterum ramulum triunciale, dividitur: quem folia cingunt pallide virentia, longis pediculis donata, quæ in partes tres, vel etiam quinque alias

subrotundas, alias acutas, per marginem crenatas & hirsutas, dividuntur umbella flosculis candidis, latis tamen, summo cauli insidet, quibus semen plenum, latum ac tenue, succedit. Tota planta levissimis pilis pubescit. Ex Austria alpinus, D. Burserus misit.

**III.** SPHONDYLIIUM alpinum glabrum: radice est crassa, eaque alba, caule bicubitali, geniculato: foliis ficulneis, glabris, quæ absque pediculis palmum longa, duas lata sunt, communiter tripartitis, sed non usque ad pediculum divisas, per marginem crenatis: quorum inferiora pediculis palmaribus, hispidis & subsæperis donantur: caulis summo, umbella flosculorum candidorum, sed quam in reliquis speciebus minorum, insidet: semen succedit subrotundum, planum, cujus summitati apex infligitur. Hoc solum in monte Wasserfall & quidem ab anno 1595. usq; ad præsentem annum 1618. Julio mense & florentem & semine prægnantem, observavimus.

## DE LIBANOTIDE.

## CAPVT XX.

**L** IBANOTIS latifolia, aquilegiæ folio: radice est crassa, fibrosa, cortice inæquali, quasi rugis transversis asperata, fusciq; coloris, testâ, medulla candida, amara, modicum quid Aroma & Aristolochiam sapore redolens: ad cujus caput, pili tanquam veterum foliorum defluxorum fibræ solidiores & nigre: etenim folia, quæ numerosa ex radice capite longis pediculis emergunt, una parte quasi vaginato exortu (ei mirum ea quæ crassiora & latiora sunt, ut & ea, quæ ex caule prodeunt) eundem, tanquam membranacea filiqua circumdant, articulo crassiore, lineaque transversa: quæ crassa sunt, rigida, glabra, viridia & splendentia, subtus candicantia, fibris majoribus subpurpureis transcurrentibus, quæ licet instar foliorum Aquilegiæ dividantur, non tamen omnia in pares lacinias (Aquilegiæ lacinias latiores) fissa sunt: inferiora namque in vegetiore planta, plerumque quinque folia habent, ex triplici rami divisione, alias tria, tribus pediculis insidentia. Caulis unicus est, cubitos tres quatuorve superans, rotundus, striatus, nodis distinctus, subalbicans, puniceo colore aliquando admixto, in tria, quatuor, vel quinque

brachia distributus, quæ umbellam magnam, ex longissimis festucis & floribus albis parvis compositam, sustinent: semen succedit longum; latum, striatum, geminum, puniceum, gultu subamarum, Cumini saporem imitans, aromaticum, modice excalescens, & salivam ciens. Hoc D. Doldius Norinberga ex D. Camerarii horto, nomine Sefeli Æthiopici folio Aquilegiæ misit, cuius Camerari<sup>9</sup>, (sed sine descriptione) in sui horti Catalogo, sub Sefeli Æthiopico altero meminit, & semen odore & sapore aliquantulum Cinnamomum repræsentare scribit.

II. *LIBANOTIS* latifolia minor semine crispo: hæc à vulgata potissimum foliorum magnitudine & numero, semisque forma differt: cum in vulgata singulæ foliorum alæ, magna ex parte quina folia habeant, uno extremam alam occupante: at hæc in primis duabus alis, tria tantum, & in media ala, quinque obtinent, per ambitum communiter serrata, quædam tamen unam alteramve profundam incisuram obtinent: superne atrovirentia, inferne vero subcinericea quodammodo coloris, magnitudine unciam, vel sesquiunciam vix excedentia. Caule cubitali, glabro umbella parva flosculorum alborum insidet, quibus succedit semen breve, subrotundum, eleganter crispatum. Hanc ex Italia D. Neudorfferus, nomine Colti amari semine crispo, attulit.

*D E C A R V I.*

*C A P V T. XXI.*

**C**ARVI alpinum: planta palmaris est & glabra, ex radice oblongiuscula nigricante, aromatica, folia emittens oblongis pedicu-

lis donata, foliorum Carvi modo, in paulo tamen majora segmenta, divisa, pallide virescentia: caulis modo unus, modo duo, tenuis, ad uncias sex exurgens, supra medium nudus, in quinque senasve festucas instar umbellæ abiens, quarum singulæ flosculos aliquot, quasi in capitulum junctos, ex flavo rubescens, sustinent. In Pyreneis montibus D. Burserus legit.

*D E P I M P I N E L L A.*

*C A P V T. XXII.*

**I.** *PIMPINELLA* saxifragia tenuifolia: ex radice oblonga, caulis pedalis viridis, lævis, striatus, genicularis, statim ad radicem in ramos, & hi in tenues alas divisus, exurgit: folia habet in tenues primum, dein pene capillaceas partes divisa: flosculi exigui, pauci, albicantes, in parva umbella; semen non vidimus, copiose ad lacum Genevensem provenit.

II. *PIMPINELLA* sanguisorba inodora: hæc à sanguisorba minore vulgata, differt foliis & odore: nam in hac folia longiora sunt, quæ in illa magis rotunda, sunt in hac inodora, in illa odora. Hanc *Pimpinellæ* minoris Hispanicæ nomine, D. Gille-  
nius misit.





Sefeli paluftræ lactefcens.



DE SESELI.

CAPVT XXIII.

**I.** SESELI montanum Cicuræ folio subhirsutum: ex radice crassa, folia lata, Cicutariæ, vel Myrrhidis Fuchsi instar, in multas alas divisa, nigricantia, levissimis pilis, præsertim ipsi pediculis aspersis, subsæpera: caule sesquicubitali & altiore, crasso, striato, cavo, nodoso, pilis paucissimis donato, in alas brachiato, foliis paucis, prioribus similibus, sed minoribus cincto: in summitate, umbella magna alba: floribus succedunt semina oblonga, gemella, tenuissimo apice donata, Carvi sapore. Hoc in altissimo monte Wasserfall, ætate florens, inter saxa reperimus.

**II.** SESELI pratense tenuifolium, sive Daucus pratensis tenuifolius: caule est cubitos duos su-

perante, rotundo, striato, nodoso, superne in ramos brachiato: foliis instar Pastinacæ tenuifoliæ sylvestris divisis: umbellam habet ex parvis albis floribus compositam, quib. succedit semen parvum aromaticum: & tota planta pastinacæ odorem refert: in pratis udis Michelsfeldæ provenit.

SESELI paluftræ lactefcens: cum Camerarius in suo horto sub Sefeli palustri descripserit, ejus figuram prætermittam, addere placuit.

DE LIGUSTICO.

CAPVT XXIV.

**L**IGUSTICUM sive Siler montanum angustifolium: caule est tenui, cubitali, in alas brachiato, quæ umbellam albam parvam sustinent, foliis paucis, in segmenta angusta, oblonga, peucedani instar (sed longe breviora) divisis, quæ in alis, fere capillacea: prope oppidum Stain Austriæ, D. Burserus legit.

DE FILIPENDULA.

CAPVT XXV.

**F**ILIPENDULA minor: radicem habet rufescentem, in filamenta extenuatam, sed per extrema glandulosam: folia duas tresve uncias longa, semunciam lata, ex segmentis pluribus, tenuissime divisis ambitu serratis composita, veluti Potentillæ, duriora tamen & saturatius virescentia, inter quæ cauliculus palmo minor in medio foliolo cinctus, exurgit: aliquando simplex, aliquando in summo binus, ovi coma flosculorum albidorum, ramulis præditorum, aliquando quasi in capitulum compactorum, insidet: succedit semen, instar racemi parvi coactum. In asperis circa Monspelium legimus.

DE CRISTA GALLI.

CAPVT XXVI.

**I.** CRISTA Galli umbellata: radice est tenui, parva, caule palmo parum altiore, tenui & erecto: foliis paucis, unciam longis, angustis, per ambitum crenatis: caulis summo flores plures, lutei, quasi in umbella dispositi, triplo majores & latiores, quam in vulgari, quibus

L. 3j

valvul.

valvulae latae membranæ, semen continentes, succedunt. In Castiliæ agris, D. Albinus legit.

II. CRISTA galli angustifolia montana: hæc caule est cubitali, anguloso, foliis oblongis, angustis, acuminatis, margine crenatis, bina sibi ex opposito correspondentibus, ex quorum alis foliola minora prodeunt, & plerumque cauliculus, unam alteramve unciam longus, minutissimis foliolis cinctus: ipse vero caulis, in ramos semipalmares, etiam longiores, dividitur: quibus flores pallidi, eo, quo in vulgari, ordine, sed longe minores insident, quibus valvula, semen latiusculum includentes, succedunt. Hæc in montibus urbi vicinis provenit.

Valeriana alpina prima.



DE VALERIANA.

CAPVT XXVII.

I. VALERIANA palustris major profunde laciniata: hæc è radicibus albis, oblongis, villosis, intricatis & odoratis, plures quam quinquaginta emittit caules, latos, foliis Valerianæ ex uno latere caulis dependentibus, sed multo majoribus, & incisuris profundioribus in aliquibus duplici serie luxuriantibus & prodependentibus, vestitos; quæ, ut & radices, odorem Valerianæ vulgaris habent: flores non vidimus. Hæc prope urbem Pudisfinam in loco palustri, à D. Franco seniore inventa & eruta.

II. VALERIANA palustris inodora parum laciniata: ex radice fibrosa, leviter Valerianam redolente, folia subrotunda, minime laciniata, pallide virentia, longis pediculis donata, prodeunt inter quæ caulis cubitum superans, exurgit; quem rara folia, primis, forma & longis pediculis similia, bina ex adverso respondentia, cingunt, quæ aliquando ad modum Valerianæ hortensis, ad exortum in lacinias divisa, inodora sunt: caulis summo, flores quasi in umbella sparsa, pallide rubentes, insident. In palustribus nostris Michelsfeldensibus frequens, licet raro cum flore reperitur, cum in sænificio abscondi consueverit.

III. VALERIANA alpina prima: ex radice oblonga, odorata, caulis unus (rarius plures) cubitalis, striatus, prodit: folia ad radicem plura, longis pediculis donata, ex rotunditate acuminata, sinuata, aliquando laciniata & in crenas profundiores divisa, pallide virentia: quæ vero caulem ambiunt, pauca sunt, bina ternave juncta, oblonga, incisa, binis alis pleraque donata: flores in summo caule pallide purpurascens, veluti umbellæ insident, quibus semen exiguum succedit. Iulio mense florentem in monte Wasserfall collegimus, ut in Phytopinace monuimus, quam etiam ex montibus Genevensi, accepimus.



IV. VAL-

Valeriana alpina scrophulariæ  
folio.Valeriana peregrina purpu-  
rea.

IV. VALERIANA alpina scrophulariæ folio: radice est nigricante, aliquantum torosa nodo-  
sæve: caule cubitali & sesquicubitali, cavo, stria-  
to, viridi (aliquando pluribus) foliis fenis, septo-  
nis, longis pediculis donatis insident, quorum  
quædam subrotunda, quædam oblonga, quæ-  
dam leviter sinuata: at quæ caulem cingunt,  
pauca sunt, scrophulariæ foliis æmula, uncias  
tres longa, sesquiunciam, vel unciam lata, acu-  
minata, leviter crenata, bina semper juncta: cau-  
lis, in summo, in longas tenues alas brachiatur,  
quibus flores pallide rubentes, Valerianæ sylve-  
stri similes insident eodem loco ubi & prior pro-  
venit: utraque sub Valeriana montana prima &  
altera in Phytopinace proposita fuit. Videtur  
Clusius utramque una descriptione & figura ex-

pressisse, Valerianæ sylvest. alpinæ primæ latifo-  
liæ nomine.

V. VALERIANA alpina minor planta palma  
minor, foliis ad radicem, primis quidem parvis,  
subrotundis, subsequentibus sesquiuncialibus,  
scabiosæ parvæ instar in lacinias acutas divisis:  
inter quæ cauliculus unciarum sex exurgit, bi-  
nis ternisve foliis, in ternas, vel quaternas laci-  
nias angustas divisus, ciliatus: in summo, um-  
bella, flosculos purpurascences sustinens: ex  
montibus Pyrenæis, D. Burserus attulit.

VI. VALERIANA peregrina purpurea alba-  
ve: ex radice parva, fibrosa, albicante, caulibus  
exurgit pedalis, rarius cubitalis, tenellus (ut  
in terrâ reclinet) viridis, cavus, striatus, nodosus,  
& ut plurimum ad singulos nodos in bi-  
mos divisus, horumque aliqui, in alios bre-

ramulos subdividuntur. Folia habet pallide vi-  
rentia, pauca, duas tresve uncias longa, unam, ra-  
rius duas, lata, Nardi montanæ similia, ex ad-  
verso bina sita, mollia, crassiuscula, quorum su-  
periora interdum sinuosa, & ad exortum in cre-  
nas divisa, & fere insipida: ramulorum summis  
flores inodori, elegantissime purpurei, vel albi,  
plures in caput congesti, longiusculi, extrema  
parte aperti, & in quinque lacinas divisi, quo-  
rum duæ superiores breviores & latiores, infe-  
riores tanquam labra pendulæ, & media reli-  
quis longior; quibus succedunt vascula oblon-  
ga, latiuscula, calices referentia incurva & fibro-  
sa, in quibus semen, altero tamen vasculo inclu-  
sum, quod crassiusculum, fungosum, nigricans.  
Annuæ est planta, singulis annis ferenda, quæ pro  
tempore sationis, citius tardiuse in hyemem  
usque floret. Sponte quidem in Latio provenire  
audio, in loco quodam Siculo dicto (unde Vale-  
riana Sicula) & in Sabinis ubi flore albo D. Vor-  
stius observavit: utramque & purpureo & albo  
flore in horto meo habui. Hanc ante annos vi-  
ginti tres D. Paschalis Gallus, Valerianæ Indicæ  
Imperati nomine, Patavio misit: dein Nardi  
Creticæ nomine, semine à Casabona misso, in  
horto Montembelgardiano crevit. Verum no-  
biliss. Cortusius, Tripolium esse voluit, cuius opi-  
nioni faver icon Tripolii in manuscripto Codice  
Diofcoridæo, quem Illust. Pinellus Patavicus in  
sua Bibliotheca habebat. In Phytopinace & Mat-

chiolo descriptissimus, & utrobique figuram adpo-  
sumus: nunc à Clusio Valerianæ Indicæ appella-  
tione proponitur.

VII. VALERIANA rubra angustifolia: hæc à Va-  
leriana rubra dicta, porissimum foliorum angus-  
titia differt, quæ linifolius angustiora, breviora, in  
acumen desinuntia, rigidiuscula & pallida, cau-  
lem rotundum, nodosum inordinate cingunt:  
verum tota planta, altera minor est, & in monte  
Baldo collecta.

NARDO CELTICÆ SIMILIS INODORA.

CAPUT XXVIII.

NARDO celticæ similis inodora: radícula est  
oblonga, rufescente, capillata, ex qua fo-  
lia aliquot oblonga, in latitudinem pau-  
latim sese laxantia, longis pedicellis donata, vi-  
ridia primum, dein flavescencia exurgunt, inter  
quæ cauliculus tenuissimus, palmaris, rarius al-  
tior, effertur, circa cujus medium foliola duo ob-  
longa, angustissima: cauliculus in pedicellum a-  
bit, qui stilosculos oblongos, pallidos, ut in Cel-  
tica sustinent, qui in semina exigua abeunt. Ino-  
dora est: hanc in Baldo & Alpibus Sumano con-  
germinis, legimus, & in monte Dravenslein Au-  
striae D. Burserus collegit, & Valerianæ  
alpinae parvæ latifoliæ nomine,  
misit.

☉ ○ ☉

LIBER

# LIBER QVINTVS.

## DE SOLANO.

### CAPVT I.

Solanum tuberosum esculentum.



**S**OLANUM tuberosum esculentum: caulem habet ad duorum triumve cubitorum, rarius in viri altitudinem exurgentem, crassum, angulosum, striatum, leviter hirsutum, in multos ramos infirmos, in terram, nisi adminiculo sustineantur, procumbentes, brachiatum, ex quorum alis pediculi crassi, angulosi, flores sustinentes, prodeunt. Folia quæ primo nascuntur, Barbaræ similia sunt (quemadmodum figura nostra & Matthiolo & huic libro addita eleganter, cum omnibus plantæ partibus, ex-

primit) ex atro purpurascencia, subhirsuta, cæteris pallide virentibus, absque pediculo, palmum longis, in sex. octo, plures & pauciores partes, ex una costa dependentes, divisis, ex rotunditate oblongis, integris, quibus singulis, duo sextuplo minora interjiciuntur, & semper pars una, quæ septima vel nona, cæteris major, alæ summo additur. Flores elegantes, exterius ex purpura candicantes, interius purpurascences, vel ex caruleo purpurascences (flore pleno in Austria haberi ajunt) deni, duodeni aut plures,

M

alii

alii clausi, pauciores aperti, qui magni malorum infanorum forma, singulari folio constantes, quinquanguli, lineis vel radiis quinque subflavis, vel herbaceis per longum discurrentibus, ex quorum medio staminula rufescentia, vel etiam flava communiter quinque, stylo subviridi prominente, prodeunt: & flores, odorem Tilie florum quodammodo referunt. Hos fructus rotundi excipiunt, plures simul quasi ex racemo dependentes, longis pediculis, ut in Solano vulgari, donatis, quorum aliqui parvæ nucis, alii avellanæ magnitudine, alii minores immaturi atrovirentes: maturi atrorubentes, rarius albi & striati, humida & albicantē pulpa pleni, quæ feminibus multis, parvis, planis, subrotundis: Solani somnifaci secundi forma, fuscis, conferta est. Radix tuberosa est, aliquando pugni magnitudine, aliquando oblonga, aliquando minima, rarius singularis membri virilis forma, inæqualis, quibusdam vestigiis donata, unde germina anno sequenti emerfura sunt, cute fusca aut atrorubeunte tecta, medulla sive carne firma & alba: & quandoque tuber ex quo planta nascitur, cum eruitur, inane & flaccidum reperitur. Ad caulis exortum, radices plures, fibrosæ, oblongæ, albicantes per terram sparsæ, quandoque in profundum descendentes, cui alie tuberosæ radices adnascuntur, ita ut plantam hyemem verseruturam, ultra quadraginta (alii quinquaginta notarunt) tubera diversæ magnitudinis notaverimus, quas plerique erunt, ne per hyemem putrescant, & sicco loco, calidiore tamen, alii in vase terra sicca pleno, reponunt, vernalique tempore terræ rursus committunt: ex ramis etiam reclinatis, terræ testis, Burgundi propagare solent, quo plura tubera acquirant. Florent apud nos in Junio, & sæpe ad Autumnum usque, & à primis pruinis offenditur. Hæc ex Insula Virginea primum in Angliam, inde in Galliam, aliasque regiones delata est.

Hujus radices in Virginea Openanck dici, ejus historiæ autor monet. Petrus Cieca in sua Chronica (& Gomara in sua Indiarum historia generali) Papas locis Quito vicinis vocari scribit: Benzoni, Pape, & Iosepho Acoftæ in hist. Indiæ, Papas: hinc Papas Indorum vel Hispanorum dicitur, Italis Tartuffoli, quo nomine & tubera nominare solent, Germanis Grublingbaum/ id est, tuberum arbor dicitur. § Plantæ hujus cum an-

no 1590. iconem suis coloribus delineatam, à D. Scholtzio, Pappas Hispanorum nomine accepissim, & à nemine descriptam invenirem, in Phytopinacæ sub Solano tuberoso, & in Matthiolo, sub Solano tuberoso esculento, figura addita, descripsimus, ejusque iconem D. Clusio transmissimus. Solanum appellavimus, propter formam aliquam foliorum cum malis aureis: florum, cum malis infanis: fructuum, cum baccis Solani vulgaris: feminum, cum Solanis pene omnibus: denique, propter totius plantæ odorem, quem cum Solanis communem habet.

An veteribus cognita? Pyncocomon Dioscoridis, nobiliss. Cortufus censuit, motus exemplari Dioscoridis manuscripto, cui similis figura adpicta. Et sane notæ florum ac radicem Pyncocomi Dioscoridis, huic Solano conveniunt: floris & feminis non item: Clusius denique in sua historia Arachidnam Theoph. suspicatur, & Papas Peruvianorum vocat.

Indi radicibus panis loco utuntur: quem Chunno vocant: radicem evulsam, folique expositam siccant, siccantam in partes dissingunt, ex quibus edulium Channo præparant, admodum diu durans conficiunt. Papas a thinc vero viridis, interdum quoque velenta, vel assata manducatur: hæc Acofta: qui adule, & aliud Papas genus in calidioribus fundis plantari, ex quo fercula, Locro appellata, parant. Sic in Insula Virginea, apud quos in humidis & paludosis locis nascitur, radicibus in aqua, aut aliter coctis, utuntur. Sic nostrates, aliquando Tuberum modo sub cineribus assant, & cuticula ablata, cum pipere comedunt: alii assatas, & mundatas, in taleolas dissecant, & jus pingue cum pipere affundunt & comedunt, ad Venerem excitandam, semen augendum: alii & tabidis utiles volunt, cum bonum alimentum præbeant: non minus quam castaneæ & pastinacæ alunt, & flatulentæ sunt. Relatum mihi, nunc apud Burgundosharum radicem usum interdicium, persuasi earum esum Lepram causare, & Artificokos Indicos vocari.

II. SOLANUM racemosum ceraforum forma: vel Cerafa amoris racemosa rubra: ex radice fibrosa, caules exurgunt bicubitales, angulosi, aliquantulum hirsuti, in multos ramos late se spargentes divisi, qui infirmi sunt, & nisi radica sustineantur, in terram procumbunt, succi pleni: ex caul-



lis latere, pediculi tres, quatuorve uncias longi, hispidi, flores sustinentes, prodeunt. Folia habet, in multas lacinias acutas, impari semper numero, Agrimonie foliorum instar divisa & per marginem incisa, aliis foliis minoribus interjectis, pallide virentia, aspera & gravem odorem spirantia. Flores plures, quorum singuli singulis pedicellis insident, luteoli, ex quinque foliis acutis compositi, à calice viridi quinquefolio sustentati, in quorum medio capitulum parvum rufescens, apicibus donatum: quibus fructus succedunt, quasi in racemo dispositi, Ceraforum forma & magnitudine, virides primum, dein per maturitatem rubentes, in quibus non secus quam in Pomo Amoris, copiosa humida medulla, & semen minutum albicans & planum, continetur. Planta annua est, & singulis annis ferenda, quamvis in horto meo ex deciduo semine renata sit.

I. I. SOLANUM tryophyllum Brasilianum: ex radice tenui, non longa, oblique serpente, cauliculus exurgit singularis, glaber, palmum superans, circa quem folia terna, ex uno centro prodeuntia, & in latus sparsa, Solano tetraphyllo similia, latiora tamen, uncias quatuor lata, quinque longa, ex rotunditate acuminata, tenuia, lævia, venosa: supra quæ cauliculus unciarum quatuor assurgit, cui tria alia folia, uncias tres longa, lon-

geque angustiora insident, calicis instar sustententia florem magnum, album, venosum, ex tribus foliis, uncias duas longis, & fere unciam lateis, compositam. Hoc in sylvis Brasiliæ apud Tououpinambaultios copiose reperitur, referente Pharmacopœo Gallo, qui una cum aliis D. Bursero communicavit. Ignorans, quid esset, formamque considerans, Solani nomen, propter formam, quam cum Solano tetraphyllo habet, imposuimus.

IV. SOLANUM Mexiocanum Iasminum Indicum dictum flore minore. Hoc à Iasmino rubro, vel Mexiocano majore, quod communiter in hortis colitur, potissimum magnitudine differt omnibus plantarum partibus minoribus & foliis rotundioribus, existentibus: nam licet majoris flores, ex uno folio, convolvuli florum instar, componantur, attamen radiis discurrentibus, quasi in partes quinque dividuntur: minoris flores, similiter quidem formati sunt, sed totus flos unam partem majoris non adæquat: ita ut hujus quini flores, majoris unum in circumferentia non æquent: præterea staminula quaternaria minutissimis apicibus donata, cum stylo paulo longiore, è medio flore emergunt, quæ longius quam in majore, extra florem producuntur semen similiter quadruplo minus est.

*Hyoscyamus Creticus luteus major.**Papaver spinosum.*

DE HYOSCYAMO,

## CAPVT II.

**H**YOSCYAMUS Creticus luteus major: caulibus est cubitalibus, robustis, ramosis, rotundis, molli lanugine obfictis: foliis latis, subrotundis, sinuatis, & circumscissis, hirsutis, longiore pediculo donatis: ex quorum alis pediculi lanuginosi exurgunt flores sustinentes, ex calice hirsuto in quinque apices secto, prodeuntes, oblongos, Lamii melyssophylli forma, quinquefariam divisos, quorum tria folia superiora, majora & flava, inferiora duo pallidiora, ex quorum medio stamina quina, purpurascientia, apicibus flavescens, una cum stylo oblongo ejusdem coloris efferuntur: floribus delapsis, calices indurantur, qui semen minutum subrufum conti-



nent. Ex horto Montembelgardiano, à fratre Ioh. Bauhino primum accepimus, semine à Casabona misso, quemadmodum in Phytopinace monuimus, & in Marthiolo figura addita descriptus: hanc postmodum Clusius, Hyoscyami Cretici alterius nomine, absque figura proposuisse videtur.

DE PAPAVERE,

## CAPVT III.

**P**APAVER erraticum Pyrenaicum luteo flore: caule est tenui, pilis exiguis, hinc inde aspersis: foliis teneberrimis, glabris, pallide virentibus instar Caulalidis, vel Apii filiorum in laciniis divisim per marginem incisim & serratis, quo-

quorum costæ mediæ pili paucissimi adpositi: ex folij ala, pediculus nudus, sex etiam octo uncias longus, prodit, florem simplicem, magnum, quadrifolium, & colore luteo, sulcinens: plura non licet, cum hoc siccum, in Pyrenæis, locis tamen udis, natum, D. Burserus attulerit.

II. PAPAVER spinosum; ex radice tenui, oblonga, fibrosa, caulis sesquipedalis, aliquando altior, ramosus, rotundus, striatus, minimis aculeis donatus, alba medulla plenus, exurgit: folia omnium prima ex semine prodeuntia, oblonga, angusta sunt: subsequencia vero, quemadmodum & ea quæ in caule sunt, papaveris corniculati instar laciniata: non hirsuta, sed mollia & nitida, medium caulem amplectentia, quæ tres, quatuorve uncias longa, duas lata; per margines aculeis flavescentibus & acutissimis armata; parte quidem superna viridia, at nervis, quasi tenui pulvere asperso, albicantibus: parte inferna canescentia & nervis ex minimis aculeis exasperatis. Flos luteus, ex quinque; vel sex, aliquando quatuor foliis compositus, odorem Chelidonii majoris quodammodo referens, ramulorum summis insidet: huic succedit capitulum oblongum, pentagonum, hexagonum, & tetragonum, multis staminibus flavis id ambientibus, quod tenellum summa parte rubescit, maturum vero nigricat, spinis frequentibus & firmis horridum: hoc semine nigro, sextuplo aliorum majore, rotundo, in apicem desinent & elegantissime striato, plenum est. Julio & Augusto floret, & autumnus feri debet, cum planta annua sit.

Semen ex Anglia primum, nomine Figo del inferno, id est, Ficus infernalis, à D. Camerario juniore Norinbergæ allatum, unde D. Doldius primum anno 1593. & mox nobiliss. Cortulus, Patavio, & plantam & semen transmissere, primumque Papaveris spinosi nomine donavi, uti videre est in Phytopinace, & in Matthiolo, ubi & figura & descriptio propostia est, aliquot annis antequam Clusius, hoc, Papaveris spinosi nomine, in sua historia exhiberet. Tota planta succo flavescente, instar Chelidonii majoris abundat, quam ob causam Glaucium ne sit Dioscoridis, dubitamus: eos enim qui Chelidonium majorem, & eos qui Poma amoris volunt, & eos qui Papaver corniculatum phœniceum, substituant: non probamus. Dioscorides etenim suo Glaucio, folij Papaveris corniculati tribuit, ad-

dens *λεπιδία φύλλα*, nitidiora interpretor, qualia sunt Papaveris spinosi, non hirsuta, ut corniculati: addit totum croceo succo madere: quem sane, vel levissimum vulnere copiosum hoc Papaver fundit. Sed de his, in Theatro, Deo volente plenius.

## DE ARGEMONE.

## CAPVT IV.

ARGEMONE alpina lutea: huic folia sunt, ad radicem parva, multa, in multifidas tenuesque; alas instar foliorum Scandicis incisæ, viridia & lævia, inter quæ cauliculi bini, terni, palmares, nudi, levissimis pilis vestiti, recta assurgunt, qui florem unicum mediæ magnitudinis, luteum, quadrifolium sustinent: ex floribus umbilico, plurimi apices flavescentes exurgunt: flori capitulum parvum, subrotundum, asperiusculum, semen continens succedit. Hanc in monte Sneegberg Austriæ, qua parte ex pago ejusdem nominis perpendiculariter ascenditur, inter saxa D. Burserus reperit.

## DE ANEMONE.

## CAPVT V.

ANEMONE trifolia Cretica albo magno flore: foliis est Ranunculi pratensis, vel hortensis repentis, specie trifolia, rarius quinquefolia divisis, per marginem crenatis: caule pedalis, rotundo, flores duos vel tres albos, ex sex, vel septem foliis compositos, Papaveris erratici florem magnitudine superantes, sustinente: quibus capitulum, seminibus aliorum Ranuncolorum more confectum, succedit. Hanc delineatam. Patavij natam, Laurentius Rosenavv Germanus Pharmacopæus, una cum aliis anno 1595. transmisit: cujus iconem etiam Phytopinaci addidimus.

II. ANEMONE sylvestris alba minor: ex radice subnigricante, fibrosa, folia subrotunda, unguem vix superantia, longis pediculis villosis donata, terna, quaterna, Ranunculi pratensis modo, tribus usque ad umbilicum incisuris, dein singulis, aliis tribus minoribus laciniata: pallide virescentia, mollia & hirsuta exurgunt, inter quæ cauliculus candida lanugine pubescens, unciarum septem altus, in medio duobus foliis parvis laciniatis cinctus, cujus summo flos unicus, parvus, triplo quam in vulgari minor, quinquefolius, candidus, in cujus medio capitulum exiguum, multum

multis brevissimis subluteis flaminibus cinctum insidet. In summa, ab Anemone sylv. alba major, quam tertiam Matthiolum facit, sola magnitudine differre videtur. Hæc prope Herbipolim sponte nascitur.

III. ANEMONE alpina alba major: ex radice nigricante, folia exurgunt acuta, Cicutarie modo, multis divisuris secta, atrovirentia, & parte prona, secundum venarum ductum, villosa, inter quæ cauliculus tenuis, leviter hirsutus, uncias sex altus, cujus summo flos albus, major quam in ulla Anemone sylvestri, vel etiam Pulsatilla vulgari, ex septem foliis compositus, ex rotunditate in, acumen desinentibus, & pluribus in medio flaminulis luteis donatus, insidet: an vero tandem hujus, ut & sequentis flos, in plumosi seminis congeriem transeat, non constat.

IV. ANEMONE alpina alba minor: tota planta uncias quatuor non excedit, radiculam habens parvam, nigram, folia longe minorâ, quam prioris, magisque villosa: cauliculo est biunciali villosa, quem circa medium folia similia amplectuntur, cujus summo flos albus, sex foliis donatus, priore quadruplo minor, multis flaminulis luteis præditus, insidet: hæcque ad Anemonem sylvestrem 2. Clusii accedit. Utraque in Austria provenit: illa in Blankenstein: hæc, in Taurero Rastadiensi, ubi D. Burserus collegit.

## DE PULSATILLA.

### CAPVT VI.

I. PULSATILLA palustris: hæc foliis est ad radicem in tenuissima & angusta segmenta divisus eorum pediculis hirsutis, inter quæ caulis pedalis, rotundus, rufescens, levi lanugine aspersus, cujus medium folia capillacea acuta cingunt, ipsiusque summo flos unus, villosa capitulo ex capillaceis foliis composito sustentatus, insidet, qui vulgari longe minor, ex foliis sex acutis, violæ nigræ colore compositus, flaminibus in medio luteis: capitulum villosa cæsarie comosum, & incanescens, cum semen succedit. Hæc apud nos in pratis udis & paludosis Michelsfeldæ provenit: & in hortum translata, cum vulgari, vegetior quidem sit, sed formam & colorem servat.

II. PULSATILLA apii folio venalis flore majore: ex radice nigra, longiuscula, folia plura, pediculis

oblongis, pilosis donata, crassa, dura, rigida, Apii foliorum instar in quinas lacinias, & hæc in alias divisa, margine piloso, prodeunt: inter quæ cauliculus unciarum quatuor, nudus, at hirsutie incanus exurgit, qui florem magnum, trium unciarum longum latumque, ex sex foliis compositum, multique apicibus luteis, ut & duæ sequentes, donatum, sustinet; qui colore variat, aliquando ex albo & subpurpureo mixtus, aliquando intrinsecus albus, extrinsecus subpurpureus, vernali tempore florens: in sylvis circa Francofurtum ad Oderam, D. Fleisserus, ut & sequentem, collegit.

III. PULSATILLA apii folio vernalis flore minore: & hæc ex radice crassa, nigra, oblonga, folia crassa, pauca, oblongis pediculis donata, Apii instar, sed in tres tantum lacinias ad umbilicum divisa, quarum quælibet in alias binas, ternasve lacinias, per marginem incisas, secantur, & pilis vix conspicuis donantur: cauliculus villosissimus, uncias duas alto, flos priore modica parte minor, & dilute purpureus insidet: Aprili, scilicet plerumque carens, floret.

IV. PULSATILLA apii folio autumnalis: radice est longa, foris nigra, intus candida, foliis ad radicem plurimis, Apii modo in tres tantum lacinias, & has in alias divisas, glabris, inter quæ cauliculus triuncialis, albis pilis villosus, florem præcedenti minorem obsoleti coloris, instar vulgari, sustinens, qui, & priorum flores, in capitulum hirsutum, quod semen continet, abit. Septembri mense florens, in Lusacia, unde D. Francus misit, reperitur.

V. PULSATILLA, folia Anemonis secundæ, vel subrotundo: radix crassa, nigra, aliquot propagines quandoque fundit: ex quibus prodeunt folia, pediculis oblongis hirsutis donata, instar Anemonis bulbocastani radice subrotunda, inferne & per marginem levi lanugine candicante, semper in lacinias tres latas, & in hæc in alias bifidas, vel trifidas, minus profundas secta: inter quæ caulis emergit pedalis, subhirsutus, infra medium angustis oblongis foliis (qualia & flori subjiuntur) cinctus, florem subcæreuleum, septem foliis donatum, & reliquorum more in pappum abeuntem, sustinens: ex Lusacia à

D. Franco, Pulsatillæ latifoliæ nomine, accepimus.

## DE RANUNCULO.

## CAPVT VII.

**I.** RANUNCULUS nemorosus Anemones flore minor: tota planta uncias sex non superat: radícula est tenui, obliqua, cauliculo tenuissimo, triunciali, quem folia, ut in Ranunculo nemoroso albo, in tres lacinias, & hæc in alias, diuisa, sed vix unguem lata, cingunt, ita ut tota planta cum flore, unam vulgaris Ranunculi nemorosi albi laciniam, latitudine non superet: hæc, cauliculus uncialis superat, florem paruum album sex foliorum sustineus. A vulgato nemoroso non distinguemur, nisi hic parvus, copiosissime in editissimo monte ad Curiam Rhetorum, & circa Monspelium fuisset observatus.

**II.** RANUNCULUS rotundifolius repens echinatus: ad radicem nigricantem, capillaceam, folia sunt rotunda, crenata, uncialia, pediculis longissimis donata, quæ vero in caule, maiora, pleræque rotunda, etiam in lacinias, sed non usque ad umbilicum, diuisa: caulium habet pedalem, in terram reclinatum & quasi repentem, ac in alios diuisum, circa quem folia pediculis palmaribus donata: flores pallide lutei, pauci ad umbilicum staminibus: flore deciduo, capitulum ex pluribus seminibus rufescentibus subasperis echinatis, simulque congestis compositum, succedit. Tota planta ob pilos aspersos mollis est, at uero, & circa Bononiam in agris prouenit.

**III.** RANUNCULUS palustris echinatus: è radice in multas fibras longas capillatas diuisa, prodeunt folia glabra, atrovirentia, longis pediculis donata, communiter unguem pollicis lata, pampini fere diuisura & in ambitu incisa, in caule tamen latiora & profundius lacinia: ramis est recurvis, aliquando pedalibus, & in alios breviores, hucque adhuc in minores, diuisis: aliquando tamen tota planta uncias quatuor non excedit, & tunc ramuli plures à radice, duas, tresve uncias non superantes exurgunt, quorum extremitatibus flores pallide lutei, quinque folii insident: singulis succedit capitulum ex seminibus compressis, echinatis tuberculis oblitis, in apicem recurvum acutum desinentibus, pluribus, paucioribus, aliquando duodecim simul junctis, compositum.

Locis humidis & aquosis Monspessuli gau-

det. Hujus licet ad versaria sub Ranunculo palustris rotundiore folio semine echinato obiter meminierint, attamen quia cum Ranunculo palustris rotundifolio lævi confundunt, ut in Phytopinace monuimus, integram veramque descriptionem proponere volumus: hunc videtur Clusius in postrema sua historia, nomine Ranunculi Apulei, figura minus fideliter expressum, exhibere.

**IV.** RANUNCULUS grumosa radice folio ranunculi bulbosi: ex radice alba, grumosa, veluti ex parvis bulbis, sed firmiter compactis, composita, fibris oblongis intermixtis folia: Ranunculi vulgaris radice verticelli foliis similia, subrotunda, sed profundius dissecta, oblongis pediculis donata, levissime pilosa, prodeunt: inter quæ caulibus pedalis, hirsutus, rarius in ramos diuisus effertur, quem folia in angustos lobos secta bis cingunt, cujus summo flos luteus, aliorum forma insidet: cui capitulum, brevissimis aculeis armatum succedit. Hic Ranunculus agris Bononiensis familiaris est, & à D. Agerio collectus. Hujus etiam meminimus in Phytopinace, sub Ranunculo racemosa radice Ioh. Bauhiner, qui in montibus Bononiensibus reperit. An hunc intelligit Anguillara opin. ii. dum meminit Ranunculi circa Sebenicum Dalmatiæ oppidum, radicibus Chelidoniæ minoris, qui polyanthos sit: de quo & Camerarius in suo horto, sub Ranunculo pleno flore luteo repente majore.

**V.** RANUNCULUS geranii tuberosi folio: radice est fibrosa, caulibus multis cubitalibus, viridibus, striatis & ramosis: foliis à radice absque pediculis palmaribus, uncias sex longis latisque superne atrovirentibus, foliorum Geranii tuberosi instar in multas lacinias, sed longiores & latiores ad pediculum diuisis, & rursum in alias scissis: at in caulibus summitate, in segmenta graminea partiti: flores in ramulorum summis plures, parvi, lutei, multis in medio staminibus, quibus capitulum paruum rotundum cum seminio succedit. Non longe Patavio in Arqua, ubi Petrarchæ sepultura, anno 1578. legimus,

quem nobiliss. Cortusius Batrachium verum nomina-

vii.

*Ranunculus montanus subhirsutus*  
latifolius.



VI. *RANUNCULUS montanus subhirsutus* latifolius: ex radice oblonga, fibrosa, folia prima Geranio columbino similia, subnigricantia, mollia, in tres primum lacinias ad pediculum divisa, & hæc in alias tres, hæque in alias secta, pediculis palmaribus, subhirsutis donata prodeunt, quorum tamen superiora latiora & acutiora: inter quæ caulis sesquicubitalis, cavus, striatus, pene glaber, in ramos brachiatus, effertur: quibus flores parvi, pallide lutei, quinquefolii insident; his semina, in capitulum congesta, succedunt. Hic in humidis montis Murææ provenit.

VII. *RANUNCULUS montanus lanuginosus* foliis ranunculi pratensis repentis: radicem habet fibrosam, rufescentem, à qua, cum caule tenui, cubitali, lanuginoso, superne in alas diviso, prodeunt folia pallide virentia, tactu mollia, pediculis palmaribus, lanuginosis, donata, instar Ra-

nunculi pratensis repentis, in tres primum lacinias, oblongis pedicellis donatas, & hæc in alias acutas, per marginem crenatas, divisa, flos aureus, quinquefolius, priore major est. In altissimis montibus, ut in Belken Marchionatus, reperitur.

VIII. *RANUNCULUS saxatilis* magno flore: radix ex oblongis fibris capillaribus composita est: folia habet ad radicem plura, oblongis pedicellis non nihil lanuginosis donata, unguem vix lata, in tres parvas lacinias, & hæc in binas, vel ternas acutas divisa: inter quæ cauliculus palmo minor; tenuis, lanuginosus, cujus summo flos magnus, aureus, splendens, quinquefolius, multis in medio staminibus rufescentibus, insidet. Circa Monspelium in saxosis crevit.

IX. *RANUNCULUS saxatilis* foliis subrotundis: radix in fibras oblongas, capillares abit: folia per terram sparsa, subhirsuta, crassa, pedicellis uncialibus donata, vix unguem lata, in petiolo parva, subrotunda, & hæc in alla dividuntur: cauliculus tenuis, lanuginosus, sex unciarum, ad exortum statim dividitur: flos luteus, quinquefolius, multis staminibus donatus. Eodem quo prior loco reperitur.

X. *RANUNCULUS minimus saxatilis hirsutus*: radice est pusilla, capillari, circa quam foliola plurima, in tres lacinias subrotundas, & per marginem incisas, divisa, longis pedicellis hirsutis donata: inter quæ cauliculus, duarum triumve unciarum hirsutus exurgit, florem luteum, aliorum Ranunculorum similem, multis in medio croceis staminibus, sustinet: cui capitulum parvum, ut in aliis succedit. Non longe Monspelio, ad Lattes, provenit.

XI. *RANUNCULUS villosissimus* Monspeliacus: radice est fibrosa, rufescente, foliis ex ea prodeuntibus crassis, villosis, parvis, in lacinias primum ternas, alias subrotundas, alias acutas, & hæc in alias incisas & per marginem crenatis: quæ vero in caule sunt, in oblongas & acutas, & quasi aculeo armatas lacinias, sed longitudine impares, dividuntur: inter quæ caulis palmaris, in breves alas brachiatus, quibus singulis, folium in plures lacinias divisum, subjicitur: flos aliorum Ranunculorum forma, mediæ magnitudinis, lutei coloris est. Tota planta ob pilos rufescentes, molles, villosa & rufescens est, &

Monspelluli in saxosis reperitur.



## DE DORONICO.

## CAPVT VIII.

**D**ORONICVM Helveticum incanum: ex radice geniculata, & quasi squamata, caulibus emergit pedalis, rotundus, incanus, cui flos magnus luteus, folijs aureis longiusculis non crenatis discum cingentibus, qui tandem in papum abit cum semine aliorum simili: folijs est crassis, ad radicem aliquibus subrotundis, alijs ex rotunditate oblongatis, in ambitu dentatis & serratis, parte inferiore una cum pediculis ob incanam lanuginem mollibus, superne vero pallide virentibus & nervo albicante: quæ vero caulem ambiunt, longa sunt, angusta & acuminata, acris & amari saporis: ex Helveticis alpinis D. Burserus attulit.

**I. I. DORONICVM** Helveticum humile crassis folijs: planta palmaris est, folijs crassis & densis, superne atrovirentibus, inferne pallidis, non nihil hirsutis, primis quidem ex rotunditate oblongis, per ambitum crenatis, pediculi basi caulem ambiunt, subsequenter vero, uncias sex longis, sesquiunciam latis, quorum superiora pediculis carent: caule est brevi, hirsuto, in ramulos biunciales diviso, quorum singuli florem luteum, mediæ magnitudinis, sustinent. Julio mense in Valesianorum jugis (auss der Gemme vocant) floret, ubi D. Fleissner eruit.

## DE ELLEBORO.

## CAPVT IX.

**E**LEBORVS niger Saniculæ folio minor: radices nigrae subsunt, & ab vno exiguo capitulo fibræ quam plures tenues descendunt: folia, quæ oblongis pediculis donata, subrotunda sunt, vnguem pollicis lata, in septem lacinias breves & angustas, ad umbilicum usque divisa, per margines crenata, in caule vero, brevissimis pedicellis tenuissime hissa: inter quæ cauliculi bini, terni, tenuissimi, palmares, & glabri exurgunt, uno alterove folio vestiti: aliquando in summo, pediculi ad latera prodeunt, qui flosculos complures simul sarctos, candidos, quasi in muscario junctos, sustinent. In summa, veratrum nigrum Dodonæi, sive Astrantiam nigram Lobelij, per omnia refert, solaq; magnitudine differt.

Hic in Alpibus solum reperitur, ut in monte Fracto, Spligel Rhætorum & in Pyrenæis.

## DE GENTIANELLA.

## CAPVT X.

**G**ENTIANELLA alpina latifolia magno flore: ad radicem nigricantem, fibrosam, folia humi sparsa, quaterna, quinave subrotunda, crassa, plantagininis, vel Calthæ alpinæ forma, unciam lata, duas longa: inter quæ cauliculus uncias quatuor altus uno alterove folio donatus, cui utriculus insidet, unicum florem oblongum, cæruleum, calathio similem sustinet: cujus caliculi utrinq; folium oblongum adponitur: ex Helvetiæ alpinis habemus.

**II. GENTIANELLA** omnium minima: extradictula oblonga, tenui, albicante, foliola oblonga, angusta, viridia, plurima simul instar cespitis conjuncta, prodeunt, inter quæ pedicelli brevissimi (tota enim planta, radice excepta, unciam non excedit) quibus singulis flosculus, pro plantulæ ratione magnus, pallide cæruleis, staminulis donatus, caliculo inclusus, insidet; hæc nisi summe amara esset, Muscus aliquis floridus censeretur: in summis Alpium Helveticarum jugis reperitur.

## DE PLANTAGINE.

## CAPVT XI.

**P**LANGATO maxima tota glabra: ex radice nigricante, fibrosa, folia sex, septem, vltro, glabra, caruosa, & nervosa, uncias sex longa, quatuor lata, pediculis pene palmaribus, initio rubentibus donata, prodeunt: inter quæ pediculi nudi tres, quatuor, quinque bicubirales, atrovirentes, rotundi, striati, spicam pedalem sustententes, exurgunt: circa Monspelium reperitur.

Reperitur quoque folijs laciniatis, tenuibus, glabris, pedalis, uncias sex latis, caule etiam superante, & ad spicæ exortum, folia habente.

**II. PLANTAGO** quinquenervia caulium summitate foliosa: hæc à vulgari in eo differt, quod cauliculi spicam florum sustententes, in caulem palmarem excrescunt, in cujus summitate, folia plura, eo modo quo ad radicem disposita: spicis,

N

non

non oblongis, sed rotundis, brevissimis pediculis lanuginosis insidentibus.

Reperitur etiam quinquenervia vulgaris, spicis bifidis: vel loco spicarum, sunt capita mire variantia, à pediculis nudis sustentata, quorum quædam ex infima spicæ parte, utrinque; unum capitulum obtinent, alia pluribus capitulis, utrinque spicæ circumjectis, donantur.

III. *PLANTAGO* trinervia angustissimo follo: radice est tenui, fibrosa, albicante; folijs aliquando palmaribus, aliquando uncias quinque longis, strictissimis, atrovirentibus, tribus nervis distinctis, per marginem potissimum, pediculis pilosis: inter quæ cauliculi plures exurgunt, alij cubitales, alij pedales, alij palmares, aliquando triunciales, ad exortum aliquando villosi, glabri nonnunquam, quibus spicæ breves, oblongæ & subrotundæ insident. Hanc sæpius ad vias, maxime ad rudera, notavimus.

IV. *PLANTAGO* angustifolia paniculis lagopi: ex radice oblonga, fibris oblongis capillata & rufescente, cauliculi plurimi, aliquando supra viginti, nudi, leviter hirsuti, rotundi, recurvi, altitudine impares, alij palmam excedentes, semipalmares, alij duas tresve uncias non superantes, prodeunt, qui capitulum lagopi forma, modo longum, modo breve, molle, rufescens sustinent: ad latera flosculi parvi, rufescentes, tenuissimis pedicellis insidentes conspiciuntur, quibus semen minutissimum succedit: folia habet plura, nervosa, uncias quatuor longa, uncia angustiora, hispida, & in exquisitissimum apicem desinentia. Hæc copiose in agris Nemausensibus provenit.

Hæc aliquando ita parva, ut uncias tres non superet, magis villosa, & capitulis minimis rotundis donata.

*DE HOLOSTIO SIVE LEONTOPODIO  
CRETICO.*

CAPVT XII.

**H**OLOSTIVM sive Leontopodium Creticum: ex radice rufescente & quasi squamata, paulatim gracilescente, & in fibras divisa, folia viginti, etiam plura, palmaria, angusta, nervis tribus per longitudinem discurrentibus distincta, & hirsutæ subaspera, prodeunt: inter quæ pedicelli plures, molli rufescente lanugine pubescentes, duarum triumve unciarum conspiciuntur, quibus singulis capitulum crassiusculum, rufescens insidet: flosculi albicantes, umbiliconigricante præditi, quandam foraminum speciem præbent: at in senescente, & arescente planta, pediculi crassiores & rigidi facti, una cum capitulo terram versus, ad radicis caput adeo curvantur, ut pedem leoninum quodam modo referant. Hoc in Creta provenit, & Patavio à Laurentio Rosenavv Pharmacopæo, Leontopodij Cretici & Catanances Cortusi nomine: dein pro Holostio minore, ab Imperato Neapoli accepi, & ante viginti & aliquot annos descriptionem figuræ addita in Phytopinace proposuimus: postmodum & Clusius Leontopodij Cretici nomine, exhibuit.

*DE CORONOPO.*

CAPVT XIII.

**C**ORONOPVS maritimus minimus: radícula est longa, capillari, foliolis multis per terram sparsis, in lacinias tenues instar foliorum Scabiosæ minoris sive Stæbes divisis: inter quæ plures pedicelli recurvi, unciales, thyrsulos parvos spicatos & hirsutos sustinentes, flosculis minutissimis donatos: tota planta hirsuta est:

hanc D. Gillenius misit.

## Pſyllium minus.



## DE PSYLLIO.

## CAPVT XIV.

**I.** **PSYLLIVM** Indicum folijs crenatis: radice est oblonga, tenui, fibris capillata: caule circa radicem lignoso & rufescente, rotundo, subaspero, pedali, in frequentes ac foliosos ramulos diviso, qui capitula plura, singula singulis pedicellis insidentia, sæpius dena, duodena, squamata sustinent, è quibus flosculi pusilli, pallide lurei, lanuginosi relucunt: semen nigricans, parvum, splendens, succedit: folia habet oblonga angusta, acuta, crenata, instar foliorum Coronopi, nonnihil laciniata, hirsuta: ex semine Psyllij Indici nomine facto, in horto aliquoties Julio florens, enatum. Et hoc Dioscoridis Psyllium censemus.

**II.** **PSYLLIVM** minus: huic radix est tenuis,

oblonga, subalbida, fibris paucis capillata: ramuli semipalmares, rotundi, tenues, rufescentes, in terram reclinati, in summo in minores divisi: folijs brevibus angustis, binis sibi ex opposito respondentibus, quæ alis subjiciuntur, aliquando ternis, nonnunquam quinis simul junctis: ramulorum fastigijs, capitula squamata insident, quibus utrinque foliolium unum (aliquando plura & impari longitudine) parvum recurvum & per maturitatem rigidum subjicitur: flosculos habet pusillos, albos, pedicellis inhærentes, quibus semen longe vulgari minus, subnigrum relucens, succedit. Augusto florens in horto collegimus, semine Patavio ex nobiliss. Bembii horto, Gottne rubri & albi nomine misso: sic & Alpinus, Gottne rubrum nominavit, differentiam inter Gottnerubrum & Gottne album (hoc enim Holoſtij species est) faciens. Idem & Borrio rubro nomine, à Sprengero Heidelbergæ accepimus.

## DE LIMONIO.

## CAPVT XV.

**I.** **LIMONIUM** maritimum minus foliolis cordatis: ad radicem crassam, lignosam, rufescentem parumque fibrosam, folia plurima, densa, carnosa, lævia, subrotunda, per terram instar cespidis sparguntur, in quibusdam plantis obtusa, nulloque mucrone prædita: in alijs, in summo sinum habentia & cordis formam referentia: inter quæ cauliculi plures, inæquales, trium, quatuor, etiam sex unciarum teretes nudi, prodeunt, in plurimos breves & recurvos ramulos divisi, flosculis frequentibus parvis, pallide rubentibus onusti. Hoc in littore maritimo, ut, circa Malsiam & Louornum, reperitur.

**II.** **LIMONIUM** maritimum minimum: tota plantula uncias quatuor vix excedit: nam ad radiculam oblongam, rufescentem, in summo divisam, foliola minima, subrotunda, crassa, instar Sedi compacta, inter quæ cauliculi unciales, paucos flosculos pallide rubentes, vel subcæruleos sustinentes, exurgunt. Hoc in Insula quadam non longe Malsia, provenit. De alijs

Limonij differentijs, in  
Theatro agitur.



## DE BISTORTA.

## CAPVT XVI.

**B**ISTORTA alpina maxima: ex radice quadruplo quam in vulgari maiore, contorta, geniculata, fibris capillata, foris nigricante, intus alba, caules bicubitales, nodosi, striati, majori ex parte nudi exurgunt, quorum quælibet spicam florum subpurpureorum, unciarum quatuor sustinet: folia habet oblonga, in acumen desinentia, venosa, superne videntia, inferne cæsia, vel etiam incana: quorum quædam ad cubiti altitudinem accedunt, sed angusta, uncias tres lata. In altissimis Silesiorum montibus reperitur, ut in Sudetorum jugis, velut ad Gigantæum, Albis fontes

Schneegruben.



## DE PYROLA.

## CAPVT XVII.

**P**YROLA Alfinæ flore duplex est. Europæa & Americana, utraque major & minor est: nullius hæcenus figura posita fuit: Europæam tamen, primus Val. Cordus in obser. sylv. sub herbarientali proposuit; dein Iohannes Thalius, in sua Hærcynia Saxothuringica, sub Alsmanthemo descripsit: & Johan. Francus in horto Lusatix, nomine herbæ pusillæ trientalis, & tandem Casp. Schvenckfeldus, in suo Catalogo plantarum Silesiæ, Alsiuem alpinam nominavit: nulla differentia ostensa, Alsinanthemi majoris & minoris nomine, à D. Sigfrido Helmaftadio: Pyrolæ Bohemicæ majoris & minoris, à D. Doldio: minorem vero, nomine Anonymi Betulæ folio, in betuletis Scotiæ natam, D. Cargillus, ex Scotia misit. Hujus descriptionem, à prædictis propositam, præterire, & Brasilianam majorem describere, in præsens lubet.

## Pyrola alfinæ flore major.



**PYROLA** Alfinæ flore Brasiliæna: ex radicularibus, tenuis, laevis, sex, septemve uncularum, inferiorem parte nudus. circa medium duobus foliis parvis sibi oppositis donatus, superius vero folijs sex vel septem per abirum cinctus: quæ magnitudine imparia sunt, aliquibus uncias duas alij unam longis, unciam vel semunciam latis, Plantaginis quinquenerviæ forma (cum & per hujus folia quinque nervi discurrent) sed glabra, tenera & viridia, in acumen fastigiata, ex quorum medio pedicellus tenuis, uncialis exurgit, florem singularem, pallide luteum, ungui pollicis æqualem, quadrifolium, striatum, cujus folia (stellæ modo disposita) lateralia, alij duobus latiora sunt: ad floris umbilicum, staminula plura exigua, rufescentia occurrunt.

Hæc in Brasilia apud Tououpinambaultios reper-

reperita est, & ab Europæa, potissimum folijs quinquenervijs differt, cum per Europæam, tam majoris quam minoris folium medium, unus nervus feratur, à quo fibræ per latera sparguntur: dein flore quintuplo majore: At minor Brasili-ana, ab Europæa minore, solum foliorum magnitudine, quæ in Brasiliana longiora, angustioraq; sunt, differt.

## DE POTAMOGETO.

## CAPVT XVIII.

**P**OTAMOGETON racemosum angustifolium: radice est capillacea, rufescente, cauliculis tenuissimis, palmariibus, in aqua fluitantibus, folijs angustis, longis, binis ex opposito respondentibus: aliquibus in ambitu leviter sinuatis, aliquibus minime sinuosis: petiolo tenui, brevique, flosculi pusilli, vix in morem congesti insident, quibus granula aculeata, simul juncta succedunt. Hoc prope Monspelium, ad molen-dinum in aqua fluitans reperitur: idem tribuli aquatici minoris nomine, D. Francus ex Lusaria misit.

**II.** POTAMOGETON gramineum ramosum: ex cauliculo pedali, etiam cubitali, tenuissimo, rotundo, albicante, in plures alas brachiaro, folia graminea, oblonga, atrovirentia, non alternatim, sed multum ad invicem distita, prodeunt, quæ in alia folio. fere capillacea, abeunt, nihilominus tamen ex primi folij ala, cauliculus in similia folia abiens, exurgit: in extremo caulis, pediculus triuncialis, flosculi minores, & granula sub sequentia minuta & subsæpera, non racemi modo, sed magis, & velut in spica, dispersa, sustinet. Hoc in paludibus Austriæ fluitans. Fontilapathigraminei nomine, D. Burserus misit.

**III.** POTAMOGETON minimum capillaceo folio: hoc parvum est capillaceo & caule & foliis oblongis, inordinate dispositis, pallide virentibus: in summo, pedicello parvo, modo uno, modo duobus, capitulum minimum & acuminatum, prioris tamen forma, quod minutissimo flosculo pallidulo successit, sustinens, quorum aliud expansum, aliud quasi vesiculæ foliaceæ in in acumen desinentis, inclusum est. Hoc cum sequenti, Monspelio D. Burserus attulit.

**IV.** POTAMOGETON capillaceum, capitulis ad alastrifidis: hoc cauliculo est palmari, pilo

non crassiore, ramoso, articulado, ad quemlibet articulum, folia bina, oblonga, quovis pilotenuiora, ex adverso respondentia: quorum alis, minutissimi flosculi palliduli insident, qui juncti, nodulum quasi referunt, quo maturato, nodulus sive capitulum, ex tribus portionculis semicircularibus in apicem abeuntibus & rufescentibus compositum, conspicitur: nihilominus tamen, ex priorum foliorum alis, pediculus exurgit, qui in tria, etiam plura foliola absumitur, similisq; in medio nodulus adponitur; in summitate namq; capitulum nullum est.

## DE SERPENTARIA.

## CAPVT XIX.

**S**ERPENTARIA triphylla Brasiliana: hanc integram describere non licet, siquidem solum caulis portio cum folio & flore ad manus sit: quare ex caule rufescente, striato, exurgit, folij pediculus palmaris, & lævis, in ejus summo folium tenue, albidum virens, fibrosus, subrotundum, trifidum, in exquisitum apicem desinens, duabus partibus inferioribus, & quidem inferne sinum obrinens, quorum quodlibet uncias cum dimidia latum, longitudine vero uncias quatuor superat: flos serpentariæ majoris forma, similiter pediculo triunciali donatus, longitudine unciarum quinque, latitudine sesquiuncialis, atrorubens, striatus, venis albicantibus perme-dium, maxime extrinsecus, excurrentibus: pistillo nigricante, oblongo, in summo bifido. Ex Tououpinambault Brasiliæ anno 1614. allata.

## DE TVSSILAGINE.

## CAPVT XX.

**T**VSSILAGO alpina folio oblongo: ex radice nigricante, minimi digiti crassitie, plurimis fibris donata, caulis exurgit cubitalis, hirsutus, rufescens, striatus & asper: folijs ad radicem quinis, senis, longis pediculis donatis, oblongis, nigricantibus, duris, hirsutis asperis, per marginem crenatis, & imparis longitudinis: at in caule binis, ternisve angustioribus: cujus summo, aliquando in ramos divisio, flos muscosus, luteus, satis magnus insidet, qui tandem in papum evanescit. In Helvetiorum alpi-bus & Baldo (sed angustioribus folijs) provenit.

## DE CACALIA ET LAPPA.

## CAPVT XXI.

**C**ACALIA tomentosa: folia habet Tusilaginifolijs majora, figura instar Personatæ oblonga, in ambitu serrata, nonnunquam sinuata, superne ex virore nigricantia, venis tamen, in cana lanuginea albicantibus, percurrentibus: inferne, propter densam & mollissimam lanuginem qua pubescunt, candidissimis: quorum pedicelli oblongi, striati, non secus ac folia, lanu-

ginosi: de floribus nil constat, cum solum folia aliquot D. Paschalis ad nos miserit, in Sumano monte prope Vincentiam collecta: eandem circa Thermas Fabarias, sed floribus, cauleq; carentem, postea observavimus.

**LAPPA** rosea: hæc à vulgata differt capite: nam circa floris capitulum, folia plura, veluti in Plantagine rosea, dense stipata, junguntur, quæ singula in mollem aculeum desinunt: hæc apud

Lipsenses frequenter reperitur: unde à D. Jungeimanno acceptum.



## LIBER SEXTVS.

## DE LEUCOIO.

## CAPVT I.

**I.** **LEUCOIVM** luteum magno flore: hoc à vulgari Leucoio luteo Keiri dicto, differt magnitudine & colore, quia parum fruticem, valde ramosum & totum virentem refert: folijs est majoribus, viridibus, splendentibus: floribus quadrifolijs magnis, ita ut hujus folium, vulgaris totum florem pene adæquet, odoratissimis, intensiorisq; lutei coloris: siliquis copiosis, semen minutum, planum rufum continentibus. Hoc Majo mense & majore ætatis parte floret, pertinuis est, & frigoris patiens, cujus semen Leucoij lutei Hispanici nomine missum est.

**II.** **LEUCOIVM** luteum serrato folio: hoc à præcedente folijs porissimum diferepat, quæ duplo pene longiora, angusta, per latera crenis aspersis ferrata, & in aculeum finientia, quæ similiter crassa, sed pallide virentia, mollia, quia parte inferna quasi lanugo aspersa est: flores lutei sunt & magni. Hoc D. Doldius Norinberga misit.

**III.** **LEUCOIVM** luteum sylvestre hieracifolium: hoc circa radicem crassiusculam, albicantem, in oblongas fibras capillatas abeuntem, folia plura habet per terram sparsa, eaque oblonga, angusta, subsæpera, sinuosa & per ætatem in planta luxuriant Hieracij instar sinuata, quæ circa caulem pedalem, striatum nonnihil incanum alternatim disposita, oblonga, latiuscula, ut in Keiri vulgari pallide virentia, ob raras crenas

inæqualia tactuq; oblevissimam hirsutiem aspera: caulis major pars floridus est, flores lutei sunt, quadrifolij, Keiri floribus minoribus oblongis pediculis donati, quibus siliquæ triunciales stratisimæ, in summo utrinque parum reflexæ, succedunt: hoc in sylvis prope Neustadium Harcyniæ reperitur, unde D. Furerus misit.

**IV.** **LEUCOIVM** album odoratissimum folio viridi: radice est multiranda, caule viridi, ramoso, aliquando minimi digiti crassitie: folijs viridibus splendentibus, crassis, Keiri folijs forma respondentibus: floribus albis, quadrifolijs, suavius admodum & quidem vespere Hesperidum modo, olentibus, cujus nomine nostrates, Wissem Nâgstein/ id est, moscum redolentes garyophyllos vocant: quibus siliquæ longæ, crassiusculæ, virides, duplicem planorum seminum ordinem, membrana intercurrente, continentes, quod Leucoij albi Cretici nomine primo accepimus. Hoc per aliquot annos durat, si hyeme in cella asservetur.

**V.** **LEUCOIVM** minimum Creticum: cauliculo est palma minore, viridi, striato, levissimis tamen pilis aspersis: foliolis subrotundis, pallide virentibus, longis pediculis donatis, aliquando binis ex opposito, alijs alternatim sitis: cauliculi summum in duos pedicellos a bit, qui stocculum oblongum, cæruleum, quadrifolium, modo unum,



unum, modo duos, sustinent. Hoc ex horto nobiliff. Contareni, D. Leritzius attulit.

V. LEVCOIUM maritimum minimum: radicula habet tenuissimam, oblongam, albam, ad quam foliola minima quina, senave, subrotunda & pallida: cauliculis sesquiuncialis, rufescens, quinis, senis, foliolis oblongis, obtusis, hirsutis subcanis, alternatim dispositis, cingitur: flosculum unum vel alterum subæruleum, cauliculus & pedicellus hirsutus sustinet. Hoc in littore maris prope Terracinum reperitur.

## DE HESPERIDE.

## CAPVT II.

I. HESPERIS sylvestris flore parvo: caule est cubitali, viridi, striato, nodofo, multis alis fere palmariis, donato & concavo: folijs quam in vulgari acutioribus, in ambitu profundius serratis, viridibus, subhirsutis & minus vulgari asperis: floribus plurimis, subæruleis. quadrifolijs parvis, ita ut hujus flos integer vix vulgari foliolum adæquet, quib. siliquæ strictissimæ succedunt. Hæc, circa Monspelium in horto Dei, ad aggeres aquarum, à D. Bursero collecta fuit.

II. HESPERIS sylvestris Hieracij folijs hirsuta: tota planta hirsuta est, caulem habens pedalem, angulosum, hirsutum, pallide virentem, in summo in ramos aliquot alternatim dispositos divinum: folia Hieracinis instar lacinata & sinuata, oblonga, angusta, acuminata, crassa, hirsutis aspera, quorum superiora pediculis carent: flores in calicibus hirsutis rubri, magnitudine Hesperidis vulgaris flores æquantes: quibus similes siliquæ, semen continentes succedunt. In saxosis humidis Provinciæ, D. Burserus legit.

## DE SAPONARIA.

## CAPVT III.

SAPONARIA concava Anglicæ: planta est elegans, radicibus fuscis, crassis, longis, lentis, repentibus fibellis paucissimis adherentibus: unde caules exurgunt cubitales, rotundi, striati, glabri & albi, geniculis distincti, in terram reclinati. & concavi: circa quos folia viridia, glabra, subrotunda, nervosa, uncias duas lata, paulo longiora, rarius ex singulis geniculis bina, sed ex quolibet geniculo unum tantum, nullo certo ordine vel numero nascitur, quod antequam expandatur, situlæ instar caulem complectitur: flores in summo caulicorum, ex superiorum foliorum sinu, tenebricosis pedicellis subnixi, ex cali-

culis oblongis nonnihil hispidis prodeunt, Saponariæ vulgaris forma, ex quinque folijs per oras crenatis, commissi, qui colore albi sunt, levi carneo colore asperso, in quorum medio flaminula quædam exigua: semen non vidimus.

Hæc ætate media floret in Angliæ, quæ in Comitatu Northampton, in nemore quodam Spiæniæ dicto, à D. Gerardo Chirurgo Londinensi reperta, Gentiana concava nominata, & Londino à D. Listero, una cum figura suis coloribus illustrata, missa fuit.

## DE LYCHNIDE.

## CAPVT IV.

I. LYCHNIS auriculæ ursi facie: hanc in Phytopinace sub Lychnide viscosa Cretica exhibuimus, cujus hæc perfecta descriptio est: radice est alba, longa, & fibrosa, folijs ad radicem pluribus, etiam viginti numero, per terram sparsis, incanis, lanuginosis, Auriculæ ursi folijs forma & crassitie similibus, uncias tres, etiam quatuor longis: quæ ex longissimo & latiusculo pediculo sensim rotundam figuram acquirunt & rarius unguem latitudine superant: caulem habet sesquicubitalem, ramosum, rotundum, hirsutum, firmum, in summo lento succo glutinosum: flores ex viridi flavescentes, plures, quasi in umbella congesti, quinquefolij & bifidi: quibus caliculi parvi, semen minutum nigricans continentes, succedunt. Hanc à Joh. Bauhino, Viscaginis auriculæ ursi facie Candia, quo nomine semen à Casabona Florentia acceperat, primum habui: dein Lychnidis auriculæ ursi facie: & hanc postmodum Clusius, Lychnidis sylv. latifoliæ nomine, exhibuit.

II. LYCHNIS sylv. minima exiguo flore: ex radícula oblonga, tenui, cauliculis rotundis, rufescens geniculatus, trium quatuorve unciarum, in alas minimas brachiatus exurgit, foliolis binis exiguis, acutis, ad quemlibet geniculum & alam & ex qualibet ala, pedicelli oblongi, angustissimi, rigidi, quib. flosculus purpurascens, ex quinque foliolis, singulis cordis formam referentibus, compositus insidet. Hæc circa Monspelium, in pede montis qui est prope Boutonet copiose reperitur, quam Centaurium minimum appellabant. Verum ante quadriennium eandem, sed palmum superantem, & Florentiæ ad agrorum margines natam, Tunicæ peculiaris nomine, à D. Burf. accepimus.

## DE CARYOPHYLLO.

## CAPVT V.

**I.** CARYOPHYLLVS arborefcens Creticus: ex radice crassa, alba, dura, & lignosa, caules cubitum superantes exurgunt, albi, rotundi, læves, geniculati, lignosi, in alas brachiati: folia habet ad radicem plura, longa, angusta, in acutum mucronem desinentia, pallide virentia, in caule paucissima: flores, & calicibus viridibus, tenuissimis & acutissimis foliolis cinctis quinquefolij, eleganter, sed non profunde, fimbriati, ex diluta purpura rubentes, prodeunt: ex quorum medio staminula plura brevique prominent: semen vero paleaceum in cauliculis continetur. Ex femine Cretico, in horto Montembelgardiano velut in arbusculam excrevit.

**II.** CARYOPHYLLVS sylvestris repens multiflorus: ex radice crassa, lignosa, subfusca, cauliculi plurij, etiam quandoq; supra triginta, trium quatuorve unciarum, tenues, partim in terram reflexi, partim erecti, paucis foliolis cincti, quæ circa radicem plura, brevissima, angustissima, dura, mucronata, viridia: quibus singulis flos, modo unus, sæpe duo simul cauliculis ad exortum junctis, quinquefolij aliorum forma, pallide rubentes insident. In saxosis circa Monspelium proferit.

**III.** CARYOPHYLLVS sylvestris biflorus: ex radice parva, folia pauca angustissima, ut prioris, sed multo longiora, exurgunt, & inter hæc cauliculus tenuis, plus minus palmum altus, in summitate in duos pediculos semper distinctus, quorum singuli florem magnum, Caryophylleo syl. vulgarissimo multo majorem, quinquefolium, leviter laciniatum colore pallide rubentem sustinet. Circa Genevam D. Cherlerus collegit.

**IV.** CARYOPHYLLVS pumilus latifolius: à radice cauliculus statim in duos ramulos sex uncias altos, tenues, rotundos divisus prodit, cui ad radicem folia brevia, latiuscula, in ramulis longiora, mollia & pallida, binis sibi invicem ad geniculos respondentibus: cuilibet ramulo, flos unus, priore multo minor, pallide purpureus, magisq; albens ex brevi calice prodians, insidet: ex Austria D. Burserus misit.

**V.** CARYOPHYLLVS holostius alpinus latifolius: ad radicem tenuem, albicantem, fibrosam & repentem, cauliculi aliquot in terram reclina-

ti, hirsuti, trium, quatuorve unciarum, folijs parvis, subrotundis, latis binis, sibi invicem respondentibus, hirsutis, & crassis cincti: ex alarum sinu, pediculo tenui, triunciali, leviter hirsuto, singuli florem unum, calici viridi primo inclusum, dein quinquefolium magnum & album sustinent. cui capitulum oblongum, semen continens succedit. Hic in Valesianorum alpidibus, loco Gemme dicto, & circa Fabarias reperitur.

**VI.** CARYOPHYLLVS holostius alpinus angustifolius purpureus: & hic radícula est repens, cauliculo tenui, triunciali, leviter hirsuto, circa quem foliola parva, oblonga, acuminata, bina sibi opposita: flores in summo bini, terni, prioribus minores, purpureoscentes, stellæ in modum dispositi, calicis foliolis viridibus alternatim velut intercedentibus: ex Pyrenæis Hispanicis, D. Burserus attulit.

**VII.** CARYOPHYLLVS holostius alpinus gramineus, radiculam habet exigua, caulem palmarem, exilem, rotundum, geniculatum, pilis levissimis donatum, circa medium in ramulos & hi in alios brachiatur: folia ad radicem pauca, ad geniculum bina ex opposito respondentia, atrovirentia, angustissima, unciam longa; flosculi albi quinquefolij, ex calice prodeuntes, singuli, singulis pedicellis insident: quibus exiguum capitulum, minuto semine refertum succedit. In alpidibus provenit: in Austriæ monte Taurero, D. Burserus legit.

**VIII.** CARYOPHYLLVS holostius montanus angustifolius albus: & hic cauliculo est tenui, geniculato, rufescente, glabro, trium quatuorve unciarum: folijs oblongis, angustis, glabris cincto, floribus albis quinquefolijs, & prædicto quinto multo minoribus. In horto Dei, D. Burserus legit.

**IX.** CARYOPHYLLVS holostius tomentosus latifolius: ex radice tenui & repente, caulis tenuis, rotundus geniculatus, in terram reclinatus prodit, qui statim in ramulos plures palmares, semipalmares, etiam minores subdividitur; quos folia oblonga, latiuscula, quædam subrotunda, ob lanuginem asperam mollia & alba, bina & opposito respondentia, cingunt: flos non est conspectus: Hunc ex horto Pisano & quidem secundo, primum opera D. Wolfhardi Ocymoides tomentosus nomine, accepimus.

**X.** CARYOPHYLLVS holostius tomentosus angustifolius

guistifolius: hic cauliculis est palmo minoribus, erectis, tenuibus, rotundis & parte inferna geniculatis, superiore parte nudis & pene glabris, qui statim in ramulos brevissimos, ex alarum sinu, ex adverso sitos, dividuntur: folia habet oblongiuscula, angustissima, reflexa, ob tomentum mollia & ex viridi albicantia: cauliculus in tres pedicellos, binis foliis sustentatos, eosque oblongos, sed longitudine impares, abic, qui singuli calicem viridem sustinent, cui flos unus, isque albus & quinquefolius insidet: hunc in Granada, ad radicem montis copiose D. Albinus observavit.

Caryophyllus arvensis glaber minimus.



XI. CARYOPHYLLUS arvensis glaber minimus: ex radice capillacea rufescente, cauliculus unus vel alter, tenuissimus, geniculatus, pedalis pro-

dit, in summo valde ramosus, ramulis capillo tenuioribus, quorum singuli, singulos flosculos albos, minutissimos, in duos apices abeuntes sustinent: folia habet pauca, longa, angusta. Variat magnitudine, nam & semipalmaris est, paucissimis, capillaceis, brevioribusque foliis. Illum ex Euganeis collibus habemus: hunc vero Montpelio: & hoc adhuc minus ex sylvis prope thermas Wisbaden sesinfra Moguntiam.

XII. CARYOPHYLLUS saxatilis ericæfolius umbellatis corymbis: ex radice tenui, contorta, lignosa & reclinata, cauliculi plures, geniculati, rufescentes, semipalmares, attolluntur: ad quorum exortum foliola brevia, angusta, ericæ similia & ad genicula bina brevissima & rigidiuscula: cauliculorum summitatibus, veluti umbellæ ex corymbis compositæ insident, unde flores candidi, ex quatuor, aliquando quinque foliis constantes, prodeunt. Hic in Galliæ provincia locis saxosis, in monte edito prope Vigan reperitur.

XIII. CARYOPHYLLUS saxatilis ericæfolius ramosus repens: hic inflat musci elevati per terram repens, ex radice caulem lignosum emittit, in ramos plures, & hos in alios subdivisum, quos folia exigua ericæ foliis similia cingunt: quorum summitatibus flores copiosi, nivei, magni, elegantissimo spectaculo insident: ex Pyrenæis D. Burserus attulit.

Hunc floribus rubris, sed majoribus, foliisque ad cauliculos longioribus & laetioribus, ex Hispania habemus. Uterq; à Caryophyllo muscoso, sive musco florido, diversus est.

XIV. CARYOPHYLLUS saxatilis siliquosus: è saxorū fissuris in Hircyniæ promontoriis, planta perennis erumpit, foliis ad radicem pluribus, bellidis forma, sed multo minoribus, oblongis pediculis donatis, tenuibus, pallide virentibus, inter quæ cauliculi tenues, læves, palmares, in oblongos ramulos divisi, foliis paucis, longis, angustis cincti, prodeunt: ramulorum summis flores candidi, quadrifolii insident, quibus siliquæ strictissimæ, minutissimum semen rufescens continentes, succedunt. Gypsophyti siliquosi nomine, D. Furerus communicavit.



## DE ANTIRRHINO.

## CAPVT VI.

**A**NTIRRHINUM saxatile folio serpilli: radice est parua, ramis multis, reflexis, tenuibus, leuiter hirsutis: foliis Serpilli vulgaris forma, sed minoribus: floribus rubris, aliquando pallide cæruleis, pedicellis oblongiusculis insidentibus, forma & magnitudine una cum capitulo succedente, Antirrhino arvensi minori similibus. Massiliæ in saxosis provenit.

## DE LINARIA.

## CAPVT VII.

*Linaria bellidis folio.*



**L**INARIA latifolia Dalmatica magno flore: caulibus est lignosis, rotundis, firmis, cubitum superantibus, in ramos brachiatis, quos folia, præsertim inferiora, unciam lata,

duas longa, pediculis carentia, in apicem acutissimum desinentia, nullo ordine servato, ambiunt: flores habet Linariæ vulgaris floribus, forma similes, sed triplo imo quadruplo majores, ex luteo rufescentes aureosque, quibus vascula ut in aliis succedunt. Hanc anno 1594. in horto Montembelgardiaco collegimus, enatam ex semine à Casabona Florentia misso, nomine Linariæ maximæ Dalmaticæ lauri foliis: eandem quoque nomine Linariæ perennis fruticantis Creticæ accepimus.

**II. LINARIA** Americana parvo flore: ex radice, caules plures sesquicubitales, rotundi, læves, rufescentes, in ramos plures divisi, exurgunt, quos folia triplo quam in priori angustiora, in exquisitum apicem desinentia, atroviuentia, alternatim nulloque ordine disposita, cingunt: floribus est aureis, iisque longe quam in vulgata minoribus. Hæc an. 1601. Argentinæ, in horto D. Saltzmanni crevit.

**III. LINARIA** latifolia triphylla: caulibus est viridibus, rotundis, striatis, glabris, sesquipalmaribus, in summo brachiatis: foliis ut in Linaria Valentina Clusii, terno, & adversis inter se petiolis ordine adherentibus, dispositis, quolibet folio uncia latiore & duabus longiore, tenui, ex glauco virecente, venis ternis, ut in plantagine per longitudinem discurrentibus: at in caulis summo, modo terna, modo bina, modo sine ordine sita sunt: extremo ramo veluti spica oblonga florum Linariæ vulgaris similibus, rictu flavo, calcarum vero pallide cæruleo. Hanc Linariæ latifoliæ Valentini Clusij nomine D. Doldius misit, cujus in Phytopince sub Linaria commemoramus. An hæc Linaria Cretica latifolia Clusij, in sua historia?

**IV. LINARIA** capillaceo folio erecta flore odorata: hæc caulibus est cubitalibus, rotundis, ramosis: foliis plurimis, capillaceis, nulloque ordine dispositis: floribus parvis ex cæruleo, alboque mixtis, cujus rictum linea flavescens distinguit, suavem & subtilem odorem spirantibus: quibus capitula Lino fere similia, minutum semen in pericarpis continentia, succedunt. Planta perennis est, Monspeuli sponte proveniens: nonnunquam ibidem in muris reperitur: flore vario, coloribus ex albo, cæruleo & luteo mixtis.

In hortis, cultura omnibus sui partibus major est, duos cubitos superans, & quædam duplex, alteri flo-

ri flos odoratior, alteri inodorus: quæ ex radice repente & perenni mire se propagat.

V. LINARIA arvensis cærulea erecta: hæc radice est exili, capillacea, cauliculis palmaribus, foliis capillaceis, sed rarioribus & brevioribus, quam in priore: floribus parvis, violaceis, lini capitulis exiguo semine refertis. Hæc in agris Lusitaniæ flore est cæruleo: at Monspessuli in arvis ad montem Cetum violaceis reperitur.

VI. LINARIÆ aureæ affinis: caule est cubitali, rotundo, lignoso, in ramulos brachiato, quorum summitatibus flores lutei, Senecionis majoris forma, & similiter in pappum abeuntes, insident: folia oblonga, angusta, Kali majoris cochleato semine, foliis & forma & modo dispositis (sed densiora) habet. In Aragoniæ locis desertis, D. Albinus collegit.

LINARIAM bellidis folio, à C. Clusio, Lobelio & alio. b Linaria odorata, descriptam, sed non recte icone expressam, cum calcaribus careat, figuram veram adponere visum fuit.

DE LINO.

#### CAPVT VIII.

I. LINUM frutescens subflavum: fruticosum est, caulibus cubitalibus, tenuibus, levibus & ramosis: foliis angustis, brevibus, sine ordine dispositis: floribus in summis cauliculis multis & magnis, subflavis, quinquefoliis, totidem in medio staminibus. Hoc in Granada D. Albinus legit.

II. LINUM sylvestre cæruleum folio acuto: caule est pedali, rotundo, lignoso, statim ad exitum in ramos palmares diviso, quos folia atrovirentia, basi latiore alternatim cingunt, & in

exquisitissimum, & veluti aculeatum mucronem desinunt: ramorum summitatibus, cauliculi multi quasi in umbella dispositi, caules alii quot apicibus donatos sustinent, è quibus flores magni, cærulei, quinquefolii, in medio staminibus donati, prodeunt, quibus vascula subrotunda succedunt. Hoc in saxosis Provinciæ, non longe Massilia provenit.

III. LINUM minimum stellatum: tota plantula duarum, rarius trium unciarum est, radiculæ capilli instar tenui, albicante, cauliculo uno vel altero tenuissimo, foliolis brevibus, in exquisitissimum parvumque apicem desinentibus: inter quæ flosculi parvi, pallide virentes, stellati, ex quinque radiolis, exiguum circulum veluti umbonem cingentibus, compositi. Hoc Monspessuli in Gramuntio & Boutoneto provenit, & ab aliis lingua avis minor, ab aliis Passerina minor saxatilis, dicebatur.

DE HYSSOPO, HYSSOPI FOLIA, SIVE

Gratiola minore, & Thymo.

#### CAPVT XI.

HYSSOPUS latifolius: caulibus est lignosis, rufescentibus, striatis: foliis triplo quam in vulgari latioribus, striatis: foliis triplo quam in vulgari latioribus, obtusis, in reliquis cum vulgato conveniens. Londino D. Cargillus misit.

2. Addidit & alium, à vulgato solum foliorum colore diversum, qui in hoc atrovirens, in illo vero pallide luteus.

3. Sic & tertium hirsutum, cujus caules & folia, molli lanugine pubescunt.

## Hyssofifolia five Gratiola minor.



**HYSSOPIFOLIA** five *Gratiola minor*: ex radice modo crassiore, modo tenuiore, ac fibrosa albida, caulis exurgit cubitalis, in plures ramulos divisus, subrufus, rotundus, striatus, quem folia Polygoni masculæ æmula cingunt, pallide virescentia, alternatim disposita, & pediculis carentia: ex quorum alis flores singuli, oblongis cauliculis inclusi, eleganter cærulei quadrifolii: hos sequuntur valcula oblonga, semina minuta subfusca continentia. Hæc omnis odoris expers est, & pene insipida, licet aliqui nitrosum, alii subdulcem saporem in ea notarint.

Variat foliis: altera est latioribus, quæ altius exurgit: altera angustioribus & oblongis, quæ vix palmaris, Iunio mense florent. Florib. item; nam ex Hispania habemus, quæ flores habet oblongos, forma Gratiolæ vulgaris similes, qui saturationis coloris cærulei sunt. Locis humidis & ubi gurgulis nascitur, quamprimum in paludibus

Patavinis & ad portum S. Iustinae & quidem latioribus foliis, legimus: dein circa Monspelium in rivulis, ubi Anagallidem aquaticam vocabant: tum in Alsaria non longe Müllhusio, item locis udis: quæ vero foliis angustioribus est, Möspelluli, ad lucum Gramuntium provenit. Hanc videtur notasse Cordus in observ. *Grasse Poley* & Gesn. libel. de coll. stirp. Gratiolæ minoris nomine. Camerarius, qui in Franconia observavit: Hyssoioidem nominavit, & in Hassia, Halimum aquaticum vocari monet: in Phytopinace sub Hyssofifolia Joh. Bauhini, & in Matthiolo emaculato sub Gratiola minore, figura addita (quæ hæcenus nullus exhibuit) proposuimus.

**THYMUM** inodorum: suffrutex est, ob lævem lanuginem, qua pubescit, incanus, caule lignoso, cortice incano, rugoso, vestito, qui in plures ramos palmo minores, recurvos, hique in alios & velut in orbem dispositos, dividitur: quos per intervalla folia brevissima, angustissima, plura simul juncta, inodora & pene insipida, sed altitringendi vi prædita, cingunt: cauliculorum summis flores purpurei, forma & dispositione Thymi vulgaris floribus similes, insident. Hoc in regno Valentia, locis arenosis in litore ad Alicanta, copiose provenit, D. Albino referente.

## DE SERPILLO ET POLIO.

## CAPVT X.

**SERPILLUM** latifolium hirsutum: tota planta sob mollem lanuginem, qua pubescit, præsertim caulibus incana est: cauliculis donatur frequentibus, tenuibus, longis, recurvis: qui foliis subrotundis, pediculis oblongis, binis ex adverso nascentibus, cinguntur: cauliculorum summis capitula hosculorum purpurascens, ut in vulgari, insident. Hoc sæpius locis aridioribus apud nos reperitur.

**POLIUM** latifolium incanum Creticum: & hæc planta tota, tomento albo, molli, tecta est, habens caules pedales, rotundos, in ramos palmares, hoscque in breviores subdivisos, quos folia subrotunda crenata, instar Alsines hederule folio, vel Chamedrys, crassa, rugosa, bina ex adverso nascentia, inferne candida, superne ex viridi flavescentia, quæ masticata pene insipida (in secca planta) & non secus ac si tomentum dentibus concreteretur sensum præbent: flores non vidimus. Hoc ex Creta ab Honorio Belli, nomine Poli platiphylli Cydoniensis, accepimus.



*Ocimum latifolium maculatum.*

inordinate disposita, potissimum cauliculi partem summam ambientia, vulgaris Origani odore. Hoc circa Aureliam Gallorum copiose reperitur.

OCIMUM latifolium maculatum, sub latifolio à Cæsalpino, Basilici Indici vel potius Hispanici nomine, à Camerario exhibitum: cum ejus figuram hæcenus apud Herbarios non viderim, non abs re fore judicavi, si his adderetur.

DE MENTHA ET, CALAMENTHA.

CAPVT XII.

I. MENTHA rotundifolia minor, seu flore globoso: caule est pedali, anguloso, rufescente, hirsuto, aliquando incana lanugine cincto: quem folia ex rotunditate oblongata, mollia, hirsuta, per marginem crenata, subtus incana, superne atrovirentia, bina semper sibi mutuo opposita, ambiunt: ex foliorum alis, nonnunquam ramuli prodeunt, quibus flores, veluti in capitulum globosum collecti, purpurascetes insident: tota planta gravis odoris est. In scrobibus humentibus & riguis, secus fossas aquarum reperitur.

II. MENTHA radice geniculata: ex radice modice crassa, geniculata, fibris distincta, caulis exurgit cubitalis, quadratus, tactu aliquantum, asper, quem foia oblonga, Menthae spicatae similia, parique modo disposita, mollia, nigricantia, nonnihil rugosa, in ambitu serrata, ambiunt: flores habet in spica oblonga, galericulatos, ut in Mentha Cattaria, dilute purpurascetes: quibus vascula succedunt, semen rotundum, quod tritum aromatici odoris est, ut & tota planta continens. Hanc & Menthae tuberosae &

Nepetae angustifoliae odoratae nomine, accipimus.



DE PULEGIO ET ORIGANO.

CAPVT XI.

PULEGIUM foliis nummulariae: ex horto Paravino D. Heyl ante undecim annos attulit, hujus ramum tenuem, palmarem, quasi geniculatum, quem folia & singulis geniculis bina, tenuia, intar Nummulariae rotunda, sed sexcuplo minora, pedicellis donata, & ex adverso sibi respondentia, cingunt, & floribus ex albo caeruleis, caulem verticillatim ambientibus, subjiciuntur. Hoc odore vulgari multo est gratiore.

ORIGANUM sylvestre humile: ex radice lignosa, rufescente, fibrosa, cauliculus communiter unus, rotundus, rufus & asper, unciarum sex vel septem, exurgit: qui in summo in ramulos plures dividuntur, hique flores, umbellae formae ex caeruleo purpureoque mixtos, sustinent: folia habet parva oblonga, subhirsuta, compacta &



Mentha Cattaria minor.



III. MENTHA Cattaria minor: caulem habet cubitalem, quadrangulum, geniculatū, in multis ramos, & hos in alios, divisum: quos folia oblonga acuminata, in profundas crenas veluti lacinias divisa, odore quam in vulgari vehementiore quidem, sed suaviore, ramulorum extremis flores pallidi, vulgaris forma insident, quibus calices exigui, semen nigrum subrotundum continent, succedunt: quod Iunio & Iulio, in horto floruit, semine Patavio ex horto Bembiano, Nepetellæ nomine misso. Hanc à Cattaria tenuifolia Clusii, quæ folia habet angusta, leviterque crenata, totaq; incana est, diversam facimus, utriusque figuram in Theatro exhibituri.

IV. MENTHA Cattaria minor alpina: hæc caule est pedalis, anguloso, rufescente & ramoso: foliis priore quadruplo minoribus, Nepetæ vulgaris forma respondentibus, quasi triangulis, subcanis, serratis, floribus pallidis, galericulatis, ve-

luti in spica dispositis & prioribus similibus. Hæc in montosis circa Neapolim Italia: provenit, unde semen Nepetæ alpinæ nomine, ab Imperato accepimus.

CALAMENTA vulgaris flore exiguo: caules habet pedales, angulosos, lanugine alperfos, & veluti geniculatos, unde folia bina, subrotunda, atrovirentia, hirsuta, sibi mutuo opposita prodeunt, ex quorum alis, majore caulis parte, pedicelli gemini, hirsuti efferuntur, flosculos minutos, vulgari forma similes & colore nonnihil purpurascens, sustinentes: quibus semen exiguum nigricans succedit. Hæc in Sabaudia inter monasterium & Ayme, locis acclivibus, Iulio florens, collecta.

DE MARRUBIO.

CAPVT XIII.

I. MARRUBIUM palustre hirsutum tenuius laciniatum: caulem habet cubitalem, quadrangulum, leviter hirsutum, quem folia dura, hirsuta incana & aspera, Scabiosæ montanæ calidarum regionum modo ad collam mediam, in plures oblongas, angustas, acuminatas, & crenatas lacinias divisa, ambiunt: flores parvi, albicantes, ex calicibus asperiusculis prodeuntes, caulem verticillatim, ut in Marrubio palustri vulgari glabro, cingunt. Hoc locis humidioribus in Austria reperitur, unde Sideritidis 2. Matthioli nomine, accepimus.

II. MARRUBIUM album villosum: cauliculos edit pedales, lignosos, rotundos, albos, villosos, in ramulos divisos: folia sunt subrotunda, parva, crassa, per ambitum crenata, ob tomentum album inferius adpositum, Gnaphalii instar mollia superius rugosa & nigricantia: flosculi, ut in vulgari, caulem verticillatim ambiunt. Hoc in agris Lutetianis collegimus.

III. MARRUBIUM album crispum: & hoc cauliculis est lignosis, rotundis, albis, sed foliis minoribus, crispis, crenatis, utraque parte cinereis, nec ita tomentosis: flosculi subcandidi in punctibus conceptaculis caulem per intervalla verticillatim ambiunt. Hoc à D. Neudorffero accepimus.

DE LAMIO.

CAPVT XIV.

LAMUM peregrinum Scutellaria dictū: radice est urticæ simili, flavescente, obliqua & fibrosa,

brofa, à qua primo vere exurgit caulis singularis, rectus, quadratus, geniculat<sup>9</sup>, hirsutus, & cubitalis, quem folia ambiunt, per genicula bina, oblonga, hirsutæ levi incana & mollia, profunde incisa, obscure virentia, petiolis oblongis, hirsutis, & mollibus, donatis: ad quorum exortu, circa caulis medium, utrinque; ramuli palmares prodeunt: in quorum, ut & caulis summo, folia angusta, parva, acuminata, non serrata, florib. subjiciuntur: flores in oblonga spica, ut in Horminio luteo dispositi, purpurei sunt, rarius albi, oblongi, Lamii modo galericulati, erecti. longa cervice donati, aliquando bini, aliquando etiam simplices, ex uno pericarpio, galeam militarem imitante, producantur: florib. delapsis, semina quatuor rotunda, dura, verrucosa, observantur. Hoc in Calabria, potiss. montosis copiose provenire D. Vorstius significavit: in Campoclaresium collib. & Aquicolorum montib. sylvestris, locis humentib. & saxosis D. Columna nota vit. Ex horto Patavino Scutellariæ nomine primo habuimus, & in Phytopin. sub Teucrio simili Scutellaria (quia tunc summitas tantum fuerat conspecta) descripsimus: & quia vulgo in Calabria, Scutellariam dici, D. Vorstius monuerat, quia tñ. ad Horminum aliquod sylv. referendum putabat. At postmodum doctiss. Columna, qui medium inter Horminum & Lanium censuit, à singulari & privata fruct<sup>9</sup> sive pericarpii forma, militaris galeæ iconem exprimente, Cassidam appellavit: quia hujus fructus rotundi sunt & compressi, hirsutæ crassa, asperginoza, viscosa & odora, manus inficiente, dum virent, obstiti: quorum pars anterior in acutum producitur, fissuram habens oris specie, & desuper veluti in fronte limbū elevatum sui proportionem magnū, elatū veluti diademata, aut crista obliqua, qua ornari videtur, ut in militum galeis.

## DE SIDERITIDE.

## CAPVT XV.

**S**IDERITIS foliis oblongis glabris caules habet quadrangulos, cubitales, velut geniculatos, in quorum summitate rarissimi pili conspiciuntur: folia tenuia, pallide virentia, penitus glabra, bina semper ex adverso nascentia, quorum inferiora, tres uncias longa, unam lata, minimeque serrata sunt: flores, forma quidem Sideritidis vulgarissimæ florib. respondens, sed longiores & majores, galeati & albi, è calicib. asperiusculis prodeuntes, ad foliorum exortum, ab

imo fere ad summum caulem verticillatim ambiunt: quibus semen parvum, nigrum, inæquale, in vasculis plantaginis, succedit. Hanc Heidelbergæ Sprengerius senior, ex horto suo misit.

**II.** SIDERITIS alfine trixaginis folio: hæc radicem habet parvam, fibris capillatam: caulem pedalem, quadrangulum, subhirsutum, qui mox ad exortum in ramos dispergitur, hiq; in alios, in terram reclinatos, quemadmodum in Alfine trixaginis folio, quia tñ. multo major est: folia habet rara, dictæ Alfinis forma, per ambitum serrata, sed majora: ad foliorum exortum, flores subcærulei, oblongi, è calicibus asperiusculis prodeunt, quibus semen parvum subrotundum succedit. Hæc circa Argentinam reperitur.

## DE EUPHRASIA.

## CAPVT XVI.

**E**UPHRASIA lutea radice squamata: radice est velut bulbosa, alba, ex quatuor crassiusculis squamis coarctata, caule pedali, aliquando palmari, lævi, cavo, ramoso; ramulis ex alarum cavis prodeuntibus: quem folia bina, petiolis carentia, basi sua situ adverso cingunt, Alfine trixaginis foliis forma similia, sed acutiora: flores lutei, Euphrasie florib. respondent: quibus succedit semen nigrum, rotundū, in apicē exiguum desinens, quod geminum parvo petiolo infidet. Hæc montosis asperis & humidis gaudet: hancq; primum an. 1606. ex Bienenfium Helvetior. alpib. habuimus: dein, non longe ab Einsiedlen: tum ex Pyrenæis: tandem D. Burserus ex superiore Austria, ex Blaudenstein. prope oppidum Hallstadt natam, transmisit.

**II.** EUPHRASIA purpurea minor: radicem habet lignosam, parvam, nigricantem, in tenues fibras divisam: caulem palmarem (altiores non vidimus, sed minorem duarum triumve unciarum) quadratum, rubentem, leviter hirsutum, aliquando simplicem, aliquando statim ad exortum in duos, rarius plures, parvos ramulos divisum, quæ folia pauca, crassa, hirsuta, rotunda fere & bina, in crenas profundas, inferiora quidem quam minora, in ternas, superiora v. in quinas, senasve divisa, sua basi cingunt: flores è folior. sinu, aliquando à medio caule, aliquando tanquam ex spica comæ, ex utriculis, velut oblongo calice, prodeunt bini, galericulati, purpurascens (câdidos aliqui notantur) quib. semen oblongū, angulosum, candicans, in utriculis succedit. Hæc

in pratis collium Italia frequens est, ita ut quibuldam locis, tapetem purpureum humum ornare videatur: hæc in via Romana, etiam Romæ in monte Testaceo provenit: passim etiam in Castilia, maxime circa Escorial, reperitur. Amara est, & monente doctissimo Columna à pharmacopæis pro Euphrasia altera Matthioli usurpatur. Hanc cum primum collegissemus, Brunellam Italicam nominavimus, hocq; nomine ante viginti quatuor annos in Phytopinace descripsimus: Ulysses Aldroand. Euphrasie speciem, ostendit nominavit: & Columna, Eufragium tertiam sive mediam vocat.

## DE MELAMPYRO.

## CAPVT XVII.

Scrophularia flore luteo.



**M**ELAMPYRUM luteum linariæ folio: radice est candida, fibrosa, caule pedali, rotundo, atrorubente, in ramos plures palmo minores, matremque superantes, non ta-

men æquali & contrario situ positos, diviso: folia sunt oblonga, linariæ foliis angustiora, ex quorû sinu folia alia breviora & angustiora prodeunt: in caulis summo, spica oblonga, ex pinatis cristatisve & ob crenas exasperatis ac subrotundis foliis composita, unde flores pallide lutei, oblongi, concavi, hiantes, antrosum exportecti, prodeunt: semen in siliquis foliaceis oblongum, nigricans continetur. In sylvis nostris montosis, & in Muretto monte, Majo Iunioq; florens reperitur. Linopyron forte dici possit.

## DE SCROPHULARIA.

## CAPVT XVIII.

**I.** SCROPHULARIA flore luteo: ex radice crassa, nigra, fibrosa scrophylis carere, caules lutes exurgunt cubitales & sesquicubitales, quadranguli, subrubentes, leviter hirsuti, mollive lanugine pubescentes & cani: folia habet ad radicem per terram sparsa, uncias quinque vel sex longa, similituræ lata, subrotunda, ob pilos brevissimos asperfos, mollia, longissimis pediculis donata, & profunde crenata: at quæ ca. l. m. cingunt minora sunt, binis semper ex opposito respondentibus: ex foliorum sinibus, ab imo ferre ad summum utrinque prodit pediculus unus, uncias tres longus, lævis & nudus, qui in alios breviores subdividit, uno alterove brevi folio divisioni subiecto: his, quasi corymbi plures insident, ex quibus singulis flos orbiculatus, luteus, in breves lacinias divisus, una cum staminibus aliquot oblongis prodit: capitula subrotunda, Scrophulariæ vulgaris majora acuminata succedunt, quorum acumini filamentum capreoli instar insidet, & hic semina minuta nigra includuntur. Majo & Iunio floruit, semen Autumno maturuit. Hanc à D. Doldio primum accepimus, & velut indistincta censescentes, breviter in Phytopinace, & Matthiolo. figura addita, descripsimus: nunc vero plenius, cum eam annis aliquot in horto coluerimus: quam postmodum doctissimæ Columnæ Scrophulariæ montanæ maximæ nomine descripsit & in valle Campoclaresium atque etiam supra Matesium umbrosis Septentrionalibus nivosis invenit, & à C. Clusio in Pannonicis, pro Lamio Pannonico descriptum censet: sane, notæ aliquot à Clusio Lamio suo Pannonico 2. exotico tributæ, nostræ conveniunt: non desunt tamen, quæ in nostra observatione non est (ut nec figura cum nostra convenit)

nisi forte cultura, varietatem hanc causerit, quamvis & ipse solum in horto observarit.

II. SCROPHULARIA foliis laciniatis: hæc caule est crasso, striato, subrubente, & lævi: foliis atrovirentibus, lævibus, tenuibus, longis pediculis donatis, inferioribus, palmaribus, instar foliorum Raphani, in laciniis quinque oblongas crenatas divisus, ex quorum sinibus folia minora, etiam laciniata prodeunt: at folia in caulis summitate non vidimus: flore est magno, elegantissimo, croceo inferiore parte galera, intrinsecus rubro: plura non licet, quia solum ramum, nomine Scrophulariæ Hispanicæ non scriptæ, à D. Gillenio Cassellis accepimus: An forte Scrophularia Indica, cujus capitula quadruplo majora esse, quam in vulgari, in Phytopinace monuimus.

## DE PSEUDOSTAHTDE.

## CAPVT XIX.

I. PSEUDOSTACHYS Cretica: è radice lignosa, caules quadrati, cubitales, tomento albo vestiti exeunt: folia cinericea, molliter hirsuta, oblonga, quæ ad radicem una cum pediculo oblongo palmum superant, latitudine unciam non æquantia, pene inodora, vel saltem odore alii suaviore: at quæ floribus subiciuntur & caulem ambiunt, brevia sunt & angusta, pediculis carentia, è singulis articulis bina sibi mutuo opposita, duriuscula: flores purpurei, ex verticillis aculeatis caulem cingentibus, prodeunt: semen rotundum est & nigricans. Hæc pro Marrubio Cretico facta fuit.

II. PSEUDOSTAHTS alpina: à radice dura, rufescente, in fibras crassas & longas divisa, folia plura, hirsuta prodeunt, Hormino similia, sed tenuiora, uncias tres lata, quatuor longa, longis pediculis, molli lanugine albicantibus, donata, per ambitum crenata, nonnihil odorem gravem spirantia, inter quæ caules sesquicubitales, quadraguli, cannulari, geniculis distincti & hirsuti, efferuntur, qui foliis rugosis, asperis, prioribus longioribus circumdantur: ad quorum exortum, sæpe utrinque ramulus unus semipalmaris, etiam palmaris egreditur: flores circa summa genicula verticillati, galericulati, ex albo rubentes, ex utriculis asperiusculis, in quibus semen rotundum nigrum continetur, prodeunt.

Hanc Julio mense florentem in altissimo monte Wasserfall dicto, aliquoties observavimus.

Eandem, cubitos duos superantem, foliis multo majoribus, minime gravi odore molestatam (quæ culturæ a describimus) Marrubii nomine, ex horto Friderici Meyeri Argentina accepimus.

## DE SALVIA.

## CAPVT XX.

I. SALVIA folio serrato: hæc à vulgari foliis Spotissimum differt, quæ in hac latiora, rotundiora, tenuiora, manifestis per marginem ferris donata, & suaviori odore prædita: quædam etiam uncias quatuor longa, tres vero lata: in reliquis cum vulgari convenit: hanc D. Cargillus ex Anglia misit.

II. SALVIA folio subrotundo: hæc caule est etiam quadrato, villosa, foliis rotundis, ad Violariæ, vel Aristolochiæ rotundæ folia accedentibus, at in acumen finientibus, scabris, vulgari magis candicantibus, & tenuibus: quam Schmalcaldio à pharmacopæo accepimus.

III. SALVIA lanuginosa angustifolia: caule est rotundo, crasso, lignoso, ob candidam lanuginem, molli, cubitali, ramoso: foliis candidis, angustis, brevibus, semunciam latis, duas longis, dentis & scabris, odore Tanacetii: floribus in caulis summo quasi in spica, Lamii floribus similibus, purpurascens, è quorum medio stamina oblonga efferuntur: hanc D. Neudorfferus communicavit.

## DE SCORODOTI.

## CAPVT XXI.

SCORODOTIS Cretica: radicem habet magnâ Sperennem: caulē quadrangulum, striatum, villosum: folia per terram in orbem sparsa, alba sunt, tomentosa, subrotunda, rugosa, crassa. Mentastro similia, per ambitum serrata, flores verticillati, pallidi, Stachydis forma, quibus vascula, semen nigrum, rotundum, includentia, succedunt. Hanc ab Honorio Belli ex Creta, unâ cum seminibus Scorodoniæ Creticæ nomine accepimus, & sub Stachyde Cretica in Phytopinace descripsimus: sed cum in horto ex semine enatam diligentius perpendifsemus, & in vi-  
rente, ut in Scordio, Allii odorem notassemus,

ad Scordorum Plinii accedere censuimus : cujus nomine in Creta, apud quos ubique inter saxa, secus vias, & ad agrorum margines provenit, Seplassia-rij pro Scordiopromiscue utuntur, monente Bel-lo, & Pona in suo Baldo referente.

DE HORMINO.  
CAPVT XXII.

Horminum Syriacum.



**H**ORMINUM Syriacum : planta est Sclæræ forma, caulibus cubitum superantibus, quadrangulis, levissime hirsutis, in alas divisis : foliis inferioribus palmum longis, latis, subasperis, sinuosis, superioribus angustis, oblongis, lævioribus : flores albi sunt, galericulati. florum Sclæræ forma : semen vasculis inclusum, parvum est & compressum, rubris costis donatum, cinereis, nigris lineis sine ordine conspersum, quod sub lingua ut Ocymi semen lentescit, & inodorum est. At planta, quæ facile ex semine nascitur, cum flores producit, odore quam Colis Iovis gravior est,

& Ocymum nonnihil æmuletur. Hujus semen Bisarmar nomine D. Bernhardus Paludanus, cum Patavium ex Syria anno 1378. rediisset, communicavit. Bisennas Camerarius in suo Horto nominavit : at sunt qui Aman quoque vocitent.

II. HORMINUM angustifolium laciniatum : caule est quadrato, pedali, hirsuto, rarius ramoso : foliis paucis, nonnihil hirsutis, pollicem latis, uncias tres longis, aliquando sinuosis, aliquando, potissimum inferioribus, in profundas lacinias divisis : floribus albis, parvis, verticillatim caulem ambientibus, spicam oblongam & inflexam efformantibus quibus decidentibus, semen nigrum succedit. Hoc Monspessuli, foliis Scolopendriæ modo divisus, legimus : at Helmstadio, Hormini Cretici albi nomine, D. Sigfridus misit.

III. HORMINUM minus album Betonicæ facie : ex radice lignosa, fibrosa, nigricante, cauliculus unus, aliquando geminus, palmo minor, rotundus, villosus oritur : foliis est paucis, ad radicem rotundis, crassis, lanuginosis, crenatis & longis pediculis donatis : in caulis medio bina, Betonicæ foliis æmula, sed crassiora & breviora, basi caulem ambientia, & capitulo duo minima subijciuntur : flores sunt albi, Betonicæ forma velut in spica congesti : In montibus Pyrenæis Hispaniam versus, D. Burserus legit.

DE VERBASCO.

CAPVT XXIII.

**V**ERBASCUM foliis rotundis flore blattariæ : caulibus est cubitalibus, viridibus, rotundis, striatis, leviter villosis, nec ramosis : foliis inferioribus oblongis. reliquis omnibus subrotundis, parvis, caulem basi sua alternatim amplexantibus, inferne incanis, superne nigricantibus, ad quorum fere singulorum exortum, duo minora adjiciuntur, ex quorum sinu pediculi, unus, duo, tres, rarius quatuor, prodeunt, quibus singulis, flos unicus, luteus, parvus, ex quinque foliis compositus insidet, cujus medio, stamina aliquot purpurea, quasi ex caliculo, ut in Blattaria, emergentia insident : huic vasculum, semen minutum, rotundum continens succedit. Hoc in horto

Ioh. Hainzelmanni Pharmacopœi nostri desuncti cecit.



## DE ÆTHIOPIDE.

## CAPVT XXIV.

ÆTHIOPIS laciniato folio: hæc foliis est pedem longis, uncias quinq; vel sex latis, in acumen desinentibus, mollibus, alba lanugine pubescentibus, in multas lacinias profundas, acutas, easq; crenatas divisas, per terram sparsis: caule quadrangulo, lanuginoso, in ramulos distributo: quem folia parva basi sua complectuntur: flores candidi, per intervalla ordine digesti, Lamij floribus forma & magnitudine similes: semen rotundum, nigrum, geminum, in pericarpio continetur: ante plures annos in horro coluimus.

## DE SANICULA MONTANA.

## CAPVT XXV.

SANICULA montana minor: radice est crassiuscula, multis fibris capillaribus donata, & à lateribus propaggines agente, foliis per terram sparsis ex rotunditate oblongis per ambitum incisis, aliquantulum hirsutis: inter quæ cauliculi ( sæpius unus) semipalmares, etiam minores, rarius altiores, nullis, vel certe paucis pilis cincti, in summitate in exiguos ramulos divisi: singulis ramis flosculi albi, quinquefolii, punctati, staminibus in medio insident: quibus capitulum, exiguu nigroque semine plenum, succedit. Variat: nam vel folia magna, subrotunda, vel parva & oblonga

existunt: in Helvetiorum alpibus provenit, An apud Clusium, Saniculae montanae alterius speciei secunda.

Illi SANICULA alpina minima pilosa: plantula est duarum circiter unciarum, radiculam habens exiguam, ramulos unciales per terram sparsos, foliola breviter, angusta, incana, nonnihil pilosa, plura, stellæ in modum disposita: flosculi sunt oblongi, lutei, pro ratione plantæ magni, qui singuli singulis pedicellis, minutissimis, è simbriato obtusiore calice prodeuntes insident. Hæc in summitate Ventosi montis & Pyrenæis reperitur.

## DE DIGITALI.

## CAPVT XXVI.

DIGITALIS angustifolia luteo parvo flore: huic folia sunt angusta, unciam lata, binas ternasve longa, utraque parte virore splendentia: caulem habet simplicem, cubitalem, rectum, rotundum, lævem, à medio sursum versus floribus compluribus ornatum, qui ab una caulis parte supra se invicem dispositi, deorsum pendunt, lutei, oblongi, concavi, forma Campanulam, vel Dactylis thecam, referentes, ore diviso, per margines hirsuto, staminibus intus luteis: quos vascula rotunda, in pilum desinentia, semen exiguum continentia, succedunt: hæc in monte Baldo provenit, & an ad Ephemerum Dioscoridis referri possit, considerandum.

## LIBER SEPTIMVS.

## DE LYSIMACHIA.

## CAPVT I.

**I.** **LYSIMACHIA** hirsuta filiquosa parvo flore: hæc duplex est, major & minor. Major caule est bicubitali, rotundo, hirsuto, concavo, in ramos brachiato: foliis oblongis, angustis, leviter crenatis, hirsutis, lanugine incanis & mollibus: in summis virgis, filiquæ strictissimæ & longæ, quarum extremitatibus flores purpurei, parvi & quadrifolij insident: at in ipsis siliquis, semina exigua, subrufa, candida lanugine implicita, continentur. Apud nos in arenosis ad Wiesfam, æstate floret.

II. Minor, ex radice tenui, fibrosa, caulem unum vel alterum, pedalem, lanuginosum protrudit, folia; caulis, foliorum & filiquarum brevitæ, à priore differt, quam & in Italia legimus.

III. **LYSIMACHIA** Chamænerion dicta alpina: ex radice fibrosa, cauliculi rotundi, superne albicâtes, palmares, nonnunquam pedales exurgunt, foliis duplicibus cincti: alijs Rorismarini forma, sed brevioribus & angustioribus, nullo ordine dispositis: alijs brevissimis, iisq; vel prædictis interjectis, vel ex eorum sinu prodeuntibus: cauliculorum summis, flores, longis pedicellis subcæreuleis, vel candicantibus insident, elegantes, purpureo cæreulei, vel albo cæreulei, quadrifolij, satis magni, quibus foliola quatuor breviam & viridia, subjiuntur, & ex eorum medio flamina aliquot exurgunt: filiquæ longæ, angustæ, semen minutum cum lanugine continentes, succedunt. In alpihus Helveticorum provenit.

## DE VERONICA.

## CAPVT II.

**I.** **VERONICA** alpina bellidis folio hirsuta: radice est per terram transversim repente, fibris oblongis nigricantibus donata:

cauliculo semipalmari, vel paulo altiore, tenui, hirsuto, duro, flexili, reclinato: cujus folia ad radicem plura, Bellidis cæreuleæ foliis forma respondent, parva, subrotunda, atroviorentia, hirsuta & cralla, in cauliculo pauca, binis ex opposito sitis: cauliculorum summitatibus flosculis cæreulei, quasi in umbella, ex parvis hirsutis caliculis prodeunt, quaternis, quinifve foliolis & staminulis binis cum stylo compositi, insident: semen vero in vasculis brevibus compressis, ex medio veluti umbone stylo prodeunte, continetur: Hanc in Helvetiorum alpihus reperimus.

Eandem, sed minorem, sine nomine, F. Greg. de Regio Capuccinus, ex montibus Tyrolensibus, ut & D. Burserus majorem, ex Pyrenæis, misit.

## DE TEUCRIO.

## CAPVT III.

**TEUCRIUM** alpinum inodorum magno flore: radice alba, oblonga & capillacea, per terræ superficiem repit: cauliculos aliquot habet, lignosos, rufescentes, hirsutos, nonnunquam in alas divisos, semipalmares & in terram reclinatos, foliis subrotundis, parvis, quorum maximi, ne minimi digiti unguem adæquat, hirsutis, rugosis, & crenatis; folijs salviæ tylectris superioribus forma respondentibus, cinctos: in cauliculorum summitatibus, flores quasi in spicam congesti, qui magni, purpureo cæreulei, galeculati: semen non vidimus. Ex monte majore S. Bernhardi, & Augusta vale, Helveticorum, D. Burserus attulit.

## Chamædrys spinosa.



## DE CHAMÆDRY.

## CAPVT IV.

I. **CHAMÆDRYS** spinosa: planta est palmaris & sesqui palmaris, rarissime cubitalis, molli lanugine incana & hirsuta: cauliculis quadratis, geniculatis, virgultis hinc inde sparsis: foliis oblongis, subrotundis, aliquibus laciniatis, at plerisque leviter serratis, summis tamen integris: flores ex caliculis lanuginosis, Chamædryos forma, ex flavo rufescentes, ex foliorum alis prodeunt, unde & aculei bini, aliquando plures, modo breviores, modo longiores, exurgunt: aliquando ex geniculis unum virgultum prodit, cujus summitati spina suptilissima insidet: semen rotundum, subnigrum, caliculis inclusum, floribus succedit. Patavio ex horto Bembiano accepimus, in Phytopinace & Matthiolo deferensimur.

II. **CHAMÆDRYS** Austriaca foliis tenuissime laciniatis: caule est lignoso, rotundo, hispito, pedalis in ramos brachiato, foliis nonnihil pilosis & rigidiusculis, in angustas lacinias divisis: floribus subcæruleis, in spica oblonga dispositis, quos capitula subrotunda, bifida, seminum minutissimorum conceptacula sequuntur. Ex Austria D. Agerius attulit.

III. **CHAMÆDRYS** Hispanica, foliis tenuissime divisis: hæc caule est priore multo teneriore, rotundo, leviter piloso, geniculis pluribus distincto: foliis brevioribus angustiusque divisis, & ad singula caulis genicula, junctis: at cauliculis in tenuissimorum & parvorum foliorum quasi cespitem absumitur, & ad summum geniculum, in duos pedicellos triunciales, foliis nudos, dividitur: quibus flosculi parvi, stylo oblongo donati, insident: plura non licet: ex Hispania D. Albinus attulit.

IV. **CHAMÆDRYS** alpina minima hirsuta: ex radica capillacea, ramulus tenuissimus (modo bini ternive) duarum triumve ad summum uncium, prodit: foliola ad radicem exigua, subrotunda, hirsuta, crenata & crassiuscula, in ramulis nulla, qui in pedicellos absumuntur, hiq; singuli flosculum cæruleum sustinent: ex cujus medio stylus muscæ proboscidi fere similis, prominet: vascula exigua plana & compressa, ut in Chamædry sylvestri, floribus succedunt. In jugis alpium Helveticarum & Tyrolensium, ut & Baldi summitatibus reperitur.

V. **CHAMÆDRYS** spuria minor angustifolia: hæc radice est nigricante, lignosa & fibrosa: ramulis plurimis in terram reflexis, palmaribus, rotundis, rufescentibus, nonnihil pilosis, rigidis, duris, & in ramulos plures subdivisis: foliis ad radicem nonnunquam oblongis, latiusculis, obtusis, minime crenatis: reliquis vero ad canaliculos brevibus, angustis, crenatis & in apicem desinentibus: flores habet copiosos in spica oblonga dispositos modo pallide cæruleos, quadrifolios, staminulis & stylo donatos: quibus ut sylvestri, semen minutum in parvis thecis succedit.

Æstate florēt in agris nostris siccioribus & incultis, copiose circa Balneum Bruggingen occurrit.

**I.** ALSINE palustris minor serpillifolia : radiculam habet parvam, capillarem, cauliculus nodosum reflexum : à quo fibræ exiguæ utin Scorpillo prodeunt, terræ figuræ hic in cauliculos plures, oblongos, repetites, diuisus, foliis serpilli forma, sed multo minoribus, & quidem binis contrario situ vestiuntur : foliorum aliis parui flosculi insident, quibus vasculum utrinque unum eo quo in Glaucedo modo, semen minutum continens, succedit. Hæc locis palustribus provenit.

**II.** ALSINE palustris minor folio oblongo : & hæc radice est tenui, oblonga, capillaceis fibris prædita, cauliculis frequentibus, tenuibus, humifusis, & subinde ad internodia fibris sese firman- tibus : foliis oblongis, angustis, pallidis, binis ex aduerso nascentibus : flosculis parvis, racemi modo junctis & tenuissimis pedicellis insidentibus, quibus semen minutum succedit. Hanc Portulacæ aquaticæ nomine, D. Sigfridus Helmsta- dio misit.

**III.** ALSINE alpina glabra : ex radice albida, oblonga, fibris capillata, cauliculi plures, iiq; palmares, tenues, læves, rotundi & geniculati, in ramulos aliquot, hique in alios diuisi, prodeunt : qui foliis pallide virentibus. Lini forma, sed brevioribus & acutis, binis ex aduerso sitis, cinguntur : flores plures albi, staminibus aliquot donati, pedicellis insidentibus, ex caliculis prodeunt, capitulis minuto semine refertis, succedentibus. Hæc locis saxosis humidis gaudet, quod copiose circa balneum Sultzbergense in Marchionatu superiore observavimus : verum ex Rhetorum alpinis monte Spliegel, radice lignosiore, totaq; planta omnibus partibus minore & semipalmaris, habemus.

**IV.** ALSINE alpina junceo folio : planta est ad palmi altitudinem accedens, cujus cauliculus statim à radice in duos, hique in alios ramulos breviores dividuntur, inter quos unus vel alter semipalmaris, exurgit, in summitate florum unum fustinus vel is uno alterove pediculo donatur, & cuilibet unus, isq; albus, quinq; folius, satis magnus, ex calice prodiens, insidet : foliis est capillaceis, viridibus, rigidis & inordinate dispo-

sis. Hæc Iulio florens in Helveticis & Genesivum montibus reperitur.

**V.** ALSINE minor Androsaces alterius Matthioli facie : radiculam habet oblongam, tenuem, rufescentem, circa quam foliola multa per terram sparsa, parva, oblonga, oris crenatis, inter quæ cauliculi plures, nudi, nonnihil pilosi, inæquales, duas, tres, etiâ quatuor uncias alti, summo fastigio quasi umbella, ex octo, decem, duodecim pedicellis composita, insidet : quorum singuli flosculum parvum album ex pericarpio prodeunt, sustinent. In arenosis provenit : prope pagum Martersen quarto ab urbe Herbipoli miliari, D. Burserus, collegit.

**VI.** ALSINE verna Androsaces capitulis : plantula est subhirsuta unciarum trium, ad cujus radiculam simplicem & brevem, foliola Bursæ pastoris minimæ loculo oblongo, dictæ similima, orbiculatim per terram sparsa sunt : ramulos habet tenuissimos, biunciales, nudos, reflexos, circa quorum medium quasi corolla quinq; minutissimorum foliolorum, unde pedicelli quaterni, aut plures emergunt, & singuli caliculum exiguum, quinq; apicibus, donatum, & cujus medullis flosculi parvus albus emergit : hæc plantici Northusanæ alumna, D. Furero monente.

**VII.** ALSINE alpina miniata glabra : plantula est flosculis elegantissimis placens, ex cujus radice rufescente, in fibras oblongas abeunte cauliculi plures in terram reclinati, foliolis multis prioribus similibus, sed glabris vestiti, prodeunt, ex quibus pedicelli unciales, rarius triunciales, nudi efferruntur, qui in summo in duos, tres, & plures petiolos dividuntur, & singuli flosculum elegantem, stellatum, quadrifolium, punctulis insignitum, album vel etiam purpurascens, ex caliculo emergentem, sustinent. In Helvetiorum montibus, ut monte Fractio & ad Thermas Fabarias, æstate florens, reperitur.

**VIII.** ALSINE nodosa Germanica : ad radicem fibrosam, albam, folia plura, oblongiuscula, pilo tenuiora & viridia, aliquando velut cespitem constituentia : cauliculi tenuissimi sunt, glabri, modo erecti, modo reclinati : aliquando palmares, nonnunquam vix duarum, triumve unciarum, geniculati, vel nodosi : ad quemlibet nodum, foliola exigua, unde & ramuli prodeunt, in quorum summitatibus flosculi plures, albi, quinq;

quefolii, ab aliis quinq; foliolis viridibus sustentati, singuli singulis pedicellis insident. Hæc cum in arenosis proveniat, ab aliquibus Arenaria vocatur, quo nomine etiam ex Scotia, D. Carrigillus: ex Lusatia, sine nomine, D. Francus misit.

IX. ALSINE Spergulæ facie, sive Spergula minor subcæreleo flosculo: radice nititur oblonga, simplici, parum capillata & albicante: cauliculis est multus, uncias tres quatuorve longis, in terram reflexis, geniculatis: geniculis singulis, bina foliola brevina, incana, lata basi undiq; cingentia, adponuntur: ex quorum sinu folia alia oblonga, angusta, viridia, incerto numero prodeunt, ut & pedicelli, quibus singulis, singuli flores subcærelei, vel purpureo: cærelei, aliquando striati, insident: quous, ut in Spergula, vascula orbiculata minutum semen continentia, succedunt. Apud nos ad semitas reperitur, maxime inter novam domum & arcem Orlingen.

## DE ANAGALLIDE.

## CAPVT VI.

**A**NAGALLIS aquatica angustifolia scutellata: radicem habet rufam, per terram repentem & fibrosam: caules cubitales, striatos, læves, geniculatos: folia ad singula genicula semper bina, pediculis carentia, situ ad vterio sita, angustissima, acuminata, duas vel tres uncias lata: ex foliorum pene omnium sinu, pediculi prodeunt palmares, etiam breviores, sursum spectantes & capreolorum modo se intorquentes, quibus utrinq; pedicelli, alii absq; ordine adpolit, qui flosculos patulos Asine forma trifolios ex albo purpurealentes sustinent: his thecæ sive scutellæ geminæ, ex quarum medio filamentum prodit, semen continentes, succedunt. In locis paludosis & follulis Helvetiæ, Lusatiæ: sic circa Francofurtum ad Oderam, Viennam quoque repentur.

## DE ECHIO.

## CAPVT VII.

**E**CHUM Hispanicum flore calcarum donato: radicem habet lignosam, fibrosam, cortice ad rufum vergente testam, a qua cauliculi plures, alii palmares, alii breviores, rotundi, non-

nihil villosi humum versus reclinati prodeunt, qui foliis rarioribus, brevibus Veronicae alpinæ similib. crassiusculis & asperiusculis cinguntur: flores in cauliculorum summis cærelei, oblongi, cavi, calcare ut Linaria donati, ex hirsuto brevique calice prodeunt, ex uno folio compoliti, at in summitate in laciniis quaternis divisi, quibus delapsis in conceptaculis semen oblongiusculum, durum, rugosum, ut in Echio vulgari, succedit. Hoc in Granadæ montibus, D. Albinus collegit.

II. ECHUM Scorpioides minus flosculis luteis: hoc cauliculis est tenuibus, reflexis, hirsutis & semipalmaribus, foliis paucis & quidem inferioribus oblongis longoque pediculo donatis, pilosis: cauliculorum fastigia, una cum florum rudimentis, caudæ scorpionum instar recurvantur, hisque sensim sese explicantibus, flosculi exigui, lutei, aurei, quinque folii, sese offerunt. Monspelii in muris humidis horti Dei, D. Burserus legit.

## DE CYNOGLOSSO.

## CAPVT VIII.

**C**YNOGLOSSUM sempervirens: caulem habet cinæqualem, striatum, levi hirsutie asperum, cavum, cubitoque altiore: folia, quæ non incana, sed semper atroviresentia, acuminata, palmum longa, unciam vel sesquiunciam lata, parte superna lævia, inferiore aspera, nervo satis crasso, per longitudinem æqualiter delato, basi caulem ambiunt: & ex eorum alis, rami palmares, & longiores exurgunt, quorum summum fastigium, Heliotropii majoris instar reflectitur & sustinet flores, forma vulgaris similes, sed minores & rubentes, staminulis donatos: quibus lappulæ vulgaris similes, semen, ex quo deciduo se propagat, continent, succedunt. Tota planta canitie sive albedine & odore gravi (quæ in vulgari) destituitur: Aprili & Majo floret: in montibus umbris Alsatia: Lotharingam versus, ut circa Rappersvillam & circa

Masmunster frater p.m. Ioh. Bauhinus reperit, in hortum Montembelgardia-cum ante annos 26, transtulit.

Consolida media alpina.

Bellis alpina major rigido folio.



DE CONSOLIDA MEDIA.

CAPUT X.

**C**ONSOLIDA media alpina: radice est fibrosa, caule pedali, quadrato, striato, leviter hirsuto, inani, foliis paucis, oblongis, longoq; pediculo donatis, angustis, crassis, asperis, per ambitum crenatis, binis caulem ambientibus, & ex adverso respondentibus: flores cœrulei veluti in spica, caulis summo insident: in Baldo monte Italiæ reperitur.



DE BELLIDE.

CAPUT XI.


**I.** BELLIS alpina major rigido folio: ex radice nigra, repere, ab una parte fibras spargente, & lignosa, caulis rotundus, striatus cubito altior exurgit, circa quæ folia pediculis carentia, quinque vel sex uncias longa, vix unciam lata, rigida, partim obtusa, partim ex rotunditate acuminata, per circumferentiam profunde crenata, nulloq; ordine disposita: in caulis summo flos unicus, Bellidis vulgaris majoris flore major, medio luteus, foliis albis discum cingentibus. cui semen oblongum, ut in vulgari, succedit: in monte Baldo provenit.

**II.** BELLIS alpina minor: ex radice cauliculus unus, vel alter levis, semipalmaris incurv<sup>us</sup> prodeit, quæ cingunt folia rigidiuscula angusta, brevia,

per



*Bellis montana* major folio acuto.



per ambrum profundis & asperiusculis crenis donata: cauliculo summo, flos unicus, magnus, disco luteo, aliquando purpurascēte, foliis albis multis cincto, insidet. In alpinis Helvetiorum provenit, ut in Valesia supra Gemme, & supra Thermas Fabarias: aliquando tota plantula, vix uncias duas, superat.

III. *Bellis montana* major folio acuto: hæc cauliculo est Bellide prima brevior, foliis brevioribus, duplo triplove angustioribus, levius crenatis, nec rigidis, in acumen exquisitum desinentibus, flore primæ simili, sed minore: in montibus Euganeis collecta.

IV. *Bellis montana* folio obtuso crenato, radicem habet lignosam, fibrosam, caulem unum, tenuem levem & pedalem, folia angusta, longissimis pediculis donata, per marginem crenata, obtusa, in tres apices desinentia: in caulis sum-

mo flos unicus, parvus, disco luteo & foliolis albis eum cingentibus. Monspessuli versus Vigan.

V. *Bellis maritima* foliis Agerati: plantula est palmo minor, ad cujus radicem parvam, albam, cauliculus pilis levissimis aspersus, in binos ternosve tenuissimos ramulos dividitur, quorum unus sex, alii tres uncias non excedunt; ad quorum partem inferiorem pauca & parva foliola, Agerati foliorum instar, per margines crenata, superiore & majore caulicorum parte foliis carente, singulis unicum florem, qui parvus, disco viridi, foliolis albis ultra virginis cincto, sustentantibus. Hæc copiose in insulis Stechadibus in arenosis provenit, unde D. Burserus attulit.

*Bellis spinosa* duplex est: alia folio Agerati, quam Lobelius in parte secunda ad versariorum descripsit: alia forma Bellidis cæruleæ, cujus descriptionem subjiciemus.

VI. *Bellis spinosa* flore globoso: hæc tota fere facie Bellidem cæruleam, Globulariam dictam refert, cujus ad radicem folia plura sunt, parva, rigida, crenata, & cuilibet crenæ aculeus insidet: cauliculo est palmari atrovirente, quem folia oblonga, angusta, non crenata, sed in aculeum abeuntia, inordinate basi sua vestiunt, cujus summitati capitulum rotundum, cæruleum, Globulariæ capitulum majus, multis flosculis ut in succisa hirsutum: hanc copiose, pluribus simul cespitem constituentibus, in Granadæ montibus, D. Albinus observavit.

VII. *Bellis hortensis* pediculo folioso: hæc à communi hortensi in eo tantum differt, quod pediculus, qui leviter hirsutus, foliolis oblongis, subrotundis, duobus, aut tribus longe distantibus, cingitur, & flori folia quina subjungitur: in hortis reperitur.



Gnaphalium roseum,

Gnaphalium roseum hortense.



## DE GNAPHALIO.

## CAPUT XII.

**I.** GNAPHALIUM roseum: plantula est exigua, tomentosa, incana, vix unciam superans: radícula simplici, capillacea, rufescente, cauliculo semunciali, parvis tomentosis & conglobatis foliis donato, flosculo roseo, disco flavescente. Monspeßuli ad pedem montis Cetus & Massiliæ in saxosis reperitur.



**II.** GNAPHALIUM roseum hortense: ex semine minuto, in horto provenit planta tota incana, tomento molli, radice tenui, capillacea, quatuor unciarum, ex qua aliquando plures, quandoque pauciores ramuli triunciales, reclinati, foliis subrotundis cincti, quorum summitatibus flos rose modo expansus, disco luteo, etiam aureo, foliolis ut in ramulis undique sustentatus, elegantis spectaculo infidet.



Helichryson Orientale.

Helichryso syl. similis.



DE HELICHRYSO.  
CAPVT XIII.

**H**ELICHRYSO Orientale: caule est torundo, lanuginoso, pedali, foliis oblongis, angustis, lanuginosis & ob tomentum crassis & incanis, usque ad radicem oblongam, nigricante cortice testam, pluribus: caulis in summo in plures pediculos unciales, incanos divitur: quibus singulis flos rotundus, rarius oblongus, quasi ex plurimis squamis compositus, quintuplo quam in vulgari, quæ Stæches citrina dicitur, major, flavus & splendens. An hæc Chrysocome Dioscoridis l. 4. c. 55. & Plin. lib. 21. c. 5. Chrysites, nostro enim corymbi auri fulgore splendent: quod Comæ aureæ primum, dein ex Creta ab Honorio Belli, Elichrysi Orientalis nomine, accepi-mus. Simile, sed caule cubitali, foliisque latiori-

bus, minusque; lanuginosis, umbella multo latioribus, floribusque minoribus & pallidioribus, Helichrysi Cretici appellatione, ex horto nobiliss. Contareni habemus.

HELICHRYSO sylvestri flore oblongo similis: caule est sesquipalmari, rotundo, lanugine candidissima vestito, in ramulos aliquot inæquales, palmo breviores brachiato: foliis Stæchadi citrinæ alterius inodora similibus, latioribus tamen, aliquibus leviter sinuatis, sesquiuncialibus, inferne incanis & tomentosis, superne virentibus: ramuli in pediculos tenues, nudos, uncias quatuor longos, abeunt; quorum summitatibus capitulum unicum, squamosum, cum flore insidet, qui in pappum brevem, ut in Elichryso sylvestri angustifolio, abit. In montibus Italiæ prope Terracinum, provenit.

## DE CONYZA.

## CAPVT XIV.

I. **C**ONYZA cærulea alpina major: hæc ex radice lignosa, rufescente, caulem crassum, pilis asperum, palmarem, mox in ternos ramulos, & horum aliqui in pediculos diuisum, protrudit: circa quem folia pauca, hirsuta & aspera, crassa, uncias tres, quatuorve longa, uncia angustiora, nervis aliquot distincta: singulis pediculis flos unicus, cæruleus, Conyzæ cæruleæ vulgari similis, & similiter in pappum evanesceus: hæc in monte S. Bernhardi provenit.

II. **C**ONYZA cærulea alpina minor: plantula est semipalmaris, aliquando minor, lævis, rarus, nonnihil pilosa, radice nigricante, fibrosa, cauliculo rotundo, tenui, unicum florem cæruleum, illius quidem flori forma similem, sed triplo minorem, multis apicibus donatum, & in pappum abeuntem, sustinente: foliola habet ad radicem plura, angusta, triuncialia, pediculis donata, pallide virentia; at quæ caulem basi sua cingunt, breviora sunt: hæc in monte Gotthardo reperitur.

III. **C**ONYZA aquatica Asteris flore aureo: caule est cubitali, rotundo, hirsuto, geniculato, in plures ramos brachiato, qui foliis tres, quatuorve uncias longis, semunciam latis, villosis, per

marginem & hispidis, & crenis rigidioribus exasperatis, cingitur: flores magni Asteris forma, aurei, singuli singulis pediculis insident, discum enim aureum folia plurime, & angustissima aurei coloris cingunt, at aliorum more in pappum avolant. Hanc in Valesia prope Sedunum ad aquas, D. Burserus legit: non tamen Conyzæ palustris serratifolia, quam alii consolidam palustrem vocant, censenda est.

## DE ASTERE.

## CAPVT XV.

**A**STER hirsutus Austriacus cæruleus magno flore: caule est rotundo, hirsutie aspero, pedali, in unum alterumve ramum brachiato, foliis latis, subrotundis, per marginem nonnihil exasperatis & in apicem rigidiorum desinentibus, rigidis, crassis, hirsutie levi exasperatis & scabris, cincto: cujus summo flos magnus insidet, ejusq; orbem pallidum, folia multa, tenuia, oblonga, pallide cærulea, ambiunt, qui maturus similiter in pappum abit. Hic licet in Austria circa Cremsam reperiatur, attamen cum Astore montano cæruleo magno flore, qui etiam in Austriacarum alpium jugis (imo & Helvetiarum, ut in Iura) oritur, confundi non debet.

Verbena nodiflora.



DE VERBENA.

CAPVT XVI.

**V**ERBENA nodiflora: ex radice tenui, fibris capillata, caulis tenuis, quadratus, geniculatus, glaber, in terram reflexus & sesqui palmaris, prodit, quem folia, ad geniculum bina, aduerso situ, ungue non multum longiora, per extremum crenata & acuminata, cingunt: ex quolibet penegeniculo, & ramulus foliis aliquot cinctus, & pedicellus nudus, duas tresve uncias longus, exurgit: hicque capitulum subrotundum squamatum sustinet, unde flosculi Verbenæ vulgari similes exeunt, semenque paruum, ut in vulgari, succedit. Hanc Neapoli una cum semine, ab Imperato accepimus.

DE SCABIOSA.

CAPVT XVII.

**I.** SCABIOSA peregrina rubra: ex radice annua, scaulis bicubitalis, ramosus, parte inferiore leviter hirsutus exurgit: folia tenuia, ad radicem Rapæ forma laciniata, subrotunda, longis pediculis subhirsutis donata, & per ambitum ferrata, ad ramulos superiores, oblonga, angusta & integra: pediculis pedalibus & palmariibus lævibus & maiore parte nudis, & quidem singulis flos unicus atrorubens, Scabiosæ globulariæ majoris forma, oblongis filamentis puncto albo notatis, donatus, suavis odoris, insidet: huic capitulum oblongum, rufum, oblongis filamentis, ut in Caryophyllata vulgari exasperatum, & semen stellatum succedit. Hæc ex semine Scabiosæ Hispanicæ rubræ nomine misso (ut in Phytopinace monuimus) æstate in horto floruit: & à Clusio Scabiosa Indica nominatur.

Hanc, sed foliis in tenuiores lacinias dissectis, floreque minore & nigro, ex horto Patavino, D. Peckius, nomine Scabiosæ nigræ odore Zibethi, attulit.

**II.** SCABIOSA folio Sinapi sylvestris: caule est cubitali, striato, in ramos palmo longiores brachiato, qui ex foliorum alis, ubi pili paucissimi, prodeunt: foliis glabris, forma Sinapi sylvestris modo, ad nervum usque laciniatis, & sparsim crenatis, inferiorib. subrotundis: flores rubentes, mediæ magnitudinis, & singuli cauliculus summis insident. Neapoli

ex horto Imperati habemus.



## Scabiosa prolifera.



III. SCABIOSA prolifera foliis Gingidij: Scabiosa prolifera duplex est: altera foliis in latiores lacinias divisâ Lobelio & Clusio proposita, cujus figura addita, de qua sermo non est. Altera foliis est tenuius incisâ, ad modum foliorum Gingidii, quod Vîsnaga dicitur: quæ caule est cubitali, viridi, striato, geniculato, folia utrinq; ad geniculum triuncialia, ex quorum alis ramu-

li aliquot trium quatuorve unciarum, exurgunt: at major caulis pars, nudus & nonnihil asper est, cujus summo, flos purpureo-rufus infidet, & ad hujus latera plures cauliculi modo unciales, modo palmares & glabri, minores quidem in orbem funduntur, at majores florem superantes eriguntur, singulis flosculum ejusdem coloris, ex filamentis compositum, sustinentibus, quibus folia fœniculacea subjiciuntur: semina aliorum modo succedunt. Utramque D. Doldius Norinberga misit: illa tamè, Patavij inter dumeta, circa Thermas D. Virginis, etiâ observata.

IV. SCABIOSA montana dentis leonis folio: caule est sesquipedali, viridi, rotundo, striato, levi & cavo, superiore parte nudo: foliis latiore basi caulem amplexantib. paucis, lævibus, crassis, inferioribus obtusis, & parum crenatis: superioribus ad modum foliorum dentis leonis, in binas ternasve lacinias divisâ & acuminatis, per oras crenatis, uncias sex longis, & duas circa folii medium latis, per quod nervus excurrit: caulis summum, quem duo folia, fere ut in Dipsaco complectuntur, flores aliquot subcaulei, pedicellis hirsutis, inæqualibus insidentes, exornant. Hæc Monspeßuli, in monte Calcaris reperitur.

V. SCABIOSA stellata minima: plantula est, trium quatuorve unciarum, levi hirsutie canescens, radícula simplici, cauliculo ut & foliis biuncialibus, angustis, in parvas & profundas lacinias divisâ: cauliculi summo, capitulum rotundum, ex cauliculis paleaceis compositum, infidet, flores subcæruleos, parvos continens, quibus exiccatis in cauliculorum medio stella parva conspicitur, à qua filamenta capillacea, oblonga, rufa, quinque numero extra cauliculum producantur. Hanc in Provincia locis incultis observavimus, & à Scabiosa minore Hispanica Clusij, quam in litore Veneto notavimus, diversam facimus.



Scabiosa argentea angustifolia.



VI. SCABIOSA argentea angustifolia: ex radice lignosa, caules bini, terni, sesquipalmares, rotundi, incani, parum reflexi, exurgunt: circa radicem folia quatuor aut quinque unciarum longa, angusta, graminea, albicantia, & argenti colorem referentia, inordinate disposita, in superna caulis parte nulla: caulis unicum discum orbiculatum planum, molli lanugine incanum sustinet, qui plures flores caeruleos, vel pallidos, aliarum forma continet: quibus cauliculi membranacei, etiam stellati cum staminibus, sed quam in priore brevioribus, semen continentes, succedunt. In monte Sumano prope Vicentiam provenit.

DE IACEA.  
CAPVT XVIII.

I. IACEA nigra angustifolia, vel Lithospermi arvensis, foliis radice est nigricante, in fibras

aliquot divisa, caule pedali, rarius cubitali, rotundo, aspero, in alas inaequales diviso: quem folia incana, angusta, brevia, rigidiuscula & aspera, Anchusæ sive Lithospermi arvensis similia, alternatim sua basi cingunt: cauliculorum summis capitulum squamatum, & nonnihil asperum, aliarum lacearum forma, sed minus, insidet, ex quo flos multis exiguis, oblongis foliolis, pallide rubentibus, vel ex purpura candicantibus, prodit, cui semen exiguum, nigrum succedit. Hanc passim Monspessuli & Paravii observavimus.

2. Huic & altera similis, sed caule molli tomento velito, & foliis incanis, mollibus & longioribus.

II. IACEA integrifolia humilis: hæc cauliculis est pedalibus, rotundis, alba lanugine hispida & terram versus reflexis: foliis unciam latis, duas longis, nec laciniatis, nec crenatis, sed integris, lanugine, præsertim per marginem, pubescentibus & subspicis, basi sua cauliculum ambientibus; in cuius summo, capitulum ex multis squamis imbricatis dispositis, constans: ex quo flos laceæ vulgari similis, subpurpurascens, ex foliolis oblongis, in filamenta aliquot divisis, compositus, prodit. In Austria ad S. Hippolytum provenit, unde laceæ Austriacæ repentis nomine, D. Burserus misit.

III. IACEA capite longis aculeis spinoso: tota planta subincana, brevibus & rigidulis pilis hirsuta: radicem habet fibris crassioribus implexam, fragilem, candidam, sed membrana subfusca tectam: caulem cubito altiore, rotundum, incanum, asperum, in ramulos inaequales divisum: folia prima & tenella, pilis densioribus albidioribus, mollioribusque stipantur, reliqua vero oblonga, uncias duas lata, crassa, rigida, per ambitum profundius crenata, nonnunquam ad pediculum laciniata, per quæ fibræ crassiores albæ ranscurrunt: caulis summitatis, capitulum squamosum ex pluribus squamis, etiam triginta numero compositum, & in conum pini amulum compactum, insidet, quarum apices in spinas oblongas, rectas, subflavas & rigidas desinunt, & squamarum ora, firmis pilis alben-  
tanquæ setis undiq; circumdata sunt, inter quas flos multis foliis oblongis, laciniatis & candidantibus emergit, cui semen Cnico funale, sed

vulgari majus, succedit. Hæc à lacea montana echinato capite Clusii diversa est, & à D. Doldio missa fuit.

IV. *LACEA* laciniato Sonchi folio, sive lacea latifolia purpurea capitulo spinoso: radice est recta, fragili, fibrosa, membrana subfusca tecta, & si plures caules protrudat, brachiata, sapore sub-austriusculo, ex insipido ad amariusculem tendente: caulis ut plurimum rectus, hirsutus, brevibus, densisque villis seu lanugine, potissimum parte inferiore, refertus, qui ob capitulorum gravitatem, humum versus reflectitur, & in summo in aliquot ramulos dividitur. Folia primum prodeuntia variant, sunt enim rotunda, oblongo pediculo donata, dein magis magisque sinuata, tandem vero in lacinias (quæ ad exortum inferiorum minora sunt) inæquales dividuntur: sunt etiam rigida & dura, adeo ut complicata cum quodam pene crepitu frangantur, brevissima & duriuscula lanugine, potissimum superiora & ad exortum, tecta. Cauliculorum summi capitula spinosa, ex squamis compacta, initio viridia, mox ad apicem purpurascencia, insident: ex squamis spinæ septem pulchro ordine, stellam dimidiatam referentes, exeunt, quarum media cæteris latior & longior, in minuto capitulo rubens, paulo post vero pallens. Flos ex capitulo tarde prorumpit, qui elegantis purpuræ & inodorus, cujus filiola fitulæ sunt oblongæ, superius amplo & laciniato rictu præditæ, inferius angustæ, quæ ad exortum coloris albi, sed paulatim versus fastigium in rubrum sese mutante: omnes autem stamina clavata sustinent, clava ex purpureo seu violaceo proflus nigricante, in summo alba puncta habente, & staminum pediculis, ubi ex fitula prorumpunt albis existentibus. Semen, Cyani semen refert, oblongum, angustum, & cinereum est. Hanc Centaurii marini nomine, D. Doldius misit.

Eandem sed palmo minorem, foliis parvis, rigidis, parum laciniatis, & per marginem crenis rigidis exasperatis, Cyani marini nomine à D. Neudorffero ex Italia habemus.

V. *LACEA* montana in cana aspera capitulis hispidis: radice est lignosa, in longas fibras divisa & rufescente: cauliculo palmari, rotundo, lanuginoso: foliis asperis, ad radicem pluribus, incanis hispidis, parum laciniatis, angustis, uncias quatuor longis, reliquis vero, in profundas

*lacea montana candidissima.*



& rigidas crenas divisas, basique sua caulem amplexantibus; qui aliquando in ramulos dividitur, quorum singuli capitulum parvum, ex squamis hispidis compositum, sustinent, earum enim cuspides exteri reflexæ, in tenuissima filamenta desinunt: flores vulgari similes, sed multo minores. Montepessuli in monte Calcaris provenit.

VI. *LACEA* montana incana laciniata capitulo hispido: ex radice caulis palmo major, rotundus, molli lanugine canescens, exurgit, circa quem folia pediculis oblongis incanis donata, laciniata & subrotunda, ractuque mollia: capitulum parvum & priori simile, eodemque in loco proveniens.

VII. *LACEA* montana candidissima Stæbe foliis: hæc ex radice crassa lignosa, caulem proferit palmarem, nonnunquã cubitalẽ, angulosum, striatũ, molli & incana lanugine velutũ: folia habet ad radicem multa per terram sparsa, palmaria lata,

lata, Stæbes insit laciniata, molli lanugine incana & superiora molli tomento, quasi farina aspersa, mollia & alba sunt: cauliculis summis flores singuli lacææ vulgaris similes insident, qui ex capitulis squarrosis prodeunt: in montibus prope Capuam provenit.

VIII. IACÆA tomentosa capitulo spinoso: tota planta, quasi farina aspersa floret, albescit, & à radice, caulibus pede minor, statim in alas plures divisus, exurgit: folia habet brevia, angusta, in petiolo tria, quina, septena, subrotunda divisa: cauliculis, capitula parva, ex squamis multis in aculeos acutos & rufescentes abeuntibus, composita: flos non fuit conspectus: in Murena Hispaniæ, D. Albinus legit.

IX. IACÆA Babylonica: ex horto clariss. Concrenti, hoc nomine folium accepimus, quod primo intuitu Acanthium aliquod referre videtur: hoc longitudine cubitum æquat: in medio, latitudine palmum superat, nonnihil incanum, tactu asperum, cujus tota circumferentia veluti minimis aculeis exasperatur: ad exortum laciniæ acutæ trium quatuorve unciarum longas, obtinet: hinc ex rotunditate sensim angustatur & in apicem abit, cujus summo brevissimus aculeus insidet: per ipsius medium, costa elevata, nonnihil hispida fertur, à qua plures nervi in latera excurrunt. Plura non licet.

### TRAGOPOGON.

#### CAPVT XIX.

I. TRAGOPOGON folio sinuato: radice est oblonga, lacteo succo manante, caule gracili, striato, pedalis altitudinis, raris foliis alternatim septo, quæ oblonga: non multum palmo breviora, at angusta, sinibus brevioribus, & quasi ferratis exasperata, pallideque virentia: caulis summo flos insidet pallide luteus, magnus, Tragopogo vulgaris similis, ex calice magno apicibus pedis donato prodiens, quo marcido, semen oblongum, in materia villosa alba latitans, succedit: Monspeluli legimus.

II. TRAGOPOGON tenuissime laciniatus: radice est oblonga, crassiuscula, fibris carente, rufescente & lacte tingente: ad quam folia plura oblonga, angustissima, acuminata, & in plures angustissimas lacinas divisa: caule est cubito non multum superat, in medio latius, subrotundo, nonnihil incanum, in alio, tenuius, in quo, densius lanugine, aculeis, & pilis, & lacte, cui sunt oblongi,

scabrum, cristâ pilosa in summo præditum, & calici oblongo inclusum, succedit. Et hoc Monspeluli observavimus.

### PERFOLIATA.

#### CAPVT XX.

I. PERFOLIATA alpina latifolia minor: radice est unica, rufescente, paucissimis fibris capillata: cujus caulis gracilis, teres, glaber, cavus, cubito altior, in ramulos, quasi in umbella dispositos distribuitur, quem folia glabra, venosa, sesquiunciam lata, Vaccariæ foliis similia basi lata medium amplectuntur: in cauliculorum fastigiis umbellæ, una cum foliolis exiguis, flosculis tenuibus subluteis, quibus semen oblongiusculum, nigricans, angulosum, succedit. Hæc in Helvetiorum alpihus reperitur.

II. PERFOLIATA alpina angustifolia major, sive folio anguloso: radicem habet unicam, oblongam, rotundam, crassam, nigricantem cortice tectam, minime capillatam, ex qua prodeunt folia plura, pallide virentia, glabra, pedem longa, unciam vel sesquiunciam lata, longis pediculis donata: at folia caulem amplectentia angulosa sunt & acuminata, rarius bina, hederæ modo angulosa ex opposito sita: caulis rotundus est, teres, glaber, cavus, sesquicubitalis, quasi foliorum basin penetrans: cujus summo quina folia, lata, in orbem disposita insident, eodem quo in Tithymalo, unde pediculi seni, septeni, longitudine impares prodeunt, quibus una cum foliis parvis, rotundis, flores parvi ex luteo rufescentes insident: Semen non vidimus: in Pyrenæis, non longe Narbona, D. Burserus legit.

III. PERFOLIATA alpina angustifolia media: hæc à præcedenti sola magnitudine & foliorum angustia differt, quæ pro Perfoliata longifolia Dalechampi, in historia Lugdunensi picta videtur, & ex monte Gotthardo habemus.

IV. PERFOLIATA alpina angustifolia minor: hæc radice est rufescente, ad quam folia multa, atrovirentia, graminæ, semipalmaria: caulem habet unum, aliquando geminum, pedalem, rotundum, glabrum, quem folia pauca acuminata, basi sua latiore ambiunt, in cujus summitate veluti umbella, ut in vulgari Perfoliata, ex qua ramuli emergunt, flores rufescentes, cum seminibus insidentes. Hanc ex Summo monte, & vâle Alpibus, habemus. Verum cum Perfoliata alpina graminæ folio, sive Bupleuro angulati-

gustifolia alpino, quod in Baldo provenit, confundi non debet.

CENTAURIUM.  
CAPVT XXII.

V. PERFOLIATA alpina angustifolia minima: plantula est semipalmaris, inter Perfoliatam & Bupleuron media, radice tenui rufescente & serpente, fibris capillaceis terræ affixa: ex qua folia oblonga, angustissima, pluribus lobis progerminant: inter quæ cauliculi efferuntur tenuissimi, glabri, uncias quatuor alti, in ramulos binos & hi in minores quasi ex umbella minima prodeuntes, divisi: quos folium unum vel alterum basi latiore cingit, & flosculi exigui flavi insident. In summis Pyrenæorum jugis reperitur.

VI. PERFOLIATA minor ramis inflexis: hæc foliis est vulgari paulo longioribus: brevioribus tamen quam in montana, caulem habet racemosum reclinatum, & velut per terram sparsum, flores luteos: annua est instar vulgaris sive arvensis, in quo ab alpina differt: hanc apud Ioan. Bauhinum fratrem p.m. vidimus, quam ex herbo Sturgardiano habuit.

Centaureum minus spicatum album.



CENTAURIUM minus spicatum album: ex radice parva, alba, fibrosa, caulis exurgit, mox in duos palmares & semipalmares striatos, hique in alios divisi: folia sunt parva, pediculis carentia, quorum prima lata, subrotunda, superiora angusta, acuminata, quandoque bina adverso situ caulem amplexantia: flores oblongi, albi, ab imo sursum per caulem sparsi, singuli, ut plurimum, ex una caulis parte sibi invicem succedentes, ex cauliculis foliosis prodeunt, ea forma qua non patentem in figura exprimunt, patentem enim sculptor non recte exprellit: his siliquis, ut in vulgari, semen minutum continentes, succedunt. In montibus Euganei Patavinorum, & hinc inde circa Monspelium reperitur, ut in nostro Matthiolo monuimus.

ASCYRON ET HYPERICUM.

CAPVT XXIII.

ASCYRON magno flore: hoc Ascyro vulgari, sive Hyperico dumetorum simile, caule sesquicubitali, rotundo, glabro, nudo, terete, quem folia pallide virescentia & inferne albidiora, nec iam longa, semunciam lata, subrotunda, bina semper situ adverso cingunt. in caulis summo, flores calice viridi sustentati, pallide lutei, magni, quintuplo vulgari majores, ex quinque foliis uncialibus compositi, e quorum umbilico staminula plura, flava, velut puncto notata, exurgunt: siliquas & semina non vidimus. In Pyrenæis D. Burferus hoc, quemadmodum & subsequens, legit.

HYPERICUM numulariæ folio: radicem habet oblongam, tenuem, paucis fibellis capillatam, ex qua cauliculi tenues, rufescentes, palmares efferuntur, quos folia parva, rotunda, nummo similia, bina adverso situ & æquali distantia locata cingunt, quæ superno atrovirescentia, inferius alba, aliquando punctis vel maculis rubris notata, conspiciuntur: cauliculorum summis flores pallide lutei satis magni, plurimis staminulis donati, insident.



## POLYGONUM.

## CAPVT XXIII.

**I.** **POLYGONUM saxatile:** hujus radix tenuis, lignosa tamen, fibris capillata & alba est: ramulis multis oblongis & crebro geniculatis serpit: circa quos folia subrotunda, unciam longa, semunciam lata, superne virentia, at inferius albicantia, quasi polline aspersa, quæ sensim minora redduntur: à geniculis flosculi exigui, ut in vulgari, pallide rubentes exeunt, quos femina triangularia sequuntur. Hoc inter saxorum fissuras, ad arcium editissimarum radices, ut in petris arcis Waldenburgenfis Basileensem, & in vicinis observavimus.

**II. POLYGONUM Creticum thymi folio:** herba est supina, humique procumbens, cauliculis, sive viticulis, palmaribus, ramosis, hinc inde sparsis: flosculi parvis albicantibus, pluribus simul quasi in nodo junctis, quibus foliolum Thymi forma, modo unum, modo bina, ternave, magnitudo, sine impari adponuntur: semen pusillum ac copiosum succedit. Hoc Polygoni Cretici nomine, D. Gillenius misit.

**III. POLYGONUM littoreum minus flosculis spadiceo albicantibus:** ex radicle candicante, tenni, oblongiuscula, prodeunt viticuli plurimi, tennissimi, per terram sparsi, ramosi & dodrantales, foliis oblongis, angustis & albicantibus alternatim cincti, ad radicem vero longioribus & biuncialibus: viriculorum summitatibus flosculi plures minutissimi, intus albi, foris spadicei insident, quibus femina minutissima & copiosissima, ut singuli coliculi eo turgeant, succedunt: hinc ad Millegranum referri potest. Hoc apud nos, in arenosis ad Wiesam flumen, autumno florens reperitur, quod Polygoni *πικνὸν ὀξύριον* nomine, Northusio, apud quos in sabulosis reperitur, D. Furerus misit: idem, sed sine nomine, ex inferiore Lusatia, ubi locis arenosis, in ripa fluminis Nissæ provenit, à D. Franco accepimus.

**IV. POLYGONUM minus lentifolium:** plantula est tota virens, parva, supina, humiq; procumbens, ex cujus radice simplici, in altum descendente, cauliculi plures, impares longitudine, crebris internodiis geniculati, exiguis foliis subrotundis, lenticularibus adnatis, prodeunt: flosculi in cauliculorum summis minimi, albican-

tes, vel pallide virentes plures simul juncti & semen pusillum observatur.

Cum Anethyllide Valentina Clusij, quæ tota subrubens est, longe minoribus foliis, & copiosioribus flosculis ex albo purpurascens, iisque non solum in cauliculorum summis sicis, confundi non debet. Hoc in Hispaniæ montibus prope Escorial D. Albinus invenit: quod tamen ante annos triginta novem Monspeluli in incultis, sed aliquantum minus, collegimus.

## DE SEDO.

## CAPVT XXIV.

**I. SEDUM tridactylites alpinum majus:** radicem habet tenuem capillaceam, cauliculi semipalmarem, purpurascens, nonnihil pilosum, in ramulos plures tenues & fragiles divisum: folia ad radicem tenuia & mollia, lata (in ramulis minuta) in tres lacinias primum, & in alias, divisa: flores in ramulorum summis albi, quinquefolii, totidem staminibus donati, quibus capitula subrotunda, longiuscula, minutissimum semen continentia, succedunt. Hoc ex Baldo habemus, & saxifragæ albae petreae nomine, Pona in suo Baldo exhibuit: idem præterito anno D. Furerus, nomine Dactyliobotani sive Saxifragæ petreae semper virentis misit, quod in ea Harcyniæ parte, qua Buda fluvius officinas Rubelandicas alluit, totos scopulos obvolvere scribit.

2. Simile, sed foliis latio ribus, & in ternas primum profundas lacinias divisis, & in his in minora & tenuiora segmenta sectis: caulibus pedalis, floribus pallide luteis, in humidis montium Pyrenæorum natum, habemus.

3. Aliud cauliculo rotundo, semipalmari, pilis levissimis aspersis, foliis parvis, crassiusculis & eo modo quo folia Sedi tridactylidis in rectis provenientis, incisæ sunt, etiam divisæ, totumq; cauliculum alternatim basi sua cingentibus, qui in summitate in ramulos dividitur, & singuli flosculum candidum, sed minore sustinent, capitulaq; ut in præcedenti, succedunt. Sedi dactyli nomine, ex Taurera Austriæ, D. Burferus misit.

**II. SEDUM tridactylites alpinum minus:** ad radicem parvam, repentem & nigricantem, folia plura exigua, viridia, simul compacta, superne in crenas profundas, binas, communiter ternas, rarius

plures, diviso: ex quorum medio, cauliculus unus vel alter, tenuis, aliquando divisus, paucis & exiguis foliolis cinctus, triuni quatuorve unciarum exurgit, cui flosculi terni, quaternive pallidi, quinquefolii, multis staminibus donati, singuli singulis pedicellis insident: hic calices parvi, semen minutum continentes, succedunt. Hoc in monte Lupi & Calcaris, in eorundem rupibus collegimus: ex humidis Gotthardi montis & Pyrenæis quoque habemus.

III. *SEDUM* montanum ericoides: ramis est palmaribus, lentis, flexibilibus, dense geniculatis, per terram sparsis, quos folia brevia, crassiuscula, *Ericæ* forma, vestiunt, & hi in plures alios, duarum triumve unciarum, & etiam breviores dividuntur, hique foliola frequentia, sibi fere incumbentia & rotundiora habent: in singulorum summitatibus velut ex squamoso calice flos satis magnus purpurascens, ex quatuor aliquando quinque foliis, & aliquot in medio staminibus compositus, insidet: quid florì succedat non constat. Hoc ex horto Dei dicto, habemus: & cum *Lobelii* *Sedo* minimo arborecente vermiculato, plurimum affinitatis habet.

IV. *SEDUM* alpinum ericoides cæruleum: ex præruptis jugis, ac faxis humidis propendet, radicem habens oblongam, fibrosam, rufam, ramos plures, foliolis quam in priore brevioribus, crassius, cinereis, velut in *Sanamunda* 2. *Clusii*, sive *Ericæ Alexandrina* compactis, cinctos: singulis cauliculis uncialibus, foliaceis, flos magnus, cæruleus, quadrifolius, aliquot staminibus brevibus donatus, insidet. Hoc, cum ann. 1579. Martio mense, per *Rhetia* alpes iter faceremus, è rupibus, ob aquam defluentem humidis, instar *Cymbalariae* dependens, florensque collegimus, quod florum eleganti colore cæruleo, oculos nostros valde reficiebat.

Idem in *Gotthardi* summitatibus, & in *Valesia* ad thermas *Leccenses* supra *Gemme* reperitur: quod à priore differt potissimum folior. exilitate, & colore florum: item & colore & magnitudine.

V. *SEDUM* saxatile hirsutum purpureum: plântula est triuncialis, radiculæ capillacea, cauliculo tenni, leviter piloso, cujus summitas in breves ramulos dividitur, qui singuli florem purpureum sustinent: foliola ad radicem plura, hirsuta, lente minora. Hoc, ut & subsequens, ex *Pyrenæis* *D. Burserus* attulit,

VI. *SEDUM* saxatile atrorubentibus floribus: tres quatuorve uncias non excedit, haud radiculam exilem, longiusculam, unum autemve cauliculum biuncialem, foliolis paucis, longiusculis, alternatim vestitum, flos atrorubentes, quasi in umbella dispositos stinentem. Hoc etiam in *Gotthardo* nonnihil altius excrescit.

VII. *SEDUM* saxatile variegato flore: radice est capillacea, cauliculis plurimis, tenuibus, uncialibus, per terram repentibus & fibellis pilularibus terræ adhærentibus: foliolis multipallide virentibus, subrotundi, lente minoribus vestiti: ex ramulorum summis, pedicelli plures capillacei, oblongi, exurgunt, singuli floribus quadrifolium, varium, album, purpureum & atrorubentem eleganti spectaculo sustinent, et plantula hæc cespitis musci quæ instar saxæ ornet. Hoc inter *Valesiam* & *Augustam* vallis in monte *Wieschberg* dicto, qui toto pene annivofus est, copiose provenit.

VIII. *SEDUM* alpinum foliolis crenatis asperis: radice est capillacea repente, cauliculis tenuissimis, semipalmaribus, etiam brevioribus, superius palmaribus, in summo in ramulos aliquos sectis: folia habet longiuscula, angusta, acuminata, crenis utrinque exasperata, & parte averte candicante; flores quadrifolii, purpurascens & staminibus donati, cauliculis sustentatur, quibus capitulum subrotundum, membranaceum apice donatum, minutulum semen continens succedit. Hoc *Julio* mense floret, in ascensu montis *S. Bernhardi* majoris & *Gotthardo*. An foris *Gesnerus* lib. de hortis Germaniæ, hoc intellexit, dum scribit *Sedum* quoddam esse, cujus foliis marginibus asperis, branchias piscium referunt.

IX. *SEDUM* arvense flore rubente: radice est agnoscitur, fibris capillata, cauliculis aliquot palmaribus, rotundis, rugoso rufescente cortice testis qui in ternas, quandoque plures ramulos (quorum aliqui recurvantur) dividuntur: hos folia longiuscula, angusta, succulenta, sine ordine ambiunt ramulis superioribus flores plures, vulgari *Sedo* floribus similes, sed rubentes insident, semenque vulgari simile succedit. Hoc non longe ab urbe in agris *Huningensibus*, autumno jam exiccatum reperitur: quod etiam in agris argillofis ad

*Pyrenæos*, sed minus, reperitur.



## DE COTYLEDONE.

## CAPVT XXV.

**C**OTYLEDON minor foliis subrotundis serratis: radix subest tenuis, fibrosa, fusca, circa quam folia multa, semi ungue minora, non ut in altero oblongis ligulis similia, sed subrotunda, margine crenato, crassiuscula, candiantia & non nihil adstringentia: è quorum medio caulis semipalmaris, quandoque palmaris, subasper, minimis & paucis foliis cinctus, assurgit: in cuius summo, pedicelli, flores, multoquam in secunda minores, ex quinque quandoque etiam sex foliis & mediis apicibus compositos, sustinentes, qui albi, aliquando rubentibus punctis aspersi, nonnunquam extrinsecus lineis ternis foliola floris percurrentibus, ita ut flores pallide purpurascens appareant: his capitula exigua, nigrum semen continentia, sequuntur. In Helvetiorum alpidibus, ipsis saxis ac scopulis adhæret; Junio & Iulio floret: at ea quæ flore est pallide purpurascens, apud Monspelienfes, in horto Dei collecta fuit.

## DE KALI.

## CAPVT XXVI.

**K**ALI minus villosum: radice est oblonga, fibrosa, nigricante, caule pedali, inæquali, ramoso, foliis pluribus, angustioribus, mollibus & villosis, inter quæ unum, quod cæteris subjicitur, longius est, quemadmodum etiam in Tragio observare est: in cauliculis summis, capitula parva, florem minutum continentia: semen non observavimus. Hoc, cum figura Kali albi Dodonæi, melius convenit, quam Kali minus Lobelii. Tota planta falsa est, & non longe Monspelio à Perault, qua ad mare itur, legitur: quam vis idem, nomine Kali hirsuti foliis Spergulæ, ex Italia, a D. Neudorf, habemus.

II. KALI folio gramineo: ex radice oblonga, exiguis capillaceis fibris donata, caulis pallide virelscens, rotundus incurvus, pedalis, in varios & plures ramos quadrunciales, tenues & fragiles, inordinate dispositos, brachiatus exurgit: quos folia oblongiuscula, angustissima alternatim disposita cingunt, quib. singulis, singuli noduli exigui florum & seminum, ut in Kali mino-

re Lobelii adhærentes, adponuntur. Ex Salinis Saxonis sicum, D. Jungermannus transmisit: & ad Anthylloidem Thalii accedere videtur.

## DE TELEPHIO.

## CAPVT XXVII.

**T**ELEPHIUM purpureum minus: hoc à radice nodosa, & aliquot veluti minimis napis constante, multisque fibris prædita, cauliculum unum vel alterum rotundum, semipalmarem, fragilem ac succulentum promittit: quem folia crassiuscula, succulenta, parva, in ambitu crenata, sine ordine ambiunt: flosculi quinquefolii, purpurei, velut umbellæ insident: quibus capitula pentagona, minutissimum semen scobis instar continentia; succedunt. In editissimo monte Brisoæ, Velschen dicto, locis humidis Iulio florens, collectum.

## DE TITHYMALLO.

## CAPVT XXIX.

**I.** TITHYMALLUS incanus hirsutus: caules pedales, rotundos, rufescentes, profert, foliis incanis & hirsutis, Myrsenitis legitimi forma, confuso ordine vestitis, in summitate in virgulas divisi, quibus, ut in Myrsinitæ, flores & capitula triangula, semina continentia, insident. Hunc ex Italia D. Neudorfferus attulit.

II. TITHYMALLUS sive Esula exigua foliis obtusis: radice est exili, oblongiuscula, capillata, cauliculis pluribus ad terram resupinatis, aliquantulum repentibus, biuncialibus, triuncialibus, aliis palmo minoribus, rotundis, lacteo succulentis, qui foliolis oblongis, angustis, sed semper in summo obtusis & velut abscissis, inordinate vestiuntur: hic in agris Patavinis & Massiliensibus, reperitur.

III. TITHYMALLUS exiguus saxatilis: radicula habet capilli mox tenuem, longiusculam, cauliculos tenues, unciales & biunciales, angustissimis & brevibus foliolis cinctos, flosculos exiguos, rubentes: circa Monspelium locis asperis provenit.

# LIBER OCTAVUS.

## DE CONVULVULO.

### CAPVT I.

**I** CONVULVULUS purpureus folio rotundo : caules prælongos, teneros, viticulosos, paucis pilis exasperatos, vicinis perticis circumvolutos, promit: folia habet longis pediculis subasperis donata, quæ lata sunt, angulis carencia & nonnihil hirsuta, præsertim superiora: flores oblongi, ex calicibus hirsutis instar Campanulæ sive Smilacis lævis ex cæruleo purpurei sunt, quibus succedit semen nigrum, semicirculare & angulosum, capitulo membranaceo inclusum, quod semine Campanulæ cæuleæ multo minus est. Hic sub æstatis finem floret. An ad Nil Avicennæ quoque referri potest?

**II.** CONVULVULUS peregrinus cæruleus folio oblongo: radice est singulari, oblonga, rufescente, ex qua caules multi, tenues, pedales, interdum cubitales, flexiles, ramosi, levissimis pilis pubescentes prodeunt: quos folia oblonga, inferiora quidem, uncias tres, quatuorve longa, vix unciam lata, inordinate veliunt, quæ sensim minora redduntur, & per marginem leviter hirsuta sunt: ex omnium fere foliorum sinu, pedicelli tenuissimi, oblongi exurgunt, quibus singulis flos cæruleus ad exortum pallidus, Campanulæ forma, unico folio constans, & ex cauliculo prodiens, insidet: floribus succedunt capitula membranacea parva, quibus semina parva, nigra includuntur. Planta sane ob florum copiam elegantissima, & quæ ob cauliculorum flexibilitatem fulciri debet. Hic in horto meo ex semine, Campanulæ cæuleæ nomine accepto, sæpius crevit.

**III.** CONVULVULUS foliis laciniatis, vel quinquefoliis: viticulis est tenuibus, geniculatis, lævib: ex quolibet geniculo folium, longo tenuissimo pedicello donatum, prodit, quod in quinque lacinas angustas longiusculas dividitur, & quandoque inferior una alterave bipartitur, & cuiuslibet lacinæ, tenuissimus mollisque aculus insidet. Supra folii exortum, pedicellus aequæ longus, duarum triumve unciarum longus & nu-

Convolvulus quinquefolius.



dus exurgens, florem magnum purpureocæruleum, aliorum Convolvulorum forma, sustinet. Semen non conspectum, cum solum hujus ramum, Convolvuli Ægyptiaci nomine, à nobis liss. Cortuso Patavio ante viginti annos acceperimus.



## DE BRYONIA.

## CAPVT II.

**I.** **BRYONIA** Cretica maculata: radice est longa, alte descendente, sed ad vulgaris magnitudinem non accedente, sulco cortice recta; ex qua longa & tenuia sarmenta prodeunt, quæ ambiunt folia aspera (qualis & tota planta) ad similitudinem vitium, aut Bryoniæ vulgaris diuisa, sed minora, viridia, albis striis per medium discurrentibus, vel maculis albis notata, quibus capreoli ut in vite adduntur. Flores habet pallidos, quinquefolios, striatos, vulgaris Bryoniæ floribus majores, ex longis pediculis propendentes: cuilibet flori, fructus succedit semicircularis, superne in partes duas diuisus, viridis primum, at per maturitatem ruber, semina duo continens, quare Dicoecos appellari potest. Hæc in Creta frequens est, unde semen à D. Honorio Belli accepimus, & in D. Zvingeri horto (quia tum hortum colere intermiseramus) sevimus.

**II.** **BRYONIA** sylvestris baccifera: radicem habet magnam, crassam, longam, succo glutinoso plenam. caules vero sarmentorum vitis instar longos, lignosos, angulos, quib. se. (licet capreolis careat) crebris circumvolutionibus vicinis fruticibus circumvoluit: folia hederacea. Similibus lævis similia, magis tamen sinuata, tenuia, splendens, & nervosa, longissimis pediculis donata: flores albi sunt, mucosis ad cujuslibet folii exortum, in viticulis maxime superioribus, pedicellus brevis ex caule exurgit, qui baccam unicam ceraso minore, virentem primum, at per maturitatem rubentem sustinet: cui semina satis magna, rotunda, nigraque quaternis, quinave includuntur. Provenit in sylvis circa pagum Huningen lunio flens: at bæcæ Septembris fine maturæ sunt.

Hæc à communi Bryonia sylvestri, quæ Tamus dicitur, potissimum in his differt, quod communis florem minorem habet, racemosa sit: hæc vero flore sit majore & bæcifera.

**III.** **BRYONIA** Mechoacana nigricans: radice est Mechoacæ simili, sed cortice nigricante vestita, interius rufescens, quæ tessellatim incisâ rotunda, magnitudinis & figura calculo aleatorio respondens, ex India Chelapæ sive Celapæ nomine ante annos undecim allata fuit.

Ab Alexandrinis & Massiliensibus, Isalapium vel Gelapio vocatur: & à Massiliensibus, Mechoaca nigra vel mas exilimatur.

Gustu est non ingrato, & gummoso, & ob copiosam gummositatem, si carbonibus, vel igni admoveatur, flammam concipit. Facilitate, vulgarem sive albam Mechoacam, superat: nam ob gummi copiosum, fortius humores serosos purgat, cum imi ventris levi dolore, & præcipue viscera, hepar & ventriculum roborat. Quare drachmæ unius pondere exhibetur tuto, & sine fastidio opus suum exequitur. Sunt qui ea indoli, cum aqua Cichorææ, aut simili stillaticia, seu jure, actu frigidis, tribus horis ante prandium, ægris propinent.

## DE CLEMATIDE.

## CAPVT III.

**I.** **CLEMATIS** maritima repens: hæc cauliculos habet sarmentosos, geniculatos & striatos, cubitales, atrovirente cortice vestitos: folia Flammulæ cretæ instar oblonga, acuminata, nervosa, rigida, sed angustiora, quod communiter tria uni pediculo, qui velut in capreolum abiit, insident, & quedam per circumferentiam nonnihil crenata, quæ vero in summo caule floribus subijciuntur, angulissima sunt: flores albi sunt, multis staminibus villosis albis, medullium occupantibus, longis periculis sustentati: quibus semina plana, subrotunda, rufescentia, ut in Flammula cretæ, sed minora, binæ, ternæ junctæ, singulis capreolo plumoso, veluti incana crista donatis, succedunt: hæc acria sunt quemadmodum & tota planta. In maris Adriatici littoribus, ut in Venerorum Insula Lio & Litzefulina, suis sarmentis repentem observavi.

**II.** **CLEMATIS** alpina Geranifolia: ex radice sarmentosa & perenni, caules plures lenti, lignosi, quandoque rufescente cortice tecti, duos tresve cubitos alti, exurgunt, qui æqualiter bipartiti, in latera dividuntur: quibus singulis folia, crebris & profundis divisis incisâ, trigemina, cohærentia, ut in Anemone geranifolia, insident: flores singuli, singulis pediculis longissimis ac tenuissimis insident, qui coloris cærulei albicantis, aut obscure purpurascents, ex quatuor foliis oblongis, mucronatis nervosis, crucis in modum dispositis, & nonnihil lanuginosis, in cujus medio folia, plura, breviora

DE CHELIDONIA ROTUNDIFOLIA.

Malva folio varie.

## CAPVT VI.

**C**HELIDONIA rotundifolia maior: hujus radix fibrosa est, quibus aliquot oblongi testiculi adhærent: foliis est subrotundis, crassius, lævibus, ad foliorum Afari magnitudinem accedentibus, sed nonnihil quandoque sinuatis, pediculis semipalmaribus donatis & humi procumbentibus: cauliculo palmo minore, flos insidet. calice triphylo membranoso sustentatus, qui pallide luteus, magnus, vulgari quadruplo maior, qui ex quinque vel sex foliis, quorum singuli ad medium fissi sunt, componitur, & ad ejus umbilicum stamina plura rufescentia, conspiciuntur: capitulum cum semine non vidimus. Monspessuli locis humidis provenit.

DE MALVA.

## CAPVT VII.

**M**ALVA folio ficus: hujus folia sunt nigricantia, aspera & crassa, quorum prima, modo in tres, modo in quinque lacinias inæquales dividuntur: quædam in lacinias quinque profunde secta, sine ordine sinuata, & per marginem crenata sunt, quorum lacinie aliquæ palmares exsistunt, & pediculis longissimis & pilosis donantur. Scapum sive caulem simplicem aliquot cubitorum habet: flores & semina non vidimus, quia ante tempus. Argentine in horto Friderici Meyeri, ante annos viginti legimus.

**II.** MALVA folio vario: radice est alba fibrosa, caule rotundo, cubitali, in plures ramos brachiato, quem folia cingunt pallide virentia, inferne candicantia, crassiuscula & nonnihil lanuginosa, sed figuræ, in eodem ramulo, diversæ: quorum quædam Bryoniæ forma, quædam acuminata, duabus alis donata, quædam subrotunda, ungue minora, omnia tamen in ambitu ferrata: flores quinquefolii purpurascens, staminibus in umbilico pallidis, pedicellis oblongis insident: semen in capirulis foliaceis semicirculare succedit. Argentina D. Salrzmannus misit.

**III.** MALVA Americana: radice habet oblongam, albam, fibrosam, caulem angulosum, striatum, lanugine levi oblitum: folia viridia, tenuia,



plerunque semicircularia, uncias duas longa, tres lata, superne angulosa seu sinuata, per ambitum leviter crenata, pediculis palmaribus, hirsutis donata, flores albi una cum semine. Malvæ syl. pumilæ similes sunt. Hanc ante annos octodecim in horto D. Salrzmanni, Argentinae, collegimus.



## D E A L T H E A.

## CAPVT VIII.

I. **A**LTHÆA Bryoniæ folio: caule est cubito altiore, rotundo, lanuginoso, albo; foliis Bryoniæ similibus, in quinque lacinias ut plurimum divisis, palmaribus & aliis multo minoribus, crassis, nervosis, lanugine nonnihil asperis, parte inferna canescentibus & longis pediculis insidentibus: flores habet purpureo-cæruleos, quinquefolios, superne semilunatos, staminibus rufescentibus donatos, quibus singulis capitulum foliaceum, planum, semen Althææ simile continens, succedit. Hanc in horto aliumus, quam tamen prius Althææ arborescens sempervirentis nomine, D. Doldius: dein Althææ Americanæ, D. Sprengerus, Heidelbergæ, misit.

## D E G E R A N I O.

## CAPVT IX.

I. **G**ERANIUM malacoides minus: plantula Gest duarum unciarum, in terram reclinata, radícula longiuscula, exigua, foliolis malacoidi majori similibus, sed minimis, elegantè incisís & longis pedicellis insidentibus: flosculos parvos cæruleos habet, quibus capitulum rostro tenuissimo longiusculo donatū succedit. In agris circa Rhotomagum reperitur.

II. GERANIUM columbinum tenuius laciniatum: radicem habet oblongam, tenuem, fibrosam, rufescentem; ex qua cauliculi plures, palmares, rotundi, hirsuti nonnihil asperi & reclinati prodeunt: folia, quæ unguem vix superant, rotunda sunt, in lacinias quatuor primum, & hæc in alias divisa, & longis pediculis hirsutis prædita: ad cauliculorum latera, flosculi communitè bini, singuli singulis pedicellis insident, parvi, cærulei, quibus capitula parva rostrata, sive utriculi tumentes rostrati succedunt, & ubi semen maturuit, utrinque cum utriculorum mucronibus, quasi capreolo insidens, modo geminum, modo ternum, ad rostri apicem, quod adhuc supereminet, reflectitur, quod in aliis quibusdam Geraniis etiam observavimus. Hoc Monspessuli in sylvestribus reperitur.

III. GERANIUM cicutæ folio ac longissimius:

caulibus est bicubitalibus, hirsutis, asperis, angulosis: in varios ramos brachiatis: foliis Gerani moschati sive Cicutæ modo divisis: floribus subpurpureis, vel violaceis, quinquefoliis; cuilibet acus uncias quinque longa, hirsuta, succedit, quæ ex utriculo hirsuto quinquefolio, apicibus donato, semen continente, prodit, quod per maturitatem exilit, & cum utriculorum mucronibus sursum primum, dein deorsum, alioque modo circumvolvitur. Hoc Monspessuli legimus: in Valesia etiam reperitur.

## D E A L C H I M I L L A.

## CAPVT X.

**A**LCHIMILLA alpina quinquefolia: radicem habet oblongam, nigricantem, fibras plures de se mittentem, ex qua folia aliquot parva, longis pediculis donata & glabra prodeunt, quæ in quinque lacinias ad pediculum, hæc in profundas crenas dividuntur, inter quæ pediculi bini, terni, tenues, glabri, trium, quatuorve unciarum longi, reclinati: quorum summitatibus flosculi vulgari Alchimillæ forma & colore similes, trifolii, pallidi ac herbacei, singuli singulis minimis pedicellis donati: quasi umbellæ insident. In monte S. Bernhardi majoris & Gotthardo, locis humidioribus, Augustoflorens, reperitur.

## D E C A N N A B I N A.

## CAPVT XL

**C**ANNABINÆ aquaticæ similis capitulis nutantibus: radicibus est fibrosis, Ellebori nigri similibus, caulis pluribus, cubitalibus, hirsutis, in varios ramos scissis: ad singulos ramos folium unum longum, latum, quandoque serratum, pilosum: ramuli juxta florem pulchre contorqueantur, folia plura habet satis longa, stellæ instar disposita, in quorum medio flos deorsum nutans, ex multis veluti squamis compositus, in cujus medio multi apices lutei: semen ut in Cannabina aquatica. Hanc in humidis Michelsfeldensium inveni-

imus.

## DE CARYOPHYLLATA.

## CAPVT XII.

**C**ARYOPHYLLATA alpina minor: radicem habet crassam, oblongam, repentem, fibris donatam & cortice purpurascens testam: folia crassa, hispida, in lacinias diuisa, in ambitu serrata: inter quæ caulis unus vel alter, rotundus, hispidus, paucis foliis vestitus, palmo minor: cuius summitati flos unicus satis magnus, aureus, cum exiccatur rufescens, quinquefolius, multis staminibus donatus: cui villosa congeries cum semine succedit. Hæc in summitatibus Baldi collecta.

## DE PÆONIA.

## CAPVT XIII.

**P**ÆONIA flore pallido hirsuto: huic ex radice aliarum simili, caules angulosi, læues, exurgunt: folia, quorum pediculi non nihil pilosi sunt, in ternas lacinias, & harum una rarius in binas diuisa, mucronata, inferne brevi lanugine pubescentia & candicantia, superne virentia quidem, sed non splendentia, multis venis à medio nervo in latera excurrentibus: caules singuli florem unicum, reliquis minorem pallescentem, ochrice colore, simplici octo foliorum serie constantem, multis staminibus albis præditum, sustinent. In quibusdam hortis observauimus.

## DE QUINQUEFOLIO.

## CAPVT XIV.

**I.** **Q**UINQUEFOLIUM album majus: radice est crassiuscula, rufa, foliis in quinque lacinias subrotundas usque ad pediculum diuisis, in ambitu serratis, paucissimis & brevissimis pilis aspersis, longissimis & hirsutis pediculis insidentibus, inter quæ caulis paucis pediculis, angulosus, paucis pilis donatus, foliis vestitus, exurgit, & in ramulos binos, & hi in summo in plures alios diuiduntur: quorum singulis flos albus, satis magnus insidet, qui ex foliis quinque in summo diuisis, compositus est: in cuius medio, veluti parvus pappus, unde plura stami-

nula rufescentia efferuntur. Hoc in mœniis urbis Wallstati Helvetiorum, collectum.

**II.** **Q**UINQUEFOLIUM album minus: radice est nigricante parua, cauliculis pilosis, erectis, palmo minoribus, in summo diuisis: foliis unguem latis, in quinque lacinias, extremis oris serratis, diuisis, & brevibus pedicellis insidentibus: floribus est prioris Quinquefolii similibus, sed minoribus. Hoc in saxosis circa Curiam Rhætorum reperitur.

**III.** **Q**UINQUEFOLIUM montanum luteum erectum hirsutum: ex radice nigricante cauliculi & folia exurgunt: cauliculi quidem tenuissimi & sesquipalmes, in summo multifidi, & molli lanugine pubescentes: folia inferiora, longissimis pediculis donata, in septem (at quæ in caule in quinque) lacinias profundas, diuersæ longitudinis, per oras serratas, pilisque donatas diuiduntur: quæ parte inferna, ut in vulgari rufescunt, tantillum incana sunt, non tamen splendent: flores habet paruos, aureos, quinquefolios, multis brevibus & croceis staminibus donatos, quibus capitulum aliorum more, semen minutum continens, succedit. In montis Crenztacenlis ad patibulum ascensu, provenit.

**IV.** **Q**UINQUEFOLIO similis enneaphyllos hirsuta: radicem habet crassam, nigricantem, in longas fibras abeuntem, à qua cauliculi plures, ad exortum quasi conglobati, per terram sparsi, capillacei, multifidi, tres, quatuorve uncias longi, prodeunt: foliis est oblongis pedicellis donatis, in novem lacinias angustissimas, per marginem incisas, & hirsutæ villosas, diuisis: flosculi parui, aurei, & capitula parua quinquefoliorum modo à pedicellis sustinentur. Ex Helvetiorum alpinus.

## DE FRAGARIA.

## CAPVT XV.

**F**RAGARIA affinis sericea incana: radice est lignosa, nigricante, ad quam folia plura, Fragariæ syl. similia, sed longe minora, unguem non æquantia, crassa, utrinque incana, molli & sericea lanugine testæ, in tres lacinias ad pediculum usque diuisa & superne crenata: ramulos habet breues, reclinatos, flores paruos, luteos, stellatos sustinentes, quibus capitulum, calice quinquefolio sustentatum, minutum semen continens, succedit. Hanc ante annos circiter



quadraginta à Ioan. Bauhino fratre p. m. nomine Leucas aduersariorum: & ante quadriennium, à D. Albino, qui etiam in faxosis Granadae collegit, sine nomine accepimus.

## DE TRIFOLIO.

### CAPVT XVI.

**I.** TRIFOLIUM montanum purpureum folio acuto crenato: cauliculis est pedalis, firmis, rectis: foliis rarioribus, ternis ab uno exortu procedentibus, oblongis, angustis, nervosis, acutis sursumque spectantibus, in ambitu denticatis, aliquando profundius incis: in cauliculi summo, flores purpurei, quasi in globo conferti: quod in monosis pratis, Maio, Iunioque florens, reperitur.

**II.** TRIFOLIUM montanum purpurascens folio obtuso crenato: hoc caule est ramosiore, foliis oblongis, angustis, sed obtusis & superne utrinque crenatis, cujus ramuli, frequentioribus & angustissimis foliis, donantur: flores, quam in priore rariores & purpurascetes: in pratis montosis circa Genavam.

**III.** TRIFOLIUM montanum lupulinum: hoc ramis est cubitalibus, glabris: foliis rarioribus, parvis, subrotundis, levissime denticulatis, longissimis pediculis donatis: rami fastigio, capitulum lupuli forma, sed oblongum, ex flosculis spadiceis compositum, insidet: quod in montibus supra Ilfeldam provenit, ubi D. Furcrus collegit & transmisit.

**IV.** TRIFOLIUM capitulo spumoso laevi: radice est alba, oblonga, fibrosa & capillata, cauliculis multis humi sparsis, tres, quatuor, rarius sex uncias longis, foliolis parvis, ternis, oblongo petiolo haerentibus, per marginem acutiuscule crenatis: floribus parvis luteis, quibus capitula incana, veluti ex pluribus vesiculis sibi invicem insidentibus composita, spumamque referentia, succedunt, quibus semen palvum, rotundum & planum inclusum est. Hoc circa Neapolim Italarum, in maritimis: circa Monspelium, in agris & luto Gramuntio reperitur.

**V.** TRIFOLIUM capitulo spumoso aspero majus: radice est oblonga, fibrosa, caulibus bicubitalibus tenuibus, flexibilibus, à vicinis fruticibus sustentatis: foliis rotundis, trifolio vulgari simi-

libus crenatis, praelongis pediculis donatis, inter quae pediculi nudi, palmares, quandoque pedales effertur, qui singuli capitulum subrotundum, nonnunquam parvae avellanae magnitudine ex floribus aureis compositum, sustinent: hos folliculi membranacei sibi invicem incumbentes, nonnihil à quibusdam filamentis exasperati, sequuntur. Hoc in Salicetis Michelsfeldg Huningam versus, iis se sufficiens, reperitur.

**VI.** TRIFOLIUM capitulo spumoso aspero minus: hujus radix transversim fertur & fibris capillaceis terrae infigitur: ramulis suis per terram reptat, à quibus pediculi biunciales & triunciales, nudi eriguntur, qui capitulum parvum, subrotundum, ex rufescentibus floribus compositum, sustinent, quibus capitulum, quasi ex vesiculis pluribus compositum, subsperum & initio virens, minurum semen subrotundum continens, succedit: folia parva sunt, rotunda & crenata: hoc apud nos ad Rheni ripam, herbido & arenoso loco, juxta Barm & circa Monspelium, provenit.

**VII.** TRIFOLIUM capitulis Thymi: radice est oblonga, alba, tenui, capillacea: cauliculis semipalmaribus, humi sparsis: foliolis ternis obtusis, uni petiolo inhaerentibus, in aetate ferratis, cujus virgulis capitula rotunda, ut in Thymo, flosculorum rufescentium insident, quae per maturitatem indurantur, minutumque semen subrotundum continent. Monspessuli locis siccioribus provenit.

**VIII.** TRIFOLIUM capitulo oblongo aspero: & hoc radicem habet capillaceam albam, cauliculos plures pedales, laeves, rotundos, & quasi articulatos, paucis foliis rotundis vestitos: ex singulis articulis flosculi plures simul juncti, iique lutei, prodeunt: his succedunt capitula oblonga, pluribus quasi spinis recurvis donata & per maturitatem exasperata, quibus singulis solum tripartitum subjicitur: & hujus, quemadmodum & praedictorum, semen exile est. Patavij, in edito monte prope Arqua, quod longe minus altero, quod Monspessulo habemus, legimus.

**IX.** TRIFOLIUM cochleatum folio minuto obtuso fructu latiore: radice est oblonga tenui, cauliculis aliquot tenuibus, rotundis, palmaribus, in terram reclinatis: foliolis trifoliis, sed minimis lente minoribus, obtusis & tenuissime crenatis: floribus parvis, luteis, oblongis pedicellis insidentibus.

dentibus: fructu lato, compresso, aliquot circumvolutionibus in spiras cochleæ modo contorto, semien planum, recurvum & rufum, continente. Hoc æstate florens in montibus Euganeis & Monspessuli legimus.

X. TRIFOLIUM cochleatum polycarpon: hoc ramis est pedalis, glabris & striatis: foliis trifolio vulgari similibus, longis pediculis donatis, singulis petiolis unguem latis, tenuibus, subrotundis, minime crenatis: pediculorum extremis flosculi parvi, flavi insident; quibus succedunt fructus plures, quini seni, quasi conglobati, sed parvi, in spiras convoluti & spinulis mollioribus donati: quod in Italia collegimus.

2. Huic simile est alterum, solum foliis à priorè differens, quorum quædam subrotunda, pleraque acuta, omnia tamen per marginem incisa, vel crenata.

XI. TRIFOLIUM cochleatum echinatum minus: ex radícula prælonga capillacea, cauliculi plures tennes, fragiles, repandi, palmares prodeunt, foliolis trifolii, sed parvis, iisque obtusis & crenatis, cincti: flosculis est parvis, aureis, communiter uno (rarius pluribus) oblongo pe-

dicello capillaceo insidente, cui folliculus cochleæ modo circumvolutus, minimis spinulis exasperatus, plerumque unus, iisque parvus (rarius terni quaterni uno pedicello donati) succedit, semina parva, plana, semilunata, rufa, continens, Ex Italia habemus.

XII. TRIFOLIUM fructu duro, spinis horrido: caulem habet pedalem, recurvum, per terram sparsum, folius raris, subrotundis & superne crenatis cinctum: florem luteum, fructum Tribuli terrestris instar durum, sed rotundum & majorem, eumque plerumque geminum, per maturitatem album; multis spinis horridum, Monspessuli legimus.


XIII. TRIFOLIUM folliculis coronæ similibus: radícula est capillari, cauliculis aliquot, nonnihil hispidis, ramosis, palmo minoribus, foliis trifolii minutis, obtusis & crenatis, cincti: flosculis luteolis, oblongis pedicellis donatis, quos sequuntur foliculi minimi, sibi insidentes & formam coronæ regiæ referentes.

Monspessuli provenit.

Trifolium peltatum Creticum.



Trifolium spinosum Creticum.



XIV. *TRIFOLIUM peltatum Creticum*: ex radice tenui, oblonga, fibrosa, cauliculi exurgunt palmo minores, pede nudi, foliis parvis, tripartito divis, parum crenatis, oblongis pediculis donatis, vestiti: cauliculorum summis flosculi quaterni, quinive ordine succedentes, forma Ornithopodii, luteo-pallidi insident: quibus siliquæ luteæ, planæ, membranæ, quasi semicirculares, in filamentum abeuntes, semen unum vel alterum parvum compressum continentes, succedunt: quæ dum molles sunt, dulcissimæ, esui aptæ, ac ubi induraverint, amarissimæ. Hoc rusticis in Creta, *μασχογιαν* dici, D. Honorius Belli auctor est, qui Trifolii Cretici odorati nomine misit.

XV. *TRIFOLIUM spinosum Creticum*: radicem habet oblongam, capillatam, caules plures, palmares, & sesquipalmares, versus terram reclinatos, angulosos, in frequentes ramulos brachiatos, frequentibus geniculis, ex viridi purpurascens, cinctos: ramulos cingunt, utrinque ex opposito sibi respondentia, tria folia uni petiolo in hærentia, viridia, oblonga, acuminata, in minimam spinam abeuntia: quemadmodum etiam ad singula genicula, spinæ quatuor parvæ aduncæ superne binæ, totidem inferne adpositæ sunt: unde brevis pediculus exurgens, florem singularem, quinquefolium, Campanulæ arvensis formæ & colore (sive purpureo-ceruleum) similem, capitulo viridi insidentem, susti-

ſuſtinet, in cujus medio ſtamina decem, apicibus luteis prædita, capitulo inter ea latente conſpiciuntur: quod capiculum poſtmodum quinque angulis donatur, ſtyloque prominente augetur, & per maturitatem petiolo incurvato ramis ſe recondit, & in ſingulis angulis, ſemen unicum compreſſum, ruſum, continet. Hoc primum, nomine Trifolii ſpinoſi ſempervirentis Ciſti flore, Patavio à Laurentio Roſenavv accepiſimus, poſtmodum apud fratrem Ioh. Bauhinum p.m. Montembelgindi collegimus, cujus ſemen ἀντροχῆς nomine miſſum fuerat.

XVI. TRIFOLIUM ſtellatum: ex radice alba, tenui, oblongiufcula, capillata, cauliculi prodeunt, modo pauciores, bini, terni, modo plures, quini, ſepteni, ſemipalmares, palmares, rarius longiores, rotundi, lanuginoli, incani, quandoque ruſcentes, inanes, rariffime in alas diviſi: folia habet parva, Trifolii modo diviſa, mollia, villoſa, in ſummo ſinuata, & ad radicem oblongis pediculis donata, duobus aliis ad pediculum nexum adnatis: cuilibet cauliculo, ſpica rotunda, ex floribus oblongis, rubris, rarius luteis, compoſita inſidet: qui ubi delabi incipiunt, ſpica magis orbiculata redditur, quaſi ex pluribus ſtellis ſimul junc̄tis compoſita foret: etenim ſori cuilibet capſula (vel utriculus) oblonga, villoſa, in quina, oblonga, acuminata foliola abiens, ſuccedit, quæ ſemen ut plurimum unicum, idque ruſum & planum continet. Hoc Monſpeſſuli, Majo menſe collegimus: at per omnia minus, ex Hiſpania accepiſimus.

XVII. TRIFOLIUM globoſo flore, vel capitulo Lagopi rotundiore: radicem habet longam, fibroſam, capillaceam, albam: caules plures, tenues, rotundos, palmo minores, quandoque pedales, in ramulos leviter hirtuſos diviſos: quos folia parva tripartita, nonnihil piloſa, per ambitum crenata cingunt, quibus juxta pediculum communiter duo alia ſubjiciuntur: cauliculorum ſummis, flores parvi, lutei inſident, quibus capiculum ruſcens, ſphæricum, ex apicibus aſperis compoſitum, ſuccedit: Majo menſe, Monſpeſſuli circa Caſtelnovum copioſe provenire obſervavimus.

XVIII. TRIFOLIUM globoſum repens: radice eſt exili, capillacea, ruſcente, cauliculis aliquot per tetram ſparſis trium quatuorve unciarum, mollibus, lanuginofis & ruſcentibus, foliolis paucis ſuperne ſinuatis: caulicorum ſummis capiculum globoſum, plurimis apicibus villoſum, inſidet: hoſculis enim ruſcentibus, utriculi, pluribus apicibus ruſcentibus donati ſuccedunt, quorum ſinguli ſemen minutum includunt. Monſpeſſuli in loco Gramuntio, & juxta caſtrum Epiſcopi, provenit.

XIX. TRIFOLIUM ſaxatile hirtuſiſſimum: radici lignoſe, tranſverſim repenti, ruſo cortice teſtæ, quaſi truncus ex multis plantulis ſimul junc̄tis, caule carentibus, inſidet, tota planta duas treſve uncias non ſuperante: folia habet Trifolii parva, mollia, incana & velut argentea, ſuperne crenata, & pedicellis breviffimis inſidentia: inter ipſa folia, capitula parva, rotunda, longiufculis pedicellis donata, in quorum medio, pili breves, molliffimi, flavescens conſpiciuntur: nec ſorem nec ſemen vidimus, & in Helvetiorum altiffimis jugis legimus.

XX. TRIFOLIUM alpinum flore magno: radice dulci: radice eſt longa, craſſa, cortice pallescente teſta, medulla candida dulci, multis capillis teſta & fibris aliquot oblongis donata; ex qua cauliculi plures in terram reclinati prodeunt, quos folia trifida, oblonga, anguſta & glabra, paucis & ad tactum ſenſibilibus crenis, & oblongis pediculis donata: inter quæ pediculus communiter unus (quandoque duo) lævis & nudus, trium quatuorve unciarum, exurgit, cujus ſummitati flores Aſtragalo ſive Onobrychidi forma ſimiles, purpureſcentes, magni, octo vel decem, quaſi ſpicæ orbiculati inſident: qui ſinguli ex calice oblongo, quinque apicibus donato prodeunt, ſingulos pedicellos obtinent.

Hoc primum ex ſternatum alpiſis, ante quadraginta annos habuimus: dein, in planitie Horti Dei apud Monſpelienſes, menſe Junio cum floribus, ſed illo multo majus, legimus. Radix ſapore eſt Glycyrrhizæ, hinc forte Glycyrrhiza Aſtragaloides, vel Aſtragalus dulcis dici poſſet: ex Hiſpania Glycyrrhizæ Hiſpanicæ nomine accepiſimus.

XXI. *TRIFOLIUM corniculatum* minus pilosum: radícula est capillacea, cauliculis pedibus, tenuissimis, rufescentibus, subtilissimis pilis aspersis, foliis parvis, acutis & hirsutis, in brevi pediculo ternis, duobus aliis ad pediculi nexum adnatis, ex quorum alis, pediculi longi capillacei exurgunt, flosculum unum, vel alterum, coloris ad croceum vergentis, sustinentes: quibus singulis, siliquæ oblongæ, strictissimæ, modo una, modo duæ, minutissimum semen continentes succedunt. Hæc Monspessuli in sylvulis, & pratis inter montem Lupi & Calcaris provenit.

XXII. *TRIFOLIUM corniculatum* frutescens, tenuissimis foliis: caulibus est tenuibus, viridibus, glabris, pedibus, in plures ramos palmo minoribus, brachiatis: foliis ut in priori, sed angustissimis, cinctis: cauliculorum summitatibus, quemadmodum & pedicellis, ex foliorum alis, prodeuntibus, flosculi bini, terni, rarius quini in orbem dispositi lutei coloris, insident: quos siliquæ binæ, ternæ breviores & crassiores, quam in prioribus, in longum apicem desinentes, in quibus semina exigua, sequuntur. Monspessulo habemus, quemadmodum etiam ex Italia: at hoc minus est, foliis & siliquis paulo latioribus, inque brevioribus apicem desinentibus.

XXIII. *TRIFOLIUM angustifolium* repens, folliculis rotundis: radicem habet albam oblongam, tenuem capillaceam, à qua cauliculi plures semipalmes, rarius palmes, per terram sparsi, utrinque prodeunt: circa quos foliola oblonga tribus petiolis pediculo insidentia, quæ levia sunt & per marginem crenata: ex quorum alis pediculi emergunt tenues, oblongi, quibus flores parvi, luteoli octo, novem, decem & quandoque plures alternatim dispositi affiguntur: his totidem folliculi rugosi, singuli semen unum continentes, succedunt. Hoc Monspessuli in arvis, & ad pedem montis Lupi D. Saltzmanus legit.

XXIV. *MELILOTUS Hispanica* foliis maculatis: ex radice parva, ramuli palmes, aliquando pedales, tenues emergunt, quos ambiunt folia bina hinc inde, ex quorum alis petiolum prodiens, tria folia sustinet, obtusa, at videntia, & ob venas candidas per ea discurrentes, maculata: flores parvi, pallidi. Hæc in montibus Castiliæ frequens est, unde  
D. Albinus attulit.



# LIBER NONVS

## DE RUBIA ET GALLIO.

## CAPVT I.

**I.** RUBIA montana angustifolia : radicem habet rufescentem, fibrosam, caules cubito altiores, leues, rotundos, striatos, geniculatos : folia ad quodlibet internodium oblonga, angusta, Gallii forma senu, septena, in orbem disposita & rigidiuscula caulem ambiunt : ad internodia, brevissimi ramuli exurgunt, ipse vero caulis in ramulos plures brachiatur, quorum summis, flosculi frequentes, albi quadrifolii insident, quibus semina minuta rotunda, quodlibet suo pedicello donatum, succedunt. Hanc apud nos in asperis collibus legimus : quam & Monspelio, sed foliis subtilioribus, brevioribus, & asperiusculis : quemadmodum quoque ex Austria, apud quos hinc inde in petris reperitur habemus. Hanc, Gesnerus in lib. horticorum Germaniæ nomine Rubiæ Sylvaticæ longioribus & angustioribus foliis, nulla descriptione addita, forte intellexit.

**II.** RUBIA pratensis lævis acuto folio : ex radice caulis cubitalis, lævis, quadratus, rufescens, geniculatus, canus, & communiter unus exurgit, ex cujus nodis ramuli semipalmates prodeunt, quorum summis flosculi plures quadrifolii, pallidi (semen non conspectum) insident : folia lævia quaterna, unciales, in acumen abeuntia, ad quemlibet nodum in orbem disposita sunt. Hæc apud Valesianos in pratis ad thermas Leucenses nata, quam etiam in pratis Lipsensibus reperiri, relatum fuit.

**III.** RUBIA quadrifolia rotunda lævis : ex radice capillacea rufescente, cauliculi tenues quadrati, geniculati, palmo altiores, quorum aliqui in ramos brachiati exurgunt : ad singula genicula folia quatuor rotunda, nervosa, tantillum aspera in orbem disponuntur : extremis cauliculorum, flosculi albi, quadrifolii, pedicellis capillaceis insident, quibus capitulum parvum, geminum, asperiusculum, succedit. In montibus Helvetiorum, ut Gorthardo, & ad Eremita-

nos provenit : hanc & circa Argentinam crescere dicunt.

**IV.** RUBIA angustifolia spicata : à radice sub-rufa, lignosa, & paucis fibris capillata, cauliculi exeunt quadranguli, nodosi, palmares, ramulique ad nodos ex adverso nascentibus præditi, & nodos, folia plura capillacea, ut in Polygono Knaut dicto, sursum spectantia : in orbem ambiunt : cauliculi in longam tenuemque spicam, ex utriculis parvis acuminatis compactam, abeunt : flores & semina non vidimus. Monspessuli in collibus nascitur.

**V.** RUBEOLA arvensis cærulea repens : radice est oblonga, tenui, capillacea, rubra, cauliculis in terram reflexis, quadratis, geniculatis, semipalmaribus, rarissime pedalibus : ad quodlibet geniculum folia habet parva, subrotunda, quina, senu, in orbem disposita, asperiuscula, & in acutissimum apicem desinentia : ex geniculis hinc inde prodeunt pedicelli, quibus quina, senuve similiter folia insident : ex his quemadmodum in cauliculorum summis, flores parvi cærulei, vel ex cæruleo purpurascetes, quinquefolii insident : quibus semina oblonga, acuminata, senu, octena, binis tamen simul junctis succedunt. Hæc passim in agris nostris, etiam autumnum florens occurrit, quam forte Rubiæ arvensis nomine Camerarius in suo horto, nulla descriptione addita, intellexit.

**VI.** RUBEOLA saxatilis : plantula est tota incana, semipalmaris, cauliculo tenui, quadrato, geniculato, in unciales ramulos brachiato : folia parva, aspera, angusta, acuminata, communiter octo, rotæ modo disposita habet : ramulorum summis flosculi plures, exigui, quadrifolii, apicibus & minimis pedicellis donati, luteoli, si recte recorder, insident. In saxosis Gallo provinciæ.

**VII.** RUBEOLA maritima aspera : radice est oblonga, tenui, repente & rufescente : cauliculis

T pluri-



pluribus geniculatis, biuncialibus, per terram sparsis, & capillaceis fibellis terræ affixis, foliis pluribus, brevibus, acuminatis, virentibus, & asperis, cauliculos inordinate cingentibus: flosculis minutis, pallidulis. Hæc copiose in litore maris Mediterranei, non longe Monspelio, & etiam Massiliæ occurrit.

VIII. RUBIA cynanchica saxatilis: ex radice alba, oblonga, tenui & fibrosa, cauliculi plurimi, trium, quatuorve unciarum longi, foliolis plurimis, oblongis, angustissimis, & viridibus, vestiti, exurgunt: & inter hos pediculi bini, terni, palmares, graciles, in ramulos divisi, & paucissimis foliolis vestiti, quibus flores, ut in Cynanchica vulgari, pallide rubescences, singuli lingulis pedicellis donati, insident. Hæc in saxosis udis circa Valentiam Delphinatus, à D. Bursero collecta fuit.

GALLIUM latifolium glabrum: radice est tenui, repente, geniculata: cauliculis tenellis, quadrangulis, geniculatis, palmo minoribus: foliis è singulis internodiis quaternis, decussatis, glabris, instar plantaginis nervosis, pallide virentibus, & sesquiuncialibus: flores habet parvos, cauliculos verticillatim coronæ modo ambientes, luteos, brevibus pediculis donatos. Hæc

circa Bononiam inter sentes, tota æstate reperitur.



Thalictrum angustissimo folio.



DE THALICTRO.

CAPVT II.

II. THALICTRUM angustissimo folio: radice est flavescente, ex aliquot fibris oblongis, crassiusculis, composita: caule bicubitali, lævi, rotundo, profunde canaliculato, & gemulato: ex quolibet geniculo folia plura prodeunt, in plures oblongas, & pleraque angustissimas, tandem & ternas lacinias, secta: at caulis in fastigio in ramulos dividitur, in quibus flores plures muscosi, pallidi, ad luteum vergentes, velut in oblonga spica dispositi, quos valvulae tenues, parvæ, minutissimum semen continentes, sequuntur. Hoc in pratis Michelsfeldensibus æstivis mensibus floret, quod Rutam pratensem majorem quàm Tabernæmontani esse, minus recte suspicari sumus.

II. *Thalictum* minimum foetidissimum: caule est pedali rotundo, in ramulos diviso: foliis pluribus in tres lacinias divisis, anterius duabus incisuris denticulatis, superne atrovi- rentibus, inferne pallascentibus: in ramulorum fastigiis flosculi parvi, muscosi, ex plurimis stamini- bus compositi, quibus succedunt exiguae valvulae, oblongae, senae, septenae, striatae, apice incurvo donatae, sibi- que invicem junctae, capil- laceo oblongo pediculo insidentes, semen exi- guum includentes. Tota planta odorem foeti- dissimum spirat, & in *Valesia* reperitur.

Simile, sed caule ex puniceo colore purpura- scente, *Thalictum* maritimi minimi nomine, *D. Gillenius* misit.

## DE FABA ARBORESCENTE.

## CAPVT III.

**F**ABARUM differentiae plures dantur, at solum *Faba* arborescentis hoc loco meminisse lubet. *Faba* arborescentis Anglica nomine. species sex *Amstelrodamo*, à *D. Jacobo Guilhel- mi Hooft* anno 1614. una cum quamplurimis al- liis fructibus exoticis accepimus: quarum prima lata, compressa, cordis humani figuram refert: siquidem circa umbilicum veluti ad basim sinum habet semicircularem, & sensim ex rotunditate in obtusum apicem definit; cortice rufo, splen- dente tegitur, cujus interior pars, sive caro subje- cta, rufa, dura, densaque existit: quoad magni- tudinem uncias tres lata, & quatuor longa est, & in duas partes finditur.

Altera priore minor est, magis compressa, figu- raque magis rotunda, & parte superiore non se- cus, quam prior, profundum umbilicum semi- circularem obtinet, & multo quam aliis parti- bus crassior: cortice est nigro, striato, tenuiore, & carne pauciore.

Tertia, priore adhuc minor, magisque plana, atque compressa, etiam nigro cortice tecta, un- cias duas lata, tres longa, & parte superiore um- bilico, non ut in duabus prioribus semicirculari cavo, sed oblongo.

Quarta, à proxima solum crassitie, & corticis colore spadiceo, differt.

Quinta, colore quidem, cum quarta convenit, sed quadruplo crassior est, & aliquo modo os *Scapulæ* refert: siquidem ad umbilicum, ubi un-

ciam crassa, sinus pollicis unguis latitudinem æ- quans, acetabulum *Scapulæ* refert, utrinque co- stas tenues obtinet: nam sensim oblongatur, in fine rotundatur, & ad latera sensim angustior redditur: at per medium linea extruberat.

Sexta, lata est, & compressa humani unguis similitudine, & magnitudine, nigro cortice te- cta, superne umbilicum parvum cavum obti- nente.

## DE PISO.

## CAPVT IV.

**P**ISUM umbellatum: & *Pisum* differentias præterire lubet, & solum *Pisum* umbellati hi- storiam brevem subijcere. Hoc caulibus est longis, striatis, fistulosis, fragilibus, ramosis, & per maturitatem albis: foliis aliquot oblongis, uni costæ adverso situ adnatis, quæ parte extre- ma, capreolorum modo in claviculas, quibus se- vicinis implicat, definit: flores habet albos, cir- ca umbilicum purpurea nota insignitus, in sum- mitate caesium velut in umbella dispositos: hic succedunt siliquæ duarum unciarum, in formam umbellæ situate, in quibus *Pisum* rotundum, al- bum, communiter unum, vel duo, rarius tria, vulgaribus majora, continentur. Germanis, apud quos licet rarius, in horti colitur, *Büschels Erbsen* id est, *Pisa* in fasciculum junctæ, appellan- tur.

## DE CICERE.

## CAPVT V.

**C**ICER montanum ἀνθαυον: radice est lon- ga, in profundum, nisi fissilium lapidum intervallum prohibeatur, descendente; à qua exurgunt pediculi palmares, tenuous, hirsuti, utrinque foliis duodenis, & pluribus subro- tundis, sed non nihil, quam in *Cicere* sativo lon- gioribus, marginibus hirsutis, modo æqualiter, modo inæqualiter ex adverso nascentibus, folio tamen extremo impari, vestiti: flosculi ad radi- cem oblongiusculi, pallidi, forma ad florem *Lo- ti* tetragonoboli accedente: his succedunt sili- quæ prætumida, duabus valvulis constantes, se- mine reniformi, Medicæ in morem flavescens, prægnantes. Vernis mensibus floret, in monti- bus

bus Thuringiæ circa Northufam, unde D. Furex anno 1616. tranfmiffit.

II. Cicer montanum lanuginofum erectum, ramis eft pedibus, rectis, rotundis, molli lanugine hispidis, in ramos femipalmes, etiam multo minores brachiatis; in quibus folia Viciæ fylv. forma longa, modo latiora, modo anguftiora, mollia, levi lanugine obfita, dena, duodena & cotidem ex ad verfo eidem coftæ inhærentia, extremo femper impari numerum faciente: ramulorum apicibus fpica florum pallidorum & hirsutorum infidet, quos fequuntur fiquæ oblongæ, lanuginofæ, in exiguum filamentum recurvum definentes, quæ femen nigrum minutum continet.

Hoc anguftioribus foliis, in Valefia ad Thermas Leucenſes, Julio florens reperitur: at quod foliis paulo latioribus eſt, Ciceris montani erecti Thuringiani nomine, à D. Fureo, & Ciceris aſtragaloidis erecti Francenhufanorum à D. Jungermanno accepimus, quod in montibus Francenhufanis copioſe reperiri ſcripſere.

#### DE LUPINO.

##### CAPVT VI.

**L**UPINUS cæruleus major villoſus: radice eſt lignoſa ruſcente, fibroſa: caule cubitali, firmo, rotundo, ſtriato, molli lanugine obſito (nam in hoc longe maior eſt hirsuties, quam in aliis Lupinis) in ſummitate in paucos ramulos diſiſo: ramulis quandoque etiam ſubalari- bus, rudimenta floris futuri habentibus, qui raro noſtro cælo perficiuntur: folia ſeptena, oſtena, molli lanugine obſita, & quam in cæteris latiora, ſtellæ in modum diſpoſita, pediculis villoſis, tres, quatuorve uncias longis infident, quæ decem ſunt, maxime ubi femen perfici incipit: flores magni ſunt, eleganter cærulei, & in odori (rarior floribus eſt incarnatis) ſemper quini in ordine ceu verticillatim diſpoſiti; ita ut quæ amplum quatuor, raro quinquæ ordines conſpiciantur: & quo planta perfectior fit, eo etiam magis à ſe invicem diſtinguuntur, & quintus ordo plerumque perit, dum inferiores femen perficere ſtudent: ſiquæ ſequuntur hirsutæ, unciam lata, duas longæ, ſed paucæ, cum ex quinque ordinibus vix binæ ſingulo ordine proveniant (quod raritatem & peregrinam plantæ naturam.

oſtendere videtur) quæ femen vulgaribus majus compreſſum, & ruſcens, quandoque ſtriis variegatum, continent. Hujus femen anno 1593. Lupini Indici nomine, D. Doldius Norinberga, ipſam vero plantam Lupini Cretici appellatione, D. Spranger Heidelbergæ miſit: quem Lupinum quartum, Cluſius in poſtrema hiftoria facere videtur.

II. LUPINUS minimus: ex radiculâ oblonga capillacea, cauliculis tenuis, palmaris, quam minimum hirsutus exurgit, circa quem foliola quina, ſena: ſeptena, brevia, anguſtiſſima, ſubhirsuta, quæ oblongis pedicellis infident: flores & ſemina nondum vidimus: plantam Lupini Africanæ minimi nomine, ex horto nobiliſſ. Conſtarenti habemus.

#### DE LATHYRIDE.

##### CAPVT VII.

**L**ATHYRIS anguſtiſſimo ſive capillaceo folio: plures Lathyridis diſcrentias in foliorum latitudine & anguſtia, floris colore, ſiquarum forma, hirsutis, & lævitate hic prætereire lubet, & ſolum meminiffe Lathyridis anguſtiſſimo folio, quæ radice eſt exili, cauliculis cubitalibus infirmis, quibus hinc inde, & ad verſo ſitu bina minima foliola adnaſcuntur, è quorum ſitu bina, nonnunquam terna folia capillacea, trium, quatuorve unciarum longa, & ſurrecta; exiguo pedicello innixa, una cum pediculo in multitudine capreolum deficiente, prodeunt; ex quo etiam pediculus tenuiſſimus; oblongus & nudus, effertur, qui florem unicum, parvum ſubcæruleum, quandoque pallide ruſcentem ſuſtinet: quo deſſuxo, ſiquæ uncialis in apicem ſalcatum aſciens, bina, ternave granæ parva rotunda nigricantia continens, ſuccedit. Monſpeſſuli in collibus, Majo florens reperitur.

## DE VICIA.

## CAPVT VIII.

**V**ICIA Onobrychidis flore: & Viciarum quamvis differentias plures observaverimus, attamen in præfens unius solum descriptionem subicere lubet. Hæc caules habet pedales, teretes, striatos, quos foliorum alæ, ut in Vicia vulgari, sed breviores & angustiores, uni costæ ex adverso respondentes, ambiunt, capreolis extremum occupantibus: ex foliorum alis superioribus, pediculi semipalmares, nudi exurgunt, quorum summitatibus flores plures oblongi, galeculati, Onobrychidi 3. Clusii forma similes inferne pallidi, superne violacei coloris insident: floribus succedunt siliquæ planæ, deorsum reclinatæ, semina exigua, fœna, septena numero, continentes. Monspeßuli provenit;

## DE CARITE GALLINACEO.

*et onobrychide.*

## CAPVT. IX.

**C**ARUT Gallinaceum minus: ex radice tenui oblonga, fibris carente, cauliculos aliquot palmares, & semipalmares profert, eosque ut plurimum procumbentes, & in ramulos divisos: folia vulgari, sive majori similia, sed breviora & angustiora: flores habet paucos, parvos, dilute rubentes, brevibus pediculis insidentes: fructus parvi, asperi, echinati & subrotundi succedunt. Hoc in maritimis & arenosis Provinciæ, & juxta Olbiam, & in montosis juxta oppidum Vigan, reperitur.

I. ONOBRYSIS clypeata aspera minorâ radi-  
ce crassa, fibrosa, cauliculi semipalmares, reclinati prodeunt, circa quos foliola multa, brevia & angusta, adverso situ costæ adhærentia: stoculi eleganti colore rubentes, parvi, Genistæ formæ similes, pedicellis insident: sequuntur fructus clypeolis exiguis similes, plani, asperi, semen minutissimum continentes. Monspeßuli in planitie. Lupi collecta.

II. ONOBRYSIS clypeata lævis: ex radice rufescente, paucissimis fibris donata, caulis unus (nonnunquam duo) pedalis, nodis distinctus, exurgit: circa quem folia alata, ex senis, septenis utrinque. fibris oblongis, glabris, uni costæ

inhærentibus, unoque extremam aliam occupante composita: ex alis, tenues, & oblongæ virgulæ, flores purpureo cæruleos, velut in spica dispositos, sustinentes, prodeunt; quos sequuntur fructus plani, læves, clypeiformes, communiter terni, sibi invicem per longum cohærentes, semen minutum includentes. In Helvetiorum alpibus, ut monte Fractio, & ad Thermas Fabarias provenit.

III. ONOBRYSIS incana: caulem habet rotundum, ramosum, incanum: folia plura, acuminata, angulata, uni costæ adnexa, incana velut cinere aspersa: cauliculi semipalmares, nudi, spicam florum purpurascens, aliorum forma sustinent: quibus succedunt siliquæ oblongæ, incanæ, incurvo mucrone donatæ, duabus valvulis constantes, semen minutum, nigrum, planum, & semicirculare continentes. In Provincia Galliæ reperitur.

Alteram non minus incanam, sed minorem, semipalmarem, foliis brevioribus & rotundis, ex Aragoniæ & Castiliæ saxosis, D. Albinus attulit.

## DE OROBO.

## CAPVT X.

**O**ROBUS alpinus latifolius: ramis est cubitalibus, aut altioribus, angulosis, viridibus. foliis in singulis alis octonis uni costæ adnatis, & sibi invicem oppositis, uncias tres longis, duas latis, viridibus, nervosis, & cæteris Oroborum foliis minus acutis: è virgulis ex alarum cavis palmaribus nudis prodeuntibus, flores unciales, Genistæ forma, pallide lutei, at folio superiore rufescente, dependent stylo ex illorum medio prominente: lobos & semina non vidimus: ex Pyrenæis & Helvetiorum alpibus habemus.

205

## DE GLAUCE LEGUMINOSA.

## CAPVT XI.

**G**LAUCI Leguminosæ affinis: radicem habet albam, oblongam, paucis fibris donatam, ex qua caulis bicubitalis, & altior, satis crassus, rotundus, rubescens, cavus, paucis & brevibus pilis aspersus, prodit, & nisi sustentetur, procumbit: at frequenter ad cubiti solum altitudinem accedit, nec fulmine opus habet: hic in alios ramos dividitur: folia habet Glaucæ leguminosæ similia, duodecim etiam quatuordecim, & pluribus, utrinque ad costam ordine dispositis, nec in ambitu serratis, & eleganti virore nitentibus: ex foliorum sinubus pediculi pro-

deunt, flores pallide luteos, modo unum communiter plures, forma Glauci leguminosæ similes sustentantes: hos sequuntur siliquæ crassæ, conjunctæ, unciam longæ, triangulares, in brevem apicem abeuntes, semina angulosa, per maturitatem ex viridi flavescentia, continentes. Hujus semen Araci Boetici nomine, à D. Jo. Ponna Verona accepimus, & ab annis aliquot in hortulo nostro habuimus: nam licet planta annua sit, attamen ex semine deciduo sese propagat. Tota planta ingrati saporis est: folia commanducata, herbaceum primum & ingratum,

dein amarum saporem in faucibus relinquant.



## LIBER DECIMVS.

## DE OPHIOGLOSSO.

## CAPVT I.

**I.** OPHIOGLOSSUM anguloso folio: ex radice crassa, in fibras crassas abeunte, unus vel alter pediculus, uncias quatuor longus, post medium dilataus, effertur, cui folium unicum, uncias tres longum, sesquiunciam latum, ad exortum utrinque dilatatum, & angulosum insidet, & stylus sesquiunciam linguam referentem, pediculo donatum obtinet. Helmsadio, D. Sigfridus misit.

**II.** OPHIOGLOSSUM minus: radiculis est fibrosis, pediculo simplici & brevi, cui folium unicum, subrotundum, unciam latum, sesquiunciam longum insidet: ad ejus exortum, & veluti è folii sinu, stylus serpentis linguam referens, unciam longus exit: in humidis circa Monspelium provenit.



## DE ADIANTHO.

## CAPVT II.

**A**DIANTHUM fruticosum Brasilianum: hoc Filicis instar excrescit, caule tenui, lævi, subnigro puniceo colore nitente, qui in alios subdividitur, circa quos folia viridia, Adiantho vero aliquantum similia, parva, oblonga, sed obtusa, superne tantum incisuris divisa, inferiore costa, qua capillaceo insident, integra, alternatim cauliculo, & quidem utrinque duodecim usque ad viginti, petiolis, per pedicellum junguntur. Apud Toupinambaultios in Brasilia natum à D. Bursero accepimus.

## DE FILICE.

## CAPVT III.

**I.** Filix palustris maxima: radice est omnium Filicum crassissima, duos pugnos superante, nigra, velut ex crassissimis squamis compacta, & multis

multis fibris nigris capillata, unde exurgūt folia plura atroviuentia, tres cubitos superantia, in latum amplissime expansa: quorum pedicul<sup>9</sup> rufescens, angulosus, cavus, instar oblongi auriscalpii ex radice prodit, qui ubi pedalem altitudinem adeptus est foliosus redditur, ad modum Filicis maris vulgaris: nam veluti ex plurimis pinnis, secundum margines crenatis, & ad unum pediculum coherentibus componuntur. Verum ad radicem, inter media folia, plura foliorum rudimenta cubitalia, veluti futurorum principia, conspiciuntur, eo modo, quo in Filice florida, sive Osmunda dicta, circa summos ramulos apparent: à qua tamen differt, quod Osmunda caules edat, & caulium summis, veluti flores sive seminum rudimenta adhæreant, & folia habeat latiora, & haudquaquam per margines serrata. Hanc locis palustribus circa thermas Marchicas copiose observavimus: aliquando in editis & saxosis, sed humidis montibus etiam reperitur, ut circa Ramstein arcem Basileensium notavimus.

II. *Filix mas aculeata major*: radicem habet nigram, fibrosam, pediculos pedales, foliosos, in multas alas pinnatas, modo majores, modo minores, modo minores profundius divisos pallide virescentes, primis in ambitu dentatis, & in brevem spinulam desinentibus. Hanc in monte Wasserfall legimus.

III. *Filix aculeata minor*: hæc pinnulis est brevibus, totis integris, non dentatis, sed in spinulam acutam brevemque omnibus desinentibus: eodem quo prior loco, licet eam postmodum à D. Furero ex Harcynia & Stolberga veteri, acceperimus.

## DE MUSCO.

## CAPUT. IV.

I. *Muscus penetrans*: hic colore est ex luteo virescente, lateq; serpit, multis viticulis, sed brevibus, ramosis, minutis foliis, pennam æmulantibus vestitus, qui fibras tenues pro radicibus habet: in petrosis & sylvis reperitur.

Hujus altera species, radice rufescente ex copiosissimis fibris composita, viticulis ramosioribus, foliis minoribus: in sylva Wilens, locis uliginosis provenit.

II. *Muscus filicinus minor*: hujus aliquot differentias observavimus: sed hic solum de minore agemus, qui per terram serpit, cauliculis tenuibus, in summo ramosus, foliolis Filici similibus, sed tenuissime dissectis: ex ramulis, pedicelli aliquot capillares rufescentes, biunciales, effertur, quib. singulis capitulum exiguum, subrotundum, incurvū, in apicem exiguum desinens, insidet. Hunc, cum aliis D. Jungermannus misit.

III. *Muscus Abietis facie*: prædicto non multum ab simili, viticulis in ramos divisus, foliis capillaceis, utrinque (ut in Abiete) costæ oblongiusculæ adnatis, multo quam in priore brevioribus, & viridioribus.

IV. *Muscus ramosus repens, velut spicatus*: hic ad arborum radices, nigris radiculis terræ affigitur, viticulis crassis, & longis serpit, & de se copiosas veluti spicas oblongas, ex tenuissimis & levissimis foliolis compactas, ramulorum instar emittit.

Huic similis & alter, foliorum tantum apicibus candicantibus discrepans: uterque in monte Crenzacho ad arborum radices crescit.

V. *Muscus ramosus erectus major*: hic cespitis instar eleganter & artissime quasi compactus, ex radicibus oblongis capillaceis, cauliculorum trium quatuorve unciarum emittit, qui imbrinos, ternos, quaternos, biunciales, etiam triunciales ramulos, & hi quoque in alios eriguntur, qui minimis capillaceis foliolis vestiuntur: inter ipsa foliola, pedicelli unciales, nudi, capillacei, capitulum, ut in Adianto aureo, sustinentes, offeruntur. Hic in Crenzacho monte ad arborum radices, aliis Muscis commixtus conspicitur: at elegantior & viridior, ad sepes circa Birsam fluvium reperitur.

VI. *Muscus ramosus erectus minor*: ex capillacea radiculâ cauliculus ad summum biuncialis varie divisus foliolis vix conspicuis cinctus, emergit: eodem quo tres priores, loco provenit.

VII. *Muscus saxatilis ericoides*: hic circa radicem folia multa Musco vulgari similia, inter quæ viticuli sunt palmares, alperi, foliolis Ericæ coridis folio similibus, inordinate vestiti, aliquid hinc inde nudi, quorum summo capitulum exiguum insidet. Ad Wiesam fluvium super saxa reperit.

VIII. *Muscus stellaris roseus*: ex fibellis nigris radicem constituentibus; pedicellis unciales pro-



prodeunt, quibus singulis folia plura instar rosæ compacta, pallide virentia, acuminata, in modum stellæ disposita, insident. Hic in saxosis Telamontii provenit.

IX. Muscus Cupressiformis: parvus est, ramosus, foliolis cupressi forma, atrovirentibus, inter quæ pedicellus exurgit, qui minimas spicas pallidas & molles sustinet. Ex Hircynia.

X. Muscus Polytrichoides: hic triplex est; Primus, viticulis est plurimis, iisque brevibus, & compactis, qui foliolis brevibus capillaceis rigidiusculis cinguntur. Alter, per omnia minor est, cujus folia rigidiuscula non sunt: Tertius, minimus est, & mollis: prior in sylvis uliginosis reperitur: duo posteriores muris insident.

XI. Muscus terrestris coralloides erectus, cornibus rufescentibus: hic Musco terrestri vulgari eleganti spectaculo innascitur: nam Musco vulgari ex pallido virenti, hic candidus insidet, coralli modo in ramulos rigidiusculos divisus: qui licet candidus sit, ipse tamen summitates cornutæ, & rigide rufescunt: hic ad Wiesam fluvium late expansus in arenosis reperitur. Verum hic cum Musco Corallino, sive Corallina montana Tabernæmontani, neutiquam confundi debet.

XIII. Muscus ceranoides: hic duplex est, major & minor: major, trium, quatuorve unciarum est, foliis carens, cauliculis latiusculis in ramos divisus, hi que in alios breves, & hi similiter in tenuissima segmenta, trifida, quadrifida, acute seinduntur.

Minor totus incanus, unciam non excedens, ex plurimis ramulis proxime junctis compositus, quorum summitas communiter in duo mi-

nutissima & acutissima cornua abit: uterque in Hircynia collectus fuit.

XIV. Muscus aquaticus folio expanso: hic ex radice transversim repente, & nigricante, ramos frequentes, late sparsos & semipalmes emittit, quorum summitates ob foliola compactiora, velut in spicam abeunt: foliis est brevis, latiusculis primum, dein acutis. Hic apud nos quæ in rivulis innatat, & nonnihil splendet: quamvis eundem ex lacu Gaderselebio D. Sigfridus, & D. Jungermannus, Musci majoris lapidum Hircynia nomine, miserit.

XV. Muscus fontanus sive hepatica aquatica: hunc triplicem habemus, majorem & minorem, Hepaticæ nomine à Lobelio, Tabernæmontano & aliis depictum, his tertium addere lubet, ab illis diversum, quem Muscum fontanum capitulis racemosis vocamus: hic foliis est longe minoribus, squamarum instar junctis, pallide virentibus, & nonnihil hirsutis, inter quæ quam plurimi pediculi capillacei, biunciales, nudi effertur, quorum singuli capitulum parvum instar racemi compactum, & rufescens sustinent, quantum ex sicco, à D. Sigfrido misso, colligere licuit.

XVI. Muscus pyxioides duplex est: alter terrestris, tubulis majoribus, & candidioribus constans, à Lobelio nomine Musci terrestris pyxidatos alabastriculos imitantis, propositus: sub quo in Silesia calcem reperiri relatum fuit.

Alter vero saxatilis est, tubulis longe minoribus, copiosioribus, nec ita candidis, qui petris saxi sive latilimis innascitur, eaque obteggit, quemadmodum in via Telamontium versus, videre est.

*Lenticula palustris latifolia.*

qua incidere. Pisis in Auxerisfluvio, qui aquas  
thermales ex monte S. Juliani recipit.

*CORALLINA.*

CAVTV VI.

**C**ORALLINA varietates multæ occurrunt;  
at in præsens de tribus, quas hæcenus apud  
Authores, qui ad manus sunt, non observavi-  
mus.

I. CORALLINA alba nodosa: caule est pedali,  
ligno candido, & duro, candido & aspero cortice  
tecto, à quo utrinque, sed sine ordine, pediculi,  
trium quatuorve unciarum erecti flexiles, prode-  
unt, quorum aliqui in alios, etiam uncia minores  
subdividuntur: hos minimum noduli, velut ex  
duobus semicirculis, ijsq; ut plurimum pertusis,  
compositi usque ad extremum apicem (triginta,  
etiam quadraginta in uno pediculo observare li-  
cet) elegantis spectaculo, ad antiquarum mini-  
marum cæterarum aurearum similitudinem, cin-  
gunt. Hanc una cum sequentibus, D. Rumbaumi-  
us, Mafsilia attulit, ex Barbaria illo deferri, & apud  
Mafsilienfes plumarum loco supra pileos  
gestari, affirmavit.

II. CORALLINA cinerea rugosa: hæc duplex  
est, & utraque non secus quam sequens, intus li-  
gnum habet spadiceæ coloris, durum, medulla ca-  
rens, & crusta obductum. Prima, ligno est durio-  
re, quod crusta cinerea, aspera, rugosa, & tubero-  
sa, veluti cortice vestitur, quæ friabilis est, forte  
ex lino maritimo exiccato creata: hæc in ramos  
plures recurvos, & hi in minores, veluti tuber-  
culis exasperatos, dividuntur, & in obtusum ro-  
tundiusculum apicem desinunt.

Altera, crusta magis albicante, minusque ru-  
gosa obducitur, & in ramos pede longiores fle-  
xiles, & hi in stylos plerosque palmares, absum-  
untur. Verum has duas, nec cum Lithophyto  
marino Gesneri, nec cum Corallina alba, lutea,  
& rubra Tabernæmontani, nec cum Erica mari-  
tima Clusij, confundere oportet, cum omnes has  
differentias habeamus.

III. CORALLINA pallide flavescens lævis:  
hæc crusta pallide flavescente, lævi ac friabili  
obducta est: à qua utrinque modo rami,  
modo styli læves & flexiles  
prodeunt.



*LENTICVLA PALVSTRIS.*

CAVTV V.

**L**ENTICVLA palustris latifolia punctata:  
Lenticula palustris mihi quadruplex est:  
vulgatissima Lentem referens: altera trifolca:  
tertia quadrifolia: quarta cujus & figuram (in  
Phytopinace & Matthiolo propositam) & descri-  
ptionem adungere lubet. Hæc ramulis aquis in-  
nata, à quibus filamenta radicales constituenta  
deorsum feruntur: folijs est copiosis, subrotun-  
dis, eleganter virentibus, conjugatim, in ramu-  
lis digestis, superne punctis minutissimis nota-  
tis: his inferne copiosæ lenticulæ, aliquando sin-  
gulæ, aliquando ternæ, & quaternæ, rugoso  
prætenui cortice donatæ adhærent, quibus se-  
men copiosissimum, minutissimum & flavescens  
includitur: sapore est aqueo; Hanc in fossis  
Patavinis aquis supernatantem vidimus, & in  
Silesia circa Uratislaviam reperitur: quam forte  
Cæsalpinus, pro Stratiore aquarica Dioscoridis  
proposuit, quamque scribit fluitare, & cum a-

## QUERCUS MARITIMA.

## CAPVT VII.

**Q**UERCUS *maritima* triplex mihi est: 1. quæ propter vesicas aut bullas plurimas, quibusdam baccifera dicitur: 2. vesicis quidem caret, sed foliorum extrema crassiora sunt, & inæqualia, quasi rudimentum Cucumeris exigui ostendunt, quam glandiferam vocant utraq; jam descripta. At tertia, quam Quercum *maritimam* barbaram vocamus, pauca quidem folia habet, eaque secundæ similia, sed hæc in quam plurima oblonga capillacea filamenta, barbæ instar, absumuntur.

## FUCUS MARITIMUS.

## CAPVT VIII.

**F**EX *Fucus* *maritimus* quam plurimis, in præfens aliquot solum exhibebimus, quorum duos priores anno 1603. D. Cargillus, Abredonia ex Scoria una cum descriptione transmisit.

I. *Fucus* *alatus*, sive *phaganoides*: hujus admiranda est forma: saxis quæ Oceanus lambit, & in æstu quoque mergit, adheret, caule tereti, pennæ anserinæ magnitudine; colore, quem exhibet Pruna Damascena, inter rubrum & nigrum saturatum, medio; at folia, quæ non nisi caulem aduatum ornant, saxo hærentia (in sicca virescent) ad luteum magis vergunt. quæ palmæ latitudine supra radicem nascuntur plurima, ligularum instar, cartilaginea, tres, quatuor, sex, aut octo uncias longa: inter quæ caulis eo usque teres, latefcit, porrigiturque interdum ad ulnæ longitudinem infirmus, ut nisi aquis innatans sustentetur, humi semper procumbat: huic, si adultior utrinque ala adnascitur, tantæ, quantæ & ipse caulis est longitudinis, ea vera tota membranæ est, fibris hinc inde venosis à caule conspersa. Notandum autem membranam hanc, prout in sagittarum alis est videre, ima parte angustiore, sensim latiore reddi, ita ut tres ab ortu pollices transversos, æqualis deinceps tota existat, unius, duarum aut trium unciarum latitudine. Vulgo Baderlacks vocant: *Fucus* *alatus*, aut *phaganoides* esto, caulis enim ancipitem gladium refert: Hic, præsertim in Septembri viget, alio anni tempo-

re inutilis: membranæ abjiciuntur, reliquo vescuntur gravidæ, alijq; etiam in cibos cedit: sapore est salso cum modica dulcedine: sitim manducantibus excitat.

II. *Fucus* *arboreus* *polychides*: eodem ortu & usu est, quem vulgus *Tangels* nominat, *Fucus* omnium interdum maximus, trium quatuorve cubitorum, teres, luteus (tenuior, qui solus vescus est, longe infra minimi digiti crassitudinem, corticem Castaneæ bene maturæ colore æmulatur) caulem Angelicæ maximæ crassitudine æquat: fastigium, in latic cartilagineos membranas, varie dividitur, eo prope modo, quo balthei pars, & qua ensis suspenditur apud Helvetios. Hic *fucus* maximus, aut *arboreus* *polychides* esto. Hætenus *Cargillus*. Verum hic postremus à *Palmifolio Giganteo* sive *Alga latifolia Imperati*, à quo Neapoli, cum quam plurimis *maritimis* plantis accepimus, distingui debet.

III. *Fucus* *longissimus*, *latissimus*, *crassus*: folio, radice est brevis, ex crassis fibris composita, ex qua pediculus crassus, rotundus, semipalmaris prodit, qui in folium expanditur: folium unum ingentis longitudinis, pedes aliquot & ulnas excedit (rarius ex una radice duo folia, ejusdem omnino formæ & longitudinis) & latitudine uncias quatuor superat, ejusdem fere per totum folium, principio excepto, latitudinis, in medio æqualiter planum, ad utrumq; vero latus parum convolurum tortuosum & sinuosum, obscure virens, crassum, & dum terræ adhuc affixum, tactu forma gelatinæ, viscosum, & madidum: quare, propter nimium madorem vix asservari potest, licet sæpius Soli exponatur: nam quoties chartæ reponitur, mador ille citi fœtore recrudescit, ita ut à corruptione non nisi post aliquot septimanas, donec plane sicceat, servari possit. Hic in Gallijs ad maris litora versus S. Malo provenit, & è natali solo facile eruitur: unde D. Særlus promissit.

IV. *Fucus* *longissimus*, *latissimus*, *tenuis*: folio: hic priori non multum absimilis, qui ex radícula nigra, fibrosa, pediculum tenuem, triunciale emittit, qui in folium sesquicubitalis longitudinis, unciarum quinque vel sex latitudinis, planum, per margines hinc inde convolutum, absumitur: coloris pallid: virescit est, substantiæ tenuissimæ membranæ: hunc cum alijs maris Mediterranei purgamentis re, æstum, non longe à montis Ceritæ, colligimus.

## CARDVVVS.

## CAPVT IX.

V. FVCVS longo, angusto, & crasso folio: radice est rotunda & plana, ex qua bina, ternave folia (sive cauliculi, si mavelis) sesquipalmaria, crassa, coriacea & plana, ligulas referentia procedunt, quæ in alias velut ligulas. sed rarius, dividuntur. Hic ad Fucum maritimum secundum Dodonæi editionis Belgicæ referri posse videtur, cujus species altera brevior & angustior folio dici poterit. Hunc quoque à D. Satero habemus.

VI. FVCVS membranaceus ceranoides: hic instar Lactucæ marinæ tenuis, palmum excedens, caule est unciam & semiunciam lato (mire varians) qui in plurimas alas modo latiores, modo angustiores, læq; in brevissimas easq; plures cornuum modo subdividuntur. Hujus species varias esse, scopulis adnasci, Scotis Dils dici, ejusq; esum contra Picam commendari, D. Cargillus, planta addita, perscripsit.

VII. FVCVS maritimus Gallopavonis pennas referens: hic membranaceus est, sese sensim late expandens, qui in plures lacinias semicirculares sibi quandoq; incumbentes dividitur, per quas variæ striæ semicirculares, variegatæ, diversæq; latitudinis, ut in pennis Gallopavonis, eleganti spectaculo feruntur. Hic scopulis maritimis adnascitur: quamvis etiam ex Mitulis, cortex huic Fuco similis, eximatur: hunc à D. Cargillo ex Scotia accepimus.

VIII. FILVM maritimum Germanicum: hoc exiguo lapillo innascitur, & in plurima bicubitalia, angustissima, nigricantia, lævia, crassiuscula & firma, aliquando inter se complicata fila, absumuntur. Hoc ex mari Baltico accepimus, & incolis Meerfaden, & Meerstrang dici accepimus.

ALGA bombycina: Algam hanc ex Scotia accepimus, quæ instar Gossypij live bombycis mollis & compacta, late expansa, aquis dulcibus innatat, superne pallide virens, inferne albicans: hoc gossypio, quod ex veteri thorace, cui fustulum erat, eximitur, similem est.



I. CARDVVS mollis latifolius: caule est cubitali, striato, brevibus & mollioribus spinis armato: folijs Rumicis forma, tenuibus, levibus, venosis, palmum longis, uncias quatuor latis, marginibus exiguis spinulis dentatis, caulibus summis in pediculis breves unciales abit, quorum singuli capitulum Lappæ vulgaris forma, ejusq; fere magnitudinis sustinent, quod in stamineum purpureum florem expanditur. Hunc D. Burserus in Austriæ monte Taurero Raftadiensium legit.

II. CIRSIVM angustifolium: ex radice nigra fibrosa, caulibus cubito altior effertur, membranosis alis asperiusculis vestitus, in ramos divisus, quorum singuli in pediculum oblongum, eumq; nudum, abeunt, cui capitulum unicum hispidum insidet, quod in florem stamineum rubentem aperitur, & tandem in lanuginem absumitur. Folia habet ad radicem palmaria, uncia angustiora, atrovirentia, in ambitu raris aculeis prædita: at quæ in caule, brevia sunt, nonnihil lacinata, & aculeis magis exasperata. Hoc in monte Walsersfall legimus.

III. CARDVVS sphærocephalus acurus vulgaris: ex radice crassa, caulibus cubito altior, statim in ramos brachiatus, effertur, qui crassus, lignosus, membrana alata spinosissima usque ad summum investitur: quem folia pediculo latiore amplectuntur, quæ profunde lacinata, palmaria, duas tresve uncias lata, per ambitum crebris & acutissimis, pallide flavescitibus spinis armata. Caulium summis, capita rotunda, pene sphaerica, acutissimis spinis horrida, insident, quæ in florem stamineum purpurascentem explicantur, & tandem in pappum abeunt, cui semen Cnicus sylvestris simile includitur. Hæc frequens est in dumetis humidis, quamvis etiam secus vias reperitur.

IV. CARDVVS lanceatus angustifolius: hic caulibus est bicubitalibus, rotundis, striatis, hispidis & firmis, oblongis, acutis, albicantibus spinis horridis, hinc inde membranea ala donatus, & in summo in ramulos divisus: circa hunc folia rariora, palmum æquantia, angusta, in lanceam oblongam, eamq; latiore, quam in Cardo lanceato latifolio, abeuntia, raris & brevibus

bus lacinijs divisa, subtus incana, superne atrovirentia, spinis longis donata: cauliculorum summis capitula plura, parva, ex imbricatis squamis composita, insident, quæ in stamina atrorubentia, apicibus divisis expanduntur, & aliorum more in pappum & lanuginem resolvuntur, semenque exiguum in ea occultatur. Hic & flore albo quandoque reperitur. Hunc in nemore ad pontem Wiesam observare licet.

V. *CARDVVS* palustris: radice est simplici, caule tricubitali, foliaceo, erecto, nonnihil ramoso, brevibus spinis armato, folijs atrovirentibus, crassis, sinuosis, quandoque etiam laciniosis, semipalmaribus, sesquiunciale latius, per marginem rarioribus spinis cinctis; caulis summo capitula plura, singula singulis pediculis insident, quæ in florem stamineum purpurascentem expanduntur, dein in pappum aliorum more abeunt. Hic ad Wiesam locis arenosis, herbosis, & Michelsfeldensibus palustribus, provenit.

VI. *CARDVVS* polycephalus angustifolius: radicem habet lignosam, fibrosam, caulem cubito altiore, rotundum, striatum, spinis carentem, cujus summitas in plures semipalmes ramulos, & hi quandoque in breviores, dividitur: folia sunt pauca, angusta & brevia, spinis oblongis armata; capitula plura, parva, quibus mini-

ma subjiuntur, exiguis spinulis prædita, & flores jaceæ similis ex staminibus purpurascentibus compositis, insidet, qui similiter in lanuginem abit. In pratis Michelsfeldensibus frequens occurrit.

VII. *CARDVVS* repens vinearum: ex radice oblonga, nigricante, caulis prodit reclinator, rarius erectus, pedalis, incurvus, striatus, candicans, cujus summum in ramulos paucos, eosque breves absumitur, qui capitula parva jaceæ vulgari similia, sustinent: folia ad radicem plura, superne atrovirentia, inferius incana lanugine aspersa, semipalmaria, unciam lata, leviter sinuata, spinulis per circumferentiam donata: at quæ caulem ambiunt in profundas lacinias dividuntur, palmaria, duas tresve uncias lata, existunt. Hic in vinetis Mutenisibus frequens est.

VIII. *ANONIS* viscosa minor flore pendulo: plantula est semipalmaris, totaque hirsuta: radícula alba, oblonga, tenui, parum fibrosa, à qua cauliculi plures duarum triumve unciarum, exurgunt, ijque, tenues, rotundi, foliolis parvis, plerumque ternis ex uno pediculo prodeuntibus, forma & situ vulgaris Anonidis similibus, viscosis: flores parvi sunt, lutei, propendentes, quibus minutum semen in exigua siliqua succedit, & nullis spinis donatur. Ex Gallia Narbonensi habemus.



## LIBER VNDECIMVS.

## C R T I S U S.

## CAPVT I.

## G E N I S T A.

## CAPVT III.

**C**YTISVS Hispanicus siliquis Ornithopodij: hic virgis est rotundis, striatis, duris, tricubitalibus, in varios ramos non nihil lanuginosos brachiatis, quos folia numerosa, terna, uni pediculo inhærentia, in summis ramulis exigua, dilute virentia, ambiunt: flores parvi, lutei, Genistæ similes, quibus siliquæ unciales, molli hirsutie testæ, instar siliquarum Ornithopodij, minus tamen profunde sinuatæ, & plures simul junctæ, ternæ, quaternæ, quinæ, uni pedicello inhærentes, quibus semina parva, plana, nigricantia inclusa sunt. Hic in Hispania, ad agrorum limites frequens est, non tamen cum Cytiso primo Clusij, cujus pars interior nigricat, & ramuli toti villo obfiti sunt, confundi debet.

## C O L V T E A.

## CAPVT II.

**C**OLVTEA Scorpioides maritima glauco folio: virgis est pedalis, rarius cubitalibus, lignosis, rotundis, rufescente, rugoso cortice vestitis, in frequentes ramos divisis: folia alata, septem, aut novem, uni costæ, binis semper ex aduerso sitis, adhærent, uno impari extremam alam occupante, Coluteæ folijs similia, multo minorâ, obtusa & cordata, glaucique vel cæsi coloris: flores & forma & colore Coluteæ similes, sed minores: pediculis tenuibus siliquæ tenues, oblongæ, unciales, articulis distinctè insident. quarum singulis articulis, singula semina parva inclusa sunt. Hæc in maritimis prope Teracinum collecta, quamvis etiam Patavio, ex horto Bembiano habeamus.

**G**ENISTÆ Hispanicæ affinis: suffrutex est cubitum superans, caule tenui, tereti, candicante cortice testæ, qui in plurimas virgas tenuissimas dividitur, quarum aliquæ palmum superant, aliæ minores sunt: circa quas folia longiuscula, angustissima & ita ut virgæ pene nudæ appareant: summis virgis singulis unicum capitulum rotundum, villosum, molle, insidet, ut in Gramine maritimo sive polyanthemo majore, ex pluribus floribus. Genistellæ tinctoriæ forma, sed minoribus pallide luteis compositum: nam quilibet flos, ex caliculo villosi, hirsutie albo prodit. In montibus plane saxosis ad aquas Blancas D. Albinus collegit.

**GENISTELLA** Monspeliciac spinosa: hæc viticulis est palmaribus, in terram reflexis, quarum pars inferior in brevissimos ramulos, ex parvis spinulis constantes dividitur, à medio vero sursum villosi sunt, quandoque in ramulos brachiati, oblongis viridibus folijs, minoribus sæpe additis, vestiti, spinisque carentes: summitatibus flores pallide lutei, forma Genistæ spinosæ vulgaris similes, insident. Hanc quidam Monspelluli Corradam luteam vocabant: quæ etiam in Ventofo monte reperitur.

Similem sed per omnia majorem, caulibus pedalis, folijs rarioribus, spinis longioribus, minusque pungentibus, floribus majoribus & aureis, quasi in spica dispositis, ex Hispania habemus.

**GENISTELLA** minor Aspalatioides: suffrutex est pedalem altitudinem superans, stipite rotundo, rufo cortice vestito, ligno fo, hinc inde spinis, sed rarioribus, armato, in ramos, qui in



minores subdividuntur, brachiato: circa quos foliola rara, parva, quædam subrotunda, quædam oblonga, spinis interiectis, quibus flores lutei, Genistæ prædictæ duplo minores, hinc inde componuntur, nec, ut in priore, ramulorum summis, in aculeum abeuntibus, insident. Hanc, ex Anglia Genistæ spinosæ nomine accepimus: at eandem in asperis, circa Aureliam Gallorum, ramis late se spargentibus, collegimus.

**CHAMÆGENISTA** Cretica: hæc virgulis est palmo minoribus, humi diffusis, tenuibus, rotundis, subcanis, in ramulos aliquot duarum, trium unciarum divisis, foliolis oblongis, angustissimis, binis aut ternis ab eodem exortu, sed altero semper longiore, prodeuntibus, incanis: ex foliorum alis flosculi terni, quaterni, parvi, lutei, Genistæ floribus æmuli: siliquas non vidimus. Ex horto nobiliss. Contareni habemus.

### *S Y M A C H.*

#### *C A P V T I V.*

**S Y M A C H** angustifolium: hoc potissimum folia Slijs à vulgato differt: hujus enim folia uncias quatuor longa, semunciam lata sunt, in exquilum apicem desinunt, & per marginem crenata sunt, quorum duodecim uni coltæ, utrinque nimirum sex, adherent, undecimo impari numerum, constituyente, quæ superne atrovirent, inferne pallida sunt, costa elata per longum excurrente. Hoc in Brasilia apud Tououpinambaultios collectum & à D. Bursero communicatum.

### *M E L E G V E T A.*

#### *C A P V T V.*

**M E L E G V E T A** sive Grana Paradisi: folia crassa sunt, uncias quatuor longa, tres lata, per quorum longitudinem costa elata fertur, à qua fibræ plurimæ per transversum abeunt, ut in Caryophyllorum folijs cum quibus maximam similitudinem habent: fructus satis cognitus, habetur in officinis, ut & Grana exempta: hujus folij pediculus, sapore est aromatico, ipsis granis correspondente, non tamen ita acuto & aromatico, ut in folijs Caryophyllorum animadvertitur, quo signo potissimum à se invicem di-

stingui possunt. Hujus folia una cum Nucis moschatæ folijs, D. Clutius Amstelrodamo misit.

### *S T Y R A X L I Q U I D A.*

#### *C A P V T V I.*

**S T Y R A C I S** liquidæ folia: ex radice rotundo, snigricante, rugoso, striato & quasi articulato cortice testæ, folia terna, etiam quina, oblongis, tenuibus, nigricantibus pediculis donata, ex uno veluti tuberculo prodeunt, quæ vitiginea sunt foliorum Aceris, vel Platani instar, in lacinias ternas, etiam quinas divisa, nervosa, per circumferentiam crenata, & mucronato cuspidæ. Hæc ab Honorio Belli accepimus, qui styracis hujus magnum ramum se habere perscriptit.

### *L I G V S T R V M.*

#### *C A P V T V I I.*

**L I G V S T R V M** duplex ex Italia accepimus, de utroque breviter in præsens, cum solum ramos absq; floribus & seminibus acceperimus.

**I. L I G V S V A M** Myrsinibus: hoc ad Ligultri vulgaris modum excrecere, & in ramos brachiari audio: rami rotundi sunt læves non nihil rufescentes: folia atrovirentia, vulgaris folijs & latiora & longiora. Hoc nomine, Ligultri myrsifolij perpetui, vel Myrti Ligultri folio, Patavio ex horto Pharmacopæi (cujus nomen excidit) ad pontem molin accepimus.

**II. L I G V S T R V M** folijs lacinia: & hujus ramos pedales habemus, circa quos folia atroviarentia, glabra, inferiora quidem subrotunda, alia vero oblonga: hæc q; modo integra, modo Jasmmini lutei instar divisa, quandoq; ab altero folium latere, laciniam unam, quandoque utrinque unam, rarius binas, quandoque ternas, quaternas, inordinatas lacinias obtinent. Hoc primum Ligultri nigri nomine, ex horto III. Mori Senatoris Veneti, quem in villa di Carbonara colit: dein, pro Syringa lacinia: folijs, ex horto III.

Contareni Sen. Veneti accepimus: de utroque plenius in Theatro nostro.

## S A L I X.

## CAPVT VIII.

I. **SALIX** fragilis: hæc mediocris est altitudinis caulibus ramosis, rotundis, rubente cortice vestitis: folijs longis, angustis, prona parte incanis, superius atrovirentibus, & tandem pene nigris: julis quam in cæteris brevioribus. Fragilem appellare lubet, quia non aliarum Salicum instar virgis lentis & vimineis, sed plane fragilibus donatur. Nostri Brandreiden / eo quod tandem nigrescat, dicitur: frequens ad Birsam & S. Jacobum.

II. **SALIX** oblongo incano folio: hujus caules, cortice atrorubente vestiti, in breves & plures ramulos divisi: folijs oblongis, superna parte obscure virentibus, parte prona cinereis & incanis: flores copiosos aliarum salicum modo producit, & semen parvum nigrum, cum albissima lanugine avolat: hæc apud nos frequens, in primis in minore urbe, ad molendinum ærarium, in sepibus ad aquam.

III. **SALIX** subrotundo argenteo folio: hæc caulibus est cubito altioribus, rotundis, incanis & ramosis: folijs subrotundis, superne nigricantibus, parte prona incanis, argentei coloris, splendentibus, tactu mollibus, & veluti tenui lanugine pubescensibus, per ambitum raris crenis exasperatis. Hanc sine fructu ex Belgio D. Gallus transmisit.

IV. **SALIX** humilis latifolia erecta: hæc salici, latifoliz aquaticæ acuto folio similis est, sed humilior, cum hujus virgæ rotundæ striatæ, vix

cubitus superent: folia minora sunt, & rotunditate oblongata, in acumen desinentia, rugosa, parte prona lanuginosa, tactu mollia: juli totius di, pavi, flavi: hæc cum latifolia repente confundi non debet. Michelsfeldæ humidis.

V. **SALIX** alpina angustifolia repens: ex radice, atrorubente cortice recta, cauliculi palmares humi fusi prodeunt, qui capillaceis radicibus tertæ affiguntur, ramulis tamen paucis fursum elatis: foliolis oblongis, latiusculis, brevibus cincti: flores ut in cæteris, quibus absentibus, nullus salicem esse crederet. Hæc in Helvetiorum alpihus & monte Parva, frequens est.

VI. **SALIX** alpina Pyrenaica: hæc ad semicubitalem altitudinem vix assurgit, virgis tenuibus, ramosis, folijs oblongis, parvis, per circumferentiam pilosis, tactu holoserici instar, ob minutissimos pilos, mollibus: spicæ florum unciales, angustæ, molles sunt. In summitatibus Pyrenæi D. Burserus legit.

VII. **SALIX** faxatilis minima: hæc duas uncias vix superat, quæ ex radícula caudicem crassiusculum, vix semiuncialem emittit, qui in binos ternosve unciales ramulos, terræ incumbentes dividitur: folia sunt parva, oblonga, subrotunda, atrovirentia, venosa, quorum medio capitulum parvum subrotundum, veluti ex multis baccis compositum, insidet, quibus maturis apertis, veluti ex triangulari caliculo, mollis, candida & brevis lanugo effertur. In alpium

Helvetiorum jugis, saxis insidentibus, reperitur.



## LIBER DVODECIMVS.

## SANAMUNDA.

## CAPVT I.

**S**ANAMUNDA viridis vel glabra : tadice est Scrasa, lignosa, fibrosa, alba, cortice crasso, pallido, lèto vestita, à qua ramuli plures, tenues, palmates, etiam minores, ijque geniculati prodeunt, folijs oblongis (rarius subrotundo) Chamæleæ vel potius Polygalæ similibus, sed brevioribus, viridibus & glabris. alternatim circa ramulos dispositis : inter quæ flores oblongi, luteoli, in quatuor foliola divisi conspiciuntur : fructum non observavimus. Hæc Aptili florens, Monspessuli in horto Dei collecta fuit.

## FRANGULA.

## CAPVT II.

**F**RANGULA altera polycarpus : frutex est Frangulæ sive Alni nigre similis, ramosus, cortice candicante vestitus : folijs subrotundis in apicem plerumq; abeuntibus, plurimis nervis elatis pèt ea discurrentibus, quare instat foliorum Ulmi rugosis, tenuissime per marginem serratis : Flores habet forma Frangulæ vulgari

similes, parvos, stellatos, luteolos, copiosos, velut in racemo cohærentes, quibus succedunt fructus parvi angulosi compressi, Spinæ insectoria baccis cortespontentes, ex minimis pediculis dependentes. Hæc vere florens in quibusdam dumetis, etiam in monte nostro Muteto, reperitur.

## R I B E S.

## CAPVT III.

**R**IBES montana oxyacanthæ sapore : duplex Ribes in Helvetiorum alpihus reperitur : altera, quæ frutice & folijs, sed minoribus vulgari convenit : fructum v. habet rubrum, hortensi duplo pene majorem, sapore oxyacanthæ fructui respondentem : in Valesianorum montibus reperitur. Altera, humiliorum montibus reperitur. Altera, humiliorum est, & per omnia minor, baccis vulgari minoribus, minusq; acidis : in Bernatum montibus provenit. Et hæc ad gloriam Dei dicta sunt, cui sit laus honor & imperium in sæcula.

## F I N I S.





# I N D E X PRODROMI THEA- TRI BOTANICI;

Quo plantæ supra sexcentæ una cum alijs  
continentur.

*Primus numerus paginam,  
Secundus pagina segmentum,  
Tertius paragraphum denotat.*



A.	Alchimilla alpina quinquesolia, <a href="#">131.2.</a> quo mense floreat,
Brotanum Campestre incanum,	et quibus locis reperitur <a href="#">ibid.</a>
Carlina odore, <a href="#">71.1.</a> ubi proveniat	<a href="#">ibid.</a>
Absynthium Ponticum Creticum	<a href="#">ibid.</a>
grati odoris, <a href="#">71.1.1.</a> Græca lingua quomodo recte vocetur	<a href="#">ibid.</a>
ibid.	<a href="#">ibid.</a>
Absynthium alpinum incanum, <a href="#">71.1.11.</a> ubi nascatur,	ibid.
ibid.	<a href="#">ibid.</a>
Absynthium alpinum candidum humile	<a href="#">ibid.</a>
Absynthium alpinum umbelliferum, <a href="#">71.2.11.</a> quando inventum novum, ibid. quæ ejus varietas	<a href="#">ibid.</a>
Acetosa Americana folijs longissimus pediculus donata,	<a href="#">ibid.</a>
<a href="#">131.2.1.</a>	<a href="#">ibid.</a>
Acetosa rotundifolia alpina	<a href="#">ibid.</a>
Acetosa scutata repens	<a href="#">ibid.</a>
Acetosa Cretica semine aculeato	<a href="#">ibid.</a>
Acetosa lanceolata angustifolia repens	<a href="#">ibid.</a>
Adiantum fruticosum <a href="#">Brotanum, 150.2.</a> ubi nascatur	<a href="#">ibid.</a>
ibid.	<a href="#">ibid.</a>
Aethiopia laciniato folio	<a href="#">ibid.</a>
	<a href="#">ibid.</a>
	<a href="#">ibid.</a>
	<a href="#">ibid.</a>
	<a href="#">ibid.</a>

- Alfne Spergula facie, five Spergula minor subcaruleo foli- Beta Cretica femine aculeato* 7.1. & 2.  
sculo 119.1.X. *Wiesem Nagelein* 102.1.IV.  
*Alibea Bryonia folio, 131.1.1. alia Alibea arborescens sem- Bisfortia alpina maxima, 100.1. in altissimu Silefiorum*  
per virescens ibid.1 montibus reperitur 14.2.  
*Anagallu Aquatica angustifolia fenellata, 119.1. ubi pro- Brasica spinosa* 35.2. & 2.11.  
veniat ibid. Brasica sylvestris alpina 54.2.111.  
*Anemone tenuifolia Cretica albo magno flore* 93.2.1. Brandweyden 159.1.1.  
*Anemone sylvestris alba minor* 93.2.11. Bryonia Cretica maculata, 135.1.1. ubi frequens sit ib.  
*Anemone alpina alba major* 94.1.111. Bryonia sylvestris baccifera, 135.1.11. quo tempore floreat, ib.  
*Anemone alpina alba minor, ibid. IV. quo loco proveniat* ib.  
ibid. *Bryonia Mechoaca uergeri, 135.1.111. alias Jalapum*  
*Anethum sylvestre minus* 76.2.1. vel Gelapo, item Mechoaca nigra, vel mal. ib.  
*Amirrhinum saxatile folio serpilli, 106.1. ubi enascatur ib.* Bursa pastorum major folio non sinuato 50.2.1.  
*Angelica sylvestris hirsuta uadota, 82.2. quibus locu pro- Bursa pastorum major loculo oblongo, 50.1. & 2.11. nonnullu*  
veniat ibid. Thlaspi Veronica folio nominatur ib.  
*Anoni viscosa minor flore pendulo, 156.2. VII. unde ba- Bursa pastoris alpina hirsuta* 51.1.111.  
beatur ibid. Buschelerb 147.2.  
*Apium hortenfe maximum* 81.1.  
*Apium peregrinum folio subrotundis, 81.2. ubi reperitur* ibid.  
*Aquilegia montana magnoflore* 75.1.1.  
*Aquilegia montana parvo flore thalictri folio* ib.11.  
*Aquilegia hortenfe inulplex flore parvo* ib.111.  
*Argemone alpina lutea* 93.2.1V.  
*Arundo Anglica foliu in summitate diffusiu* 25.2.11.  
*Arundo Indica latifolia flore luteo punctato, ibidem III*  
26.1.  
*Ascyron magno flore, 130.2. hoc ascyron vulgari, five Hyperico dumetorum simile ib. ubi nam reperitur* ib.  
*Aster hirsutus Austriacus caruleu magno flore, 124.2. ubi*  
reperitur ibid.  
*Atriplex sylvestris fructu compresso rofeo vel stellato 58.1.1.*  
*Atriplex sylvestris vel Pes asperinus* ibid.  
*Atriplex sylvestris lappula habens, 18.1. & 2.11. alias atriplex sylvestris infipida parva cresta* ib.  
*Atriplex maritima angustifolia, ib.111. ubi proveniat* ib.  
  
B.  
*Bellu alpina major rigido folio* 120.2.1.  
*Bellu alpina minor* ib.11.  
*Bellu montana major folio acuto, 121.1.111. ubi nascatur*  
ibid.  
*Bellu montana folio obuso crenato* 121.1.1V.  
*Bellu inaristia foliu Agerati* 121.2.V.  
*Bellu spinosa quotuplex* ibid.  
*Bellu spinosa folio Agerati* ib.  
*Bellu spinosa forma bellidii carulea* 121.2.V.  
*Bellu spinosa flore globoso* ibid.VI.  
*Bellu hortenfe pediculo folioso* 121.2.V.111. 156.1.

## C.

- Calalia tomentosa, 102.1. ubi nam locorum reperiri*  
soleat 102.2.  
*Calanienta vulgaris flore exiguo, 110.2. ubi proveniat* ib.  
*Calamus. Vide Arundo.*  
*Calamus aromaticus Syriacus* 25.2.1.  
*Cantabricu alpina folio gramineo* 39.1.11.  
*Campanula alpina latifolia flore pullo* 39.2.111.  
*Campanula alpina latifolia carulea* 34.1.1V.  
*Campanula alpina rotundifolia minor* ibid.  
*Campanula rotundifolia minima, 34.2.V. quo loco copiosissime provemat* ibid.  
*Campanula Cybularia folijs* 34.2.1V.  
*Campanula serpillifolia* 35.1.V11.  
*Campanula folijs subrotundis, 35.2.1. hec a Campanula hortulensi rapunculid radice quomodo differt* 36.1.1.  
*Campanula Draba minoru folijs* 26.1.11.  
*Campanula folijs Ecby floribus villosis, 36.3.1.111. minor ejus species* ibid.  
*Campanula alia folijs Ecby, quam Clusius nomine Trachelij Dupondis descripsit* ibid.  
*Cannabina aquatica similis capulis nucantibus* 113.2.  
ubi invenitur ibid.  
*Caput gallinaceum minus, 149.1. quibus locu reperitur*  
ibid.  
*Carduus mollis latifolius, 155.2.1. ubi reperitur* ibid.  
dem.  
*Carduus Sphaerocephalus acutus vulgaris, ib.111. quibus locu gaudet* ib.  
*Carduus lanceatus angustifolius, ibid. IV. ubi reperitur* ibid.

<i>Carduus palustris</i> , <u>150.1</u> . V. quo loco proveniat	ib.	<i>Chamaedrys spuria</i> minor angustifolia <u>117.2</u> . V. ubi occurrat	ibid.
<i>Carduus polycephalus angustifolius</i> , <u>156.1</u> . VI. ubi frequenter occurrit	ibid.	<i>Chamaemelum leucanthemum Hispanicum</i> magno flore	<u>70.2</u> . L.
<i>Carduus repens vinearum</i> , <u>ibid. 2</u> . VII. ubi nascitur	ibid.	<i>Chamaemelum luteum Hispanicum</i> odoratum	ib. 11.
<i>Carui alpinum</i>	<u>14.1</u> . & <u>2</u> .	<i>Chamaemelum leucanthemum incanum Hispanicum</i>	minimus <u>ib. 111.</u>
<i>Caryophyllata alpina</i> minor, <u>130.1</u> . ubi colligitur	ibid.	<i>Chelidonia rotundifolia</i> major, <u>137.1</u> . quomodo loci proveniat	ibid.
<i>Caryophyllus arboreus</i> Creticus, ex radice <u>crassa</u> , <u>104.1</u> .		<i>Chelidonium majus</i> folij querni flore laciniato	<u>74.2</u> .
<i>Caryophyllus sylvestris</i> repens <u>nuliflorus</u> , <u>ibid. 11</u> . ubi proveniat	ib.	<i>Chondrilla viminea viscosa</i> nonspeliaca	<u>61.1</u> . & <u>2.11.</u>
<i>Caryophyllus sylvestris</i> biflorus, <u>ib. 111</u> . ubinam reperitur	ibid.	<i>Chondrilla viscosa</i> humilis	<u>61.1</u> . & <u>2.11.</u>
<i>Caryophyllus pumilus latifolius</i>	<u>104.1</u> . IV.	<i>Chondrilla purpurascens</i> fetida	ib. 111.
<i>Caryophyllus holoctis alpinus latifolius</i> , <u>ib. V</u> . ubi reperitur	<u>104.2</u> .	<i>Chrysanthemum latifolium</i> Brasiliannum	<u>70.1</u> .
<i>Caryophyllus holoctis alpinus angustifolius</i> purpurascens. <u>104.2</u> . VI.		<i>Cicer montanum</i> <u>dicum</u> , <u>147.2</u> . L. quo anni tempore, & quo loco proveniat	<u>148.1</u> . L.
<i>Caryophyllus holoctis alpinus</i> graminum, <u>ib. VII</u> . ubi proveniat	ibid.	<i>Cicer montanum</i> lanuginosum erectum	<u>148.1</u> . 11.
<i>Caryophyllus holoctis montanus angustifolius</i> albus, <u>ibid. VII</u> .		<i>Cicer astragaloides</i> erectum	ibid.
<i>Caryophyllus holoctis tomentosus latifolius</i> , <u>104.2</u> . IX. alias <i>Ocymoides tomentosus</i> , <u>ibid.</u> ubinam proveniat	ibid.	<i>Cirsium angustifolium</i> , <u>155.2</u> . 11. ubinam colligitur	ib.
<i>Caryophyllus holoctis tomentosus angustifolius</i> albus, <u>ibid. VII</u> .		<i>Clematis maritima</i> repens, <u>135</u> . ubinam reperitur	ib.
<i>Caryophyllus holoctis tomentosus latifolius</i> , <u>104.2</u> . IX. alias <i>Ocymoides tomentosus</i> , <u>ibid.</u> ubinam proveniat	ibid.	<i>Clematis alpina</i> Geraniifolia, <u>ib. 111</u> . ubi nascitur	<u>158.1</u> .
<i>Caryophyllus holoctis tomentosus angustifolius</i> , <u>104.2</u> . X. & <u>105.1</u> .		<i>Crista Galli umbellata</i>	<u>81.2</u> . L.
<i>Caryophyllus arvensis</i> glaber minimus <u>105.1</u> . quomodo variat <u>105.2</u> . ubi provenire <u>consequenter</u>	ibid.	<i>Crista Galli angustifolia</i> montana	<u>163.1</u> . 11.
<i>Caryophyllus saxatilis ericaefolius</i> , umbellatus corymbus, <u>105.2</u> . XII. ubi nascitur	ibid.	<i>Cochlearia minor</i> erecta	<u>134.1</u> .
<i>Caryophyllus saxatilis ericaefolius</i> ramosus repens, <u>ibid. XIII</u> . ex Hispania qualis ad nos adferatur	ibid.	<i>Cochlearia Danica</i> repens	<u>ib. 11.</u>
<i>Caryophyllus saxatilis filiquosus</i> , <u>105.2</u> . & <u>14</u> . in <i>Marcynie</i> promontoris frequens, <u>ibid.</u> alius <i>Gypsophyllum filiquosum</i>	ibid.	<i>Convolvulus purpureus</i> folio rotundo, <u>134.1</u> . L. quando floreat	ibid.
<i>Caucalis nodosa echinatus</i> semine, <u>16.1</u> . L. alias <i>caucalis</i> semine ad caulium nodos echinatus	<u>ibid. 2</u> .	<i>Convolvulus peregrinus</i> <u>caruleus</u> folio oblongo, <u>ibid. 11</u> . a liis <i>Campanula carulea</i>	ibid.
<i>Caucalis semine albero</i> foliis subrotundis <u>16.1</u> . & <u>2.11.</u>		<i>Convolvulus</i> folij laciniati. vel quinq. folius <u>134.1</u> . 111.	
<i>Caucalis tenuifolia</i> montana	<u>ib. 2.11.</u>	<i>Colutea Scorpioides</i> maritima glauco folio, <u>157.1</u> . ubi nascatur	ibid.
<i>Centaurium minus</i> spicatum album, <u>130.1</u> . & <u>2</u> . ubinam reperitur	ibid.	<i>Consolida media alpina</i>	<u>120.</u>
<i>Centaurium majus</i>	<u>16.2</u>	<i>Consolida regalis</i> <u>latifolia</u> parvo flore	<u>74.1</u> .
<i>Centaurium alpinum</i> luteum	ibid.	<i>Consolida regalis</i> peregrina parvo flore	ib.
<i>Cichorium spinosum</i> Creticum	<u>62.1</u> .	<i>Conyza carulea alpina</i> major, <u>134.1</u> . L. ubi proveniat	ibid.
<i>Chamaedrys spinosa</i>	<u>117.1</u> .	<i>Conyza</i> , <u>ibid.</u>	
<i>Chamaedrys Austriaca</i> folij tenuissime laciniati <u>117.2</u> . 11.		<i>Conyza carulea alpina</i> minor, <u>ib. 11</u> . ubi reperitur	ib.
<i>Chamaedrys Hispanica</i> folij tenuissime divisi <u>117.2</u> . 111.		<i>Conyza aquatica</i> <i>Asteris</i> flore aureo, <u>ibid. 111</u> . ubi legitur	<u>124.2</u> .
<i>Chamaedrys alpina</i> minima bifurca, <u>ibid. IV</u> . ubi reperitur	ibid.	<i>Corallina alba</i> <u>nodosa</u> , <u>113.2</u> . 1. unde ad nos adferatur	ib.
		<i>Corallina cinerea</i> rugosa, <u>113.2</u> . 11. quotuplex sit	ib.
		<i>Corallina pallide</i> flavescenti lavu	<u>113.2</u> . 111.
		<i>Coronopus maritimus</i> minimus	<u>61.2</u> .
		<i>Corydalis minor</i> folij subrotundis serratis	<u>141.1</u> .
		<i>Cynocrambe</i> <i>Dioscoridis</i>	<u>59.2</u> .
		<i>Cynoglossum</i> semper vivens	<u>119.</u>
		<i>Cynosictis</i> <u>augustifolia</u> <i>bianthe</i> cucullo	<u>25.2</u> . L.



**D**aucus montanum apud solia flore luteo, 77.1. ubi nunc al-  
ter similis ibid.  
Daucus pratensis apud solio 2.11. 77.2.11.  
Daucus Alsaticus ibid. 111.  
Daucus pratensis tenuifolius 25.1. 75.1. & 2.11.  
Dent. Leonii latifolius caulescenti 62.2.1. 62.2.1.  
Dent. Leonii tenuifolius solio ibid. 11.  
Dent. Leonii minor solis radiatus ibid. 111.  
Dent. Leonii minor aspero solio 63.1.1V. 63.1.1V.  
Digitaria angustifolia luteo parvo flore 115.2. ubi proveni-  
at ibid.  
Doronicum Helveticum incanum, 97.1.1. ubi locorum cre-  
scat ibid.  
Doronicum Helveticum humile, crassum foliis, ib. 11. quo  
mense & loco florescunt ib.  
Draba tenuifolia velut spicata 33.1.1. 33.1.1.  
Draba flore carneo galeato 33.1.1. 33.1.1.  
Dracunculus alpinus solis scabiosa 39.1. 39.1.

## E.

**E**cbium Hispanicum flore calcarati donato, 119.1.1. ubi  
nascatur ibid.  
Ecbinium Scorpoides minimus flosculis luteis 119.2.11. 119.2.11.  
Elleborus niger Sannicula folio minor, 97.1. verum nigrum  
Dodonaei sive Astrantiam nigram Lobely per  
omnia refert. sola autem magnitudine differt, ibid. ubi  
nam locorum reperitur 97.2.  
Equisetum palustre lunaria scoparia folio 24.2.1. 24.2.1.  
Equisetum palustre minus polysacchion ib. 11.  
Equisetum palustre tenuissimum & longissimum seriu, ib. 111.  
Equisetum nudum minus variegatum Basileense, ibid. 1V  
& 25.1.  
Equisetum setidum sub aqua repens 25.1.V. 25.1.V.  
Eruca latifolia, 39.2.1. an Eruca tertia Anglica ib.  
Eruca sylvestris minor Bursa pastorum folio 39.2.11. 39.2.11.  
Eruca sylvestris minor incana 40.2.11. 40.2.11.  
Eruca lutea sive Barbarea flore pleno ib. 1V.  
Eruca acerulea in arenosis crescens, 40.1.V. provenit loco  
arenosis ibid.  
Eruca maritima Cretica filiqua articulata 42.2.VI. 42.2.VI.  
Eruca maritima Italica filiqua hastata cuspidi simili ibid.  
Eruca Monspeliaca filiqua quadrangula echinata, 41.1.  
VII.  
Erysimum simile bifidum alba 42.2. 42.2.  
Erysimum certum 43.1. 43.1.  
Euphrasia lutea radice squamata, 111.2.1. ubi nascatur,  
ibid.  
Euphrasia purpurea minor, 111.2.11. ubi proveniat ibid.

## F.

**F**aba arborescens 147.1. 147.1.  
Faba arvensis differentia quot ibid.  
Faba arborescens Anglica species quot ibid.  
Festuca graminea glutinum vacuu 19.1. 19.1. LXIV.  
Festuca graminea effusa juba 19.2. 19.2. LXV.  
Festuca juncea folio ibid. LXVI.  
Festuca juncea folio. spica gemina ib. LXVII.  
Festuca pratensis lanuginosa ibid. LXVIII.  
Festuca dumetorum 19.2. 19.2. LXIX.  
Festuca dumetorum angustissima & pilosius folium, ib. LXX.  
Filipendula minor 85.2. 85.2.  
Filix palustris maxima 130.2.1. 130.2.1.  
Filix mas aculeata maior, 151.1.11. ubi legatur ibid.  
Filix mas aculeata minor, 151.2.111. ubi proveniat ib.  
Filum maritimum Germanicum, 155.1.VIII. ubi reperitur  
ibid.  
Fragaria affinis Sericea incana, 159.2. alia Leuca adven-  
siorum ab & quibus locum provenire solet ibid.  
Frangula altera polyarctos, 160.1. quo anni tempore flo-  
reat, & quo loco 160.2. 160.2.  
Fucus maritimus 154.1. 154.1.  
Fucus alatus sive phaeogonides ib. 1.  
Fucus arboreus polyschides 154.2.1. 154.2.1.  
Fucus longissimus, latissimus crassus, folio, ib. 111. ubi repe-  
riatur, ibid.  
Fucus longissimus, latissimus tenuis, folio, ibid. 1V. ubi com-  
gatur 154.2. 154.2.  
Fucus longo, angustio & crasso folio 155.1.V. 155.1.V.  
Fucus membranaceus ceratoides ib. 1.  
Fucus maritimus Galloparonis pennas referens, 155.1. 1. 1.

## G.

**G**allium latifolium glabrum 146.1.VIII. ubi reperitur  
ibid.  
Gentia Hispanica affinis 157.2. quo loco proveniat ibid.  
Gentiana Monspeliaca spinosa, ib. alias Cornuta lutea ib.  
Gentiana minor aspalatoides 157.2. 157.2.  
Gentiana alpina latifolia magno flore, 97.2.1. quo loco  
proveniat ibid.  
Gentiana omnium minima, ibid. 11. in sinu alpium  
Helveticarum jugis reperitur ibid.  
Geranium malacoides 138.1.1. 138.1.1. quib. locis reperitur ib.  
Geranium columbinum tenuius latiusculum, ib. 11. ubi pro-  
veniat ibid.  
Geranium cicutae folio ac longissimum 138.1.111. ubi lega-  
tur 138.2. 138.2.  
Gladialis angustio gramineo folio, 20.1. quo loco proveniat  
ibid.

<i>Glauca leguminosa affinis</i> <u>1.2.1.</u>	<i>Gramen spicatum folijs &amp; spiciu hirfutis mollib.</i> <u>9.2. XXVI.</u>
<i>Gnaphalium roseum, 12.2.1.</i> quibus locis provenire solet <u>ibid.</u>	<i>Gramen typhoides maximum spica longissima, 10.2. XXV.</i>
<i>Gnaphalium roseum hortenfo</i> <u>12.2.2.</u>	<i>Gramen Pbalaroides minus, sive Hispanicum, 10.1. &amp; 2. XXVI.</i> Pbalardi quomodo simile & dissimile, <u>ibid.</u>
<i>Gramen caninum vineale, 1.1.1.</i> ejus descriptio, <u>ib.</u> ubinam reperitur <u>ib.2.1.</u>	<i>Gillenius quo nomine transmissit</i> <u>ibid.</u>
<i>Gramen caninum supinum paniculatum dulce, 1.2.1.</i> quibusnam locis gaudeat <u>ibid.</u>	<i>Gramen Pbalaroides spica mollis, sive Germanicum, 10.2. XXVII.</i> Ulmenfes quo nomine id indigirent, <u>ibid.</u> ubi provenire solet <u>ibid.</u>
<i>Gramen caninum maritimum asperum, 2.1.111.</i> in quibus locis reperitur, <u>ib.</u> a Lobelio quomodo vocetur. <u>ibid.</u>	<i>Gramen alopecuroides spica aspera, quo nomine apud Lugdunensem describat</i> <u>10.2. XXVII.</u>
<i>Gramen caninum maritimum spicatum, 2.2.11.</i> ubi proveniat <u>ibid.</u>	<i>Gramen tomentosum alpinum &amp; minus</i> <u>10.2. XXVIII.</u>
<i>Gramen murorum 2.2.11.</i> ubi provenire solet <u>ibid.</u>	<i>Gramen sparteum Basiliense, sive capillaceo folio majus</i> <u>11.2. XXX.</u>
<i>Gramen nodosum spica parva</i> <u>2.2.11.</u>	<i>Gramen sparteum Hollandicum, sive capillaceo folio minus</i> <u>11.2. XXX.</u>
<i>Gramen nodosum avenacea panicula</i> <u>2.2.11.</u>	<i>Gramen sparteum Monspeliacum capillaceo folio minimum</i> <u>11.2. XXXI.</u>
<i>Gramen bulbosum aquaticum, 2.2.11.</i> ubi reperitur <u>ib.</u>	<i>Gramen sparteum setis equina referens</i> <u>11.2. XXXII.</u>
<i>Gramen bulbosum ex Alepo</i> <u>2.2.111.</u>	<i>Gramen sparteum variegatum</i> <u>11.2. XXXIII.</u>
<i>Gramen tremulum minus panicula parva</i> <u>2.2.11.</u>	<i>Gramen foliolu juncu brevibus majus, radice nigra</i> <u>11.2. XXXIV.</u>
<i>Gramen tremulum maximum, 2.2.11.</i> quibus locis crescat <u>ibid.</u>	<i>Gramen palustre juncu racemoso semine</i> <u>11.2. XXXV.</u>
<i>Gramen pratense paniculatum molle</i> <u>11.2.11.</u>	<i>Gramen juncu folio articulo aquaticum</i> <u>11.2. XXXV.</u>
<i>Gramen pratense paniculatum minus angustiore folio, 11.2.11.</i> quomodo ab alio simili differat & conveniat <u>11.2.11.</u> quibus locis reperitur <u>ibid.</u>	<i>Gramen montanum juncu capite squamoso</i> <u>11.2. XXXVI.</u>
<i>Gramen panicula multiplex 6.2.11.</i> ubi proveniat <u>ib.</u>	<i>Gram. juncu minus capitulo squamoso</i> <u>11.2. XXXVII.</u>
<i>Gramen arvense panicula crispa 6.2.11.</i> a Matthiolo 10.2.11.	<i>Gramen juncu minimum alterum, 11.2. XXXVIII.</i> a priore quomodo differat <u>ibid.</u>
<i>Gramen montanum panicula spadicæa delicatior, 6.2. XII.</i> quomodo differat <u>ibid.</u>	<i>Gramen juncu minimum maritimum, 11.2. XXXIX.</i>
<i>Gramen paniculatum odoratum 7.2.111.</i> Borussis usitatum, & quorsum eorum utantur <u>ibid.</u>	<i>Gramen Cyperoides latifolium spica spadicæa viridi majus</i> <u>11.2. XL.</u>
<i>Gramen sylvaticum paniculatum altissimum, 7.2.111.</i> quid ex borussici conficiant <u>ibid.</u>	<i>Gramen Cyperoides angustifolium spica spadicæa viridis minus</i> <u>11.2. XL.</u>
<i>Gramen palustre panicula speciosa</i> <u>7.2.111.</u>	<i>Gramen Cyperoides spica pendula longiore &amp; angustiore</i> <u>11.2. XLII.</u>
<i>Gramen palustre paniculatum minus</i> <u>7.2.111.</u>	<i>Gramen Cyperoides spici minoribus minus compactis</i> <u>11.2. XLII.</u>
<i>Gramen maritimum siliari cornutum</i> <u>7.2.111.</u>	<i>Gramen juncu quoniam ejus sint differentia</i> <u>11.2. XLIII.</u>
<i>Gramen spica cristata levi, vel gramen cristatum, 8.2. XI.111.</i>	<i>Gramen arundinaceum plumosum album</i> <u>11.2. XLIV.</u>
<i>Gramen spica cristata subhirsutum</i> <u>8.2. XIX.</u>	<i>Gramen nemorosum pauculis albis capillaceo folio, 11.2. XLV.</i>
<i>Gramen spicatum angustifolium montanum, 8.2. XX.</i> a gramine Caryophyllato pratenfi quomodo differat <u>ib.</u>	<i>Gramen bolognense alpinum minimum</i> <u>11.2. XLVI.</u>
<i>Gramen sylvaticum angustifolium spica alba, 8.2. XXI.</i> ubi reperitur <u>ibid.</u>	<i>Graminis hirsuti differentia quoniam denatur, 11.2. XLVI.</i>
<i>Gramen spicatum folio aspero 9.2. XXI.</i> quo nomine a Dalech. ampio proponatur, <u>ib.</u> ubi proveniat <u>ibid.</u>	<i>Gramen hirsutum latifolium minus juncæa panicula, ib.</i>
<i>Gramen Caryophyllatum nemorosum spica multiplex 9.2. XXII.</i>	<i>Gramen hirsutum capitulis psyllis</i> <u>11.2. XLVI.</u>
<i>Gramen Caryophyllatum montanum spica varia, 9.2. XXIII.</i> ubi reperitur <u>ibid.</u>	<i>Gramen hirsutum angustifolium majus</i> <u>11.2. XLVII.</u>
	<i>Gramen spica subrotunda echinata, vel gramen echinatum capitulo</i> <u>11.2. XLVIII.</u>
	<i>Gramen spica plana echinata</i> <u>11.2. XLIX.</u>
	<i>Gramen montanum panicula miliacea</i> <u>11.2. L.</u>
	<i>Gramen arundinaceum panicula miliacea</i> <u>11.2. LI.</u>

Gramen arundinaceum Sorghi panicula <u>sparsa</u>	17.2.III.	Hieracium intubaceum flore luteo, ib. X. alias Hieracium	
Gramen latifolium spica triticea <u>compressa</u>	18.1.IIII.	Appacoides	ibid.
Gramen latifolium spica triticea <u>diffusa</u>	18.1.IV. apriore	Hieracium intubaceum flore magno albo	ib. XI.
quomodo differat	ib.	Hieracium prolesum falcatum	ib. XII.
Gramen angustifolium spica triticea <u>compressa</u>	18.1.LV.	Hieracium minimum falcatum	65.1.XIII.
Gramen angustifolium, spica tritici mutica <u>simili</u>	18.2.LVI.	Hieracium montanum rapisolum	ib. XIV.
Gramen spica <u>secunda</u>	18.2.LVII.	Hieracium montanum folijs dentatis flore magno, ibi-	
ibid.		dem XV.	
Gramen spica briza <u>major</u>	19.1.LVIII.	Hieracium ramosum magno flore	63.2.XVI.
ibid.		Hieracium alpinum non laciniatum flore fusco, ib. XVII.	
Gramen spica briza minus, ibid.	19.1.LIX.	Hieracium borreuse non laciniatum floribus atropurpu-	
ubi locorum prove-		rascentibus	ib. XVIII.
niat		Hieracium latifolium, 25.1.IV. ubi nam locorum proveniat, ib.	
Gramen loliaceum latifolium spica angustiore, ib. LX. cui-		Hieracium borreusum <u>Creticum</u> , 76.1. ubi nam locorum repe-	
fit simile	ibid.	riatur	ibid.
Gramen loliaceum minus, spica simplici	ib. LXI.	Hieracium sive Leontopodium <u>Creticum</u>	98.2. ubi nam
Gramen loliaceum minus supinum, spica multiplici, ibi-		proveniat	ibid.
dem LXII.		Hieracium Syriacum, 114.1.I. alias Aman vocatur	114.2.
Gramen maritimum panicula loliacea	ib. LXIII.	Hieracium angustifolium laciniatum 114.2.II. ubi prove-	
Gramen montanum avenaceum locustis rubris, 20.1.		niat	ibid.
LXXI.		Hieracium minus album Betonica <u>facie</u> , 114.2.III. ubi	
Gramen avenaceum lanuginosum glutum rarioribus 20.		nascatur	ibid.
2. LXXII.		Hyacinthus minimus maritimus 6.1. & 2. ubi nam repe-	
Gramen glutum varijs	21.1. LXXIII.	riatur	ibid.
Grass Polcy	108.2.	Hyoscyamus <u>Creticus luteus major</u> , 92.1. quibus locis pro-	
		veniat	ibid.
H.		Hieracium numularie folio	13.2.
Alinum minor	59.1.	Hyssopus <u>latifolius</u> 107.2. ejus species	ibid.
Asafetida	4.2. IX.	Hyssopifolia sive <u>Gratiola minor</u> , 108.1. folijs varijs	ibid.
Helichryson Orientale	123.1.	itemq. floribus, ib. ubi nascitur	108.2.
Helichryson sylvestris flore oblongo <u>simili</u>	123.2.	Hyssopoides, ib. alias Alinum aquaticum	ibid.
ubi nascitur	ibid.		
Hesperis sylvestris flore <u>parvo</u>	103.1.1. ubi nam colligatur		
ibid.			
Hesperis sylvestris Hieracii folijs <u>hirsuta</u>	103.1.II. ubi prae-		
veniat	ibid.		
Hieracium dentis leonis folio hirsute asperum <u>minus</u>	63.1. & 2.1.		
Hieracium minus glabrum	63.2.II.		
Hieracium dentis leonis folio obruto <u>minus</u>	ib. III.		
Hieracium dentis leonis folio floribus parvis	ib. IV.		
Hieracium dentis leonis folio bulbosum	63.2.V. & 64.1.		
Hieracium tomentosum Hispanicum	64.1.VI.		
Hieracium maximum asperum Chondrilla folio	64.1.		
& 2. VII.			
Hieracium alpinum angustissimum oblongo, folio, ibi-			
dem VIII.			
Hieracium alpinum pumilum Chondrilla folio, ibi-			
dem IX.			

I,

Jacea nigra angustifolia vel Lithospermum arvense folijs	127.1.1. ubi observata, ib. altera huius similis	ib.
Jacea integrifolia <u>humilis</u>	127.2.1. ubi proveniat, ib. alias	ibid.
Jacea austriaca repens	ibid.	
Jacea capite longius aculeis <u>spinosa</u>	127.2.III.	128.1.III.
Jacea montana echinata <u>capite</u> et diversa	128.1.III.	
Jacea laciniata Sombi folio, sive Jacea latifolia purpu-		
rea capitulo <u>spinosa</u>	128.1.IV. alias centaurium mari-	ibid.
num		
Jacea montana incana aspera capitulis <u>spinosis</u>	128.1.V.	
Jacea montana candidissima Stabefolij	128.2.1.	
Jacea montana incana laciniata capitulo bispido	ib. VI.	
Jacea tomentosa capitulo <u>spinosa</u>	129.1.VIII. ubi colligitur	ibid.
Jacea Babylonica	ib. IX.	
Jacobaea maritima sive Cineraria latifolia	69.1.I.	
Jacea		

Jacobaea rotundifolia incana, <u>69.2.11.</u> ubi reperitur	Leucocium maritimum minimum, <u>102.1.17.</u> ubi locorum reperitur
ibid.	ibid.
<u>Jacobaea alpina folijs</u> rotundis serratis, <u>70.1.6.2.</u> ubi proveniat	Leucocarcissus. Vide Pseudonarcissus
Funci differentia quotnam <u>21.2.</u>	Libanotis latifolia, aquilegia folio, <u>83.2.1.</u> aroma & aristolochiam sapore redolet, ib. alias <u>nomine Seseli</u> Aethiopi-
Funcus acutus maritimus caule triangulo, <u>22.2.1.</u> ubi reperitur	ci folio aquilegia appellatur <u>84.1.1.</u>
Funcus exiguus montanus mucrone carens, ibid. <u>11.</u> ubi proveniat	Libanotis latifolia minor semine crispo, ibid. <u>11.</u> alias Costum amarum semine crispo
Funcus inutilis, sive Chamaecephalus, <u>22.2.11.</u> ubi crescat	ibid.
ibid.	Ligustrum sive Siler montanum angustifolium <u>85.2.</u>
Funcus acuminereflexo alter <u>ib. 11.</u>	Ligustrum myrtifolium <u>118.2.1.</u>
Funcus acumine reflexo trifidus, ibidem V. ubi reperitur	Ligustrum folijs laciniatis <u>ibid. 11.</u>
ibid.	Lilium convallium latifolium <u>116.2.11.</u>
Funcellus capituli equiseti <u>fluitans, 23.1.17.</u> ubi proveniat	Limonium maritimum minus folioli <u>cordatis, 99.2.1.</u> quibus loci reperitur
ibid.	ibid.
Funcus alpinus capitulo lanuginoso, <u>23.2.11.</u> quo loco reperitur	Limonium maritimum minimum, ib. <u>11.</u> ubi nam loci proveniat
ibid.	ibid.
Funcus alpinus bombycinus, ibidem VIII. ubi loci proveniat	Linaria Americana parvo flore <u>106.2.11.</u>
ibid.	Linaria latifolia <u>tryphylla</u> , ib. III. alias Linaria latifolia
Funcus floridus minor <u>ib. 1X.</u>	Valentina <u>ibid.</u>
K.	Linaria capillaceo folio creta flore odore, <u>106.2.11.</u> quibus
Kali minus villosum, <u>133.1.1.</u> cum figura kali albi Dodonaei quomodo conveniat, ibid. ubi reperitur ib.	<u>loci proveniat, ib.</u> eadem quotuplex <u>ib.</u>
alias kali hirsutum folijs Spergula <u>ibid.</u>	Linaria arvensis cerulea creta, <u>107.1.1.</u> V. duplici flore conspicua alio in agrio Lusatie, alio ad montem Cetium, <u>ib.</u>
Kali folio gramineo. <u>133.1.11.</u> ubi nascitur, <u>133.2.</u> ad An-	Lupinus ceruleus major villosus <u>123.1.</u>
thyliordem Tbaty accedere videtur <u>ibid.</u>	Lupinus minimus <u>124.2.</u>
L.	Lychnis auricula urfi facie, <u>107.2.1.</u> quibus <u>alii</u> nominibus vocetur <u>ibid.</u>
Laduca folio oblongo acuto, <u>60.1.1.</u> cui sit simili	Lychnis sylvestris minima <u>exiguus flore, ib. 11.</u> ubi reperitur
ibid.	ibid.
Laduca Italica laciniata <u>ib. 11.</u>	Lysimachia hirsuta filiquosa parvo flore <u>116.1.11.</u>
Laurum peregrinum Scutellaria dictum, <u>110.2.</u> ubi nam copiose proveniat <u>111.1.</u>	Lysimachia minor <u>ibid.</u>
Lapathum maritimum satidum <u>56.1.</u>	Lysimachia Chamaenction dicta alpina, <u>116.1.11.</u> ubi proveniat <u>ibid.</u>
Lappa <u>70.1.102.2.2.</u> vulgaris quomodo differat, ibid. apud	M.
Lipsienfes frequenter reperitur <u>ib.</u>	Malva folio ficus <u>137.1.1.</u>
Lathyrus angustissimo folio <u>148.2.</u>	Malva folio vario <u>ibid. 11.</u>
Lenticula palustris latifolia punctata <u>153.</u>	Malva Americana <u>137.1.11.</u>
Leucocium luteum magno flore, <u>102.1.1.</u> vulgari, Keiri dicto, quomodo differat, ibidem, quo tempore anni floreat, ibidem.	Marrubium palustre hirsutum tenuium laciniatum, <u>110.2.1.</u> quo solo gaudeat <u>ibid.</u>
Leucocium luteum serrato folio <u>ib. 11.</u>	Marrubium album villosum, <u>110.2.11.</u> ubi reperitur <u>ib.</u>
Leucocium luteum sylvestre hieracifolium, ib. III. ubi reperitur <u>ibid.</u>	Marrubium album crispum <u>ib. 111.</u>
Leucocium album odoratissimum folio viridi, <u>102.1.18.</u> hoc per aliquot annos durat, si in cella asservetur <u>ibid.</u>	Melampyrum luteum linaria folio, <u>12.1.</u> quo mense & loco floreat <u>112.2.</u>
Leucocium minimum Creticum <u>ib. V.</u>	Melegueta sive grana Paradisi <u>113.1.</u>
	Melilotus Hispanica folijs maculatis <u>124.</u>
	Mentha rotundifolia minor, seu <u>flore globosa, 109.2.1.</u> quibus loci gaudeat <u>ibid.</u>
	Mentha radice geniculata, <u>109.2.11.</u> alias Mentha tuberosa,

<i>rosa, &amp; Nepetha angustifolia odorata</i>	<i>ibid.</i>	<i>Nasturtium hortense crispum angustifolium</i>	43.2.	
<i>Mentha Caltaria minor</i>	<i>ibid.</i>	<i>Nasturtium hortense crispum latifolium</i>	44.1.	
<i>Mentha Caltaria minor alpina, 110.1.17. ubi proveniat</i>	<i>ibid.</i>	<i>Nasturtium hortense crispum</i>	44.2.1.	
<i>ibid.</i>		<i>Nasturtium pratense parvo flore</i>	<i>ibid.</i> 11.	
<i>Millefolium maximum umbella alba</i>	72.1.1.	<i>Nasturtium aquaticum majus &amp; anatum</i>	45.1.11. in- terdum Sisymbrium vocatur, & sepe inter Nasturti- um aquaticum supinum reperitur	<i>ibid.</i>
<i>Millefolium purpureum majus</i>	<i>ibid.</i> 11.	<i>Nasturtium sylvestre minus</i>	45.1.111.	
<i>Millefolium incanum Creticum, sive Millefolium Diofco-</i>	<i>ibid.</i>	<i>Nasturtium alpinum minus Reseda solis</i>	45.2.11.	
<i>ridi, 72.2.111. in Creta quomodo vocetur</i>	<i>ibid.</i>	<i>Nasturtium alpinum capfula Nasturtii hortensis, ibid.</i>	45.2.11.	
<i>Millefolium aquaticum pennarum spicatum</i>	73.1.1V.	<i>Nasturtium alpinum Bellidii folio majus</i>	46.1.1V.	
<i>Millefolium aquaticum cornutum</i>	73.2.V.	<i>Nasturtium alpinum Bellidii folio majus</i>	<i>ibid.</i> 11.	
<i>Moly Africanum umbella purpurea, 28.1.1. quem ha-</i>		<i>Nigella latifolia flore majore simplici carulea</i>	75.1.1.	
<i>beat odorem</i>	<i>ibid.</i>	<i>Nigella Cretica</i>	75.2.11.	
<i>Moly moschatum capillaceo folio</i>	28.2.11.	<i>Nigella flore purpurea, 136.1. ubinam prove-</i>	<i>niat</i> 136.2.	
<i>Muscum pennatum, 151.1.1. quibus locis reperitur, ibid. ejus</i>	<i>ibid.</i>			
<i>altera species</i>				
<i>Muscum silicinus minor</i>	151.1.11.			
<i>Muscum abietis facie</i>	151.2.111.			
<i>Muscum ramosum repens ibid. 17. huic similis alter</i>	<i>ib.</i>			
<i>Muscum ramosum erectum majus, ibid. V. ubinam reperitur</i>	<i>ibid.</i>			
<i>ibid.</i>				
<i>Muscum ramosum erectum minor</i>	<i>ib.</i> 171.			
<i>Muscum saxatile ericoides</i>	<i>ib.</i> 171.			
<i>Muscum stellare roseum, ibid. 171. ubinam proveniat</i>	<i>ibid.</i>			
<i>Muscum Cupressi formis.</i>	152.1.1X.			
<i>Muscum polytrichoides, ibid. X. quotuplex sit, ibid. ubi re-</i>				
<i>peritur</i>	<i>ibid.</i>			
<i>Muscum terrestre Coralloides, 152.1.1. ubi nasci-</i>	<i>ibid.</i>			
<i>tur</i>				
<i>Muscum terrestre, coralloides, erectum, cornibus rufescentibus</i>	<i>ibid.</i> XII.			
<i>Muscum Ceratoides, 152.1.1. quotuplex sit</i>	<i>ibid.</i>			
<i>Muscum aquaticum folio expanso, 152.2. XIV. ubi reperitur</i>	<i>ibid.</i>			
<i>ibid.</i>				
<i>Muscum fontanum sive Hepatica aquatica</i>	<i>ib.</i> XV.			
<i>Muscum fontanum capituli racemosis</i>	152.2.			
<i>Muscum pyxoides quotuplex</i>	<i>ib.</i> XV.			
<i>ibid.</i>				
<i>Myagrum frigidum, 51.2.1. cur sic dictum</i>				
<i>Myagrum monospermon latifolium, 52.1.1. Psen-</i>				
<i>dosadu ab Alpino vocatum</i>	52.1.11.			
<i>Myagrum monospermon minus</i>	52.1.111.			
<i>Myagrum similis filiqua rotunda</i>	52.1.1V.			

N.

<i>Napaeae</i>	54.1.1.
<i>Napus sylvestris Cretica</i>	38.1.
<i>Narcissus angustifolius albus minor</i>	47.1.1.
<i>Nardo Celtica similis inodora</i>	88.2.
<i>Nasturtium hortense quotuplex</i>	44.1. & 2.
<i>Nasturtium hortense latifolium</i>	45.1.

O.

<i>Cinsium latifolium maculatum</i>	109.2.
<i>Onobrychis clypeata aspera minor, 149.2.1. ubi</i>	<i>colligatur</i> <i>ibid.</i>
<i>Onobrychis clypeata levis, ibid. 11. ubinam proveniat</i>	<i>ib.</i>
<i>Onobrychis montana, 149.2.111. ubi locum reperitur, ib.</i>	
<i>altera huic similis</i>	<i>ibid.</i>
<i>Ophioglossum anguloso folio</i>	150.1.1.
<i>Ophioglossum minus, ib. 11. quibus locis proveniat</i>	<i>ibid.</i>
<i>Ophrys minima, Ophrydium seu Bisolium Broccenbergi-</i>	<i>cni minus</i> 31.2.
<i>Orchus Vide Cynosorchis</i>	
<i>Orchus montana Italica flore ferrugineo lingua oblonga</i>	29.1.V.
<i>Orchus macrophylla</i>	29.2.V.
<i>Orchus palmata angustifolia minor flore odoratissimo, 3</i>	<i>1.111.</i>
<i>Orchus palmata pratensis angustifolia major</i>	16.1.V.
<i>Orchus palmata flore viridi</i>	30.2.1V.11.
<i>Orchus palmata montana maxima</i>	31.1.X.
<i>Origanum sylvestre humile, 109.1. ubi copiose reperitur,</i>	<i>ibid.</i> 109.2.
<i>Orobanche flore majore ex caruleo purpurea, 31.2.1.</i>	
<i>Orobanche vulgaris Theophr. Limodorum, &amp; quare ita</i>	<i>dicta</i> <i>ibid.</i> 11.
<i>Orobanche Hypopitys, ibid. 111. quomodo a vulgari differat</i>	<i>ibid.</i>
<i>Orchus alpinus latifolius, 149.2. ubi proveniat</i>	<i>ibid.</i>

P.

<i>Paeonia flore pallido folio bifido</i>	159.
<i>Papaver erraticum Pteniacum succiflore</i>	92.3.1.

N.

<i>Napoca</i>	54.1.1.
<i>Napus sylvestris Cretica</i>	38.1.
<i>Narcissus angustifolius albus minor</i>	47.1.1.
<i>Nardo Celtica similis modora</i>	55.2.
<i>Nasturtium hortense quotuplex</i>	44.1. & 2.
<i>Nasturtium hortense latifolium</i>	43.1.

O.

<i>Ocinum latifolium maculatum</i>	109.2.
<i>Onobrychis clypeata aspera minor, 149.2.1. ubi</i>	<i>ibid.</i>
<i>colligatur</i>	
<i>Onobrychis clypeata levis, ibid. 11. ubinam proveniat</i>	<i>ib.</i>
<i>Onobrychis inana, 149.2.111. ubi locorum reperitur, ib.</i>	<i>ibid.</i>
<i>altera huic similis</i>	
<i>Ophioglossum anguloso folio</i>	150.1.1.
<i>Ophioglossum minus, ib. 11. quibus locis proveniat</i>	<i>ibid.</i>
<i>Ophru minima, Ophridium seu Bisolium Brocckenbergi-</i>	<i>um minus</i> 31.2.
<i>Orchus Vide Cynosorchus</i>	
<i>Orchus montana Italica flore ferruginea lingua oblonga</i>	29.1V.
<i>Orchus macrophylla</i>	29.2.V.
<i>Orchus palmata angustifolia minor flore odoratissimo, 3-</i>	<i>1.V11.</i>
<i>Orchus palmata pratensis angustifolia major</i>	<i>ib.</i> 171.
<i>Orchus palmata flore viridi</i>	30.2.171.
<i>Orchus palmata montana maxima</i>	31.1.1X.
<i>Origanum sylvestre humile, 109.1. ubi copiose reperitur,</i>	<i>109.2.</i>
<i>Orobanche flore majore ex caruleo purpureo, 31.2.1.</i>	
<i>Orobanche vulgaris Theophr. Limodorum, &amp; quare sic</i>	<i>dicta</i> <i>ibid.</i> 1.
<i>Orobanche Hypocytis, ibid. 111. quomodo à vulgaris differat</i>	<i>ibid.</i>
<i>Orchus alpinus latifolius, 149.2. ubi proveniat</i>	<i>ibid.</i>

P.

<i>Paeonia flore pallido folio bifurcato</i>	15.
<i>Papaver erraticum Pyrenaicum luteo flore</i>	92.2.111.
<i>Papaver</i>	

*Paspalum flusum*, 93. r. II. qualem odorem referat, ib. quo  
anni tempore floreat, ib. ejus semen ex Anglia primo,  
nominis Figo del inferno, id est, Ficini infernali, alla-  
tum, ib. an Glaucium sit Dioscoridū ib.  
Perfoliata alpina latifolia minor, 129. 2. I. ubi reperiat, ibid.  
Perfoliata alpina angustifolia major, sive folio anguloso,  
129. 2. II.  
Perfoliata alpina angustifolia media, ib. II. ubi nascatur  
ibid.  
Perfoliata alpina angustifolia minor, 129. 2. IV. ubi le-  
gatur ibid.  
Perfoliata alpina angustifolia minima, ib. V. inter Perfo-  
liatam & Bupleuron media, 129. 1. ubi reperiat, ib.  
Perfoliata minor rami inflexi 130. 1. V. I.  
Persicaria angustifolia 43. 2.  
Pimpinella saxifragia tenuifolia 84. 2. I.  
Pimpinella sanguisorba inodora, ibid. II. alias Pimpinella  
minor Hispanica  
Pisum umbellatum 147. 2.  
Plantago maxima tota glabra 97. 2. I. ubi locorum repe-  
riatur ibid.  
Plantago quinquenervia caulium summitate foliosa, ib.  
II. a vulgari quomodo differat, ibid. vulgari ubi repe-  
riatur 98. 1.  
Plantago triuervia angustifolia, 98. 1. III. hec ad vias  
maxime ad videra, reperitur ibid.  
Plantago angustifolia paniculis laevi, 98. 1. IV. ubi copio-  
se proveniat ibid.  
Polium latifolium incanum Creticum, 108. 2. alias Polium  
platyphyllum Cydoniense ibid.  
Polygonatum latifolium minus flore majore, 136. 2. I. ubi  
proveniat ibid.  
Polygonatum latifolium perfoliatum Brasilianum, ib. II.  
Polygonum saxatile 131. 1. I.  
Polygonum Cresicum thymi folio ib. II.  
Polygonum littoreum minus flosculi spadicis albican-  
tibus, 131. 1. III.  
Polygonum παλαιόν ibid.  
Polygonum minus lentifolium, 131. 1. II. ubi nam repe-  
riatur 131. 2. II.  
Potamogeton racemosum angustifolium, 101. 1. I. alias tri-  
bulum aquaticum minus ibid.  
Potamogeton gramineum ramulosum, ib. II. alias Fontila-  
pathum gramineum ibid.  
Potamogeton minimum capillaceo folio, ib. II. ubi prove-  
niat ibid.  
Potamogeton capillaceum, capitulum ad alii trifidū, ib. IV.  
Et 101. 1.

Pseudonarcissus gramineo folio, sive Lemnarcissus est-  
vus 27. 1. I.  
Psyllium Indicum folijs crenatis, 99. 1. I. quo tempore flo-  
reat ibid.  
Psyllium minus, ib. II. quo mense floreat, 99. 2. alias Gossyne  
rubrum & album ibid.  
Pulegium folijs nummularia 109. 1.  
Pulsatilla palustris 94. 1. I.  
Pulsatilla apj folio vernali flore majore, ib. II. & 94. 2. II.  
quo loco proveniat ibid.  
Pulsatilla apj folio vernali flore minore, 94. 2. III. & quo  
mense floreat ibid.  
Pulsatilla apj folio autumnali, ib. IV. qua loco, & mense  
floreat ibid.  
Pulsatilla folio anemones secunda, vel subrotundo, ibid. V.  
alias Pulsatilla latifolia ibid.  
Pyrola Alfine flore major & minor, Europaea & America-  
na, 102. 1. & 2. Europaea sub herba trientali Valer.  
Cordus posuit, ib. & alij qualiter & quibus locis, ib.  
Pyrola Alfine flore Brasiliano, 102. 2. ubi nam reperta, ib.  
& 101. 1.

Q.

Quercus maritima quoruplex 114. 1.  
Quinquefolium album minus, 139. 1. ubi colli-  
gatur, 139. 2. I.  
Quinquefolium album minus, 139. 2. II. ubi locorum repe-  
riatur ibid.  
Quinquefolium montanum luteum erectum birsutum,  
ibid. II.  
Quinquefolio simili encephalophyllo birsuta, ib. IV. ubi na-  
scatur ibid.

R.

Ranunculus montanum subbirsutum latifolium, 96. 1. V. I.  
quibus locis proveniat ibid.  
Ranunculus montanum lanuginosus folijs ranunculi pra-  
tensis repenti ib. VII. ubi nam reperiri solet, 96. 2. I. I.  
Ranunculus saxatilis magno flore, 96. 2. I. III. quibus locis  
crescat ibid.  
Ranunculus saxatilis folijs subrotundis ib. IX.  
Ranunculus minimus saxatilis b. r. minus, ib. X. ubi prove-  
niat ibid.  
Ranunculus villosissimus Monspelaci, ib. XI. quibus locis  
reperiat ibid.  
Ranunculus nemorosus Aemones flore minor, 95. 1. 3. d  
vulgato quomodo differat ibid.  
Ranunculus rotundifolius repens echinatus, ib. II. ubi pre-  
veniat ibid.

T.

RANUN-



- Ranunculus palustris *echinatus*, ibid. 111. quibus locis gaudet ibid.
- Ranunculus grunosa radice folio ranunculi bulbosi, 95.
2. IV.
- Ranunculus geranii tuberosi folio, ib. V. alias *Batrachium verum* ibid.
- Raphanus Creticus 38.2.
- Raphanus aquaticus folijs in profundas lacinas divisus 38.2.
- Raphanus aquaticus alter 38.2.
- Rapistrum floribus Leucis marini 37.1.1.
- Rapistrum monospermon ib. 11.
- Rapunculus spicatus spica alba vel cinerea 33.1.
- Rapunculus alpinus sive pyramidalis minor ib. 1.
- Rapunculus alpinus corniculatus 33.2.11.
- Reseda linaria folijs 42.1.
- Reseda minor alba, quam *Sesamoidem parviam* Salmanticensi Clusius vocat ibid.
- Reseda affinis Phyticuma ibid.
- Ribes montana oxyacantha sapore 160.2.
- Ribes quoduplex in Helvetiorum alpinis reperitur, ibid. ubi proveniat ibid.
- Rubia montana angustifolia, 145.1.1. ubinam proveniat ibid.
- Rubia pratensis lavis acuto folio, 145.1.11. ubi reperitur ibid.
- Rubia quadrifolia rotunda lavis, ib. 111. ubi crescat ib.
- Rubia angustifolia spicata, 155.1.1V. ubi nascatur ibid.
- Rubecula arvensis carulea repens 145.2.V.
- Rubecula saxatilis ib. V.1.
- Rubecula maritima aspera, 146.1.V.11. ubi legitur ib.
- Rubia cynanchica saxatilis, ib. V.111. ubi proveniat ib.
- S.
- Salix alpina Pyrenaea* 159.2.VI.
- Salix alpina angustifolia repens* ib. V.
- Salix fragilis* 159.1.1.
- Salix oblongo incano folio* ib. 11.
- Salix subrotundo argenteo folio* ib. 111.
- Salix humilis latifolia erecta* 159.2.1V.
- Salix saxatilis minima* ib. V.11.
- Salvia folio serrato* 113.2.1.
- Salvia folio subrotundo* ib. 11.
- Salvia lanuginosa angustifolia* 113.2.111.
- Sanicula viridis vel glabra*, 160. ubi colligatur ib.
- Sanicula montana minor*, 115.1.1. quomodo variet, & ubi Selesipratense tenuissimum, sive *Daucus pratensis* tenuis proveniat ibid.
- Sanicula alpina minima pilosa*, 115.2.1. ubi reperitur Selesipratense palustre latifolius ibid.
- Sideris folijs oblongis glabris* 111.1.1.
- Sideris*
- Sapomaria concava Anglica*, 103.1. quo anni tempore, & in qua regione floreat, 103.2. alias *Gentiana concava* ibid.
- Scabiosa peregrina rubra*, 125.2.1. alias *Scabiosa Indica* 2 Clusio dicta ibid.
- Scabiosa folio Sinapi sylvestris* ib. 11.
- Scabiosa prolifera folijs Gingidij* 126.1.111.
- Scabiosa prolifera quoduplex* ibid.
- Scabiosa prolifera folijs latioribus lacinis divisis*, 126.1.111.
- Scabiosa prolifera folijs tenuissimis incisissimis* ibid.
- Scabiosa montana dentis leonum folio*, 126.2.1V. ubi reperitur ibid.
- Scabiosa stellata minima* ibid. V.
- Scabiosa argentea angustifolia*, 127.1.1V. ubi proveniat ibid.
- Scandrix Cretica major* 78.1. & 79.1.1.
- Scandrix femine rositator Italica* 78.2.
- Scandrix Cretica minor*, 79.1.11. quam ejus varietas, 79.2.11.
- Scandrici quae herba maxime quadret* 80.2.1.
- Scrophularia flore luteo* 112.1.1.
- Scrophularia folijs laciniatis* 113.1.11.
- Secale latifolia* 26.2.
- Scorodolus Cretica* 113.2.
- Sedum tridactylites alpinum majus*, 131.2.1. alias *fasciata* alba perca. ib. simile, sed folijs latioribus, & inter duas primum profundas lacinas divisissimis, ib. aliud cauliculo rotundo, semipalmatis ibid.
- Sedum tridactylites alpinum minus*, 131.2.11. ubi reperitur ibid.
- Sedum montanum ericoides* 132.1.11.
- Sedum alpinum ericoides caeruleum*, 132.1.1V. ubi nascatur ibid.
- Sedum saxatile hirsutum purpureum*, ib. V. ubi proveniat ibid.
- Sedum saxatile arborulentum floribus*, ib. V.1. ubi non minus altius excrestat 132.2.V.1.
- Sedum saxatile variegato flore*, 132.2.V.11. ubi copiose proveniat ibid.
- Sedum alpinum foliolis crenatis asperis* 132.2.V.111.
- Sedum arvense flore rubente*, ib. 1X. ubi reperitur ib.
- Serpentaria triphylla Brasiliensis*, 101.2. ubinam reperitur ibid.
- Serpillum latifolium subhirsutum* 108.2.
- Seseli montanum Cicuta folio hirsutum* 81.1.1.
- Seseli pratense tenuissimum*, sive *Daucus pratensis* tenuissimum ibid.
- Seseli palustre latifolius* 85.2.11.
- Sideris folijs oblongis glabris* 111.1.1.
- Sideris*

Sideritū alpine trixaginis folio, <a href="#">112.2.11.</a> ubi reperiat	Tblaspi bifcutatum villosū flore calvari donato, <a href="#">49.2.</a>
ibid.	VIII.
Sinapi parvum siliqua aspera <a href="#">41.2.1.</a>	Tblaspi fruticosum <i>Leucoj</i> folio latifolium ib. IX.
Smyrniū peregrinum folio oblongo <a href="#">82.1.</a>	Tblaspi Alexandrinum <a href="#">10.1.X.</a>
Solanum tuberosum esculentum, 89.1.1. in Austriaca quale	Thymum inodorum <a href="#">158.2.</a>
<i>habetur, 90.1.1.</i> odorem qualem referat ibid.	Trachelium. Vide Campanula foliū subrotundū.
Solanum somnificum secundum, ib. an veteribus cognitum	Tragopogon folio sinuato <a href="#">129.1.1.</a>
<a href="#">90.2.</a> huius radicibus Indi panū loco utuntur ib.	Tragopogon tenuissime laciniatum ib. II.
Solanum racemosum cerasiforme <a href="#">90.2.11.</a>	Trifolium montanum purpureum folio acuto crenato,
Solanum triphyllum Brasilianum <a href="#">91.1.11.</a>	<a href="#">140.1.1.</a> quo anni tempore floreat, <i>ib. &amp;</i> ubinam repe-
Solanum Mexicosanum Jasminum Indicum dictum flore	riatur ibid.
minora <a href="#">91.2.1V.</a>	Trifolium montanum purpurascens folio obtuso crenato,
Sonchus asper laciniatum Creticum <a href="#">62.2.1.</a>	<i>ibid.</i> II.
Sonchus asper subrotundo folio, <i>ib. 11. quae ejus species</i> 61.1.11.	Trifolium montanum lupulinum, <a href="#">140.1.11.</a> ubi nascatur
Sonchus lavis in plurimas tenuissimas lacinias divisus,	ibid.
ibid. 111.	Trifolium capitulo spumoso lavi, <i>ib.</i> IV. quibus locū prove-
Sonchus angustifolium maritimum <a href="#">61.1.1V.</a>	niat ibid.
Sonchus montanum lavis laciniatum minor <i>ib.</i> V.	Trifolium capitulo spumoso aspero majus, <a href="#">140.1.V.</a> ubi re-
Sonchus villosus luteus minor, <i>ib.</i> VI. à quibusdam Hierac-	periat <a href="#">140.2.</a>
cium tomentosum dicitur <a href="#">61.2.VI.</a>	Trifolium capitulo spumoso aspero minus, <a href="#">140.2.VI.</a> ubi
Sparganium minimum <a href="#">2.6.2.</a>	proveniat ibid.
Spondylium birsutum folijs angustioribus, <a href="#">83.1.1.</a> a vul-	Trifolium capitulo Thymi <i>ib.</i> VII. ubi nascatur <i>ib.</i>
gari quomodo differat ibid.	Trifolium capitulo oblongo aspero <a href="#">140.2.VIII.</a>
Spondylium alpinum parvum <i>ib.</i> II.	Trifolium cochleatum folio minuto obtuso fructu latiore
Spondylium alpinum glabrum <a href="#">83.1. &amp; 2. III.</a>	<i>ib.</i> IX.
Stryax liquida <a href="#">158.2.</a>	Trifolium cochleatum polycarpon, <a href="#">141.1.X.</a> huic simile al-
Sumach angustifolium, <a href="#">158.1.</a> ubinam provenire solet	ternū, <i>ib.</i> quomodo ab invicem differat <i>ib.</i>
ibid.	Trifolium cochleatum echinatum minus <a href="#">141.1.XI.</a>
T.	Trifolium fructu duro, spinū <i>horrido</i> , <a href="#">141.2. XII.</a> ubi legatur
<b>T</b> Anacetum alpinum <a href="#">70.1.</a>	ibid.
Telebium purpureum minus, <a href="#">133.2. ubinam colliga-</a>	Trifolium folliculū corona similis, <i>ib.</i> XIII. ubi prove-
tur ibid	niat ibid.
Tenctrum alpinum inodorum magno flore, <a href="#">116.</a> ubi nascatur	Trifolium peltatum Creticum, <a href="#">142.1. XIV.</a> alias Trifolium
ibid.	Creticum odoratum ibid.
Thalictrum angustissimum folio <a href="#">146.2.1.</a>	Trifolium spinosum Creticum, <a href="#">142.2. XV.</a> alias Trifolium
Tbalictrum minimum <i>scissidissimum</i> , <a href="#">147.1. II.</a> ubi repe-	spinosum semper virens <a href="#">143.1.</a>
riatur, <i>ib.</i> huic simile ibid.	Trifolium stellatum, <a href="#">143.1. XVI.</a> quo anni tempore <i>&amp;</i> loco
Tblaspi vaccaria folio, Bursae pastoris siliquis <a href="#">47.1.1.</a>	colligatur ibid.
Tblaspi vaccaria incano folio minus <a href="#">47.2.11.</a>	Trifolium globoso flore, vel capitulo Lagopi rotundiore,
Tblaspi villosum capitulo birsuto <a href="#">47.1. &amp; 2. III.</a>	<a href="#">143.1. XVI.</a> quo mense <i>&amp;</i> quo loco proveniat <i>ib.</i>
Tblaspi Creticum flore albo <a href="#">48.1. IV.</a>	Trifolium globosum repens <a href="#">143.2. XVII.</a>
Tblaspi saxatile rotundifolium <i>ib.</i> V.	Trifolium saxatile birsutissimum, <i>ibid.</i> XIX. ubi legatur
Tblaspi alpinum folio parvo crenato, vel Tblaspi alpinum	ibidem.
minus capitulo rotundo <a href="#">48.2.1.1.</a>	Trifolium alpinum flore magno radice dulci, <a href="#">143.2. XX.</a>
Tblaspi alpinum majus capitulo rotundū <a href="#">49.1.</a>	quibus locū nascatur, <i>ib.</i> ejus radix quo sapore sit pra-
Tblaspi montanum incanum luteum <a href="#">49.2.</a>	dita <i>ib.</i> I.
Tblaspi alpinum repens, <a href="#">49.1.1.11.</a> quomodo variet ratione	Trifolium corniculatum minus pilosum, <a href="#">144.1. XXI.</a> ubi
loci ibid.	proveniat ibid.
	Trifol. corniculatum frutescens tenuissimū folijs, <i>ib.</i> XXII.
	Trifo-

# I N D E X.

Trifolium angustifolium repens folliculū <u>rotundū</u> , 144. 1. XXIII.	Valeriana alpina scrophularia <u>folia</u> , 87.1. IV. in quo cum
Trifolium alpina folio <u>oblongo</u> , 101.2. ubi locorum proveniat	Valeriana sylvestri conveniat <u>ibid.</u>
Tithymallus incanus hirsutus <u>ibid.</u> 133.2.1.	Valeriana alpina minor <u>ibid.</u> 87.2.V.
Tithymallus sive Esula exigua folijs obtusis, <u>ib.</u> 11. ubi reperitur	Valeriana peregrina purpurea albave, <u>ib.</u> VI. in quo cum
Tithymallus exiguus <u>saxatilis</u> , 133.2. ubi proveniat <u>ibid.</u>	Nardo montana <u>conveniat</u> , 88.1. VI. alias Valeriana
	Sicula, <u>ibid.</u> item Valeriana Indica Imperati, & Nar-
	<u>du Cretica</u> tandemq; Tripolium <u>ibid.</u>
	Valeriana rubra angustifolia <u>ibid.</u> 88.2. VII.
	Verbascum folijs rotundū flore blattaria <u>ibid.</u> 114.2.
	Verbena nodiflora <u>ibid.</u> 125.1.
<b>V</b> aleriana palustris major profunde laciniata, 86.2.	Veronica alpina bellida <u>folio hirsuta</u> , 116.1. I. ubi reperitur
I. in quo Valeriana vulgari conveniat <u>ib.</u>	Vicia Onobrychidū flore, 149.1. ubinam proveniat, <u>ibid.</u>
Valeriana palustris inodora parum laciniata <u>ibid.</u> 111.	
Valeriana alpina prima <u>ibid.</u> 111.	

# F I N I S.















